

# 914 Register Der Teutschen wörter

Adnustrein. 635 Angelica 361  
Agrimonie. 455 Stern 508  
Ahorn. 86

Alantwurzel. 47  
Alabastrstein. 633  
Alaun. Alaun. 477  
Amiantstein. 633

Andor. 391  
Angelic. 354 Spyrnam  
Angelyskraut. 431

Anisib. 355  
Apfelbaum allern. 131  
Arabischstein. 632

Argemone. 299  
Asterstein. 627  
Aeschbaum. 86

Atich. 547  
Amomum 35 Alin 615

Binnol auß vngutigen olum 48  
Galdran 28

Bachwurz. 253

Balsam. 39 39

Balsamkraut.

Balsamwurz. 268  
Basilien. 268 Volkbasilum 449

Barben. 174

Baumlein. 381

Beybrechm. 190

Brunststein. 347

Brunnwurz. 20

Brisp. 399

Brygryn. 614

Burgward. 27

Burtran. 369

Butorin. 430

Buthpflanz. 519

Bibin. 521 451  
Bib. 175 Blau Wurz biol. 511

Birr. 225

Bilsenkraut. 472

Bimulkraut. 559

Binsang. 494

Bintzulang. 275

Bintzm. 462

Birne. 177

Blyf. 595

Blinowisz. 599

Blotm. 439

Blut. 213

Blutstein. 595 & 628

Borkp. 326

Roburp. 475

Borkp. 460

Borkp. 270

Borkp. 227

Born. 254

Aegyptisch Born. 235

Born. 599

Born. 513

Brandblatt. 398

Brunn. 436

Brunnstamt. 453

Bryp. 523

Brym. 286

Brym. 250 & 544

Brym. 204

Brym. 292

Brym. 618

823 823

Cantharid. 37

Canthar. 416

Caperm. 293

Cardanoclin. 22

Casia. 30 Cndbaum 83

Cinnam. 31

Cristwurz. 527

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495



Cantharid. 37

Canthar. 416

Caperm. 293

Cardanoclin. 22

Casia. 30 Cndbaum 83

Cinnam. 31

Cristwurz. 527

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Citrat. 495

Damm. 69  
Damm. 69

Damm. 306

Damm. 525

Damm. 337

Damm. 337

Damm. 475

Damm. 334

Damm. 231

Damm. 316

Damm. 195

Damm. 380

Damm. 321

Damm. 238

Damm. 270

Damm. 482

Damm. 159

Damm. 558

Damm. 199

Damm. 186

Damm. 479



Eron fackeln. 594  
 Eronkraut. 466  
 Eron wst. 594  
 Eronw. 265 Eingelischkraut 431  
 Eronfuss. 557  
 Eronf. 355  
 Eronf. 578  
 Eronf. 361  
 Eronf. 300  
 Eronf. 287  
 Eronf. 548  
 Eronf. 271  
 Eronf. 467  
 Eronf. 503  
 Eronf. 382  
 Eronf. 584

Eronf. 556  
 Eronf. 230  
 Eronf. 366  
 Eronf. 232  
 Eronf. 151  
 Eronf. 151 Niedrige Eronf. 544  
 Eronf. 302  
 Eronf. 239  
 Eronf. 421  
 Eronf. 381  
 Eronf. 181  
 Eronf. 232  
 Eronf. 408 & 473  
 Eronf. 320  
 Eronf. 518  
 Eronf. 355  
 Eronf. 178  
 Eronf. 456

Eronf. 226  
 Eronf. 630  
 Eronf. 19  
 Eronf. 122  
 Eronf. 213  
 Eronf. 588  
 Eronf. 356  
 Eronf. 280  
 Eronf. 299  
 Eronf. 471  
 Eronf. 407  
 Eronf. 672  
 Eronf. 42 Eronf. 257  
 Eronf. 224  
 Eronf. 440  
 Eronf. 389  
 Eronf. 623 Eronf. 450  
 Eronf. 182  
 Eronf. 386  
 Eronf. 490

Eronf. 19  
 Eronf. 452  
 Eronf. 561  
 Eronf. 288  
 Eronf. 195  
 Eronf. 512  
 Eronf. 504  
 Eronf. 522

Eronf. 227  
 Eronf. 520  
 Eronf. 360  
 Eronf. 295  
 Eronf. 423  
 Eronf. 502  
 Eronf. 427  
 Eronf. 503  
 Eronf. 172  
 Eronf. 443  
 Eronf. 373  
 Eronf. 74  
 Eronf. 521  
 Eronf. 148  
 Eronf. 257  
 Eronf. 27  
 Eronf. 515  
 Eronf. 490  
 Eronf. 50  
 Eronf. 282  
 Eronf. 324  
 Eronf. 188  
 Eronf. 486  
 Eronf. 622  
 Eronf. 189  
 Eronf. 453 Eronf. 287  
 Eronf. 229  
 Eronf. 392 & 415  
 Eronf. 271  
 Eronf. 184 Eronf. 193  
 Eronf. 332  
 Eronf. 423  
 Eronf. 556  
 Eronf. 547  
 Eronf. 133  
 Eronf. 217  
 Eronf. 186 Eronf. 299  
 Eronf. 483  
 Eronf. 514  
 Eronf. 398

Eronf. 635  
 Eronf. 428  
 Eronf. 156  
 Eronf. 422  
 Eronf. 30  
 Eronf. 602  
 Eronf. 284  
 Eronf. 435  
 Eronf. 633  
 Eronf. 475



Jakob. 623  
 Kappan rosm. 468  
 Kappantrüblin. 305 & 461  
 Kappan katzen wädel. 434  
 Kappan wädel. 458  
 Kappan korn. 508  
 Kappan fältz. 345  
 Kappan korn. 266  
 Käp. 204  
 Käp. 121  
 Käp. Baum. 115.  
 Käp. Baum. 227  
 Käp. Baum. 130  
 Käp. Baum. 130  
 Käp. Baum. 382  
 Käp. Baum. 346  
 Käp. Baum. 521  
 Käp. Baum. 490  
 Käp. Baum. 429  
 Käp. Baum. 501  
 Käp. Baum. 501  
 Käp. Baum. 242  
 Käp. Baum. 410  
 Käp. Baum. 196  
 Käp. Baum. 277  
 Käp. Baum. 397  
 Käp. Baum. 247  
 Käp. Baum. 468  
 Käp. Baum. 255  
 Käp. Baum. 231  
 Käp. Baum. 326  
 Käp. Baum. 153  
 Käp. Baum. 97  
 Käp. Baum. 996  
 Käp. Baum. 418  
 Käp. Baum. 427  
 Käp. Baum. 261  
 Käp. Baum. 297  
 Käp. Baum. 591  
 Käp. Baum. 590  
 Käp. Baum. 628  
 Käp. Baum. 297

Lid no my. 436  
 Lid. 389  
 Lid. 447  
 Lid. 236  
 Lid. 208  
 Lid. 84  
 Lid. 48

Main. 244  
 Main. 631  
 Main. 468  
 Main. 345  
 Main. 144  
 Main. 144  
 Main. 249  
 Main. 212  
 Main. 72  
 Main. 149  
 Main. 463  
 Main. 149  
 Main. 305  
 Main. 202  
 Main. 576  
 Main. 273  
 Main. 487  
 Main. 364  
 Main. 246  
 Main. 580  
 Main. 390  
 Main. 242  
 Main. 185  
 Main. 323  
 Main. 248  
 Main. 496  
 Main. 496  
 Main. 112  
 Main. 155  
 Main. 292  
 Main. 167  
 Main. 174  
 Main. 468  
 Main. 406  
 Main. 625  
 Main. 293  
 Main. 255  
 Main. 138  
 Main. 304  
 Main. 417  
 Main. 204  
 Main. 632  
 Main. 61  
 Main. 414  
 Main. 381  
 Main. 214  
 Main. 634  
 Main. 404  
 Main. 339  
 Main. 405  
 Main. 103  
 Main. 158  
 Main. 503

Lang. 282  
 Lang. 264  
 Lang. 452  
 Lang. 185  
 Lang. 313  
 Lang. 380  
 Lang. 230  
 Lang. 190  
 Lang. 386  
 Lang. 445  
 Lang. 531  
 Lang. 352



Nabalckraut. 491  
 Nardischad. 474  
 Natur. 369  
 Natursalm. 653  
 Nardischadkraut. 388  
 Nardischad. 138  
 Nardischadbaum. 138  
 Nardischad. 493  
 Nardischadbaum. 621  
 Nardischadbaum. 285

Orffm. 509 & 602  
 Orffm. zung. 509  
 Orffm. 455  
 Orffm. 49  
 Orffm. 118  
 Orffm. 516  
 Orffm. 484  
 Orffm. 197  
 Orffm. 312

Pfaffenschmuck. 357  
 Pappe. 245  
 Pappe. 43  
 Pappe. 419  
 Pappe. 361  
 Pappe. 289  
 Pappe. 282  
 Pappe. 383  
 Pappe. 141  
 Pappe. 533  
 Pappe. 425  
 Pappe. 69  
 Pappe. 336  
 Pappe. 502  
 Pappe. 88  
 Pappe. 436  
 Pappe. 158

Papp. 605  
 Papp. 344  
 Papp. 343  
 Papp. 135

Papp. 410  
 Papp. 307  
 Papp. 195  
 Papp. 464  
 Papp. 228  
 Papp. 392  
 Papp. 450  
 Papp. 412  
 Papp. 227  
 Papp. 612  
 Papp. 604

Papp. 207  
 Papp. 93  
 Papp. 110  
 Papp. 458  
 Papp. 370  
 Papp. 398  
 Papp. 59  
 Papp. 93  
 Papp. 405 & 518  
 Papp. 239  
 Papp. 544  
 Papp. 403  
 Papp. 133  
 Papp. 202  
 Papp. 446

Papp. 54 & 55  
 Papp. 46  
 Papp. 619  
 Papp. 534  
 Papp. 338  
 Papp. 181  
 Papp. 497  
 Papp. 131  
 Papp. 426  
 Papp. 534  
 Papp. 343  
 Papp. 99  
 Papp. 193  
 Papp. 287  
 Papp. 165  
 Papp. 522  
 Papp. 458  
 Papp. 411  
 Papp. 460  
 Papp. 482  
 Papp. 477  
 Papp. 171  
 Papp. 322  
 Papp. 209  
 Papp. 463  
 Papp. 162  
 Papp. 195  
 Papp. 555  
 Papp. 383  
 Papp. 302  
 Papp. 485  
 Papp. 390  
 Papp. 374  
 Papp. 618  
 Papp. 445  
 Papp. 460  
 Papp. 413  
 Papp. 286  
 Papp. 279  
 Papp. 354



Gmumbarium. 82  
 Gmumbarium. 504  
 Silber glat. 597  
 Gmumbarium. 423  
 Gmumbarium. 593  
 Gmumbarium. 593  
 Gmumbarium. 251  
 Gmumbarium. 226 Gmumbarium grimp 228  
 Gmumbarium. 422  
 Gmumbarium. 596  
 Gmumbarium. 198  
 Gmumbarium. 141  
 Gmumbarium. 143  
 Gmumbarium. 543  
 Gmumbarium. 331  
 Gmumbarium. 324  
 Gmumbarium. 331  
 Gmumbarium. 240  
 Gmumbarium. 504  
 Gmumbarium. 410  
 Gmumbarium. 509  
 Gmumbarium. 553  
 Gmumbarium. 419, Gmumbarium 636  
 Gmumbarium. 424  
 Gmumbarium. 333  
 Gmumbarium. 401  
 Gmumbarium. 322  
 Gmumbarium. 313 Gmumbarium 123

Gmumbarium 457  
 Gmumbarium. 444  
 Gmumbarium. 94  
 Gmumbarium. 503  
 Gmumbarium. 494  
 Gmumbarium. 315  
 Gmumbarium. 498 & 504  
 Gmumbarium. 74  
 Gmumbarium.  
 Gmumbarium. 401 Gmumbarium 570  
 Gmumbarium. 603  
 Gmumbarium 520

Violwurz. 17  
 Violwurz. 629  
 Violwurz. 91  
 Violwurz. und allerley 2 Jahr schonalt  
 Violwurz. 200  
 Violwurz. 489  
 Violwurz. 366  
 Violwurz. 274  
 Violwurz. 221

Violwurz 220  
 Violwurz. 319  
 Violwurz. 440  
 Violwurz. 443  
 Violwurz. 435 & 553 (Violwurz 495)

• Waldsagen. 556  
 Waldwurz. 433  
 Waldwurz. 182  
 Waldwurz. 182. Waldwurz 445  
 Waldwurz. 556  
 Waldwurz. 449  
 Waldwurz. 253  
 Waldwurz. 489  
 Waldwurz. 441  
 Waldwurz. 285  
 Waldwurz. 425  
 Waldwurz. 175  
 Waldwurz. 319 & 537  
 Waldwurz. 441  
 Waldwurz. 433  
 Waldwurz. 251 Waldwurz 260  
 Waldwurz. 257  
 Waldwurz. 81  
 Waldwurz. oder Waldwurz 116  
 Waldwurz. 432  
 Waldwurz. 569  
 Waldwurz. 348  
 Waldwurz. 569  
 Waldwurz. 520  
 Waldwurz. 65  
 Waldwurz. 304 Waldwurz 636  
 Waldwurz. 58.  
 Waldwurz. 330  
 Waldwurz. 222  
 Waldwurz. 316  
 Waldwurz. 325  
 Waldwurz. 554  
 Waldwurz. 267  
 Waldwurz. 365  
 Waldwurz. 493  
 Waldwurz. 526  
 Waldwurz. 434  
 Waldwurz. 323  
 Waldwurz. 237 & 272  
 Waldwurz. 25  
 Waldwurz. 533  
 Waldwurz. 146  
 Waldwurz. 495  
 Waldwurz. 345  
 Waldwurz. 328  
 Waldwurz. 117 Waldwurz 349  
 Waldwurz. 366  
 Waldwurz. 27  
 Waldwurz. 423  
 Waldwurz. 357  
 Waldwurz. 244  
 Waldwurz. 508  
 Waldwurz. 553 & 280  
 Waldwurz. 529  
 Waldwurz. 275  
 Waldwurz. 260.  
 Waldwurz. 340  
 Waldwurz. 353  
 Waldwurz. 353 & 412 & 448  
 Waldwurz. 560



Wolffsch. Mirtel 523  
Wolffsch. Jaffaran. 384  
Wolffsch. Jaffaran. 384 & 559  
Wolffsch. Jaffaran. 570  
Wolffsch. Jaffaran. 267  
Wolffsch. 454  
Wolffsch. 385  
Wolffsch. 177 Wunderbaum 538  
Wolffsch. 479  
Wolffsch. 539  
Wolffsch. 479  
Wolffsch. 204  
Wolffsch. 334  
Wolffsch. 393  
Wolffsch. 451  
Wolffsch. 498  
Wolffsch. 23  
Wolffsch. 30  
Wolffsch. 76

Zapfenbaum. 524  
Zapfenbaum. 202  
Zapfenbaum. 525 & 546  
Zapfenbaum. 537  
Zapfenbaum. 233  
Zapfenbaum. 276  
Zapfenbaum. 596



liber sancti Nicolai epi in bruno per me fratrem Nicolau  
Iacobus aureis reparatus anno q̄ madiut sub prelo. LIII

PETRI ANDREAE

823

# MATTHIOLI


## MEDICI SENENSIS

### Commentarii,

IN LIBROS SEX PEDACII DIOSCORIDIS.

ANAZARBEI, DE MEDICA  
MATERIA.

Adiectis quàm plurimis plantarum & animalium  
imaginibus, eodem authore.



Cum Pont. Maximi, Caesaris Maiestatis, Christianiss. Galliarum Regis,  
ac Illustriss. Senatus Veneti, gratia & priuilegio.

Venetijs, in officina Erasmiana, apud Vincentium Valgrifium.

M. D. LIIII.



# SERENISSIMO AC POTENTISSIMO

PRINCIPI FERDINANDO

ROMANORVM, PANNONIAE,

ET BOHEMIAE, ETC. REGI,

INFANTI HISPANIARVM, ARCHIDVCI

AVSTRIAE, DVCI BVRGVNDIAE, ETC.

Comiti Tyrolis &c. Domino suo  
clementissimo.



VM vniuersam medicinam non modò vetustis-  
simi quique scriptores, Serenissime Rex FERDI-  
NANDE, sed recentiorum quoque plerique Dijs  
immortalibus acceptam referant, eamque ob id nō  
immeritò scientiam antiquissimam, celeberrimam,  
& diuinam existiment: tum eam præcipuè illius  
partem, quæ medicamentorum doctrinam pertra-  
ctat, dignam esse censent, quæ Dijs ipsis accepta re-

feratur, & planè diuina habeatur. Non enim fieri posse putant, ut homo ip-  
se per se abditas stirpium, aut animalium, aut fossilium naturas facultates-  
que inuestiget, adipiscatur, & perspectas habeat, nisi eas primùm à maximo  
omnium rerum opifice fuerit edoctus. Quamobrem non desunt probatis-  
simi authores, qui reiectis nugis poëtarum, & aliorum, qui fabulosè de me-  
dicinæ inuentoribus scripserunt, certò credunt, ac rationibus comprobant,  
Deum opt. max. plantarum & reliquarum rerum omnium, quas terra pro-  
creat, facultates Adæ primo humani generis propagatori indicasse, ei que il-  
larum cognitionem infudisse, simulatque illi è terra cōformato, vitæ lumen  
inspirauit. A quo subsecutam ætatem uolunt, rerum omnium notitiam hau-  
sisse, ac subinde, industria adaucta, res altius diligentiusque exquirere cœ-  
pisse: ita ut hinc primùm rei medicæ plurimum cognitionis ac ornamenti  
accesserit. Quod cum postea animaduertissent innumeri sapientes uiri, no-  
uissentque maximam esse huiusce facultatis præstantiam atque vilitatem,  
eius voluptate capti, ipsi etiam rei herbariæ, & cæteris, de quibus illa tra-  
ctat, inuestigandis ac cognoscendis studium impenderunt. Id quod abun-  
dè testantur Pythagoras, Aristoteles, Theophrastus, Democritus, Zoroa-  
stres, Xenophon, Amphilocho, Athenæus, Philisthenes, Apollodorus,  
Aristander, Hipparchus, Aristomachus, Bion, Agathocles, Diodorus, Dio-  
cles, Carystius, Epigenes, Euagoras, Praxagoras, Crateuas, Erasistratus,  
Metrodorus, Nicæus, Pamphilius, Mantias, Herophilus, Hippocrates,  
Dioscorides, Galenus, Plinius, & alij antiquorum plurimi, quorum nomi-



## Epistola

na, ne longior sim, quàm deceat, consultò prætereo. Si siquidem nobilitate ac iucunditate huius scientiæ ducti, studio item posteritatis iuuandæ, & perpetuæ sibi conciliandæ famæ, non dubitarunt varijs sese uitæ periculis committere, dum permultas ignotas peragrarent regiones, ut ueram legitimamque simplicium medicamentorum cognitionem consequerentur. Porro quòd plantarum peritia, aut inuentio, præter eam quam maximam secum adfert voluptatem & utilitatem, gloriam quoque & laudem pariat sempiternam, nouerunt non tantum vniuersi orbis sapientes, diligentissimi rerum indagatores, sed summi etiam ac potentissimi reges. Quippe illorum claritatem, quæ hinc potissimum ortum habuerat, admirati, rati in hac antiquissima facultate summum splendorem, singularemque præstantiam esse, tantum otij ac studij ad eam percipiendam, & illustrandam contulerunt, ut eorum plerique de plantarum historia & viribus libros condiderint. Nonnulli generosa antidota composuerunt, ut ita suæ, & aliorum mortalium uitæ usuique consulerent. Alij etsi ex rebus consilio & armis præclare gestis se illustres reddidissent, cum tamen illustriores effici se posse cernerent, si clarissimam stirpium facultatem ipsi quoque suo essent studio profecuti, è remotissimis terrarum regionibus raras nobilesque plantas ingenti pecunia conquisitas, ad se transferri curarunt, ut certam ac ueram earum historiam describerent. Neque illud certè hos latuit, quòd si hac in re studiosè diutius uersati, egregium quicquam inuenissent, aut scriptis tradidissent, suum nomen esset nullis non seculis celebre duraturum. quâdoquidem herbæ, quæ singulis annis reuiuiscunt, repullulant, & reuirescunt, eos perpetuò in hominum memoriam reuocant, qui illas inuenerunt, uel de ipsarum historia & viribus aliquid posteritatis memoriæ prodiderunt. Qua in re eos minime deceptos comperimus. nam satis persuasum est omnibus, Gentianam herbam à Gentio Illyriorum rege inuentam, ab eo quidem appellationem mutuatam esse, illi verò claritatem, & immortalitatem retribuisse. Similiter Lysimachia (ut Plinius est author) Lysimachum Macedonia regem, qui eam inuenit & nominauit, perpetuis laudibus celebrat. Scordium item, Mithridatem magnum illum Ponti regem, à quo Mithridatiæ herbæ nomen accepit: quin & Eupatorium, eundem Eupatorem cognominatum, à quo herbam hanc inuentam & dictam esse uolunt, nominis æternitati commendant. Clymenos præterea herba Clymeno regi inuentori suo, Euphorbium Iubæ Mauritanorum, Telephium Telepho Mysiæ regibus, Echium & Anchusa Alcibiadi Atheniensium duci, famam largiuntur æternam. Hinc etiam clarent, Attalus Pergami, & Euax Arabum reges. siquidem hic de simplicium medicamentorum viribus ad Neronem Imperatorem multa conscripsit: ille uerò, dum plura (ut Galenus perhibet) aduersus uenena, & animalium uirus eiaculantium ictus conficeret antidota, plurimum laboris insumpsit, ut legitimas plantas nancisceretur. His accedunt Archelaus Cappadociæ, Masinissa Numidiæ, Agamemnon Argiuorum reges, quorum nomina nulla uetustate extinguì poterunt, ob eam quam in cognoscendis prodendisque stirpibus



## Nuncupatoria.

stirpibus curam ac diligentiam adhibuerunt. Omittam Philometora, Hieronem, & alios plurimos magni nominis reges, ne uerbosius, quàm oporteat, rem hanc prosequi uidear, qui uel ipsi ex hoc immortalem gloriam retulerunt, quòd rei plantariæ studiosi extiterint, in eaque de posteris præclare sint meriti. Sunt etiánum poëtae quàm plurimi, in quorum poëmatibus Sole clarius lucet, rem herbariam & antiquam fuisse, & semper laudibus decantatam. qua in re & ipsi nedum insigne, sed etiam perpetuum nomen sibi conciliarunt. Ex Græcis quidem produntur Orpheus, Musæus, Hesiodus, Homerus, Alcæus, Rufus Ephesius, quem testatur Galenus, libros quinque de herbis, uersibus scripsisse. ex Latinis autem sunt Vergilius, Ouidius, & Aemilius Macer, qui plura de plantis notatu digna, & nunquam interitura, carminibus cecinerunt. Herbarum gloriam mulieres quoque affectasse, & affectas esse, ut quæ multum curæ ac studij earum uiribus inuestigandis impederint, non modò poëtae, sed etiam historici tradunt. Etenim ob id Circen, à qua Circea herba dicta est, poëtae Solis filiam fuisse fabulantur. Sed hæc re uera eam demum exquisitam herbarum notitiam adepta est, ut non temerè ob eius admirabilia facta illis seculis diuina potius, quàm humana sit habitata. Talis quoque Medea fuit, quæ tantam herbarum notitiam habuit, ut cùm compositis ex ijs medicamentis, pluribus senectutem retardasset, Aesonem poëtae finxerunt ultimo affectum senio, ab hac iuuentuti fuisse restitutum. Helena ad hæc Helenio herbae, quam primùm, ut quidam uolunt, seuit, suum nomen impertita est: atque ideo in ea nunc etiam nominatissima uiuit. Artemisia uerò Mausoli Cariae regis vxor, alioquin præclari nominis mulier, uel ex hoc memorabilis & immortalis reddita est, quòd suum nomen herbae inditum reliquerit. Illud insuper satis esse posset, ut quenque ad plantarum cognitionem capeSSendam inuicaret, quòd hæc tātum in se utilitatis habeat, ut etiam animalia ipsa, natura docta plurimarum herbarum uires cognoscāt, easque mortalibus indicarint. Quandoquidem cerui dictamnum herbam, quòd vulnerati, eius pastu telum eiecissent, sagittarum vulneribus mederi ostenderunt. Item ceruæ seseli herbam demonstrarunt: testudines cunilam, mustelæ rutam, accipitres hieracium, columbæ verbenacam, hirundines chelidonium, ciconiæ origanum, & alia denique animalia alias innumeras herbas inuenere ac mōstrauere. Quocirca si ad prædicta mentem animūque homines conuerterent, si medicæ materiæ primordia spectarent, utpote cùm plantæ suis diuinis præditæ uiribus, statim ab elementis conditis, è terra emerferint, nullum mihi dubium est, quin omnes faterentur, hanc facultatem antiquitate, nobilitate, & diuinitate cæteras antecellere. Neque ob id solum illi tantum laudis, admirationis, ac gloriæ debetur, quòd eius cognitio iucunda & delectabilis sit, sed etiam quia utilis ac necessaria existit. Ea nanque sanitatem (qua nihil homini exoptatius esse potest) tuetur, varia innumeræque morborum genera fugat, ferarum virus euincit, & venenorum vim demolitur: quinetiam homines in uita diutius seruat, & sæpe deploratos, quorum scilicet salutis nulla spes reliqua est, ad uitam reuocat. Quod



## Epistola

cùm rectè quidem æstimassent Romanorum imperatorum nonnulli (vt libro primo de antidotis testis est Galenus) etsi in republica administranda; & prouincijs gubernandis ac tutandis plurimum essent occupati, eos tamen non mediocre studium tenuit colendæ atque illustrandæ rei herbariæ. Quippe vt legitimas plantas consequerentur, vtquæ veris aromatibus potirentur; in multis ac longinquis regionibus herbarios magnis sumptibus aiebant, muneribusque donabant: hac præterea animi inductione, vtinde non minus gloriæ quàm vtilitatis referrent, quòd ita quoque studerent mortalitatem beneficio demereri. Sanè memorabili suorum maiorum exemplo ducebantur, qui non solum exuias regum, quos in bello vicerant, trophæis dicatas, in triumphis portare, ipsosque reges victos ante se ducere solebant, sed etiam peregrinas plântas, & generosa aromata, quibus raræ præclaræque doctes inerant, in eisdem magno cum honore ferebant. Nec putabant ij, se minorem laudem ac gloriam adeptos esse ex plantis illis, quas postea diligenter suis in hortis ferebant, itémque ex aromatibus, quæ inter sua alia pretiosa reponabant, in suum & aliorum commodum, quàm ex trophæis, simulacris, & arcubus, quæ omnia erigi curabat senatus populúsque Romanus in perpetuam rerum gestarum memoriam; & eorum gratiam, qui se tali laude dignos exhibuerât. Magno etiam apud Romanos honore habiti sunt ij, qui de plantarum historia & viribus scripserunt, in quæ hac facultate claruerunt: Argumento satis manifesto, quòd expugnata Carthagine, omnes bibliothecas, quas inuenerant, varijs regibus ac principibus donauerint, præter duo & triginta volumina de re herbaria & agricultura tantum, à Magone Pœno scripta, quæ Romam attulerunt; & vt in Latinam linguam verterentur, mandarunt: tantam nimirum solus cum Romanis iniit gratiam. Magos ille rei herbariæ, & agriculturæ peritus. Verùm enimvero etsi medicæ materia nullis olim non seculis celebris, nec solum tractata, sed etiam excolta fuerit, accidit tamen vel regnorum euerfionibus; vel seditionibus, & bellis tum ciuilibus, tum externis, vel grassantis pestilentie sæuitia, vel medicorum qui nos præcesserunt incuria, vt tam præclara diuinæque facultas superioris nostro seculo obsoleta, intentata, & inculta iacuerit, adeò vt perpauci reperirentur medici, qui alias ferè plantas, quàm olera, quorum frequens est in cibis vsus, cognoscerent. Qua quidem re animaduersa, complures ætatis nostræ clarissimi viri, & rei medicæ diligentissimi indagatores, Latini & Græci sermonis peritissimi, Hermolaus Barbarus, Nicolaus Leonicensis, Ioannes Manardus, Ioannes Ruellius, Marcellus Vergilius, Leonhartus Fuchsius apud Germanos claræ eruditionis medicus, Antonius Musa in academia Ferrariensi doctrina celebris, Otho Brunfelsius, Iacobus Syluius, Aloysius Mundella, & alij, strenuam nauarunt operam, vt discussa superioris seculi caligine, medicam materiam è tenebris eriperent, & suæ luci restituerent. Quos equidem eo quo potui maiori studio atque industria secutus; cùm multis iam annis animaduertissem in vniuersis Italiæ pharmacopolijs cùm à seplasiarijs ipsis, tum maximè à medicis huius facultatis ignaris, quàm plurimos

## Nuncupatoria.

plurimos errores, eosque graues & detestandos, committi in humanæ vitæ discrimen, ac sæpe in eiusdem perniciem, ut illorum errores tollerentur; habita nostrorum pharmacopœorum ratione, quorum pauci satis Latine sciunt, Dioscoridem Anazarbeum & Græcum, & antiquissimum scriptorem, ac in simplicium medicamentorum historia & viribus reddendis facile principem, in Italicam linguam vertendum, & Italicis item commentarijs, ut possem, illustrandum suscepi. In quos utique, quantum ingenio, quantum labore ac cura, quantum denique iudicio consequi potui, contuli, ut legitimas quas puto plantas proderem, meamque similiter de cæteris simplicibus medicamentis proferrem sententiam. Qua in re coacti fuimus non modò seplasiariorum, & medicorum superioris ætatis, qui hanc medicinæ partem neglexisse videntur, errata passim explodere, sed recentiorum quoque, qui tamen materiam hanc diligentissimè tractarunt, opiniones sæpè numero refellere. Nec certè mirum, quòd viri alioqui doctissimi, & summa laude digni impeerint, lapsique fuerint, vel in tanto rerum discrimine vacillantes, vel interdum humana caligine cæcutientes. quod quidem & nobis aliquando accidisse hoc opere non dubitamus. Porro plantarum & animalium historiam latè, quantum res postulare visa est, complexus sum. In viribus autem recensendis, eas cuique plantæ ex Galeno in fine reddidi, eoque ferè semper contentus fui, nisi quando quid ipse prætermisit. Præterea cum plura sint plantarum, aromatum, & aliorum simplicium medicamentorum genera, quæ frequentem in medicina vsum obtinent, partim à Mauritanis, partim ab alijs qui per singulas ætates claruerunt, inuenta, de quibus nusquam, quod extet, meminerunt Dioscorides, Galenus, aliique veterum Græcorum authores, ea omnia nostris commentarijs inseruimus, ipsorumque historiam & vires, ea qua potuimus diligentia, descripsimus. Hoc opus ubi ad vmbilicum perduxissem, vel amicorum hortatu edidi, eo in primis animo, ut aliqua ex parte industria mea hominum vitæ prodessem, deque ea bene meritis existimarer. Affecutus hoc sim necne; nostrum non est ferre iudicium. Nisi temerè fortasse à nobis dictum videretur, illud certè testari possem, me ex eo coniecisse non ingratum opus Italis, neque inutile fuisse; quòd paucis post annis tertio, & quarto, & quinto (ni fallor) fuerit excusum & venditum. Adderemque non vulgare de eo doctorum virorum iudicium, ex quo etiam cognoui, me non oleum nec operam planè lusisse. Id profectò me mouere debebat, ut si quid de exteris quoque gentibus promereri possem, tentarem, ne viderer in hoc Italis solis natus. Sed illud præterea huc accessit, quòd ex illis etiam aliquos nostris commentarijs, quantumvis Italicè conscriptis, delectatos esse, ex iisque fructum aliquem cepisse intellexerim. Cuius rei illud mihi satis manifesto indicio fuit, quòd ex recentioribus tam Germanis, quàm Gallis scriptoribus inuenerim; quibus placuit nostras qualescunque sententias interpretari, suisque scriptis interserere; neque eas tantum nobis ingenuè acceptas referre, sed de nobis etiam (quæ eorum fuit humanitas) admodum honorificè loqui. Quorum erga nos vo-



## Epistola

luntatem vt augerem , & studium omnium externorum si possem adiuuare , vtquæ illis gratiam aliquam rependerem , & cum alijs omnibus inirem , nulla mihi commodior ratio visa est , quàm vt Italicos nostros cōmentarios in Latinam linguam trāsferrem . Hos itaque quàm primùm potui , Latinos feci , in quibus tamen plura mutauī (quod maxima rei difficultas tulit) plura auxi , & omnia quodammodo illustraui . Adiecimus insuper quàm plurimas plantarum & animalium imagines , quàm fieri potuit diligentius , ad naturæ imitationem expressas , magnis cū laboribus , tum sumptibus : non alia mehercle ratione , quàm vt ijs , qui terras peragrarē non possunt , nec præceptores habent , quasi hortulum exhiberemus , in quo omni tempore , nullo cultu adhibito , viuas ferè stirpiū effigies spectarent . Enimuero , Serenissime Rex **F**ERDINANDE , tanto semper cognoscendæ materiæ medicæ , & iuuandæ posteritatis desiderio exarsī , vt faciliè impulsus sim per varias ire solitudines , loca tum amœna , tum horrida perlustrare , & abditas terræ fibras scrutari , vt res ipsas oculata fide cognoscerem . quas modò vel cum vitæ meæ periculo in præruptis montium locis quæsiui , modò in densis & asperis syluis , modò in conuallibus opacis , modò in collibus apricis , nūc in paludibus & lacubus , nunc in fontium & fluminū ripis , nunc in litoribus maris , aliàs in campestribus , aruis , pratis , & vinetis , aliàs in clarissimarum vrbium viridarijs , aliàs in ruderibus & collapsis ædificijs , aliàs in speluncis & lōgis terræ meatibus , aliàs in subterraneis metallorum fodinis , & eorum fornacibus . Ex quibus sanè locis plura mecum detuli simplicia medicamenta , quæ ab adulterinis , quorum est in officinis vsus , maximè distant . Nec me certè labores aut pericula deterruissent à magnis longisque itineribus , quòd Galeni exemplo mare traiecissem , & Cyprium , Cretam , Lemnum , Syriam , Aegyptum , aliàsque regiones peragrassem , vt multa præclara simplicia , quæ hodie desiderantur , essem consecutus , ad mortalium cognitionem & vsum transferenda , nisi meæ animi propensione obstitissent negotia domestica , ægros curandi pietas , & corporis imbecilla satis constitutio , quæ me quidē maris & longæ peragrations incommoda ferre non diu permisisset . His tamen nostris secundis conatibus magnam opem tulerunt (nec enim me pudet verū apertè fateri) nōnulli huius ætatis medici clarissimi , & rei herbariæ peritissimi , quorum alij plantarum missione , alij consilio , alij rerum inuentarum cōmunicatione , mihi multum profuerunt . Inter quos potissimùm non grauaret hoc loco cōmemorare , si possem illis ex beneficij accepti commemoratione aliquam referre gratiam , **L**ucam **G**hinum **F**orocorneliensem medicum ingenij & doctrinæ singularis , **P**isis magna cum omnium laude rem herbariam profitentem : item **G**abrielem **F**alloppium **M**utinensem , medicū eruditione & experientia clarum , qui **P**atauij honoratissimè humani corporis fabricam pariter & materiam medicam profitetur : necnon **A**ndream à **L**acuna **S**ecobiensem medicū præstantissimum : præterea **B**artholomæum à **M**aranta **A**pulum medicum apprime eruditum : **V**lysssem quoque **A**ldrouandum **B**ononiensem honestissimi generis , probatæ doctrinæ , & magnæ expectationis medicum . Quibus omnibus eò

## Nuncupatoria.

bus eò magis me deuinctū esse intelligo, quòd ij pro sua tantū humanitate ac liberalitate, me, quem non nouerunt nec viderunt vnquam, amore & officio prosequantur: nisi fortè eorum in nos beneuolentia ex eo orta sit, quòd iam aliquam de nobis conceperint opinionem ex nostris Italicis commentarijs. Non defuerunt etiam amicitia & affinitate nobis coniuncti, quorum studio ac diligentia, mihi licuit hoc tēpore non aliter peragranti, ex diuersis locis plures plantas consequi, earūque picturas edere. Sed præsertim in hoc pro nobis assiduam nauauit operam Io. Odoricus Melchiorius Tridentinus medicus spectatæ eruditionis, & magnæ spei iuuenis, qui me in patris locum semper habuit. sanè is tum Patauio, tum Venetijs complures stirpes nō vulgares ad nos perferri curauit. Potuissem equidem hæc omnia dissimulare, & mihi soli vniuersam laudem vendicare. sed absit omnis inanis gloriæ cupiditas. Etenim benignum est (vt Plinius in epistola ad Vespasianum scitè inquit) & plenum ingenui pudoris, fateri per quos proficimus. Cæterum quandoquidem Dioscorides non modò quinque libris tradidit vniuersam medicam materiam, quæ plantis, animalibus, & metallicis comprehenditur, sed his etiam sextum attexuit, in quo ad mortalis generis vsum de antidotis disseruit, quibus venena omnia arcentur, ac omnium venenosorum animalium morsus ictusque curantur, ideo nos ipsum secuti in hunc quoque cōmentarios scripsimus, in quos plura regessimus, quæ vitæ hominum profutura speramus. Nam præterquàm quòd improborum veneficorum insidijs pateāt cū vniuersum genus humanum, tum maximè reges ac principes, nō desunt etiam innumera animalium genera, quæ morfu vel ictu homines ex tēpore interimunt. Quippe scorpiones, stelliones, phalangia nostris in domibus viuunt oberrantque, quæ animalia cū nullam habeant personarum aut locorum rationem, vbique sese recipiunt, & latebras nidósque parant. quo fit, vt interdum ab hominibus inscientibus molestata, ictu venenum inferant, & ictos in perniciem agant. Latent præterea modò in hortis & viridarijs, modò in vinetis, modò in pratis, aliisque in locis inter flores & herbas, aspides, viperæ, & alia venenosa reptilia, quæ vel si tantillum quidem pede premātur, aut excitentur; illico exitiosum vulnus infligunt: ex quo statim, vel paulò post icti commoriuntur, nisi quàm primū antidotis succurrantur. Est & canis, qui etsi homini familiarissimus sit, tamen cū in rabiem agitur, quos morderit, in horrendum mortis genus plerunque deducit. Quòd cū diligenter examinassent rectèque expendissent complures veterum sapientum, quorum superius meminimus, plantarum, aromatum, & aliorum quoruncunque simplicium medicamentorum vires altius perscrutati, varia aduersus venena & virulentorum animalium morsus antidota cōposuerunt. Quorum vestigia secutus Nithridates magnus ille Ponti & diuersarum gentium rex, cuius etiam antè mentionem fecimus, cū non magnam satis sibi gloriam ex eo comparasse iudicasset, quòd mortalium solus (vt tradit Plinius) duabus & viginti linguis loqueretur, adeò vt de subiectis gentibus nullū hominem per interpretem compellaret, nec quòd plurimis potitus esset victorijs,



## Epistola

rijs, ad maiorem adhuc immortalémque suam gloriam medicinæ peculiari-  
ter curiosus fuit, & rei herbariæ percipiendæ maximum studium impendit.  
Quorum vtrunque planè affecutus videtur: nam ex herbarum cognitione  
antidoti genera inuenit, ex quibus vnum composuit, quod nomen etiam e-  
ius retinet, & suum authorem famæ immortalitati consecrat. Huius antido-  
ti vsu adeò corpus suum rex ille firmauerat, tutúmque à venenis reddiderat,  
vt cum ipse vitam finire mallet, quàm Romanorum seruitutē pati, id sæpius  
fertur frustra veneno tentasse. Mithridatem imitatus est Andromachus do-  
ctissimus pariter & elegatissimus Neronis imperatoris medicus. Is siquidem  
theriaces compositionem inuenit, quæ, Galeni testimonio, à venenis serua-  
uit non solum plurimos Romanorum imperatores, ac innumeros principes,  
sed & alios quosque, qui eam opportunè sumpserunt. quapropter Galeni  
tempore, ab ipso magnificè ac splendidè, ita iubentibus imperatoribus, hæc  
parabatur antidotus. Præteribo Attalum Pergami regem, de quo etiã à no-  
bis antè dictum est, quem quoniam idem studium tenuit antidota conficien-  
di, ideo is ab ipso Galeno maximis laudibus celebratur. Veruntamen nostra  
hæc ætas ex horum antidotorum vsu non eum fructum neque vtilitatem ca-  
pit sentitque, quam sensit antiquitas. Nam etsi eorum nomina monumentis  
tradita habeamus, atque etiam antidota ipsa in seplasiariorum officinis para-  
ta reperiantur, non eos tamen effectus virésque hæc præstant, quas suis no-  
minibus pollicentur, quásque illa præstare veteres memoriæ prodiderunt.  
Cuius discriminis illud nimirum in causa est, quòd plura à nobis desiderētur  
generosa & pretiosa aromata, quæ legitima ac omnium præstantissima suis  
antidotis immiscebant Mithridates, Attalus, Andromachus, Galenns, & alij  
complures veterum: quæquæ ingenti pecunia, summo studio ac labore, ab  
Arabum, Aethiopum, Troglodytarum, aliarúmque diuersarum gentiũ re-  
gionibus, illius florentissimæ ætatis imperatores Romam adferri curabant.  
Vbi tamen nemini, præterquàm medicis imperatorijs (quod fatetur Gale-  
nus) licebat veram ac legitimam theriacen conficere: nisi quis fortè poten-  
tiorum fauore, ab Imperatoribus esset ijs præclaris donatus aromatibus. Id  
quod maximè facit, ne miremur, si theriace nostri vsus, itémque antidotus  
Mithridatica non perinde pollent viribus, atque earum nomina promittūt,  
& veterum scripta testantur. At certè in hoc satis infelicitè actum esse con-  
stat cum vita hominis, vtpote quæ iacturam fecerit maximorum remedio-  
rum aduersus venena, aliáque grauissima incommoda, quibus obnoxia est,  
ac sæpe affligitur. Quamobrem hac nostra ætate, in qua quidem reliqua fe-  
rè omnia in pristinum candorem reduci, & suæ integritati restitui videntur,  
gloriosus & verè fortunatissimus dici posset summus ille Pontifex, inuictis-  
simus ille Imperator, serenissimus ille Rex, magnanimus ille Princeps, sa-  
pientissimus ille cuiuscunque reipub. Senatus, qui proprijs animi dotibus  
Romanos illos imperatores, & alios potentissimos reges imitatus, nullis si-  
neret se vel sumptibus, vel laboribus grauari, sed omne studium, omnem  
operam, omnem denique suam facultatem adhiberet, vt iamdudum deper-  
dita

## Nuncupatoria.

dita aromata, quæ omnino nobis defunt ad antidota conficienda, in lucem reuocarentur. Enimuero si horum aliquis id faceret, vel si omnes idem facere contenderent, non suæ tantum & aliorum mortalium vitæ consulerent, deque posteris præclare mererentur, sed præterea hinc famam assequerentur æternam. siquidem beneficium id posteris summa cum laude proprijs authoribus perpetuò acceptum referrent. Equidem si id mihi non licuit, id saltem quod potui, omni studio industriæque meæ præstare conatus sum. nam eum viderem huius nostræ ætatis homines in iisdem quæ priscæ, atque etiã in maioribus vitæ periculis versari, nobis tamen deesse vera illa ac generosa veterum antidota, ob ea quæ hodie in ijsce desiderantur legitima ac præclara simplicia medicamenta, tentare volui, possentne ex legitimis quæ habemus, composita fieri medicamenta, quæ illorum vicem pensarent. Feci id quidem magno meo labore, longoque rerum usu & experientia: sed affectus sum necne quod contenderam, ignoro. Illud certè fateri possem, ea semper mihi visa esse longè felicius theriacæ & Mithridaticæ antidori vires præstare, quàm quæ passim hac tempestate, earundem nomine conficiuntur. Verum non omisi, quin in hoc, sicut in reliquis aliorum potius esset iudicium, quàm meum. quandoquidem eo promerendi animo, quem semper habui, in nostris commentarijs in sextum Dioscoridis librum, non solum Dioscoridem ipsum, quantum potui, illustraui, sed quædam etiam antidota nobis inuenta descripsi. Cæterum cum veterem & vilitatum scriptorum morem secutus, patronum quærerem, qui hosce nostros commentarios ab inuidis, maleuolis, & vitiligatoribus protegeret ac tueretur, cuius item amplitudine, autoritate, & splendore maiores illi quodammodo, grauiore, & illustriore redderentur, prima omnium mihi occurrit Serenissima maiestas tua; Potentissime Rex FERDINANDE; vt quæ pro sua summa virtute atque immensa clementia, neminem vnquam iniquè depresso non extulerit, aut iniuria aliqua affectum non defenderit. Præterea mihi admodum condecens visum est, vt opus, in quo ea tractatur materia, cuius studio olim reges summopere delectati (quod suprâ retulimus) perpetuum nomen sibi conciliarunt, non alio quàm Regi dicetur, eique præsertim, quem miræ naturalis philosophiæ & rei medicæ voluptas tenet. Quarum facultatum dignitatem & excellentiam quia Serenissima Maiestas tua summo studio & amore prosequitur, ideo iure aliquo hos nostros commentarios illi dedicandos esse putavi. Illud quoque me adduxit, vt potissimum tuæ Serenissimæ maiestati eos nuncuparem, quòd ex compluribus audiuerim, eam hilari admodum vultu, summæque humanitate cuiusque conditionis hominum munera suscipere: id quod christianæ charitatis, ac religionis maximum præbet indicium. Huc etiã accedit immensa erga studiosos quosque Serenissimæ maiestatis tuæ benignitas, quæ eos perpetuò promouet, fouet, ac tuetur: sed maximè in medicos, quos ea præ cæteris (vt audio) præcipua benignitate complectitur, utpote qui diuinam potius, quàm humanam profiteantur facultatem. Quod etiam apud Hebræos testatum reliquit Iesus Syrach di-

uino



## Epistola nuncupatoria.

uino spiritu afflatus, dum sic inquit. Ab altissimo orta est medicina, & à rege accipiet munera. medicamenta de terra creauit dominus, & vir prudens non contemnit illa. disciplina medici exaltabit caput eius, & in conspectu magnatum collaudabitur. hæc ille. Porro illud omnibus mirum videri posset, quòd Serenissima maiestas tua, etsi in grauissimis negotijs, sui imperij functionibus, & curis dies ferè noctesque versetur, præsertim cum ea sola in vniuersa repub. christiana aduersus immanissimas Turcarum gentes iugiter firmissimum sese offerat propugnaculum, nunquam tamen prætermittere soleat, quin succisuius quibusdam horis, uarijs scientiarum studijs vacet. Sed quid plura referam de tanto Rege? cuius nimirum religionem, iustitiam, prudentiam, pietatem, generositatem, liberalitatem, beneficentiam, humanitatem, ac probitatem admirantur non modò vniuersæ reipub. christianæ principes ac populi, sed aliæ quoque gentes, quando nullis hominum præconijs præclarissimæ animi illius dotes satis explicari possint. Reliquum igitur est, vt Serenissimam maiestatem tuam humillimè rogem, vt hoc sui mancipij munusculum, qualecunque sit, in seruitutis meæ testimonium læta fronte accipiat, foueat, & tueatur. Ad quod eam maximè facturam spero. nam si munus hoc quasi chartaceum perpendet, exiguum quidem, nec tanto rege dignum videbitur: at si animum donantis respiciet, maximum dicet, atque hoc nomine me (quæ sua erit immensa benignitas) suo fauore complectetur. Quod si ipsa, vt spero, fecerit, præterquàm quòd quàm plurimos studiosos doctòsque viros excitabit, me quidem eò inuitabit atque alliciet, quòd maiora fortasse atque exoptatiora, quæ nostra in officina continuè cuduntur, diutius latere non sinam. Quæ si in lucem quandoque prodibunt, ea vniuersa posteritas Serenissimæ maiestati tuæ accepta feret. Cui non solùm hæc, sed & meipsum, & seruitutem meam dedico, dono, ac voueo. Coritiæ, Calen. Ianuarij, M. D. LIIII.

Sereniss. Maiestatis tuæ

Mancipium

Petrus Andreas Martini  
thiolus medicus.

PETRI

# PET. ANDREAE MATTHIOLI ad medicæ materiæ studiosos,

## Præfatio.



**S**I VELLE eorum morem sequi, qui antequam opus suum aggrediantur, illud in primis profitentur, nihil sibi maiori curæ ac studio esse, quam ut vitæ vsuque mortalium confulant; hoc ipse quoque ingenue facere possem. Nam ea animi propensione ab ipsa iuuentute, quantum mihi otij ab artis medicæ exercitatione, & cura familiari impetrare licuit, id totum ad bonorum autorum libros euoluendos, ad simplicium medicamentorum cognitionem assequendam, ac demum ad scribendum contuli. Qua in re, ut certè apud omnes testatum relinquerem, me hac mente animoque elaborasse, ut quantum studio, labore, atque industria consequi possem, humanæ vitæ prodessem, deque ea optimè meritis existimarem, Dioscoridi omnem meam operam ac diligentiam adhibui, ut quantum in me esset, illustrior redderetur, atque omnium manibus tereretur. Ad quod ea mihi visa est ratio commodissima, ut ipsum Dioscoridem in nostram Italianam linguam transferrem, in eumque commentarios à nobis Italicè item conscriptos adicerem. quòd tunc nos priuatum studium maiorque cura subiret Italos adiuvandi, quam ceteros. Etenim pauci admodum sunt in Italia pharmacopolæ, ad quos tamen potissimum hac de medicæ materia tractatio spectat, qui Latinam linguam norint. Hoc opus, quod summa animi alacritate susceperam, ubi absoluissem, emisi vel hortantibus amicis, ut quem fructum antea ex meis laboribus mihi proposueram, eum postea mortalibus percipiendum, ac omnibus æstimandum exluberem. Verùm an is talis fuerit, qualis ut esset, contenderam, malim aliorum esse iudicium, quam meum. Illud certò scio (si tamen id absque vino nobis testari licet) à multis in Italia, quorum iudicium cæteris omnibus antepono, eo animi candore scripta nostra æstimata ac commendata fuisse, quo ipsi illa scriptissimum, atque etiam Italis non inutilia, neque iniucunda fuisse. Quorum sanè exemplo, deque nostris commentariis iudicio non potui non mihi ipsi gratulari, ac omnibus, quibus illos legendos tradidimus. Accessit interea mihi non minor inde cupiditas externos quoque demerendi. eamque cupiditatem illud auxit, quòd intellexerim ijs pergratum fore, si nostri commentarii Latini fierent. Hac igitur ratione adductus, ut etiam ab externis gratiam aliquam inirem, utque omnibus in vnuersum studio, cura, industriaque mea prodessem (quod ego quidem antiquum semper habui, & præcipuum) nostros commentarios ex paruo, quod nobis superest otio, Latinos reddendos atque illustrandos suscepi. Quo in opere quid præstiterim, planè ignoro. vos, in quorum gratiam, tantum in eo laboris insumpsi, quòd iam absolutum quidem ipsum, sed mihi non decoctum emitto, legendo iudicabitis. Neque aliud ab omnibus petiitum velim, quam ut hos nostros commentarios ea animi sinceritate, & æquitate æstiment, qua suos ab alijs æstimari & perpendi vellent: vel qua ipsi aggregati sumus illos conscribere. Nam etsi multorum eruditorum sententias refellere ausus sum, atque non pauca fortasse nimis acriter insequi, corrupta scilicet, quæ indoctorum pertinacia nunquam satis explodi possunt; id tamen eo consilio feci, ut quantum ingenio perficere, quantum mente elaborare, quantum denique iudicij in re medicæ ex studijs, laboribus, ac vigilijs mihi comparare potui, liberè in publicum ad mortalitatis fructum & utilitatem proferrem. Sed certè in hoc longius, quam statueram, digressa est oratio nostra: eò enim (nescio quo modo) irrepsit, ut partem aliquam aperire nostri scribendi instituti. Quod tamen non prorsus alienum fuisse, iusi eius consilij ratio cum alibi, tum præcipue superius in epistola nuncupatoria à nobis latius exposita esset, atque à pluribus, opinor, comprobata, quam ut hoc loco paucis attingi debuisset. Quare iam ad id nobis accedendum est, quod in primis medicæ materiæ studiosos admonendos esse putamus, utpote quod nonnihil priuatum ad rem præsentis operis facere videatur. Cum enim ab eo tria potissimum comprehendantur, Dioscoridis contextus, nostri in eum commentarii, & plantarum imagines, de singulis aliqua nobis reddenda ratio est, ut qualem me in vnoquoque gesserim, quod confitendum sit, non dissimulem. De contextu itaque Dioscoridis, quem nequaquam prætermittendum censuimus, ob plures causas, quas hic referre nimis longum esset, quaeret aliquis, cur Ioannis Ruellij Galli medici eruditissimi interpretationem prætulerim, dignamque existimauerim, quæ præ cæteris in nostris commentarijs legatur; cum tamen duo alij viri summi panter & doctissimi, Hermolaus Barbarus, & Marcellus Virgilius Florentinus in idem studium nauiter incubuerint. Farcior ingenue me Ruellij versionem secutum esse, sed non propterea aliorum præclaros conatus contempsisse unquam: quin potius vtriusque studium semper admiratum, quippe quòd vterque in eo maximam laudem promeruerit. Illud autem me magis mouit, ut Ruellium admiserim, quòd eius conuersio omnibus facta sit vulgarior, ac frequentior in studiosorum manibus versetur. Adde etiam, quòd hæc communi omnium ferè, medicorum præsertim, iudicio præferatur: cui nimirum nobis quoque libuit subscribere. Non tamen illud me certè latuit, Ruellium nimis fortè in ea religiosum fuisse, quippe qui interdum maluerit ipsum Dioscoridem deferere, quam Plinium, modò Latini sermonis nitore captus, modò etiam rei cognitione incertus. Quare à nobis perspecta, Ruellij quidem interpretationem recepi, ita tamen ut nonnullam ausus sim ab eo desciscere, vel vetustissimorum probatissimorumque exemplarium, & vnus Oribasij codicis fidem secutus, vel certa rei experientia fretus. Eorum autem quæ immutauim, nonnulla obelisco adnotata reliqui, nonnullis etiam signum suppressimus. Sanè plura eiusmodi, pluresque insuper varias lectiones exhibuissim, si maius otium & tempus nobis suppeditasset. quæ tamen, Deo concedente, aliquando ad communem utilitatem, & ampliorem medicæ materiæ disquirendæ campum, dabuntur. Hinc factum est, ut Ruellij nomen contextui præscribendum non duxerim, ne videretur cum eo nomine conuenire, re autem sæpe ab eo dissentire. Satis enim fore putauim, si hic studiosos certiores facerem, me Ruellio Dioscoridis conuersionem acceptam referre: si præterea rationem reddidissim, cur illi non semper addictus esse voluerim. Quod quia abunde, ut arbitror, præstimus, iam ad alterum nobis propositum, quod de nostris commentarijs erat, progrediamur. De quibus professio mihi melius esset tacere, quam pauca dicere, si vellem nasutulis & vitiligatoribus occurrere. Frequens nanque hodie est, indiesque magis pullulat huiusmodi genus hominum in Italia (nescio quid fiat in alijs regionibus) qui nullum in toto vitæ suæ cursu fructum semineve proferunt, alienos tamen auidè carpunt, mox lacerant, & pedibus obtulerunt. Sed hos nunc missos faciam: alius enim locus, aliud studiorum nostrorum onum postulat, ut cum ijs sermonem conferamus, vel eos ab hac mala mente deterrendi, uel ad sua quoque proferenda excitandi causa. Verùm ad candidos, & æquos, quibus hæc scribimus, nostra sese conuertat oratio. A uobis equidem illud petiitum volo, quòd nulla vos capiat admiratio, si in his nostris commentarijs inuenietis, ut inuenietis scio, me plantas aliquas notas prodidisse, neque tamen earum imagines pictura expressisse. Hoc mehercule factum est, non solum quòd plantæ nobis cognitæ, dum eas depingi curarem, non omnes nobis in promptu essent; sed quòd etiam deessent sculptores, qui pictas plantas citò diligenterque inciderent, & insculperent. Quorum quidem defectu coacti fuimus (ut ingenue, quòd accidit, confitear) non aliquarum modò plantarum, quæ à Dioscoride nobis notæ redduntur; sed omnium quoque, quas nostris commentarijs inseruimus, picturam in aliud tempus differre. Accesserunt amicorum hortatus, & typographi sumptus. illi s. ut obtemperarem, æquum fuit: neque non alterius habenda ratio erat, ne scilicet nimio sumptu grauaretur. Quare operæpretium fuit, ut & imaginum, quas absoluendi tempus & commoditas dabatur, & totius



& totius operis (ut semel omnia complectar) editioni celeritatem & festinationem adhiberem. Quæ verò nunc omni-  
simus, cogerentibus causis prædictis, ea aliquando prodemus, nisi quid nobis humanitus accidat. Cæterum ut de imagi-  
nibus quoque seorsum aliquid dicamus, equidem aliàs abhorruim ab hoc docendi genere, ratus neminem unquam posse ex  
iconibus veram & exactam simplicium medicamentorum penitum assequi. quod eorum vanitas non possit vnicui sin-  
gulorum pictura comprehendere: siquidem non eadem est pullulanti herbarum facies quæ adultæ, neque adultæ quæ iam sene-  
scenti. Quod si eiusmodi herbarum mutationes omnes singulis picturis representari vellent, quis dubitet, id opus fu-  
turum infiniti laboris, ac immensi sumptus? Verum tamen cum vidissem tales aliorum conatus ab omnibus propè-  
modum commendari, atque indes crescere studium virorum rerum effigies in publicum edentium, ne solus viderer in  
diuersam ire sententiam, utque etiam notam, dum vivo, delerem, quam quidam typographus nostris Italicè scriptis  
commentariis inuulerat, adiectis plantarum imaginibus, quæ quidvis aliud, quam rem ipsam referrebant, ipse quoque ex-  
periri volui, si quid hac in re præstare possem, non tantum ut mea in medium proferrem, quantum ut aliorum conatus  
adiuarem, & de vobis studiosis, si possem, bene mererer. Sed quàm res hæc nobis difficilis fuerit, non est quod pluri-  
bus explicem. omnes enim sciunt, quàm difficile inueniantur homines, qui res ipsas ita ut sunt, depingant, & qui depi-  
ctas diligenter incidant, & insculpant, quorum maior adhuc inopia est. Id quod etiam faciliè diiudicabitis studiosi, qui  
in hoc opere nonnullas effigies affabre satis, nonnullas verò infabre excultas offenditis. Sane quod in rem commu-  
nem nauare potui, licet illud exiguum esse intelligam, in eo non commisi, ut meum studium, opera, aut diligentia à vo-  
bis desideraretur. Quid autem profecerim, nescio. vestrum erit iudicium. Abiis certè, qui grati sunt, me gratiam initu-  
rum spero. quandoquidem mihi communis utilitatis cupidissimo hoc opus non aggrediendi voluntas defuerit, sed per-  
ficiendi facultas: quam tamen omni studio consequi assidue conamur. Bene valeat, & nostra boni consulite.

## EXEMPLVM PRIVILEGII PONTIFICII.



**M**OTV PROPRIO &c. Cum, sicut dilectus filius Vincentius Valgrisus bibliopola, & typogra-  
phus Veneris nobis nuper exponi fecit, ad communem omnium studiosorum utilitatem, sua propria  
impensa, Commentaria dilecti filij Petri Andreæ Matthioli medici Senensis in sex Pedacij Dioscoridis  
Anazarbei libros de medica materia, nunc primum ab ipso in Lannum conuersa & aucta, cum innume-  
ris plantarum, & animalium figuris, quæ ad idem opus spectant: item Almanachum siue Ephemeridas  
supputatas per dilectum filium Nicolaum Simum Bononiensem mathematicum: necnò Dialogos seu  
Colloquia dilecti filij Marci Mantui Bonauri Patavinij Iurisconsulti: adhuc Secundam partem philo-  
sophiæ naturalis per dilectum filium Alexandrum Picolomineum Senensem Hetrusco sermone conscriptam: item Car-  
mina dilectorum filiorum Io. Baptistæ Pignæ, & Reueren. Cæli Calcagnini, & Ludouici Areofu Ferrarensum: præte-  
rea Centuriam consiliorum Io. Baptistæ Montani Veronensis: insuper libros Ioannis Schoneri mathematici de iudicij  
natiuitatum, in Italicum sermonem per Io. Baptistam Carellum conuersos, hætenus non impressa, imprimi facere inten-  
dat, dubitetque ne huiusmodi opera postmodum ab alijs absque eius licentia imprimantur, quod in maximum suum præ-  
iudicium tenderet. Nos propterea eius indemnitati consulere volentes, Motu simili, & ex certa scientia eidem Vincentio,  
ne supradicta opera per ipsum imprimenda, per decem annos, post dictorum operum impressionem à quocunque sine ip-  
sius licentia imprimi, aut vendi, seu venalia teneri possint, concedimus, & indulgemus, inlibentes omnibus, & singulis  
tam in Italia, etiam in Fulginatensi, & Raccanateni ciuitatibus, quàm extra Italiam existentibus, bibliopolis, & librorum  
impressoribus sub excommunicationis lætæ sententiæ. In terris verò S. R. E. mediatè vel immediatè subiectis, sub ducen-  
torum ducatorum auri, pro vna, fisco cameræ Apostolicæ, & pro alia medietatibus, eidem Vincentio eo ipso applicandis  
pœnis: & insuper amissionis omnium librorum, quoties contrauentum fuerit ipso facto, & absque alia declaratione in-  
currentis, ne intra decennium ab impressione dictorum operum respectiue computandum, dicta opera sine eiusdem Vin-  
centij expressa licentia imprimere, vendere, seu venalia habere, aut proponere quomodolibet audeant. Mandantes uni-  
uersis venerabilibus fratribus minoris, Archiepiscopis, Episcopis, eorumque Vicariis in spiritualibus generalibus, & in  
statu C. S. R. E. etiam Legatis, & Vicelegatis sedis Apostolicæ, ac ipsius status gubernatoribus, ut quotiens pro ipsius  
Vincentij parte fuerint requisiti, vel eorum aliquis fuerit requisitus, eidem Vincentio efficacis defensionis præsidio assi-  
stentes, præmissa ad omnem ipsius requisitionem contra inobedientes, & rebelles per censuras Ecclesiasticas etiam sæpius  
aggrauandos; & per alia iuris remedia, auctoritate Apostolica exequantur. Inuocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio  
brachij secularis, non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, privilegijs quoque indultis, & literis  
Apostolicis quibuscunque, & præsertim dictas Fulginatens, & Raccanateni ciuitatibus, super libertatibus, & exemptioni-  
bus mercatorum quorumbet, tempore nundinarum eorundem ciuitatis, ac alijs quomodolibet editis, concessis, confir-  
matis, & innouatis etiam iteratis vicibus. Quibus omnibus illorum veriores tenores pro sufficienter expressis habentes,  
hac vice duntaxat, specialiter & expressè pari motu derogamus, ceterisque contrarijs quibuscunque. Et insuper quia dis-  
ficilè admodum esset præsentem motum proprium ad quælibet loca deferri, volumus & Apostolica auctoritate decerni-  
mus, ipsius transumptis, vel exemplis plenam, & eandem prorsus fidem ubique tam in iudicio, quàm extra haberi, quæ  
præsentis originali haberetur: & quod præsentis motus proprii, absque eo quod publicetur, aut in eo data apponatur, so-  
la signatura sufficiat, & ubique fidem faciat in iudicio, & extra, regula contraria non obstante.

## EXEMPLVM PRIVILEGII CAESAREI.



**C**AROLVS Quintus, Diuina fauente elementia, Romanorum Imperator Augustus, ac Rex Germa-  
niæ, Hispaniarum, utriusque Sicilia, Hierusalem, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiae &c. Archidux Aus-  
triæ, Dux Burgundiæ, Brabantæ &c. Comes Habsburgi, Flandriæ, Tyrolis &c. Notum facimus te-  
nore præsentium vniuersis. **Q**VVM syncerè nobis dilectus Vincentius Valgrisus bibliopola, &  
chalcographus Venetus, nobis reuerenter exponi fecerit, se constituisse in communem omnium, &  
præcipue rei medicæ studiosorum utilitatē, suis proprijs impensis imprimere, & imprimi facere Com-  
mentaria hætenus non impressa in sex libros Dioscoridis Anazarbei, de simplicium historia & viribus  
latinitati reddita per honorabilem, doctum, nostrum & Imperij sacri fidelem dilectum Petrum Andream Matthiolum Sen-  
ensem, artium & medicinæ Doctorem, cum figuris omnium plantarum, animalium, aliarumque rerum eidem operi spe-  
ctantium. Vereri autem ne eiusmodi Commentaria & figure, postquàm ab ipso magno labore ac sumptu impressa fue-  
rint, ab alijs chalcographis aut bibliopolis temerè imprimantur & distrahantur, in non modicum ipsius damnum & de-  
trimentum. A nobis proinde humiliter petendo, ut ipsum Privilegio ac Edicto nostro aduersus eam iniuriā munire vel-  
lemus. Nos igitur cupientes in primis illorum indemnitati consultum, qui magnis suis impensis & laboribus utilitatem pu-  
blice prodesse student. Icareo tenore præsentium, ex certa nostra scientia, & pro ea auctoritate, qua tam ratione Imperi-  
alis dignitatis, quàm aliàs fungimur, edicimus, statuimus, & districte inhibemus, ne quis typographus seu impressor,  
aut quivis alius cuiuscunque status & conditionis existat, per totum Romanum Imperium, & ciuitates, terras, ac loca nobis

bis & eidem Romano Imperio, mediatè vel immediatè subiecta, tam in Italia, quàm in Germania, & vniuersa Ditione nostra, prædicta Commentaria in Dioscoridem, per præfatum Vincentium Valgrisum imprimenda, infra decennium ab illarum prima editione, absque ipsius Vincentij expressa licentia, imitari vel imprimere, seu alibi impressa seu excusa, intra fines sacri Romani Imperij, & Ditionis nostræ importare, adducere, ac vendere audeat & præsumat. Quatenus præter nostram, & Imperij sacri grauem indignationem, & amissionem librorum, sic per æmulationem impressorum (quos eisdem Vincentio, vbicunque natos, per se vel agentes suos ad se recipiendi, & in vsum suum vertendi ius esto.) poenam quoque sex Marchiarum auri puri, Fisco nostro Cæsareo, & ipsi Vincentio, ex æquo, quotiescunque contrafactum fuerit, irremissibiliter applicari, cupiant evitare. Harum testimonio literarum, manu nostra subscriptarum, & sigilli nostri impressione munitarum. Datæ in ciuitate nostra Imperiali Augusta Vindelica, die vigesima prima mensis Februarij. Anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo primo, Imperij nostri trigesimo primo, & Regnorum nostrorum trigesimo sexto.

### EXEMPLVM PRIVILEGII GALLIARVM REGIS.



**H**ENRY par la grace de dieu Roy de France Aux Preuostz de Paris Bailly de Rouen Seneschaulx de Lyon Tholose & Bordeaux & a tous noz autres Iusticiers officiers ou leurs lieuten qui appartiedra sa luy Nostre cher & bien ame Vincent Vaugrys libraire & imprimeur dem a Venize Nous a fait entendre par lres que nous a escriptes nostre ame & seal cõseiller maistre des requestes de nostre hostel & nostre ambassadeur deuers la seigneurie de Venize Que auez grandz fraiz peine soinz & labeur Il a traduit le liure de Dioscoride avec les figures au naturel & les commentz latus du docteur philosophe & medecin Maistre Pierre Andre mathuol Senoys & pareillemēt les figures de tous les simples qu'il a fait portraire & designer au naturel Pour le benefice commun de tout le monde & pour L'ayde & support des corps humains lesquelz il a fait imprimer audict Venize & pour aultant qu'il crant que aucuns libraires & Imprimeurs de nostre Royaulme ne fingerent & entremectent de faire Imprimer & portraire ledict liure & par ce moyen le frustrer de ce qu'il pretend du fruit de son labeur Nous suppliant & requerant a ceste cause luy vouloir surce pourueoir Pour ce est il que nous inclinans a la requeste que nostre dict ambassadeur nous a faicte pour ledict Vincent Vaugrys Et voulans luy subuenir en cest endroict auons de noz certaine science plaine puissance & auctorite Royal prohibe & defendu prohibons & defendons a tous libraires imprimeurs de nostre Royaulme & aultres personnes quelz qu'ilz soient Que durant le temps & terme de dix ans ensuyuans & consecutifz Commenceans au iour & date de ces ptes ilz n'ayent a imprimer ne faire extemper mestre ne exposer en vente lesdictes oeuvres & traduction dudict liure de Dioscoride ne aussi les portraictz & figures de tous les simples Sinon celluy ou ceulx qui auront charge d'en vendre & exposer en vente de la part du dict Vaugrys sur peine damende arbitraire a nous a appliquer & de cõfiscation de tous lesdicts liures & oeuvres qui ainsi se trouueront Imprimez sans charge ne commission dudict Vincent Vaugrys Si vous mandons commedons & a vnz chün de vous endroict soy et si comme a luy appartiedra Que selon & ensuyuant ce que dessus vous faictes ou faictes faire expresse Inhibition & deffences de par nous sur les peines que dessus indictes & aultres que verrez estre a imposer a tous lesdicts imprimeurs libraires demourans en voz iurisdicions & destroictz Que parcy apres ilz ne aulc d'eulx aultres que celluy ou ceulx qui auront charge expresse de ce faire dudict Vincent Vaugrys Ayent a imprimer ne faire extemper mestre ne exposer en vente ledict liure traduction & figures desdusdictes et si apres lesdictz commandemens faictz vous trouuez aucuns contreuenans a iceulx vous procedez a lencontre d'eulx par condemnation desdictes penes & aultres ainsi que verrez estre a faire selon lexigence des cas Non obstant oppõs ou appellaõs quelcõques & sans preiudice dicelles Pour lesquelles ne voulons estre distere Car tel est nostre plaisir De ce faire vous auons donne & donnons plain pouuoir puissance auctè & mandement especial Mandons & commandons a tous noz Iusticiers officiers & subgetz a vous en ce faisant estre obey. Donne a Saint Germain en Leez le **xxix** Iour de mars Lan de grace mil cinq cens cinquante deux auant pasques & de nostre Regne le Sixiesme.

. . . Par le Roy

Duthier

### EXEMPLVM PRIVILEGII ILLVSTRISSENATVS VENETI.



**S**ERENISSIMO Principe & Illustris. Signoria. Supplica il fedelissimo Seruitore di V. Sublimità Vincenzo Valgriso libraro & insieme stampator di libri, che hauendo deliberato di far stampar à honore, & vtile di questa inclita città, i commentari Latini dell'Eccellentissimo medico messer P. Andrea Matthioli sopra Dioscoride, libro nõ men vtile, che desiderato da molti. Et hauedo per maggior intelligentia della materia, che in esso libro si tratta, fatto dissegñar & intagliar infinite piante. Per il che ha fatto vna grandissima spesa, ne quella solamente è stata in far ritrarre, & intagliare le dette piante da valentissimi huomini, ma in farsi trouar, & portar quelle piante (che sono molte) che qui non nascono da diuersi paesi, tutto con speranza di mandarle insieme co'l libro in luce, mercè però del fauore, che aspetta dalla bontà di V. Sublimità, si per honore, & gloria di questa Clarissima città, come per vtilità, & beneficio del corpo humano. Et perche dubita il detto supplicante stampando il sopradetto libro con le dette figure senza'l priuilegio di vostre Sublimità, che altro Libraro, ouer Stampatore non gli toglia la fatica, & le spese insieme, cauado'l disegno dalle sue figure, facendole poi intagliare, & vltimamente stampandole, prendendo nel resto il suo libro per essemplar, il che gli faria non solamente perdita delle fatiche, & spese fatte intorno à questa opera, ma cagion grande di sua ruina. Per questo egli hora ricorre alli piedi di V. Sublimità, & à quelle con l'Eccellentissimo suo Consiglio di Pregadi humilmente supplica d'esserli concesso in special gratia, che altri, che egli, ouer chi da lui hauerà auctorità, non possa stampar, ò fare stampar, pigliando questo suo Dioscoride per essemplare, & da esso cauando le figure delle piante, ne da altri in alcun modo stamparo vendere il detto libro per spatio di anni quindici, sotto pena à chi contrafarà, di ducati seiceto, & di perder tutti i libri, & i disegni che fussero stati fatti, & di pagar ducati due per ciascuna opera, che fusse stata contrafatta. Et se sarà alcun habitante in questa inclita città, che lo facesse stampare, ouero fusse causa, che si stampasse, in terre aliene, che faria danno di V. Sublimità, & di esso supplicante, trouandosi questi tali s'intendano incorrer nelle sopradette pene. delle quali un terzo vada all'hospital dell'incurabili, l'altro all'accusator, & l'vltimo all'officio, il qual farà l'effecutione, & che ogni officio, ouer magistrato possa far la detta effecutione, doue sarà fatta la conscientia.

Supplica ancora il medesimo per le sottoscrutte opere nella forma istessa, che quella di sopra, & questo tutto domanda in gratia à vostre Sublimità, allequali humilissimamente si raccomanda.

Almanach, ouero Ephemeride per xv. anni calculato per l'Eccellentissimo messer Nicolò Simo Bolognese.

Colloquia, seu Dialogi iuris &c. dell'Eccellentissimo messer Marco Mantoa Patauino.

La Seconda parte della Filosofia naturale di messer Alessandro Piccolomini, volgare.

La Poesia Lanna di M. Giouan Barnista Pigna, di Monsignor Celio Calcagnino, & di M. Lodouico Ariosto Ferraresi.

1553. Die. 29. Septembris in Rogatis.

Che al soprascritto supplicante sia concesso quanto'l domanda, essendo obligato di obseruar tutto quello, che è disposto in materia di stampe.

Raphaël Cornelius Ducalis Notar. &c.

Typographus



# Typographus Lectori. S.

**C**UM NON possumus id facere quod volumus, id velimus quod possumus, necesse est. Non temerè neque ineptè quidem cogor nunc ijs verbis uti. nam si ego, qui omnem meam operam in tuum vsum libenter conferre soleo, non vterer nunc tecum excusatione officij, quod mihi maxima de causa intermittendum fuit, eius facti conscientia mihi iniucunda esset. Huius operis calci Matthiolus præclarus author adiecit Apologiam, qua se ab erroribus & calumnijs vindicat, quibus notatur ab Amato Lusitano medico in suis enarrationibus, quas ille in Dioscoridem nuper edidit. Apologiæ subinde idè attexuit obiectiones, in quibus contrà errata illius patefacit. Vtrunque libentissimo animo excudendum susceperam, ratus rem tibi non ingratam, neque prorsus inutilem me facturum. Cur autem id modò non præstiterim, in causa fuit (vt dicam ingenuè quod res est) angustia temporis, & rerum nostrarum infirma satis conditio: quarum vt rationem haberem, nullum tempus erat nobis reliquum. Sanè maximas impensas feci, & vix nostris viribus pares, ex quibus vt iam fructum aliquem caperem, opportunū valde visum est, ex usuque meo, hunc librum ad proximum mercatum Francofordiensem mittere. Qua præterea ratione celerius à nobis satisfaceret exterarum gentium expectationi, quam illis librum hunc de se concitasse intelligo. Habes igitur causam, cur hoc tempore satis angusto maluerim meis commodis, quàm tuæ utilitati consulere, quàm etiam Matthioli voluntatem exequi, quibus tamen iandudum me meamque operam dicaui: id quod feci vtriusque humanitate fretus. Quare si nunc non potui (quod non ab re præfatus sum) id facere quod volebam, si id uolui quod potui, mihi ignoscas, abs te peto. Dabo equidem operam, vt quæ nunc remisi, quàm primùm absoluam, adeò vt huic libro etiam empto, ea commodè assuere possis. Atque etiam adnitar, vt plura alia, quæ scio uir hic clarissimus exornat, à nobis excudantur. In summa non committam posthac, vt meam diligetiam desideres: quin imo efficiam, vt me tuæ magis, quàm meæ utilitatis cupidissimum cognoscas. Vale.

## Errata corrigenda.

Pagina 8. uersu 6. *suspectum esse* *suspectus esse* 9. 37. *clematis altera* *clematis prima* 16. 2. *in arundinibus sati* *in arundinetis sati* 24. 25. *lib. III. epist. VI.* *lib. VI. epist. III.* 40. 41. *persimiles* *persimilis.* 53. *Faciendi modus* *Faciendi modum* 44. 49. *per regiones desertur* *per regiones non desertur.* 48. 19. *Sifer his satis.* *Sifer his feritur* 51. 20. *deinde sacculum* *deinde in sacculum* 158. 4. *capite secundo* *capite undecimo* 195. 28. & ante ipsum Theophrastus & post ipsum Theophrastus 215. 30. *acano rabido* *acane rabido* & 55. *carnes duræ* *carnis duræ* 278. 55. *depotum* *depositum* 300. 21. *hanc de causa* *hac de causa* 350. 52. *paruo bello* *paruo bulbo* 401. 2. & 3. *semine rebtām* *semine refertām* & 4. *Amferosiam Ambrosiam* 482. 7. *inter se differant* *inter se non differant.*

Ex his erroribus nonnullos hoe loco necessariò adnotauimus, quippe quòd authoris sententiam peruerterent. nonnullos verò, qui verbum immutabant, latinitatēque offendebant vnius vel alterius literæ additione, aut defectu, aut mutatione, ea tantum ratione apposuiamus, vt eorum exemplo alios similes inter excudendum commissos, benignus lector emendet.

# INDEX EORVM, QVAE IN HOC OPERE CONTINENTVR.

Cuius primus numerus paginam, sequens uerò  
paginae lineam denotat.

## A



BIETIS historia	71. 53
Abietis lacryma	72. 2
Abietis lacrymae uires	72. 20
Abrotonum Dioscoridi	331. 33
abrotoni consideratio	331. 45
abrotoni maris genera duo	332. 9
abrotoni foeminae consideratio	331. 45
abrotoni uires ex Galeno	332. 9
Absinthium Dioscoridi	328. 57
absinthium marinum Dioscoridi	329. 30
absinthium santonicum Dioscoridi	329. 40
absinthij consideratio	329. 47
absinthium Ponticum	329. 50
absinthij marini consideratio	330. 19
absinthij seriphij consideratio	ibidem
absinthij uires ex Galeno	330. 47
Absque simplicium medicamentorum notitia recte mederi nemo potest	3. 6
Acacalis Dioscoridi	96. 40
acacalis consideratio	96. 43
Acacia Dioscoridi	113. 48
acacia altera Dioscoridi	114. 2
acaciae consideratio, & historia	114. 9
acacia officinarum factitia	114. 38
acaciae alterum genus	115. 12
acaciae uires ex Galeno	115. 17
Acanthium Dioscoridi	323. 3
acanthij consideratio	323. 7
Acanthus sativus Dioscoridi	323. 21
acanthi sativi consideratio	323. 36
acanthi uires ex Galeno	324. 10
Acanthus sylvestris Dioscoridi	323. 32
acanthi sylvestris consideratio	324. 8
Acarne historia ex Theophrasto	384. 39
Acetum Dioscoridi	578. 39
acetum e betonica Dioscoridi	584. 46
acetum mulsium Dioscoridi	579. 24
acetum scillinum Dioscoridi	580. 11
acetum ex stoechade Dioscoridi	584. 40
aceti consideratio	578. 55
acetum contrarijs constat facultatibus	578. 57
aceti scillini uires mirabiles ex Galeno	580. 27
Achatæ lapidis historia, & uires	630. 57
Achillea Dioscoridi descripta	452. 45
achilleae consideratio	452. 58
achilleae uires ex Galeno	453. 21
Achras Dioscoridi	337. 35
Acidamuria Dioscoridi	579. 53
acidæ muriae usus exoleuit	579. 59
Acinos Dioscoridi	346. 43
acini consideratio	346. 47
Aconitum Dioscoridi	479. 25
aconitum alterum Dioscoridi	480. 29
aconiti genera, & consideratio	480. 23

aconiti historia ex Theophrasto	480. 45
aconiti uenenum, & eius remedia Diosc.	660. 51
aconiti ueneni noxa, & eius curatio	661. 1
Acontiae historia	702. 11
acontiae morsus notæ, & eius cura	702. 19
Acorum Dioscoridi descriptum	19. 10
acori consideratio	19. 24
acorum legitimum	20. 10
acori uires ex Galeno	20. 26
Acuta spina Dioscoridi	99. 44
acute spinæ consideratio	100. 1
acute spinæ uires ex Galeno	102. 14
acutam spinam non esse berberim uulgi	100. 27
Adami Loniceri errata, & sententiæ improbatæ	80. 52
& 98. 28. & 104. 45. & 127. 2. & 269. 58	
Adami poma	137. 13
Adarces Dioscoridi	625. 17
adarcae consideratio	625. 24
adarcae uires ex Galeno	625. 40
Adeps omnis Dioscoridi	209. 3
adipis, & pinguedinis uires ex Galeno	210. 52
adipis in cibis facultas	212. 29
Adiantum Dioscoridi	518. 8
adianti consideratio	518. 37
adianti historia ex Theophrasto	518. 37
adianti uires ex Galeno	519. 14
adianti uires ex Mesue	519. 20
Aegilops Dioscoridi	520. 3
egilopis consideratio	520. 9
egilops hordei uitium	520. 38
egilopis uires ex Galeno	520. 48
Aeris flos Dioscoridi	590. 45
aeris floris historia	590. 57
aeris floris uires ex Galeno	591. 4
Aeris squama Dioscoridi	591. 11
aeris squamæ consid. & uires ex Galeno	591. 33
aeris squamæ lethifera uis, & eius remedia	675. 4
Aerugo rasa Dioscoridi	593. 8
erugo scolecia Dioscoridi	593. 30
eruginum consideratio	593. 54
eruginum uires ex Galeno	593. 59
eruginis uenenum, & eius remedia	676. 26
Aes ustum Dioscoridi	590. 21
aeris usti consideratio	590. 35
aeris usti uires ex Galeno	590. 39
Aethiopis Dioscoridi	501. 5
aethiopidis consideratio	501. 18
aethiopidis uires	501. 28
Ætites lapis Dioscoridi	635. 32
Ætite lapidis historia, & uires	635. 39
Agallochum Dioscoridi	43. 51
agallochi consideratio	43. 57
agallochi fabulosa uulgi opinio	44. 8
agallochi historia ex Serapione	44. 17
agallochi facultates ex Auicenna	44. 52
* Agaricum	



# Index.

Agaricum Dioscoridi <i>Gummibosum</i>	306.22	alyssi historia varia	ibidem
agarici consideratio	306.55	alyssum Aëtij	383.30
agarici vires ex Galeno	307.1	alyssum Plinij	383.17
agarici facultates ex Mesue	307.11	alyssum Galeni	383.38
agarici nigri noxa, & eius remedia Diosc.	678.36	alyssi vires ex Galeno	383.50
agarici nigri noxa, & eius curatio	679.12	Amaracum Dioscoridi <i>Majoran</i>	345.25
ageraton Dioscoridi	465.56	amaracum quid	345.39
agerati consideratio	466.33	amaracini consideratio	59.1
agerati vires ex Galeno	466.35	Amaranti purpurei historia	464.50
Agnus Dioscoridi	115.49	Amati Lusitani error	113.40
Agria arbor <i>Agrimoniz Odrum</i>	99.10	Ambari historia	43.38
Agri folij consideratio <i>455</i>	98.60	ambari genera, & vires	43.45
Aiuga Dioscoridi	428.56	Ambrosia Dioscoridi	400.53
aiugæ consideratio	429.41	ambrosiæ consideratio	400.58
aiugæ vires ex Galeno	429.47	ambrosiæ vires ex Galeno	401.20
Alabastrites lapis Dioscoridi	633.3	Amelli mentio Vergilio	510.25
alabastrite lapidis consideratio	633.6	Amiantus lapis Dioscoridi	633.42
alabastrite vires ex Galeno	633.14	amianti lapidis consideratio	633.46
Alcea Dioscoridi <i>Alkakengi 175</i>	423.24	amianto lapide fraus impostorum	633.53
alceæ consideratio <i>Indekyfrum</i>	423.30	Amni Dioscoridi	358.23
alceæ vires ex Paulo	423.44	annios consideratio	358.36
Alciadion Dioscoridi <i>Alchimilla</i>	447.7	annios vires ex Galeno	358.59
Alcyonium Dioscoridi <i>Simnam 510</i>	624.30	Ammodite historia, & ueneficis	701.27
alcyonij historia, & consideratio	624.45	ammodite morsus signa, & eius curatio	701.38
alcyonij vires ex Galeno	625.1	Ammoniacum Dioscoridi	379.27
Alge consideratio <i>Allelia Sankhm 395</i>	497.6	ammoniaci consideratio	379.45
Alisma Dioscoridi <i>Fraxum Unum</i>	425.56	ammoniaci historia ex Plinio	379.51
alismatis consideratio	426.5	ammoniaci lacryma duplex	379.52
alismatis vires ex Galeno	426.16	ammoniaci vires ex Galeno	379.58
Alliarie herbe consideratio, & vires	397.49	Amomis Dioscoridi	351.26
Allium Dioscoridi <i>Fraxum Unum</i>	277.32	Amomum Dioscoridi	351.14
allium sylvestre Dioscoridi	277.37	amomi consideratio	351.39
allij consideratio	278.4	amomum spurium	351.40
allij sylvestris consideratio	278.18	amomi vires ex Galeno	36.1
Alni consideratio, & historia ex Theophr.	90.36	Ampelitis terra Dioscoridi	638.52
alni usus, & vires <i>Alm haim</i>	90.46	ampelitis terre consideratio	638.59
Aloë Dioscoridi	327.52	Ampeloprasion Dioscoridi	275.48
aloës consideratio	328.23	ampeloprasii consideratio	275.55
aloës vires ex Galeno	328.34	ampeloprasii usus ex Galeno	276.9
aloës vires ex Mesue	328.46	Amphibene ictus notæ, & curatio Dioscoridi	702.31
Alphasasat Aphris quid	273.57	amphibene consideratio	702.36
Alfine Dioscoridi <i>Gummadam</i>	489.8	amphibenam bicipitem esse, falsum	702.53
alsines consideratio	489.18	amphibene morsus signa, & curatio	703.5
alsines vires ex Galeno	489.27	Amurea Dioscoridi	118.23
Althæa Dioscoridi <i>Wisswontz</i>	422.43	amureæ usus	119.8
althææ consideratio	423.57	Amygdale amaræ Dioscoridi	144.57
althæa Theophrasto duplex	423.12	amygdale dulces Dioscoridi	145.14
althææ vires ex Galeno	423.16	amygdalarum consideratio	145.10
Alumen Dioscoridi	613.40	amygdalarum vires ex Galeno	145.30
aluminum omnium consideratio	616.7	Amygdalini parandi ratio	611.12
aluminis rupei faciendi ratio	616.24	amygdalini vires	611.27
alumina cognita & iam in lucem reddita	617.13	amygdalorum gummi Dioscoridi	145.9
aluminum vires ex Galeno	617.35	Amylum Dioscoridi	231.53
aluminum facultas calida, non frigida, ut quidam contendunt	617.41	anyli consideratio	232.5
Alypon Dioscoridi	552.40	anyli vires ex Galeno	232.8
alypi consideratio	552.49	Anacardiorum mentio, & vires	148.23
alypi vires ex Paulo	553.5	anacardiorum ueneni signa, & curatio	660.3
Abysson Dioscoridi	383.7	Anagallis Dioscoridi	1299.57
alyssi consideratio	383.14	anagallidis consideratio	300.6
		anagallidum	

# Index.

anagallidum uires ex Galeno	300.10
anagyris Dioscoridi	425.3
anagyris consideratio, et genera	425.11
anagyris uires ex Galeno	425.22
Anchusa Dioscoridi	446.24
anchusarum consideratio	447.23
anchusarum uires ex Galeno	447.32
Andacorba Mauritanis quid	395.18
Androsaces Dioscoridi	413.53
androsacis consideratio	414.20
androsacis uires ex Galeno	414.25
Androsæmon Dioscoridi	427.47
androsæmi consideratio	428.10
androsæmi uires ex Galeno	428.41
Anemone Dioscoridi	297.47
anemones consideratio	298.36
anemones uires ex Galeno	298.59
Anethum Dioscoridi	356.35
anethi consideratio, et uires ex Galeno	356.42
Angelica historia, et uires	508.26
Anguim senecta Dioscoridi	171.43
anguim senecta consideratio	171.59
Animalia ex ouis nascentia	183.19
animalia alia præter canem rabie tentantur	685.
Anisum Dioscoridi	355.50
anisi consideratio, et uires ex Galeno	356.1
Anonis Dioscoridi	324.14
anonidis consideratio	324.28
anonidis uires ex Galeno	324.56
anonidis historia ex Theophrasto	324.42
Anthemis Dioscoridi	416.46
anthemidis consideratio	417.1
anthemidis uires ex Galeno	417.12
Anthyllis Dioscoridi	416.29
anthyllidis consideratio	416.37
anthyllidis uires ex Galeno	416.40
Antidota contra uenena, et eorum descriptio	653.
et deinde	
Antidoti è sanguinibus descriptio	654.53
antidoti è scinco descriptio	655.3
antidoti è terra Lemnia descriptio	655.41
antidotorum actio	645.27
Antipathes Dioscoridi	626.47
antipathes ubi uisum	627.24
Antirrhinon Dioscoridi	516.33
antirrhini consideratio	516.41
antirrhini uires ex Galeno	516.52
Antispoda Dioscoridi	588.58
Aparine Dioscoridi	382.48
aparines consideratio	382.58
aparines uires ex Galeno	383.2
Aphaca Dioscoridi	274.36
aphacæ consideratio	274.40
aphaca intybi genus	274.53
aphacæ et uiciæ uires ex Galeno	274.46
Apiastrum Dioscoridi	390.55
apiastri consideratio	391.5
apiastri uires	391.11
apiastri facultates ex Galeno	391.29

Apios Dioscoridi	548.58
apij consideratio	549.8
Apium hortense Dioscoridi	361.37
apij hortensis consideratio	362.32
apij omnis generis uires ex Galeno	363.38
apium palustre	363.1
apium montanum	363.8
apium risus	297.22
Apocynon Dioscoridi	483.50
apocyni consideratio	484.1
apocyni uires ex Galeno	484.13
Apollinaris herba Dioscoridi	472.44
apollinaris herbe consideratio	473.24
apollinaris herbe uires ex Galeno	473.44
Apri iecur Dioscoridi	183.54
Apum consideratio	221.30
apum rex et regimen	221.36
apes quibus gaudeant	221.50
apum mira prudentia	221.59
apum mira in opere industria	222.1
apum reparatio ex Virgilio	222.21
Apum ictus curatio Dioscoridi	694.56
apum ictus, et eius remedia	695.1
Aqua Dioscoridi	576.56
aquarum differentia, et facultates	577.1
aquarum non potabilium facultates	577.33
aque frigide noxa, et curatio Dioscor.	680.49
aque aurificum noxa, et curatio	676.19
Aque pavor quousque exoritur in demorsis à canera biofo	690.9
aque pavor quando, et quibus curetur	690.21
Aqua marina Dioscoridi	578.17
aqua mulsæ Dioscoridi	576.17
aque mulsæ parandæ ratio uaria	576.30
aque stillatitiæ quæ cæteris præstantiores	112.2
Aquifolium	99.5
Aquilina, siue aquileia	302.32
Aquosa quæ ament loca	912.17
Arabicum gummi non esse acaciæ	114.42.58
Arabicus lapis Dioscoridi	632.12
Arabis Dioscoridi	281.51
arabidis consideratio	281.58
Araneus piscis	167.58
araneus Dioscoridi	198.6
aranei consideratio	198.30
aranei muris consideratio	202.45
Arbores quæ plantæ scandant	9.57
arboribus quæ innascantur	9.55
Arbutus Dioscoridi	144.12
arbuti consideratio	144.19
arbuti descriptio	144.40
arbuti usus et uires	144.48
Arction Dioscoridi	501.39
arctij consideratio	501.44
arctij uires ex Galeno	501.50
Arena Dioscoridi	636.43
Argemone Dioscoridi	299.5
argemones consideratio	299.10
argemones uires ex Galeno	299.22

# Index.

Argentina herba	289.50	asij lapidis consideratio	628.2
Argenti recrementum Dioscoridi	597.38	asij lapidis historia, et vires ex Galeno	628.13
argenti scorie consideratio	597.42	Aspalathus Dioscoridi	41.11
Argenti spuma Dioscoridi	597.53	aspalathi consideratio	41.19
argenti spuma consideratio	598.38	aspalathi vires ex Galeno	41.38
argenti spuma vires ex Galeno	598.55	Asparagus Dioscoridi	251.3
argenti spuma noxa, et curatio Dioscor.	674.22	asparagorum vires	251.26
argenti spuma mala	674.28	Asphodeli consideratio, et historia	291.43
argenti spuma sumptie curatio	674.48	asphodeli vires ex Galeno	291.56
Argentum uiuum Dioscoridi	605.18	Aspidis ictus notae, et curatio Dioscoridi	706.19
argenti uiui consideratio	605.28	aspidis perniciosis ictus, et genera	706.28
argenti sublimati parandi ratio	606.9	aspidum historia, ictus signa, et cura	706.37
argenti uiui noxa, et auxilia Dioscoridi	675.15	Asplenium Dioscoridi <i>Miltisfrant</i>	414.35
argenti uiui perniciosis natura	675.18	aspleni consideratio	414.49
argenti uiui sumpti curatio	675.46	aspleni vires ex Galeno	415.12
Aria arbor	99.10	Assa foetida	376.16
Arida loca quae plantae amant	9.32	Aster Atticus Dioscoridi	509.52
Arisarum Dioscoridi	291.3	asteris Attici consideratio	510.1
arisarum vires ex Galeno	291.7	asteris Attici vires	510.38
Aristolochia clematidis Dioscoridi	311.57	Astragalus Dioscoridi	467.52
aristolochia longa Dioscoridi <i>On hurnis</i>	311.52	astragali consideratio	468.1
aristolochia rotunda Dioscoridi	311.50	astragali vires ex Galeno	468.6
aristolochiae consideratio	312.38	Athera Dioscoridi <i>Astrenium 364</i>	227.30
aristolochiae clematidis examen	312.56	atherae consideratio <i>Mystm wirt</i>	227.32
aristolochiam longam uulgarem à Plinij pistolochia non differre	313.18	Attractylis Dioscoridi descripta	384.24
aristolochiae vires ex Galeno	313.37	atractylidis consideratio	384.30
Aristotelis de lapidum generatione opinio	563.35	Atramentum librarium Dioscoridi	639.22
Armeniacamala Dioscoridi	133.53	Atramentum sutorium Dioscoridi	610.26
armeniacorum malorum consideratio	135.57	atramenti sutorij consideratio	609.42
Armenius lapis	600.34	atramenti sutorij historia, et vires ex Galeno	611.14
armenij lapidis consideratio	600.38	Atriplex Dioscoridi <i>Null</i>	246.38
armenij lapidis vires ex Alexandro	601.6	atriplicis consideratio	246.42
armenij lapidis vires ex Aetio	601.28	atriplicis vires ex Galeno	246.55
armenij lapidis vires ex Galeno	601.36	Auellana nux Dioscoridi	148.38
Armeniae terrae vires ex Galeno	609.36	auellanae nucum consideratio	148.48
Armoracia Dioscoridi	241.26	auellanae vires ex Galeno	148.60
Aron Dioscoridi <i>Asstumpint</i>	289.58	Aucna Dioscoridi	227.49
ari consideratio	290.6	auenae consideratio	227.53
ari vires ex Galeno	290.16	auenae facultates	227.56
Arsenici sublimati uenenum, et curatio	676.17	Auerrois uana calumnia contra Galenum	307.
Artemisia Dioscoridi <i>Drus fuf</i>	398.57	56	
artemisia tenuifolia Dioscoridi	399.14	Auerrois locus restitutus	350.10
Artemisia consideratio	399.22	Auicennae lapsus	137.8. et 665.38
artemisiae vires ex Galeno	400.46	Auicenna contra Galenum	360.4
Arundo Dioscoridi <i>Artichaut 322</i>	93.12	Auicennae defensio	143.33. et 349.56. et 481.38
Arundinum consideratio, uide Harundinum	93.28	38	
Asarum Dioscoridi	27.32	Auicennae de generatione lapidum opinio comprobata	564.5
asari consideratio	27.47	Aurantia poma <i>Summanti</i>	137.73
asari vires ex Mesue	28.9	Auri historia, et praestantia	606.25
asari facultates ex Galeno	28.19	auri vires ex Auicenna	606.58
Asclepias Dioscoridi	383.57	Auricula muris Dioscoridi <i>Mmipsoz</i>	304.3
asclepiadis consideratio	384.1	auriculae muris consideratio	304.13
asclepiadis vires ex Galeno	384.20	auriculae muris facultates	304.26
Ascyron Dioscoridi	427.32	Auripigmentum Dioscoridi	614.48
ascyri consideratio	428.10	auripigmenti consideratio	615.7
ascyri vires ex Galeno	428.41	auripigmenti vires ex Galeno	615.31
Asinum iecur Dioscoridi	183.50	auripigmenti noxa, et remedia Dioscoridi	676.4
asini ungula Dioscoridi	184.55	auripigmenti uenefica uis, et curatio	676.10
Asius lapis Dioscoridi	627.50		



# Index.

Azadaracht arboris uenenum, & remedia 664. 23  
Azaroli arboris descriptio 139. 2

## B

Baccabauri Dioscoridi 84. 53  
Baccharis Dioscoridi 347. 3  
baccharis consideratio 347. 22  
baccharis uires ex Paulo 348. 2  
Balaninum oleum Dioscoridi 51. 36  
balanini olei consideratio 51. 40  
balanini olei uires 51. 43  
Balaustium Dioscoridi 128. 2  
balaustij consideratio 128. 28  
Ballote Dioscoridi 390. 24  
ballotes consideratio 390. 33  
Balsamina herba que 553. 59  
balsamina historia 356. 1  
Balsamum Dioscoridi 39. 16  
balsamum cur in Syria non reperitur 40. 4  
balsami consideratio, & historia 39. 47  
balsami uiridarum in Memphi 40. 7  
balsami historia ex Theophrasto 40. 12  
balsami fructum non legitimum officinis 40. 31  
balsami uires ex Galeno 40. 38  
balsami loco quid supponendum 40. 42  
balsami factitij confectio 40. 53  
Barbula hirci Dioscoridi 270. 53  
barbule hirci consideratio, & uires 270. 58  
Basilisci ictus notæ, & curatio Diosc. 707. 7  
basilisci uaria historia 707. 13. & in ea plura fabulosa 707. 39  
Basilicum 269. 4  
Bdellium Dioscoridi 64. 15  
bdellium planta genus 64. 57  
bdellij consideratio 64. 26  
bdellij uulgaris genera 64. 37  
bdellij succedanea 64. 41  
bdellij historia ex Plinio 64. 42  
bdellij uires ex Galeno 64. 48  
Behen album & rubrum 536. 53  
Bellis, & eius historia, & uires 418. 52  
Belzoinum quid 376. 20  
Beneficium a Dioscoride in posteros collatum 642. 35  
Beta Dioscoridi 249. 51  
betæ consideratio 249. 59  
betæ facultates ex Galeno 250. 3  
betæ sylvestris 250. 12  
Betonica Dioscoridi 430. 20  
betonicæ consideratio 430. 52  
betonicæ uires ex Antonio Musa 430. 54  
betonicæ uires ex Galeno 431. 28  
Betule arboris consideratio 90. 52  
betule cortex bituminosus 90. 59  
betule uires 91. 3  
Bezahar lapidis historia, & uires 609. 59  
Bislingua herba 516. 8  
Bistorta herba que 431. 49  
bistortæ uires 431. 59  
Bitumen Dioscoridi 77. 59  
bituminis consideratio 78. 22  
bituminis historia, & uires ex Galeno 80. 8  
Blatta pistrinaria Dioscoridi 182. 56

blattarum consideratio 182. 59  
blattarie herbe historia, & uires 500. 48  
blatte bifantis 161. 19  
Bliton Dioscoridi 244. 42  
bliti consideratio 244. 45  
bliti uires ex Galeno 245. 4  
Boeotica myrrha 63. 12  
Boli Armenij uires 609. 36  
Bonifacia 516. 9  
Borraginis consideratio 514. 10  
Botrys Dioscoridi 401. 26  
botryos consideratio 401. 33  
botryos uires ex Paulo 401. 50  
Branca urfina 323. 39  
Brasauli lapsus, & eiusdem opiniones non acceptæ  
19. 41. & 24. 39. & 27. 23. & 30. 35. & 38.  
42. & 62. 6. & 67. 39. & 75. 16. & 79. 17. &  
90. 4. 28. & 137. 25. & 142. 15. & 238. 37. &  
254. 42. & 263. 8. & 269. 14. & 278. 25. &  
284. 35. & 298. 39. & 315. 7. & 321. 14. &  
323. 44. & 336. 1. & 342. 9. & 375. 9. & 399.  
48. & 403. 21. & 417. 54. & 428. 24. & 456.  
58. & 502. 29. & 517. 47. & 541. 25. & 543.  
59. & 589. 47. & 591. 51. & 596. 37. & 612.  
61. & 613. 21. & 616. 17  
Brassica Dioscoridi 247. 40  
brassicæ sativæ consideratio 248. 12  
brassicæ uires ex Galeno 248. 41  
brassicam que oderunt 25. 29  
brassica sylvestris Dioscoridi 247. 58  
brassicæ sylvestris consideratio 248. 38  
brassica marina Dioscoridi 248. 3  
brassicæ marinæ consideratio 249. 4  
Britannica Dioscoridi 431. 36  
britannicæ consideratio 431. 41  
britannicæ historia ex Plinio 431. 43  
britannicæ uires ex Galeno 432. 7  
Bromus Dioscoridi 520. 55  
bromi consideratio 521. 2  
Brunfelsij lapsus 285. 9. & 496. 7. & 515. 57  
Bryon Dioscoridi 42. 3  
Bryonia Dioscoridi 554. 18  
bryoniæ consideratio 554. 50  
bryoniæ noxa, & curatio 679. 36  
Bubuli stercoris uires 215. 32  
Buccina Dioscoridi 158. 49  
buccinæ consideratio 159. 8  
Buglossum Dioscoridi 514. 4  
buglossi consideratio 514. 10  
buglossi descriptio ex Auicenna 514. 28  
buglossi uires ex Galeno 514. 38  
Bulbus esculentus Dioscoridi 292. 3  
bulbus uomitorius Dioscoridi 292. 17  
bulborum consideratio 292. 21  
bulborum uires ex Galeno 292. 33  
Bunium Dioscoridi 512. 28  
bunij consideratio 512. 40  
bunij uires ex Galeno 512. 50  
Bupthalmum Dioscoridi 428. 14  
bupththalmi consideratio 428. 22

# Index.

buphthalmi vires ex Galeno 418.47  
 Buprestes Dioscoridi 296.3  
 buprestium consideratio 296.34  
 buprestis sumpta notæ, & auxilia Dioscor. 657.56  
 buprestium uenenum eiusq; curatio 658.4  
 Bursa pastoris, & eius vires 281.31  
 Butyrium Dioscoridi 204.54  
 butyri fuligo Dioscoridi 205.3  
 butyri consideratio 206.5  
 Buxi arboris consideratio 113.30  
 buxi usus 113.36

## C

**C**ACALIA Dioscoridi descripta 312.9  
 Cacaliæ consideratio 312.14  
 cacaliæ vires ex Galeno 312.21  
 Cachrys Dioscoridi 371.3  
 cachrys quid 371.40  
 Cactus cardui genus 322.20  
 Cadmia Dioscoridi 586.46  
 cadmiæ consideratio 587.21  
 cadmiæ historia ex Galeno 587.23  
 cadmiæ historia ex Plinio 587.46  
 cadmiæ facultates ex Galeno 587.35  
 Cæcilie ictus notæ, & curatio Dioscoridi 702.31  
 cæcilie morsus signa, & remedia 703.5  
 Cæruleus, uide cœruleus  
 Calamus odoratus Dioscoridi 38.8  
 calami odorati historia ex Theophrasto 38.20  
 calami odorati vires ex Galeno 39.4  
 calamus odoratus officinarum spurius 38.56  
 Calamintha Dioscoridi 341.49  
 calaminthæ consideratio 342.4  
 calaminthæ vires ex Galeno 342.37  
 Calcifraga Dioscoridi 553.16  
 Callorum equi vires 289.43  
 Calthæ consideratio, & vires 322.24  
 Calceiua Dioscoridi 623.15  
 calcis uiuæ consideratio 623.24  
 calcis vires ex Galeno 623.31  
 calcis noxa, & remedia Dioscoridi 676.4  
 calcis malefica uis, & curatio 676.10  
 Canabel Aphris quid 330.16  
 Cancanum Dioscoridi 45.13  
 cancani consideratio 45.19  
 Cancellorum consideratio 165.15  
 Canceri Dioscoridi 163.33  
 cancrorum consideratio 163.58  
 cancrorum vires ex Galeno 164.24  
 cancri fluuiales in Heturia frequentissimi 164.58  
 Canis rubus Dioscoridi 102.21  
 canis rubi consideratio 102.25  
 canis rubi vires ex Galeno 102.58  
 Canis rabidi iecur Dioscoridi 183.54  
 canis rabiosi signa Dioscoridi 684.53  
 canis rabiosi uenefica natura, & signa 685.12  
 canes quibus causis rabie exagitantur 685.30  
 canis morsus neglecti discrimina 686.3  
 canis rabidi morsus indicia salutifera 686.29  
 canis rabiosi morsus curatio Dioscoridi 686.56  
 canis rabiosi morsus curatio 687.19

canis rabiosi morsus remedia suspecta 688.3  
 canis rabiosi morsus auxilium religiosum 688.20  
 caninum stercus, & eius vires 215.56  
 Cannabis Dioscoridi descripta 423.50  
 cannabis consideratio 423.58  
 cannabis vires ex Galeno 424.15  
 Cannella 322.23  
 Cantharides Dioscoridi 195.59  
 cantharidum consideratio 196.31  
 cantharidum vires ex Galeno 196.59  
 cantharidum noxa, & remedia Dioscoridi 196.55  
 cantharidum malefica uis 656.26  
 cantharidum ueneni curatio 656.40  
 Caphura historia, & genera 73.33  
 caphura temperamentum, & vires 73.56  
 Capnos Dioscoridi 503.20  
 capni consideratio, uide fumariæ consider.  
 Capparis Dioscoridi 293.48  
 capparium consideratio 294.8  
 capparium satio 294.22  
 capparis vires ex Galeno 294.29  
 Capre ungula Dioscoridi 184.56  
 caprinum iecur Dioscoridi 183.52  
 caprini stercoris vires 215.37  
 Carciofi 322.32  
 Cardamomum Dioscoridi 22.34  
 cardamomi consideratio 22.42  
 cardamomi officinis genera plura 22.45  
 cardamomi Mauritatis genera duo 22.50  
 cardamomi genera ex Plinio 23.18  
 cardamomi vires ex Galeno 23.24  
 Cardiacæ consideratio, & vires 494.13  
 Carduus Dioscoridi 322.7  
 carduorum consideratio, & genera 322.12  
 cardui vires ex Galeno 322.44  
 carduus pinea (Carduus S. Mariae 370) 322.37  
 carduus benedictus, & eius vires 385.29  
 Cardina 317.47  
 Carnes quo modo diutius asseruentur 15.50  
 carnes noxie, & earum remedia 681.1  
 Carpassi succi noxa, & remedia Dioscoridi 664.35  
 carpassi consideratio (carota 353. 28) 664.38  
 Carpesij consideratio 29.24  
 carpesij vires ex Galeno 29.26  
 Carpobalsami consideratio 40.31  
 carpobalsami loco quid supponendum 40.48  
 Cartanum 559.23  
 Carum Dioscoridi 356.13  
 cari consideratio 356.18  
 carui officinarum 356.18  
 cari vires ex Galeno 356.27  
 Caryophyllata vires 443.51  
 caryophyllorum consideratio, & historia 283.48  
 Caryota Dioscoridi 113.15  
 caryotarum vires ex Galeno 127.14  
 Caseus Dioscoridi 204.43  
 casei consideratio, & vires 206.18  
 Cassia Dioscoridi 30.44  
 cassiæ odoratæ consideratio 31.29  
 cassiam odoratam non esse cassiam coronariam 31.38  
 cassiam

# Index.

casianum in cinnamomum mutari	3232	Cervinum cornu Dioscoridi	293-35
casia fistula Græcis quid	3236	cerui genitale Dioscoridi	284-45
casie odoratae descriptio ex Plinio	3240	ceruorum historia	293-59
casie odoratae historia ex Theophrasto	3248	ceruis uita longa	294-46
casia lignea	3255	cerui dictamni herba inuentores	294-59
casie uires ex Galeno	3442	cerui fel non habent	295-1
Casie solutiue consideratio	3447	cerui uenenum atrocissimum in cauda habent	295-5
casie solutiue uires	3458	eius remedia	672-59
Cassia siue cuscute historia	35214	Cerussa	225-57
Castanea Dioscoridi	221-46	Cerussa Dioscoridi	599-8
castanearum consideratio	221-50	cerusse consideratio	599-32
castanearum uires ex Galeno	222-5	cerusse uires ex Galeno	599-36
Castorium Dioscoridi	275-53	cerusse noxa, et curatio Dioscoridi	670-12
castorij consideratio	276-26	cerusse lethalis natura	670-20
castorij uires ex Galeno	276-55	cerusse ueneni remedia	670-33
castorei uires ex Plinio	277-32	Cestron Dioscoridi	430-20
castorei uirulenta uis, et curatio	673-13	Chalcanthi genera, et historia	609-42
Catanance Dioscoridi	517-3	chalcanthi uires, et historia ex Galeno	612-14
catanances consideratio	517-10	Chalcitis Dioscoridi	612-26
Cataputia	543-50	chalcitis consideratio	613-15
Catoblepas	707-30	chalcitis historia, et uires ex Galeno	613-40
Caucalis Dioscoridi	267-12	Chamae Dioscoridi	260-29
caucalidis consideratio	267-18	chamarum consideratio	260-48
caucalidis uires ex Galeno	267-26	Chamaeste Dioscoridi	548-7
Cauda cerui uenenum, et eius curatio	672-59	Chamaecissos Dioscoridi	512-55
Cauterij utilitas	688-50	chamaecissi consideratio	513-1
Cedria Dioscoridi	83-8	chamaecissi uires ex Galeno	513-13
cedrides Dioscoridi	83-33	Chamedaphne Dioscoridi	525-56
cedri historia	83-39	chamedaphnes consideratio	526-1
cedri et cedrie uires ex Galeno	84-18	chamedaphnes uires ex Galeno	526-15
cedromela Dioscoridi	833-55	Chamedrys Dioscoridi	387-22
cedrus Dioscoridi	833-6	chamedryos consideratio	387-37
Celticum nardum Dioscoridi	25-47	chamedryos historia, et uires ex Theophr.	387-49
celtici nardi consideratio	26-1	chamedryos uires ex Galeno	388-1
celtici nardi uires ex Galeno	26-54	Chameleo albus Dioscoridi	316-52
Cenchri ictus notæ, et remedia Dioscoridi	705-45	chameleo niger Dioscoridi	317-34
cenchri consideratio	705-52	chameleonis utriusque consideratio	317-47
Centaurium magnum Dioscoridi	314-49	chameleonis utriusque historia, et uires ex Theophr.	318-49
centaurij magni consideratio	315-1	Charesfolium	266-10
centaurij magni uires ex Galeno	315-39	chameleonis nigri uenenum, et remedia	669-58
Centaurium minus Dioscoridi	315-53	Chameleuce Dioscoridi	513-19
centaurij minoris consideratio	316-22	chameleuces consideratio	513-22
centaurij minoris uires ex Galeno	316-32	chameleuces uires ex Galeno	513-26
Cepa Dioscoridi	276-18	Chamelon Chamillm Chamomilla	417-1
ceparum consideratio, et historia	276-43	chameloni consideratio	ibidem
ceparum uires ex Galeno	277-22	chameloni uires ex Galeno	417-12
Cepæa Dioscoridi	425-29	Chamapitys Dioscoridi	428-56
cepæa consideratio	425-36	chamapityos consideratio	429-41
cepæa uires ex Paulo	425-48	chamapityos uires ex Galeno	429-47
Cera Dioscoridi	220-47	Chamesyce Dioscoridi	544-44
ceræ uires ex Galeno	221-3	chamesyces consideratio	544-53
Cerafa Dioscoridi	130-8	chamesyces uires ex Galeno	544-56
cerasorum consideratio	130-14	Chamelea Dioscoridi representata	546-42
cerasorum satiuorum genera	130-23	chameleæ consideratio	547-5
cerasorum acidorum genera plura	130-38	chameleæ uires ex Galeno	547-27
cerasorum uires ex Galeno	130-59	chameleæ noxa, et curatio	679-37
Cerafæ ictus notæ, et eius curatio Dioscoridi tradita	705-59	Characias tithymalus Dioscoridi	540-37
cerafæ morsus exitialis auxilia	706-6	Chelidonia herba ab hirundine inuenta	291-42
Ceretta herba	433-2	chelidonium maius Dioscoridi	302-2
		chelidoni maioris consideratio	302-21
		chelidoni	



# Index.

chelidonij maioris uires	302.39	circae consideratio	404.54
Chelidonium minus Dioscoridi	302.51	circae uires ex Galeno	450.7
chelidonij minoris consideratio	303.4	Circumforaneus floris uenenati olfactu interemptus	
chelidonij minoris uires	303.28	644.26	
Chersydri natura, morsus, & curatio	705.31	Circumforaneorum uenena innoxie sumere profitentium	
Cherue oleum	50.49	fraudes	652.5. & dein.
Chia terra Dioscoridi	638.3	Circumforaneorum diui Pauli stirpem mentientium fraus	
Chine radice consideratio, & uires	119.10	693.53. & deinde	
Chondrilla Dioscoridi	260.39	Cirsium Dioscoridi	509.22
chondrilla utriusq; consideratio	260.51	cirsij consideratio	509.32
chondrilla uires ex Galeno	260.56	Cistus Dioscoridi	205.32
Chrysanthemon Dioscoridi	465.6	cisti consideratio	205.48
chrysanthemi consideratio	465.16	cisti uires ex Galeno	206.7
chrysanthemi lectio restituta	465.39	Citria mala Dioscoridi	233.55
Chrysobalanus	536.49	citriorum mira facultas	236.31
Chrysocolla Dioscoridi	599.50	citriorum uires	236.41
chrysocolla factitia	216.59	citrij mali facultates ex Galeno	236.55
chrysocollae consideratio, & historia	600.1	Clematis Dioscoridi	435.34
chrysocollae uires ex Galeno	600.21	clematis altera Dioscoridi	435.41
Chrysocome Dioscoridi	463.47	clematidum consideratio	435.46
chrysocomes consideratio	463.53	clematidum uires ex Galeno	436.14
chrysocomes uires ex Galeno	463.57	Clinopodium Dioscoridi	385.57
Chrysogonon Dioscoridi	464.4	clinopodij consideratio	386.4
chrysogoni consideratio	464.8	clinopodij uires ex Galeno	386.9
Chymistarum de chelidonio uanitas	302.27	Chymenon Dioscoridi	439.46
Cicade Dioscoridi	288.35	chymeni consideratio	439.52
cicadarum consideratio	288.34	Cneori consideratio, & descriptio ex Theophrasto	
cicadarum uires ex Galeno	289.13	323	
Cicer satium Dioscoridi	233.32	Cnicus Dioscoridi	559.3
ciceris consideratio, & uires ex Galeno	233.48	cnici consideratio	559.22
ciceris uires ex Aëtio	234.5	cnici uires ex Galeno	559.33
cicer arietinum Dioscoridi	233.39	cnici sylvestris historia ex Theophrasto	384.34
cicer sylvestre Dioscoridi	233.45	Coagulum Dioscoridi	208.30
Cichorion Dioscoridi	257.53	coaguli consideratio	208.44
cichorij uires ex Galeno	259.46	coaguli facultates ex Galeno	208.50
Cici Dioscoridi	538.23	Coccum Gnidium Dioscoridi	546.50. & 547.2
Cicini olei consideratio	50.49	cocum infectorium Dioscoridi	450.3
cicini olei uires ex Mesue	50.53	cocci infectorii consideratio	460.13
Cicuta Dioscoridi	482.17	cocci infectorii uires ex Galeno	460.42
cicute consideratio	482.36	Cochleæ Dioscoridi	262.6
cicute uires ex Galeno	482.46	cochlearum consideratio	262.39
cicute pote noxa, & curatio Dioscor.	662.52	cochlearum uires ex Galeno	262.56
cicute uenefica uis	663.1	cochleæ pomatie quæ	262.59
cicute sumptæ remedia	663.20	cochleæ marine	263.21
Cimices Dioscoridi	282.3	cochleæ sine testa	263.22
cimicum consideratio	282.19	cochlearum lapis, & eius uires	263.23
cimices sylvestres	282.26	Cæruleus lapis Dioscoridi	601.49
Cimolia terra Dioscoridi	638.14	cærulei lapidis consideratio	601.53
Cinis fermentitius Dioscoridi	624.3	cærulei uires ex Galeno	602.33
cineris omnis uires ex Galeno	624.9	Colchicon Dioscoridi	486.42
Cinnabaris Dioscoridi	603.12	colchici & ephemeris consideratio	487.13
cinnabaris consideratio	603.23	colchici & ephemeris uires ex Galeno	488.14
Cinnamomum Dioscoridi	31.3	Colocassia Dioscoridi	235.28
cinnanomi consideratio	33.2	colocassie consideratio	235.39
cinnanomi historia ex Galeno	33.8	Colocynthis Dioscoridi	549.32
cinnanomi penuria unde	33.41	colocynthis consideratio	549.52
cinnanomi differentie ex Theophrasto	34.20	colocynthis lesiones	549.56
cinnanomi uires ex Galeno	34.38	colocynthis noxa, & curatio	579.35
Cionia Dioscoridi	158.53	colocynthis uires ex Mesue	550.2
Circa Dioscoridi	404.47	colocynthis uires ex Galeno	550.19
		Colophonis	

# Index.

Colophonie resine consideratio	75.44	Crithmum, seu crithamon Dioscoridi	255.13
Columnelle lapsus	153.35	crithmi consideratio	255.26
Colutee, & colytee consideratio	368.29	crithmi uires ex Galeno	255.46
Colymbades oliue Dioscoridi	118.4	Crocodili animalis historia	201.24
Communis curatio in omnes ictus uirulentos Dioscoridi	696.47	crocodili animalis genera, & uires	201.34
Confiligo herba	528.7	Crocodilion Dioscoridi	319.7
Consolida regalis	357.60	crocodilij consideratio	319.12
Conyza Dioscoridi	406.3	crocodilij uires ex Galeno	319.25
conyze consideratio	406.24	Crocomagma Dioscoridi	47.16
conyze uires ex Galeno	406.39	Crocum Dioscoridi	46.52
Corallium Dioscoridi	626.39	croci consideratio	47.27
corallij consideratio	626.51	crocum optimum mittit Vienna Austria	47.33
corallij facultates	627.15	croci uires ex Galeno	47.36
Corallina, & eius uires	496.40	crocum Saracenicum	559.21
Cordi errata	35.56. & 285.8. & 455.54	Croton Dioscoridi	538.23
Coriandrum Dioscoridi	359.5	Cruciata consideratio	311.29
coriandri facultas ex Galeno	359.22	cruciatae uires	311.38
coriandri uires ex Auicenna	360.5	Crystalli historia	634.46
coriandri epoti noxa, & curatio Dioscoridi	662.8	crystalli uires	635.4
coriandri uenefica natura	662.15	Cubearum consideratio	30.5
coriandri ueneni remedia	662.32	cubearum uires	30.7
Coria ueteramentaria Dioscoridi	185.49	Cucumis satiuus Dioscoridi	262.43
coriorum ueteramentariorum uires	185.52	cucumeris consideratio	262.54
Coris Dioscoridi	428.3	cucumeris uires ex Galeno	263.53
coris consideratio	428.14	cucumis sylvestris Dioscoridi	529.56
Cornarij errata, & eius opiniones damnatae	121.5. & 122.46. & 134.31. & 135.5. & 486.4. & 617.10. & 625.34	cucumeris sylvestris consideratio	530.49
Cornu cerui Dioscoridi	193.35	cucumeris sylvestris uires ex Galeno	531.24
cornu cerui uires	195.12	Cucurbita Dioscoridi	261.3
Cornus Dioscoridi	140.45	cucurbitae consideratio	261.15
corni consideratio	140.50	cucurbitarum uaria genera	261.36
cornorum usus in cibis	141.9	cucurbitae facultates ex Galeno	261.39
cornorum uires ex Galeno	141.14	cucurbita sylvestris	554.50
Coronopus Dioscoridi	255.51	Culta quae plantae ament	9.39
coronopi consideratio	255.55	Cuminum satiuum Dioscoridi	357.34
coronopi sylvestris uires	256.52	cumini satui consideratio	357.56
coronopi hortensis uires ex Galeno	256.56	cuminum sylvestre Dioscoridi	357.44
Corpora icta fulmine non putrescunt	15.50	cuminum sylvestre alterum Dioscoridi	357.50
Corrago Apuleio quid	514.36	cumini sylvestris examinatio	357.56
Corruda Dioscoridi	251.3	cumini uires ex Galeno	358.17
Cortices quando siccandi, & reponendi	7.37	Cumila Dioscoridi	334.24
Corydalis herba	503.53	Cupressus Dioscoridi	80.18
Cos Naxia Dioscoridi	636.54	cupressi historia, & consideratio	80.34
Costus Dioscoridi	36.5	cupressus liquidam resinam fundit	80.60
costi consideratio	36.16	cupressus pusilla	81.2
costum quae suppleant	36.25	cupressi uires ex Galeno	81.9
costi uires ex Galeno	36.32	Curatio uirulentorum ictuum secundum quendam eremitan	694.40
Cot. Aphris quid	273.59	Curmi Dioscoridi	225.52
Cotonea mala Dioscoridi	131.53	curmitis consideratio	225.56
cotoneorum malorum consideratio	134.42	Cyclaminus Dioscoridi	287.2
cotoneorum malorum genera	134.43	cyclaminus altera Dioscoridi	287.36
Cotyledon Dioscoridi	492.55. & 492.35	cyclanini utriusque consideratio	287.42
cotyledonis utriusque consideratio	492.40	cyclanini uires ex Mesue	287.50
Crataegonum Dioscoridi	408.22	cyclanini uires ex Galeno	287.57
crataegoni consideratio	408.29	cyclanini noxa, & curatio	579.12
Cressini forma, & uires	101.33	Cynocrambe Dioscoridi	560.52
Crimnon Dioscoridi	226.48	cynocrambes consideratio	560.57
crimni consideratio	226.51	Cynoglosson Dioscoridi	514.44
		cynoglossi consideratio	514.53
		Cynosorchis Dioscoridi	410.3
		Cynobastus	102
		Cyparissias	

# Index.

Cyparissius tithymalus Dioscoridi 541.11  
Cyperus Dioscoridi 21.32  
cyperi consideratio, et genera 21.54  
cypirus arbor 22.14  
cyperi uires ex Galeno 22.37  
Cyphi compositio Dioscoridi 46.36  
cyphi caput in Dioscoride adscititum 46.49  
Cytinus Dioscoridi 127.52  
cytini consideratio 128.28  
Cytisus Dioscoridi 505.24  
cytisi consideratio 505.36  
cytissus frutex est, non herba 505.45  
cytisi historia ex Columella 506.22  
cytisi historia ex Plinio 506.18  
cytisi uires ex Galeno 506.41

**D**AMASCENA pruna Diosc. 141.53  
Danaosonium Dioscoridi 425.56  
Daphnoides Dioscoridi 525.47  
daphnoidis consideratio 526.2  
daphnoidis uires ex Galeno 526.15  
Daucum Dioscoridi 366.36  
dauci consideratio 367.10  
daucum à sylvestri pastinaca differre 367.22  
dauci uires ex Galeno 367.35  
Delphinium Dioscoridi 367.43  
delphiniij consideratio 367.31  
Dendroides tithymalus Dioscoridi 541.14  
Deuteria Dioscoridi 575.23  
Dictamnium Dioscoridi 337.2  
dictamnium Cretense 337.32  
dictamni consideratio 337.40  
dictamnium caulem, florem, et fructum ferre 338.12  
dictamni uires ex Galeno 338.29  
dictamni albi consideratio 338.24  
dictamni albi uires 338.37  
Difficile unum uni ueneno proprium inuenire signum.  
Dioscor. (Ses lcomis. 269.31) 642.7  
Dioscorides in simplicium medicamentorum materia pri-  
mas tenet 5.21  
Dioscorides à Galeno maxime commendatus 5.12  
Dioscorides à calumnia defenditur 5.8.5  
Dioscoridi uaria simplicium nomina adulterina 8.25  
Dioscoridis lectio in agallocho restituta 43.60  
Dioscoridis lectio in lentiscino oleo deprauata 53.44  
Dioscoridis lectio in thure tribus in locis castigata 68.  
39. et deinde  
Dioscoridis lectio in pice restituta 77.54  
Dioscoridis lectio quibusdam codicibus in mespilo deprauata 139.4  
Dioscoridis locus in thlapi restitutus 281.22  
Dioscoridis lectio in moly restituta 350.54  
Dioscoridis lectio in oreoselino restituta 363.10  
Dioscoridis locus in asclepiade restitutus 384.12  
Dioscoridis codex in leucade diminutus 388.13  
Dioscoridis locus in leucoio suspectus 408.2  
Dioscoridis locus in aconito suspectus 480.29  
Dioscoridis locus in squama stomomatis deprauatus  
592.43  
Dioscoridis locus in aleyonio suspectus 624.57

Dioscoridis lectio castigata in lacte intus coagulato  
674.1  
Diphryges Dioscoridi 614.11  
diphrygis consideratio 614.26  
diphrygis historia, et uires ex Galeno 614.30  
Dipsacum Dioscoridi 319.32  
dipsaci consideratio 319.49  
dipsaci uermiculus 319.59  
dipsaci uires ex Galeno 320.14  
Dipsadis morsus notæ, et remedia Dioscor. 703.50  
dipsadis historia, morsus signa, et curatio 704.39  
Domestica nobis noxia Dioscoridi 680.49  
domesticarum rerum noxa 680.57  
domesticarum rerum noxæ remedia 681.8  
Dorella quid 3508.56  
Doronic consideratio 1271.45  
Doryenion Dioscoridi 476.59  
doryenij consideratio 477.6  
doryenij uires ex Galeno 477.10  
doryenij sumpti noxa, et remedia Diosc. 660.26  
doryenij ueneni consideratio 660.34  
Draba Dioscoridi 281.52  
drabæ consideratio 281.58  
Draco marinus Dioscoridi 57.24  
draconis marini consideratio 167.38  
draconis marini ictus notæ, et remedia Dioscoridi  
39. 698.26  
Dracunculus maior Dioscoridi 288.2  
dracunculus minor Dioscoridi 288.32  
dracunculorum consideratio 289.4  
dracunculi species plures 289.20  
dracunculi uires ex Galeno 289.34  
dracunculus hortensis 289.43  
dracunculi seminis noxa, et auxilia 661.50  
Dryini ictus notæ, et remedia Dioscoridi 703.15  
dryini historia, et eius ictus signa 703.20  
dryini morsus curatio 703.41  
Dryopteris Dioscoridi 558.48  
dryopteridis consideratio 558.53  
dryopteridis uires ex Galeno 558.57  
Dulcis radix Dioscoridi 313.55  
dulcis radices consideratio 314.7  
dulcis radices uires ex Gal. 314.37  
**E**BENVS Dioscoridi 107.18  
Ebeni consideratio 107.32  
ebeni genera duo 107.33  
ebeni uires ex Galeno 107.52  
ebulum Dioscoridi 548.7  
ebuli, et sambuci genera, et uires 548.22  
ebuli uires ex Galeno 548.37  
Ebur Dioscoridi 191.50  
eboris consideratio 191.52  
eboris uires 193.6  
Echinus marinus Dioscoridi 55.24  
echini marini consideratio, et historia 55.40  
echinometra 55.48  
echinorum uires ex Galeno 56.8  
Echinus terrestris Dioscoridi 56.34  
echini terrestris consideratio 56.39  
echini



# Index.

echini terrestris facultas	256.43
Echion Dioscoridi	448.24
echij consideratio	448.27
echij uires ex Paulo	448.55
Elaphobosci Dioscoridi	365.24
elaphobosci consideratio	365.35
elaphobosci uires ex Galeno	365.56
Elaterion Dioscoridi	530.11
elaterij uires ex Mesue	531.7
elaterij noxa, & remedia Dioscoridi	678.36
elaterij noxa, & curatio	679.12
Elatine Dioscoridi	454.51
elatines consideratio	454.56
Electarij in cura cantharidum descriptio	657.37
Electrum Dioscoridi	88.42
Eleomeli Dioscoridi	50.22
eleomelitis consideratio	50.28
Eleliphacos Dioscoridi	339.3
Eleoselinum Dioscoridi	361.43
eleoselini consideratio	363.2
Elephantorum historia	191.54
Elichryson Dioscoridi	464.14
elichrysi consideratio	464.28
elichrysi uires ex Galeno	464.46
Elleborine Dioscoridi	503.2
elleborines consideratio	503.6
Elleborum album Dioscoridi	526.52
elleborum nigrum Dioscoridi	527.15
ellebori utriusque consideratio	527.39
ellebori utriusque uires ex Mesue	529.5
ellebori utriusque uires ex Galeno	529.23
ellebori albi noxa, & remedia Dioscoridi	678.36
ellebori albi noxa, & curatio	679.11
ellebori nigri noxa, & cura	679.23
Empetron Dioscoridi	553.18
empetri consideratio	553.22
empetri uires ex Galeno	553.31
Ephemerum Dioscoridi	487.3
ephemeri, & colchici consideratio	487.12
ephemeri, & colchici uires ex Galeno	488.24
ephemeri colchici noxa, & remedium Dioscoridi	659.36
ephemeri colchici uenenum, & curatio	659.49
Epimedium Dioscoridi	444.23
epimedij consideratio	444.29
epimedij uires ex Galeno	444.43
Epipactis Dioscoridi	503.2
epipactidis consideratio	503.6
Epithymum Dioscoridi	550.18
epithymi consideratio	550.26
epithymi disputatio	550.47
epithymum ubi plurimum	552.35
epithymi uires ex Mesue, & Galeno	552.6
Equisetum maius Dioscoridi	458.55
equisetum minus Dioscoridi	459.2
equiseti utriusque consideratio	459.38
equiseti utriusque uires ex Galeno	459.52
Equorum lichenes Dioscoridi	185.13
Eretria terra Dioscoridi	637.18
Erica Dioscoridi	96.3

erica consideratio	96.6
erica facultates ex Galeno	96.34
Erigeron Dioscoridi	495.45
erigerontis consideratio	496.1
erigerontis uires ex Galeno	496.8
Erinus Dioscoridi	449.33
erini consideratio	449.41
erini uires ex Galeno	449.59
Eruca Dioscoridi	268.3
eruce consideratio, & uires	268.9
Eruca olerum Dioscoridi	195.21
erucarum olerum historia	195.23
erucarum generatio	195.42
eruce quomodo fugentur	ibidem
Eruca pinorum Dioscoridi	196.8
erucarum pinorum consideratio	196.35
erucarum pinorum dolores, & remedia Dioscoridi	657.48
erucarum pinorum uenenum, & curatio	658.4
Eruum Dioscoridi	238.6
erui consideratio	238.31
erui uires ex Galeno	238.50
Eryngium Dioscoridi	326.57
eryngium marinum non esse crocodilium	319.18
eryngium marinum	327.19
eryngij consideratio	327.12
eryngij uires ex Galeno	327.45
Erysimon Dioscoridi	282.8
erysimi consideratio	382.22
Erythrodanum Dioscoridi	421.37
erythrodani consideratio	421.49
erythrodani uires ex Galeno	421.55
Eupatorium Dioscoridi	455.8
eupatorij consideratio	455.22
eupatorij uires ex Galeno	455.58
eupatorium Auicennae quid	455.37
eupatorium Mesui quid	455.46
Euphorbium Dioscoridi	378.13
euphorbij consideratio	378.28
euphorbium quis primum inuenerit	378.36
euphorbij uires ex Mesue	378.46
euphorbij uires ex Galeno	379.1
euphorbij potio noxia, & eius curatio	679.33
Eupragie descriptio, & uires	457.20

Faba Dioscoridi	234.14
Fabarum consid. & uires ex Galeno	234.42
fabas Aegyptia	235.17
fabas Aegyptiae consideratio	235.39
Fax Dioscoridi	622.51
fecis, & tartari dicti consid. & uires	623.5
Fagus Dioscoridi	119.57
fagi consideratio	120.44
Farris consideratio	229.12
farris, & balica differentia	ibidem
Fel Dioscoridi	213.3
fellis uires ex Galeno	213.26
fellis bubuli lapis, & eius uires	213.37
fellis pardi uenenum, eiusque remedia	672.16
fellis uiperæ uenefica uis, & auxilia	672.24

# Index.

fellis canis piscis uenenum, et cura	672.33	foliorum in coloribus discrimen	21.59
Felis, eiusq; cerebri maleficia, et remedia	672.36	Fomes ignis ex tussilagine	398.40
Ferri rubigo Dioscoridi	594.13	Fontium in riguis quæ plantæ proueniant	9.30
ferri rubiginis consideratio	594.24	Fossilium facultates	569.8
Ferri stercus Dioscoridi	594.21	Fragariæ, et fragorum confid. et uires	57.10
ferri stercoris consideratio	594.24	Fraxinus Dioscoridi	86.49
ferri scobis noxa, et curatio	674.45	fraxini species	87.28
ferri squamæ noxa, et cura	ibidem	fraxini consideratio, et historia	87.2
ferri recrementi noxa, et cura	ibidem	fraxini uires ex Plinio	87.30
Ferula Dioscoridi	372.26	Fructus quando decerpenti, et quomodo conseruandi	7.26
ferulæ, in brutorum cibis uariis effectus	15.34	Frutices	8.38
ferulæ consideratio	372.36	Fuchsij errores, eiusq; sententiæ reprobatae	19.55
ferulæ et ferulaginis historia ex Theophr.	372.45	et 23.4. et 29.51. et 37.58. et 38.60. et	
ferulæ uires ex Galeno	373.8	44.36. et 46.8. et 73.46. et 79.4. et 143.	
ferulæ ubi maxime	373.7	4. et 148.20. et 161.23. et 201.6. et 218.	
ferula tacta muræna confestim moritur	373.6	50. et 220.18. et 231.29. et 238.38. et	
Fiber Dioscoridi	175.53	240.29. et 241.38. et 263.50. et 286.55.	
fibrini testes Dioscoridi	175.54	et 298.43. et 313.24. et 317.55. et 320.	
fibri consideratio	176.26	50. et 331.54. et 349.57. et 363.36. et	
fibros sibi testes amputare, uanum	176.37	368.27. et 372.11. et 375.22. et 384.7.	
fibri testium adulteratio	176.40	et 385.21. et 393.5. et 400.20. et 410.	
fibri testium uires ex Galeno	176.65	56. et 411.51. et 415.42. et 417.54. et	
Ficus Cypria	150.50	435.59. et 436.44. et 440.37. et 452.15.	
Fici Dioscoridi	151.12	et 459.49. et 464.39. et 465.48. et 467.	
ficorum consideratio	151.59	492. et 476.11. et 481.4. et 488.5. et	
ficorum facultates ex Galeno	152.5	492.49. et 494.57. et 500.29. et 502.26.	
ficus agrestis	152.48	54. et 513.1. et 515.30. et 517.49. et 543.	
fici præcoces	152.51	510. et 555.48. et 604.31. et 617.9. et 630.	
ficus cinis Dioscoridi	151.47	28.	
Fidicula Theodoro	519.3	Fucus marinus Dioscoridi	496.53
Filicula Dioscoridi	557.55	fuci marini consideratio	497.1
filiculæ consideratio	557.52	fuci marini uires ex Galeno	497.19
Filipendula, et eius uires	405.23	Fuligo et myrrha, resina, styrace Dioscoridi	66.12
Filix mas Dioscoridi	556.58	fuligo liquidæ picis Dioscoridi	76.55
filix femina Dioscoridi	557.9	fuligo pictoria Dioscoridi	639.16
filicis utriusque historia	557.17	fuligo thuris Dioscoridi	66.3
filicis utriusque uires ex Galeno	557.36	fuliginum omnium uires	77.43
Finum Dioscoridi	214.25	Fumaria Dioscoridi siue Fumæ terræ	503.21
fumi uires, uide stercoris uires		fumariæ consideratio	503.29
Flammulæ historia, et uires	436.2	fumariæ alterum genus	513.33
flammulæ noxa, et curatio	661.27	fumariæ genera ex Plinio	503.35
Flores quo tempore decerpenti, ac recondendi	7.6	fumariæ uires ex Mesue	503.59
flores seci quando durent	7.14	fumariæ facultates ex Galeno	504.15
florum in plantis uarietas	13.26	Fungi Dioscoridi	485.3
Flos æris Dioscoridi	590.45	fungorum consideratio, et genera	485.30
floris æris historia	590.87	fungi lucernarum	486.1
floris æris uires ex Galeno	591.4	fungorum uires ex Galeno	486.20
Flos salis Dioscoridi	620.8	fungorum strangulatus, et remedia Diosc.	570.42
flos punice Dioscoridi	127.52	fungorum uenefica natura	1670.51
flos sylvestris punice Dioscoridi	128.2	fungorum præparatio	1670.59
Fluminibus quæ plantæ adnasci gaudeant	9.12	fungorum ueneni remedia	671.15
Foeniculum Dioscoridi	366.3		
foeniculum erraticum Dioscoridi	366.23		
foeniculi utriusque consideratio	366.34		
foeniculi uires ex Galeno	366.44		
Foenum græcum Dioscoridi	232.22		
foeni græci confid. et uires ex Galeno	232.37		
Foliorum in plantis uarietas	14.18		
foliorum in plantis comparatio, et similitudo inter se			

**G**AGATES lapis Dioscoridi 630.15  
 Gagatæ lapidis consideratio 630.22  
 gagatæ lapidis historia, et uires ex Galeno 630.38  
 Galactites lapis Dioscoridi 632.20  
 galactitæ lapidis historia 632.29  
 Galangæ consideratio, et genera 20.32  
 galangæ uires 20.39  
 Galaxias

# Index.

Galaxias lapis Dioscoridi 632.40  
Galbanum Dioscoridi 379.5  
galbani confid. 379.22. eius uires ex Gal. 379.28  
Galega quid, et eius uires 350.28  
Galení navigationes 2.45  
Galení lectio in thure restituta 66.45  
Galení in prunis defensio contra Brasauolum 142.15  
Galení de pistaciorum uiribus opinio ab Auicenna reprobata 146.1  
Galení, et Dioscoridis in Seripho, et Santonico abstinthio sententia uaria 330.54  
Galenus in coriandro à Dioscoride dissentit 359.23  
Galení sententia de trifolio asphaltite damnata 355.26  
Galení liber de theriaca ad Pisonem suspectus 395.49  
Galerita Dioscoridi 190.42  
galeritæ consideratio 191.1  
Gallion Dioscoridi 495.22  
galij confid. 495.31. eius uires ex Gal. 495.37  
Galiopsis Dioscoridi 494.28  
galiopseos consideratio 494.38  
Galla Dioscoridi 122.20  
gallarum confid. 122.29. et uires ex Gal. 123.23  
galla omphacitis 122.44  
Galli, et gallinæ Dioscoridi 186.10  
gallorum, et gallinarum confid. et uires 186.36  
Gallitricum quid *Gallitricum Hermium* 339.14  
Gammarrorum lapilli 164.54  
Garum Dioscoridi 181.46  
gari consideratio 181.55  
Gatteria herba *Gallimimum vide Lili* 42.12  
Genistæ consideratio *Sim* 534.17  
genistæ historia, et uires 534.24  
Genitale cerui Dioscoridi 184.45  
genitalis cerui consideratio 184.47  
Gentes tute à serpētib. eorūq. ictibus medentes 693.36  
Gentiana Dioscoridi 310.51  
gentianæ confid. 311.10. eius uires ex Gal. 311.18  
Gentiana minor 311.32  
Geodes lapis Dioscoridi 637.3  
geodæ lapidis consideratio 637.6  
Geranium Dioscoridi *Geranium is sradol* 401.57  
geranij consideratio 402.36  
Gingiber Dioscoridi 284.13  
gingiberis consideratio, et historia 284.22  
gingiberis uires ex Galeno 284.38  
Gingidion Dioscoridi 266.3  
gingidij confid. 266.8. et uires ex Gal. 266.4  
Giū Dioscoridi 374.50  
giū consideratio 375.1  
Gladiolus Dioscoridi 444.49  
gladioli confid. 445.1. eius uires ex Gal. 445.20  
Glandes Dioscoridi 119.53  
glandiferarum arborum consideratio 120.1  
Glans unguentaria Diosc. 534.50. eius confid. 535.1  
glandis unguentariæ uires ex Mesue 535.37  
glandis unguentariæ uires ex Galeno 535.51  
Glastum satium Dioscoridi 305.3  
glastum syluestre Dioscoridi 305.6  
glasti utriusq. confid. 305.11. et uires ex Gal. 305.17  
Glaucium Dioscoridi 380.32

glaucij confid. 380.38. eius uires ex Gal. 380.49  
Glaux Dioscoridi 521.13  
glaucis confid. 521.18. et uires ex Gal. 521.32  
Gleucinum Dioscoridi 58.31  
gleucini consideratio 58.36  
Glirium historia, et uires 203.30  
Gluten piscium Dioscoridi 381.3  
Glutinum Dioscoridi 380.55  
glutinis consideratio, et uires 381.7  
Gnaphalium Dioscoridi 403.43  
gnaphalij confid. 403.46. et uires ex Gal. 404.10  
Gnidium granum Dioscoridi 546.50  
Gnidinum oleum 52.20  
Gobius Dioscoridi 180.25  
gobiorum consideratio 180.45  
gobij facultas ex Galeno 180.49  
Gobij fluuiatiles 180.52  
Gospij consideratio 404.1  
Gramen Dioscoridi 450.5  
gramen arundinaceum Dioscoridi 450.11  
gramen Parnasi Dioscoridi 450.14  
graminis confid. et historia ex Plinio 450.28  
graminis uires ex Galeno 450.53  
Grandinis impetum quæ arceant 15.45  
Grossi Dioscoridi 151.40  
Guaiaci ligni consideratio 107.56  
guaiaci genera tria 108.1  
guaiaci cortices 108.45  
guaiaci planta 108.53. eius facultates 108.56  
Gummi amygdale Dioscoridi 145.9  
gummi cerasi Dioscoridi 130.9  
Gummi elemi facult. et consideratio 119.6  
Gypsum Dioscoridi 623.41  
gypsi confid. 623.44. et uires ex Gal. 623.50  
gypsi strangulatus remedia Dioscoridi 671.21  
gypsi ueneficium, eiusq. curatio 671.28

## H

**H**ÆMATITES lapis Dioscoridi 628.59  
hæmatitæ lapidis consideratio 629.16  
hæmatitæ lapidis uires ex Galeno 629.24  
hæmatitæ lapidis uires ex Alexandro 629.37  
Hæmorrhoi ictus notæ, et curatio Diosc. 703.50  
hæmorrhoi perniciosus ictus, et historia 704.8  
hæmorrhoi morsus notæ, et remedia 704.28  
Halica Dioscoridi *Halicaea* 228.25  
halicæ confid. 228.32. et uires ex Gal. 229.4  
halicæ, et farris differentia 229.12  
Halicacabum solanum Dioscoridi 474.58  
Halimus Dioscoridi 98.13  
halimi consideratio 98.17  
halimus Mauritanis molochia 98.23  
halimi uires ex Galeno 98.30  
Handachocha Arabicis quid 507.7  
Harundo Dioscoridi 93.12  
harundinum consideratio 93.28  
harundinum genera plura 93.30  
harundinis, et filicis odium 93.50  
harundinis uires ex Galeno 93.56  
Hastula regia Dioscoridi 291.17  
hastulæ regie consideratio, uide in Asphodelo  
Herba Trinitatis 595. \*\* Hedera  
Herba paralytir *Syluestre album* 500



# Index.

Hedera Dioscoridi	300.60	Hippopotami testes Dioscoridi	175.34	
hederæ consideratio, et genera	301.18	hippopotami historia	175.36. eius uires 175.46	
hederæ facultas	301.48	Hippofelinon Dioscoridi	361.52	
Hedychroon Dioscoridi	59.26	hipposelini consideratio	353.23	
hedychroi compositio ex Galeno	59.18	hipposelini uires ex Galeno	363.40	
Hedysaron, uide Securidaca		Hirci barbula Dioscoridi	270.53	
Helcysma Dioscoridi	597.38	hirci barbule consideratio	270.53	
Helenium Dioscoridi	47.46	Hirculus Dioscoridi	25.53	
helenij consideratio	48.1	Hirudinum deuoratarum remedia Dioscor.	578.6	
helenium alterum Dioscoridi	47.54	hirudinum deuoratarum noxa	578.13	
helenij Aegyptij consideratio	48.30	hirudinum deuoratarum curatio	578.19	
helenij uires ex Galeno	48.40	Hirundines Dioscoridi	191.16	
Helichryson, uide supra in Elichryso	467	hirundinum historia	191.36	
Helioscopius tithymalus Dioscoridi	541.6	Historia rustici à serpente hasta transfixo infecti	543.58	
Heliotropium magnum Dioscoridi	562.13	historia rustici suctu morsus feræ perempti	544.30	
heliotropium paruum Dioscoridi	562.1	historia fraudis circumforanei uenenum innoxie fumere	652.50	
heliotropij utriusq; consid.	562.8. et uires 562.10	historia casus ex cicuta sumpta	563.4	
Helleborine, uide Elleborine	503.2	Holostium Dioscoridi	438.39	
Helleborum, uide Elleborum	526.25	holostij consid.	438.44. eius uires ex Gal. 439.3	
Helxine cissampelos Dioscoridi	454.20	Hordeum Dioscoridi	224.27	
helxines consideratio	454.25	hordei consideratio	224.54	
helxines uires ex Galeno	454.45	hordei facultas	225.7	
Helxines altera Dioscoridi	488.32	Horminum Dioscoridi	411.32	
helxines consid.	488.46. uires ex Galeno	488.56	hormini consideratio	411.45
Hemerocallis Dioscoridi	406.49	horminum cereale	412.7	
hemerocallis consideratio	406.55	Humani stercoreis uires	215.6	
hemerocallis uires ex Galeno	407.30	Hyacinthus Dioscoridi	468.13	
Hemionitis Dioscoridi	415.31	hyacinthi consid.	468.23. eius uires ex Gal. 468.35	
hemionitidis consid.	415.37. et uires ex Gal. 416.23	Hydri historia, morsus, et curatio	705.20	
Herba mirabilis ad excitandam uenerem	411.11	Hydromeli Dioscoridi	576.26	
Herbarum formæ descriptæ parum conferunt ad cognoscenda simplicia	3.58	hydromelon Dioscoridi	581.47	
herbæ quo pacto legenda, siccandæq; sint	6.39	Hydropiper Dioscoridi	285.13	
herbas colligere certis temporibus non est ab re	6.24	hydropiperis consideratio	285.26	
herbæ quæ	8.42	hydropiperis uires ex Galeno	285.59	
herbæ quæ in alias profiliunt plantas	9.59	Hyoscyaminum Dioscoridi	51.59	
Herba Paris, et eius historia, et uires	481.5	hyoscyamini olei uires	52.10	
Hermolai lapsus, et opiniones improbatæ	25.4. et 9.50. et 39.35. et 50.31. et 60.49. et 73.8. et 271.4. et 295.47. et 384.30. et 403.15	hyoscyamini parandi ratio	52.19	
Hermolaus à calumnia uindicatur	478.55	Hyoscyamus Dioscoridi	472.44	
Hieracium magnum Dioscoridi	361.2	hyoscyami consid.	473.24. eius uires ex Gal. 473.44	
hieracium paruum Dioscoridi	361.6	hyoscyami noxa, et auxilia	565.18	
hieracij utriusq; consid.	et uires ex Plinio. 361.10	hyoscyami noxia uis	565.26	
Hiericuntam non esse Amonum	35.52	hyoscyami utriusq; noxæ curatio	565.40	
hiericuntæ uires	35.59	Hypecoon Dioscoridi	472.26	
Hippocampus Dioscoridi	157.3	hypecoi consideratio	472.30	
hippocampi consideratio	157.41	hypecoi uires ex Galeno	472.36	
hippocampi uires ex Galeno	158.23	Hypericon Dioscoridi	426.46	
Hippoglosson Dioscoridi	516.2	hyperici consid.	428.10. eius uires ex Gal. 428.37	
hippoglossi consid.	516.8. eius uires 516.18	Hypocistis Dioscoridi	105.39	
Hippolapathon Dioscoridi	243.51	hypocistidis consideratio	105.48	
hippolapathi consideratio	244.8	hypocistidis uires ex Galeno	106.12	
hippolapathi facultates	244.14	Hyssopum Dioscoridi	332.36	
Hippomarathon Dioscoridi	366.23	hyssopi consid.	332.54. eius uires ex Gal. 333.34	
hippomarathri descriptio, et uires	366.40	hyssopi uires ex Mesue	333.39	
Hippophaës Dioscoridi	537.54	Hystricis mentio	156.54	
hippophaïs consideratio	538.12	<b>I</b> ACEA herbæ	511.38	
Hippophaëston Dioscoridi	538.5	Iacobi Sylui in acacia opinio improbatæ	115.5	
hippophaësti consideratio	538.12	Iasminum Dioscoridi	60.35	
		iasmini unguenti consideratio	60.40	
		Isatis satiuæ folio 308 vniuersæ	156.54	

# Index.

Iaspis Dioscoridi	635.13	Ius piscium Dioscoridi	181.52.
iassidum genera plura, & uires	635.19	Ixia Dioscoridi	316.51.
Iberis Diosc. 153.47. eius confid.	153.53	ixia nigri chamæleonis radicibus innasci	318.22
iberis, & lepidium idem	154.5	ixia uenenum mortiferum	318.60
iberis à Damocrate carmine descripta	154.8.	ixia uenenum, & remedia Dioscoridi	669.27
iberis altera	154.41.	ixia uenefica natura 669.37. eius cura	669.44.
Ibiscus, uide Althea	422.45	<b>K</b>	
Ichthyocolla Dioscoridi	381.1		
Ictuan uirulentorum communis curatio Diosc.	690.47.	<b>A R A B E</b> Mauritanorum	
Idæa radix Dioscoridi	458.3		
idææ radicis consideratio	458.7	Keiri quid	407.55
idææ radicis uires ex Galeno	458.10.	Kepris quid	88.47
Iecur apri Dioscoridi	183.53	Kerna quid	538.47.
Iecur asinum Dioscoridi	183.50	<b>L</b>	
Iecur canis rabidi Dioscoridi	183.54		
Iecur caprinum Dioscoridi	183.51.	<b>A R R V M</b> Veneris Dioscoridi	
Iecur mergi Dioscoridi	183.57		
Iecinorum diuersorum consideratio	184.21	Labri Veneris consideratio	319.49
Iesemin unde dictum	60.60	labri Veneris uires ex Galeno	320.14
Iesemini uires ex Serapione	61.3	Labrusca Dioscoridi	570.7.
Ilex Dioscoridi	119.57	Lac Dioscoridi	204.3
ilicis consideratio	120.53	lactis consideratio	205.27.
Imperatorie consideratio, historia, & uires	365.5	lactis probatio 205.38. eius facult.	205.45
Impia herba Plinij	403.52	lactis bibendi ratio	205.52
Impostores quandoque etiam peritos decipiunt	4.11	lactis facultates ex Galeno	207.6
Indica harundo	94.36	lactis coagulati uires	205.57
Indicum Dioscoridi	602.39	lac humanum Dioscoridi	204.33
indici consideratio	602.45	lac schiston Dioscoridi	204.21
Intybus Dioscoridi	257.53	lactis serum Dioscoridi	204.18
intybi consideratio	259.1	Lactis intus coagulati noxa, & auxilia Diosc.	673.26
intybi uires ex Galeno	259.46	lactis coagulati consideratio	673.33
Ioannis de Vigo lapsus	61.9	lactis in uentriculo coagulati noxa	673.43
Iouis glandes Dioscoridi	121.46	lactis in uentriculo coagulati curatio	973.58
Irini unguenti consideratio	158.24	Lacca, & de ea Arabum opinio uaria	45.30
Irio Dioscoridi	28.28	lacca insectorum est Arabum lacca	45.38
irionis consideratio	28.22	laccæ factitiæ genera	46.3
Iris Dioscoridi descripta	17.34	Lacerta Dioscoridi	199.28.
iridis confid. & genera 17.55. eius uires	18.27	lacertarum consideratio	199.54
iris cognomine astragalitis	18.34	lacertarum Chalcidicarum consideratio	199.58
iridis mentio à Galeno	18.46	Lacrymæ, resine, & gummi	7.55
Ifopyron Dioscoridi	151.3	Lactuca Dioscoridi	264.55
ifopyri consideratio	151.8	lactuca syluestriis Dioscoridi	265.3
Iuanusca	396.44	lactucæ consideratio	265.18
Iudaicus lapis Dioscoridi	633.28	lactucæ syluestris consideratio	265.25
iudaici lapidis uires ex Galeno	633.33	lactucæ uires ex Galeno	265.33
Iuglandes nuces	146.36	Ladanum Dioscoridi	106.29
iuglandium consideratio	146.57	ladani consideratio	106.50
iuglandium uires ex Galeno	147.4	ladani uires ex Galeno	106.59
Iuncus Dioscoridi	46.2.5	Lagopus Dioscoridi	443.42
iunci consideratio, & uires	46.2.19. & dein.	lagopi consideratio	443.45
Iuncus odoratus Dioscoridi	37.3	lagopi uires ex Galeno	444.2
iunci odorati consideratio	37.19	Lagrino uulgo quid	72.2
iunci odorati uires ex Galeno	37.60	Lamium herba	495.8
Iuniperus Dioscoridi	81.23	Lampfana Dioscoridi	244.25
iuniperi consideratio	81.38	lampsanæ consideratio	244.28
iuniperi caput in Dioscoride deprauatum	ibidem	lampsanæ uires ex Galeno	244.35
iuniperi domesticæ	81.53	Lana Dioscoridi	207.46
iuniperi gummi	81.57. eius usus	Lanaria herba Dioscoridi	286.31
iuniperi uires ex Galeno	82.19	lanariæ herbæ consideratio	286.40
Ius galli ueteris Dioscoridi	186.12	lanariæ herbæ uires ex Galeno	286.52
		Lapathum Dioscoridi	242.56
		lapathi consideratio	243.55
		lapathi uires ex Galeno	244.11
		Lapides cur pauci, cur multi fiant	566.10
			lapidum

# Index.

lapidum colores unde uarij	566.23	leontopetalii uires ex Galeno	386.36
lapidum diuersa discrimina	567.22	Leontopodion Dioscoridi	515.49
Lapis plumbarius	595.36	leontopodij consideratio	515.55
lapidis plumbarii consideratio	ibidem	Lepidium Dioscoridi	295.34
Lapis bezabar Arabum	609.59	lepidij consideratio	295.39
lapidis bezabar historia, & uires	ibidem	lepidium Plinij	295.42
lapis in felle bubulo repertus, & eius uires	ibidem	Leptocarya Dioscoridi	148.38
213.37 Lappa minor	519.502	Lepus marinus Dioscoridi	172.10
Larix arbor, & eius historia	71.7	leporis marini consideratio	172.38
larix agaricum profert	71.26	Leporis marini hausti note, & curatio Dioscoridi	675.40
larigna resina	71.37	leporis marini sumpti indicia	675.50
Lasus Dioscoridi	375.46	eius noxae remedia	677.2
laseris consideratio	376.16	Lepus terrestris Dioscoridi	172.11
laseris uires ex Galeno	377.26	leporis terrestris consideratio	172.45
Laserpitium Dioscoridi	375.40	leporis ubi candidi	172.51
laserpitij consideratio	376.16	leporis ubi bina habent iecinora	173.7
laserpitij historia ex Theophrasto	376.47	leporis facultates	173.12
laserpitij uires ex Galeno	377.21	Leporinum coagulum Dioscoridi	208.30
Lassulata	341.2	Leucacantha Dioscoridi	325.3
Lathyrus Dioscoridi	543.30	leucacanthae consideratio	325.10
lathyrus consideratio	543.50	leucacanthae uires ex Galeno	325.55
lathyrus uires ex Actuatio	543.55	Leucas Dioscoridi	388.7
lathyrus uires ex Galeno	543.60	leucadis consideratio	388.10
lathyrus noxa, & curatio	679.36	Leucoion Dioscoridi	407.40
Lauanda uulgo quae fuit Lauendula	25.29	leucoij consideratio	407.51
Lauer Dioscoridi	253.3	leucoij uires ex Galeno	408.9
laueris consideratio	253.12	Libri explodendi	331
laueris uires ex Galeno	253.33	Libysticum Galeno ligusticum	353.3
Laurus Dioscoridi	84.48	Lichenes equorum Dioscoridi	185.24
lauri baccae Dioscoridi	84.52	lichenum equorum uires	185.43
lauri historia	85.1	Lichen Dioscoridi	146.238
laurini olei consideratio	53.20	lichenis consideratio	146.245
laurini olei uires	53.23	lichenis genera ex Plinio	146.253
laurus lapidea	85.26	lichenis uires ex Galeno	146.314
lauri uires ex Galeno	85.31	Lignum aloes	43.57
laurus ex se ignem producit	85.41	Lignorum marcor Dioscoridi	22.59
Laurus Alexandrina Dioscoridi	524.48	lignorum marcoris uires	22.53
lauri Alexandrinae consideratio	524.54	Ligusticum Dioscoridi	352.36
lauri Alexandrinae uires ex Galeno	525.10	ligustici consideratio	353.3
Ledon Dioscoridi	106.25	ligustici, seu libystici uires ex Galeno	353.8
Lemnia terra Dioscoridi	607.45	Ligustrum Dioscoridi	103.3
lemniae terrae consideratio	607.52	ligustri consideratio	103.16
lemniae terrae historia	ibidem	ligustri uires ex Galeno	103.48
lemniae terrae uires	608.43	Lilium Dioscoridi	389.3
lemniae terrae adulterandae fraus detecta	609.23	lilij consideratio	389.23
Lens Dioscoridi	236.33	lilij historia ex Plinio	389.32
lentium uires ex Galeno	236.34	Lilia quomodo in totum annum uiridia seruantur	389.49
Lens palustris Dioscoridi	489.36	lilia quomodo diuersis temporibus florent	389.52
lentis palustris consideratio	489.57	lilia alba quomodo purpurea fiant	389.45
lentis palustris uires ex Galeno	489.59	liliorum uires ex Galeno	390.1
Lentiscini olei parandi ratio	53.32	Lilium conuallium non est hemerocallis	406.59
Lentiscus Dioscoridi	72.27	lilij conuallij historia, & uires	407.8
lentiscina resina Dioscoridi	72.43	Limonium Dioscoridi	442.55
lentiscini consideratio	72.38	limonij consideratio	443.33
lentiscini uires ex Galeno	73.15	limonij uires ex Galeno	443.36
Leonici errata, ac eius opiniones dilute	256.	Limonia poma	37.13
24 & 312.52 & 347.52 & 393.4 &		limoniorum pomorum aqua stillatitia quibus confrat	137.21
415.38 & 705.7			
Leontopetalon Dioscoridi	386.18		
leontopetali consideratio	386.28		



# Index.

*Linaria herba* 321.50  
*Lingua ceruina est phyllitis* 392.50  
*lingua ceruina non est hemionitis* 393.6  
*Lingua serpentina* 389.49  
*lingue serpentine descriptio, et uires* ibidem  
*Linoxostis Dioscoridi* 559.41  
*linxostis consideratio* 559.54  
*Linum Dioscoridi* 232.48  
*lini consideratio* 232.59  
*lini uires ex Galeno* 233.23  
*lini seminis oleum, et eius uires* 233.2  
*Lithargyros Dioscoridi* 597.52  
*lithargyri consideratio* 598.38  
*lithargyri uires ex Galeno* 598.55  
*Lithotolla Dioscoridi* 636.19  
*Lithospermon Dioscoridi* 429.57  
*lithospermi consideratio* 426.40  
*lithospermi historia ex Plinio* 426.53  
*Lixuij saponis noxa, et curatio* 676.28  
*Locuste Dioscoridi* 189.29  
*locustarum consideratio* 189.41  
*locustarum ingens numerus quando Italiam inuasit* 189.53  
*locuste in cibis* 189.56  
*Lolium Dioscoridi* 231.22  
*loliij consideratio* 231.22  
*loliij uires ex Galeno* 231.47  
*Lonchitis Dioscoridi* 422.2  
*lonchitis altera Dioscoridi* 422.14  
*lonchitis consideratio* 422.20  
*lonchitis uires ex Galeno* 422.34  
*Loniceri lapsus, uide Adami Loniceri errata*  
*Lora Dioscoridi* 575.23  
*lorae parandae ratio ex Galeno* 575.33  
*Lotus arbor Dioscoridi* 139.47  
*loti arboris consideratio* 139.52  
*lotus Italica* 140.21  
*loti arboris uires ex Galeno* 140.36  
*Lotus Aegyptia Dioscoridi* 506.47  
*loti Aegyptie historia ex Theophrasto* 506.54  
*loti Aegyptie mentio ex Galeno* 507.12  
*Lotus sylvestris Dioscoridi* 504.59  
*lotus urbana Dioscoridi* 504.55  
*loti sylvestris, et urbanae consideratio* 505.5  
*loti herbae utriusque uires ex Galeno* 505.28  
*Lunaria minor* 416.5  
*lunariae minoris uires* 416.10  
*Lupinus Dioscoridi* 239.4  
*lupinorum consideratio* 239.26  
*lupinorum facultates* 239.32  
*Luporum fimum* 239.60  
*Lupus salictarius* 523.30  
*lupali historia, et uires ex Mesue* 523.33  
*Lychnis coronaria Dioscoridi* 388.23  
*lychnis sylvestris Dioscoridi* 388.25  
*lychnidis utriusque consideratio* 388.31  
*lychnidis facultas ex Galeno* 388.59  
*Lygum Dioscoridi* 112.32  
*lycij consideratio* 113.7  
*lycij uires ex Galeno* 113.19

*Lycopsis Dioscoridi* 447.53  
*lycopsis consideratio* 447.59  
*lycopsis uires ex Galeno* 447.55  
*Lygos Dioscoridi* 115.27  
*Lyncurium ex urina lyncis coalescere, uanum putatur* 217.4  
*Lyfimachia Dioscoridi* 432.49  
*lyfimachiae consideratio* 432.56  
*lyfimachiae uires ex Galeno* 433.13  
**M** *MACER Dioscoridi* 91.9  
*Maceris consideratio* 91.11  
*macerem non esse officinarum macem* 91.14.30  
*maceris facultates ex Galeno* 91.25  
*Machs Arabum consideratio* 247.44  
*Mene Dioscoridi* 179.55  
*menarum, et finaridum consideratio* 179.58  
*Magnes lapis Dioscoridi* 631.34  
*magnetis lapidis historia* 631.38  
*magnetis lapidis uires ex Galeno* 632.6  
*magnetis uenefica uis, et remedia* 674.60  
*Magularis Dioscoridi* 345.51  
*Mala insana* 478.56  
*malorum insanorum uires* 479.6  
*Mala aurea Italicae* 479.12  
*Malabathrum Dioscoridi* 30.13  
*malabathri consideratio* 30.25  
*malabathri uice quid supponendum* 30.40  
*malabathri uires ex Asicenna* 30.41  
*Malicorium Dioscoridi* 127.59  
*Malua Dioscoridi* 245.14  
*maluae consideratio* 245.32  
*malua mirae magnitudinis* 245.44  
*maluae uires ex Galeno* 245.52  
*Malum Dioscoridi* 131.52  
*malorum consideratio* 134.4  
*malorum genera plura* ibidem  
*Mala Armeniaca Dioscoridi* 133.53  
*malum cotoneum Dioscoridi* 131.53  
*malum dulce Dioscoridi* 133.43  
*malum Medicum Dioscoridi* 133.55  
*malorum Medicorum consideratio* 136.6  
*malum orbiculatum, siue Epiroticum Dioscoridi* 133.46  
*malum Persicum Dioscoridi* 133.50  
*malum Punicum Dioscoridi* 127.38  
*mali Punici consideratio* 128.6  
*mali Punici genera tria* 128.9  
*mala Punica acris quomodo dulcia fiant* 128.14  
*mala Punica quomodo diutius incorrupta seruentur* 128.20  
*Manardi Ferrariensis errata, ac eius opiniones confutata* 24.25. 63.55. 111.19. 128.50. 219.53. 225.26. 273.14. 295.47. 346.55. 393.4. 456.48. 508.26. 533.20. 589.15. 600.49. 607.27. 667.59. 673.34  
*Mandragoras Dioscoridi* 477.49  
*mandragorae utriusque consideratio* 478.27  
 \*\* 3 mandragorae

# Index.

mandragora humanam formam referentes, fascitie		Medium Dioscoridi	444.7
478.30		medij consideratio	444.12
mandragora vires ex Galeno	479.13	medij vires ex Galeno	444.16
mandragora sumptæ signa, et curatio Dioscoridi		Medulla Dioscoridi	212.30
665.50		medulle vires ex Galeno	212.40
mandragora noxia vis	665.57	medulle in cibis facultas	212.55
mandragora noxæ curatio	666.3	Mel Dioscoridi	217.35
Manna thuris Dioscoridi	666.6	mellis consideratio	218.18
manne thuris consideratio	672.3	Mel Heracleoticum uenenosum	218.32
Manna celestis historia, et genera	67.20	mellis Heracleiæ uenenum, et eius remedia Dioscoridi	
manne celestis Mauritanis duplex	67.34	1. 661.58	
manne historia ex Theophrasto, Galeno, et Plinio		mellis Heracleotici noxa, et curatio	662.1
67.47. et deinde		mellis genera non rosida	218.35
manna in comitatu Goritienſi, et Foro Iulij quo tempo-		Mel frugum	219.35
re abundantissima reperta sit	68.4	Melanteria Dioscoridi	212.53
manna secto fraxini cortice manans	68.19	melanteriæ consideratio	213.21
manne celestis temperamentum, et vires	68.33	Melanthium Dioscoridi	374.56
Marcelli Secretarij Florentini lapsus, et opiniones re-		melanthij consideratio	375.1
iectæ	102.44. et 135.50. et 153.4. et	melanthium sylvestre	375.12
173.49. et 227.3. et 237.51. et 278.32. et		melanthij vires ex Galeno	375.28
333.4. et 572.28. et 591.49.		melanthinum oleum	52.26
Marcor. lignorum Dioscoridi	92.50	Melia terra Dioscoridi	638.37
Margaritarum historia	159.14	melia consideratio	638.45
margaritarum vires	159.41	Melica consideratio, et usus	230.16
Marium, et fluminum litora, quæ plantæ ament		Melilotus Dioscoridi	345.49
9.24		meliloti consideratio	345.58
Marrubium Dioscoridi	391.41	meliloti uulgaris usus illegitimus	345.60
marrubij consideratio	392.1	meliloti vires ex Galeno	346.5
marrubij historia ex Theophrasto	392.2	Melimela Dioscoridi	233.43
marrubij vires ex Galeno	392.26	Melini consideratio	235.23
Marrubium nigrum Dioscoridi	396.24	Melissophyllon Dioscoridi	399.53
marrubij nigri consideratio	399.35	melissophylli consideratio	391.5
Maragon, lilij genus	399.54	melissophylli vires ex Arabibus	391.11
Marum Dioscoridi	346.10	melissophylli facultates ex Galeno	391.29
mari consideratio	345.15	Melites lapis Dioscoridi	632.26
marimentio ex Galeno	ibidem	melites lapidis historia	632.29
marum Italie peregrinum	346.35	Melomeli Dioscoridi	581.41
Mastiche Dioscoridi	72.45	Memphites lapis Dioscoridi	634.29
mastiche consideratio	73.10	memphite lapidis consideratio	634.40
mastiche vires ex Galeno	73.22	Mentha Dioscoridi	339.42
mastichini parandi ratio, et vires	53.55	menthe consideratio	339.53
Matricariam non esse artemisiæ genus	399.39	menthe vires ex Galeno	339.60
Matrifylua	449.22	mentha sylvestris Galeno calamintha dicitur	340.36
Matthæi Syluatici errata	249.14. et 320.11. et	Mentha Græca	340.55
439.22. et 443.47. et 445.43.		mentha Græcæ vires	341.11
Meconium Dioscoridi	470.2	Menthastrum Dioscoridi	339.49
meconij mentio	470.51	Meon Dioscoridi	20.51
meconij sumpti noxa, et remedia Dioscoridi		mei consideratio	21.1
666.48		mei vires ex Galeno	21.22
meconij uenefica natura	667.1	Mercurialis Dioscoridi	559.40
meconij noxæ curatio	657.17	mercurialis consideratio	559.54
Medica herba Dioscoridi	273.44	mercurialis historia, et vires ex Plinio	559.69
medicæ herbe consideratio	273.49	mercurialis vires ex Galeno	560.47
Medica mala Dioscoridi	233.55	Mergi tecur Dioscoridi	183.57
medicorum. malorum consideratio	236.6	Mesuis errata	315.31. et
Medicamenta adulterabantur etiam Galeni tempore		352.11	
255.0.		Messpilus Dioscoridi	138.48
medicamenta simplicia uenenis aduersantia	651.25	messilorum consideratio	138.55
medicamenta composita uenenis aduersantia	651.	messilys altera	239.21
42		messilorum vires ex Galeno	239.39
		Metallorum	

# Index.

*Metallorum differentia plures* 366.39  
*Metopium unguentum Dioscoridi* 39.36  
*Milium Dioscoridi* 229.36  
*milij uires ex Galeno* 229.41  
*milium Indicum Plinio quid* 230.27  
*milium Solis* 240.40  
*Millefolium Dioscoridi* 307.47  
*millefolij consideratio* 307.52  
*millefolij, seu myriophylli uires ex Galeno* 307.59  
*Millemorbia herba* 494.46  
*Millepeda Dioscoridi* 182.37  
*millepedarum consideratio* 182.48  
*Misy Dioscoridi* 612.45  
*misyos consideratio* 613.15  
*misyos historia, et uires ex Galeno* 613.40  
*Mituli Dioscoridi* 159.46  
*mitulorum consideratio* 159.55  
*Moly Dioscoridi* 350.35  
*moly consideratio, et historia ex Theophrasto, et Plinio* 350.39  
*moly, seu myles uires ex Galeno* 350.52  
*Molybdena Dioscoridi* 596.58  
*molybdene consideratio* 597.7  
*molybdene uires ex Galeno* 597.27  
*Molybdoides Dioscoridi* 595.18  
*molybdoidis consideratio* 595.36  
*Momordica* 403.25. et 555.59. et 556.21  
*Monachorum, qui Mesuem commentati sunt, lapsus, atque opiniones explose* 20.43. et 22.59. et 22.43. et 37.40. et 46.20. et 68.11. et 91.2. et 98.5. et 102.45. et 124.24. et 154.1. et 317.60. et 342.36. et 348.56. et 356.22. et 358.5. et 363.22. et 400.18. et 410.60. et 427.55. et 428.33. et 460.27. et 488.18. et 551.49. et 622.31. et 632.47.  
*Montes que plantae ament* 7.50.  
*Morochibus lapis Dioscoridi* 632.40  
*morochibi lapidis consideratio, et uires ex Galeno* 632.47.  
*Morsus diaboli descriptio, et uires* 300.14  
*Morus arbor Dioscoridi* 149.3  
*mori arboris consideratio* 149.30  
*mori arboris, et fructus uires ex Galeno* 149.38  
*Moschi odorati historia* 426.0  
*moschi odorati uires* 432.16  
*Mullus piscis Dioscoridi* 174.48  
*mulli piscis consideratio* 174.51  
*mulli piscis facultas ex Galeno* 174.55  
*Mulsium Dioscoridi* 576.8  
*Mumia sepulcrorum* 72.40  
*mumiae consideratio* 72.23  
*mumiae uires* 79.49  
*Muria Dioscoridi* 620.3  
*Mures Dioscoridi* 202.55  
*murium consideratio* 202.58  
*murium mirum* 203.22  
*murium montanorum consideratio* 203.43  
*Mus araneus Dioscoridi* 129.29  
*muris aranei consideratio* 120.45  
*muris aranei morsus nota, et remedia Dioscoridi* 699.36

*muris aranei morsus signa* 699.36  
*muris aranei morsus curatio* 699.41  
*Muris auricula Dioscoridi* 304.3  
*muris auricula consideratio* 304.13  
*Muse arboris, et fructus consideratio, et historia* 126.9  
*Muscus Dioscoridi* 42.3  
*musci arborei consideratio* 42.12  
*musci arborei uires ex Galeno, et alijs* 42.40  
*Muscus marinus Dioscoridi* 496.35  
*musci marini consideratio* 496.39  
*musci marini uires* 496.48  
*Mustela Dioscoridi* 177.41  
*mustela consideratio* 177.48  
*mustela natura, et uis* 178.4  
*Myagron Dioscoridi* 508.46  
*myagri consideratio* 508.50  
*myagri uires ex Galeno* 508.57  
*Myle, moly Galeno* 350.50  
*Myrica Dioscoridi* 94.51  
*myricae consideratio* 95.1  
*myricae uires ex Galeno* 95.31  
*Myrobalanorum Arabicorum genera* 336.7  
*myrobalanorum omnium uires ex Mesue* 336.34  
*Myrrha Dioscoridi* 61.15  
*myrrha Baetica Dioscoridi* 61.40  
*myrrha consideratio* 61.43  
*myrrha officinarum illegitima* 61.44  
*myrrha historia ex Plinio* 61.18  
*myrrha historia ex Theophrasto* 62.32  
*myrrha arboris historia* 62.21.36  
*myrrha uires ex Galeno* 62.58  
*myrrha uice quid supponendum* 63.6  
*myrrha Baetica mentio* 63.12  
*Myrrhis Dioscoridi* 508.3  
*myrrhidis consideratio* 508.12  
*myrrhidis uires ex Galeno* 508.40  
*Myrteum oleum, et eius uires* 52.42  
*myrtei olei parandi ratio* 52.60  
*Myrtidani Dioscoridi* 129.12  
*myrtidani consideratio* 129.45  
*Myrtus sativa Dioscoridi* 128.47  
*myrti consideratio* 129.19  
*myrtus exotica, et Tarentina* 129.46  
*myrti usus* 129.48  
*myrti uires ex Galeno* 129.57  
*Myrtus sylvestris Dioscoridi* 523.57  
*myrti sylvestris consideratio* 524.8  
*Myxa, et myxaria quid* 142.55  
*myxorum consideratio* ibidem

## N

*Naphtha Dioscoridi* 78.11  
*Naphthae consideratio* 79.12  
*Napelli consideratio, et historia* 481.18  
*napelli uis lethalis* 481.27  
*napelli uenenum, eiusque remedia* 668.48  
*Napus Dioscoridi* 240.58  
*napi consideratio* 241.1  
*Narcaphton Dioscoridi* 44.57  
*narcapthi consideratio* 44.59  
*Narcissus*



# Index.

Narcissus Dioscoridi	337.14	
narcissi historia ex Theophrasto	337.31	
narcissi uires ex Galeno	337.48	
Nardum Indicum Dioscoridi	23.30	
nardum Syriacum Dioscoridi	ibidem	
nardi Indicæ consideratio	24.4	
nardi Syriacæ consideratio	ibidem	
nardi Indicæ uires ex Galeno	25.39	
nardum Celticum Dioscoridi	25.47	
nardi Celtici consideratio	26.1	
nardi Celtici uires ex Galeno	26.54	
Nardus Italica Tabernaemontani	25.28	
nardi Italicæ uires	25.34	
Nardum montanum Dioscoridi	27.2	
nardi montani consideratio	27.6	
nardi montani lectio in Dioscoride deprauata	27.8.29.	
nardi montani uires ex Galeno	27.27	
Nardinum unguentum Dioscoridi	60.23	
Nasturtium Dioscoridi	280.17	
nasturtij consideratio	280.32	
nasturtij uires ex Galeno	280.40	
Natrix, et eius ictus curatio Dioscoridi	705.13	
natricis historia, morsus signa, et remedia	705.20	
Naxius lapis Dioscoridi	636.58	
naxij lapidis consideratio	637.6	
Nepeta Dioscoridi	341.31	
nepete mentio	342.6	
Nerion Dioscoridi	484.22	
nerij consideratio	484.36	
nerij uires ex Galeno	484.51	
nerij malefica natura	664.4	
nerij sumpti noxæ curatio	664.18	
Nitrum Dioscoridi	621.39	
nitri spuma Dioscoridi	621.41	
nitri, et eius spumæ consideratio	621.56	
nitri, et aphronitri uires ex Galeno	622.34	
Numularia herba	416.21	
numulariæ uires	ibidem	
Nux auellana Dioscoridi	148.38	
nucis auellaneæ consideratio	148.48	
nucis auellaneæ uires ex Galeno	148.60	
Nux Indica, et eius historia, et consideratio	147.26	
nucis Indicæ uires	147.34	
nucis Indicæ oleum, et eius uires	147.36	
Nux Iuglans Dioscoridi	145.36	
nucum Iuglandium consideratio	146.57	
nucum Iuglandium uires ex Galeno	147.4	
Nux metella, et eius historia	148.3. et dein.	
nucis metelle sumptæ noxæ, et eius curatio	666.32. et deinde	
Nux myristica, et eius historia	147.41	
nucis myristicæ uires	147.51	
Nux pinea Dioscoridi	69.48	
nucleorum pineorum uires	146.20	
Nux uonica, et eius historia	148.3	
Nymphaea Dioscoridi	413.7	
nymphaea altera	413.20	
nymphaeæ consideratio	413.41	
nymphaeæ uires ex Galeno	413.43	
OCHRA Dioscoridi	602.55	
Ochrae consideratio	603.1	
Ochros legumen	228.38	
Ocimum Dioscoridi	449.2	
ocimastri consideratio	449.10	
ocimastri uires ex Galeno	449.25	
Ocimum Dioscoridi	268.48	
ocimi consideratio	268.59	
ocimi degeneratio	269.29	
ocimi uires ex Galeno	269.35	
ocimi ab ocymo differentia	269.42	
Oenanthe herba Dioscoridi	405.11	
oenanthes herbae consideratio	405.16	
Oenanthe uitis sylvestris Dioscoridi	572.3	
oenanthes uitis sylvestris consideratio	572.14	
Oesypum Dioscoridi	207.60	
oesypimentio	208.25	
Officinarum lapsus, et abusus	316.27. et 6.55.	
et 52.42. et 492.45		
Olea sylvestris Dioscoridi	117.46	
oleæ sylvestris consideratio	118.33	
oleæ, et quercus odium	118.33	
Oleæ Aethiopica lacryma Dioscoridi	118.15	
oleæ Aethiopica lacrymæ consideratio	118.57	
Olei uires Dioscoridi	48.51	
olei consideratio	49.33	
olei usus apud ueteres qualis	49.38	
olei facultates ex Galeno	49.54	
olei omnis generis parandi ratio	52.50	
Oleum amygdalinum Dioscoridi	50.58	
olei amygdalini parandi ratio	51.11	
olei amygdalini uires	51.27	
Oleum balaninum Dioscoridi	51.36	
olei balanini consideratio	51.40	
olei balanini facultates	51.43	
Oleum caryinum Dioscoridi	51.39	
olei caryini, siue è nucibus Iuglandibus	51.52	
oleum cicinum Dioscoridi	50.38	
olei cicini consideratio	50.49	
oleum cnicinum Dioscoridi	52.3	
olei cnicini consideratio	52.23	
oleum Gnidinum Dioscoridi	52.3	
olei Gnidini consideratio	52.20	
Oleum hyoscyaminum Dioscoridi	51.59	
olei hyoscyamini uires	52.10	
olei hyoscyamini parandi ratio	52.17	
Oleum laurinum Dioscoridi	53.12	
olei laurini consideratio, et uires	53.20	
oleum lentiscinum Dioscoridi	53.28	
olei lentiscini parandi ratio, et uires	53.52	
Oleum mastichinum Dioscoridi	53.52	
olei mastichini parandi ratio	53.55	
oleum melanthinum Dioscoridi	52.6	
olei melanthini consideratio	52.26	
oleum melinum Dioscoridi	133.35	
oleum myrteum Dioscoridi	52.32	
olei myrtei consideratio	52.42	
olei myrtei parandi ratio	52.60	
Oleum ex ouorum luteis	188.15	
oleum		

## Index.

oleum ex lini semine, & eius uires	233.2
Oleum cenanibinum Dioscoridi	55.28
oleum oliuæ syluestris Dioscoridi	49.5
olei oliuæ syluestris facultas ex Galeno	50.10
oleum omphacinum Dioscoridi	48.51
oleum omphacinum quomodo arte parari possit	50.2
oleum picinum Dioscoridi	76.51
Oleum raphaninum Dioscoridi	52.4
olei raphanini consideratio	52.25
Oleum sesaminum Dioscoridi	51.38
olei sesamini consideratio, & uires	51.44
oleum Sicyonium Dioscoridi	49.19
oleum sinapinum Dioscoridi	52.7
olei sinapini consideratio	52.27
oleum styracinum Dioscoridi	63.44
oleum fustinum Dioscoridi	56.50
olei fustini mentio	57.19
Oleum terebinthinum Dioscoridi	53.30
olei terebinthini consideratio, & uires	53.41
olei nostri de scorpionibus descriptio, & eius uires	54.14
Oliuarum genera plura	118.41
oliuarum uires ex Galeno	119.13
Olera quo pacto ab erucarum iniuria uindicentur	195.46
Oloschoenos Dioscoridi	462.10
Olusatrum Dioscoridi	361.52
Olyra Dioscoridi	226.58
olyræ consideratio	227.1
Omphacium Dioscoridi	572.44
omphacij consideratio	572.56
omphacij uires ex Galeno	573.3
Omphacomeli Dioscoridi	581.52
Onagra Dioscoridi	509.3
onagræ consideratio	509.8
onagræ uires ex Galeno	509.16
Onobrychis Dioscoridi	426.25
onobrychis consideratio	426.29
onobrychis uires ex Galeno	426.36
Ononis Dioscoridi	324.14
ononidis consideratio	324.28
ononidis uires ex Galeno	324.56
Onosma Dioscoridi	412.44
onosmatis consideratio	412.52
onosmatis uires ex Galeno	413.1
Opacis locis quæ plantæ latentur	9.36
Ophioglosson	289.53
Ophioscorodon Dioscoridi	277.37
ophioscorodi consideratio	278.18
Ophites lapidis Dioscoridi	635.53
opbitæ lapidis historia	635.58
ophites marmor	636.1
Opium Dioscoridi	469.42
opij facultas	470.40
opium, quo utimur, adulterinum	470.49
opij uenefica natura	667.1
opij ueneni curatio	667.17
Opobalsamum Dioscoridi	39.20
opobalsami uis ex Galeno	40.40
opobalsamum factitium	40.52

Opocalpasum Galeni quid	664.47	
opocarpasi consideratio	664.38	
Oreoselinum Dioscoridi	361.44	
oreoselini consideratio	363.8	
oreoselini uires ex Galeno	363.40	
Origanum Heracleoticum Dioscoridi	334.24	
origanum onitis Dioscoridi	335.13	
origanum sylvestre Dioscoridi	335.16	
origani historia uaria	335.42	
origani Heracleotici, & onitidis consideratio	336.10	
origani sylvestris consideratio	336.7	
origani uires ex Galeno	336.15	
Ornithogalum Dioscoridi	271.10	Garlarz
ornithogali consideratio	271.18	
Orobanche Dioscoridi	270.12	
orobanches consideratio	270.22	
orobanches facultas ex Galeno	270.46	
Oryza Dioscoridi	228.9	
oryze consideratio	228.12	
oryze facultas ex Galeno	228.16	
Osisfragus Dioscoridi	190.10	
osisfragi consideratio	190.14	
Ostracites lapis Dioscoridi	636.24	
ostracite lapidis consideratio, & uires	636.29	
Osyris Dioscoridi	521.46	
osyridis consideratio	521.50	
osyridis uires ex Galeno	522.9	
Othonna Dioscoridi	303.35	
othonne consideratio	303.46	
Ouorum natura Dioscoridi	186.60	
oui candidum Dioscoridi	187.3	
ouorum consideratio	187.25	
ouorum partes, & coctura uaria	187.36	
ouorum uires ex Galeno	187.50	
ouorum lutei oleum	188.15	
oua testudinum	188.28	
Oxalis Dioscoridi	242.59	
oxalidis consideratio	244.5	
Oxalmæ Dioscoridi	579.53	
Oxycedri consideratio	83.57	
Oxylapathum Dioscoridi	242.57	
oxylapathi consideratio	243.59	
Oxymel Dioscoridi	579.24	
oxymelitis confectio triplex Galeno	579.30	
oxymelitis confectio ex Mesue	579.40	
Oxys Plinio	395.4	
P		
Pæderota, acanithus Dioscoridi	323.22	
Pæonia Dioscoridi descripta	419.7	
pæonie consideratio	419.32	
pæonie uires ex Galeno	419.36	
Paliurus Dioscoridi	98.38	
paliuri consideratio	98.44	
paliurus diuersi generis apud autores	ibidem	
paliuri uires ex Galeno	99.36	
Palma Dioscoridi	125.3	
palme consideratio	125.45	
palmarum uires ex Galeno	127.3	
palmularum facultas ex Galeno	127.14	
Palmaelate Dioscoridi	125.34	
palma		

# Index

palma elate quæ pars in palma	226.51	Pedicularis herba Dioscoridi	531.40
palma elate Galeno duplex	226.55	Pelecimon Dioscoridi	412.16
palmae Indicæ uinum fundentes	226.28	pelecini consideratio	412.25
palmae Thebaicæ	225.16	Peplis Dioscoridi Pentaphyllon 455	544.21
Palmae Christi consideratio	410.42	peplos. Dioscoridi	544.7
palmae Christi genera duo	410.44	pepli, & peplidis consideratio	544.30
palmae Christi uires	410.49	pepli, & peplidis uires ex Galeno	544.36
Panaces Asclepij Dioscoridi	351.51	Pepo Dioscoridi	262.46
panaces Chironium Dioscoridi	352.3	peponum, & melopeponum consideratio	263.33
panaces Heracleum Dioscoridi	351.2	peponum uires ex Galeno	264.7
panacis omnis generis consideratio	352.6	Perichymenon Dioscoridi Persopata 428	440.4
panacis cuiusque uires ex Galeno	352.19	perichymeni consideratio Pera pastoris 281	440.21
panacis lacrymæ facultas ex Mesue	352.30	perichymeni uires ex Galeno	440.46
Pancration Dioscoridi	293.15	Peristereon, uerbenacæ Dioscoridi	456.40
pancratij consideratio	293.26	Persea arbor Dioscoridi	152.57
Panicum Dioscoridi	230.2	persea arboris consideratio	153.2
panici uires ex Galeno	230.6	persea arboris mentio, & uires ex Galeno	153.24
Panis optimi conficiendi ratio	223.53	Persica mala Dioscoridi Persicaria 285	133.50
panis hordeaceus (Panicum 295)	225.29	persicorum malorum consideratio	134.58
panis siligineus omnium syncerissimus	227.16	Personata Dioscoridi	501.58
Pannum in larice nascens	71.49	personatæ consideratio	502.5
Papauer corniculatum Dioscoridi	471.26	personatæ uires ex Galeno	502.35
papaueris corniculati consideratio	471.55	personata, Plinio persolata	502.19
papaueris corniculati uires ex Galeno	472.14	Petasites Dioscoridi Pes leonis 510	502.48
papaueris corniculati noxa, & auxilia Dioscoridi	666.59	petasitis consideratio Peruinca 455.45.	502.52
Papauer erraticum Dioscoridi	468.46	petasitis uires ex Galeno	502.58
papaueris erratici consideratio	470.9	Petri Criniti erratum	124.34
papauer satium Dioscoridi	468.58	Petroselinum Dioscoridi	361.48
papaueris satui consideratio	470.19	petroselini consideratio	363.21
papaueris lacrymæ facultas	470.40	petroselini uires ex Galeno	363.45
papauerum uires ex Galeno	470.51	Pettimborsa	311.43
Papauer spumeum Dioscoridi	471.45	Peucedanum Dioscoridi	373.14
papaueris spumei consideratio	472.4	peucedani consideratio	373.47
Papyrus Dioscoridi	94.7	peucedanum officinarum supposititium	374.1
papyri consideratio	94.13	peucedani uires ex Galeno	374.7
papyri conficiendi ratio	94.23	Phalangium herba Dioscoridi	393.24
papyri nouum genus	94.29	phalangij herbae consideratio	393.33
papyri uires ex Galeno	94.39	phalangij herbae uires ex Galeno	393.42
Paralios tithymalus Dioscoridi	541.2	Phalangiorum animalium consideratio, & genera	398.30.38.52
Parietaria herba	488.47	phalangiorum morsus notæ, & curatio Dioscoridi	695.18
Paronychia Dioscoridi	463.24	phalangiorum genera ex Aëtio	695.32
paronychiæ consideratio	463.28	phalangiorum genera, & morsus notæ ex Nicandro	695.46
paronychiæ uires ex Galeno	463.35	phalangiorum morsus signa, & curatio	696.13
Parthenium Dioscoridi	417.38	Phalaris Dioscoridi	420.3
parthenij consideratio	417.49	phalaridis consideratio	420.44
Pastinum Dioscoridi	573.22	phalaridis uires ex Galeno	421.2
Pastinaca herba Dioscoridi	353.43	Pharicon, & eius ueneni notæ, & curatio Dioscoridi	667.29
pastinacæ herbae consideratio	353.52	pharici ueneni consideratio	667.39
pastinacæ uires ex Galeno	354.7	Phasioli Dioscoridi	237.20
Pastinaca marina Dioscoridi	173.22	phasiolorum consideratio	237.40
pastinacæ piscis consideratio	173.41	Phellodrys arbor quæ	221.23
pastinacæ piscis, & eius radij uires	173.55	Phillyrea Dioscoridi	103.57
pastinacæ marine ictus notæ, & eius curatio Dioscoridi	698.26	phillyreæ consideratio	104.1
pastinacæ marine ictus signa	698.35	Phoenix Dioscoridi	457.39
pastinacæ marine ictus remedia	698.44	phoenicis consideratio	457.48
Pauli Iouij errata, ac eius opiniones refutata	155.50. & 159.55. & 178.57	Phrygius lapis Dioscoridi	627.29
Pecten Veneris	1267.3	phrygij	



# Index.

*phrygij lapidis consideratio* 27.37  
*phrygij lapidis uires ex Galeno* 27.40  
*Phu Dioscoridi representatum* 28.59  
*phu consid.* 29.7 *et uires ex Galeno* 29.21  
*Phycus marinus Dioscoridi* 496.53  
*Phyllitis Dioscoridi* 392.42  
*phyllitidis consideratio* 392.42  
*phyllitidis uires ex Galeno* 393.16  
*Phyllon Dioscoridi* 408.36  
*phylli consideratio* 408.42  
*phylli mentio ex Theophrasto* 408.56  
*Phyteuma Dioscoridi* 513.37  
*phyteumatis consideratio* 513.41  
*Picea arbor Dioscoridi* 69.34  
*picæ consideratio, et historia* 71.53  
*Picinum oleum Dioscoridi* 76.51  
*picis liquida fuligo Dioscoridi* 76.59  
*Picis fuliginis consideratio* 77.18  
*Pilosella descriptio, et uires* 438.53  
*Pimpinella genera, et uires* 461.12  
*Pineæ nuces Dioscoridi* 69.48  
*pinæ nuclei* 846.26  
*Pinorum cruce Dioscoridi* 156.8  
*pinorum erucarum historia* 156.36  
*pinorum erucarum haustarum notæ, et remedia Dioscoridi* 157.48  
*pinorum erucarum uenenum, et curatio* 158.4  
*Pinus Dioscoridi* 69.34  
*pinus historia, et genera* 69.58  
*Piper Dioscoridi* 282.50  
*piperis consideratio* 283.14  
*piperis planta in Italia* 283.38  
*piperis et plantæ uariæ* 283.42  
*piperis uires ex Galeno* 283.43  
*piper Indicum* *Piperitis* 295 23.3  
*Piscium ius Dioscoridi* 181.51  
*Pissaphaltos Dioscoridi* 78.6  
*pissaphalti consideratio* 78.58  
*Pisselæon Dioscoridi* 76.51  
*Pistacia Dioscoridi* 145.51  
*pistaciorum consideratio* 145.54  
*pistaciorum uires ex Galeno* 145.58  
*Pistacia sylvestria quid* 146.13  
*Pityusa Dioscoridi* *Pistoliachia* 313.20 542.50  
*pityuse consideratio* 543.1  
*pityuse uires ex Galeno* 543.24  
*Pix liquida Dioscoridi* 76.38  
*pix sicca Dioscoridi* 77.8  
*picis conficiendæ ratio* 77.23  
*picis facultates ex Galeno* 77.34  
*Plantago Dioscoridi* 252.45  
*plantaginis consideratio, et genera* 252.40  
*plantaginis uires ex Galeno* 252.46  
*Plantæ quæ colligi postulant, dum florent* 6.46  
*plantarum degeneratio* 8.46  
*plantas meliorescere cœli clemētia, et loci amicitia* 9.2  
*plantarum situs naturales* 9.7  
*plantarum in radicibus uarietas* 10.6  
*plantæ pro locorum ac climatum differentia, facultates uariant* 318.24

*Platanus Dioscoridi* 86.3  
*platani consid.* 85.10. *eius uires ex Gal.* 86.38  
*Platearij in capbura error* 73.53  
*Plinij lapsus, et sententiæ non probatæ* 18.22. *et* 24.60. *et* 70.26.44. 59. *et* 71.18. *et* 87.12. *et* 88.54. *et* 92.25. *et* 104.39. *et* 106.5. 57. *et* 126.57. *et* 135.47. *et* 159.35. *et* 169.39. *et* 170.14. *et* 190.36. *et* 192.44. *et* 253.25. *et* 283.22. *et* 312.42. *et* 314.16. *et* 315.36. *et* 335.51. *et* 339.26. *et* 392.30. *et* 396.51. *et* 398.32. *et* 399.33. *et* 405.3. *et* 412.4. *et* 412.29. *et* 428.26. *et* 448.45. *et* 472.7. *et* 515.23. *et* 517.59. *et* 522.6. *et* 553.28. *et* 564.22. *et* 591.45. *et* 603.59. *et* 630.48. *et* 634.48.  
*Plinius à Brasauoli impugnatione uindicatur.* 27.55  
*Plinius à Dioscoride in malabathro dissentit* 30.32  
*Plinius in colligendo balsamo à Theophrasto, et Dioscoride discordat* 48.15  
*Plinius in personata defenditur* 502.22  
*Plumbago Dioscoridi* 596.53  
*plumbaginis consideratio* 597.7  
*Plumbum elotum Dioscoridi* 594.39  
*plumbum ustum Dioscoridi* 594.55  
*plumbi recrementum Dioscoridi* 595.9  
*plumbi scorix consideratio* 595.21  
*plumbi facultates ex Galeno* 595.42  
*plumbi scobis noxa, et curatio* 674.43  
*Pnigitis terra Dioscoridi* 638.22  
*Polemonia Dioscoridi* 436.49  
*polemoniæ consid.* 436.37. *eius uires ex Gal.* 436.47  
*Polentæ consideratio* 225.32  
*Polion Dioscoridi* 396.33  
*polij consideratio* 396.41  
*polij uires ex Galeno* 396.55  
*Polycnemon Dioscoridi* 385.42  
*polycnemi consideratio* 385.47  
*polycnemi uires ex Galeno* 385.52  
*Polygala Dioscoridi* 322.37  
*polygalæ consideratio* 322.40  
*Polygonaton Dioscoridi* 434.23  
*polygonati consideratio* 434.33  
*polygonati uires ex Galeno* 434.55  
*Polygonon Dioscoridi* 433.51  
*polygoni utriusque consideratio* 433.4  
*polygoni utriusque uires ex Galeno* 433.7  
*Polypi piscis mira magnitudo* 174.31  
*Polypodium Dioscoridi* 557.43  
*polypodij consideratio* 557.52  
*polypodij uires ex Galeno, et Actuarius* 558.36  
*Pomate conficiendæ ratio* 212.7  
*Pompholyx Dioscoridi* 589.12  
*pompholygis consideratio* 589.10  
*pompholygis, et spodij historia ex Galeno* 589.57  
*pompholygis uires ex Galeno* 590.6  
*Populus alba Dioscoridi* 88.34  
*populus nigra Dioscoridi* 88.39  
*populi utriusque consideratio* 88.45  
*populi lacrymam non esse succinum* 89.13  
*populnei unguenti examinatio* 89.1  
*poterilla succiniferina* 255 *Porrium*

# Index.

Porrum capitatum Dioscoridi	275.3	Pyrethrum Dioscoridi	369.46
porri consideratio	275.27	pyrethri consideratio	369.56
porri facultates ex Galeno	275.36	pyrethri uires ex Galeno	370.10
porrum quo mangonio capitatum fiat	275.34	Pyrites lapis Dioscoridi	628.25
porri agrestis consideratio	275.51	pyrite lapidis consideratio	628.35
Portulaca Dioscoridi	250.21	pyrite lapidis uires ex Gal.	628.45
portulacæ consideratio	250.39		
portulacæ uires ex Galeno	250.42		
Potamogeton Dioscoridi	497.24		
potamogetonis consideratio	497.44		
potamogetonis uires ex Galeno	497.46		
Poterion Dioscoridi	322.50		
poterij consideratio	322.57		
Pratis quæ plantæ latentur	9.42		
Præcipitati uocati facultas	689.5		
Propolis Dioscoridi	221.13		
propolis consideratio	221.18		
propolis uires ex Galeno	221.24		
Pruna, & prunus Dioscoridi	141.51		
prunorum consideratio	142.4		
prunorum uires ex Galeno	142.32		
prunorum usus	142.47		
Pseudobunion Dioscoridi	512.36		
pseudobunij consideratio	512.47		
Pseudodictamnium Dioscoridi	337.25		
pseudodictamni consideratio	338.21		
Pforicon Dioscoridi	612.33		
Psyllion Dioscoridi	473.55		
psyllij consideratio	474.9		
psyllij uires ex Galeno	474.29		
psyllij facultates ex Mesue	474.12		
psyllij epoti signa, & remedia	662.40		
psyllij ueneni noxa, & curatio	662.43		
Ptarmica Dioscoridi	286.5		
ptarmicæ consideratio	286.14		
ptarmicæ uires ex Galeno	286.22		
Ptisana consideratio	225.22		
Pulegium Dioscoridi	336.22		
pulegij consideratio	336.39		
pulegij Plinio genera duo	336.47		
pulegij uires ex Galeno	336.57		
Pulmo marinus Dioscoridi	183.11		
pulmonis marini consideratio	183.13		
Pulmones animalium Dioscoridi	183.20		
pulmonum animalium consideratio	183.39		
Pulmonariæ historia, & uires	463.2		
pulmonariæ alterius descriptio, & uires	463.8		
Pulsatilla historia, & uires	298.45		
Pumex Dioscoridi	618.58.44		
pumicks consideratio	619.6		
pumicks uires ex Galeno	619.10		
Purpura Dioscoridi	158.48		
purpurarum consideratio, & historia	158.58		
Pycnocomon Dioscoridi	548.43		
pycnocomi consideratio	548.50		
Pyra Dioscoridi	137.32		
pyrorum consideratio	137.42		
pyrorum genera	137.46		
pyrorum facultates	138.2. & inde		
Pyrafter Dioscoridi	137.35		
		Quercus Dioscoridi	119.50
		Quercus consideratio	120.12
		quercus plura alia fert præter fructum	120.19
		quercus uires ex Galeno	121.29
		quercus, & oleæ inimicitia	121.25
		Quinquefolium Dioscoridi	456.11
		quinquefolij consideratio, & genera	456.39
		quinquefolij uires ex Galeno	457.5
		Quirici Augusti lapsus	349.47
		R	
		Radicis quando effodiendæ	5.42
		Radicum optimarum notæ	5.56
		radices quò mundandæ, siccandæ, ac conseruandæ	6.2
		radices quibus in locis reponendæ	6.13
		radicum differentiæ in coloribus, & saporibus	10.34
		Radicula Dioscoridi	286.31
		radiculæ consideratio	286.40
		Radix Dioscoridi	241.8
		radicis consideratio	241.32
		Radix dulcis Dioscoridi	313.55
		radicis dulcis consid. 314.7. & uires ex Gal.	314.37
		Radix sylvestris Dioscoridi	241.26
		Rana Dioscoridi	178.12
		ranarum consideratio	178.35
		ranarum partus	178.42
		ranæ palustris sumptæ noxa, et remedia Diosc.	677.12
		ranæ palustris uenenum	677.34
		ranæ malificæ signa, & curatio	677.49
		Ranunculus Dioscoridi	295.55
		ranunculi consideratio	297.10
		ranunculi uires ex Galeno	297.36
		Raphanus Dioscoridi	241.8
		raphanus sylvestris Dioscoridi	241.26
		raphani Theophrasto plura genera	241.43
		raphani consid. 241.32. & uires ex Gal.	241.51
		Raphaninum oleum	52.25
		Rapum Dioscoridi	239.52
		rapi consideratio	240.6
		rapi uires ex Galeno	240.32
		Recocta quid, & uires	206.48
		Recrementum argenti Dioscoridi	597.38
		Remedia ad uaria medicamentorum noxiorum sympto-	
		mata	679.53
		Res quæ uenena produunt, usq; suspensæ aduersantur	
			648.56
		Resina lentiscina Dioscoridi	72.43
		resina liquida è pinu, & picea Dioscoridi	74.42
		resinæ aliæ Dioscoridi	ibidem
		resina terebinthina Dioscoridi	74.27
		resinæ terebinthinæ consideratio	75.26
		resinarum omnium consideratio	75.36
		resinarum omnium uires ex Galeno	76.4
		Resta bouis	324.34
		Rha	Rha

# Index.

Rha Dioscoridi Rabarbarum 310 307.25  
 Rhannus Dioscoridi 307.33  
 rhanni consideratio 307.46  
 rhanni uires ex Galeno 308.7  
 Rhaponticum Dioscoridi 307.25  
 rhapontici consideratio 307.39  
 rhapontici, et rhabarbari discrimen 308.13  
 rhapontici uires ex Galeno 308.35  
 Rheon Dioscoridi 307.25  
 rhei Barbarici nomenclatura inde 309.31  
 rhei Barbarici, seu rhabarbari uires ex Mesue 310.13  
 rhei Indici nominatio 309.16  
 rhei Turcici nomenclatio 309.9  
 Rhodia radix Dioscoridi 458.16  
 rhodie radicle consideratio 458.21  
 rhodie radicle uires ex Galeno 458.48  
 Rhododendron Dioscoridi 484.22  
 rhododendri consideratio. Vide nerij consideratio  
 Rhus Dioscoridi 123.43  
 rhois consideratio 123.57  
 rhois uires ex Galeno 124.53  
 Ribes Mauritanis quid 102.3  
 ribis officinarum consideratio 101.58  
 Ricinus Dioscoridi 338.23  
 ricini consideratio 338.39  
 ricini uires ex Mesue 338.53  
 ricini uires ex Galeno 338.57  
 ricini sumpti noxa, et curatio 679.36  
 Ricini olei consideratio 50.49  
 ricini olei uires ex Mesue 50.53  
 Risagalli uenenum, et curatio 676.31  
 Rosa Dioscoridi 110.24  
 rosarum consideratio 110.56  
 rosarum genera plura. et eorum uires 111.15  
 rosarum succus, et dilutum 111.18  
 rosarum dilutum absq; noxa aluum deicere 111.15  
 rose sylvestres 111.26  
 rose aureo colore 111.29  
 rosarum differentie, et genera ex Plinio 111.30  
 rosarum partes, et earum uires 111.44  
 rosarum aqua stillatitia quæ præstantior 111.22  
 rosarum facultas ex Galeno 111.24  
 Rosaceum Dioscoridi 54.16  
 rosacei consideratio 54.53  
 rosaceum num conueniat in noxa mandragore 666.22  
 Rosaceum ompbacinum 54.57  
 rosacei ompbacini uires 55.1  
 Rosæi pastilli Dioscoridi 110.43  
 Rosmarinum Dioscoridi 370.47  
 rosmarinum coronarium Dioscoridi 371.12  
 rosmarini consideratio 371.28  
 rosmarini historia ex Theophrasto 371.23  
 rosmarini uires ex Galeno 371.40  
 Rubeta, et eius noxe remedia Dioscoridi 677.12  
 rubete ueneni signa 677.35 et eius curatio 677.48  
 Rubia Dioscoridi 421.37  
 rubie consid. 421.49. et uires ex Galeno 421.55  
 Rubigo ferri Dioscoridi 359.13  
 rubiginis ferri consideratio 359.24  
 Rubrica fabrilis Dioscoridi 607.33

rubrica fabrilis consideratio 607.37  
 Rubrica Sinopica Dioscoridi 607.8  
 rubrica Sinopice consideratio 607.15  
 Rubus Dioscoridi 453.27  
 rubi consideratio 453.54  
 rubi uires ex Galeno 454.7  
 Rubus canis Dioscoridi 102.21  
 rubi canis consideratio 102.25  
 rubi canis uires ex Galeno 102.58  
 Rubus Idæus Dioscoridi 453.46  
 rubi Idæi consideratio 454.1  
 Ruellij errata, ac eius opiniones reprobate 23.4 et  
 25.4 et 29.50. et 30.35. et 41.29. et 73.7. et  
 97.57. et 140.31. et 154.49. et 230.10. et  
 249.11. et 285.28. et 287.43. et 295.47. et  
 298.56. et 308.39. et 321.46. et 325.15. et  
 342.30. et 353.55. et 358.47. et 363.5. et  
 364.52. et 365.46. et 383.44. et 384.30. et  
 385.14. et 393.4. et 400.6. et 403.4. et 411.  
 51. et 415.38. et 432.59. et 440.37. et 441.  
 54. et 452.18. et 500.29. et 502.52. et 515.  
 30. et 517.14. et 521.24. et 549.24. et 560.  
 57. et 562.15. et 673.34  
 Rumex Dioscoridi 242.57  
 rumicis consideratio 243.55  
 rumicis facultas ex Galeno 244.16  
 Ruscum Dioscoridi 523.57  
 rusci consideratio 524.8  
 Ruta Dioscoridi 348.8  
 ruta montana Dioscoridi 348.41  
 ruta sylvestris Dioscoridi 348.48  
 ruta satina, et sylvestris consideratio 348.52  
 rute utriusq; uires ex Galeno 349.14  
 Ruta sylvestris altera Dioscoridi 349.22  
 ruta sylvestris alterius consideratio 349.31  
 ruta sylvestris alterius uires ex Galeno 350.21  
 Ruta capraria, et eius uires 350.27  
 Ruta muraria 351.22  
 SABINA Dioscoridi descripta 82.24  
 Sabine consideratio 82.35  
 sabine uires ex Galeno 82.50  
 Saccharum Dioscoridi 217.55  
 sacchari consideratio 218.41  
 saccharum antiquorum à nostrate non differre 219.1  
 sacchari factitij auuentio 219.22  
 saccharum candidum 220.41  
 Sacra herba Dioscoridi 466.49  
 Sagapenon Dioscoridi 377.34  
 sagapeni consideratio 377.44  
 sagapeni uires ex Mesue 377.49  
 sagapeni facultates ex Galeno 378.3  
 Sal Dioscoridi descriptus 619.27  
 salis omnis generis consideratio 620.18  
 salis facultates ex Galeno 621.13  
 Sal Ammoniacus Dioscoridi 619.28  
 salis Ammoniaci consideratio 620.45  
 sal Armeniacus officinis 620.49  
 Sal Indus quid Paulo, et Auicenna 620.32  
 salis Indi consideratio 620.54  
 Salis flos Dioscoridi 620.8



# Index.

*salis floris consideratio* 621.5  
*Salis spuma Dioscoridi* 619.57  
*salis spumæ consideratio* 621.4  
*Salnitri usus* 620.60. & 621.57  
*Salamandra Dioscoridi descripta* 197.13  
*salamandræ consideratio* 197.34  
*salamandram igni non absumi, falsum* 197.44  
*salamandra aquatica* 198.1  
*salamandræ haustæ signa, & remedia Diofco.* 658.13  
*salamandræ uenefica natura* 658.21  
*salamandræ ueneni curatio* 658.37  
*Salina humana, & eius facultates* 217.14  
*Saluaris herba, pyrethrum Dioscoridi* 359.46  
*Salunca, & eius consideratio* 26.50  
*Salix Dioscoridi* 116.30  
*salicis confid.* 116.44. *eius uires ex Gal.* 117.2  
*Salsa parilla quid, & uires* 110.19  
*Salvia Dioscoridi* 339.3  
*salviæ consideratio* 339.11  
*salviæ uires ex Galeno* 339.27  
*salviæ sylvestris consideratio* 339.12  
*salviæ Theophrasto due species* 339.18  
*salviæ uires ex Aëtio* 339.29  
*Salvia Romana Salvia Sylvestris* 341.1  
*salviæ Romanæ uires* 341.12  
*Sambucus Dioscoridi* 548.3  
*sambuci, & ebuli genera* 548.26  
*sambuci, & ebuli uires* 548.27  
*sambuci utriusq; facultates ex Galeno* 548.37  
*Samia terra Dioscoridi* 337.31  
*samie terræ consideratio* 337.45  
*Samius lapis Dioscoridi* 637.40  
*samij lapidis consideratio* 637.58  
*Sampsuchum Dioscoridi* 345.13  
*sampsuchi confid.* 345.29. *eius uires ex Gal.* 345.43  
*Sampsuchinum Dioscoridi* 345.50  
*sampsuchini consideratio* 345.59  
*Sandaracha Dioscoridi* 614.59  
*sandarachæ consideratio* 615.7  
*sandarachæ uires ex Galeno* 615.35  
*Sandarachæ potæ noxa, & eius remedia Diofco.* 676.3  
*sandarachæ malefica uis, & curatio* 676.10  
*Sandaracha gummi* 615.7. & 615.16  
*sandaracha ceraginosi mellis genus.* 82.14. & 615.25  
*sandarax Arabum quid* 615.18  
*Sandyx Dioscoridi* 599.20  
*sandycis consideratio* 599.33  
*sandycis facultas ex Galeno* 599.39  
*Sanguinariamas Dioscoridi* 433.51  
*sanguinaria femina Dioscoridi* 433.59  
*sanguinariæ confid. & uires, uide in polygono*  
*Sanguis Dioscoridi* 213.46  
*sanguinis consideratio* 214.1  
*sanguinis quorundam animalium uires peculiare a Ga-  
leno improbatæ* 214.4  
*Sanguis taurinus, eiusq; epoti notæ, & curatio Diofco-  
ridi* 671.41  
*sanguinis tauri uenenata potio* 671.51  
*sanguinis menstrui uenenum, & eius remedia* 672.8  
*Sanicula genera, & uires* 438.3

*Sanicula, quinquefolij species* 457.4  
*Santalorum consideratio, & genera* 41.42  
*santalorum uires* 41.46  
*Sapa Dioscoridi* 573.23  
*Sapphirus lapis Dioscoridi* 634.3  
*sapphiri consideratio* 634.6  
*sapphirus nostri usus suspectus* 634.9  
*Sarcocolla Dioscoridi* 380.3  
*sarcocollæ consideratio* 380.6  
*sarcocollæ uires ex Arabibus* 380.16  
*sarcocollæ facultates ex Galeno* 380.26  
*Sardianæ glandes Dioscoridi* 121.46  
*Sardonie herbæ noxa, & remedia Diofco.* 664.54  
*sardonie herbæ uenenum, eiusq; curatio* 665.1  
*Sarmentitius cinis Dioscoridi* 624.3  
*Satureia Dioscoridi Salsifraga. 270.* 343.54  
*satureiæ consideratio* 344.1  
*satureiæ uires ex Paulo* 344.15  
*Satyrium Dioscoridi* 410.20  
*satyrium erithronium Dioscoridi* 410.26  
*satyrij confid.* 410.34. *eius uires ex Gal.* 411.25  
*Saxifraga Dioscoridi* 442.15  
*saxifragæ consideratio, & uires* 442.23  
*saxifragæ nomen pluribus plantis commune* 442.34  
*saxifraga alba* 442.49  
*Saxosifolus quæ plantæ gaudeant* 93.4  
*Scabiose consideratio* 439.24  
*scabiosæ uires* 439.37  
*Scammonia Dioscoridi* 545.3  
*scammonie, & eius succi confid.* 545.26  
*scammonium officinarum uitiatum* 545.41  
*scammonij lesiones ex Mesue* 545.47  
*scammonij uires ex eodem* 546.6  
*scammonij noxa, & eius curatio* 579.35  
*Scandix Dioscoridi* 266.27  
*scandicis confid.* 266.30. *eius uires ex Gal.* 266.55  
*Scaniola quæ species intybi* 266.54  
*Schistum lac Dioscoridi* 204.21  
*Schistos lapis Dioscoridi* 629.58  
*schisti lapidis consideratio* 630.4  
*schisti lapidis uires ex Galeno* 630.7  
*Scilla Dioscoridi* 292.48  
*scille confid.* 293.24. *eius uires ex Gal.* 293.41  
*scillæ preparatio* 293.34  
*Scillinum acetum Dioscoridi* 580.11  
*scillini aceti uires admirabiles ex Galeno* 580.17  
*Scincus Dioscoridi* 200.33  
*scinci consideratio* 200.57  
*scinci Vicentini* 201.2  
*scincimentio, & uires ex Plinio* 201.17  
*Scolopendra Dioscoridi Sclaria. 411.60* 168.6  
*scolopendræ marinæ consideratio* 168.9  
*scolopendræ ictus notæ, & curatio Diofco.* 696.48  
*scolopendræ uenenosæ consideratio* 696.58  
*scolopendræ morsus remedia* 697.5  
*Scolopendrium Dioscoridi* 414.35  
*scolopendrij consideratio* 414.49  
*Scolymos Dioscoridi Artyfistum. 411.60* 322.7  
*Scordion Dioscoridi* 397.3  
*scordij consideratio* 397.22  
*scordium*

# Index.

*scordium ubi optimum* 337-38  
*scordij vires ex Galeno* 337-44  
*Scoria ferri Dioscoridi* 334-22  
*scoriae ferri consideratio* 334-24  
*Scoria plumbi Dioscoridi* 335-3  
*scoriae plumbi consideratio* 335-21  
*scoriae omnis vires ex Galeno* 334-30  
*Scorodoprasim Dioscoridi* 278-43  
*scorodoprasim consideratio* 278-48  
*Scorpene piscis consideratio* 157-5  
*Scorpioides Dioscoridi* 352-36  
*scorpioidis confid.* 562-40 *eius vires ex Gal.* 562-53  
*Scorpiurus herba Dioscoridi* 461-14  
*Scorpius marinus Dioscoridi* 167-3  
*scorpij marini consideratio* 167-5  
*scorpionis marini ictus notæ, et curatio Diosc.* 658-32  
*Scorpius terrestris Dioscoridi* 163-43  
*scorpionis terrestris consideratio* 163-43  
*scorpionum genera* 166-10  
*scorpiones aligeri* 166-22  
*scorpionum facultates* 166-32  
*scorpionum oleum miræ facultatis* 166-35 *et* 654-9  
*scorpiones aliquibus admotis stupidi redduntur.* 165-56  
*scorpiones quibus admotis reuiuiscant* 165-58  
*scorpionis ictum prohibentia* 165-59  
*Scorpionis ictus notæ, et curatio Diosc.* 659-14  
*scorpionum genera ex Nicandro* 657-33  
*scorpionum ictuum indicia, et remedia* 657-54  
*Scrophularia* 494-46 *eius vires* 495-14  
*Secale frumenti genus* 227-3  
*Secacul Arabum* 227-27  
*Securidaca Dioscoridi* 412-17  
*securidacæ consideratio* 412-25  
*securidacæ vires ex Galeno* 412-35  
*Sedum Dioscoridi* 490-35  
*fedi consideratio, et genera* 491-20  
*fedi vires ex Galeno* 491-48  
*Selago quid* 82-41  
*Selenites lapis Dioscoridi* 634-35  
*felenitæ lapidis consideratio* 634-41  
*Selinus terra Dioscoridi* 638-5  
*Semperuium maius Dioscoridi* 490-35  
*semperuium minus Dioscoridi* 490-48  
*semperuium tertium genus Dioscoridi* 490-36  
*semperuii consideratio, et genera* 491-26  
*Semen sanctum* 330-11  
*Semina quomodo demetenda* 14-19  
*feminum, et fructuum in plantis discrimina* 14-19  
*Senæ herba, et eius historia* 369-14  
*senæ, et eius diluti vires* 369-24  
*senæ diluti præparatio* 369-22  
*senæ uinum* 369-27  
*senæ folliculorum vires* 368-43  
*Senecta anguium Dioscoridi* 491-43  
*senectæ anguium consideratio* 491-59  
*Senecio Dioscoridi* 495-47  
*senecionis confid.* 496-1 *eius vires ex Gal.* 496-8  
*Sepia Dioscoridi* 174-13  
*sepiarum consideratio* 174-13  
*sepiarum facultates* 174-37

*Sepiasiariorum lapsus* 2635 *et* 4617 *et* 5118  
*et* 5356 *et* 25933 *et* 34944  
*Seps Dioscoridi* 299-52  
*sepis feræ consideratio* 299-59 *et* 702-47  
*sepis morsus signa, et remedia* 702-2  
*Serapionis errata* 2218 *et* 303 *et* 3546 *et* 68  
*30 et* 139-27 *et* 453-15 *et* 487-37 *et* 510-9  
*Serica Galeno quid* 143-28-53  
*serici consideratio, et vires* 149-50  
*Seris Dioscoridi* 257-53  
*seridis consideratio* 259-1  
*Serpens marina Aristoteli quid* 167-45  
*Serpyllum Dioscoridi* 344-24  
*serpylli consideratio* 344-43  
*serpylli vires ex Galeno* 345-8  
*Sertula Campana Dioscoridi* 345-49  
*sertulæ Campanæ confid. uide meliloti confid.*  
*Seruij Grammatici error* 103-45  
*Serum lactis Dioscoridi* 204-18  
*seri vires ex Galeno* 206-52  
*seri vires ex Mesue* 206-57  
*Sesamum Dioscoridi* 230-37  
*sesami consideratio* 230-47  
*sesami vires ex Galeno* 231-3  
*Sesamoides magnum Dioscoridi* 229-37  
*sesamoides paruum* 229-44  
*sesamoidis utriusq; consideratio* 229-49  
*Seseli Aethiopicum Dioscoridi* 354-59  
*seseli Creticum Dioscoridi* 354-59  
*seseli Massiliense Dioscoridi* 354-44  
*seseli Peloponnense Dioscoridi* 354-53  
*seselis omnis consideratio* 355-6  
*seselis vires ex Galeno* 355-23  
*Sicyonium oleum Dioscoridi* 491-9  
*Sideritis prima Dioscoridi* 451-38  
*sideritis secunda Dioscoridi* 451-51  
*sideritis tertia Dioscoridi* 452-3  
*sideritis omnis consideratio* 452-8  
*sideritis vires ex Galeno* 452-33  
*Signa in commune ueneni sumpti* 434 *et* 650-1  
*Silique Dioscoridi* 131-13  
*siliquarum confid.* 131-18 *et* *vires ex Gal.* 131-38  
*Silurus Dioscoridi* 178-52  
*siluri piscis consideratio* 178-57  
*Silybum Dioscoridi* 534-41  
*silybi mentio* 534-44  
*Simplicium peritia acquiri non potest ex librorum tan-*  
*tim lectione* 3-54  
*Simplicium peritia à præceptoribus, non ex libris com-*  
*paratur* 4-5  
*Simplicium nomina uaria Dioscoridi adulterina* 8-25  
*Sinapi Dioscoridi* 279-32  
*sinapi consideratio* 279-59  
*sinapi vires ex Galeno* 280-12  
*Sion Dioscoridi* 1253-3  
*sij consideratio* 1253-12  
*sij vires ex Galeno* 1253-33  
*Sifer Dioscoridi* 242-38  
*siferis consideratio* 242-41  
*siferis vires ex Galeno* 242-46  
*siferis*

# Index.

<i>Siferis forma</i>	242.51	<i>Spina alba consideratio</i>	320.33
<i>Sifon Dioscoridi</i>	355.32	<i>Spina alba uires ex Galeno</i>	321.30
<i>Sifonis consideratio</i>	355.39	<i>Spina Arabica Dioscoridi</i>	321.36
<i>Sifymbrium Dioscoridi</i>	253.38	<i>Spina Arabica consideratio</i>	321.40
<i>Sifymbrij consideratio</i>	253.47	<i>Spina Arabica uires ex Galeno</i>	321.60
<i>Sifymbrij in mentham mutatio</i>	253.54	<i>Spodium Dioscoridi</i>	588.12
<i>Sifymbrium aquaticum</i>	254.56	<i>Spodij, &amp; pompholygis consideratio</i>	589.10
<i>Sifymbrij utriusq; uires ex Galeno</i>	255.55	<i>Spodij, &amp; pompholygis historia</i>	589.57
<i>Smarides pisces Dioscoridi</i>	179.32	<i>Spongie Dioscoridi</i>	625.49
<i>Smaridum consideratio</i>	179.58	<i>Spongiarum historia ex Aristotele</i>	626.1
<i>Smilax hortenſis Dioscoridi</i>	272.56	<i>Spongiarum uires ex Galeno</i>	626.23
<i>Smilacis hortenſis consideratio</i>	273.5	<i>Spongiarum lapides Dioscoridi</i>	636.8
<i>Smilax aspera Dioscoridi</i>	272.19	<i>Spuma nitri, uide Nitri spuma</i>	
<i>Smilacis asperæ historia ex Theophrasto</i>	273.10	<i>Spuma salis, uide Salis spuma</i>	
<i>Smilax læuis Dioscoridi</i>	273.3	<i>Spuma argenti, uide Argenti spuma</i>	
<i>Smilacis læuis historia</i>	273.22	<i>Squama æris, uide Aeris squama</i>	
<i>Smilacis utriusque uires ex Galeno</i>	273.50	<i>Squama stomomatis Dioscoridi</i>	591.30
<i>Smilack glandiferæ consideratio</i>	270.60	<i>Squama stomomatis consideratio</i>	591.33
<i>Smyris lapis Dioscoridi</i>	366.38	<i>Squama stomomatis que legitima</i>	592.5
<i>Smyridis confid. &amp; uires ex Galeno</i>	366.46	<i>Squillarum consideratio</i>	655.3
<i>Smyrnion Dioscoridi</i>	364.3	<i>Squinanthum</i>	37.19
<i>Smyrni confid. 364.26. eius uires ex Gal.</i>	364.54	<i>Stachys Dioscoridi</i>	392.13
<i>Sodomeus lacus</i>	78.27.53	<i>Stachyos confid. 392.22. eius uires ex Gal.</i>	392.94
<i>Solanum halicacabum Dioscoridi</i>	474.59	<i>Stacte Dioscoridi</i>	59.51
<i>Solanum hortense Dioscoridi</i>	474.35	<i>Stactes consideratio</i>	59.58
<i>Solanum manicum, seu furiosum Diosc.</i>	475.52	<i>Staphis agria Dioscoridi</i>	531.40
<i>Solanum somniferum Dioscoridi</i>	475.40	<i>Staphidis agrie consideratio</i>	531.57
<i>Solani omnis generis consideratio</i>	476.1	<i>Staphidis agrie uires ex Galeno</i>	532.2
<i>Solani historia ex Theophrasto</i>	476.21	<i>Staphidis agrie noxa, &amp; curatio</i>	660.14
<i>Solani uires ex Galeno</i>	476.40	<i>Staphylodendron</i>	146.14
<i>Solani manici noxa, &amp; curatio</i>	660.38	<i>Stellarie historia, &amp; uires</i>	510.43
<i>Solbastrella, &amp; eius uires</i>	461.19	<i>Stellionum consideratio</i>	658.49
<i>Soldanella que</i>	249.6	<i>Stellionum morsus remedia</i>	659.25
<i>Solidaginis minoris, &amp; mediæ uires</i>	437.53	<i>Stereoris uires</i>	215.1. & uide
<i>Solidago regalis</i>	438.12	<i>Stercus ferri, uide Ferri stercus</i>	
<i>Sonchus Dioscoridi</i>	257.33	<i>Stibium Dioscoridi</i>	596.18
<i>Sonchi confid. 257.41. eius uires ex Gal.</i>	257.43	<i>Stibij consideratio</i>	596.30
<i>Sorba Dioscoridi</i>	141.25	<i>Stibij uires ex Galeno</i>	596.52
<i>Sorborum consideratio</i>	141.31	<i>Stimmi, lege supra Stibium</i>	
<i>Sorborum uires ex Galeno</i>	141.42	<i>Stoebe Dioscoridi</i>	439.10
<i>Sory Dioscoridi</i>	613.13	<i>Stoebes confid. 439.14. eius uires ex Gal.</i>	439.36
<i>Soreos consideratio</i>	613.13	<i>Stoechas Dioscoridi</i>	333.47
<i>Soreos historia, &amp; uires ex Galeno</i>	613.40	<i>Stoechadis consideratio</i>	333.53
<i>Sparganion Dioscoridi</i>	445.28	<i>Stoechadis uires ex Galeno</i>	333.59
<i>Sparganii confid. 445.34. eius uires ex Gal.</i>	445.50	<i>Stomoma Dioscoridi</i>	591.39
<i>Spartion Dioscoridi</i>	533.44	<i>Stramonia herba</i>	476.36
<i>Spartij consideratio</i>	533.52	<i>Stratiotes Dioscoridi</i>	497.52
<i>Sparti usus ex Plinio</i>	534.4	<i>Stratiotæ consideratio</i>	497.57
<i>Sparti uires ex Galeno</i>	534.33	<i>Stratiotes millefolium Dioscoridi</i>	498.4
<i>Spartha Dioscoridi</i>	25.34	<i>Stratiotæ millefolij consideratio</i>	498.42
<i>Sphacelus spatula foetida</i>	339.19	<i>Stratiotæ millefolij uires ex Galeno</i>	498.48
<i>Sphondilium Dioscoridi</i>	371.49	<i>Strigmenta balnearum</i>	286.28
<i>Sphondilij confid. 372.1. eius uires ex Gal.</i>	372.13	<i>Struthium Dioscoridi</i>	286.33
<i>Sphragis agos Dioscoridi</i>	607.47	<i>Struthij confid. 286.40. &amp; uires ex Gal.</i>	286.52
<i>Spinacia</i>	246.49	<i>Styrax Dioscoridi</i>	63.28
<i>Spina acuta Dioscoridi</i>	99.44	<i>Styracis consideratio</i>	63.48
<i>Spina acutæ consideratio</i>	100.1	<i>Styrax calamita unde dicta</i>	63.50
<i>Spina acutæ uires ex Galeno</i>	102.14	<i>Styracis uires ex Galeno</i>	64.5
<i>Spina acuta legitima que</i>	101.2	<i>Suberis consideratio, &amp; historia</i>	121.10
<i>Spina alba Dioscoridi</i>	20.19	<i>Suberis uires</i>	121.26

*Spigo raecondel signified and gelu 25 linea 28 Succaneas*

# Index.

Succedanea quando admittenda	650.1
Succi quomodo exprimendi, seruandiq; sint	7.40
Euccinum Dioscoridi	88.42
succini historia uaria	89.28
Sudoris animalium uirus, & remedia	673.6
Suffrutices qui dicantur	8.39
Suillus pulmo Dioscoridi	183.20
suillus talus Dioscoridi	193.11
Sulphur Dioscoridi	618.3
sulphuris consideratio	618.15
sulphuris faciendi ratio	618.29
sulphuris uires ex Galeno	618.42
Sycomorus Dioscoridi	150.8
sycomori historia	150.33
sycomori consideratio, & uires ex Galeno	150.44
sycomorus Italie adulterina	150.56
sycomorosicus Cypria similis	150.50
Sylvus quæ plantæ adamant	9.54
Symphathia, & antipathia rerum	15.20
Symphyton petræon Dioscoridi	436.54
symphyti petræi consideratio	437.41
symphytum alterum Dioscoridi	436.60
symphyti alterius consideratio	437.47
symphyti utriusque uires ex Galeno	438.20
Symphoriani Campegi lapsus	135.50

<b>T</b> ALVS suis Dioscoridi	193.11
Tali suilli consideratio	193.31
Tamarix Dioscoridi	94.31
tamaricis consideratio	95.12
tamaricis uires	95.31
Tamarindorum consideratio	126.35
tamarindorum uires	126.44
Tanacetum	418.8
Tarantule consideratio	199.6
tarantule ictus mirabiles effectus	ibidem
tarantule ictus musica remedium	199.18
tarantule uenenum, & eius auxilia	696.42
Tauri sanguis, uide Sanguis taurinus	
Taxus Dioscoridi	482.34
taxi consideratio	483.13
taxi historia ex Theophrasto	483.13
taxi uires ex Galeno	483.43
taxi uoxa, & eius remedia Dioscoridi	663.28
taxi uenefica natura	663.31
taxus utrum calida, uel frigida	663.46
Tede consideratio	701.28
Telephium Dioscoridi	305.23
telephij confid.	305.29
telephij uires ex Gal.	305.34
Telline Dioscoridi	359.52
tellinarum consideratio	359.55
Tembulum Arabum	305.36
Terebinthus Dioscoridi	74.18
terebinthi consideratio, & historia	75.7
terebinthi uires ex Galeno	75.59
Terebinthina Dioscoridi	74.27
terebinthine resine consideratio	75.26
Terra pennis Dioscoridi	637.13
terræ brevis enarratio	563.30
terra fornacum Dioscoridi	638.33
terras alias quære in suis proprijs nominibus	

Terrantula Italica quid	200.27
Testæ fornaceæ Dioscoridi	638.28
Testiculus Dioscoridi	410.3
testiculus alter Dioscoridi	410.12
testiculorum consideratio	410.34
testiculorum uires ex Galeno	411.16
Teucrium, Teucris Dioscoridi	386.44
teucrij consideratio	386.53
teucrij uires, & historia ex Plinio	386.60
teucrij facultates ex Galeno	387.14
Thalassomeli Dioscoridi	578.32
Thalictron Dioscoridi	496.17
thalictri consideratio	496.22
thalictri uires ex Galeno	496.28
Thapsia Dioscoridi	532.9
thapsie consideratio	532.49
thapsie radices turpeti uicē illegitime expiet	532.59
thapsie uires ex Galeno	533.3
thapsie noxa, & remedia Dioscoridi	578.36
thapsie potionis signa, & curatio	579.11
Theamedes lapis, & eius mira natura	632.3
Theodori lapsus	136.15
Theophrasti sententia non probata	225. & 270.

44. & 382.15

Theophrasti locus in corni historia suspectus	41.1
Theophrasti de generatione lapidum opinio	563.53
Theriace componende ratio deprauata	55.31
theriaca laudibus à Galeno celebrata	693.12
Thlaspi Dioscoridi	280.53
thlaspi consideratio	281.5
thlaspi uires ex Galeno	281.12
Thracias lapis Dioscoridi	631.17
thracij lapidis mentio ex Galeno	631.20
Thunnus Dioscoridi	181.3
thunni consideratio	181.19
thunnorum captura, & nomina uaria	181.27
thunnorum in cibis facultas	181.37
Thus Dioscoridi	165.20
thuris consideratio, & historia	66.14
thuris facultates ex Galeno	66.40
thuris cortex Dioscoridi	165.47
thuris fuligo Dioscoridi	66.3
thuris manna Dioscoridi	65.56
thuris manne consideratio	67.13
Thyites lapis Dioscoridi	633.19
Thymelea Dioscoridi	546.50
thymeleæ consideratio	547.5
thymeleæ noxa, & eius curatio	679.37
Thymoxalme Dioscoridi	580.3
Thymum Dioscoridi	343.3
thymi historia	343.18
thymi genera duo	343.33
thymi uires ex Galeno, & Aëtio	343.37
Thymbra Dioscoridi	343.54
thymbre confid.	344.1
thymbre uires ex Gal.	344.15
Tigname officinis quid	545.2
Tilia confid.	545.16
Tithymali omnes Dioscoridi	540.34
tithymalorum omnium consideratio	541.22
tithymali cogniti	541.44
tithymali	



# Index.

tibymali Theophrasto tria tantum genera 542.3  
 tibymalorum uires ex Mesue 542.13  
 tibymalorum uires ex Galeno 542.22  
 tibymalorum noxa, & remedia 679.36  
 Tordilium Dioscoridi 354.59  
 Tormentilla descriptio, & uires 431.56.59  
 Torpedo piscis Dioscoridi 168.17  
 torpedinis consideratio 68.37  
 torpedinis mira facultas 68.39  
 torpedinis uires ex Galeno 68.58  
 Toxicum, & eius ueneni curatio Dioscoridi 667.46  
 toxici consideratio 667.55  
 toxici sumpti nota ex Nicandro 668.21  
 toxici, & napelli discrimen 668.31  
 Tragacantha Dioscoridi 326.3  
 tragacanthæ confid. 326.29. & uires ex Gal. 326.32  
 Tragium Dioscoridi 460.48  
 tragium alterum Dioscoridi 460.56  
 tragij confid. 461.2. & uires ex Gal. 461.26  
 Tragoriganum Dioscoridi 335.25  
 tragorigani consideratio 336.13  
 Tragos Dioscoridi 227.39  
 tragi cerealis consideratio 227.42  
 Tragum Dioscoridi 461.36  
 tragi herbæ consideratio 461.47  
 Trasi, & eorum descriptio, & uires 271.36  
 Tribulus Dioscoridi 441.35  
 tribuli utriusque consideratio 441.47  
 tribuli utriusque uires ex Galeno 441.44  
 Trichomanes Dioscoridi 518.37  
 trichomanis consideratio 518.37  
 trichomanis historia ex Theophrasto 519.1  
 trichomanis uires ex Galeno 519.19  
 Trifolium Dioscoridi 393.51  
 trifolij omnis generis consideratio 394.39  
 trifolij acuti historia ex Scribonio 394.54  
 trifolium pratense tempestates prænuñciat 395.8  
 trifolium odoratum 506.33  
 trifolium acetosum 395.2.  
 trifolij uires ex Galeno 395.22  
 Trinitas herba, & eius historia, & uires 395.11  
 Tripolion Dioscoridi 517.21  
 tripolij confid. 517.27. & uires ex Gal. 518.2  
 Trissago Dioscoridi 387.22  
 trissaginis consideratio 387.37  
 trissaginis historia, & uires ex Theophrasto 387.49  
 trissaginis uires ex Galeno 388.1  
 Triticum Dioscoridi 223.47  
 tritici genera ex Theophrasto 223.5  
 triticum Italicum optimum 223.42  
 tritici electio 223.53. & uires ex Gal. 224.18  
 tritici oleum 224.16  
 Tubera Dioscoridi 271.53  
 tuborum consideratio 271.56  
 tuborum uires ex Galeno 271.37  
 Turbit Arabum 517.32  
 Turpetum, & eius consideratio, & historia ibidem, &  
 552.50  
 turpeti noxa, & curatio 679.35  
 Tusilago Dioscoridi 358.3

tusilaginis confid. 358.17. & uires ex Gal. 358.43  
 Typha Dioscoridi 404.16  
 typhæ consideratio 404.23  
 typhæ usus, & uires 404.29  
 VALERIANA maior 29.7  
 Valeriana minor 29.18  
 Varia de generatione lapidum sententia 563.32  
 uaria de metallorum ortu sententia 564.59  
 Veneficorum doli Dioscoridi 640.31  
 Venena præcauendi modi Dioscoridi 640.29  
 uenena quot modis mortem adferant 643.45  
 uenena petunt diuersa membra 645.46  
 uenena calida non possunt in nutrimentum uerti 647.12  
 uenena præcauendi modus 648.2  
 Venena curandi ratio generalis Dioscoridi 641.3  
 uenena curandi ratio uniuersalis 649.38  
 uenena incognita uomitu deprehenduntur Dioscoridi  
 641.26  
 Venenata animalia Dioscoridi 681.19  
 Veneni operatio qualis 643.18  
 ueneni humidi exemplum 644.53  
 uenenis, quorum nulla cognitio, quæ opitulentur Dio-  
 scoridi 641.14  
 Venenorum genera unde 643.31  
 uenenorum effectus à diuersis causis 644.34  
 uenenorum præcautio quedam explosa 648.3  
 uenenorum præcautio ex medicamentis 549.23  
 uenenorum remedia in generali 656.53  
 uenenorum animalium diuersi gradus, & effectus 691.54  
 Venenum quandoque morbis, & alteri ueneno, reme-  
 dium est 647.43  
 uenenum serpentium frigidum esse, falsum 692.9  
 Veneris pecten 267.3  
 Veneris umbilicus Dioscoridi 491.55  
 ueneris umbilicus alter Dioscoridi 492.35  
 ueneris umbilici utriusque consideratio 492.40  
 ueneris umbilici utriusque uires ex Galeno 492.53  
 Veratrum album, lege supra in Elleboro albo 526  
 ueratrum utrumque triginta perdurat annos 619  
 Verbascum Dioscoridi 498.55  
 uerbasci consideratio, & genera 500.21  
 uerbasci uires quedam 500.40  
 uerbasci genera, & uires ex Galeno 500.55  
 uerbasci sylvestris mentio 500.22  
 Verbenaca Dioscoridi 466.40  
 uerbenacæ utriusque consideratio 467.1  
 uerbenacæ uires ex Galeno 467.37  
 Vermes terreni Dioscoridi 202.4  
 uermium terrenorum uires 202.8  
 uermium terrenorum oleum 202.11  
 uermium in lignis enascentium usus 92.57  
 Veronice herbæ historia, & uires 337.59  
 Vesicaria solani genus 476.3  
 uesicaria altera 476.29  
 Vessparum ictus curatio Dioscoridi 694.56  
 vessparum ictus, & remedia 695.1  
 Vgonis Solerij de nigro ueratro opin. explosa 528.24  
 Viburnum quid, & eius descriptio 244.5  
 Viciæ uires ex Galeno 274.46  
 Vinca 435.45  
 Vexetoxi cum 389

# Index.

Victus ratio in morsu rabiosi canis Diosc. 589.28  
 victus ratio demorsorum à cane rabioso 589.52  
 victus ratio eorum, qui uenena sumpserunt 650.36  
 Vincetoxicum, et eius descriptio 384.8  
 Vina marina Dioscoridi 581.23  
 uina picata Dioscoridi 573.31  
 uina resinata Dioscoridi ibidem  
 Vinetis quæ plantæ latè nascantur 9.44  
 Vini natura, et genera Dioscoridi 573.9  
 vini facultates uariæ pro modo usus 574.19  
 vini usus cui ætati conueniat 574.36  
 vini usus moderatus quantum proffit 574.20  
 vini usus immoderatus quantum obest ibidem  
 uinorum factitiorum consideratio 586.26  
 Vinum abiegnum Dioscoridi 583.42  
 uinum abrotanites Dioscoridi 584.60  
 uinum absinthites Dioscoridi 584.9  
 uinum acorites Dioscoridi 585.46  
 uinum adynamon Dioscoridi 575.28  
 uinum anethinum Dioscoridi 585.50  
 uinum apijtes Dioscoridi 581.58  
 uinum aromatites Dioscoridi 585.6  
 uinum asarites Dioscoridi 585.30  
 Vinum bunites Dioscoridi 584.42  
 Vinum calamitibites Dioscoridi 584.69  
 uinum catorchites Dioscoridi 583.9  
 uinum cedrinum Dioscoridi 583.42  
 uinum cedrites Dioscoridi 583.59  
 uinum è Celtica nardo Dioscoridi 585.26  
 uinum cestrites Dioscoridi 584.41  
 uinum chamædryites Dioscoridi 584.36  
 uinum è chamelea Dioscoridi 585.59  
 uinum chamæpitinum Dioscoridi 586.1  
 uinum è conyza Dioscoridi 585.1  
 uinum cupressinum Dioscoridi 583.43  
 uinum cydonites Dioscoridi 581.36  
 Vinum daucites Dioscoridi 585.39  
 uinum dictamnites Dioscoridi 584.52  
 uinum è dulcitrade Dioscoridi 585.46  
 Vinum è flore salis Dioscoridi 585.51  
 Vinum guaiacum, et eius conficiendi, exhibendi, ratio 589.29  
 uinum gypsatum Dioscoridi 573.30  
 Vinum helleborites Dioscoridi 585.54  
 uinum hyssopites Dioscoridi 584.27  
 Vinum ex iride Dioscoridi 585.20  
 uinum iuniperinum Dioscoridi 583.43  
 Vinum è labrusca Dioscoridi 575.49  
 uini è labrusca uires 575.52  
 uinum laurinum Dioscoridi 583.42  
 uinum lentiscinum Dioscoridi 582.52  
 Vinum malabathrinum Dioscoridi 585.26  
 uinum mandragorites Dioscoridi 586.2  
 uinum marathrites Dioscoridi 585.50  
 uinum emarrubio Dioscoridi 584.53  
 uinum melites Dioscoridi 581.36  
 uinum melitites Dioscoridi 575.59  
 uinum melomeli Dioscoridi 581.41  
 uinum è myrrha Dioscoridi 585.21  
 uinum myrsinites Dioscoridi 582.44

uinum myrtites Dioscoridi 582.36  
 Vinum è nardo sylvestri Dioscoridi 585.32  
 uinum nectarites Dioscoridi 585.24  
 uinum nouum Dioscoridi 573.21  
 Vinum oenanthinum Dioscoridi 582.3  
 uinum omphacomes Dioscoridi 581.52  
 uinum omphacites Dioscoridi 575.15  
 uinum organites Dioscoridi 584.58  
 Vinum palmeum Dioscoridi 582.57  
 uinum panacites Dioscoridi 585.43  
 uinum passum Dioscoridi 573.22  
 uinum è petroselino Dioscoridi 585.50  
 uinum phthorion Dioscoridi 585.53  
 uinum picatum Dioscoridi 583.59  
 uinum pineum Dioscoridi 583.42  
 uinum Pucinum, et eius uires 574.53  
 uinum è pulegio Dioscoridi 584.60  
 uini ex punice malis uaria confectio 582.14  
 Vinum resinatum Dioscoridi 583.25  
 uinum rhodites Dioscoridi 582.28  
 uinum rheetes Dioscoridi 582.9  
 Vinum saluatium Dioscoridi 585.41  
 uinum è satureia Dioscoridi 584.58  
 uinum scammonites Dioscoridi 585.53  
 uinum scellinum Dioscoridi 580.56  
 uini scellini uires ex Galeno 581.9  
 uinum stæchadites Dioscoridi 584.38  
 uinum strobilites Dioscoridi 583.35  
 uinum è sycomoris Dioscoridi 583.19  
 uinum è Syriaca nardo Dioscoridi 585.26  
 Vinum terebinthinum Dioscoridi 582.52  
 uinum thymites Dioscoridi 584.55  
 uinum è thymela Dioscoridi 585.56  
 uinum tragoriganites Dioscoridi 584.47  
 Vinum uetus Dioscoridi 573.9  
 uinum Vipacum, et eius uires 574.54  
 Viola alba Dioscoridi 407.40  
 Viola purpurea Dioscoridi 511.13  
 uiole purpureæ consideratio 511.23  
 uiolarum uires ex Mesue 511.45  
 uiolarum uires ex Galeno 512.1  
 Vipera ex hominis uentre fugata 586.2  
 uiperæ Aegyptijs cibum 571.36  
 uiperæ uino delectantur 570.44  
 uiperæ ictus notæ, et curatio Dioscoridi 700.3  
 uiperarum consideratio 569.4  
 uiperarum facies sexusque discrimen 570.2  
 uiperarum morsus indicia 700.27  
 uiperarum morsus remedia 700.46  
 uiperarum uenatio, et earum pastilli 700.51  
 Viperinæ carnes Dioscoridi 569.4  
 uiperinæ carnis uires ex Galeno 570.19  
 Virga aurea, et eius historia, et uires 452.21  
 virga pastoris, et eius consideratio 520.3  
 Virulentorum ictuum, uel morsuum curatio 592.19  
 Viscum Dioscoridi 381.15  
 uisci consideratio 381.43  
 uisci utilitas in Hetruria 381.51  
 uisci uires ex Galeno 382.29  
 Vitex Dioscoridi 115.27  
 uiticis

# Index.

uiticis consideratio	215.54
uiticis uires ex Galeno	215.60
Viticellæ herbæ historia, & uires	556.1
Vitis alba Dioscoridi	554.28
uitis albæ consideratio	554.30
uitis uires ex Galeno	555.4
Vitis nigra Dioscoridi	555.13
uitis nigre consideratio	555.27
uitis nigre uires ex Galeno	555.54
Vitis sylvestris Dioscoridi	553.47
uitis sylvestris consideratio	553.58
uitis sylvestris uires ex Galeno	554.22
Vitis uinifera Dioscoridi	569.49
uitis uinifere consideratio	570.24
uitis, & brassicæ odium	25.26
Vitruuij in larice error	71.28
Vlmus Dioscoridi	91.48
ulmi consideratio, & historia	92.1
ulmi facultates	92.35
ulmi uires ex Galeno	92.42
Vlua quæ	497.12
Umbilicus Veneris, uide supra Veneris umbilicus	
Vnedo, Arbutus, ideo quære in Arbuto.	
Vnguentorum ratio Dioscoridi	54.2
unguentorum consideratio	54.45
Vnguentum abrotoninum Dioscoridi	56.37
unguentum amaracinum Dioscoridi	58.
unguentum anethinum Dioscoridi	56.43
Vnguentum butyrium Dioscoridi	57.45
Vnguentum cinnamominum Dioscoridi	60.9
unguentum crocinum Dioscoridi	57.35
unguentum Cyprinum Dioscoridi	57.48
Vnguentum elatinum Dioscoridi	55.7
Vnguentum gleucinum, uide Gleucinum.	
Vnguentum hedychoon, uide Hedychoon.	
Vnguentum iasminum, uide Iasminum.	
unguentum irinum Dioscoridi	58.6
Vnguentum lilinum Dioscoridi	56.50
unguenti lilini consideratio	57.28
Vnguentum malabathrinum Dioscoridi	50.31
unguentum Megalinum Dioscoridi	59.9
unguentum melinum Dioscoridi	55.13
unguenti melini conficiendi ratio	55.23
unguentum Mendesium Dioscoridi	59.47
unguentum metopion Dioscoridi	59.36
Vnguentum narcissinum Dioscoridi	57.23
unguentum nardinum Dioscoridi	60.23
Vnguentum ociminum Dioscoridi	56.28
unguentum oenanthinum Dioscoridi	55.28
unguentum onychinum Dioscoridi	57.45
Vnguentum rosaceum, lege Rosaceum.	
Vnguentum sampsuchinum Dioscoridi	55.50
unguenti sampsuchini consideratio	55.59
unguentum styracinum Dioscoridi	57.45
unguentum sustinum Dioscoridi	56.50
Vnguentum telinum Dioscoridi	55.36
Vngula Cabillina.	398.21

Vngula asini, & capræ Dioscoridi	284.55
ungularum animalium uires	284.58
Vnguis odoratus Dioscoridi	160.56
unguium odoratorum consideratio	161.19
Vniones qui prestantissimi	139.32
unionum uires	159.41
Vrina Dioscoridi	216.26
urinarum facultates	216.44
Vrtica Dioscoridi	493.32
urticæ consideratio	493.53
urticæ uires ex Galeno	494.1
urticæ seminis noxa, & curatio	661.40
Vstio auxilium contra uirulentos ictus Diosc.	688.35
ustionis utilitas	688.50
Vtrum uenena in statum diem interimere possint	646.7
Vtrum quis assuescieri possit, ut uenena innocue sumat	646.51
Vtrum animalia, quæ cibis uenenosis uictitant, exilio sanum retineant	647.19
Vua Dioscoridi	570.13
uue consideratio	570.24
uuarum uires ex Galeno	570.43
Vua passa Dioscoridi	570.56
uue passæ consideratio	571.4
uue passæ uires ex Galeno	571.39
Vua spina, & eius usus	101.33
Vua taminia quæ	55.29
Vulpinus pulmo Diosc.	283.21

X

<b>X</b> ANTHION Dioscoridi	519.35
Xanthij consideratio	519.47
xanthij uires ex Galeno	519.58
Xiphion Dioscoridi	444.49
Xiphia piscis	181.22
Xylon, & eius consideratio	233.14
xyli uires	404.7
Xylobalsamum Dioscoridi	403.31
xylobalsamum officinarum spurium	40.36
xylobalsami uicem quid expleat	40.43
Xylocinnamomum Dioscoridi	31.21
Xyris Dioscoridi	445.56
xyridis consideratio	446.11
xyridis uires ex Galeno	446.16
<b>Z</b> E A Dioscoridi	226.16
Zee consideratio	226.21
zee uires ex Galeno	226.44
Zedoarie consideratio, & uires	284.54
Zibetti historia, & facultas	43.31
Zizypha, & eorum consideratio	43.26
Zopissa Dioscoridi	77.15
Zuccharum albusar	215.55
Zurumbet Arabibus, idè quod Grecis Arnabo.	285.2
zurumbet quid	285.5
Zythum Dioscoridi	25.47
zythi consideratio	225.56

# PETRI ANDREAE MATTHIOLI MEDICI

## Senensis Commentarii,

IN LIB. PRIMVM PEDACII DIOSCORIDIS  
ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA.

### Præfatio Dioscoridis.



VANQVAM, amicissime Aree, complures non ueterum modò, sed recentiorum quoque, de medicamentorum compositione, uiribus, atque probatione scripserunt; nobis tamen nec uanum, nec à ratione abhorrentem impetum animi ad hoc opus incessisse, tibi ostendere tētabimur. propterea quòd eorum nonnulli absolutum nihil ediderunt, alij plurima, ut ex narratione acceperant, scriptis tradiderunt. Siquidem Bithynus Iolas; & Heraclides Tarentinus, omissa prorsus herbarum tractatione, rem ipsam paucis perstrinxerūt. neque uerò omnes illi de metallicis quicquam rebus, aut odoramentis memoriæ prodiderunt. Crateuas autem herbarius, & Andreas medicus, qui cæteris diligentius hac in parte uersati uidentur, radices multas apprimè utiles, herbasque aliquas haud quaquam adnotatas reliquerunt.

Veruntamen priscorum subscribere oportet sententijs: quos, etsi pauca ipsis referantur accepta, magnam tamen impendisse diligentiam constat. Iunioribus minus assentiendum: è quibus est Iulius Bassus, & Niceratus, & Petronius Niger, & Diodorus, Asclepiadæ omnes, qui medicinalem materiam uernaculam, cognitamque uulgo, dignam censuerunt, quæ ab ipsis literis exactè mandaretur: & ut medicamentorum uires, probationesque cursim complexi, sic nullo experimento eorum effectus colligentes, inani uerò reddendarum causarum studio uerba fundentes, alia interdum pro alijs scriptitando, t̄ rem in aceruum, congeriemque controuersiarum extulerunt. Siquidem qui inter eos egregius habetur Niger, euphorbium nascentis in Italia chamelææ succum esse contendit: androsæmonque eandem herbam cum hyperico esse: quinetiam aloë in Iudæa fossilem nasci: & pleraque his similia falsò exponit, quæ prorsus ueritati refragantur. Quibus coniectura colligi potest, ea nò oculata fide, sed narratione potius ab alijs accepisse. In ordine præterea iidem ipsi aberrarunt, partim eorum discrepantes, nullaque cognatione coniunctas uires collidentes: partim per elementa literarum scripta in ordinem digerentes, quò facilius memoriæ mandarentur, genera & eorum effectus à sua cognatione disingentes. Nos uerò ab ineunte, ut ita dicam, iuuentate, iugi desiderio cognoscendæ materiæ allekti, multis regionibus peragratis (nec enim nescis nos militarem uitam exegisse) tuo hortatu commentationem in sex libros contulimus. Quod opus tibi dicamus, Aree, animi gratitudine obsequentes, ob eum quo nos prosequeris affectum. Etenim natura cum in omnes eruditione excultos, tum uerò in eos, quibus cum tibi eiusdem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse soles, in nos etiam aliquantò peculiarius. Enim uero non paruum præbet tuæ probitatis argumentum, optimi uiri Licinij Bassi singularis erga te amicitia: quam unà nobiscum degentes nouimus, cum mutuam inter uos beneuolentiam æmulatione dignam intueremur. Admonitum autem te uelim, eosque qui in hosce commentarios incident, ne in uerbis facultatem nostram æstimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritia curam. Etenim plurima uisu ipsi exactissimè cognouimus: quædam etiam ex ea, de qua inter omnes conuenit, historia, percunctationeque rerum apud singulos uernacularum, diligēter accepimus. Dabimus igitur operam, ut differenti ab alijs ordine tradito, genera singularum medicinarum, uiresque describantur. Quòd autem necessaria sit medicamentorum doctrina, nemo est ferme qui ignoret: quòd ea & toti arti coniuncta sit, uniuerfisque eius partibus efficax administret auxilium. Quare per medicamentorum compositiones, atque misturas, & facta in morbis pericula extēdi, & incrementum capeffere potest, plurimùm conferente singulorum medicaminum cognitione. Quinetiam uernaculam, familiaremque materiam complectemur, ut perfectæ sit, quæ à nobis relinquatur, doctrina. Verum in primis curam impendere oportet, ut suis temporibus singula & demetantur, & recondantur.



tur. certè pro horum ratione medicamenta aut ualent uiribus, aut euanido nulloque munere funguntur. Serena igitur cæli constitutione demetenda sunt. magni siquidem refert inter colligendum, si uel squalores, uel imbres infesti sint: quemadmodum si loca, in quibus prodeunt, cliuosa, & uentis exposita sint, & persflata, frigidaque, & aquis carentia: in his enim locis uires eorum longè ualidiores intelliguntur. Contrà, quæ in campestribus, riguis, & opacis, cæterisque locis à uento silentibus enascuntur, plerumque degenerant, & minus uiribus ualent: multoque magis, si non suo tempore, nec opportunè colligantur, aut si per imbecillitatem intabuerint. Neque ignorandū, ea sæpe pro peculiari loci natura, aut anni clementia, maturius, aut serius adulescere. nonnulla propria ui hyeme florent, & folia pariunt: quædam bis anno florifera. Quare cui in animo est horum peritiam assequi, necesse est cum prima germinatione solo emergentibus, adultis, & senescentibus adesse. Nam qui pullulanti herbæ duntaxat adstiterit, adultam cognoscere non potest: neque qui adultam tantum inspexerit, nuper erumpentem noscet. Quo fit, ut propter mutam foliorum faciem, caulium proceritates, florum seminisque magnitudinem, & id genus alias peculiares notas, nonnulli, qui olim has rerum uarietates non perspexerunt, magno in errore uersentur. Quæ causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas quasdam, uerbi gratia, gramen, quinquifolium, & tusilaginem emittere florem, fructum, & caulem negant. Ergo qui sæpius ad uisendas herbas, & earum natales se contulerit, earum cognitionem maximè consequetur. Scire etiamnum conuenit, sola ex herbaceis medicaminibus veratri genera, nigrum, inquam, & candidum, multis edurare annis: reliqua à trimatu inutilia. Quæ uerò fruticosæ sunt, sicut stæchas, triflago, polium, abrotonū, seriphum, absinthium, hyssopum, & alia id genus semine prægnantia demetantur. Flores quoque antea, quàm sponte sua decidant. Fructus autem, ut maturi decerpantur, necesse est: & semina, ubi siccari cœperint, priusquàm defluant. Herbarum succus, & foliorum elici debet, germinantibus tū primum cauliculis. Lac, & lacrymæ excipiantur, inciso per summum adolescentiæ uigorem caule. Radices, & liquamenta, corticesue ut recondantur, eximere conuenit, cum herbæ suis folijs exiuntur. siccantur etiam expurgatæ inibi, locis asperginem non redolentibus: sed quæ luto, aut puluere sunt obsitæ, aqua elui debent. Flores, & omnia, quæ iucundum odorem efflant, arculis tiliaceis, nullo situ obductis, reponantur. Nonnunquam charta, aut folijs semina, ut perennent, aptè inuoluuntur. Liquidis medicaminibus dēsior materia, argentea, uitrea, aut cornea cōuenit. Fictilis etiā, si modò rara non sit, accommodatur: & lignea, præsertim è buxo: sed ænea uasa ocularijs medicamentis, liquidisque, & omnibus ijs, quæ aceto, pice liquida, aut cedria componuntur. Adipem autem, & medullas stagnis uasis recondi conuenit.

## COMMENTARIVS MATTHIOLI.



**Q**UANTVM oporteat Medicos omnes, qui legitimū in arte nomen sibi comparare student, simplicium quoruncunq; medicamentorum, quæ medicinæ usui competunt, cognitionem, ac facultatem sensibus exactè consequi, non modò hac præfatione declarat Dioscorides Anazarbeus in hac materia cæteris facillè princeps; sed id quoque post Dioscoridem admirabili doctrina pluribus in locis memoriæ prodidit grauissimus autor Galenus: qui hac in re præ cæteris Dioscoridem secutus (ut eius luculentissima monumenta passim attestantur) in simplicium medicamentorum uiribus, ac facultatibus indagandis, relictæ (hoc etiam ipse fatetur) Dioscoridi historiæ palma, omnes, qui in hac materia scripserunt, longè admodum superauit. Quippe tanta animi propensione oblectationeq; cognoscendo-

rum simplicium captus fuit (sciebat enim non posse rite se dici medicum sine eorum scientia) ut nullo magni laboris metu, nullis periculis deterritus, in Lemnum, Cyprum, Syriam nauigauerit, atq; alias plurimas peragruerit regiones, ea demum causa, ut quæ legitima & sincera, quæq; spuria & adulterata essent medicamenta, certò dignoscere posset. Quapropter lib. iij. de medicament. comp. per genera ita scriptum reliquit. Hinc enim puto bonæ indolis iuuenes incitatum iri, ut medicamentorum materiam cognoscant, ipsimet inspicientes, non semel aut bis, sed frequenter: quoniā sensibilibus rerum cognitio sedula inspectione perficitur. cuius rei euidentissimum est indicium, quòd gemini per omnia similes esse nobis uideantur, differentes autem ijs, qui ipsos inspicere consueuerunt. Itaq; herbarum, fructuum, & arborum materiam, priusquàm è terra eximantur, contemplari pulcherrimum est, dum fructus uidelicet futuri sunt, dum eduntur, dum augescunt, & dum uigent. Hæc siquidem continua eorum speculatio docebit te, quando potissimum ipsos commodè decerpas, ac in siccis domunculis repositos custodias. Vos ergo admoneo, amici, ut in hoc quoq; me sequamini, si artis opera pulchrè obire uolueritis. Nouistis enim, quomodo ex omni natione præstantissima quotannis mihi afferantur medicamenta, eo quòd perditū illi omnigenarum rerum cōemptores (Græci ἑταίροις uocant) uarijs modis ea contaminant. Præstiterat forsā non hos solū, sed multò magis etiam mercatores, qui illa aduehunt, incusare, atq; his multò magis ipsos herbarios. item nūll minus eos, qui radicū liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in urbes conferunt: bi siquidem omnium primi in eis dolum exercent. Quisquis igitur auxiliorum undiq; copiam habere uolet, omnis materiæ stirpem, animalium, & metallorum, tum aliorum terrestrium corporum, quæ ad medicinæ usum ducimus, expertus esto, ut ex eis & exacta, & notha cognoscat. Nisi enim hoc modo instructus ad præsentis operis

Galeni nauigationes, ut legitima cognitione secreti simplicia.

Medicamentis adulterantur etiam Galeni tempore.

# In Lib. primum Dioscoridis.

3

operis presidia veniat, uerbotenus quidem medendi methodum sciet, opus uero nullum ipsa dignum perficiet. Et primo de antidotis: Medicus autem (inquit) omnium stirpium, si fieri potest, peritiam habeat, consulo: sin minus plurium saltem, quibus frequenter utimur. Earum genera quisquis toto ætatis illarū decursu nouerit, multis in partibus orbis terrarum reperiet, ut ego in Italia multis in locis inueni, quæ nec quando pullulant, nec quando crescunt, nouerunt isti, qui siccas stirpes tantummodo cognoscunt. Hæc Galenus. Ex quibus satis medicis omnibus perspicuum est, non posse quamquam sine certa simplicium medicamentorum cognitione, nec morbis ratione mederi, neq; artem recta metodo exercere, nec nisi fortuna quadam, uel nature ipsius robore egros sanare. Neq; enim ullo pacto eis ad stipulandum censeo (ut medicorum pleriq; faciunt, & ij sepe, qui primas sibi deferri existimant) qui compositis tantum officinarum medicamentis, ipsiq; admodum uulgaribus contenti sunt. Nam cum satis sibi fore persuadeant, scire Diacatholicum omnes in uniuersum humores deicere, Deiectorium è succo rosarum flauā bilem, Diacnicum pituitam, Diasenam, & Catapotia ex ceruleo atram bilem, Coecia caput & cerebri expurgare, sicuti, quæ lucida nuncupant, oculis, & quæ ex hermodactylis dicuntur, ac quæ fetida uocantur, arthriticis esse peridonea, nihil ultra requirunt: quin potius scire negligunt, è quibus ea simplicibus componantur medicamenta, & an ijs eæ insint uires, quæ suis nominibus pollicentur. an simplicia, quibus constent, legitima sint an spuria, sincera an adulterata, recentia an exoleta, sicca an humore, uel situ corrupta, an suo tempore, & opportune decerpta, sole succata, an umbra, an igne, ut sæpius in temporis angustia officinis fieri solet. Neq; unquam animaduertunt, quod deiectorijs medicamentis, quæ nostro æuo parantur ad bilem deiciendam, semper Scammonuem lacte tithymalorum, ac ptyusa adulteratum, magno egrorum detrimento immiscet. Iis uero, quæ pituitam ducunt, sæpe legitimi Turpeti loco, modo ptyuse, modo thapsie, modo peonie radicum cortices imponunt, quæ impostoriam mangonio ita Turpetum referunt, ut non seplasiariorum modo, sed etiam medicorum quoruncunq; oculos sæpenumero fallant, nisi fraus gustu, & legitimi Turpeti scrutinio, & collatione deprehendatur. In Catapotijs deinde, quæ ex hermodactylis uocant, ephemerum Colchicum legitimi hermodactyli uice, in fœtidis uero cicuta semen pro agrestis rute semine, quorum utrunq; mortiferum est medicamentum, omnes iniiciunt. Adde præter hæc, quod sæpenumero medicamenta ex ijs simplicibus componunt, quæ etate exoleta, nihil uiribus præstant. quo fit, ut penitus euanida, ac inualida reperiantur. Quod etsi quandoq; malitia, ac propria artificum impostura fiat, id tamen plerunq; accidit, ex ipsorum tum incuria, tum etiam imperitia. nam pauci, uel potius nulli habentur pharmacopole (eos semper excipio, qui simplicium historias amplexantur) qui supposititijs, ipsiq; innumeris non utantur simplicibus. Nam quæ asaro utuntur pro bacchare, cytiso pro trifolio, syluestri loto pro fertula Campana, colutca pro sena, acoro odorati calami uice, cypero pro galanga, hierario pro soncho, sphondylis pro acantho, chondrilla pro cichorio, agresti lactuca pro intubo, ophioscorodo pro scordio, quibusdam arborum lacrymis pro succino, thapsia pro turpeto, pice pro pissasphalto, resina larigna pro abiegna, & legitima terebinthina, phyllitide pro aspleno, obscuris quibusdā radicibus pro meo, peucedano, & costo. Ad hæc casiam pro cinnamomo usurpant, santala pro aspalatho, laccam ex brasilio & cocco insectorio confectam pro cancano, Rhodium oleastrum pro agallocho, ossa & carnem humanam pro muonia, macim pro macere, chartam pro papyro, crespinū (sic enim uulgò uocant aculeatā quandā plantam) pro oxyacantha, conuoluulum, siue læuē smilacem pro ligustro, agrestium prunorum succum pro acacia, succum uero bacarū ligustri, et periclymeni pro lycio, nuces, quas Arabes uomicas appellāt, pro metellis ita uocatis, æcros pro gāmaris, ranunculum pro coronopo, saponariam uulgò dictam pro struthio, carduum, quem benedictum nomināt, pariterq; chameleonem album pro leucacantha, parthenium pro artemisia, cotulam fetidam appellatam pro parthenio, canis testiculos (sic enim radices quædam nominantur) pro satyrio, polium pro chamæpity, paronychiā, & trichomanem pro adianto. Cadmia præterea officinis ferè omnibus pompholygem refert, erugo eris florem, eris squama stomomatis (quod chalybē dictum putamus) squamam, sandix minimum, terra quædam mangonizata a sphragidem lemniam, salnitrum nitrum, & aphronitrum. Alia deniq; plura, ac diuersa simplicia medicamenta sunt, quæ ubiq; locorum apud varias nationes, huius, uel illius uice nulla penitus ratione indifferenter subiiciuntur, ubi tum prauam, tum spuriam sibi iandiu uendicant usum, quæ ne uerbosius rem hanc prosequi uideamur, silentio prætermittenda censemus. Hæc autem pluribus in locis non euenirent, si medici omnes ueram, & exquisitam simplicium rerum doctrinam consequerentur, quam maxime, & iure consequi deberent. Quippe materie huius peritiam assecuti, & errorum cognitionem nacli, ne seplasiarij in eiusmodi uersarentur scandalis, obstarent, neq; eis ulla unquam medicamenta confici permetterent, nisi sibi prius perspectis, cognitis, ac probatis simplicibus, quæ in ipsis componendis expetuntur. Dent itaq; iam operam imperiti, ut huiusce materie cognitionem exactè consequantur. quandoquidem artifice nihil quidem execrabilius, ac terrius esse potest, quàm suæ artis subiectum, & instrumenta ignorare. Quod sanè unicuiq; medico usu euenire competit. 30 mus, qui non modò alienis utitur mixturis, sed nec simplicia quidem, nec eorum facultates nouit. Proinde scitè à Galeno dictum est lib. vii. & viii. de composit. medic. secundum locos, quod non poterit, is ex quo ordine eiusdem generis medicamentorum compositum sit, cognoscere, num ex mollissimo, an uehementissimo, aut medio, aut alio aliquo inter hunc, & alios intermedio, qui singulorum simplicium potestatem exactè antea non perceperit. Veruntamen nemo in hac materia se peritum euadere confidat assidua tantum librorum lectione, etsi eos quidem grauissimi conscripserint autores, nisi sæpius ad uisendas stirpes se contulerit, et quod à præceptore in herbarum agnitione diu exercitato, digiti demonstratione prius fuerit doctus, ac oculorum sensu, gustatq; uarijs anni temporibus omnia hæc diligenter omni ex parte perpendat. Id enim, cum maxime perpendisset Galenus (ut sexti libri de simplicium med. facult. præfatione legitur) inquit. Equidem non possem non accusare & illos quoq; qui primi herbarum formas scriptis docere sunt conuati, cum melius existimem ab ipso præceptore oculis discere, ac non adsimilari ijs, qui ex libris prodeunt gubernatores. nam sic et uerior, & manifestior esset doctrina, non herbarum modò, & fruticum, arborumq; sed & aliorum omni- 40

Abque simplicium cognitione recte mederi nemo potest.

Officinarum lapsus.

Officinarum abusus & ignorantia.

Simplicium peritiam nemo potest adipisci ex librorum lectione.

Herbarum formarum descriptionum parum conferunt.

Scripta quorū  
comendat Ga-  
lenus.

Simplicium pe-  
rina à præce-  
ptoribus, non  
ex libris com-  
paratur.

Impositores  
quādoque et  
peritos doci-  
pant.

Scirpes folia  
immutantes.

Scirpium ima-  
gines parum,  
uel nihil pro-  
funt ad simpli-  
cia diagnoscen-  
da.

Vanū & sup-  
stiosū in-  
cationib⁹ uti,  
dū placē effo-  
diuntur.

nium medicaminum. Verum enimvero si omnino libris est opus, quis adeo miser est, ut præteritis scriptis Dioscoridis, Nigri, Heraclidis, Crateuæ, et aliorum innumerorum, qui in arte ipsa consenserunt, libros grammaticos scribentis incantationes, transformationes, et decanorum, demoniorumq; herbas sacras perferat? Et libro primo de alimentorum facultatibus: Optima (inquit) illa doctrina est, quæ uiua uoce traditur, neq; enim quisquam ex libro nauclerus, aut alterius artis artifex euadit. In hoc namq; comparati sunt libri, ut nobis sint eorum, quæ ante didicimus, monumenta, non ut rudes et ignari per illos doctrinam perfectam assequamur. Quod si qui sint, qui præceptoribus careant, uelutiq; ijs, quæ luculente, ac copiose sunt scripta (qui nobis scribendi mos est) diligenter incumbere, magnum ij fructum capient, præsertim si eadem relegere identidem non grauentur. Et primo de antidotis: Quod si nullo (ait) monstrante ex libri alicuius lectione, quales sunt commentarij Heraclidis, Crateuæ, Dioscoridis, aliorumq; quorundam in simplicium medicaminum cognitionem peruenire aliquis uelit, longè maiore ipsi opus est inspectione, ut exactè singularum medicinarum uirtutes, ac uitia diiudicare sciat. Nam qui simplices medicinas diuendunt, tam callide illarum quasdam concinnant adulterantq; ut etiam exercitissimos in eis decipiant. Hactenus Galenus. Ex cuius uerbis manifestè percipi potest, ex libris duntaxat non posse in simplicium agnitione peritum fieri quenquam, etiam si in ipsis stirpium imagines uidentibus persimiles omni exquisito artificio fuerint adiectæ. Siquidem (ut hac in præfatione scribit Dioscorides, et lochiam citatis asserit Galenus) qui in stirpium historia peritissimus euadere cupit, illum quidem uiuas omnium plantarum non semel tantum, sed diuersis anni temporibus inspicere oportet. Quandoquidem plantæ ipse folia aliàs exhibent, cum prima germinatione emergunt, aliàs cum adolescunt, et caule edunt, aliàs ubi flores erumpunt, et aliàs ubi siccescentes maturum gestant semen. Videmus enim apertè populum nigram, sicuti ricinum, per initia folia explicare rotunda, quæ tamen post tempus huic platani, illi uerò triangulari sectione laciniata uisuntur. Sed contra hederæ euenit. quippe huic prima statim iuuenta triquetra folia insunt, quæ uetustiora iam facta quadantenus rotundantur. Scymbrij aquatici folium cum primum erumpit, rotundum est, cum uerò adoleuit, in erucæ modum laciniatur. Lepidio, et nasturtio folia primo exortu circinata, ac circumquaq; apij ferè modo laciniata emergunt: at cum pubescunt, prælonga oleaceis similia euadunt. Quo etiam modo hortense nostrum uulgò petroselinum uocatum cum suis ludere cernimus. Lathyrus amygdalinis folijs caulem uestit, quæ in cacumine ita prioris formæ obliuiscuntur, ut in aristolochiæ, aut hederæ folia degenerent. Nouellus acanthus folio lactucæ longiore uirescit erucæ incisuris diuiso: at senior effectus quedam circa totum caulem folia promit tam crebra, acuta, implicita, densa, ac minuta, ut nucameti speciem quandam referant. Sunt et aliæ nonnullæ, quæ has foliorum mutationes per tempora ostendunt, quarum nomina breuitati consulentes nunc consultò prætereunda censemus. At fieri quidem nequit, ut huiusmodi stirpium uariationes ex libris, in quibus figuræ expressæ, atq; etiam coloribus exornatæ habentur, omnes obseruari possint. quandoquidem plantæ ipse appiet ex tot uarijsq; unam nobis duntaxat imaginem representant. Huc etiam illud accedit, quod ea, quæ picturæ artificio fiunt, etsi ex optimi artificis penicillo emergant, nunquam tamen naturalium rerum lineamenta ad unguè referre, ac exprimere queunt, quanuis etiam naturam exactissime imitentur. Eadem ratione putauerim ex cuiuslibet grauissimi auctoris commentarijs, qui stirpium historiam continent, neminem absolutam earum notionem unquam adepturum esse, quæ maxime medicis requiritur. quippe quod ij suis simplicium monumentis, ac foliorum, caulium, et reliquarum partium historijs, non nisi unam lineamentorum, ac similitudinum enarrationem tradiderint. Quæ tamen uera sint, nullum tamen præbent mutationis exemplū, ut sepe ac sæpius plantis compluribus uarijs totius anni curriculis tum in folijs, tum in caulibus, reliquisq; particulis euenire comperimus. Quo fit, ut hæc uariandi series nullo alio pacto addisci possit, quam longa oculorum exercitatione, dum ætate tota plantæ ipse solo educatæ uirescunt. Ceterum ubi scriptores in suis historijs stirpium notas explicant, illi quidem ferè semper similitudinibus utuntur, acoriorum exempli gratia, xyridem, gladiolumq; iridi similem reddentes. Meon præterea anetho, cyperum porro, asarum hederæ, pbu smyrnio, et hoc illi, et illud huic sæpius comparantes. Vnde fieri non potest, quum aliquis, non prius perspectis unā cum doctissimis ac exercitissimis præceptoribus plantis quibuslibet, cum quibus aliæ inijsse tum similitudinem, tum etiam cognationem narrant auctores; et non habita hoc modo earum ratione, possit unquam ex solis libris cum stirpium imaginibus, uel sine eis editis, in summum et perfectum herbarium euadere. Quamobrem etsi stirpium imagines, quæ magno tum pictorum, tum typographorum studio libris excuduntur, insipientium oculos blandè admodum detineant, atq; illas prius à nobis cognitās in memoriam reuocent; magni tamen eas esse emolumenti ijs non crediderim, qui uisu, et præceptoris auxilio numerosam earundem partem non acceperint prius: quanquam fortasse secus uulgus existimet. Adhibeant igitur curam ij, quibus in animo est rei herbariæ peritiam adipisci, ut in primis uiros huius rei non imperitos sibi præceptores asciscant: deinde ut assuescant per diuersa temporis interstitia, montes adire, ualles, sylvas, ac cætera terræ loca, ubi oculis reliquisq; sensibus simplicia medicamenta inspicere, et cognoscere ualeant. Quos nec pigeat se conferre ad fodinas, ubi metallica et fossilia medicamenta tam diligenter contemplantur, ut legitima quæq; deinde ab adulterinis discernere sciant. Neq; solum in fodinis ipsis uersari debent, sed etiam in fornacibus, ubi metalla funduntur. nam ibi et diphrygem, et pompholygem, et spodium, et cadmiam, et argenti spumam, et alia nonnulla diagnoscere poterunt: quæ hac nostra ætate factitia, spuria, et adulterata in myropolijs ferè omnibus habentur. Quin et ad magna emporia, luculentissimasq; ciuitates se conferant, ubi peregrina undiq; importata ueneunt. At certè ridiculi sunt, qui inter legendum tum herbas, tum etiam radices, uana ducti religione, quibusdam uerborum, carminum, et suffimentorum superstitionibus uti præcipiunt, quasi uires, et facultates medicamentorum uerba, et carminum incantationes infundere, augere, et diminuerè ualeant, ut stulti, et supersticiosi falso credere, et affirmare non erubescunt. Quos tamen lib. v. i. de simp. med. facul. superius citato acerrimè damnauit Galenus, sic inquit. Et Pamphilus cum in modum tractatum de herbis composuit, uerum is ad fabulas uersus aniles est, simulq; præstigiaturus

## 5

**Radicū opti-  
marum ROTÆ.**



Radices quomodo mundandæ, siccandæ, ac conseruandæ sint.

Radices quib⁹ i locis exiccatæ sint ponendæ.

Veratrū utrū que triginta edurat annis.

Non est ab re certis tēporib⁹ herbas colligere.

Herbæ quo pacto legendæ, siccandæque sint.

Plantæ, quæ colligi postulant florib⁹ ornate.

Officinarum lapsus in herbis siccis reponendis.

crem magnitudinem nascis, quæ crassitudinis modum excedunt, & plus humoris in se continent, quàm illis usu uenturæ. Hæc Galenus. Ceterum ubi radices è terra fuerint exemptæ, primum quidem tandiu aqua clara elui debent, donec omni undiq; terra, uel limo penitus abstergantur: mox deradunt à fibris, tum capillamentis omnibus, quibus inuersum ferè omnes comantur: postremo siccari eas conuenit omni adhibita cura. Quod si fuerint quales foeniculi, apij, asparagi, rusci, polipodij, rubiæ, intubi, & consimilium, in umbra, ubi orientales uenti respirent, diligenter siccantur. At omnino cauendum est, ne sole feriantur: quippe quoniam potius earum pars ab eis prorsus euanesceret, utpote raris & tenuibus. Verum enī uero si ex eis fuerint, quæ natura crassæ sunt, ueluti gentianæ, helenij, mandragoræ, bryonæ, & id genus aliæ, & aer sit nubilus, & hyems, ne in umbra situ tabescant, ac proinde marcescant, in sole ac uento tuto siccari possunt. Quod commodius fieri potest, si frustatim dissectæ ita tenui funiculo traiciantur, ut partes non se contangant, aut cratibus impositæ quotidie sæpius manibus reuoluantur. Atqui curandum est, ante quàm siccantur, ut lignea matrix, quæ omnibus ferè radicibus includitur, ipsis in longum scissis, integra eximatur: quippe omnino inutilis est, nullamq; uim obtinet. & si gentiana, cyclaminus, aristolochia rotunda, iris, bryonia, centaurium maius, nymphaea, aliæq; complures absq; matrice suas præ se ferant radices. Siccatis radicibus, quod planè constet eas sine tabe, & terredine per tempora adseruari posse, ijs reponantur in locis, ad quæ solares radij non penetrent, neq; fumo pateat aditus, & quæ neq; uliginosa sint, neq; puluerulenta. Sit igitur locus eminens, & siccus, ad septentrionem uergens, uel etiam ad meridionalem plagam, quando scilicet radices ipsæ non prorsus exiccatae reconderentur: adhibita tamen cura, ne eo tempore austru humidissimi flatus admittantur. Ita deniq; recondi, ac seruari possunt tot annis, quot ab inantitate, terredine, & tabe iudicari ualeant. Nam & si quæ tenues sunt, ut asari, pbi, asparagi, rusci, & id genus aliæ, anteduntaxat perennent; ueratrum tamen utrunq; quauis radicibus constet tenuibus, ad trigessimum annum usq; perdurat. Ceterum demetendi tempus, recondendi locus, perdurandi terminus non modò in radicibus obseruandus, sed & in ceteris tum stirpium, tum etiam animalū partibus, ut in hirci sanguine, lupi iocinore, intestino, ac etiam stercore, iulis pulmone, apri uescia, anguuum senectæ, alijsq; consimilibus. Assumantur igitur hæc omnia eo demum anni tempore, quo magis suis uiribus sunt præditæ, nullo planè modo neglecta temporum ratione, quibus singula decerpi possulant. Neq; enim damnandi sunt, qui in quibusdam plantis colligendis quædam decreta tempora, nonnullosq; errantium siderum affectus obseruant: quippe quod apud graues autores scriptum inuenerint, pæoniæ radices contra comuales non esse euellendas, nisi decresciente luna. Quæ quidem opinio non prorsus reprobanda uidetur, nec ad ineptias incantationum, aliarumq; uanitatū, quas stultè (ut Galenus inquit) prodidit Pamphilus, comparanda. Nam cum inferiora terrestria à superioribus cælestibus gubernentur, & regantur, fieri maxime potest, ut luna, ut quæ ceteris errantibus sideribus est nobis magis proxima, motuq; uelocissima, maximam cum plantis omnibus, ac rebus quibusuis alijs habeat rationem, tum cum augetur, tum etiam cum minuitur singulis mensibus. Quamobrem non temerè à Galeno produrum est, abyssum herbam tantum sirio ardente ad canum rabiosorum morsus esse euellendam, sicuti etiam fluuiatiles caneros ad idem peridoneos. Quo etiam tempore captantur scorpiones, atq; anchusa radice constat sanguineo succo madente. Quemadmodum & stirpes, quibus facultas excoalsciens insit, perpetuò in locis calidis, ac siccis demetere conuenit. Quocirca Hippocrates ad Crateum scribens: Adnitere (inquit) quantum potes, ut nobis montanas maxime, & in altis collibus nascentes herbas à radicibus rescas: quandoquidem hæc firmiores, atque aciores sunt us, quæ aquosioribus nascuntur locis: idq; quod in montibus terra sit densior, & aer tenuior. nam quod attrahunt, frigidius est. Quinetiam dabis operam, ut flores ex his herbis etiamnum decerpas, quæ circa stagnantes aquas, paludes, fluuios, & fontes prodeunt, quas sanè debiles, & exolutas, ac dulcis succi esse scio. Hæc Hippocrates.

Herbæ similiter, atq; radices, legendæ sunt, siccandæ, ac asseruandæ, his tamen demptis, quæ tum in medicinæ usu, tum in cibis, tum etiam in obsoniorum condimentis quotidie uerentes usurpantur, ueluti lactuca, intubus tam domestica, quàm agrestis (cichorum appellant) portulaca, buglossum, beta, atriplex, blitum, brastica, uiola nigra, malua, helixne, linxostis, ocimum, apium, hyoscyamus, sedum, plantago, asparagus, acanthus, & aliæ complures. Atq; non solum refrigerantibus herbis, uerum etiam excoalsciantibus recentibus utimur: plerunq; enim ex calida potestate præditis, uirides siccis præponimus, præsertim ubi minus calefacere sit opus: siquidem humor in uirentibus exuberans earum caloricam facultatem haud parum demulcet. Cuius quidem classis habentur amaracus, crucea, nasturtium, mentha, absinthium, thymus, saturcia, ruta, calanthe, sisymbrium, pulegium, abrotonum, & id genus permulta. Sunt præterea & aliæ, quæ demetri expetunt, cum primum floribus ornantur, ut centaurium minus, uiola purpurea, origanum, symphytum petreum, pulegium, serpyllum, amaracus, polium, thymus, chamædrys, chamæpitrys, anthemis, chrysanthemum, storchas, hyssopum, fumaria, aliæq; cōsimiles plantæ, quas ne longior, quàm par sit, esse uidear, ex industria prætereo. Hæc igitur omnia serena cœli constitutione, non nubibus, non umbris insectis in primis colligantur oportet. Deinde terra expurgata, atq; alijs aduentitijs excrementis amotis diligenter in umbra siccantur. Nisi ex eo genere habeantur, quæ caulis crassitudine, ut in acantho, uel foliorum lentore, crassitie, & humoris exuberantia, ut in portulaca, & crithamo, omnino insolari expetant. quandoquidem si eiusmodi herbæ in umbra siccandæ reponantur, dubio procul situ obducuntur, & putrescent. Ceterum cum rectè siccatae fuerint, decusso puluere, in sacculis ex corio, uel ligneis capsulis reconduntur, ac diligenter clauduntur, ne earum uires euanescant. Quæ in re errant seplariariorum plerique, qui herbas iam siccatas in fasciculos digerentes ad officinarum laquearia suspendunt, ubi non solum breui uiribus destituuntur, aeris ambientis exuptione, ac uentorum perflatu, sed etiam in mille sordum sentinam desciscunt: quandoquidem & puluere, & aranearum telis obsiduntur, ac inde muscarum stercore, quæ illis die, noctuque insident, labefactatæ nigricant. Neque uerò planè laudibus efferendi sunt ij, qui in linteis sacculis, ipsiq; textura admodum raris eas trabibus appendere consueuerunt: quippe æstiuus aer in ipsos penetrans,

retrahens, quicquid boni inest, absorbit, & abolet. quintetiam puluere oblit & corrumpuntur, & cōtabescunt. Idcirco ut tam herbe, quam radices suas integras asseruent facultates, nihil quidem præstatius, quam eas capsulis tiliaceis, uel piceis, uel fictilibus diligenter clausis reponere, ut docet Hippocrates ad Crateum bis uerbis scribens. Omnia medicamenta, quæ succi, & liquores fluidi sunt, in iatris uasis ferantur. quæ uerò folia, aut flores, aut radices sunt, in fictilibus nouis probè obturatis, ut ne uentis perflata, medicamenti uigorem, uelut in animi deliquium collapsa, amittant. Quod si Hippocrates in recentibus obseruandum præcipit, id maxime in siccis fieri operæpretium erit.

Flores insuper non secus, atque reliquæ plantarum partes, eo tempore colligendi sunt, quo magis suo in uigore consistunt, non autem cum iam flaccescentes decidui euanescent. At capparum flores muria asseruandi, antea quam se explicent, decerpuntur: rosarum uerò cum non planè explicati uisuntur: ceteri deinde cum omnino expansis folijs patent. Verum cum maiori ex parte omnes ferè flores sint herbis fragiliores, molliores, & tenuiores; idcirco tantum

Flores quo tempore sint decerpendi, siccandi, ac recohendendi.

abest, ut in sole siccandi sint, ut ne quidem in umbra, si calida, uel eminentia fuerint loca: quippe, ut solis feruore, sic & aeris calore nimio exoluantur. Siccetur igitur in locis temperatis, quo tempore sæpius reuoluantur, ne situm contrahant, adhibita etiam cura, ne sicci natium colorem deperdant. quandoquidem certum est flores, qui inter siccandum à proprio colore degenerant, nullius esse in medicina usus. Flores itaque in uniuersum sicci ad annum duntaxat, edurant, etsi anthemidis, centaurei, chrysanthemi, millefolij, spartij, & rosarum flores etiam longiori asseruentur tempore, si ligneis arcubis optime inclusi diligenter recondantur. Non minori etiam studio sunt colligenda semina tam ea, quæ suis in stirpibus nuda innascuntur, ut lithospermi, phalaridis, fœniculi, anethi, & cari: uel uasculis, aut capitulis inclusa, ut papaueris, nymphae, melanthij, hyoscyami, & ocimoïdis: aut siliquis testæ, ut fabæ, ciceris, phasoli, dolichij, & lupini: aut corniculis recondita, ut fœni græci, fertula Campanæ, sinapis, & erucæ: aut uarijs inuolucris

Flores quando durent.

Semina quomodo demetenda.

contenta; quàm ea, quæ circa medullam quorundam fructuum intus canduntur, quale est mali medici semen, aurantij, limonis, pyrorum, cydoniorum malorum, peponum, & melopeponum, ucurbitæ, & cucumeris. Veruntamen hæc assumere oportet, cum fructus, à quibus eximuntur, suam maturitatem pluri senserint: illa uerò, ubi herbe iam siccæ, non amplius uiuent. Et quamuis multa reperiantur semina, quæ ad annum ultra suas asseruent uires, ea tamen quotannis renouare satius, ac tutius erit: siquidem pauca sunt, quæ inueterata rancorem non redoleant. quo fit, ut calorem nanciscantur extraneum, & sibi non congenitum. Vbi igitur sicca fuerint semina, arcubis ligneis reponantur in locis siccis: facili enim contrahunt locorum humores. Ceterum fructus, quemadmodum prunæ, ferica, myrti bacca, cydonia mala, cerasa (quæ uulgò marasca uocant) corna, sorba, ficus, punica mala, & alia id genus, quæ in medicinae usum reponuntur, operæpretium est, ut maturi ex arboribus decerpantur, quanquam sorba, ut siccentur, immatura decerpere conueniat. At animaduertendum est, quod ubi adstrictione, & repressione sit opus, fructus ad-

Fructus quando decerpendi, & quomodo conseruandi.

stringentes ut paululum potius immaturi, quàm secus, demetantur oportet. Porro uiglandes, amygdala, pistacia, nuclei pinei, & auellana non prius ex arboribus excutiantur, quàm planè ultimum maturitatis gradum senserint. Id autem rectè cognoscitur, cum extrema inuolucra sponte sua dehiscunt, & arbore concussa una cum fructibus decidunt, alioquin insolatu contrahuntur, & sidentur. Ex his igitur, qui siccati asseruantur, capsulis ligneis potius, quàm saccis recondantur, ne extraneos humores concipiant. Qui uerò per annum recentes reponuntur, aut maiori ex anni parte perdurant, in locis siccis minime asperginem redolentibus appendantur, ut assolet de uuis, pyris, malis cydonijs, & punicis: aut super paleas expandantur, ut sit cum malis, sorbis, ac mespilis: aut hordeo, uel milio sepeliantur, quemadmodum medica, & aurantia mala. Cortices præterea, qui fructibus auferuntur, ut citrij, punicis, & cucurbitis: quique arboribus decerpuntur, ueluti thuri, ligno guaiaco, sambuco, ac fraxino: qui item herbarum radicibus detrahuntur, ut capparum, mandragoræ, thapsiæ, alypiæ, pityusæ, ac aliarum, non

Cortices quo siccandi, & reponendi.

secus sunt siccandi, atque radices, quintetiam similiter reponendi. Succique quoque, utpote in medicina admodum necessary, omni prorsus diligentia, ac ratione sunt conficiendi, atque ita asseruandi, ut toto anni curriculo putredinem non sentiant. Igitur non solum ab herbis eliciantur oportet, sed etiam à radicibus, ac fructibus. Qui è radicibus exprimentur, ut Cyrenaicus, & glycyrrhizæ, uere quidem parandi sunt, cum primum folia emergunt. Ex folijs uerò, ante quàm stirpes flores edant, & earum caules lignosi fiant. Ex fructibus denique, quidam cum ipsi ultimam maturitatem senserint, cuiusmodi esse debet malorum puniceorum, citriorum, limonum, & ex myrti baccis: quidam uerò antequàm ad plenum maturuerint, ut ex uiglandibus, moris, pyracantha, ligustri baccis, & acacia: quidam ex immaturis adhuc uuis, ut omphacium. Horum omnium nonnulli diu insolati, aut lento igne siccati reponuntur, ut aloës, syluestris cucumeris, absinthij, eupatorij, hypocistidis glycyrrhizæ, & huiusmodi generis: aliqui uerò humidi, fluxibilesque reconduntur. Atqui non omnibus eadem est conseruandi ratio: quippe alij paululum primum

Succi quo exprimentur, conseruandi que sunt.

ad ignem feruefacti, moxque diligenter defæcati, ut fieri solet de succo rosarum, intubi, buglosi, oxalidis, lupulorum, apij, & fœniculi. Alij uerò ignem non experti tantum subsidere permittuntur, ac deinde uasis tandiu transferuntur, donec defæcati pelluceant. Quod fit de succo malorum puniceorum, citriorum, limonum, cydoniorum, & mororum. Veruntamen diligenti admodum animaduersione opus est (ut Galenus inquit lib. vi. de medicamentorum compositione secundum locos) in succis liquidis conseruandis: quandoquidem facili corrumpuntur, nisi feruefactis prius, & mox à fœcibus omnibus percolatis, olei parum superponatur, ut optime norunt solertissimi pharmacopolæ. Adhuc habentur uaria liquorum genera, quæ quàm plurimis ex plantis distillant, ac destillant, quorum alij gummi, alij resinae, alij lacrymæ uocantur. In gummi genere sunt opopanax, laser, ammoniacum, sagapenum, euphorbium, galbanum, bdellium, myrrha, thus, opocalpasium, sarcocolla, styrax, & id genus alia. In resinarum uerò censu sunt terbinthina, lentiscina, strobilina, pinea, picea, larigna, & abiigna. In lacrymarum denique numero sunt lac, quod ex pauerni uasculis excipitur, propriè opum appellatum, scammunium, quodque ex thapsia fluit, tichymalorum omnium

Gumi, lacrymæ, & resinae.

Dioscorides  
defenditur à  
calumnia.

Simplicium  
nomina uaria  
Dioscoridi a-  
dulterina.

Arbores.

Frutices.  
Suffrutices.

Herbæ.

Plantarum de  
generatio.

Scirpium mu-  
tatio.

*Iac. fencanum*, tragacanthæ lacryma, quicquid defluit è uitis liquor, ex pruno, amygdalo, et ceraso. Quin et illud, quod uulgius Arabicum uocat gummi. quanquam non desunt, qui tam hoc, quam prunorum, cerasorum, et amygdalorum lacrymæ malint in gummi potius referre, quam in lacrymas. Sed quoquomodo res habeat, eò tantum summa harum rerum spectat, ut exacta scilicet earum notitia habeatur. quippe non desunt mangones, et impostores, qui eas adulterent, quemadmodum et medicamenta metalla. Postremo si forsitan cuipiam nasuto uideretur Dioscorides non parua erroris culpa suspectum esse, quod in hac præfatione absolute pronunciauerit, ex omni herbarum genere solam ueratrum multis educare annis, reliqua uero à trimatu inutilia esse, cum tamen in pluribus locis eius sententiæ reclamet Theophrastus antiquissimus plantarum scriptor, dicimus, ut hos ab huiusmodi opinione distrahamus, quod cum Dioscorides extiterit in hac facultate peritissimus, consumatissimus, et omnium facile princeps, grauissimo quoque Galeni testimonio, non modo non credendum uidetur, sed ne cogitandum quidem, quod non calluerit is omnes stirpium proprietates, quodque haud studiosè legerit ea, quæ ante ipsum trecentis, aut pluribus annis posteritatis memoriæ mandauerat Theophrastus, et aliorum ueterum plerique: præsertim cum nobis perspicuum sit, quantum in his rebus describendis fuerit ipse apprime fidelis, et diligens. Verum omnibus persuasum esse debet, quod sicuti in quibusdam locis huius uoluminis scriptura deficit, in alijs spurij additionibus redundat, in alijs quandoque scaturit mendis, scriptorum culpa, atque etiam eorum, qui in scribendis, uel excudendis autorum uoluminibus plus, minusue curæ impenderunt, quam sua interesset; ita etiam in hac præfatione euenisse facile potuit. Quare pro certo crediderim, longè plura hic desiderari, quam ea, quæ hac in re tradiderit Theophrastus, quæ ueratrum ait triginta perdurare annis, aristolochiam quinque, uel sex, chamaeleonta nigrum quadraginta, centaurium maius decem, uel duodecim, peucedanum quinque, aut sex, uitem syluestrem unico duntaxat anno, elaterium centenis annis, ita ut repertum esse attestetur elaterium ducentorum annorum, quod optimum erat, et pretiosum. Harum itaque rerum historias omnes tantum absit, ut credamus non legisse, notasse, ac monumentis tradidisse Dioscoridem, ut ne imaginemur quidem, et si scriptis suis non extent: quin potius locus iste nobis suspectus et deprauatus habeatur. Idcirco non Dioscoridi, sed scriptoribus, et librariorum incuriæ id uitij adscribendum est: quemadmodum additionum redundantia accusantur ij, qui, ut earum autores essent, ab re hoc opus augere, atque illustrare existimauerunt, quales sunt spurie additiones illæ, quæ plura et Græcorum, et Hebræorum, et Arabum, et Chaldeorum, et Aegyptiorum, et Magorum, et Latinorum, aliarumque linguarum nomina coaceruant, atque in omni fere plantarum historia in pluribus uoluminibus Græcis statim occurrunt singulis capitibus. Quæ facile ex Pamphilo deprompta fuerunt, argumento quod (ut superius dictum est) ei rem hanc uitio uertat Galenus, atque sine ulla ratione sint in hoc Dioscoridis uolumen importata. Cuius rei nobis postea præbuit testimonium, quod in quibusdam antiquis bibliothecis legitima Dioscoridis uolumina reperta sint Græcè pluribus centenis annis scripta, in quibus nullum prorsus ex his spurij nominibus legebatur. Quorum uetustam auctoritatem simul cum doctissimo Ruellio secutus, in meis uersionibus Italica lingua conscriptis omnia illa nomina adulterina ab opere abdicauimus, quemadmodum facturum sum in hoc Latino Dioscoride: et si Hermolaus, et Marcellus uulgaris exemplaribus decepti, nomina illa suis interpretationibus reliquerint, tantumquam Dioscoridi legitima. Sed quoniam non minus utile, quam necessarium duximus, ut omnes ij, quibus in animo est plantarum peritiā assequi, sciant ad unguem, quo arbores à fruticibus discedant, frutices ipsi à suffruticibus, et suffrutices ab herbis, dixerim ego Theophrasti auctoritate, omnes illas stirpes arbores appellari debere, quæ ab radice statim simplici caudice surculoso, dissolutoque contumaci assurgunt, à quo per interualla tãquam brachia, exortati latius diffunduntur, uti olea, ficus, malus, pyrus, quercus, ilex, et id genus aliæ. Frutices uero, quæ ab radice caudice multiplici, ramosoque sese attollunt, in quorum classe sunt rubus, rosa, paliurus. Suffrutices, qui inter herbarum genera annuenerantur, ab radice caulem emittunt, lignosis adnascantibus ramulis, folijsque minutis, quæ nõ uelut aliarum herbarum folia quotannis arescunt, et decidunt, sed perpetuis folijs toto anno iurescunt, ut stæchas, iadanum, ruta, hyssopum, salvia, et eiusdem generis alia. Herbarum denique generi subscribunt reliquæ plantæ, quæ inter initia folia tantum sine caule pandunt, ac deinde in caulem erectæ, flores, et semina ferunt, ut cerealium omnia genera, oleræ, quæ in hortis ad cibos feruntur, et syluestrium fere innumera, quæ sponte sua in pratis, campis, ac alijs compluribus locis proueniunt; et si ex eis nonnullæ habeantur, quæ neque caulem, neque flores, neque semina gignunt, ut phyllitis, asplenium, cynoglossum, hemionitis, onosma. His ita determinatis, sciendum præterea est, herbas assiduo quodam cultu, ac diligentia nonnunquam arborescere, quod maxime maluæ accidit. Hanc enim pluries uidi senis, septenisue mensibus cultam tanta caudicis longitudine, crassitudine, et duritie proficere, ut bastæ instar grandesceret. Frutices quoque aut temporis diuturnitate, aut cultorum mangonio in arbores nõ pumilas exeunt, ut uitex, bedera, myrica, paliurus. Contrà similiter fit, ut arbusculæ quædam, si desit alimentum, aut si nullo cultu adhibito dimittantur syluescere, à sua natura ita recedant, ut in frutices degenerent. Quandoquidem hi tum per adultam ætatem, tum per cultus rationem, uendicatos sibi robore, crassos prædurosque fundant caudices, ac ramos. Illæ uero tanquam indomitæ surculis, stolonibus ac germinibus, qui circa caudicem et radices adnascuntur, luxuriantes, solidos ita ramos debilitant, et infirmant, subrepto illis humore, ut in frutices sensim elanguescant, ut myrtillo, lentisco, et corylo quandoque euenisse comperimus. Tanti enim in plantis naturæ germanitas potest, ut non solum sepe prædictos præstet effectus, sed etiam ut alteram in alteram stirpem facile uertat, ut cassia in cinnamomum, silymbrium in mentham, triticum in lolium, hordeum in auenam, et ocimum in serpyllum. Porro ex his omnibus herbarum generibus quædam satiuæ sunt, quædam agrestes. Has uolunt nonnulli priores fuisse satiuis, cum earum permultas domita cultu feritate mansuescere in hortis liquido constat: et si in permultis quoque et syluestre, et satiuum genus inueniatur, quarum aliæ fecundæ sunt, aliæ steriles: aliæ florent, aliæ floribus orbantur: aliæ perpetuis fronde iacent, aliæ folia amittunt. Quod non aliunde prouenire scribit Theophrastus

*fabratus, quoniam à loco ipso, ubi nascuntur, sicuti ab aëre eas ambiente: tametsi id accidat interdum particulari radicū  
tuo. Magni quippe refert, ut fecunde, floride, & perpetuo uirentes plantæ conferuentur, si clemens cæli consti-  
tutio, sit usq; germanitas adsit. Quare nil mirum, si circa Memphim, & in Elephantio agro sicubus, ac etiam uiribus  
folia nunquam decedant, quodq; in insulis alijsq; regionibus nuper in Indijs occidentilibus à Lusitanis, et Hispanis re-  
pertis, nulla spectetur arbor, quæ sempiterna coma nõ uireat. Neq; item admirandum, quod reperiantur arbores pro-  
ceriores, uirentiores, aspectu pulchriores, & magis frondibus, & fructibus exornatæ in hoc loco, quàm in illo: namq;  
aliæ hoc sibi letantur, aliæ illo pro suæ quæq; naturæ ratione. Proinde uidemus, quod quæ montes amant, ut cedrus, la-  
rix, abies, pinus, picea, terebinthus, buxus, iuniperus, sagus, carpinus, ibi proceræ admodum, formaq; insigni prospi-  
cunt. Quemadmodum in planities & collum nemoribus quercus, & cernus, suber, ilex, lotus, ulmus, acer, fraxinus,*

Plantæ melio-  
res cæli cle-  
mentia, & lo-  
ci amicitia.

Plantarum si-  
tus naturales,  
ubi lætæ na-  
scentur.

*corylus maxime proficiunt. Iuxta flumina, & in aquosis lætiores proueniunt platani, alnus, populus utraq; myrta,  
salix, hirsutudo; etsi harum permultæ non eque lætæ in montibus, uallibus, planis, & syluis exultent. Id quoq; dis-  
serminis in herbis, & fruticibus uisitur. quædam enim paludibus enascuntur: aliæ in lacubus, & stagnantibus aquis  
exiunt: aliæ litora, & fluuiorum ripas desiderant: quædam humidis, aquosos, uliginososq; amant tractus: quædam  
aquis odere, & ob id arida, & saxosa sequuntur. Nec etiã desunt quæ in humidis & siccis locis uitã ancipitem agant.  
Sunt deinde quæ in campestribus degere cupiant: quæ uinetis lætentur: quæ pratis gaudeant. Præterea quæ ualles, quæ  
colles, quæ deniq; eduos querant situs. Aliæ quoq; urbanioribus locis allecæ iuxta urbem, et oppidorum mœnia in ma-  
cerijs, & rudetibus prodeunt. In palustribus, & humentibus locis, ac secus magnarum scrobium aggeres feliciter  
enascuntur plantago, coronopus, potirum, scordium, ranunculum, eleoselinum, sphondylium, lysimachia, alisma,  
chelidonium minus, epinedum, pentaphyllum, erinus, equisetum, limonium, heliotropium paruum, uerberna, tusilago,  
hydropiper, onobrychis, conyza terti generis. Et magis palustribus gaudent cyperus, typha, sparganium, iuncus. At  
tam lacunosis, quàm admodum palustribus innatant nymphaea, potamogetum, lotus Aegyptia, colocasia, folijs & in  
aquis conditis, & extra eminentibus. Malabathrum similiter in Indis paludibus nascitur, atq; nobis in Italia oryza,  
hippolapathon, ac millefolium stratiotes. Tribulus æque in lacubus, paludibus, fluminibus nascitur, atq; in mari: quo-  
rum litoribus, ac ripis familiare spectatur nerium. Adiantum, itemq; trichomanes uliginosis specubus gaudent, præ-  
sertim si secundũ amnes existant: aut aspergunosas sequuntur ripas, quæ præruptis locis inhærēt. Vitex deinde, elichry-  
son, bubonium, botrys, rha fluminum ripas accolunt. Crithonum uerò, brasia marina, chamaeleo niger, androsaces,  
corniculatum papauer, dorycnium, solanum somniferum, glauc, hippophaës, hippophaëstum, tragium, tithymalus pa-  
ralus, peplis, alypon, absinthium seriphium in maritimis tum litoribus, tum scopulis, tum etiam collibus emergunt.  
Tripolum etiam in maritimis exurgit, ubi scilicet alludit unda, iterumq; recedit; modo in mari, modo in sicco degens.*

*Non nisi aquis proueniunt byron, thalassion, & alga. At in riguis fontium, præsertim quæ hyeme tepefcunt, sion, atq;  
aquaticum sisymbrium unã innatant, ut quasi uiuicem fraternam uideantur iniisse amicitiam. Ceterum ex his, quæ in  
continenti nascuntur, arida, & siticulosa loca petunt eryngium, satureia, luthospermon, lycium, salvia, stachys, onof-  
ma, lonchitis, cynoglossum, echium, buglossum, chamaepitys, ueratrum nigrum. Aridissimis, & saxosis exurgunt cap-  
paris, libanotis, symphytum petræum, saxifragum, helxine, hemionitis, sed utrunq; genus, cotyledon, cymbalion, po-  
tyrrichon, paronychia, asplenium, clinopodium, circa, lichen, ita ut harum pleræq; sæpius in edificiorum ruinis, ac  
saxosis admodum locis uirescant. In opacis autem simul & aridis nascuntur Helenium, chrysocome, asarum, uiola pura  
purea, astragalus, & cyclaminus. In humidis clematis altera, quæ & secus aggeres inuenitur: item phylliris, Colu-  
lum amœnitæ capiuntur spartium, nepeta, syluestre cucinum, chamaedrys, & si non oderit etiam aspera, & saxosa:  
item phalangium, thymum, quod etiam petroso solo nasci uidemus: quin & holostium. Culta deinde uirent lagopode,*

*elatine, ormethozalo, coriandro, hyacintho, hypecoo, apio alio ab hortensi, chamaecisso, egilope, osyride, aphaca, oroban-  
che, melanthio, bupbthalmo, anthemide, syluestri papauere, xypbio, leontopetalo, pœnice, hyperico, cyano. Inculta  
uero uirent psyllio, hieracio. Pratis lætantur trifolium, lotus syluestris, anonis, daucus, carian, tragopogon, oxylapa-  
thium, centaureum minus, hemerocallis, colchicum, betonica: quanquam hæc & colles, & montes abunde scateant. In  
uinetis aluntur telephium, portulaca syluestris, peplus, helxine,hederacea, anaploptasum, capnos. Tam intra, quàm  
extra oppida, & urbes in plateis, monumentis, parietinjs, rudetibus, propter muros, & hortorum sepimenta uisita-  
tur uerbascum, blattaria, thlaspi, beris, malua, chelidonium maius, urtica, ebulus, sambucus, erysimum, aristolochia lon-  
ga, marrubium, chrysanthemum, galiopsis, senecio, terrestris tribulus, sideritis, eupatorium, hyoscyamus, cicuta, persea  
nata, xanthium, syluestris cucumis. Campestria cardui omni genere horrent, atrachyli, ferulis, syluestri steniculo,  
græne, thalictro, bunio. Agrorum, & pratorum sepibus hærent ruscium, asparagus, rubus, rhamnus, ligustrum, ru-*

*bia. Ephemeræ autem, hippoglossa, filice, planities sylue uirescunt. Montes adamant nardium tam indicum, &  
Syriacum, quàm Celticum, & montanum, centaureum maius, mandragora, bastula regia, satyrium, gentiana, ligustici-  
um, alysson, smyrnium, ueratrum album, ruta syluestris, polemonia, polygonatum, tithymalus characis, polium,  
ptarmica, thymelea, chamaelea, glycyrrhiza, asclepias, narcissus, thapsia, peonia, ethiopsis, chymenum, onagra, caca-  
lia, aconitum, laphnoides, hyssopus agreste, peucedanum, chamaedaphne. In syluis montanis emicat leucacantha, atq;  
inibi in præruptis locis petroselinum, & Rhodia radix. Sunt præterea, quæ arboribus innasci uelint, in quibus  
resident, atq; ab ijsdem suscipiunt alimentum, ut agaricum, iascium, sphagnos, polypodium, dryopteris, lichen. Aliæ quin-  
dem in arboribus conspiciuntur, aliæ uero prius è terra exortæ, per arbores repunt, quemadmodum labrusca, uitis  
nigra, byronia, hederæ, clematis altera, simlex tam læuas, quàm aspera, lupus salustarius, conuulsiulus, periclyme-  
num. Non desunt etiam herbe, quæ sine radicibus in alijs herbis prosiliunt, neq; alibi, quàm in illis reperiantur, ut caca-  
lutha, epithymum, epithymbium, & epistabe. Veruntamen illud scire conuenit, quod & si harum omnium quæque*



Plantarum in  
radicib' varie-  
tas.

Radicum dif-  
ferentia in co-  
lorib' & sapor-  
ibus.

sua natura felicius proueniant in predictis locis, suosq; unaqueq; sequatur situs; nihil tamen obstat, quin eadem modo in montibus, modo in planis, nunc in collibus, sepe in uallibus, nonnunquam in agris, et pratis, ac etiam in alijs uarijs locis nullo discrimine inueniri possunt. Et haec satis sint quantum ad natalem plantarum situm. Ceterum ut quantum per me fieri potest, hanc rerum non minus utilis, quam necessaria doctrina excitetur, augeaturq; etiam ad singulas herbarum partes noster se conuertet sermo, et de radicibus, folijs, caulibus, floribus, ac seminibus differemus, primo à radicibus, ueluti à basi aliarum partium, rem ipsam exordientes. Frumentacea igitur omnia multis nituntur radicibus, ijsq; tenuibus. Legumina uero singulas habent radices praeter fabam, easq; surculosas, et duras. Sic et olea ferè omnia singulari radice coherent, ut lactuca, apium, beta, buglossum, intubus, cichorium. Quinetiam radice singulari sustententur sylvestris ruta, quam harnalam uocant, peplos, crateogonum, ephemerum, et sepius uerbenaca. Contra numerosis radicibus donantur asarium, phu, baccharis, ueratri genus utrunq; capparis, crithamum, hastula regia, chelidonium minus, asclepias, circea, alcea, ethiopis granè, filix foemina, muris auricula altera, platago, chrysocome, asparagus, ruscus, hippoglossum, panaces Heracleum, hemonitis, peonia foemina, alisma. At nardi Indici, et Celtici radix in spica modum capillatur. Praegrandi, firmaq; radice exurgunt belenium, bryonia, mandragora, scammonium, sylvestris cucumis, uitis nigra, rapum, nymphaea, colocasia, radix Rhodia, et China nuper ex Indijs occidentilibus importata, dracunculus, aloè, centaurium maius, libanotis, sphondylium, cenanthe, symphytum secundum, papauer corniculatum, raphanus, carduus, periclymenum, solanum somniferum, smilax aspera, thapsia, hippophaes, hippophaestum, thymalus characias, pityusa. Contra exiguum, tenuemq; radicem gignunt hydropiper, catanances genus secundum, ranunculum, panaces Asclepium, et Chironium, phalangium, trifolium, anthyllus, bechium, onobrychis, hellestium, britanica, epimedium, onagra, tragium secundum, leontopodium, uerbenaca supina, phytium, pancratium, aconiti tertium genus, chamacissos, asarium, utrunq; ueratrum, plantago minor, coronopus, sesanoides, origanum sylvestre, alypson, atractylis, heliotropium maius, onosma, rubia, cepaea, alisma, betonica, chamefysce, meon, gingidium, centaurium minus. Radices in lignum durescunt ethiopidi, smilaci asperae, poterio, leucacanthae, astragalo, thymalo characiae, cypero, rhododendro. At mollis, lenisq; radice constant althaea, acanthus, alcea, malua. Geniculatae ueluti arundinibus, sunt tridi, acoro, polygonato, rusco, numphaea, xyridi, hippoglossi, graminis, lauro Alexandrinae, colocasiae, galange, gingiberi, radici Cbunae nuper inuenta, et Rhodiae. Radicem digiti crassitudine fundunt orobanche, eryngium, polygonatum, peonia mas, pyrethrum, daucus, pastinaca sylvestris, symphytum petraeum, dorycnium, ebolum, echium, crithamum, elaphoboscium. Bulbosae autem insunt caparum modo, lilio, hemerocalli, cepis, bulbis, hastulae regie, allio, porro, croco, narcisso, xiphio, testicularium omni generi, satyrio, ornithogalo, utrisq; ephemeris, arisaro, hyacintho, dracunculo, ampelopraso, scorodopraso, moly. In globum extuberant radices aristolochiae rotundae, cyclamini, apij uomitorij, leontopetali, cenanthes, peoniae foeminae, rapum, chrysogoni, periclymeni, cyperi, argemones, catanances secundae, pycnocomi. Insuper radices inter se disident, tum colore, tum odore, tum sapore: quae discrimina si rectè cognoscantur ab his, qui breui hanc facultatem assequi desiderant, non parum inde haurient utilitatis. sicut et maxime confert scire, quae sint radices magnae uel paruae, quae durae uel molles, quae numerosae uel paucae, quae caparum uel tuberculorum effigie, quae deniq; geniculatae, de quibus hucusq; abunde differuimus. Sed iam de coloribus agamus. Nigricat foris chrysogoni radix, et si candicet intus: item papaueris cornuti, nardi montani, helenij secundi, cyclamini, chameleonis, cardui, hastulae regie, libanotidis, rhabontici, quanquam huius interna rubescant, peucedani, leontopetali, epimedium, nymphaeae, eryngij, symphyti secundi, smyrnij, echij, ueratri nigri, astragali, anemones, mandragorae, aconiti tertij generis, thapsiae, personatae, filicis maris, uitis nigrae, aristolochiae utriusq; quarum tamen interna buxco colore pallent, peoniae foeminae: tanetsi huic, sicut etiam thapsiae, et mandragorae delibrata exalbeat. Contra è candida proueniunt radice plantago, polygonatum, dracunculus, arum, arisarium, ranunculum, ueratrum album, anonis, ligusticum, asparagus, ruscus, hippoglossum, elaphoboscium, libanotis, sphondylium, rapum, radix, circea, alcea, hellestium, tragium, trifolium, narcissus, allium, porrum, gingidium, iberis, hipposelinum, tripolum, iris, panaces Heracleum, tragium, somniferum solanum, arctium, onagra, chamacissos, scammonium, althaea, pityusa. At non prorsus albae, sed subalbidae radices tributa sunt aro, polemoniae, belenio primo. Rubent rubiae, centaurio magno, rhabontico, rhabarbaro, tanetsi tria haec exterius nonnihil nigricent: item pentaphyllo, heptaphyllo, betae tertij generis, blito, carotae, anchusae, lycopsi, onosmati, chrysogono, quanquam exterius nigricant. Non plane rubrae, sed subrubrae radice sunt acanthus, phu, satyrium erythronium, xyris, radix Rhodia, solanum somniferum, alypium, costus. Ex atro rubescunt filici foeminae, cypero, pycnocomo, ephemero Colehico. Rubro colore purpurascunt radices symphyti petraei, cepari, scille, pancratij. Flaua intus radice sunt aristolochia rotunda, glycyrrhiza, lapathium, hippophaestum, cyperus Babylonicus, argemone, chelidonium maius, gentiana. At herbaceo colore insunt polypodio, phalagio, smyrnio, et imperatorie. Odorata radice fragrant iris, acorus, meon, cyperus, galanga, zedoaria, nardum tam Gallicum, quam Indicum, asarium, phu, caryophyllata, baccharis, ligusticum, pastinaca, angelica, fefeli Masiliense, hipposelinum, smyrnium, libanotis, asclepias, circea, alisma, tripolum. quin et radix Rhodia odorem exprat non inuicuum dum. Dulcedine gustui praebent glycyrrhiza, tragopogonis radix, centaurij maioris, chameleonis albi, elaphoboscij, geranii, arctij, polipodij. Amaritudinem uero gentianae, ranunculi, belenij, dictami candidi, leucacanthae, panacis Heraclei, hippophaeis, pancratij, scille, cichorij, asparagi, rusci, centaurij minoris, chelidonijs maioris, asphodeli, cyclamini. Acri autem radice deprehenduntur gingiber, acorus, galanga, zedoaria, imperatoria, crocodilium, angelica, panaces erythronium, smyrnium, pyrethrum, alisma, tripolum, raphanus tum satiuus, tum sylvestris, utraq; iberis, nasturtium, thapsia, argemone, hydropiper, arum, dracunculus, erysimum, ophioscorodon, ampeloprasum, scorodoprasum, cepa, allium, porrum, scandix. Quo fit, ut si exacta notitia differentiarum habeatur, quae in radicibus forma, numero, colore,

re, odore,

re, odore, ac sapore notantur, maximum inde percipiant emolumentum ij, qui magna animi delectatione in hac simplicium medicamentorum facultate operam impenderint. Ac praeterea plurimum ijsdem contulerit, si omnes stirpium deimeationes, similitudinesq; (de ijs intellige, quae scriptis tradi possunt) tum earum pariter et odores, et sapes assequantur, eo inquam modo, ac ratione, quo hic à nobis adnotata reperiantur. In primis igitur à similitudine, quam inter se inuicem plantae, exorsus pro uiribus enitar, ut quae plurimis ignota sunt, ijs, quae omnibus sanè uulgares apparerent, rectè comparentur. quapropter ab hederæ primion, ut quae neminem lateat, rem ipsam auspicabor. Hederam igitur folijs emulantur, etsi quaedam maiora, quaedam uerò minora cernantur, scammomum, asarian, uterq; cyclaminus, similax aspera, leuis, et bortenensis, uitis nigra, marina brastica, Aethiopicum seseli, perichymenon, aristolochia utraq; asclepias, epimedum, gramen parnassi, apocynum, iola purpurea, chamæcissos, helxine cognomento cissampelos, cyno-  
**20** crambe, hortense solanum, haliacabum, circaea, cucumis tam syluestris, quam satiuus, utraq; clematis. Vitigineum solanum representant platanus, acer, lupinus, ricinus, bryonia, uer atrium nigrum, balsamina, colocynthis, cucumis, quem Veneti anguriam uocant. Alba spina, et acanthium simili uidentur folio: sicuti abrotonum foemina, et absinthium seriphium uocatum folijs se inuicem imitantur. Vitex, et anagyris et folijs, et ramis conueniunt. Apij folia referunt caucalis, secundum dauci genus, laserpitium, smyrnium, bunium. Amygdale fronde uestiuntur persicus, rhododendrum, ebulus, sambucus, staphylo dendron, lathyrus, quam officina cataputiam nominant. Anisum deinde isopyro folijs adstri-  
 pulatur, anagallis anthyrrino, atriplex xanthio. Vtriusq; rubiae folia imitatur aparine, ac galium: quanquam illis maiora huic uerò minora spectentur. Porri, bulbiq; folia praeseferunt hyacinthus, narcissus, allium, colchicum, cyperus. bastula regia, ampeloprason, scorodoprason, canini testiculi, lonchitis. Buxus, et lycium consimili comantur fronde. Vitis alba anomo folijs correspondet, pyrethrium syluestri dauco, hemionitis dracunculo, cortex ericæ. Foeniculi folia  
**30** emittunt altius apparagus, panaces Asclepium, seseli, daucum Cycticum, anthemis, libanotis, bupthalmos, anethum, thapsia. Anethi folijs assurgit meon. Plantaginis non dissimilia sunt folia candidi ueratri, gentianæ, alismatis, et chymeni. Phorij folium geranium exprimit. Filicem folio emulantur sideritis secundum genus, polypodium, dryopteris. Ferula cicutam foliorum imagine refert, haec uerò myrridem. Buglossum, uerbascum, et cirsium consimili modo foliantur. Graminis folium proferunt moly, holostium, gramen arundinaceum, coronopus. Huius uerò folia habent catanance, psyllium. Cichorium, chondrilla utrunq; genus, et quod quibusdam dens caninus dicitur, cõsimili sunt folio. Cnico atrastylis folio assimilatur, chameleoni nigro crocodilium, chameleoni albo silybium. Glasto tripolium simile est. Coriandri folijs comantur parthenium, adiantum, sideritis tertia, omnia ranunculi genera (quorum tamen quaedam proprius, quaedam longius eius speciem sequuntur) uterq; daucus, thalictrium, capnos. Helxines folia produunt anagallis, alsine, muris auricula: cannabis, aut quinquemfolij eupatorium, sed quae quadripartito diuidantur. Cotonei mali frondem ex-  
**40** hibent capparis, solanum somniferum. Smyrni folium praestant phyllo, lauer. Cupressi effigiem promittit sabina: iuniperi cedrus. Hypericum, androsæmum, ascyrum, folio non discrepant. Cistibus, et ladanus sicuti in specie, ita et in folijs conueniunt. Cyclamini folium pandit aconitum primum, ciceris teucrium, securidaca: cumini syluestris stratiotes millefolium: cucurbitae personata: folij phoenix: iuglandis centaurium maius, peonia mas, gentiana; etsi huic magis cum plantagine conueniat. Iridis folia reddunt acorum, medion, syluestris iris: item gladiolus, nisi hic breuiora, angustioraq; folia sibi uendicasset. In iunci specie collocandum esset utrunq; equisetum, sed inani caule assurgit. Lenticulae folium simulant aphaca, onobrychis, chamæsyce, belenium alterum, anonis, trichomanes, polygala, glaux. Laureæ fronde uidentur polygonatum, clematis prima, daphnoides, nerium, chamædaphne. Lily folia spargunt hemerocallis, panacratium, satyrium, martagon (sic enim appellant liliū quoddam agreste) ephemeron, onagra. Lenticulam referunt glycyrrhiza, tragus. Nec lepidum arabis dissimulat. Lactucæ effigie folia ferunt dipsacus, syluestris lactuca, lycopsis,  
**50** anchusa, syluestre glastum, mandragoras foemina. Linguae bubulae similia sunt symphyti alterius folia. Myrti folia ruscus habet, tithymalus foemina, et canirubus. Menthæ satiuam folio expriment sisymbrium, hydropiper, pentaphyl-  
 lon. Marrubij effigie assurgit apiastrum, ballote, horminum, sideritis prima. Mercurialis folio uidentur helxine, elatine, cynocrambe. Nasturtij folijs iberis non refragatur. Oleam emula foliorum facie representant almus, ptarmica, pbil-  
 lyrea ligustrum, uitis, conyza, thelygonum, caninus testiculus, lithospermum, dorycnium, hippophaës. Platanum folio imitantur ricinus, nigrum uer atrium, sphondylium, aconitum cynoctonum. Verbasci folia fundunt belenium, ethiops, arctium, buglossum, et tithymali genus latifolium. Pastinaca, et gingidium folijs inter se non dissident. Portulacæ fo-  
 lio assimilantur telephium, cepaea, crithanum, terrestres tribulus, tithymalus belioscopius. Trifolio correspondent loa-  
 tus syluestris, medica, cytisus, fertula Campana. Thymum, stoechadem, satureiam simile comat folium. Acuta spina, et messili primum genus simili uidentur folio. Nec dissimili pulegio, dictamnium et calamintha comantur. Myricæ sabina, et  
**60** cupressus: serpylli clinopodium: saluiae sideritis prima, horminum, uerbascum syluestre, folijs uestiuntur. Piccae foliū ferunt polygonum, et pityusa: quercus uerò chamædryas, teucrium, scordium, betonica, sideritis prima. Neq; à rutae folijs dissident acacia, centaurium minus, serpyllum syluestre, ambrosia, polygonum primum, androsæmum, polemonia, peplus, paronychia, hypericum, apios. Aloe, et scilla similia tributa sunt folia. Sampsuchi folium ostendunt mar-  
 rum, et panaces chironium. Solani folio germinant circaea, haliacabum. Rumicis folia emulantur arum, phyllitis, bri-  
 tanica, et quae uulgò bistorta dicitur. Foliorum similitudine inter se certant ruscus, hippoglossum, laurus Alexandri-  
 na. Aspleni imaginem praebent myrtis auricula altera, et altera lonchitis: sicuti semperuiui minoris tertia augee spe-  
 cies, aristolochia clematidis. Salicis fronde prouenit lysimachia, fertula Campana ligusticum. Silybus, chameleo albus, carduus, alba spina, sese folijs imitantur. Ex his igitur facile quisq; herbarum germanitatem, cognitionem, similitudi-  
 nemq; perdiscere poterit. quae omnia in dignoscendis stirpibus non parum adferunt utilitatem. Ceterum plantarū  
 omnium folia non modicam in coloribus differentiam habent, tamen si folia ipsa coloribus adeo perspicuis, uti flores  
 haud quaquam

Foliorū in plā-  
tis cōparatio,  
& similitudo  
inter se.

Foliorū in co-  
loribus discri-  
men.

haud quaquam splendunt. Niger sane color in nullis reperitur herbis, neq; arboribus. quauis nonnullæ atro quodam  
 uirore sint suffusæ, ita ut paululum nigricent, sicut phillyrea, buxus, ligustrum, hortense solanum, nigra uiola, osyris,  
 hyoscyamus, utraq; clematis. Contra nec filia habentur, quæ niueum candorem expriment. uerum pleraq; quæ me-  
 na sunt, subalbicant, ut crithamo, echio, ranunculo, abrotono, absinthio, saluie, calaminthæ, maro, periclymeno, cornu-  
 lato papaueri, stachy, menthastrum, althææ, polio, uerbasco, utriq; lychnidi, et mandragoræ mari: quæ omnibus super-  
 ne candicant, quemadmodum inferne rosmarino coronario, bechio, oleæ, populo, artemisîæ, et alijs multis. Rubet  
 punice malo, amygdalo, lentisco, terebintho, rhoi, cyclamino, botry, cori, androsæmo, ascyro, lonchiti, osyri, blito, ama-  
 ranto, phyco marino, sesame, irioni, atriplici, alypo, Celtico nardo, et cuidam betæ generi. Folia, quæ lanugine pubent,  
 insunt dictamo, uerbasco, lychnidi, gnaphalio, acanthio, althææ, menthastrum. Aspera sunt symphyto alteri, marrubio, fe-  
 co, saluie, ballotæ, et bormino. Aculeis horrent folia buglosi, echij, urticae, eryngij, rusci, lycij, atractylis, sonchi, 10  
 chameleonis utriusq; dispaci: quinetiam cardui omne genus. Humi tacent panacis folia, coronopi, anchusæ, mandra-  
 goræ, utriusq; anagallidis, cynoglosi, glaucij, catanancæ secundi generis. Reptant etiam hiemi lithospermi, graminis,  
 onosinatis, canis testiculi, albiq; chameleonis. In uniuersam plantæ omnes, quæ caule, et floribus orbantur, folia per  
 terram spargunt. Acuta folia, ut quæ olfactu nares feriant, data sunt allio, cepis, nasturtio utriq; tam aquatico, quam  
 terrestri, sinapi, crucæ, lepidio, gingidio, hydropiperi, crysimo, clematidis secundæ, thlaspi, serpyllo, thymo, thymbræ, si-  
 symbrio, pulegio, calaminthæ, dictamo, dracunculo, aro, flammulæ, origano. quæ omnia non modo olfactu, sed magis etiã gu-  
 stu acrimoniam præbent. At amaritudinem possident chondrilla, cichoriū, gentiana, ruta, absinthiū, aphaca, abrotonū,  
 scandix, aloë, fantonicū, seriphium, chamædrys, marrubiū, scordium, glaucium, chamelea, empetrū, et quæ uulgò gra-  
 tia Dei deiectionis facultatis herba dicitur. Odorata folia sunt asaro, sio, sisymbrio, mentha, methaistro, calaminthæ, pu-  
 legio, saluie, ladano, hyssopo, sampsucho, origano, thymo, serpyllo, satyria, symphyto petræo, rosmarino, ligustico, 20  
 stachy, malabathro. Nec insuauē efflant odorem chamædrys, baccharis, artemisîa minor, et herba illa, quæ aliqui sela-  
 ream, nonnulli herbam sancti Ioannis, et pleriq; matrisaluiam nuncupant. Nec desunt stirpium folia, quæ ab alijs tunc  
 plantis, tum liquoribus odorem emendicasse uidentur, ut scordium ab allio, trifolium à ruta, et bitumine, cytisus ab er-  
 ca, apiastri à citreo malo, chamæpitys à pino, xanthium à nasturtio: ita deniq; hydropiper à pipere mutuatur odorē.  
 Grauius olent absinthium, abrotonum, seriphium, ballote, polii, ebulus, botrys, aristolochia, cannabis, anagryis, galio-  
 psis, cicutæ, mandragoræ, apocynum, glaucium. Non parum quoq; discriminis in plantarum tum caulibus, tum stolo-  
 nibus reperitur. quandoquidem ex eis quædam singularem, simplicemq; caulem proferunt: aliæ numerosos caulicu-  
 los edunt: quibusdam crassi caules insunt: alijs tenues assurgunt: alijs inanes, et uacui eriguntur, fistularum, et  
 arundinum instar: alijs pleni conspiciuntur: quibusdam item longus profilit caulis, quibusdam uerò breuior: nonnul-  
 li caules geniculis scatent, alij enodes exeunt, alij læuore, alij scabritia, alij durtia, alij lentore notantur. Nec desunt, 30  
 qui lanugine uestiuntur, et qui spinis, et aculeis rigeant. Quibusdam plantis teretes sunt, nonnullis quadranguli, et  
 aliquibus striati. Alij deniq; sursum eriguntur, alij per terram serpunt, ac repunt. Dissident præterea inter se stirpium  
 caules colore, rectitudine, et curuitate: tanta fuit naturæ in plantis formandis uarietas, atq; solertia. Plures igitur  
 caules ab una tantum radice exiliunt glasto syluestri, ptarmicæ, plantagini, muris auriculæ, telephio, aristolochie  
 utriq; rutæ syluestri, hyperico, elatine, phoenici, trago, solano somnifero, et manico, minori sedo, chamæcisso, glauci,  
 osyri, tithymalo paradio, et helioscopio, thymelææ, heliotropio magno. Ramoso, ac pariter surculoso caule fructuant  
 saluia, satyria, thymum maius, origanum, hyssopum, absinthium, abrotonum, ruta, stoechas, ocimum, amaracum, sym-  
 phytum petræum: et ut summam rem complectar, omnes deniq; plantæ, quæ suffrutices appellantur. Crassum cau-  
 lem mittunt dracunculus, chamæleo niger, ænanthe, helenium, symphytum alterum, hyoscyamus, personata, sedū ma-  
 ius. Contra proditur tenuis ornithogalo, thlaspi, polemoniæ, ranunculo, limonio, anemone, ligustico, panaci Asclepio, 40  
 peucedano, artemisîæ, phyllo, cynocranthe, buphthalmum, alismati, betonicæ, echio, eupatorio, plantagini, chelidonio ma-  
 iori, muris auriculæ, aristolochiæ utriq; seripho, tragorigano, mentha, sisymbrio, lysimachie, rutæ syluestri, delphi-  
 nio, melanthio, agresti cumino, aparinæ, chamædry, scordio, teucrio, trifolio, hyperico, sideriti secundæ, elatine, pen-  
 taphyllo, ueneris umbilico, chamædaphnæ, tithymalo helioscopio, thymelææ, alypo. Inanes in uniuersum, ac fistulosos  
 caules habent frumenta, legumina, et olera. Particulatim uerò cauis emicant colliculis phu, apium montanum, son-  
 chus, uer atrium album, gentiana, equisetum, narcissus, ricinus, cicutæ, latbyris, hieracium maius, symphytum secundū,  
 spina alba, cepe, porrum, hipposelinum, thapsia, ferula omne genus, omnesq; plantæ ferulaceæ, qualis cicutæ, para-  
 ces, laserpitium, feseli Peloponense, et quæ guttatim stillant sagapenum, galbanum, et ammoniacum. Geniculatum  
 culmum gerunt cerealia omnia: quin et ebulus, sambucus, phu, cyclaminus secundus, gentiana, panaces Asclepium,  
 polycnemum, cratægum, polygonum, equisetum, ferula, cicutæ, meon, odoratus iuncus, pityusa, arundinum omne 50  
 genus, hydropiper, ligusticum, xiphium, et omnes deniq; plantæ, quæ sceniculaceo caule assurgunt, ut elaphobosciū,  
 anethum, feseli Massiliense, pyrethrum, sphondylium, peucedanum. Læui constant caule dracunculus, hastula regis,  
 typha, nymphæa, sideritis tertium genus, chrysanthemum, aconitum lycoctonum, gentiana, acanthus, aloë, iberis, hy-  
 cinthus, millefolium, chamædaphne. Dodrantali caule exeunt chamæleo niger, tripolium, hyacinthus, arum, sesamoi-  
 des, daucum Creticum, caucalis, caninus testiculus, epimedum, hypericum, sideritis tertium genus, centaurium minus,  
 anonis, syluestre cuminum, tusilago, ænanthe, antyllis, anthemis, coris, ocimoides, achillea, elatine, pentaphyllū, tra-  
 gus, ageratum, papauer spumeum, psyllium, aconitum primum, colchicum, semperuiui minus, umbilicus ueneris, stra-  
 tiotes millefolium, chamæcissos, glaux, polygala, laurus Alexandrina, tithymalus myrsinites, paralius, helioscopus,  
 et cyperissus: item chamelea, et uerbernaca. Diuim uerò palmorum longitudine caules extollunt phalaris, thlaspi,  
 melanthus, peonia, uer atrium album, cynocranthe. Caulis cubiti altitudine adolescit petasite, plantagini minori,  
 ranunculo,

Cauliū in plā  
 us differētiæ.

*ranunculo, pbru, rosmarino, chelidonio maiori, bacchari, panaci Asclepio, sphondylia, satyrio, alfine, betonica, fabe*  
*Aegyptie, cithamo, atrabidi, asphodelo, lepidio, xyridi, eupatorio, sylvestri papaueri, aconito tertio, semperuuo ma-*  
*iori, senecioni, uerbasci foemina, cytho, xanthio, rusco, daphnoidi, chamedaphne, lathyr, primo filicis generi, cnico,*  
*gladiolo, ascyro, lysimachia. Interdum cubiti longitudinem caule excedunt alisma, cyperus, tibymalus characis, pi-*  
*tyusa. At borminum semicubitali caule contentum est. Binum cubitorium longitudinem caule aequant dracunculus, gen-*  
*tiana, spina alba, acanthus, conyza maior, althea, symphytum secundum, belenium, glastum, glycyrrhiza, centaurium*  
*maius, dipfacum, carduus, fefeli Aethiopicum, lycopsis, sideritis secunda, manicum solanum, sylvestris lotus, cirsum.*  
*Quaternum cubitorium caulis exit moly: tricubitalis uero Medio. Duris lignosisq; nituntur cauliculis hyperici, cha-*  
*medrys, teucrium, symphytum petraeum, androsenum, ascyrum, saturcia, thymum, origanum, millefolium, eupato-*  
*rium, aster Atticus, hyssopum, stoechas. Lentore et mollitia caules languescunt irioni, poterio, malue, simlacibus o-*  
*mnibus, cucurbitis, peponibus, et melopeponibus, cucumeribus, lupino, periclymeno, bryonie, uiti nigrae uiciae, helxi-*  
*nae, quam cissampelon cognominant, scammonio, iunco, typhae, altheae, alceae, solano somnifero, osyri, rusco, daphnoidi.*  
*Spinis horridum gerunt caulem dipfacum, poterium, agriacantha, scolymos, palurus, rubus, canribus, hieracium*  
*maius, stoebe, rosa. Spinosa prorsus lanugine obducuntur urticae caules, echii, anchusae, lycopsis, buglossi. Hirsutus cau-*  
*lis uisitur mentha stro, orobanche, belenio, ocimoidi, eupatorio, herbae quam pilosellam uocant, secundo symphyti ge-*  
*neri. Lanugineum caulem nutriunt acanthum, gnaphalium, uerbascum, lychnis utraq; tu silago, althea, anemone, pa-*  
*naces Heracium. Scabritia et asperitate caulium sunt pastinaca, rubia utraque, lupus salictarius, aparine, baccharis,*  
*sylvestris cnicus, aethiopis, equisetum, uer atrium nigrum, papauer sylvestre, et corniculatum. Humi cauliculis repunt*  
*polygonum, lithospermum, anagallis, clematis prima, holostium, tribulus terrestris, peplos. Caules edunt quadrangulos*  
*sideritis prima, apiastrum, marrubium, ballote, cyperus, centaurium minus, mentha, calamintha, baccharis, horminum,*  
*aparine, rubia, chamedrys, stachys, scordium, teucrium, betonica, symphytum secundum, clymenium, uerbenaca, urti-*  
*ca, galiopsis, aethiopis, lotus Aegyptia, bunium, xanthium, ebulus, pycnocomum. Triangulares insunt cirso, et qua-*  
*doq; etiam cypero. Ceterum caules albicant moly, utriq; iberidi, nasturtio, cnico, acalae, cynocrambae. Rubescunt mi-*  
*nori hieracio, soncho, artemisia, hyperico, ascyro, pbru, uirga aurea, helxinae, senecioni, myriophyllo, orobanche.*  
*Caule destituuntur chameleo albus, phyllitis, filix, cynoglossum, dryopteris, polypodium, onosma, trichomanes, asple-*  
*num, hemionitis, lichen, paronychia, adiantum, hippophestum, chamefyce. Ad haec non parum quoq; in stirpibus di-*  
*gnoscentis utilitatis praestat florum tum coloris, tum formae cognitio. quippe cum nulla sit earum pars, quae prius no-*  
*stris sese offerat oculis uere, et aestate, quam flores, uaria colorum pictura, quae in eis refulget. Quapropter non ab-*  
*re fuerit, horum differentias edocere, quae in coloribus ita se habent. Plante igitur, quae flore cadido decorantur, sunt*  
*ut oxyacantha, leuistrum, orneoglossum, fraxinus, rose, quibus tum ruber, tum etiam purpureus erumpit. Item olea,*  
*myrtus, cerasus, malus, pyrus, mespilus, prunus, arbutus, iberis, raphanus, sifer, cucurbita, caucalis, eruca, ocimum, or-*  
*nithogalum, cyclamini secunda species, hastula regia, capparis, poterium, thymus, moly, aparine, phalangium, trifolium,*  
*sed cui flos quandoq; rubescat, polium, ananthe, alba uiola, nymphaea prima, althea, polygonatum, clematis altera,*  
*ocimastrum, erinus, achillea, helxine cissampelos ducta, conuoluulus, dorycnium, ephemerium secundum, stratiotes mil-*  
*lefolium, lotus Aegyptia, chamefyce sesamoides magnum, narcissus, scammonia, thymelaea, sambucus, ebulus, angelica,*  
*filipendula, suburnum, flammula, fragaria imperatoria, lilium conuallium ductum, et uincetoxicum. Rubri flores emi-*  
*cant rosas, in quibus tamen uariant; nam alij candidi, alij purpurei, alij lutei reperiuntur. Item malis puniceis, fabae Ae-*  
*gyptiae, papaueri sylvestri, solano somnifero, onagre, et carophyllis uocatis, quem florem recentiores quidam, nescio*  
*qua auctoritate ducti, uetonicum appellant. quanquam et hi purpurei emergant, et quandoque uaria colorum mix-*  
*tura inficiantur. Flores menthae, sisymbrij, et hydropiperis colore subrubro apparent. In purpura albicantes insunt*  
*pbru, rosas, persico, amygdalo, eruo, bacchari, trifolio, alceae, periclymeno, rhododendro, peoniae. Purpurei exeunt*  
*asaro, croco, uicia, uicia, cyclamini primo, larici, centaurio minori, albae spinae, origano, pullegio, salviae, calaminthae,*  
*thymo saturiae simili, thymbrae, serpyllo, sed qui in album quandoq; uariant, pseudomelanthio, chamedry, lychnidi,*  
*scordio, uiole purpureae, canis testiculo, onobrychi, betonicae, symphyto utriq; et si secundum modum candido, modo*  
*luteo flore letetur. Item medio, gladiolo, anchusae, lycopsi, echio, sideriti tertiae, uerbenacae, astragalo, hyacintho, cir-*  
*sio, capno, bubonio, sed cuius interna fluescant, antirrhino, acanthio, glauci, ueratro nigro; tametsi quandoq; huius pu-*  
*niceae, herbaceae, candidi, et in purpuram albicantes flores reperiuntur. Item sesamoidi maiori, ricino, anaranto, gale-*  
*gae, personate, xanthio, bormino, martago (sic uocant recentiores lilium quoddam) scrophulariae maiori, geranio.*  
*At in purpura nigricantes insunt uiolis, leontopodio, delphinio, napello, pulsatille. Aureis floribus coronantur be-*  
*lenium, cornus, rapum, napus, lampsa, brasica, cithamum, sonchus, apbaca cichorij genus, tragopogon, cucumis ta-*  
*erraticus, quam satiuus, pepo, lactuca, irio, ranunculus, anemone secunda, aconitum lycoctonon, chelidonium utrum-*  
*que, fertula Campana, ruta, hieracium, atrachylis, tu silago, conyza, hemerocallis, uiola aurea, nymphaea secunda, an-*  
*gyris, alisma, hypericum, ascyrum, androsenum, chamepitys, spartium, lysimachia, eupatorium, pentaphylon, chry-*  
*socome, chrysogonon, chrysanthemum, ageratum, papauer corniculatum, byoscyanus, galium, senecio, uerbascum,*  
*lotus urbanae, et sylvestris, bunium, osyris, colocynthis, cnicus, uirga aurea, balsamina, blattaria, caltha, colutea, tana-*  
*cetum, et quae falso oxyacantham recentiores nuncupant, abrotonium foemina, pilosella, potentilla, sena, sinapi. An-*  
*themidi flores exoriuntur in medio lutei, circinato orbe candidi, sicuti et parthenio, buphthalmi, bellidi, et cotulae fo-*  
*etide. Ceruleum florem edunt linum, intubus, cichorium, chondrilla, anagallis foemina, muris auricula, clematis prima,*  
*buglossum, melanthium, eryngium, scabiosa, et quae a uulgaribus morsus diaboli appellatur. Item cyanus, et quae*

Florum in plan-  
tis varietas.



trinitas recentioribus dicitur. Hyacinthino colore placent flores centaurij maioris, chamæleonis nigri, cinaræ: quæ  
 & uaria cardui genera. Vario colore insciantur iridi, tripolio, maluæ, euphrasie. Spicati insident blitum, plantaginem,  
 hyssopo, menthæ, menthastrum, sisymbrio, hydropiperi, saluæ, sampsocho, stachy, betonica, anarato, uergæ aureæ, stachy-  
 chadi, ladano, lauendulæ utriq;. Floris effigie lilium emulantur hemerocallis, martagon, ornithogalum, nymphaea al-  
 ba, helxine cognomento cissampelos, lotus Aegyptia, narcissus, crocus, conuoluulus, ephemeron primum. Flores, qui  
 rosæ referant similitudinem, profiliunt malo cydonia, mespilo, althææ, rhododendro, pæoniæ, ueratro nigro, colocasiae,  
 corniculato papaueri. Echinatis capitulis flores conduunt uterq; chamæleo, centaurium maius, crocodilum, spina al-  
 ba, dipsacus, spina Arabica, poterium, acanthum, cinara, leucacantha, atractylis, cnici, & reliqua carduorum genera.  
 Muscosos gestant flores laurus, labrusca, myrica, erica, ligustrum, olea, quercus, castanea, cornus, galium. Flores in  
 umbellæ radiantes, uel muscariis emicantes insunt Meo, sisaro, crithamo, caucalidi, origano, panaci, ligustico, pastina-  
 cæ, fesele omni, sisoni, aniso, caro, anetho, cumino, ammi, coriandro, apio, smyrnio, elaphobosco, fœniculo, dauco, py-  
 rethro, libanotidi, sphondylis, ferularum omni generi, peucedano, laserpitio, sagapeno, galbano, panaci, ammoni-  
 co, achilleæ, chrysocome, agerato, cicuta, stratiotæ millefolio, myrrhidi, thapsia, sambuco, ebulo, angelicæ, filipendu-  
 læ, uiburno, imperatorie, & pimpinellæ generi, quæ nonnullis hircinum saxifragum uocatur, quod hircum maxime  
 oleat. Cytini imaginem representant flores asari, hyoscyami, cisthi, arbuti. Corymbis similes racematim coherent  
 botry, ambrosiæ, anagryi, urticæ, lunariæ minori, hippophaei. Lanugine quadam obducuntur, atque in pappos euane-  
 scunt flores omnium carduorum, sonchi, tragopogoni, centaurij maioris, utriusq; chamæleonis, utriusq; hieracii, se-  
 necionis, cirsii. Stellarum, solisque flore imaginem referunt eryngium, aster Atticus, anthemis, parthenium, bupthala-  
 mus, bellis, hypericum, pentaphyllum, intubus utraq; cyanus. Præterea exquisitam prorsus plantarum cognitionem  
 quis assequi poterit, si seminis, fructusq;, quos plantæ ferunt, delineationes habeat. quare non inutile fuerit earum  
 tum figuras, tum discrimina, tum etiam similitudines prosequi. Fructus itaq; racemosos proferunt terebinthus, len-  
 tiscus, populus utraq; oxyacantha, uitis nigra, uitis alba, cyclaninus secunda. Corymbaceos uero hedera, periclyme-  
 nus, solanum hortense, & manicum, smilax aspera, polycnemum, hippophaeis. Semina autem racematim coherent  
 artemisiæ, ambrosiæ, botry, urticæ nostrati, mercuriali fœminæ, hydropiperi, ricino. Acinosa sunt asaro, taxo,  
 uesicariæ, asparago, rusco, lauro Alexandrinæ. Semen folliculari specie inest fraxino, rhamno, sed quod uerticilli refe-  
 rat imaginem, nasturtio, thlaspi, androsace. At in squamosis folliculis occluditur gentiana, cumino syluestri, atriplici,  
 sphondylis, ænanthe, ferulæ, & thapsiæ. Pineam nucem imitantur, & ueluti nucamenta sunt fructus piceæ, larici-  
 cis, & cupressi. Baccas gerunt olea, laurus, ziziphus, cornus, rosa, capparis. Oblongæ, & quæ magnitudine cedant oli-  
 uis, insunt myrto, thymelææ, polygonato. Rotundæ sunt ligustro, iunipero, hederæ, periclymeno, lycio, cedro, oxya-  
 canthæ, sabinae. Ceterum fructum semenq; siliquis includunt acacia, anagryis, genista, filiquæ arbor, casia nigra, do-  
 rycnium, apocynum, staphis agria, delphinium, cicer, faba, lens, phasiolus, lupinus, pisum, eruum, sena, smilax hor-  
 tensis, medica, aphaca, uicia, pæonia, leontopetalon, xyris, solanum somniferum, & tertium aconiti genus. In follicu-  
 lis uero abditur balicacabo, coluteæ, colchico, & staphylodendro: suumq; in corniculis modo aduncis, modo rectis ser-  
 uant delphinium, fœnum græcum, lotus syluestris, rapa, napus, raphanus, lampsa, brassica, eruca, sinapi, erysimum,  
 circea, leucoium, hedyсарum, papauer corniculatum. Capitibus semina conduunt colocasia, anemone, argemone, melan-  
 thium, ocimoides, papauer tam satium, quam erraticum, hyoscyamus, lotus Aegyptia, xyris. At capitulis paruis co-  
 cipiantur lino, ptarmicæ, cumino syluestri, sparganio, psyllio, uerbascio, scrophulariæ, isopyro, ricino, tithymalo pa-  
 raliis, & helioscopio. Semina in flocci modum conclusa afferunt porrum, ampeloprasum, scorodoprasum, cepa, al-  
 lium, & si prius folliculo quodam claudantur. Umbellis nuda resident semina omnibus panacis generibus: itemq; fesele,  
 ligustico, apij omni generi, aniso, caro, anetho, cumino satiuo, ammi, elaphobosco, dauco, sphondylis, peucedano, di-  
 chryso, cicuta, myrrhidi, angelicæ, imperatorie, thapsiæ, coriandro, smyrnio, fœniculo, pyrethro, ferulis omnibus,  
 achilleæ, agerato, stratiotæ millefolio, sambuco, ebulo. Semen ueluti spicis continetur origano tam satiuo, quam sylue-  
 stri: quin & sampsocho. Papaueris imaginem semine representat phyllum, nymphaea alba, hyoscyamus, lotus Aegy-  
 ptia, peplis, peplos, chamæscice. Piperis similitudinem exhibent semina tum lycij, tum etiam uaticis. Compresso, atq; ro-  
 tundo semine habentur malua, althæa, alcea, smilax leuis. Neq; seminis effigie ab epithymo disidet alypon: à lolio  
 phoenix: à uiola alba chamæcissos: à saluia horminum. Hirsuto semine, ac aspero, adeo ut id tactum uestibus adhe-  
 reat, sunt personata, eupatorium, aparine, helxine, xanthium, & uulgare cynoglossum. Capiti uiperarum simile fert  
 echium, & uituli non dissimile antirrhinum. Mucronatum ostendunt tragos, spinachium sic uulgò uocatum, tribulus  
 tam aquaticus, quam terrestris. A fœni græci semine non desciscit semen myagri, item & loti syluestris. Semen fœni-  
 culi modo ferunt ligusticum, sison, cicuta, cuminum, carum. Anisi uero semina, apij, & ammi consimilem nata sunt  
 formam. Cnici semen suum impartitur imaginem minori centaurio, utriq; chamæleoni, spinæ albæ, & Arabicæ, atractylis,  
 cinaræ, Medio, nigro ueratro, & omnibus ferè cardui generibus. Milij semine constant circea, crateogonum,  
 panicum, sesanum, lithospermum, lotus Aegyptia, sesamoides. Erui semen possident catanance, tithymalus paralius,  
 aphaca. Semine marrubium emulantur ballote, clinopodium, fideritis prima, pycnocomum. Consimili nascuntur se-  
 mine libanotis, & crithamum: ut etiam semine conueniunt linum, satyrium erythronium, & quoddam urticæ genus.  
 Semine caudæ scorpionis effigie cernitur scorpioides: & uerrucarum modo pendet minori beliotropio. Semina, quæ  
 fructibus carnosissimis tam arborum, quam herbarum delitescunt, gestant aluo mala, cotonea, pyra, citria, limones, aurantia,  
 punica, mespila, cucurbita, pepones, melopepones, cucumeres, colocynthidis: item balsamine uulgò uocate fructus,  
 mandragoræ, aristolochiæ, halicacabi. quin & mala insana consimili modo suam recedunt semen. Minutium habent se-  
 men ruta, iberis, cupressus, circea, psyllium, mandragoras, apios, cynocrambe, papauer, hyoscyamus, ocimum. Differe-  
 ntia


Seminū, et fru-  
 ctuū in plētis  
 discrimina.

rant etiamnum colore inter se semina : siquidem albicant dauco, rosmarino, circae, lactuce, papaueri satiuo, et spu-  
meo, cucurbitae, peponi, cucumeri, sesame, iuthospermo. Vt fructu rubent oxyacantha, terebinthus, cedrus, cornus, zi-  
ziphus, rosa, punica, arbutus, taxus, cerasus. Ita similiter semine rubescunt asparagus, haliacabab, ruscus, hippoglo-  
sum, ranunculus, dracunculus, arum, acanthium, peonia, rubia, tragus, iuncus, coccum insectorium, aspera, smilax, chamae-  
daphne, sesamoides. Succo sanguineo manant ascyri, androssemi, et hyperici grana. Nigrum inest ligustro, lycio,  
myrto, oleae. Quin et semina nigricant ocimo, hirci barbulae, porro, allio, cepis, ampelopraso, hyacintho, scorodo-  
praso, ophioscorodo, saluie, rutae, hormino, ligustico, seseli Aethiopico, sisoni, hipposelino, smyrnio, melanthio, phae-  
langio, rubiae, sideriti prima, uerbasco, laurcola, narcisso, syluestri cucumeri. In longum uero protensum proferunt  
semen seseli Masiliense, ligusticum, sison, hipposelinum, cuminum, narcissus, feniculum. Quadratum spectatur seseli  
10 Masiliense, et libanotidi : triquetrum uero staphidi agriae, et lathyri. Gmination semen ferunt tordylium abysson,  
ethiopsis, mercurialis altera. Disident etiam sapore semina : namque acre id proferunt porrum, cepae, allium, ampelo-  
prasion, scorodoprasion, sinapis, nasturtium, erysimum, struthium, cyclaminus altera, dracunculus, origanum, panax  
Herculeum, seseli Masiliense, tordylium, anisum, hipposelinum, feniculum, pyrethrum, peucedanum, cardamomum,  
clematis secunda, smilax aspera, thlaspi, hydropiper, ptarmica, arum, lepidium, ligusticum, et siliquastrum, quod in-  
dician appellant piper. Odorato semine pollent omnia cardamomi Arabici genera, panaces Herculeum, meon, ca-  
rum, panaces Asclepium, elaphoboscum, ligusticum, hipposelinum, smyrnium, feniculum, daucus, pastinaca sylues-  
tris, melanthium, isopyrum, buniium, origanum, omni, libanotis. Amarium semen inest Aethiopico seseli, omni absin-  
thiorum generi, abrotono, chamaecisso, gentiane, sesamoidi. In magnam denique duritiam semen coalescit asparago, pe-  
ryclimeno, et rusco. Harum itaque rerum, qui exactam cognitionem fuerit adeptus, is in hac praestantissima facultate  
20 absque ullo impedimento poterit peritissimus euadere. Verum enimvero ne quid intactum relinquatur, quod in hac sa-  
cultate tum utile, tum necessarium existimari possit, ob id scire conuenit, quod permulta creauit natura rerum omnium  
parens, quae inter se uel maxime consentiunt, uel admodum dissentiunt. Quo fit, ut nihil hac re admirabilius sit in tota  
natura, nihilque scitu exoptatius. Quapropter nec ab re quidem fuerit haec etiam ceteris adnectere, paucisque per-  
stringere, et de his praesertim agere, quae ad simplicium medicamentorum materiam spectant. Tam igitur pertinaci  
odio sese prosequuntur quercus, et olea, ut non solum non uiuant, neque germinet, si altera effossa, in eius scrobe alte-  
ra implantetur : sed etiam altera alteram interficiat, si forte prope oriantur. Nec minor inter brassicam, et uitem  
antipathia cernitur : quandoquidem obseruatum sit, uitem, ad cuius radices asita fuerit brassica, non paruo intervallo  
sponte sua refugere. Ideo nil mirum, si tantum brassicam contra temulentiam pollere credant, quodque Germani quoti-  
dianis mensis id olus semper apponant, ut uini noxam effugiant. Nec secus brassicam oderunt origanum, ruta, et cy-  
30 claminus, atque illa uites : quippe perspectum est, quod si feratur brassica iuxta quamlibet explicatarum, confestim ca-  
dit, totaque contabescit. Scilla adeo ueneficij, et adnurmurantium incantationibus aduersatur, ut in limine ianuae do-  
mus integra suspensa ab omni eorum noxa eos, qui inhabitant, uindictet. Quocirca non temere a doctissimis rerum na-  
turalium inuestigatoribus memoriae proditum est, omnes in uniuersum stirpes, quibus scilla adsita prosiliat, non mo-  
do asseruari ab omni aeris intemperie, animaliumque noxa, sed etiam latiores, feracioresque euadere. Ferula in pabulo  
asinis gratissima est, eosque mirifice alit : quae tamen, si ab equis, uel bobus edatur, ueneni praesentanei modo eos interfici-  
cit : tametsi nulla prorsus noxa ea quoque ab hominibus edatur prima foliorum germinatione. Rhododendri flores, et  
folia mulis, canibus, asinis, et quadrupedum plurimis uenena sunt : hominibus uero contra serpentium morsus presti-  
dia. Cicutae esitata homines enecat : item et quadrupedes. nihilominus sturni innocuae eius semine uescuntur. Cucu-  
meres aquam ita diligunt, ut si uas aquae plenum, dum plantis inhaerent, illis subijciatur, admodum longiores effecti, mi-  
40 re in illam descendant. Contra oleum suppositum sic refugiunt, ut in hamos recurruntur. quandoquidem in uniuersum  
oleum omnibus, quae feruntur plantis, inimicum est. Quo fit, ut planta quaelibet, quae fuerit eo peruncta, facile  
perarescat et moriatur. Ob id enim admirandum non est, si arbores, quae oleum ferunt, ac resinam mittunt, ceterarum insti-  
tutiones aspernantur : quae admodum eas non respuunt aliarum nonnullarum, nec oleum, nec resinam fundunt. siquidem saepe com-  
specta est quercus pyra ferre, platanus poma, myrtus punica mala, oxyacantha mespila. At nunquam uisa sunt pi-  
nus, larix, picea, abies, olea, infitionis adminiculo, alios ferre fructus, quam proprios. Grandinis impetum, item et ful-  
minis ictum arcet pellis hyenae, crocodili, hippopotami, et uituli marini : neque fulmine iciuntur ficus, et laurus. Ca-  
prificorum grossi domesticis ficis appensi, non solum eorum fructus decidere prohibent, sed etiam caducos ad matura-  
ritatem usque remorantur. Apium tanto celerius adolescit in hortis, quanto magis atteritur, et calcatur : cum tamen  
secus, et contra eueniat de reliquis plantis. Tenescunt galli, esuique aptiores redduntur, qui iugulati prius in arbore  
50 fici pependerit. Carnes putredine diutius illesae asseruantur, quibus aeneus clauus fuerit infixus. Corpora icta ful-  
mine, etsi exsiccentur, nunquam tamen putrescunt. Quare non immerito poeta ille damnatur, qui Phaethontem cecinit  
de caelo tactum quibusdam in uallibus computruisse. Sed maiore miraculo nobis illud sese offert, quod scilicet fulminis  
ictu e loculis aurum adimatur illis illesis, ac ne confuso quidem cere signo : pariterque ex dolio uinum euanescat, dolio  
nullibi fracto. Quid enim hoc mirabilius? Martia princeps Romanarum grauida icta fulmine, partu exanimato, ipsa  
citra ullum aliud incommodum uixit. Mentha lacti imposita densari ipsum in caseum non sinit. Maurenae pisces seru-  
la tactae statim moriuntur. Scorpiones item adnota delphinio herba, aut lychnide syluestri, aut aconiti radice, quod  
pardalianchem uocant, adeo torpescunt, et stupidi redduntur, ut potius mortui, quam uiui existimentur : ueruntamen  
albi ueratri contactu mirifice excitantur, uiresque deperditas recuperant. Succo cotulae manus illitae apum, uestparium-  
que aculeo non inestantur. Quod item malua praestat oleo confusa, corporisque membris illita. Qui polemoniae radi-  
cem gestauerit, a scorpionibus non icitur : etsi ictus sit, nulla neque molestia, neque noxa afficitur. Porro tanta est arum-  
b 2 dinis, et

Sympathia, &  
antipathia re-  
rum quarundam  
pro simplici  
materia.

dinis, & filicis discordia, ut arundine uomeri annexa, filices in agro enatae penitus deperdantur. At contra magnam inter se ineunt amicitiam arundines, & asparagi: quippe in arundinibus sati longe letiores, quam alibi adolefcunt: quemadmodum & uites, quae ulmos, populosq; scandunt. Magna insuper conueniunt amicitia myrtus, & olea: item bac, & ficus. Orobanche sola praesentia legumina strangulat. Metellarium nucum esu peculiaris enecantur canes, quam cetera animalia. Cimices lectularij si uiui deuorentur, non solum quartanis febribus remedio sunt, sed etiam percussis ab aspidē profunt. Martyres, feles, & mustela gallinas non attingunt, quae rutae succo fuerint perunctae: neq; uulpes eas inuadunt, quae pulmonem uulpinum comederint. Vipera fagi ramulo obuian facta gressum sistit, & ueluti attonita manet. Quod item facit arundine etiam leuiter percussa. Furens elephas ariete tantum conspecto mansuescit: nec est taurus tam ferox, qui fico arbori adalligatus non mitescat. Magnes lapis mirē ferrum ad se trahit: at si alio confricetur, id neutiquam agit, nisi sanguine hircino lotus uim ab alio obfessam redimat. Succinum paleas, & festucas ad se trahit: nihilominus oleo illutum eas respuat. Equi, quos lupo momorderit, & pernici cursu, & prolifica probitate pollebunt: at si luporum uestigia calcauerint cruribus obstupefcunt, ac conuelluntur. Carnes ouille à luporum morsibus dilanatae ceteris teneriores, & gustatu suauiores existunt: at etiam lana uestibus contexta pediculos creat. Leo animal ferocissimum praesentem gallum mirum in modum ueretur, ac magis terrore concutitur audito eius cantu. Gallinaei pulli elephantem, bouem, & equum minime metunt: atqui si umbram tantum muli in aëre uolantis conspexerint, ad matrem maxime perterriti confugiunt. Nec secus agunt oues, & agni lupo conspecto. Idem lupo scille bulbo contacto quam primum sideratur. Hyenae umbra contacti canes obmutescunt. Item hyenae ipsius lingua à latratu, ac morfu canum etiam mordacissimorum ferentem uindicat. Polypodium herba cancro animalis admota efficit, ut is paruo temporis tractu tum integentes crustas, tum ungues à pedibus abijciat. Ciconiae platani folijs nidos implent, ut inde uestertiliones abigant, quibus cum ingens odium gerunt. Hirundines apium comportant, ut tineas, & blattas nidis inimicas arceant: item & chelidonium maius, quod obcecatis pullis uisum restituunt. Ceterum lauri folia nidulis important palumbes, accipitres hieracium, corui arum, upupa adiantum, cornices supinam uerberaciam, turdus myrtum, perdix arundinem, ardeola carum, aquila callitrichum, galerita gramen, cygni uaticem, ut à diuersis animalium iniurijs se uindicerent, aut ab alio quocunque, quod noxam adferre possit: tam admirabilis in uolatilibus, & quadrupedibus habetur ipsius naturae instinctus, circa rerum uires absconditas. Catus quadam herba adeo gaudet, ut illi catariae nomen recentiores indiderint. Ranae iuncum, ranunculum, & stoebeum diligunt. Testudines, & ciconiae origanum adamant. Serpentes feniculi affricatu uisum recuperant. Leo deuorata simia febrem efficacissime discutit. Ceruae, & ferae caprae non modo dictami pabulo illata uulnera in Creta insula sanant, sed & infixam tela uenatoribus reijciunt. Vrsi formicas deuorant, ubi mandragoram degustauerint, quibus mirifice sanantur. Elephantis deuorato chamaeleonte animali oleastri frondes depascuntur, quibus incolumes euadunt. Anseres, anates, ac reliquae aquaticae aues siderite tantum herba suis incommodis medentur: sicuti gallinae helxinem deuorant, grues iuncos, pantherae humanum stercore, apri hederam, & cinarum ceruae. Praeterea rhubarbaro flaua bilis à corpore deijcitur, itemq; manna, & scammonio: pituita colocynthide, & turpeto: bilis uero à atra helleboro, & Armenio lapide: sicuti & uenena theriaca superantur. Oculorum aggritudines curant solo contactu sapphiri & anthracis. Ebrietas amethysto lapide arcetur. Sanguinis defluxus iaspide sistitur. Topatio appenso uenus infirma redditur: item & uiticellato cubantibus strata. Formicae alis uestertilionis, & upupa corde fugantur. Quin & serpentes ueterum calciametorum suffitu abiguntur: ut blattae, & papiliones hircino iocinore incenso. Torpedo piscis non modo manus, sed & longiori basta contacta tangentis brachium stupidum reddit, quanuis ualidissimis musculis constet. Catablepha quencunque oculo conspexerit, enecat, & si per mille passus distet. Nec inter homines defunt, qui laudibus, & oculorum intuitu conspectos effascinent. Ceterum si ceterarum uolatilium pennae aquilinis permisceantur, breui carie contabescunt: quemadmodum testudinum chorde contactae disrumpuntur, si una tantum ex lupi intestino parata inter eas resonet. Eodem pariter modo tympana ouina pelle constructa franguntur, si tympanum lupina membrana contactum inter alia pulsatur. Tanta musicis, sibijs, ceterisq; id genus instrumentis facultas aduersus tarantulae uenenum inest, ut languentes etiam inuitos non modo ad choreas, saltationesq; alliciat, sed etiam persanet. Quin etiam tanta uipolent Marfi, ac Psilli contra serpentes, ut eos solo contactu enecent. Taurus perunctis rosaceo naribus statim uertigine corripitur. Lapis Thracius aqua madens igni admotus praeter rerum naturam flammam statim concipit, nec restingitur, nisi affuso oleo. Sed de his haecenus: quandoquidē breuitati studētes plura adhuc silentio praetercunda duximus.

† Hic locus (ut mihi retulit excellentis. medicus Augustinus Gadaldinus) in antiquo codice ita legebatur: ὅ γὰρ διαφορὰς ἔκαστοι τῶν ἀναφερόμεν. Id est: in tumorum differentias unumquodque ipsorum referentes: Quae lectio non solum ob id magis probari posset, quam uulgata, quod dogmatica sit, illudq; dogma innuat, quod facultatum medicamentorum causam in tumores, & meatus referebat; sed quod etiam eius dogmatis meminerit Galenus lib. primo de simpl. medicamentorum facultate cap. primo, his uerbis. τινες μὲν γὰρ εἰς τὰ μέγιστα, καὶ τὰ σμικρὰ, καὶ τὰς θέσεις τῶν ὀγκῶν τε καὶ πόρων ἀναφέρονται. Hoc est: Quidam enim in magnitudines, figuras, & situs tumorum & meatuum referunt.

IRIS DOMESTICA. *Scymnus flum.* IRIS SYLVESTRIS.Iris. IRIS. *Violaceae*. CAP. I.

**I**ris à coelestis arcus similitudine nomen accepit. Folia fert gladioli, sed maiora, latiora, & pinguiora. Flores 1 in summitate cuiusque caulis, æqualibus inter se spatijs distant, incurui, uarij: siquidem candidi, pallentes, lutei, purpurei, aut cærulei conspiciuntur: qua diuersi coloris specie, quædam coelestis arcus imago representari uidetur. Radices subiacent geniculatæ, solidæ, odoratæ: quæ frustatim dissectæ, in umbra siccantur, & traiectæ lino reconduntur. Melior est Illyrica, & Macedonica: & inter has laudatissima, quæ mutila ferè, & densa constat radice, frangenti contumax, subrufo colore, gustu amaro, odore perquam grato, & syncero, ita ut nullum prius situm redoleat: quæ dum tunditur, sternutamenta mouet. Secundum locum habet Africana, candicans, gustuque amara. Terebines in vetustate sentiunt; tunc tamen odoratiores reddi solent. Vis omnibus excelsatoria, extenuans, contra tussim efficax: humorum, qui egrè reijciuntur, crassitiem digerunt: bilem, crassamque pituitam ex hydromelite drachmis septem epotæ purgant: somnum conciliant, lacrymas eiunt, torminibus medentur. Eadem potæ ex aceto auxiliantur serpentium ictibus, lienosis, cõuulsis, perfrictionibus, horroribus, & quibus genitura effluit: menses ex uino potæ pellunt. Decoctum earum, fœminarum foribus utiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaque in eis uenarum spiracula: ischiadicis infunditur: fistulas, ac sinus carne explet. Radices ex melle glandis modo subditæ, partus extrahunt: quinetiam coctæ & illitæ, strumas, veteresque duritias emolliunt. Siccæ quoque ulcera replent, & cum melle purgant: nudata ossa corpore operiunt: doloribus capitis cum aceto, & rosaceo magna utilitate illinuntur. Admotæ cum albo ueratro, & duabus mellis partibus, lentigines & uitia cutis in facie à sole contracta emaculat. Pessis, malagmatis, & acopis inferuntur. In uniuersum magni ad omnia usus.

**I**ris in uniuersum satius est, & syluestris. Hec duorum est generum: altera satius, & uulgari similis, folijs tamen, flore, caule, radiceq; paulò minoribus. Altera folijs gladioli longioribus: radice tenui, lignosa, geniculata, subrufo, inodoratq;: caule breui: flore cæteris longè minori, odore Armeniaci mali. Constat hic folijs nouem purpureis, quorum extrema, superiore tantum parte, aureis pinguntur lineis. Sunt qui hanc legitimam Illyricam putent, Illyricam ab Italica differre existimantes. In quorum sententiam et si iam pridem deuenirem, tamen longè aliter rem se habere postmodum comperi. Quandoquidem præferri Illyricam nouerim, non quòd genere, uel specie à nostrate differat.

Iridis genera, eiusque confideratio.



ferat, sed quod cæli, soli; illius conuenientia, præstantioribus polleat facultatibus: ut absinthium, quod in Ponto nascitur: acorum, quod in Colchide, & Galatia: cyperus, qui in Syria, & Cycladibus insulis: costus, qui in Arabia: crocus, qui in Coryco monte: myrrha, quæ apud Troglodytas, & Minæos legitur: & alia quam plurima præferuntur à locis, quorum dote selectissima, præstantissimæ; proueniunt. Id enim apertè testatur grauius autor Galenus lib. primo de antidotis, his uerbis. Omnes itaq; herbarij unanimes scripserunt Irim in Illyrio natam optimam esse: petroselinum uerò, quod in Macedonia prouenit: bitumen è Iudæa aduectum, item & opobalsamum. Idem & in reliquis fecerunt, quorum dotes à regionibus acceptas, cùm priuatim de unoquoq; loquemur, non omittimus. Hæc Galenus. Docuit id etiam ante Galenum Theophrastus lib. ix. cap. vii. de historia plantarum, sic inquit. In Europa nihil præter Irim inueneris, quæ optima apud Illyrios exit, non tamen parte maritima, sed mediterranea, magisque ad septentrionem sita. Verion loci à locis differunt, ita ut producere meliorem possint. Quibus palàm est, Illyricam Irim non genere, & facie, sed uiribus tantum à nostrate disiungi. Satiua (ut arbitror) ex agresti originem duxit, quæ admodum plantarum aliarum pleræq; cultu tamen uegetior grandiorq; effecta. Seritur iam & altera, quam flore & folijs minorem esse diximus, quæ etiam in hortis frequens est tum ipsius floris amoenitate, tum odoris præstantia, tum etiam quod nouis floribus delectentur homines. adeo ut iam tot sativæ, quot sylvestris habeantur genera. Sylvestris utriusq; generis plurima oritur in Goritiensi agro Saluatino monte, & Iapidæ collibus inter saxa, odore non ingrato: quamvis etiam ambas uiderim in campestribus non longè à Sontij ripis. Est præterea in satiuarum genere, quæ flores nuci candoris proferat (hanc in pluribus Hetrurie locis uidimus) cuius radix odoris fragrantia, & utrum robore Illyricam ferè æquat. Iridis meminit Plinius lib. xxi. cap. vii. sic inquit. Iris radice tantum commendatur, inuigentis, & medicine nascens. Laudatissima in Illyrico: & ibi quoq; non in maritimis, sed in sylvestribus Drilonis, et Naronæ. Proxima in Macedonia: longissima hæc, & candicans, & exilis. Tertium locum habet Africana, amplissima inter omnes, gustuq; amarissima. Illyrica quoq; duorum generum est: raphanitis à similitudine, quæ & melior: rhizotomos subrusa. Et cap. xx. eiusdem libri: Iris rufa (inquit) melior est, quam candida. Quibus in locis sibi manifestè repugnare uidetur Plinius: quod superius raphanitem, quæ candicat, rhizotomo, quæ rufescit, anteposuerit, hic uerò contrà. Dioscoridi præstat, quæ subrufo constat colore, qualis Plinio rhizotomos. Ceterum (si Theophrasto, & Plinio credamus) non omnis Illyrica præstat, sed quæ tantum in sylvestribus nascitur. siquidem quæ in maritimis foditur, humore prægnans improbatur, quod subinde flaccescens contrahatur in rugas. Succus hydropicis propinandus, quoniam recenti Illyrica destituimur, è nostrate elicitur, ducitq; abunde aquas. Excalfacit Iris ordine secundo completo, uel tertio inchoante, & pariter siccatur. Atq; præter uires, quas illi adscribit Dioscorides, alijs pluribus pollet. quandoquidem compertum est, mansan oris halitum commendare: dentium dolores mulcere, si radicis decocto iisdem foueatur. coquit item, abstergit, digerit, resoluit, lenit, reserat, expurgat, & deijcit: uulnerarijs medicamentis immixta sarcotica est. Radicis expressus succus bilem flauam, pituitam, & aquas cutem subeuntes pellit: hæmorrhoidas fotu elicit. Radix ipsa contrita, & ex aceto bibita, omnibus aduersatur uenenis. Succus naribus infusus cerebrum à pituita mirificè purgat: uentriculo tamè nocet, cùm per se tantum bibitur. ideoq; à peritis medicis exhiberi non solet, nisi admixta mulsæ, & Indicæ nardo. Reperio quoddam esse Iridis genus, quæ Astragalitis cognomine dicitur. Id enim ostendit Galenus lib. primo de comp. med. secundum locos cap. primo ex Sorano transcribens: item Aëtius lib. xiii. cap. xiii. qui quibusdā in emplastris Irim astragalitidem imponunt. Veruntamè cùm antiquorum, uel recentiorum repererim neminem, qui in simplicium medicamentorum libris huiusce Iridis meminerit, quid certi de hac re proferam, sanè non habeo. Ceterum Cornarius, qui in prædictos Galeni libros commentarios edidit, Irim astragalitem, & astragalum idem esse existimat: hoc argumento ductus, quod Plinius Iridem duplicem esse tradiderit: altera, quæ raphanitis à similitudine; altera, quæ rhizotomos dicitur. At cùm astragalus radicem raphani modo ferat, inde Iridem astragalitem Astragalum esse coniicit. quin & Plinio per Iridem raphanitem, astragalum intelligi censet. Sed mea quidem sententia rectius fortasse rem hanc explicasset, si per eam Iridem, quæ à similitudine raphanitis uocatur, astragalitem ideo designari dixisset, quod ut astragalus, raphani modo radicem gerat: siquidem Plinio Iris raphanitis astragalus non est, sed altera Iridis Illyricæ species. Quamobrem ita Iridem astragalitidem à Galeno cognominatam esse putauerim, quod radice reserat astragalum: quemadmodum raphanitis à Plinio dicta est, quod radice raphanum representet. Iridem memoriæ proditam fuisse Galeno in libris simplicium medicamentorum sanè nusquam reperiri: tametsi libro primo de antidotis eius postmodum meminerit his uerbis. Andromachus rosas Iridem Illyricam adiungit. quæ uerba non frustra, negligenterq; excipienda sunt, ueluti nec cùm alijs medicinis patrie nomen apponit, de quibus paulò post differentes, quid quoq; in genere optimum sit, demonstrabimus. Polium ergo, & chamædrys Romanæ asseruntur, natæ in Italia paulò meliora. in aliquot siquidem Italiæ locis haud multò deteriora proueniunt illis annis, quibus uer totum humidum non fuerit, sed sicuti sepe contingit, æstiuo tempore simile. Quod si ueris constitutio sicciior obuenerit, multa, quæ in Italia nascuntur, pluribus Cretæ allatis paria erunt, aut non multò inferiora, ueluti chamædrys, chamæpitrys, hypericum, gentiana, thlaspi, ueratrum nigrum, & id genus alia. At uerò, quod ad Irim pertinet, secus se res habet: si enim Iris Lybica, quæ plurima ex Africa Romanæ asfertur, Illyricæ comparatur, tatum ipsi cedet, quantum cadauer uiuo corpori: non tamen alijs in gentibus orta tam multum ab Illyrica degenerare Iris uidetur. Irim igitur, uelut & reliquas medicinas, odoratiorem eligito: nam unumquodq; optimum est, quod proprius sui generis odorem uehementissimum habet, qui quidem ex multorum inspectione manifestus unicuiq; sit. Ac de gustu quidem perceptis qualitatibus eodem modo censendum est: id enim optimum medicamentum esse constat, in quo id, quod suo generi proprium est, exuperat: pessimum uerò quod sui generis alijs & tenuius, & exilius est. Meliora namque sunt omni in specie, quæcunq; nec rugosa, nec exilia fuerint: sicut quæ conuenientem sibi magnitudinem excessere, pe-

Plinii contra dictio.

Iridis uires præter traditas à Diosc.


Iris cognomēto astragalitis

Iridis mentio facta à Galeno.

ior: sunt ijs, quæ bene nutritam, & adstrictam habent substantiam. Quamobrem, ut dixi, multa sæpius inspersisse oportet: præteritum est, & maxime optima, & quæ longo iam tempore sui experientiam ipsis nascendi initijs præbuere, quæq; uno ore à peritis medicæ materiæ sunt commendata. Omnes igitur herbarij unanimes scripserunt Irim in Illyrio natam optimam esse. Hæc Galenus.

† Malui hoc in loco Marcelli interpretationem sequi, quemadmodum alibi quandoq; facturus sum, quam Ruellij, cui non semper addictus ero: quod in aliquot Græcis codicibus legatur ἐπὶ ἡραυλα, quæ vox in summitate cuiusque caulis significare uidetur: quodq; natura in planta ipsa illud manifestè demonstrat.

Ἀκορον. *Alum.* ACORVM. *Alum. hinc.* C A P. I I.  
*Grosf. & alij aut*



ACORVM folia iridis habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, complicatas, non in rectum, sed obliquum actas, & summo cespite sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratis. Optimum est densum; candidum, plenum, carie nõ exesum, odoratum: cuiusmodi Colchidici, et Galaticum, quod aspletion dicunt. Radici uis calfactoria. Decoctum potu urinam cit: prodest lateris doloribus, & iocineris, atque thoracis: itè torminibus, uul-  
fis, ruptis. Lienem absomit: urinę stillicidio, & serpen-  
tum ictibus auxiliatur: insidētibus ad muliebres affe-  
ctus, iridis modo, utiliter imponitur. oculorum cali-  
gines succo discutit. Antidotis radix magno usu com-  
miscetur. Vide Calmus fol. 38

FECEIT diuturna rei herbariæ ignorantia, ut hæcenus nõ in Italia solum; sed in quocunq; terrarum loco, ubi sepalsarij, & medici habeantur, in legitimi Acori locum rufa quedam radix successerit, quæ passim palustribus, & uliginosis locis inut-  
lis, & inodora plurima nascitur. eo sanè argumento, quod folia, et radices iridis proferat; quanvis hæ colore rufæ, illa uerò iri-  
dis longiora spectentur. Hæc itaq; radix apud omnes, qui plan-  
tarum historias neglexerunt, in hoc usque æuam legitimi Acori munere functa est, à qua quantum tum qualitatibus, tum facultatibus recedat, ex Dioscoride patet. quandoquidem palustris hæc nec candicans, nec gustu sit acris, nec ullo prorsus commendetur odore. At quanvis hæc tempestate à peritis rei herbariæ medi-  
cis non parum improbentur ijs, qui non in hac tantum stirpe, sed in alijs quàm plurimis defecere, cum tamen ipsi probatissimos au-  
tores nusquam legerint, potius excusandi sunt, quàm quidā for-

Acori consi-  
deratio.

NB.

tasse ætatis nostræ scriptores, tam Græcæ, quàm Latine lingue peritissimi; quibus res sole clariores propositæ sunt, quiq; in simplicium medicamentorum cognitione cæteris præstantiores haberi uolunt, & ij longius nihilominus (ut arbitror) aberrant, quàm cæteri. E quorum numero est Brasauolus Ferrariensis uir sanè doctrina, & fama clarissimus, qui dum innumera simplicia medicamenta declarare, explicare, & palam facere in suo simplicium examine studium impendit, et si id in plurimis affecutus fuerit; in hoc tamen, alijsq; nonnullis (ut suis locis in his nostris commentarijs ostendemus) in tanto illustrium autorum lumine mihi magis cæcutire uidetur, quàm qui ante ipsam in tenebris errauerunt. Is enim constanter asserit, Acorum à Dioscoride descriptum aliud non esse, quàm ea acerrima, & odorata radix, quam officinæ Mauritanos secutæ galangam uocant. adeo ut maluerit cum Leonicensio errare, tantum fuit præceptoris suo addictus, quàm cum Manardo bene sentire. Sed quantum eius opinio à ueritate, quantumq; ab Acori historia recesserit, per quàm facile probari potest. Quippe galangam folia iridis proferre apud Syrios nullo nobis testimonio constat: uerum quia cum cypero adeo conuenit, ut is syluestris galanga nonnullis dicatur; ideo non ab re credendum fuerit, galangam potius cyperi, quàm iridis folio provenire. Præterea quod galanga radices habeat iridis, nec mihi quidem uidetur, nec ullum id affirmare existimo. neque illud etiam uidere possum, quod eadem aliqua ex parte subalbescit, ut de Acori radicibus scribit Dioscorides: quin potius tam intus, quàm extra non obscure rufescunt. Quod autem gustu sint acris, atq; mordaci, qui neget, nullus est. Sed non tamen ob id dicendum erit, galangam esse Acorum, alijs non concurrentibus notis: præsertim cum Dioscoridis testimonio Acorum esse debeat acre, non autem acerrimum, nec galangæ modo linguam adurens. Brasauolum secutus est Fuchsius medicus clarissimus. cui cum nimis pumile uiderentur prioris galangæ radices, quàm ut Acori radices referrent, atq; propterea Brasauoli sententiam non probandam duceret, in suis de stirpibus commentarijs, alteram crassiorẽ galangam, quæ iam pridem in Italiam fertur, Acorum esse contendit. Verum si animaduertatur, quod ea non sit iridi similis, multoq; magis rufescat, quàm quod hæc dictio ὁ πολέωνος designet, quæ albicantes, & non rubentes denotat, facile palam fiet, quod unā cū Brasauolo ipse quoq; aberrauerit. Sed præter hæc ijs etiā refragatur Galenus lib. vi de simp. med. facult. quod asse-  
rat

Brasauoli er-  
ror.

Fuchsi error.

Acorum legi-  
timum.

fol 38

Acori vires  
ex Galeno.

Galangæ con-  
sideratio.

Monachori  
opinio falsa.

rat Acori radicem gustui non modo acrem esse, sed etiam subamarā: quæ tamen modica amaritudo neq; in hac, neq; in illa reperitur galanga; etsi inuaidis quibusdam argumentis suo ultimo examine contendat Brasauolus, quod galanga præter acerrimam facultatem etiam sit amara. sed uereor, ne is tunc bile persusus suam degustauerit galangam. Comprobatur præterea aliud esse Acorum, & aliud esse galangam Serapionis testimonio, qui ciam sciret non parum discriminis inter has radices esse, de ijs seorsum egit per propria capita, ut pote de rebus genere & facultate diuersis. Hoc idem probatur ex Actuarij etiam monumentis. siquidem is in compositione aureæ Alexandrinæ & Acorum, et galangam imponit, quemadmodum & Nicolaus Myrsipicus, tanquam inter se genere diuersa. His itaq; tum rationibus, tum auctoritatibus adductis, à Brasauolo, & Fuchsiō diuersus esse cogor. Nec equidem intellexerim unquam, quomodo factum sit, quod galanga maior, quæ à minore non genere, & facultate, sed tantum specie differt, ciam præmam huc è Syria aduecta est, in Acorum se commatauerit. sed qui hæc intelligunt, dijudicent. Ceterum, ut dicam quod hac in re sentio, crediderim ego unā cum Manardo Ferrariensi, alijsq; nonnullis huius ætatis in simplicium medicamentorum facultate doctissimis uiris, id omnino legitimum esse Acorum, quod non modo seplasia, sed omnes in uniuersum falsò calanum odoratum uocant. Siquidem radices primum iridi persimiles sunt, geniculis distinctæ, reflexæ, subabide, acres, odore præstantes, & (ut inquit Galenus) etiam subamaræ. insuper & folia, quæ integra ad nos unā cum radicibus (ut hæc pictura demonstrat) è Constantinopoli allata sunt, id apertius affirmant: sunt enim ferme iridis. Ad hæc ut Aeniponti (Germani Ispruch dicunt) retulit mihi clarissimus medicus Ioannes Merula, qui pluribus annis degit apud Lituānos, quod passim calanum aromaticum uocant, frequentissimum in Lituania, & circa Tartarorum fines, nascitur: folijs iridi æmulis: flore etiam simili, colore roseo purpurascēte, nulla ex parte uario: caule iridis longiore gracilioreq; à quo tamen nullus exoritur calamus: uocaturq; ab incolis suo idiomate Tattarschi zely, id est, herba Tartarica, quod fortasse à uicinis Tartaris in Lituāniam primum fuerit allata. Ideoq; Plinio memorie rectè proditum est lib. xxv. cap. xii. optimum id esse Acorum, quod ex Ponto aduehitur. Pontus enim bis Tartaris ferè iungitur, qui ultra Lituāniam inhabitant, ubi apud probatissimos autores nusquam legitur, odoratum calanum oriri. Quamobrem non potui non maxime Brasauolum admirari, quod sibi tam facile persuaserit, uulgarem calanum legitimum, & odoratum calanum esse, à Dioscoride, Theophrasto, Galeno, & Plinio non in radicem, sed in arundinum genere descriptum. nam (ut suo loco de calamo odorato-agentes latius explicabimus) is arundinea est fistula, non autem radix. Sed de his hætenus. Acori meminit Galenus lib. v. l. de simpl. medic. facul. sic inquit. Acori utitur radice, quæ gustu acris est, & modicè amara, odoreq; non iniucunda. Vnde constat, quod facultatis calida est, & consistentiæ tenuis. Huic consentaneum est, ut urinam moueat, & lienes induratos iuuat, tum ceratoidis crassitiem detergeat, simulq; extenuet. sed ad hoc melior est ipsius succus. Omnino uerò siccificū esse clarum est. Et sanè ordinis esto tertij in utroq; in calfaciendo scilicet, & desiccando. Hæc Galenus. Sed quando hic aliquid dicere de galanga occurrerit, ciam à Dioscoride, alijsq; antiquioribus Græcis nihil de ea memoriæ proditū sit, differam ego de hac, quæ à Mauritanis, & alijs sum consecutus. Est itaq; GALANGA duplex: maior altera, altera minor. Minor tenuis est radix, interius & exterius in purpura rufescens, geniculata, internodijs quibusdam reflexa, odorata, sapore admodum acri, adeo ut mansa piperis, & gingiberis modo linguam, & fauces exurat, odore formaq; cypero similis. quapropter quibusdam cyperus Babylonicus dicitur. In Italianam namq; tam ex Mempsi, quam ex Syria transfertur. Optima quæ fuerit gravis, densa, saturatè rufa, odorata, & gustu acerrima. Non desunt tamen impostores, qui cyperi radices contorquentes, aceto, & pipere macerant, & pro galanga uendunt. uerum fraus facile deprehenditur: quippe abriso exteriori cortice, nulla in radicis substantia acedinis nota, nullusq; galangæ sapor percipitur. At maior tamen si longè crassior sit radix, ignauior tamen est, & uiribus infirmior, colore etiam dilutior, minusq; odorata. Galanga calfacit, & siccit ordine tertio: Proinde uentriculum roborat, & eius dolores tollit; si tamen à frigore, uel flatu proueniant. Naribus admodum frigiditatis cerebro utilis est: ore retenta anhelitum commendat. Facit & ad cordis palpitacionem, si è plantaginis succo bibatur: coeliacos sanat, & coli dolores mulcet, qui à flatu oriuntur. Prodest flatuosis uteri affectibus: uenerem roborat: renes refrigeratos calefacit. et frigidis morbis omnibus præstat. Ceterum omnino explodenda est Monachorum in Mesuem scribentium opinio, qui contra Brasauolum & Fuchsum quasi uelle uidentur, galangam potius odoratum iuncum esse, quam Acorum. quod tamen planè falsum omnibus iam comperitum esse non dubitamus.


ΜῆΟΝ.

MEON.


Βαλάνη

C A P. I I I.

MEON, quod Athamanticum uocant, in Macedonia, & Hispania plurimum gignitur, anetho folijs & caule simile, sed eo crassius: binum ferme cubitorum altitudine attollitur: sparsis in obliquo, rectumque radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguam excalfacientibus. Quæ feruefactæ ex aqua, uel tritæ citra coctionem, præcluserum renum, uesicæque fartæ uitia potu leniunt: urine difficultati medentur: stomachi inflationes discutiunt. Torminibus, affectæ uulvæ, articulorum doloribus, atque fluxionibus pectoris, tritæ cum melle in eclegmate auxiliantur. Sanguinem per menstrua pellunt, deflectionibus feruefactæ: infantibus autem illitæ imo ventri, vrinas mouent. Quod si plus quam deceat, ex his bibatur, caput dolore afficiunt.



Κύπερος. CYPERVS.



CREDIDIMVS superioribus annis, legitimum Meon non oriri in Italia, nec eò aliunde aduehi: primum quòd Mei uice uterentur seplasiarj quibusdam albicantibus radicibus, sapore pæstinace simili: deinde quòd etiam Plinij tempore rarum esset in Italia. quippe qui scripserit non feri in Italia Meon, nisi à medicis, ijsq; admodum paucis. Quod procul dubio indicare uidetur, usq; ad Plinij æuam peregrinum in Italia fuisse Meon. Sed cum herbariorum quorundam diligentia, quedam nuper reperta sit planta, quæ folijs constat anethi, caule bicubitali, radicibus nigricantibus, longis, et in obliquum, rectumq; sparsis, grauius odoratis, acrisq; quam legitimum esse Meum, omnes ferè rei herbariæ periti unanimis affirmant, ne uidear mordicus tenere opinionem, facere equidem non possum, quin in eorum sententiam deueniam: tamen in contrarium aliqua sese offerat ratio, quòd scilicet huiusce plantæ radices odorem non usq; adeo grauium spirent, sed quadantenus grauius oleant, nec tenues cerantur, ut Dioscorides inquit. Plinius Meo folia aniso similia reddidit, uocum fortasse similitudine deceptus. siquidem Dioscorides anethi folijs Meum oriri tradidit. Nobilius quod Athamanticum uocant, ita dictum, quòd ab Athamante Aeoli filio inuentum sit, uel quòd præstantissimum in Athamante Phthiotidis proueniat. Meminit Mei Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum his uerbis. Mei radices peritiles sunt, calide tertio ordine, siccae secundo: proinde urinam, mensesq; ciere uolentes hoc utuntur pharmaco. Sed si plusculum sumatur, capiti dolorem mouet, utpote cum plusculum sit calidum, quàm siccum. quippe quòd eius caliditas humiditatem crudiorem etiamnum, et statuosiorẽ ad caput deferat, atq; ita ipsum afficiat ledatq;.

Mei confideratio.

Mei vires ex Galeno.

Gargant. Villi

CAP. IIII.

CYPERVS, quem aliqui eryfisceptrum, ut aspalathum appellant, folia fert porraceis proxima, sed longiora, & exiliora: caulem odorati iunci, cubitalem, aut maiorem, angulosum: in cuius cacumine minuta folia cum semine exoriuntur: radices, quarum in medicina est usus, coherentes inter se, oleis oblongis similes, aut rotundæ, nigro colore, suauis odore, amaro gustu. In lacunosis, palustribus, & cultis enascitur. Optima est grauißima, densa, fractu contumax, plena, & aspera, odoris cum quadã acrimonia iucundi: qualis est Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus insulis petitur. Huic calida uis inest. Venarum spiracula laxat: urinam ciat: ad calculos, aquamq; subter cutem utilissimè bibitur: aduersus scorpionum ictus remedio est: pfriktionibus uuluz, & præclusionibus fotu prodest: pellit menses. Contra ulcera oris, etiam si depascât, uorentq; farina eius efficax est. Malagmatis calfacientibus, & unguentorum spissamentis benè adijci solet. Aliud Cyperi genus tradunt in India nasci, gingeris effigie: quod manducatum croci uim reddit, gustu amaro sentitur, & illitum præsentem pilothri uim exhibet.

TAMETSI unum tantum Cyperi genus memorie prodiderit Dioscorides, cuius radices inter se coherentes oblongas referunt oleas, aut omnino rotundæ sunt; uisitur tamen Cyperus in pluribus Italiæ locis, qui radicibus cõstat longis, geniculatis summo cespite uagantibus, colore in purpuram nigricante. Nascitur hoc Cyperi genus laudatissimum prope Timauï fontes circumstantibus palustribus locis in lapidiæ sinibus galangæ uocatæ (ut paulò

Cyperi genera, & confideratio.



Curcuma cy-  
peri genus.

Leſſio Sera-  
pionis deprau-  
ata.

Cyperus vires  
ex Galeno.

paulo ante diximus) perſimile, non tantum facie, ſed etiam odore. Commendatur etiam odore, qui in Hetruria prouenit, radicibus ſere filipendulae æmulis. ſed non ob id illi fuerit præſerendus, quem Syria mittit: quandoquidem hic longe odorator eſt, et ſubamarus. Cyperi meminit Plinius lib. XXI. cap. XV. ubi de iuncis egit, ſic inquit. Quidam etiamnum unum genus faciunt iunci trianguli, cyperon uocant. Et paulo inferius: Cyperos, ait, iuncus eſt, ut diximus, anguloſus, iuxta terram candidus, cacumine niger, pinguiſq;: ſolia ima porraceis exiliora, in cacumine minutata, inter quæ eſt ſemen: radix oliuæ nigræ ſimilis, quam, cum oblonga eſt, cyperida uocant, magni in medicina uſus. Reperitur Cyperus quandoq; etiam quadrangulari caule. unde non mirum, ſi quadratum iuncum eum uocauerit Cornelius Celſus lib. III. cap. XXI. At Dioſcorides in hac facultate præclariffimus, utraq; differentiam colligens, nec triangulum, nec quadrangulum Cyperum dixit, ſed anguloſum. Optimus deferretur ad nos ex Syria, et Alexandria Aegypti, in cuius defectu Italicum ſupponunt officinae. Non deſunt, qui differentiam ponant inter Cyperum, et Cyperum Plinianum ſecuti, qui libro, et capite citatis, Cyperum gladiolum eſſe affirmat, Cyperum uero anguloſum odoratum iuncum. Sunt tamen Dioſcoridis interpretes, qui utroq; uocabulo pro eodem indifferenter utantur, eo quod (ut recte Hermolaus adnotauit) penultimam Cyperi quandoq; diphthongo longam, quandoq; uocali breuem Græci ſcribant. Eſt apud Plinium et Cypirus arbor ocyſime creſcens, et pseudocypirus frutex, ut lib. XV. cap. XII. ipſe ſcriptum reliquit. Ceterum id Cyperi genus, gingiberis effigie, quod India mittit, eam eſſe radicem peritiores medici putant, quam officinae Mauritanos ſecutæ Curcuman uocant. Nempe præ ſe fert hæc notas ſane omnes, quas Indico Cypero reddidit Dioſcorides. quandoquidem gingiberi ſimilis eſt, eius odorem ferme redolet, guſtu ſubamaro ſcit, et manſa croci modo inficit. Quibus illud etiam accedit, quod depilatorijs medicamentis quibuſdam immiſcetur. Veruntamen ſciendum eſt, hanc non eſſe Curcuman à Serapionis interprete pro chelidonio deſcriptam: ipſe enim nil aliud pro curcuma intelligit, quam Dioſcoridis chelidonium. quo fit, ut non deſit ſuſpicio erroris uel interpretis, uel ſcriptoris, cum curcuma neq; Mauritanum, neq; Græcum ſit uocabulum: Aphri enim chelidonium Kairoch appellant. unde palam eſt, Curcuma pro Kairoch in Serapione deprauatè legi. Quo factum eſt, ut priores tamen medici, tamen ſepliaſarij, qui nunquam hæc perpenderunt, fuerint hallucinati. quippe cum eos lateret, cuiuſnam plantæ radicem Indica Cyperus referret, chelidonijs maioris radicem eſſe crediderunt ob croci ſucci ſimilitudinem. Itaq; Serapionis deprauatam leſionem ſecuti, Indicum Cyperum curcuman uocauere. Indici cyperi meminit Serapio Dioſcoridem ſecutus, proprio capite de Cypero. Ex quo aperte conſtat, curcuman Serapioni deprauatè inſcriptam, ſepliaſarum curcuman, quæ procul dubio Indicus eſt Cyperus, eſſe nequaquam. Cyperum recensuit Galenus lib. V. ſimplicium med. ubi ſic inquit. Cyperi radices maxime uſui ſunt, excaſciantes pariter et exiccantes abſq; mordacitate. Itaq; ulceribus, quæ præ nimia humiditate cicatricem difficulter admittunt, mirifice proſunt: habent enim quiddam etiam adſtringens: quapropter ulceribus item oris conueniunt. Quin et incidendi uim quampiam illis ineſſe teſtificandum, quæ et calculo uentris congruunt, et urinam, menſeſq; prouocant.

### Καρδάμωμον. CARDAMOMVM. Cardamom. CAP. V.

CARDAMOMVM optimum eſt, quod ex Comagene, Armenia, Boſphoroque deuehitur. in India quoque, et Arabia prouenit. Eligi debet plenum, frangenti contumax, occluſum farctumque (quod enim huiuſmodi non eſt, exoletum iudicatur) et guſtu acre, ſubamarum, et odore caput tentans. Excaſcatoriam uim habet: potumque ex aqua facit ad comitiales, iſchiadicos, tuſſes, neruorum reſolutionem: item ad rupta, uulſa, tormina: latas ventris tineas excutit. Ex uino autem potum, renibus, difficultati urinae, à ſcorpione icctis, neque non omnibus uenenum vibrantibus, auxilio eſt. Cum cortice radiceſ lauri epota drachma, calculos comminuit: partus ſuffitu enecat: ſcabiem ex aceto illitum adimit. Et ad vnguentorum ſpiſſamenta additur.

Cardamomi  
conſideratio.

LEGITIMVM Cardamomum noſtra tempeſtate nec cognosci, nec minus à mercatoribus, qui ex Syria, uel Aegypto aromata ad nos conuehant, deferri comperit habeo. Quo fit, ut medici, ac pharmacopola in componendis medicamentis æque errent in Cardamomo, atq; in alijs compluribus, quod Cardamomi loco uarijs quibuſdam ſeminibus, odoratis tamen, indifferenter utantur. Quorum primum Cardamomum maius: ſecundum Nigellam, quod melanthij eſt genus: tertium uero Melegbettaſ, uel grana para-diſi nuncupant; cum tamen eorū nullum nec Græcum, nec Mauritanum ſit Cardamomum. quandoquidem aliud Græci, aliud uero Afri pro Cardamomo intelligunt, ut apertiſſimè teſtatur Serapio, qui quam plurima ſimplicia medicamenta ex Dioſcoride, et Galeno tranſcripſit. Is enim (ut ſua declarant monumēta) Dioſcoridis Cardamomū Cordumenum appellat. deinde autore Iſach Arabo ſui Cardamomi peculiare caput inſtituit, idq; Saccolam ſua lingua nominat: quin et diuim eſſe generum tradit, alterum maius, alterum uero minus. quorum nullum non modo Dioſcoridis Cardamomo reſpondet, ſed nec etiam ulli eorū, quibus officinae indifferenter utuntur. Probatum itaq; primum quod omne officinarum Cardamomum Dioſcoridis Cardamomum eſſe non poſſit, pluribus tum notis, tum etiam qualitatibus. quippe quod hæc in uniuerſum parum, uel ſere tantillum denſa ſint, frangenti non contumacia, et guſtui nihil amaroris relinquunt. Quod præterea ab Arabicis diſtendit, ſi cum illis cōparētur, facile diſparitas deprehenditur. ſiquidē Serapioni maius Cardamomum ſemen eſt plantæ, quod oblongis quibuſdam concluditur capitibus, ijs ſane ſimilibus, quæ è roſis prodeunt, granis obnigris, rotundis, pipere longe maioribus, in quibus minuta ſemina concluduntur, anguloſa, farcta, et odorata: minus uero nullo contegitur capitulo maioris modo; quanquam colore conueniant. Quod planè indicat, omne officinarum Cardamomum nec Arabum eſſe, nec pariter Græcorum, ſed potius ab utriſq; maxime diſſerre. Quare putauerim, illud falſo ſibi perſuaſiſſe Monachos, qui in Meſum ſcripſere, quod Arabum Cardamomum minus illud ſemen ſit, quod ſepliaſie Melegbettaſ uocant, Arabes

Grana para-  
diſi

Monachoni  
error.

dreæ Bellunenſis, qui Auicennam mendis expurgauit, auctoritate freti. Sed cùm Bellunenſis id aſſerat uulgari tantum opinionem ductus; cùmq; notæ minime eorum ſententiæ aſtipulenter, erraſſe Monachi facile deprehenduntur. Semina enim, quæ Melegberras appellant (ut omnibus planè conſtat) capitulis excepta ſuboriuntur, quod minori Serapionis Cardamomo non cuenit. Crediderunt, Ruellius in ſuis de natura ſtirpium libris, & Fuchſius in ſua methodo, id omnino Mauritanorum eſſe Cardamomum, quod nos Indicum piper, alij ſiliquaſtrum appellant. uerum cùm planta hæc folijs exeat bortenſi ſolano ſimilibus, floribus luteolis, fructu longo corniculorum inſtar, qui primo exortu uiſceſcat, maturus uerò adeò ruſceſcat, ac leuore quodam ita pelluceat, ut corallium referat, & in quo concludatur pumilū ſemen, lentum modo compreſſum, aſq; adeo acre, ut ori tantum admotum maxime linguam, & palatum exurat, exulceſcetq; ambo hac in re lapſi deprehenduntur. Nam etſi Indicum piper in hiſce corniculis roſarum ſerè modo ſuum includat ſemen, reliqua tamen Serapionis Cardamomo nullis notis correſpondent: hoc enim ſuis in uasculis globulos quoſdam concludit, non lenticulis ſimiles, ſed rotundos, & pipere craſtiores, qui intra ſe minutum quoddam ſemen continent. Huc etiam accedit, quòd cùm hoc piper corniculation, tum ſemine, tum corniculis ipſis tanta ſit acrimonia præditum, ut non modò manſum, ſed ori tantum admotum ſtatim quaſi ignis exurat, abſurdum utiq; fuerit credere Serapionis Cardamomum eſſe, cùm dixerit ipſe magis adſtriſtoria facultate pollere, quàm acri. Ceterum ſcribit Auicenna maius Cardamomum grana ciceribus atris, minus uerò lentibus minora proferre. Quod cùm fortaſſe Ruellius haud rectè percepſſet, ei errandi anſam præbuit. quippe minori Cardamomo, non autem maiori ſemina lentum modo naſci ait Auicenna: quanquam Ruellius, ut ſuam tueatur ſententiā, ſecus fortè legerit Auicennam. Plinius lib. xii. cap. xiii. quadruplex eſſe Cardamomi genus ſcribit, ſic inquiens. Simile eſt anomo Cardamomum & nomine, & frutice, ſemine oblongo. Metitur eodem modo & in Arabia. Quatuor eius genera. uiridiſſimum ac pingue, acutis angulis, contumax fricanti, quod maxime laudatur: proximum è ruſo candicans: tertium breuius atq; nigrius: peius tamen uarium, et facile tritu, odorisq; prauū, quod uerius coſto uiciniuſ eſſe debet. Hoc & apud Medos naſcitur. Haſtenus Plinius. Sed nescio quos autores ſit ſecutus. quandoquidem tam Dioſcoridi, quàm cæteris Græcis, unum tantum extet Cardamomi genus. In cuius defectu ſupponit Galenus aut myrtum, aut cyperum. Qui præterea Cardamomi meminit lib. v. ſimplicium med. bis uerbis. Cardamomum eſt ſanè facultatis admodum calidæ, non tamen uſq; adeo, ut naſturtium: ſed quantò ſuauius, magisq; ſeagrans eſt naſturtio, tantò & imbecillior ei calida facultas ineſt: nec enim ulcerare idoneū eſt uel ipſum per ſe illitum. Porro adiunctum habet quiddam etiam amaritudinis, quæ lumbricos interficit, & cum aceto ualenter pſoras detergit.

Ruellii & Fuchſii lapſus.


Cardamomi genera ex Plinio.

Cardamomi uires ex Galieno.

## NARDVS INDICA.

Nardos. NARDVM. CAP. VI.

Dvo Nardi genera: unum Indicum, alterum Syriacum appellatur, non quòd in Syria proueniat, ſed quòd montis, in quo oritur, pars una ad Syrios, pars altera ad Indos ſectitur. Ex hoc Syriaci genere, præcipuum eſt recens, & leue, largam gerens comam, flauum colore, perquam odoratum, ac cyperum redolens, breui ſpica, amaro ſapore, linguam ſiccante, quod diu in ſua odoris gratia permaneat. Ex Indico autem Nardo quoddam Gangitis uocatur, à fluuio Gange, apud quem enaſcitur, montem præterfluente: quod genus ob multam loci, in quo prodiit, uliginem, uiribus infirmius eſt, atque procerius adoleſcit, plures ferens ſpicas, ab unica radice comofas, unàque conuolutas, ac grauiter olentes. Montanum autè odoratiuſ, ſpica breui ac mutila, odore cypero uicino, cæteras habens Syriaci dotes. Eſt & genus quoddam, cui Sâpharitico nomen locus indidit, frutice breui, in magnas ſe ſpargens ſpicas, cãdidiore interim medio caule, hircorum uirus ſupra modū redolente: quod improbatuſ. Madefactum uendi ſolet. quod uirium ex eo deprehenditur, quòd candida ſit ſpica, & ſqualida, ſuaque careat lanugine: Adulteratur ſtibio cum aqua, aut palmeo uino, inſpiffationis ponderisque cauſa inſpirato. Intueri autem oportet, ſi lutum radicibus infideat, & incerniculo puluerem excutere, eluendis manibus utilem. Vim habent excaſtoriam, & exiccantem. Vrinam mouet: aluum potu ſiſtunt: uuluarum profluuia, fanieſque appoſita ſupprimunt. Nauſeæ ex aqua frigida auxiliantur, & ſtomachi roſionibus, inflationi, iocinori, regio morbo, renum uitijſ. Aquæ autem incoctæ ſotu ad inſeſum, uuluarum inflammationibus medentur: ad glabras oculorum genas ualent: ſiquidem eas ad deſiorem



chi roſionibus, inflationi, iocinori, regio morbo, renum uitijſ. Aquæ autem incoctæ ſotu ad inſeſum, uuluarum inflammationibus medentur: ad glabras oculorum genas ualent: ſiquidem eas ad deſiorem

siorem pilum reducunt. perfusis humore corporibus insparguntur. Miscentur antidotis & infusili nouo non picato ad ocularia medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cum uino in pastillos coacta.

Nardi Indicæ  
& Syriacæ co-  
fidebantur.

Manardi opi-  
nio reprobata.

Brasauoli er-  
ror.

Plinii lapsus.

NARDVM officinæ Nardi spicam appellant. Sed non desunt, qui credant Indicam nardum in Italian non adhiberi ob regionis distantiam, Syriacam opinantes esse, qua nostro æuo seplasiarum utuntur: tamen si (ut inquit Dioscorides) in Syria non oriatur, uerum ideo Syriacam dici, quod ea montis parte proueniat, quæ flectitur ad Syrios. At cum inter Indos, & Syrios amplissimæ interponantur regiones, nempe deserta Arabia, Persis, Carmania, Gedrosia, Darangia, aliæque nonnullæ, quæ ultra quatuor millia milliariorum continent, nesciuerim profecto, quoniam pacto fieri posset, ut mons ille ad Gangem posset, altera parte Syriam tam facile respiciat, ut Nardus ea parte proueniens Syriaca dici posset. Quo fit, ut quandoque mecum disquirere licuerit, eam potius à Syriacæ regione, quæ ad Indicum fluvium est, Syrii nomen sibi ascriuisse, quam à Syria. quandoquidem si Ptolemæus uera refert, mons in India uisitur, qui à Gange fluuio ad Syriacem extenditur. Absurdum enim esset credere, Nardum ad nos non deferri ex India, cum in Syria nusquam proueniat, cumque multa Indiæ aromata, nulla distantie habita ratione, per carouanas (ut uocant) in Alexandriam Aegypti conferantur, cum quibus nec temere credendum est, quin etiam Nardum conuehant mercatores; præsertim cum certò sciam, nardum Venetias ex Alexandria offerri, nec alibi, quam in India nasci. Licet Manardus Ferrariensis, officinarum nardum nec Indicam, nec Syriacam esse censeat. In cuius sententiam non equidem pedibus eo, esse medicæ materiæ is clarissimus fuerit indagator. quippe quoniam Venetijs pluribus in locis Nardi ingentem copiam uidi, leuiss, comosæ, perquam odoratæ, cyperum redolentis, flauæ, subamaræ, & mansæ non modò linguam exaccatis, sed odorem etiam non iniucundum per os aspergentis, nullisque deficientibus notis, quibus optima nardus ex Dioscoridis sententia explorari potest. Sed plerumque accidit, dum per Indicum, & Arabicum mare in Alexandriam defertur, & inde Venetias, ut ascito sibi maris humore (id namque facile fit, quod Nardus sit siccissima) uel situm contrahat, uel subputrescat: unde postea amissa sua uolentia, grauiter oleat. Quo fit, ut hac in re Manardum longè hallucinatum crediderim: qui si rectè perpendisset, quæ Nardi pars sit spica, atque in emporijs, ubi numerosa, præstantissimaque uisitur, accuratius ipsam expendisset, non equidem uereor, quin aliter de ea scripsisset. Verum enim uero cum planè ignorasset, quæ nardi pars spica esset, selectamque, & incorruptam Nardum minime nouisset, lib. 111. epist. vi. scribit, Galenum de Nardi spica, quæ antidotis admiscetur, loquentem, radicem quidem, non spicam intelligere. Et utinam, inquit, quæ nobis offertur, legitima esset: sed quod ea ipsa non sit, cognoscitur, quod nulla odoris suauitate commendetur. Et lib. viii. epist. i. inquit. Galenus lib. i. de antidotis in theriacæ compositione Nardi radicem tantummodo admiscet, eo quod uiribus ipsa præstantior sit: spicam uero paruipendit, & pro nihilo habet. Quod sanè declaratur, Manardum hanc Galeni sententiam perperam accepisse, atque etiam Nardi historiam ignorasse. quandoquidem nardi radix nil aliud est, quam spica, ut ipsemet testatur Galenus eodem de antidotis libro, sic inquit. iubet Andromachus adijcere nardum Indicam, ea uero est, quam spicam uocant, non quod spica sit, radix etenim est; sed quod spicæ formam referat. Quibus palam est, idem esse nardi spicam, & nardi radicem, ut etiamnum declarat idem Galenus lib. ix. de comp. med. secundum locos in Philonis antidotum scribens. Quapropter idem lib. viii. simp. med. de Nardo caput facturum, illud inscripsit Nardi spica, ut potest quæ pars sit in tota stirpe præstantior, minime quidem ignorans, se radicem nardi describere. Nam si sensisset, spicam à radice differre, eam planè silentio præterisset tanquam inutile, & capiti nomen indidisset aut generaliter ab ipsa Nardo, aut à radice tantum, uti uiribus præstantiore. In hoc, ac longè maiori uersatur errore Brasauolus. siquidem suo de simplicium examine Nardi spicam non modò non esse radicem censet, sed nullius usus eam existimat, sic inquit. Venetijs spicam, caulem, & radicem emes, quanuis & ipsi adulterent. lubeo autem radicem, & caulem emere, quoniam hæc apud antiquos autores, ut Dioscoridem, & Galenum magis in usu medico sunt, quam spica: quippe folia abiicit Dioscorides; ad nos tamen spica non defertur, sed radix. Hec ille. Sed mehercule quantum ex Dioscoridis scriptis percipere potui, nunquam hactenus sum consecutus, quod ipse ex omnibus nardi partibus aliam præferat, quam spica. Quod autem crediderit ipse spicam in Nardo uiribus magis præstare, quam ceteræ eius partes; quodque cum de Nardo scribit, tantum de spica intelligat, aperte ostendit, cum inquit. Ex nardo Syriaca dicta melior est recens, & leuiss, largam gerens comam, &c. Quippe leuitas, ac comæ magnitudo, nullis nardi partibus, præter quam spicæ competunt; præsertimque: cum ipsa non uacet ceteris notis, quas illi tribuit Dioscorides. Ad hæc nulli sanè incompertum existimo, Dioscoridem huiusce libri initio in probandis tantum radicibus, quæ odore commendantur, operam impendere, nempe iridis, acori, mei, nardi, phu, asari, & huiusmodi stirpium generum, non autem in offerendis caulibus, floribus, folijs, ac spicis, quæ caulium summitatibus innascantur. Quo fit, ut etiam fateri liceat, Brasauolum ignorasse spicam ipsam esse nardi radicem: quin potius pro certo credidisse in plantæ ipsius nardi cacumine, non in radice oriri spicam, quæ tamè Galeno teste radix est, & ceteris nardi partibus præstantior. quandoquidem si aliter res se haberet, commoda longè plura radicibus ex more redderet Dioscorides, quam spicæ. Quod præterea Galenus plus laudauerit Nardi caules, quam spicam (ut asserit Brasauolus) nusquam cōperit habeo. Ceterum quanta sententiæ inconstantia Nardi historiam idem descripserit, ex suo posteriori simplicium examine, in quo ultimam manum imposuisse fatetur, facile conijcitur, dum senem secum colloquentem instruit, his uerbis. Ne igitur in his montibus nardum quæras, sed Venetijs spicam, caulem, & radicem emes. At sui ipsius statim oblitus uidetur non multis post lineis, cum inquit. Aliud uero sunt spica, & flos, quæ ad nos non afferuntur. Ex quo facile crediderim, ipsam non modò Nardi historiam confudisse, atque etiam, quod peius est, corrupisse; sed etiam sibi ipsi, uel potius seni uerba dedisse. primum namque ait Venetijs spicam, caulem, & radicem reperiri: mox spicam ad nos aduerti negat. Sed ante hos hac in re Plinium quoque grauiter hallucinatum inuenio: quippe qui libro & capite xii. in Nardi

ipſius hiſtoria longè diſideat à Dioſcoride & Galeno : quin et à ceteris materie medicæ autoribus. Aum inquit . Nar-  
dum frutex eſt graui , & craſſa radice , ſed breui , ac nigra , fragiliq; , quauis pingui , ſitum redolente , cyperi odore ,  
aſpero ſapore : folio paruo , denſoq; . Cacumina in ariſtas ſe ſpargūt : ideo gemma dote Nardi ſpicas , ac folia celebrāt.  
Hæc Plinius . Cuius doctrinam ſecuti , nō modò Ferrarienſes illi , ſed Hermolaus , & Ruellius , ipſi quoq; pariter aber-  
rarunt . ſiquidem Ruellius (ut puto) nulla alia de cauſa aſſerit , ſe in officiis Nardum uidiſſe , cui incrant dotes omnes  
illū à Plinio reddite , quā ut Plinianā tueretur lectionē . Quod tamen falſum eſſe arbitramur . Ego enim tametiſi Nar-  
di quā plurimum in Venetiſ officiis diligenter examinauerim , ac ſelegerim ; aliud tamen , quā ſpicam uidere mihi  
non licuit . Quapropter nullum inueniri Nardum exiſtimo , quod in caulium cacumine ſpicas proferat , quemadmo-  
dum tradidit Plinius , aſſerit Ruellius , & contendit Braſauolus , contra Galeni , & Dioſcoridis ſententiam . Qui Nar-  
dum deſcribit plures ferre ſpicas , non quidem à caulibus , ſed ab una tantum radice prouenientes : non tamen quòd alia  
radix uiribus præſtans ſpicas ipſis ſubſit , ſed quoniam , cum plures in radice ſint ſpicæ , neceſſe eſt , ut baſi , uel firmamen-  
to aliquo conſiſtant , à quo originem trahant , ut in alio & lilij radicibus conſpicitur . Quod pro explorato conſiteri  
poſſum , cum ſepenumero Venetijs Nardi ſpicæ ceſſites uiderim , tum ſiguræ , tum etiam ſpicarum connexu allium : re-  
ſerētes , ut unusquiſq; pro arbitrio experiri poterit . Verim enim uero ut probè reſponſion ſit omnibus ſerè obiectio-  
nibus , dicimus , quòd ſi fortè reperirentur , qui aſſererent illas eſſe proprias Nardi radices , quæ capillaceis fibris à ſpi-  
carum baſi oriuntur , ut in alio , capis , ac bulbaceis omnibus uiſitur , & ea propter ſpicas ijs adnexas non eſſe Nardi  
radices , ſed per ſe partes ab his admodum differentes , poteſt eorum obiectio facilè dilui Theophræſti teſtimonio . Si-  
quidem is lib. primo cap. x. de plantarū hiſtoria aperte declarat , in alio , capis , bulbis , lilijs , ac alijs eius generis , & per-  
conſequens in ſpica non ſolū dici radices ea capillamenta , quæ bulbaceis illarum plantarum capitibus ſubijciuntur ,  
ſed etiam id bulbaceum totum , quod terra reconditur . Et ut res ipſa clarior omnibus ſit , generali regula expreſſum  
uoluit , quòd totum id in quauis planta , quod ſub terra obruitur , radix commodiſſimè dicatur . Proinde uidetur Nardū  
ipſam inter radices idem memorariſſe Theophræſtus lib. ix. cap. vii. de plantarum hiſtoria , his uerbis . Quibus ad un-  
guenta utuntur hæc ſerè ſunt , caſia , cinnamomum , cardamomum , nardus , nerum , baſanū , aſpalathus , ſtryax , iris , nar-  
za , coſtus , panaces , crocum , myrrha , cyperus , iuncus , calamus , ſampſuchum , lotus , anethum . Horum alia radices , alia  
cortices , alia rami , alia ligna , alia ſemina , alia lacrymæ , alia flores . Quibus palām eſt , non poſſe Nardum niſi inter ra-  
dices recenſeri , cum nec corticis , nec ligni , nec rami , nec floris , nec ſeminis , nec tandem lacrymæ ſpeciem præ ſe ferat .  
Quod cum rectè ſciuiſſet Galenus tum lib. primo de antidotis , tum ix. de comp. medic. ſecundum locos , Nardi ſpicam  
radicem eſſe declarauit . Verim longè ab omni Nardo diſtat NARDVS ITALICA , quæ noſtris uulgò uo-  
catur Spigo . Cuius etiam generis ea eſt planta , quam aliqui uulgò appellāt Lauanda , alij uerò Lauendula . adeo ut hæc  
fœmina , illa uerò mas in eo genere à quā plurimis uocentur . Mas folio conſtat latiore , longiore , craſſiore , robu-  
ſtiore , albidiorēq; , quā fœmina . Sed utraq; planta fruticofa , & roſmarini modo , innumeris reſerta eſt folijs : è quo-  
rum medio uinci exeunt cauliculi , quadranguli , tenuēs , dodrantalem longitudinem excedentes : in quorum cacumine  
flores exeunt ſpicati , colore purpureo , quauis in fœmina dilutiores , patentioresq; , odore fragrātes , uerū uſque adco  
acuto , ut nares feriat . Excaſfaciunt , & exiccant ambo ordine ſecundo completo , uel tertio inchoante , uiribus à Nar-  
dis omnibus non longè recedentibus . Conſerunt omnibus cerebri ægritudinibus à frigido prouenientibus : conuulſis ,  
reſolutisq; auxiliantur : uentriculum roborant , & iecur ab infarctu liberant : quin & obſtruſos lienes iuuant : ute-  
rum caſefaciunt , & menſes , & ſecundas educunt . Fit è floribus ſtillatitium oleum uitreis organis , quod propriè un-  
guentarij uulgò uocant olio di Spigo , odoris adeo acerrimi , ut cætera odoramenta ſuperet . quo fit , ut extra officinas  
illud aſſeruent , ne moſchi , ambari , zibetti , aliorumq; unguentorum , et aromatum ſuauiſſimam intercipiat . Nardi Indi-  
cæ uires ſcripſit Galenus lib. vii. de ſimpl. medic. facultate , ſic inquit . Nardi ſpica excaſfacit exceſſu primo , et  
deſiccatur ſecundo iam completo . Compoſita eſt ex adſtringente ſufficienter ſubſtantia , & acri calida non multa , &  
quadam leuiter amara . Ex his conſtans facultatibus radix & ad iecur , & ad ſtomachum rationabiliter conuenit tum  
potatū , tum extrinſecus impoſita . Vrinam ciet , morſus ſtomachi ſanat : in uentre , ac inteſtinis conſiſtentes fluxiones de-  
ſiccatur , ad hæc & eas , quæ in capite , & thorace . Valentior eſt uocata Indica , nigriorq; , quā Syriaca uocata .

Ruell. & Her-  
molaus error.

Dilutio cuius-  
dam obiectionis .

Nardi Italice  
genera , & ui-  
res . Lauendula

Nardi Indicæ  
uires ex Gal.

Νάρδος Κελτικῆ.

NARDVM CELTICVM.

CAP. VII.

Νάρδος Κελτικῆ.

Reuniſſion & uires & odor Nardi Italici

CELTICVM Nardum naſcitur in Liguriæ alpiſ , aliungia patrio nomine appellatum : pro-  
uenitq; in Iſtria . Exiguè fruticat , & cum radicibus in manuales faſciculos componitur . Folia ha-  
bet oblonga , colore in flauum languido : florem luteum . Caulium , & radicem duntaxat uſus eſt ,  
& odoris ſuauiſſas . vnde pridie faſciculos aqua abluerè expedit , & exempta terra , pauito ſolo atque  
humenti , ſubiecta charta reponere : poſtridie repurgare . ſiquidem utile , cum acroſo alienoq;ue  
propter humoris uim , non excutitur . Adulteratur impoſita herba ſimili , quæ hirculus uocatur ,  
ab odoris grauitate . Sed facilis cognitio : nanque herba candidior eſt , ſine caule , minus oblongis  
folijs , radice neque amara , neque odorata , uti uerum Nardum eſt . Itaque radices , atque cauliculi ,  
obicctis folijs , triti ſecernuntur , uino excipiuntur , digerunturq; in paſtillos , & ita fictili nouo di-  
ligenter operto , aſſeruari debent . Laudatur maximè , recens , iucundi odoris , radice numeroſa cohe-  
rens , plenum , nec fragile . Ad eadem , quæ Syriacum , pollet : ſed uehementius urinam cit , & ſtoma-  
cho utiliſſus eſt . Inflammationibus iocinoris , & felle ſuffuſis auxiliatur . Contra ſtomachi inflatio-  
nes , cum abſinthij decocto bibitur : item aduerſus licnem , renū & ueſicæ uitia , & uenenatos icthys ,  
ex uino . Additur in malagmata , potiones , & caſeficientia unguenta .



Nardi Celti-  
ce considera-  
tio.

*Matthioli Magnolium album*



Seplafianiori  
quorundā er-  
ror.

Nardi Celti-  
ce vires ex  
Galen.

TANTA fuit ueterum, qui nos præcesserunt, negligetia, ne dicam ignorantia, ut non modo in ueram simplicium medicamentorum cognitionem, quæ peregrina ex longinquis terrarum partibus aduehuntur, probatissimorum autorum ope, uenire non elaborauerint; sed ne minimam quidē curam adhibuerint, cōmuni reipublicæ beneficio, ut de his saltem, quæ in quā plurimis Italiæ locis, ac alijs non longē distantibus inueniantur, quicquam lucis assequerentur, ac posteris relinquerent. quæ potius in suis multo uidentur negligentiores, quā in alienis. Nascitur Celtica nardus in Liguriæ alpinis, nascitur et in Istria, pariterq; in montibus non longē à Villaco Carinthiæ oppido, et Ludemburgio Stiria: attamen non ob id legitima in multis uisitur officinis: nec fortasse in ijs uideretur, nisi his nostris lucubrationibus annis superioribus Italico sermone editis, pharmacopole plures diligentiores redditi, medicam materiam accuratius expendere coepissent. Sed id magis detestandum uidetur, quod ijs in regionibus, ubi Celtica nardus nascitur, magis hallucinantur homines, quā alibi. siquidem Genue, quæ Liguriæ est ciuitas (nisi iam admoniti resipiscant) alijsq; finitimis locis, ubi Celtica nardus facillè haberi potest, tam medici, quā seplafianij aliorum ignorantiam secuti, illius loco, lauanda sic uocata, uel nostrate Nardo passim utuntur. Quæ quantum in historia omnibus notis, non dicam uiribus, à Celtica nardo discrepent, quicunq; primum rem optime perpenderit, ac de inde notas, et qualitates illi à Dioscoride redditas, cum lauanda, nostratisq; Nardi notis comparauerit, manifestum eorum lapsus facillè incusare poterit. quippe Celtica nardus in breuem, exiguamq; plantam consurgit: lauanda uero, et socia nardus magno exoriuntur cespite, ramusculis proceris, densissimisque comantibus folijs. Illa folia fert subrubea, et flores flauo colore: hæ autem folijs consurgunt incanis, floribus spicatis, et colore purpurascens. Illius caule, et radicibus utimur, quod hisce partibus maxime polleat: harum uero tantum flores commendantur. Quod satis clarè demonstrat, quā facillè decipiantur, qui tam leuibus et falsis feruntur opinionibus. Verum quanquam (ut in superioris Nardi mentione diximus) communi omnium sententia comperitum sit, lauanda, spicæq; nostratis facultas ad omnia Nardi genera propius accedere; hoc tamen eos ad errorem non uindicat, qui lauandam Celticam nardum esse contendunt. Præterea non desunt pharmacopole rei herbarie potius ignari, qui pro Celtica nardo plantam quandam incognitam emant arborescē, caule longo reflexo, cuius folia, quæ colore subflauo constant, adeo densa ac minuta sunt, ut potius muscosam arborum, et lapidum materiam, quā aliud representent. At quod in uestiendis caulibus ipsius ramusculis, eos tam densè circumdat, ut ferè spicæ effigiem præ se ferant, pro Celtica nardo ab impostoribus uenditur: sed hæc haud amarescit, nec ulla odoris præstantia commendatur. Ceterum ingens legitime nardi Celticæ prouentus habetur in Stiria Austria, et Carinthia conterminis, ubi ludemburgensis rura suis è montibus quotannis innumeros comportant fasciculos, quibus magnos admodum replent saccos, et mercatoribus uendunt, qui in Syriam, et Aegyptum mercimonia conuehant. Siquidem (ut ferunt) Syrijs, et Aegyptijs Celtica nardus maxime expetitur, ut balneis eam imponent, quibus frequenter utuntur. Celticam nardum ad me primum misit Petrus Salicetus clarissimus medicus ex Grazio Stiria oppido: in cuius plantis et spicæ in radicibus, et folia, et flores in caule (ut appicta figura demonstrat) nullo impedimento cernebantur, adeo ut à Dioscoridis historia nulla ex parte recederent: nec ulla tamen spica in eius cacumine uidebatur, uti Ruellius et Brasauolus in Indica nasci scripserunt. Quamobrem nobis quoq; iam liceat literis memorieq; mandare, Celticam nardum non modo in Liguria, et Istria prouenire; sed etiam in Stiria, Carinthia, ac etiam alijs fortasse locis. quippe superiore anno ego huius nardi nonnullas inueni plantas in quodam Vipaci monte, qui tantum uiginti millia passuum à Gorizia distat. Verum si eo destituantur medici, commodè Indicam supponere poterunt. An uero Celtica nardus sit Saluica, aut non, de qua Virgilius, et Plinius scripsere, etsi hæc inter se nullam habere cognitionem pluribus comprobare possem; cum tamen ea parum, uel nihil rei medicæ conferant, silentio inuoluenda duximus. quanquam eruditissimus Leoniceus non animaduertens Dioscoridem Aliungiam, non Saliuncam Celticam nardum appellasse, Plinium accusat: qua in re ipse potius deceptus fuisse uidetur. Meminit Celticæ nardi Galenus lib. vii. de simp. med. facilibus uerbis. Nardus Celtica iam dictis nardis similis quadantenus in genere facultatis est. Ceterum ad omnia imbecillior, præter quā ad prouocandam urinam. siquidem calidior illis est, sed minus adstringit.

Νάρδος ὄρεα.

NARDVM MONTANVM.

CAP. VIII.

MONTANVM Nardum, quod ab aliquibus thylacitis, & niris appellatur, in Cilicia, & Syria nascitur: caule & folijs eryngio similibus, minoribus, minimè tamen spinosis, asperisque. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu hastulæ regiae, sed longè gracilioribus, † & longè minoribus. Neq; caulem, neq; fructū, neque florē profert. Ad eadem, ad quæ Celticū efficac.

*Eryngio*  
Nardi montanæ considera-  
tio.

VIDETVR in hoc capite Dioscorides non parum à se ipso dissentire, quòd scripserit primum montanum Nardum caule, & folijs esse eryngio similibus: mox prope capituli calcem eam scribat neq; caulem, neq; fructum, neq; florē proferre. Quapropter existimant tunc Ruellius, tunc etiam Marcellus id faciliè accidisse scriptorum incuria, qui uocum uicinitate decepti καυλὸς pro κλαδὸς, uel κλώνος scripserunt. Verum cum hæc dictiones ramos, uel scirculos designent, quæ nomina potius arboribus conueniant, quàm herbis, sintq; idem rami in arboribus, quod caules in herbis; idcirco non uidetur hic locus, ut illi fortasse putant, à mendis uindicatus. Ceterum non crediderim ego, Dioscoridem, qui est hac in facultate faciliè princeps, & quem antiqua, & secuta ætas tantopere commendat, in tam paucis sui oblitum, adeoq; turpiter lapsum fuisse. quinimo nobis relinquatur suspicio, quòd omnino in altera capituli parte uitium aliquod accesserit, non harum uocum uicinitate, sed potius scriptorum dormitantium negligentia, uel uigilantium temeritate. Quo factum est, ut hæcenus incertus dubiusq; fuerim, an hæc planta in Italia proueniat, uel aliunde eò afferatur. Misit tamen ad nos hoc anno stirpem quandam excellentiss. medicus Augustinus Alpagus Bellunensis, cui binæ inherebant radices asphodeli figura, sed longè minores, pbru, uel nardum redolentes, adeo ut hac parte montanum Nardum plane præ se ferre uiderentur. Sed quoniam folia, & caulis pbru potius referebant, quàm eryngium, quemadmodum & umbella, cur eam montanum Nardum fuisse comprobem, sanè non habeo, cum sciri non possit, an in priori, an in posteriori, an in alia huius capituli parte lateant mendæ. Itaq; si forte aliquod ad manus esset medicamentum, quod montanum Nardum exciperet, supponant audacter pharmacopole Indicum, uel Celticum. Tametsi in suo de simplicium examine asseueret Brasauolus Ferrariensis Indicæ nardi uice montanæ plurimum ad nos afferri à Ciliciâ: eamq; propriè montanam existimat, cuius passim in officinis est usus. Sed qua ratione ductus nouam hanc protulerit opinionem, ipse certè nescio: Nardus enim montana radices habet asphodelo similes, non utiq; spicatas, leues, comosas, quemadmodum ea, qua utimur ex India aduecta. Nisi fortasse Brasauolus uoluerit Indicam nardū ideo montanam appellare, quòd in montibus oriat. Ita quidem eius sententiam ueram esse putarem, non tamen à rei herbarie peritis acceptam iri. Nardi montanæ uires scripsit Galenus lib. VII. simp. med. sic inquit, Nardus montana, quæ & thylacitis, & pyritis nuncupatur, plurima in Cilicia nascitur: sed prædictis debiliior est.

Bras. opinio  
non accepta.

Nardi mont.  
uires ex Gal.

† In Oribasio, qui simplicium descriptiones Dioscoridi acceptas refert, legitur λευκότεραι, hoc est, candidiores. quòd Nardus montana constet radicibus asphodelo non solum minorib. & gracilioribus, sed etiam candidioribus.

Ασάρων.

ASARVM.

Ζυφωμύτι.

CAP. IX.

ASARVM, quod & ipsum aliqui syluestre nardum appellant, hederæ folijs, minoribus multò, rotundioribusque: floribus cythino hyoscyami similibus, purpureis, inter folia proximè radicem emicantibus, odoratis: in quibus semen acinosum. † Cauliculos habet angulosos, asperos, & molles: radices numerosas, geniculatas, tenues, obliquas, graminum non dissimiles, longè tamen graciliores, odoratas, excalfacientes, & quæ linguam uehementè mordent. Excalfactoriam uim habet: urinam cit: hydropicis, & uetusto coxendicū dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua mulsa potæ, menses trahūt: & ueratri albi modo purgant. In unguenta additur. Umbrosis montibus prouenit: sed plurimum in Ponto, Phrygia, Illyrico, & Italiæ Iustinienfi agro.


Asari conside-  
ratio.

NULLAM nostris temporibus officinæ ponunt differentiationem inter Asarum, & baccharum: quinimo uno ore fere omnes Asarum baccharum appellant. At quantum notis, & uiribus inter se differant, is rectè iudicet, qui harum stirpium historias accuratius perpenderit: differunt enim inter se admodum Asarum, & baccharis, ut diffusius libro tertio differemus. Asarum itaq; procul dubio illa fuerit planta, quæ uulgò Bacchara falso appellatur, cum nullis ab historia dissideat notis. Ceterum Brasauolus immeritò in Plinium spiculum contorsit, cum dicat ipsum eo etiam in errore uersari, ut Asarum baccharum esse existimauerit. Sed profectò nesciuerim ego, qua ratione illud Brasauolus in Plinium scripserit, quippe qui libro XXI. cap. VI. eos acerrimè arguat, qui baccharum, & syluestre nardum idem esse contendunt, his uerbis. Sed eorum quoq; error corrigendus est, qui

F. 347

Plinii tutela  
aduersus Bra-  
sauolum.

c 2 bacchar



Asari vires ex  
Mefue.

Asari vires ex  
Galenus.

bacchar rusticum nardum appellauere: est enim alia herba sic cognominata, quam Græci Asaron uocant, cuius speciem, figuramq; diximus in nardi generibus. Hæc Plinius. quibus palam est, Plinium seipsam à Brasauolo descendisse. Porro si etiam Plinij ætate non deerant, qui Asarium baccharem uocitarent; non mirum fuerit, si in hunc usq; diem protracta hæc sit appellatio. In qua fortasse perseuerantes ueterum nonnulli Dioscoridis Asaro eas ferè omnes facultates reddidere præter autoris mentem, quas ipse libro tertio bacchari adscripsit. quod facilius ad credendum uulgus allexit, Asarum, & baccharem nomine tantum differre. Verum cum recentiorum quorundam diligentia ac doctrina id totum Dioscoridi additum deprehensum sit, eo quod diuersis tum libris, tum capitibus ipse de his differuerit; cumq; Serapionem uiderint de Asaro ex Dioscoride scribentem, adulterinam hanc lectionem non admittere, id totum, quod eò accesserat præter autoris sententiam, tanquam illegitimum abdicarunt. Asari vires scripsit Mesues inter deiectionaria medicamenta, ubi sic habet. Excalfacit Asarum ordine secundo, & siccatur tertio. Attenuat, reserat, resoluit, & prouocat; adstrictione tamen non uacat. Bibitum non modo uomitiones ciēt, sed & per aluum ducit, & per urinam. Pituitam, & bilem deijcit. Roboratur tamen admixto caprino sero, aut nardo, aut hydromelite: At manifestius pituitam, quam bilem educit. quo fit, ut coxendicum cæterarumq; compaginum dolore uexatis non obscure opituletur: præsertim si sero maceretur, uel decoquatur. Facit mirum in modum ad iocinoris et lienis infarctus, scirrhusosq; tumores. Quamobrem subeuntibus cutem aquis, fellisq; suffusionibus datur maximo iuuamento uino maceratam. Conferunt item diuturnis febribus, ijsq; præsertim, quæ ex contumaci infarctu proueniunt. Oleum macerationis ipsius admixto ladano, dorsi spondylis inunctum sudorem commouet: leuiter tamen coqui debet, nam si diu ferueat, uim ferè omnem deperdit. neq; etiam diuturna indiget contritione: diutius enim contritum facilius uomitiones, quam aluum ciēt. Asari meminit Galenus lib. v. i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Asari radices utiles sunt, facultate similes radicibus acori, intensiores tamen. Itaq; ex ijs, quæ de illis prodita sunt hic facienda coniectura. Hactenus Galenus. A cuius sententia (sit tamen cum uenia dictum) maxime dissentio. siquidem cum nulla in acoro deiectionaria sit facultas, & Asarum, ut Dioscorides inquit, Mesues fatetur, & nobis experimento compertum est, ueratri modo expurget, & bilem, pituitamq; & superne, & inferne propellat, non uideo sanè, cur acoro in omnibus suis facultatibus tam facile comparari possit.

† Hec uerba ut in Ruellio inuenimus, ita reliquimus. Sed admonendum esse lectorem duximus, ea non legi in Græcis nostris codicibus, neq; à Serapione referri. quod argumento est illa Dioscoridi accreuisse. Sunt tamen Græcè scripta: ἔχον καυλὰ γανόδη, ὑποτρεχέα, ἀραιά. Id est: Habens cauliculos angulosos, subasperos, raros.

PHV MAGNUM. (30-10) Calmūs

PHV PARVUM.

Valeriana Inferiori



PHV. (30-10) Calmūs

CAP. X.

PHV, quod & aliqui syluestrem nardū appellant, nascitur in Ponto: folio olusatri, aut elaphobosci: caule cubitali, aut altiore, læui, cauo, molli, in purpuram uergente, geniculis intercepto: floribus

ribus narcisso proximis, maioribus, tenerioribus, & ex albicante purpureis : radice superius ad digitum minoris crassitudinem, ex obliquo villosa in nigri veratri, aut iunci odorati modum : capillamentis inuicem contextis, flavescentibus, odoratis, cum quadam odoris grauitate nardum æmulantibus. Excalfacit : urinam mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem præstare potest : ad lateris etiam dolorem efficax : menses cit. antidotis inferitur. Adulteratur radice rusci admista. Sed maleficium deprehenditur : quoniam hæc dura est, & frangenti contumax, sine ulla odoris gratia.

NON possum non fateri, eos omnes bene sentire, qui maiorem Valerianam sic uocatam, quæ passim in Italia nascitur, legitimum esse Phu asserunt. Quippe radices primum forma, odore, colore, ac cæteris in uniuersum notis ab ijs, quæ sibi Phu ipsum asciscit, haud quaquam recedunt. Indicant idem pariter folia, et caules : illa enim olusatro non sunt dissimilia : hi uero adolefcunt cubitali mensura proceriores, leues, inanes, molles, geniculati, et in purpuram uergentes. Flores tamen obfcurare uidentur, qui in Phu lilij, uel narcissi effigiem præ se ferunt, non autem umbellæ, uel muscarij speciem, ut in maiori Valeriana uisuntur : quanquam flosculi per se omnes, qui umbellam cõsciunt, forma narcissinos referant, in purpuram albicantes. Quo fit, ut cum Ruellio existimandum putauerim, hæc de floribus uerba esse à scriptoribus in Dioscoride deprauata. Namq; uidetur nostras Valeriana, omnibus tum notis, tum qualitatibus adeo cum Phu conuenire, ut re uera dici possit, non aliud, quam ipsum Phu ad unguem referre. Et si non desint ( ut audio ) qui profiteantur Phu alteram à Valeriana se inuenisse, quod floribus narcissi proueniat. At quia id pro certo compertum non habeo, et quia non desunt, qui talia fabulentur, non est, quid hac in re certi affirmare possim. Est et Valerianæ alterum genus, quod minus appellant, cuius caulis iuxta folia, quæ quadantenus maioris similitudinem referunt, molli lanugine pubet, reliqua uero parte maiori non absimile assurgit, floribus subpurpureis, in umbellam pariter cõeuntibus. Radices mittit hæc tenues, quæ in multifidas conglomerantur fibras, odore mixto inter iridem,

Phu confideratio.

et nardum. Vtraq; odore commendatur : proinde eas uestibus quidam interponunt. Phu ( ut scriptum reliquit Galenus lib. VIII. simplicium med. ) odoratum quodammodo est. Huius herbe radix nardo uiribus similis, sed tamen ad pleraq; infirmior. Urinam plus mouet, quam aut Indica, aut Syriaca nardus : similiter autem ut Celtica. Simile Phu asserit ipse Galenus esse Carpesium, cuius cum nullibi meminerit Dioscorides, ut recte sciri possit quid nam senioribus Græcis fuerit Carpesium, in primis Galeni testimonio eius uires et formam describam : is enim lib. VII. simp. med. sic habet. CARPESIVM simile est uocato Phu, non gustu tantum, sed et facultate. Sed plus habet tenuitatis : proinde magis eo etiam uiscerum obstructions extergit, et urinam mouet, renesq; calculis degrauiatos expurgat. Non tamen eatenus tenuium est partium, ut liceat loco cinnamomi, si non ad manum sit, usurpare, sicuti faciebat Quintus. Præstantius est Carpesium ponticum lærtio : non tamen uel ipsum cinnamomi uiribus uicinum est, imò non paruo detertus optima cassia. Nuncupatur utrunq; à montibus quibusdam Pamphiliæ, in quibus nascitur. Ingensq; eius prouentus est in Syria. Et primo libro de antidotis inquit. Quintus ( ut aunt ) quoties cinnamomum deerat, Carpesium, ut quod uiribus nihil ab optima cassia differret, in theriacæ compositione imponebat. Ego idcirco eius plurimum mecum attuli ex ea peregrinatione, qua orientis provinciis adij, diligenterq; repositum nunc usq; multum seruo : quod odorem etiamnum et saporem, si non qualem prius habebat, certe non dum exoletum retinet. Est aut Carpesium herba phu appellato genere similis, ualentior tamen, atq; odoratum quiddam spirans. Plurimum hoc in Sida Pamphiliæ nascitur, emittiturq; propterea illic uilissimo pretio. Quocirca si quis uestriam illuc accesserit, Carpesij plurimum emat, cum id sibi longo tempore duraturum nouerit. Tenuia autem sunt sarmenta, cinnamomi uirgultis similia. Eius duo reperiuntur genera ; unum quod lærtium ; alterum, quod ponticum cognominatur, à monte, in quo nascuntur, utraq; nomen adepta, sed ponticum melius est. Quod cum eius non parum haberem, permultis medicamentis admiscui, in quibus phu uocata imponi debuerat. Est enim Carpesium phu simile, ualentius tamen, et in quo ( ut dixi ) nonnihil odoratæ qualitatis gustu odoratq; sentitur. Hactenus Galenus. Verum quid hac tempestate sit Carpesium, arduum sane fuerit explicare et mihi, et cæteris materie medicæ scriptoribus. Tanetsi Hermolaus, Ruellius, Fuchsius, ac etiam Monachi Mesum exponentes pro certo exploratum habeant, Auicennæ, Serapionis, et Actuarij auctoritatibus innixi, fructus piperi similes, qui uulgò cubebe uocantur, legitimum esse carpesium, siquidem Serapio quod Galeno carpesium uocatur, sub cubebe nomine ipsius Galeni testimonio sic describit. Cubebe est medicina facultate, et sapore Phu non absimilis, quanuis longè tenuior. quare obstructions totius corporis aperit, urinam ciet, et calculos renum pelat. In hac fere sententia uersatur et Auicenna cubebas carpesium appellans : quemadmodum et Actuarius qui Mauritanorum nomina secutus, in quibusdam medicamentis Carpesium imponit, quod à barbaris κομβέας uocari ait. Quibus auctoritatibus luce clarius patet, quod Galeni carpesium, et Arabum cubebe nulla ex parte differunt.

Valeriana minor, Bahrian.

Phu uires ex Galeno.

Carpesij consideratio.

Veruntamen illud animaduertendum est, quod eos in errore uersari existimem, qui credunt ( ut Hermolaus, Ruellius, et Fuchsius ) uulgares seplasiariorum cubebas illas referre, de quibus scripsere Serapio, Auicenna, et Actuarius. quandoquidem qui dixerit cubebas plantæ fructum, uel semen esse, eorum reperio neminem : nec minus probari posse putem, id usquam dixisse Galenum. qui carpesium describit his uerbis. λεωτὰ δὲ ἐστὶ τὰ κρόφι, παρὰ τὸ λαοὶ αὐτοῖς ἐν γένεσιν τοῦ κινναμώμου. hoc est. Sunt autem tenuia sarmenta, cinnamomi uirgultis similia. Ipsumq; Phu et odore, et facultatibus adsimulat. Quapropter cum tantum Phu radices in usum medicum ueniant, facile dici potest, carpesium Galeno potius radicem esse sarmenta, quam caulium ; et præcipue cum asserat diu asseruari posse. quandoquidem solidiores sunt radices, quam caules, qui facile in omni herbarum genere flaccescunt, et pereunt. Quo fit, ut crediderim Fuchsi in suis Paradoxis immeritò impugnasse Leoniceum. Ad hæc gustantibus nobis uulgares ofscinarum cubebas, nullum prorsus Phu saporem deprehendimus. Quod manifestè indicat uulgares cubebas, nec Arabum cubebas esse, nec Galeni carpesium. Ob id igitur, ubi apud Græcos carpesium medicamentis admixtum reperitur,

Ruell. et Fuchsi opinio.



Serapionis la-  
pſus.

Cubebarum  
vulgarium cō-  
ſideratio.

Et cubebæ apud Matritanos, phu eorum uice, cum ſit carpeſio in omnibus perſimile, uel caſia, potiùs quàm cubebæ uulgaris uſus, erunt ſubijcienda. Iacobus Syluius inter recentiores apprime doctus, quanquam nouit cubebas noſtra- tes carpeſium non eſſe, non tamen animaduertit, nec etiam Serapionis, aliorumq; Arabum eſſe cubebas. Aberrant in cubebarum hiſtoria etiam Serapio. quippe quicquid Dioſcorides de ruſco ſcriptum reliquit, is cubebis perperam reddidit. Cuius autem ſtirpis fructus uulgares CYBEBÆ ſint, quid affirmare poſſim non habeo, eum ex orientali pla- ga nobis peregrinæ afferantur. Et ſi eas dixerim odoratas eſſe bæccas, racematim coherentes, corymborum bedæe modo: qui guſtui præter odoris gratiam, acrimoniã et amaroris tantillum relinquunt. Quibus conſtat, q̄ excaſſe- cere ualeant tertij ordinis inſitio, et ſiccent in fine eius. Quamobrem languentem ex pituita uentriculum, uel etiam ex ſtatu roborant: pectus à lentis craſiſq; humoribus expurgant. Lienem iuuant, ſtatus diſcutiunt, et frigidis uetri affectibus auxiliantur. Diu cum maſtiche manſæ, pituitam à capite trahunt, et cerebrum roborant.

Μαλαβάρων.

MALABATHRVM.

CAP. XI.

<sup>Indicæ odori</sup> <sup>Anguſtillatæ</sup>  
MALABATHRVM arbitrantur aliqui eſſe Indicæ nardi folium, falſi quadam odoris cogna- tione: permulta enim nardum olent, quemadmodum phu, aſarum, niris. Secus autem res ſe habet: nanque Malabathrum folium ſui generis eſt, quod Indicæ gignunt paludes, lentis paluſtris modo innatans aquis, ſine radice. Id collectum ſtatim lino tranſſuitur, & ſiccatum reconditur. Tradunt ſiccatis eſt iuo ſeruore aquis, humum aridis fruticibus uri: quod ubi non euenerit, ne amplius qui- dem renaſci. Laudatur recens, ex candido nigricans, integrum, nec fragile, odore caput feriēs, quod diu in ſua vi odore permaneat, & nardum ſapore imitetur, nullo ſalis guſtu. Infirmum uerò, & mi- nutum contuſum, præſertim ſi cariolum uirus olet, uitioſum eſt. Eaſdem nardo ſortitur uires: ſed efficacius omnia præſtat. Vrinam uehementius ciēt, ac ſtomacho magis prodeſt Malabathri uis. Lippitudinibus, inflammationibusq; tritum, & in uino ſeruafaſtum commodè illinitur. Subdi- tum linguæ, oris halitum, & ſuauiſſimam commendat. Veſtium quoque odorem interpoſitum ſer- uat, & ab eroſione tuetur.

Malabathri  
conſideratio.

MALABATHRVM, quod pleriq; folium Indicæ uocant, qui hac ætate uiderit, habeo neminem. Naſcitur (ut Dioſcorides inquit) in India paluſtribus tantum locis, aquæ abſque radice innatans, lenticulæ aquaticæ modo: ſed nec inde amplius ad nos aduehitur. Plinius lib. xii. cap. xxvi. duorum meminit generum, quorum alterū arboris cu- iuſdam Syriacæ folium eſſe ait, his uerbis. Dat et Malabathrum Syria, arborem folio cōuoluto, arido colore, ex quo exprimitur oleum ad unguenta. Fertiliior eſt eiſdem Aegyptus: laudatius tamen ex India uenit. In paludibus ibi gi- gni tradunt, lentis modo, odoratius eroco, nigricans, ſcabrumq; quodam ſalis guſtu. Minus probatur candidum. Ce- lerrimè ſitum in uetuftate ſentit. Sapor eius nardo ſimilis eſſe debet ſub lingua. Odor uerò in uino ſubferuefacti ante- cedit alios. Haſtenus Plinius. Qui tamen præter Dioſcoridis ſententiam præſtantius Malabathrum duxit, quod ſal- ſum eſt, non quod inſuſum. Ceterum non deſunt, qui Indicæ folij loco, caſiæ odoratæ, uel cinnamomi folia ſuppediūt, quæ eſſe caryophylli exiſtimat Braſauolus. Nonnulli præterea, quædam arborum folia, ex Alexandria aduecta, quæ lauri, uel arbuti frondes refrunt, in Malabathri uſum uendicant. Hæc Hermolaus, Ruellius, pariterq; Braſauolus eos ſecutus, nulla (quod ſciuerim) auctoritate, Nigritarum Tembulum eſſe arbitrantur. Verum cum adhuc eorum, qui Tembuli hiſtoriam, et notas ſcribant, inuenerim profeſſo neminem, quanuis de eo Auicenna breuiter ſcripſerit: idcirco illa potiùs aſſeram arborum folia eſſe nobis penitus incognita, quàm eorum ſequar opinionem. Nullo itaque modo hæc ad uſum ueniunt admittenda. ſiquidem cum eorum facultates nos lateant, non eſt cur ea comprobare ualea- mus. Sed ubi Malabathro opus ſit, caſiam odoratam, uel Indicam nardum ſupponendam putamus, Galenum ſecuti. qui ita decreuit tum in ſuccidaneis, tum etiam lib. viii. ſimp. medicamentorum. Excalfacit Malabathrum (ut auctor eſt Auicenna) ſiccataq; ordine ſecundo.

Hermolai,  
Rucl. & Braſ-  
opinio.

Κασία. Vol. CASSIA. CAP. XII.

CASSIA, cuius complura ſunt genera, iuxta odoriferam Arabiam gignitur, craſſi eorticis ſar- mento: folijs piperis. Eligenda eſt fulueſcens, pulchri coloris, corallij æmula, perquam anguſta, longa, craſſa, & fiſtuſoſa, guſtu mordens, & cum aliquanto ſeruore adſtringens, aromatica, uinoſo odore: cuiuſmodi eſt, quæ ab incolis achy appellatur, ab Alexandria negotiatoribus daphnitis. Huic præfertur craſſa, purpurea, & nigricans, zigir cognomine, quæ roſam odore imitatur, præci- pui in medicina uſus. Secundum locum tenet antediſta. Tertia, cui Moſylitico blaſto, id eſt, ger- mini cognomen eſt. Reliquæ uiles, ut quæ aſyphemū dicitur, nigra, inſuauis, cortice tenui, ac rimo- ſo: & quæ darca, & citto uocatur barbaro nomine. Similior huic eſt pseudocaſſia, quàm ut ex- plicari poſſit. quæ guſtu coarguitur, cum nec acris, nec odorata ſit, hærentemq; medullæ corti- cem habeat. Inuenitur etiam lata quædam fiſtula, mollis, leuis, ſurculosa, quæ antediſtæ præfertur. Damnatur candicans, ſcabra, hircinum uirus reſolens, & quæ tenui fiſtula, & ſcabra cute ſit. Vim obtinet calfaciendi, urinam ciendi, ſiccandi, & leniter adſtringendi. Conuenit ad medicamenta o- culorum, quæ præſtandæ claritatis gratia concinnantur, & ad malagmata: lentigines tollit cū mel- le illita: menſes trahit: contra uiperarum iccus pota auxiliatur: aduerſus inteſtinas inflammatio- nes omnes, & renum uitia, pota proficit: ſcæminis in folio deſidentibus, aut ſuffimentis, prodeſt ad dilatationem uulvæ. Et duplo pondere medicamenti mixta, cinnamomi uicem ſupplet, ſi ipſum deſit: nam eoſdem effectus præbet. Ad plurima perquam utilis eſt.

Κιννάμωμος.

Κιννάμωμον.

CINNAMOMVM.

CAP. XIII.

Cinnamomum.

CINNAMOMI genera plura, patrium sibi nomen uendicantia. Præfertur tamen Mosylyticū, quod cassiæ, cui mosylyti nomen est, aliquam referat effigiem: sed in eo genere recens, nigrum, ex uinoso in cinereum uergens, læue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perquam iucundè olens. Optimi ferè indicium, iucundi odoris proprietate constat: inuenitur enim cum optimo, eoque quod peculiare est, odor rutæ, aut cardamomo proximus. Insuper acre, mordēs, & cum calfactione quadantenus falsum, quod non citò confricanti asperum, aut frianti lanuginosum, læuibus tamen internodijs appareat. Si certior fieri uoles, uellito ab radice furculum. facilis est huiusmodi probatio: nanque fragmenta miscellanea quædam esse uidentur. Quæ autem melius spirant, suo halitu, cum nares primum consuluntur, olfactum expleant, deterioris dignotionē impediunt. Est etiam montanum, crassum, pumilum, fuluescens admodum. Tertium à Mosylytico, perquam suauiter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartū fungosum, candicans, aspectu tuberosum, uile, ac friabile, magnam habens radicem, quæ cassiam planè repræsentat. Quintum genus odore nares feriens, subrusum, & cortice fuluæ cassiæ simile, tangenti firmum, minus neruosum, densa radice firmatum. Iis quæ thuris, cassiæ, myrti, aut amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deligito scabrum, album, rugosum: at læue, & lignosum circa radicem, ut inutile, rejicito. Est etiamnum simile aliud, cui pseudocinnamomo cognomen est, uile, inualidi odoris, solutarumque uirium. Vocatur etiam zingiber, cum tamē sit xylocinnamomum, præbens quandam cinnamomi faciem. Est autem lignosum cinnamomum, sarmenta longa robustaque ferens, odore longè cinnamomo inferiore. Sunt qui xylocinnamomum à cinnamomo genere differre dicant, quod à natura eius abhorreat. Cinnamomum omne excalfacit, emollit, & cōcoquit: urinam ciet: tam menses, quam partus potum, aut ex myrrha impositum pellit: contra bestias, quæ uirus ei aculantur, uenenaque conuenit: caliginem pupillis oculorum obuersantem discutit: crassitiem extenuat: lentigines, & uitia cutis in facie ex melle illitum detergit: contra tussis, defluxiones, aquam subter cutem fusam, renum uitia, & urinæ difficultatem efficax est. Vnguentis pretiosis inferi solet. Et in summa, magni ad omnia usus. Tritum uino excipitur, umbraque siccatum, quod diutius eduret, reconditur.

NATURA omnium rerum parens in hoc terrarum orbe quædam stirpium genera adeo inexorabilia procreauit, ut ne quam plurimis quidem delicijs, blanditijs, officijs, obsequijsque ea apud nos quissiam retinere potuerit. Siquidem stirpes ipsæ uiuere coactæ in hortis, iuridarijs, mitioribusque Italiae locis, cum Tempe, omni amœnitate refertis, quemadmodum alpini homines delicias urbium, & maiestatem aspernantes, politis moribus omnino neglectis, nō alibi, quam in suis mapalijs hilariter, ac iucundè uiuere possunt: ita & ipsæ relictæ celi clementia, hortorumque amœnitate, spreto item fontium oblectamento, omniumque urbanarum ac familiarium stirpium consortio in desertis, solitudinesque suas, à quibus primam duxerunt originem, se tandem recepere. tantum patriæ, natalisque soli amor in rerum natura potest. In quarum genere Cassia conueneranda uenit: quæ tamen si in maiore illa Romanæ gentis fortuna multis ac uarijs hortorum locis consita habebatur, nullibi tamen hac ætate (quod nouerim) in Italia, ne in tota dicam Europa inuenitur. Sed hæc de Cassia dixisse uolumus simplicium medicamentorum peritissimos secuti, qui (ut eorum testantur uolumina) nihil inuicem differre censent, Cassiam, quæ in arborum genere Dioscoridi, & Galeno recensetur, & eam, quæ antiquis inter coronarias numerabatur herbas, quæque olim passim circa apū aluearia serebatur in Italia, quod ea maxime apes delectentur, & in hortis, & iuridarijs coronis maxime expetita. Verum enim uero longè aliter hæc res intelligi postulat, quod aliam repererim fuisse Cassiam (ut Dioscorides inquit) è felici Arabia allatam ex arbore (autore Theophrasto) uiticis magnitudine, ab hac longe diuersam, quam apibus, & coronis serebat antiquitas. quandoquidem fuerit hæc herba, illa uero arbor: præsertim cum nullus (quod sciuerim) extet autor, qui posteritatis memorie mandauerit, Cassiam adeo copiosam in Romanorum triumphis ex Arabia conuehi solitam, ut inde uulgaris facta, ubique passim & reperiretur, & sereretur ab omnibus. Quod si fortè euenisset, nunquam tamen mihi persuaserim, quod Galenus hac in scientia, & facultate omnium diligentissimus, & qui Romæ diu uitam duxit, Italicae Cassiæ historiam silentio inuoluisset. Plinius lib. XXI. cap. IX. nonnullas memorans herbas, quorum folia odoris gratia in usum coronarum uenerant, inquit. Ergo in coronamenta folio uenere malothron, spircon, trigonon, cnereon, quod cassiam Higianus uocat. Id quod ante ipsam palam fecerat Virgilius Cassiam inter coronarias herbas recolens in Bucolicis ecloga ij. his uerbis.

Tum cassia, atque alijs intexens suauibus herbis,

Mollia luteola pingit uacinia caltha. Et in Georgicis lib. II.

Vix humiles apibus cassias, roremque ministrat. Item Georgicorum lib. IIII.

Nec circum cassiæ uirides, &amp; olentia latè.

Serpilla, &amp; grauius spirantis copia thymbræ.

Floreat irriguamque bibat uiolaria fontem.

Hæc Maro. Quibus palam est, Cassiam coronariam, & quia tantopere delectantur apes, herbam, non arborem fuisse. Quod etiam testatur Plinius libro superius citato cap. XII. his uerbis. Verum hortis coronantisque maxime aluearia, & apes conueniunt, res præcipui questus, compendijque, cum fauit. Harum ergo causa oportet serere thymum, apiastrum,

Cassie consideratio.

Cneori descri-  
ptio.

Medicorū, &  
seplasiariorū  
error.

Cassia legiti-  
ma.

Error quorū  
dam.

apiastrum, rosam, uioles, lilium, cytisum, fabam, eruium, cunilam, papauer, conyzam, casiam, melilotum, melissophy-  
lum (lego myriophyllum) cerinthen. Hactenus Plinius. His itaq; rationibus, autorumq; ueterum testimonijs utitur  
Theodorus cneoron Theophrasto Casiam appellat. Quamobrem potius fuerit credendum, cneoron Græcis uocatum  
antiquis coronariam fuisse Casiam apibus gratissimam, quam eam, quæ in India & felici Arabia provenit, cinnamomo  
persimilis, odoramentis & antidotis expetita, & quæ per longas ætates cinnamomi uice usi sunt medici. CNEORON  
autem describit Theophrastus lib. VI. cap. 11. de plantarum historia, his uerbis. Cneori duo genera, aliud enim  
eandidum, aliud nigrum. Candido folium cutaneum, oblongum, figura quasi oleagineum: nigro quale tamarici, carna-  
sum. Candidum magis se huius spargit, odoratumq; est: nigrum odore caret. Radix ambobus, quæ altè descendit græ-  
dis: ramiq; permulti, crassi, furculosiq; ab ipsa protinus tellure, aut paulò superius sparsi, lenti admodum constant.  
Quamobrem hisce ad colligandum iunci modo utuntur. Germinant, florentq; post æquinoctium autumnii, & multum  
deniq; temporis florent. Hæc Theophrastus. Sed quænam plantæ oriantur in Italia, uel aliunde eò asserantur, quæ  
Cneoron referant, quid ueri referant sanè non habeo. Sed iam ad Casiam odoratam redeamus. ob cuius cognitionem  
postmodum factum est, ut recentioribus medicis, in ea recuperanda, inuestigandaq; multum negocij accesserit. Namq;  
hactenus tum medici, tum seplasiarij (etsi plures iam resipiscant) odoratæ cassiæ loco quædam incognitæ arboris  
segmenta, nec odore, nec uiribus prædita semper capefferunt. Veruntamen post quàm nonnulli ætatis nostræ doctissi-  
mi uiri, stirpium historias diligenter examinarunt, detecta fraude, mercatores ex Alexandria mercimonia Venetijs  
comportantes, cum suam imposturam deprehensam cernerent, à negotio desciscientes in aliud nouum Cassiæ genus  
segmenta illa commutarunt. Quæ sanè præter odorem, pariterq; saporem, quibus ferè penitus exoleta sentitur, cas-  
siæ à Dioscoride descriptæ admodum habetur consimilis. Quapropter nec eos errasse crediderim, qui dicerent, hanc  
Dioscoridis pseudocassiam esse. quippe & crasso cortice constat, & in eius cavitare lignosa etiam uisitur materies,  
paululumq; est odorata, minimeq; acris. Nonnulli hac non contenti, quædam uocati cinnamomi fragmina Cassiæ uice  
usurpant: quæ cum nullo odore saporeq; commenduntur, potius quercum, uel fagum, quàm Cassiam referunt. Ce-  
terum ut dicam quid ego sentio, si quis fistulam, quam cinnamomum perperam appellamus, & uulgò Cannella, Cassiæ  
generibus rectè comparauerit, facile nouerit uulgaris usus Cinnamomum legitimam Cassiam procul dubio referre.  
quinimo diligenter inquisituris, iudicij; trutina examinaturis cinnamomi ingentem copiam, quæ magnis succis Vene-  
tijs in mercatorum repositorijs asseruatur, nimirum omnia illa Cassiæ genera, quæ à Dioscoride describuntur, facile  
sefe offerent. quandoquidem mercatores (ut semper assolent) ad expediendas deteriores merces bonarum lenocin-  
quas illis admiscunt, pro uirili utuntur. Galenus itaq; libro primo de antidotis multa Cassiæ genera recensuit, ubi sanè  
Dioscoridem secutus, eam cæteris præstare fatetur, quæ zigi cognomine dicitur, hancq; asserit cinnamomum usque-  
adeo æmulari, ut essent, qui suo æuo eam cinnamomi loco uenderent. Quos fit, ut admirari non liceat, si hodie quoq; tot  
annus hac deducta, protractaq; consuetudine, ubiq; cassia pro cinnamomo uenundetur. Nec quidem longè aberratè,  
si modò optimam seleggerent: quandoquidem Galenus eodem loco palàm prodit, Cassiam sepe namerò in cinnamomum  
transmutari, fateturq; se iam uidisse eximie Cassiæ ramulos omni ex parte cinnamomum referentes. Contrà pariter  
inspexisse Cinnamomi furculos Cassiæ prorsus persimiles: adeò ut asserat pro qualibet cinnamomi parte in componen-  
dis medicamentis duas electæ Cassiæ adhiberi posse. Describit item Galenus quoddam aliud deterius Cassiæ genus,  
quod tradit iuniorum Andromachum Cassiam fistulam nominasse, cum fistularian modo, inanè cauâq; sit, & crassi cor-  
ticis: cuiusmodi in uulgarè cinnamomo frequentissima conspicitur. Huius sanè ea uidetur esse generis, quam in suo com-  
ficiendorum phar macorum libello præfert Cordus, quòd uelit Cassiam, præter Dioscoridis & Galeni sententiam, lu-  
brici esse gustus. Cæterum odoratæ cassiæ meminit etiam Virgilius præter coronariam lib. 11. Georg. ubi cecini hoc  
carmine. Nec cassia liquidi corrumpitur usus oliui. Quin et Plinius Cassiæ meminit lib. XII. cap. XIX. his uerbis.  
Frutex et Cassia est, iuxtaq; cinnamomi cæpos nascitur, sed in mōtib; crassiore sarmento, tenui cute, uerius quàm cor-  
tice: quem contrà atq; in cinnamomo leuari, & exinaniri pretium est. Amplitudo fruticis trium cubitorum. Colos  
triplex: cum primū emicat, candidus pedali mensura: deinde rubescit addito semipede: ultra nigricans. Hæc pars  
maximè laudatur, ac deinde proxima: dannatur uerò candida. Consecant surculos longitudine binum cubitorū: mox  
præsuunt recentibus corijs quadrupedum ob id interemptarum, ut ijs putrescentibus, uermiculi lignum erodant, &  
excauent corticem tutum acrimonia, & amaritudine. Probatur recens maximè, & quæ sit odoris mollissimi, gustus  
quam maximè feruens, potius quàm lento tepore leuiter mordens, colore purpureo, quæq; plurima minimum ponde-  
ris faciat, breui tunicarum fistula, & non fragili. Hæc Plinius, quorum plura à Theophrasto transcribit. Qui cassiæ  
historiam tradidit lib. IX. cap. V. de historia plantarum, eamq; fruticem esse amerinæ magnitudine scribit: quæ cum  
nullo pacto decorticari possit à ligno, cortexq; tantum utilis sit, ob id hominum industria inuentum esse ait, ut corijs  
quadrupedū confuta, interius lignum uermiculis deuoretur. Cæterim planè hallucinantur ij, qui Cassiæ fistule loco,  
siliquam Aegyptiam, siue Cassiam solutiuam uulgò dictam, atra medulla, semine duro, lignosisq; membranis confectā,  
medicamentis admiscunt Mauritanos secuti. siquidem Serapio, Auicenna, pariterq; Mesues, siue sit ipsorum, siue in-  
terpretum lapsus, pari consensu Cassiam nigram, Cassiam fistulam uocauere: legitimam uerò Cassiam, de qua hic dis-  
serit Dioscorides, Cassiam ligneam. Quamobrem certò crediderim, quòd citra omnem censuram dici possit, in omni-  
bus ijs medicamentis à Mauritanis inuentis, quæ Cassiam fistulam expetunt, solutiuam illam esse inferendam. Si uerò  
in Græcorum monumentis (excipio Alexandrum Trallianum, & Nicolaum Myrepsicum, qui à Mauritanis multa ac-  
ceperunt) Cassia fistula inuenta fuerit, uel in Mauritanorum compositionibus à Græcis transcriptis, Cassiam odorat-  
tam, à Dioscoride & Galeno descriptam, semper adhibendam existimo. Nisi medici secus intelligentes in eam error-  
rem labi uelint, in quem Leoniceus quosdam ætatis nostræ medicos (quæ profectò imperitijs multorum est) temerè  
incurrisse

incurrisse testatur, qui ad commouendos menses, difficiles partus, remorantesq; secundas, Cassie deiectione corticibus, odorato loco usq; quaq; utebantur. CINNAMOMVM uero, quod legitimum sit, quanquam diu multumq; tam Venetijs, tum Neapoli, et apud mercatores, qui fere quotannis in Alexandriam nauigant, diligenter conquisiuerunt, nisi quam id tamen uidere licuit, neq; etiam percipere potui, num hoc tempore apud magnos negotiatores, qui e Lusitania Indiam, et felicem Arabiam classe paratissima petunt, uel apud quempiam principem, regem, uel imperatorem legitimum reperiri possit. Qua de re munime demiror, cum et Galeni tempore huius magna in Italia fuerit penuria, adeo ut Cinnamomum nullibi reperiretur, nisi apud Imperatores, qui admirabili custodia inter alia pretiosa illud asseruari curabant. Cuius rei historiam in medium affert Galenus libro primo de antidotis, sic inquit. De Cinnamomo contraria ijs, quae de opobalsamo narrauimus, compertum habeo. persuasum namq; mihi est, ipsum omnium cognitu facilissimum esse illis, qui saepe optimum cinnamomum uiderint. Optimum uero consequi nemo potest, nisi repositum ab imperatoribus intueatur, sex generibus quodammodo distributum. siquidem et in hoc ipso, uelut et in cassia, optimi ad deterrimum tam magna differentia est, ut optima cassia a pessimo Cinnamomo parum distet. Neque uero Cinnamomi uirtus ad usum apta longo tempore durat: ad triginta siquidem annos, quam a principio uim habuit, integra non conseruat. nuigantur autem, qui Cinnamomum ex hisce medicinis esse dicunt, quae senectutem non sentiant. Atqui ego non centum, neq; ducentum annorum interuentu, sed pauciorum, si quis ad tantum numerum conferat, iam aliquam mutationem uetustiori cinnamomo factam obseruauit. Quo tempore siquidem Antonino imperatori theriacam parauimus, uasa lignea, in quibus eiusdem generis Cinnamomum inerat, multa conspexi, alia Traiani, quaedam Adriani, nonnulla Antonini, qui post Adrianum imperator fuit, etate reposita: omniaq; haec sese et saporis, et odoris imbecillitate, uebecmentiaq; tantum plane superabant, quantum et tempore differebant. Olim e barbarorum terris arca cubitos quatuor et medium longa, Roman per lata cum fuisset, in qua Cinnamomi primi generis integra arbor erat, ex eoq; Marco Antonino imperatori antidotum quandam composuissem, ipsam ceteris multum praestare, deprehendi, adeo ut Imperator quoq; ea degustata medicina concoctionem, uelut in alijs fieri solet, expectare noluerit, sed statim ea usus sit non dum integre duobus mensibus elapsis. Antonino subsecutus est Commodus, qui nec theriacae, nec Cinnamomi curam ullam habuit, sub quo non solum arboris illius quod superfuerat, omne dissipatum est, uerum etiam quodcumq; post Adriani tempora comportatum fuerat. Quo factum est, ut nunc imperator noster Seuerus, cum me sibi antidotum eodem modo conficere iussisset, quo Antonino confeceram, ex Cinnamomo Traiani, et Adriani tempore reposito sumere coactus sum, imbecillioraq; plane mihi uisa sunt, et tamen non dum anni triginta intercesserant. Hic nos optimi Cinnamomi notas quasdam necessarias subijcere uolumus, ipsum scilicet summo opere bene olere, inexplicabilemque praeceteris bonum quandam odorem spirare, ac calidum gustantibus se multum exhibere, non ita tamen ut mordicando tristitiam palato inferat: colorem denique talem habere, qualem si quis lacti nigrum colorem admisceat, atq; caerulei, quem uocant, aliquantululum addat. Ex hoc igitur quantum uolebam, ut mos mihi fuit, cum accepiissem, ramusculos paucos apud me reposui in ea apotheca, in qua res meas omnes pretiosas seruabam. uerum ipsa combusta, qua tempestate et delubrum pacis incensum est, et haec, et aliae quinque Cinnamomi species, quas mihi conquisieram, periire. Nunc itaque cum imperatori nostro Seuero theriacam componerem, ex Cinnamomo Adriani tempore reposito, quod optimum uisum est elegi, de quo etiam utile quiddam lecturis subdere, cum possim, id facere non grauabor. Supersunt adhuc ibi multa uasa lignea, quae omnia habent plurium radicum, uel plurium ramorum, uel ut quispiam dicere uelit, Cinnamomorum differentias: nullum tamen ueluti truncus, in ramos plures diuisus attollitur, sed ueratri utriusque figura praese fert, atq; etiam magis damasonij uocati, quod e Creta ad nos adfertur. Quaeuis autem Cinnamomi species ab una radice, seu frutex quidam paruis consurgit, emittitq; haec sex, illa septem uirgulta, uel paulo plura, paucioraue, non equali tamen omnia longitudine sunt: uerum quod maximum est, pedis Romani dimidium non excedit. Vniuersa autem Cinnamomi natura similis est quodammodo optimae cassiae. Haecenus de Cinnamomo Galenus. Cuius uerba hic recensere libuit, ut omnibus palam sit, quod cum sub ijs tam magnis imperatoribus, qui toti fere orbi imperabant, tanta esset Cinnamomi penuria, admirari non debeamus, si se nobis penitus incognitum, rarissimumque reddiderit. Sed potius id mirum fuerit, quod cum hac etate cassiae plurimum afferatur, quae, ut Theophrastus, et Plinius inquit, nascitur iuxta Cinnamomi campos, sed in montibus, Cinnamomi tamen nihil importetur. Quare non deest suspicio, quin omne fere Cinnamomi genus deperierit in Arabia, quemadmodum et balsamum in Iudaea. Quandoquidem scripserit Plinius lib. xii. cap. xix. combustas iam esse plurimas Cinnamomi syluas, his uerbis. Cinnamomi pretia fuisse quondam in libras denariorum mille. Sed postea auctum id parte dimidia est, incensis (ut ferunt) syluis tra barbarorum. Id acciderit ne ob iniquitatem praepotentium, an forte, non satis constat. Austros ibi tam ardentem flare, ut aestatibus syluas accendant, inuenimus apud autores. Quo fit, ut facile credi possit a Plinij a quo id, quod Cinnamomi reliquum erat, praeriter uel barbarorum bello, uel igneis flatibus deperuisse. Nam si aliter res se haberet, qui cassiam ad nos deferunt, cum multo plus lucri ex Cinnamomo, quam ex cassia se consecuturos sciant, Cinnamomum etiam una cum cassia ueherent. Haec autem dixisse nolui non ut hac in re certi aliquid, exploratq; habeam, cum tantam coiectionis agam, sed ut alijs uolentibus explorandi latus pateat iter. Ceterum Strabo non modo cum Theophrasto, Dioscoride, Galeno, Plinioq; Cinnamomum in Arabia nasci scribit, sed etiam in India, ea scilicet parte, quae ad austrum uergit. quippe cum haec Arabia, et Aethiopia sole persimilis sit, ea omnia (ut ipse ait) gignit aromata, nempe cinnamomum, cassiam, et alia, perinde ac ille. Verum tamen cur nec inde ad nos afferantur, an quod etiam ibi perierit, an aliam ob causam, ij manifestius referant, qui hoc tempore liburnicis eo ad aromata conquirenda quotidie nauigant. Sed uidetur Galenus satis perplexus de Cinnamomo scriptitasse. quippe primum eam Roman delatam prodidit e barbarorum regione longitudine cubitorum quatuor cum dimidio, in qua integra Cinnamomi arbor erat. quibus omnino denotat Cinnamomum esse arborem.

Cinnamomi  
considerano.Cinnam. hist.  
ex Galeno.Cinnamomi  
penuria unde  
fit.



borem. Deinde uerò unquamq; Cinnamomi speciem scribit, ab una radice, seu frutex quidam paruus cōsurgere, adeo ut maiora eius uirgulta dimidium Romanum pedem non excedant. quibus procul dubio fatetur, Cinnanomum esse in paruorum fruticum genere. Vnde certe nesciuerim ego explicare, quid sibi hac in historia uoluerit Galenus; præsertimq; cum tam tenui ipsum sarmento esse tradiderit, ut ucratri, uel damasij radicibus comparauerit. Sed illud tū mirum mihi uidetur, quod ex cassia (ut ipse ait) Cinnanomum oriatur, spectenturq; nonnunquam cassie arbores integre, in quibus aliqua cinnamomi uirgulta ē cassie ramis prodeant, cum tamen cinnanomum, et cassia diuerse inter se sint plantæ. Nisi fortasse inter utranq; tanta sit generis cognatio, ut aliquando inuenta sint cassie uirgulta tanta odoris saporisq; fragrantia, ut omni ex parte cinnanomum referrent, etsi legitima fuerit cassia. Præterea nō desunt, qui putauerint hac Galeni auctoritate freti, cassiam et cinnanomum ex una, et eadem arbore provenire, quæ dum pumila sit, cinnanomum edat, dum uerò adoleuerit, cassiam. Sed cum dicat Galenus, cassiam mutari in cinnanomum, non autem cinnanomum in cassiam, cadit eorum sententia. Quibus etiam refragatur Theophrastus lib. 1. x. de plantarum historia cap. v. ubi cassiam, et cinnanomum ostendit diuersas esse plantas: licet de earum forma, et proceritate nihil certi exploratq; affirmet. Quandoquidem initio capituli non ex sua, sed aliorum sententia scribit, cinnanomum et cassiam frutices esse magnitudine amerinæ: deinde uerò alios etiam secutus autores cinnanomum fruticosum facit. Ceterum cum scribat Strabo Arabas cinnanomo, et cassia uti ad ignem parandum, et ceterorum lignorum loco, uidetur hæ plantæ non esse adeo pumilæ, ut quidam scribunt. Quod de cassia facile dici potest, siquidem Venetijs cassie Camellæ uocate fistule usuntur tãtæ crassitudinis, longitudinisq;, ut facile quisq; iudicare possit eas ē ramis, seu uirgultis non sanè breuib; fuisse decerptas. Cinnamomi denique sex genera esse produntur à Dioscoride, et Galeno: sed is nullibi (quod scierim) ea per genera descripsit, fortasse (ut solet) Dioscoridi se remittens, qui etiam tantum à locis, ubi nascuntur, plus minusue præstantiæ huic, quam illi reddidit. At Theophrastus citato nuper loco longè aliter cinnamomi differentias haberi ait, his uerbis. Cinnanomum decerptū in quinque partes discerni narrant, et esse præcipue bonitatis, quod germinibus proximum fuerit, idq; ad palmi longitudinem cædi, aut paulò maius. Secundum, quod sequitur, quod etiam minus cæsura est. Tertium deinde, et quartum notatur. Vltimum uerò, quod deterrimum, proximumq; radici: hoc enim minimum corticis habet, in quo summa gratia est, non in ligno. quæ de causa præferri cinnamina solent, quod corticis plurimum habeant. Quidam sic aiunt. Alij uerò Cinnanomum fruticosum enarrant, eiusq; genera duo, alterum nigrum, alterum candidum. Hæc Theophrastus. Veruntamen cum nec in hac in historia aliquid constanter, affirmanterq; scribat, Imperatorem, Regemue quempiam desiderare, qui humanam rempublicam miseratus, explorandi Cinnamomi gratia in Arabian, et Indiam mitteret, magnanimosq; illos imitaretur Imperatores, qui ipsius Galeni æuo ex iisdem regionibus sibi Cinnanomum comparabant. Id enim Cesar noster Carolus quintus, si illi Deus opt. max. Christianâ remp. pacatam redderet, omode consequi posset. uel fortasse cōmodius Rex Lusitanus, qui in orientali Indîa sæpe ad aromata conquirenda suas liburnicas mittit, quo in itinere uniuersas felices Arabiæ oras explorare posset: quæadmodum et uniuersam Indiæ partē, quæ ad austrū spectat, ubi inquit Strabo Cinnanomū pariter nasci. Sed o clarissimi Lusitanæ medici, si res medica uobis cordi est, si nostram cupitis ditare facultatem, medicanæ nomen extollere, si charitas uos tenet, si naturalis humani generis iuuandi amor uobis in situs est, iam iam prouocam hanc suscipite. Quippe si princeps uester hinc sibi immortale nomen, uniuersæ uerò reipublicæ commodum perquam maximum comparare posse à uobis intellexerit, cum omni pietate ac magnanimitate (ut audio) præditus sit, nulli dubium est, quin omne studium, auxiliumq; impendat, ut non modò Cinnanomum ipsum reuocetur in lucem, sed et diu fortasse pleraq; medicamenta, quibus antiqua medicorum familia suas illustrauit antidotos. Cinnamomi uires scribit Galenus lib. v. 11. simplicium med., sic inquit. Cinnanomum summè tenuium est partium, non summè tamen calidum, sed ex tertio ordine. Nihil autem equè desiccet eorum, quæ pari sunt excalfaciendi facultate propter tenuitatem scilicet essentia. At Cinnanomus est uelut imbecillum cinnanomum: nonnulli ipsam pseudocinnanomum nuncupant. Meminit et Cassie eodem libro citato, ubi sic habet. Cassia exiccatur, et excalfacit tertio quodammodo ordine, sed et tenuium admodum est partium, gustu uerò plurimum in se acris deprehenditur, leuiter quoq; nonnihil adstringens. Quamobrem ob hæc omnia incidit, simulq; digerit, quæ in corpore sunt recrementa, et ad hæc robur etiam instrumentis addit. Idoneum uerò etiam suppressis mensibus, cum uidelicet à copia simul et crassitudine excrementorum, quod sufficiat, euacuari nequit. Veruntamen quoniam nec Dioscorides, nec ueterum Græcorum quisquam meminit CASSIÆ SOLUTIVÆ dictæ, quæ hoc tempore ad citandam aluum frequentissimè utuntur medici, quamq; Aegyptiam siliquam recentiorum quidam appellant, ne hæ nostræ lucubrationes tam nobili, tam præstanti, tamq; humane salutis necessario medicamento destituantur, differam hic de eo, quicquid ex Mauritanis compertum habeo. Aegyptiæ itaq; siliquæ arbor inter ualde proceras annumerari potest. Huius materies solida, compactaq; uisitur, cortice tenax buxæ colore, medullitū uerò nigra, non secus ac ebum, siue guaiacum. Recens grauius olet, sicca tamen minime. Folio constat siliquæ: cortice cineritio: radicibus magnis iuglandis modo. A ramis siliquæ pendent prælongæ, teretes, densæ, et cum maturitate senserint, colore in rubrum nigricante. Hæ nigra, dulciq; replentur medulla, leui ac leuato cremori simili, non tamen ut in osibus continua, sed crebris lignosisq; membranis distincta. Inheret unicuique membrana semen durum, siliquarum semini adeo simile, ut alterum ab altero discerni non possit. ex quo etiam non errasse putauerim, qui crediderit, has plantas esse congeneres. Eligenda est, quæ ex Memphi, et Alexandria Aegypti conuehitur, non admodum crassa, pellucens, recens, grauis, sarcta, et quæ concussa, inclusis seminibus minime consistit. Pulpa excalfacit, et humectat ordine primo. Eadem lenit, resoluit, sanguinem mundat, bilisq; feruorem extinguit: aluum item commodissimè citat, eiusq; uis uentriculum non pertransit. quapropter securissimè datur à medicis inchoantibus febribus, alijsq; calidis morbis ante uenæ sectionem, quod tantum uentriculum repurget, et aluum emoluit.

Cinnamomi  
differentiæ ex  
Theoph.

Carolus V

Cinnamomi  
uires ex Gale  
no.

Cassie uires  
ex eodem.

Cassie soluti  
uæ considera  
tio.

list. nocet tamen intest. norum imbecillitate affectis, & his, qui admodum lubrici sunt: aliàs omnino habetur innoxia. Tollitur id noxæ admixtis myrobalanis, rhabarbaro, nardo, & mastiche. Constipatis si detur, augenda est eius facultas ijs, quæ magis eadem ui pollent: proinde sunt, qui addant amygdalinum oleum, & psyllij spissamentum. Urinæ difficultatibus mirificè auxiliatur, si cum urinam cientibus medicamentis hauriatur, uel deuoretur. Aegre aluum excernit: eaq; propter nonnulli roborat eius uires, addito hyssopo, uel caprino sero. Bilem, & pituitam excernit, nullo sanè incommodo: pectus, & fauces mulcet, & eorum inflammationes resoluit: renes à calculis, & sabulo expedit; præsertim si cum glycyrrhizæ decocto, alijsue medicamentis urinam cientibus bibatur. quinetiam frequenter deuorata calculos renasci prohibet. Admodum præter hæc calidis confert febribus. Ceterum exterius illita erysipelas extinguit, ceterasq; inflammationes, quæ cute tenus emergunt. Sunt & recentioribus medicis, qui eam nunquam suis egrotantibus exhibeant, nisi picæ puluerem adisceant. quod consulti factum existimo; præsertim ubi uentriculi, & intestinorum imbecillitas adsit.

Αμόμον.

ΑΜΟΜΥΜ. Amomum

CAP. XIII.

Αμόμυμ exiguè fruticat, ex ligno se conuoluens in racemi modum: flore, seu candidæ uiolæ, paruo: folijs bryoniæ similibus. Laudatur quàm maximè Armeniacum, colore ad aurum uergens, ligno subrufo, abunde odorato. Medicum, quoniam in campestribus, & aquosis enascitur, infirmius esse constat: est autem magnum, subuiride, tactu tenerum, frutice uenoso, odore origani. Ponticum uerò subrufum, paruum, fragile, racemosum, fructu turgens, & odore nares feriens. Deligito recens, candidum, uel subrubrum, quod nec adstrictum cohæreat, nec conuoluatur, sed solutum diffundatur: semine plenum, uis paruis simile, graue, ualde odoratum; modò cariem non contraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore non euariante. Vim habet calfaciendi, adstringendi, exiccandi. Somnum allicit: & illitum fronti, doloris sensum aufert: inflammationes, & meliceridas concoquit, discutitque: iuuat quos scorpius percussit, ex ocimo illitum: & podagricis confert: inflammationes oculorum, uiscerumque lenit ex uua passa: ad uuluarum uitia in pessis, aut in sefionibus utile est. Decoctum iocineri, renibus, podagræ, potu conuenit. Antidotis immisceatur, & pretiosissimis unguentis. Adulteratur Amomum herba simili, quæ Amomis uocatur, sed sine odore, sine fructu. Nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiusmodi rerum probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem, quæ ab una radice suos integros surculos emittunt.

30 TANTA medicorum, qui nos præcesserunt, in simplicium medicamentorum historia, & facultatibus ignorantia, segnitiaq; extitit, ut nisi Deus opt. max. acerrimi, & serè diuinū ingenij uiros, hac ætate nobis produxisset in lucem, qui præter id, quòd uniuerfam medicam facultatem ab erroribus sanè innumeris expurgauerint, eandemq; illustrauerint, uera quidam simplicia medicamenta inuestigarent; minime profectò uerendum fuerat, quin paruo temporis tractu ars medica penitus subuersa, extinctaq; remansisset. Et certè si longiori tempore res ita se habuisset, nulli dubium est, quin huiusce facultatis cognitio in auram euolasset. quandoquidem hæc pestis radices tam in altum fixerat, ac tam latè se diffunderat, ut tametsi nonnulli ingenio, & doctrina præstantes plurimum insudauerint, omneq; studiū, & operam quàm diligentissimè impenderint, quò errores qui ignauia & negligentia emerferant, à re medica excluderentur, eos tamen hætenus radicibus euellere nequiuērunt. Siquidem non desunt, qui (quanuis hæc percipiant rationes) malint suos prosequi abusus, omni ex parte detestandos, quàm candidissimæ inherere ueritati. Quo fit, ut unā cum alijs innumeris simplicibus medicamentis etiam legitimo Amomo careamus. Cuius uice quidam stirpium impostores ex Gargano Apulia monte profecti, pumilum quoddam semen supponunt, colore nigro, odore melanthij. Quod cum tantillum aromatis respiciat, & gustu acri deprehendatur, excogitarunt, ut facilius ipsum corradarent, in hominum animis inducere, id procul dubio legitimum esse Amomum. Quod tamen (si Dioscoridi fides est adhibenda) semen edit uuarum racemis simile, non autem minutum, quale illud uisitur. Insuper mihi sanè non constat, Dioscoridem semen in Amomo approbasse, sed potius ligneam arbusculæ materiem, ut in cinnamomo & casia uidere est. quo fit, ut legitimum Amomum lignum potius, quàm semen existimauerim. Sed & turpiter aberrant, qui Serapionis interprete decepti, herbam pedem columbinum quibusdam uocatam, quæ geranij præ se fert speciem, Amomum esse contendunt, & in Amomi locum substituunt, nullam de his historiam inquirentes. Ceterum Amomum, quod iure probari possit, nullibi (quòd sciuērīm) in Italia prouenit, nec eò aliudè trāslatum hætenus uidere potui. Neq; propterea uulgare pro eo supponendum esse censeo: quippe de incognitis periculum facere nec decens est, nec tutum. Sed potius Galeno mos gerendus fuerit, qui acoro, & Amomo uires consimiles tribuit. Acorū itaq; locum Amomi supplere poterit. Porro & hi omnino explodendi sunt, qui pro certo asserere non uerentur, eam stirpem esse Amomum, quam Hiericuntam à Hierico Palæstinæ oppido appellant. Plantam hanc plerunq; ad nos è Hierico deferunt ij, qui ad sanctissimum REDEMPTORIS nostri sepulchrum peregre proficiuntur. Ea enim est, quam nostrates mulieres rosam diuæ Mariæ uocant. Constat hanc Amomum non esse, quòd folia albæ uitis non proferat, nec ullo spiret odore. Legitimum enī ualde odoratum est, adeò ut nares feriat primo statim occursu, origanūq; respiciat. Cordus libello de conficiendis pharmacis satis inconstanter de Amomo disseruit. quippe in compositione aureæ Alexandrinæ pro certo asserit Amomum uerum esse rosam Hiericuntis: in compositione uerò theriacæ, sui ipsius oblitus habere nos Amomum negat. Utuntur Hiericunta nostrates mulieres tempore partus ad inuestigandam pariendi horam. quandoquidem (ut ipsæ fatentur) in aquam demissa non prius satisfacit, quàm fœtus nasci incipiat: tanta inter cbristicolas irrepsit

Amomi consideratio.

Amomū spurium.

Serapionis interpretis lapsus.

Error quorūdam

Amomi vi-  
res ex Gale.

irrepsit superstitio. Amomi meminit Galenus lib. v. 1. simpli. med. sic inquit. Amomum acoro similem facultatem obtinet: nisi quod acorum siccius sit, maiore autem concoquendi facultate Amomum.

Kōsos. COSTVS. Costus. CAP. XV.

PRAECELLIT Arabicus, candidus, levis, eximia odoris suauitate. Secundum locum sibi uendicat Indicus, levis, uber, ut ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxeus, & odore feriens. Optimus est recens, albus, abunde plenus, densus, aridus, à teredinibus non erofus, sine graueolentia, gustu calidus ac mordens. Vis ei excalfactoria: urinam ciet: menses pellit: uitij, quæ uulnam malè habent, tam imposito, quàm fotu, & suffitu auxiliatur. Contra uiperarum morsus sextantem bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflationesque ex uino & ab-  
sinthio: uenerem ex mulso stimulat: latas uentris rineas ex aqua pellit: horroribus ex oleo ante febrim accessiones, & neruorum resolutionibus oblinitur: uitia cutis in facie, cum aqua, uel melle illitus, emendat. Additur in antidota, & malagmata. Sunt qui, admistis helenij Comageni præduris radicibus, adulterent. Quod deprehensu facile est: siquidem neque gustu feruet helenium, neque ualidum odorem uibrat, ut caput tentare possit.

Costi conside-  
ratio.

COSTVS, quo usæ sunt officinæ per longas ætates, in amarum, & dulcem diuidi solet: tametsi tum Dioscorides, tum etiam Plinius nec dulcis, nec amari meminerint, sed nigri duntaxat, & albi. Galenus quidem scribit leuiculan Costo inesse amaritudinem: sed qui inter Græcos scripserit Costum inueniri dulcem, hæcenus compertum non habeo: quamvis Mauritan, & eos secuti, dulcis, & amari quandoque mentionem fecerint. Qui in myropolijs passim habetur, adulterinus est. quippe nec ulla odoris suauitate commendatur; nec gustu adeo acri deprehenditur, ut appositum exulceret, ut Galenus inquit. Proinde medicamentis, quæ Costum excipiunt, non erit meo iudicio imponendus, cùm præterea nos planè lateat, cuiusnam plantæ sit radix. Inuenitur Costus (ut audio) apud quosdam Venetijs, sed admodum rarus, quem legitimi notas habere aiunt. Verùm cùm hæcenus talem non uiderim, non est cur eum probem, uel improbem.

Costi quæ ui-  
cem supplcat.

Ceterum seplasiarij si legitimum consequi nequeunt, à pseudocostis absterneant, & Galenum, uel autorem illum sequantur: qui, si Costus defecerit, ammoniacum, uel helenium supponi iubet: erit enim eis hoc satius, quàm uti adulterino. Sed quidam adeo suis pandectis, & luminaribus addicti sunt (quæ est eorum tum inscitia, tum pertinacia) ut nullis unquam auctoritatibus, atque rationibus suaderi possint, ut ueterem semitam penitus detestandam linquere uelint,

Inocula  
infra 508

quæ plerunque est ægris detrimento, & sibi & medicis dedecori. Sunt insuper, qui Costi loco angelicam recentioribus uocatam supponendam existiment. quorum sententiam magis probandam censerem, quàm eorum, qui pseudocostis utuntur. Costum enim hæc radix non obscure refert: quandoquidem eximia illa odoris suauitate tam iucunde spirat, ut angelicæ nomen sibi meritò uendicasse uideatur. Acris præterea est, nec amaroris omnino expers. Quapropter eos haud quaquam damnandos putauerim, qui angelicam Costi genus esse crediderint. Costi uires scribit Gale-

Costi uires  
ex Galeno.

nus lib. v. 1. de simpli. med. facul. sic inquit. Costus leuiculā planè amarā, plurimā autem acrē, & calidā in se qualitatem simul & facultatem continet, adeo ut etiam exulceret. Vnde ipso cum oleo perfricant corpus ante accessione in rigoribus per circuitus redeuntibus. Sic uerò etiam in resolutis, & ischiadicis, atque in summa in quibus excalfacere partem quamuis, aut ex alto in superficiem extrahere aliquem humorem est opus, ad Costum confugitur. Eadem de causa urinas, mensesque prouocat: & adrupta, conuulsa, ac laterum dolores conuenit. Porro ob amaritatem, quæ illi inest, lumbricos latos enecat. Ob eandem & ad contractas uelut ex sole maculas, ἐκίλεας Græci uocant, cum aqua, aut melle usurpant. Inest item flatuosa quædam illi temperiei humiditas, per quam & uenerem excitat cum uino mulso.



ODORATVS Iuncus in Africa, & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa: proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij teuchitin: pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmētis, qui manibus confricando rosæ odorem emittit, igneæ mordacitatis ad linguam. Floris, culmorum, radicisque est usus. Vim urinæ ciundæ habet: menses pellit, discutit inflationes, caput aggrauat, modicè adstringit, comminuit, excoquit, ac uenarum spiracula laxat. Flos eius in potu utilis sanguinem reiicientibus: doloribus stomachi, pulmonis, iocineris, & renum. miscetur antidotis. Radix adstringentior est: ideo fastidijs stomachi, hydropicis, conuulsis, drachma una cum pari pondere piperis, per dies aliquot datur. Decoctum, uulvæ inflammationibus, ad desidentium fots, utile est.

IVNCVS odoratus officinis Squinanthum uocatur. Quæ Iunci odorati consideratio.

uox, quamvis deprauatæ, ex plātæ, & floris nomine componitur, in unam utrisq; iunctis dictionibus. Namq; squinanthum si ad rectam etymologiam referatur, non aliud inferet, quàm duas hasce Græcæ dictiones σχοῖνον & ἄνθος, quæ Latine florem iunci significant: σχοῖνον enim iuncum, ἄνθος uero florem Græcis designat. Veruntamen flos ad nos non importatur. quod tamen mirum non est, cum etiam Galeni tempore non haberetur. Proinde inquit libro primo de antidotis. His præterea Iuncum odoratum ex Arabia allatum immitti præcipit, quem nescio quomodo schoeni anthos, id est, iunci odorati florem multi uocent, cum nobis floris copia non adeo suppeditet. Nam etsi tota aduehatur herba, sunt tamen eius superiores partes à camelis sepe depastæ:

nescuntur enim ea, & delectantur maximè. Hec Galenus. Quæ (si licet nobis dicere quod sentimus) potius ridenda, quàm probanda uidentur. Arduum quippe fuerit credere, tam ingentè esse camelorum numerum, qui locustarum modo in uniuersum schoeni flores depascantur, ut nulla penitus supersit planta, cui flos non deuoretur. Referunt quidam nasci odoratum Iuncum etiam in Apulia. quin & in Campania prouenit, ut Brasauolus inquit Plinij auctoritate. Sed uereor, ne hallucinentur, quòd nec inde flores afferantur, nec paleæ: neq; etiam id Plinius affirmanter asserat. Is, quo seplasiæ passim utuntur, non affertur aliunde, quàm ex Alexandria. Ceterum non parua quidè diligentia, dum emitur, est adhibenda. quandoquidem non desunt impostores, qui ad merces augendas, schoenum palearum, & herbarum quibusdam festucis adulterent. Præterea uidendum est, ne uetustate exoleuerit: facile enim (ut in lib.

de antidotis docuit Galenus) ab hoc uis omnis euanescit. Scribunt Monachi illi, qui in Mesum commentarios ediderunt, odoratum Iuncum, quo passim officinæ utuntur, spiritum & illegitimum esse, cum hæc paleæ (ut eorum uerbis utar) Dioscoridis schoenum minime refrant. Siquidem radices primùm medicinæ usui congruas illi non inesse contendunt, sed capillorum modo tenues: deinde paleas ipsas nullam gustantibus acrimoniam relinquere, nulloq; rosarum odore fragrare, si manibus confricentur: nec postremo iuncum aliquem proferre, sed calamos geniculis interceptos tritici, uel hordei modo. Quæ in re (pace eorum dixerim) duplici errore notantur, primùm quòd Dioscoridem oscitanter legerint, deinde quòd illud affirmant, quòd experimento procul dubio falsum esse deprehenditur. Quòd autè Dioscoridem oscitanter legerint, cum dicunt schoenum iuncum proferre, non calamum, facile patet. quandoquidem contrarium scribit Dioscorides, ubi schoeni usum reddit his uerbis. ἡ ῥίζη δὲ τῶν ἄνθων, καὶ τῶν καλῶν, καὶ τῶν σίμων. Id est. Vfus est floris, calamorum, & radicis. Præterea quòd communis usus schoenos acrimoniam nō habeat, pariter falsum est. quippe, ut experimento quotidie comprobari potest, qui non longo tempore consenuerit, linguam mansu uellicat. Quibus palam est, Monachos uel nunquam schoenum degustasse, uel si degustarūt, illum adeo uetustate exoletum fuisse (ut quemadmodum Galenus inquit) omnem acrimoniam, odoremq; amiserit. Quòd autem nostri schoeni radices tenues sint, nihil ad historiam refert: siue enim tenues sint, siue crassæ, eas non descripsit Dioscorides. Schoeni flores ex Alexandria unà cum integra planta allatos ego in manibus habui, qui digitis attriti rosarum odorem emittebant. Quamobrem non temerè contra Monachorum sententiā affirmandum putauerim, communis usus schoenum legitimum, & probatissimum esse. Sed ij quidem adhuc magis reprehendendi uidentur (non tamen ut eorū dignitati aliquid derogetur) quòd in Diagalangæ compositione scripserint, radicem galangam uocatam legitimum esse schoenum, ipsamq; galangam ad nos non afferri. quòd prorsus à ueritate alienum deprehenditur. Ceterum & in hoc pariter Fuchium errasse crediderim. quippe qui scripserit sua in methodo, schoeni anthi stipites nullam acrimoniam mansu relinquere. Schoeni uires prodidit Galenus lib. v. simp. med. ubi sic habet. Schoeni anthos modicè cal-

Monachorū opinio explosa.

Fuch. lapsus.  
Iunci odorati uires ex Gal.

d facit,




facit, modicèq; etiam adstringit, nec planè à tenuitatis natura alienus est. Quocirca his de causis urinam mouet, mensesq; ciet adhibutum siue in fomentationem, siue in potionem. prodest et iecoris, et stomachi, ac uentris inflammationibus. Magis eo adstringit radix. Quod uerò florem uocant, calidius est. Porro in omnibus sui partibus, in alijs magis, alijs minus, gustantibus apparet adstrictio: proinde medicinis, quæ hæmoptoicis, siue sanguinem reiicientibus exhibentur, commiscetur.

Κάλαμος ἀρωματικός.

CALAMVS ODORATVS.

CAP. XVII.

*Calamib. nuytzyl*



Calami odorati historia  
c. Theo.

CALAMVS odoratus in India nascitur. Melior est fuluus, densè geniculatus, & qui assulosè frangitur, plena araneorum fistula, albicans, lentus in mandendo, & adstringens, cum aliquanta acrimonia. Urinam potu ciet: quare cum graminis, aut apij semine coctus, in aquæ subter cutem fusæ morbo, renum uitij, stiticio urinæ, ruptisque, commodè bibitur: menses & potu, & appositu pellit: tussi suffitu medetur per se aut ex resina terebinthina, hausto per arundinem fumo: ad muliebres infusus decoquitur, & clysteribus imponitur. Malagmatis, & suffitionibus odoris gratia commiscetur. Accorus fol. 19

CALAMVS, & Iuncus odoratus (ut Theophrastus est autor lib. ix. cap. vii. de historia plantarum) trans Libanum montem, inter ipsam Libanum, & alium quendam montem parua ualle minima exeunt: non, ut quidam dixerunt, inter Libanum atque Antilibanum. Inter quos campus amplissimus, & pulcherrimus est, quem Aulonem appellant. Quæ uerò calamus, & iuncus proueniunt, lacus in amplum spatium iuxtaq; eum palustribus siccatis isti assurgunt. Occupant locum plus quam triginta stadia. Virides nequaquam esse uidetur, sed sicci: forma uerò nihil ab alijs differunt. Locum ingredienti, protinus odor aspirat, non tamen longius spirat, ut quidam referunt. Hic enim locus à mari plus est, quam stadia centum quinquaginta. Sed in Arabia aspiratorem agri odoratissimam esse inter omnes constat. Hæc de Calamo Theophrastus. Cui etiam subscribit Plinius libro xlii. cap. xlii. ubi sic habet. Calamus quoq; odoratus in Arabia nascens communis Indis, atq; Syriæ est: in qua uincit omnis à nostro mari centum quinquaginta stadijs. Inter Libanum montem aliumq; ignobile,

non (ut quidam existimauere) Antilibanum in conualle modica iuxta lacum, cuius palustria æstate siccantur, tricenis ab eo stadijs calamus & iuncus odorati gignuntur. Nihil ergo à cæteris sui generis differunt aspectu. Sed Calamus præstantior odore statim è longinquo inuitat, mollior tactu, meliorq; qui minus fragilis, & qui assulosè frangitur, inest fistulæ araneum, quod uocant florem. Præstantior est, cui numerosius: reliqua probatio, ut integer sit. Damatur alibi. Melior quo breuior, & crassior, lentusq; in frangendo. Hactenus Plinius. Sed certè satis palam esse arbitror (ut in acori commentarijs diximus) quam magno ducatur errore Brasauolus Ferrariensis, quod tam facile sibi persuaserit, legitimum odoratum calamum illam esse radicem, quæ temerè omnibus in seplasijs illius uicem explet, quæque uerum esse acorum superius pluribus rationibus comprobauimus. Quandoquidem primam ex ipsa Calami appellatione, deinde ex eo, quod dixerint Theophrastus & Plinius non differre hunc formam à reliquis sui generis, id est, ab omni arundinum genere, utiq; constat odoratum calamum genere, & forma arundinem præ se fere, odoratam tamen, non autem esse radicem. Quocirca Plinius Dioscoridem fortasse secutus, dixit. Fistulæ (hoc est cavitati) inest araneum, quod uocant florem: non autem radici, ut falsò contendit Brasauolus, araneum illud inueniri in uulgaribus officinarum. Ad hæc Plinius lib. xlii. cap. xi. dum plura arundinum genera, & uires recenset, idem apertissime ostendit, his uerbis. Arundinis genera xlii. demonstrauimus, non aliter euidentiore illa natura, quam continuis ijs uolubilibus tractauimus. Et quoniam plura genera fecimus, illa, quæ in India Syriæq; nascitur, odoratum unguentorumq; causa, urinam mouet cum gramine, aut apij semine decocta: cit et menstrua admotu: medetur conuulsis duobus obolis pota, iocinori, renibus, hydropi, tussi etiam suffitu, magisq; cum resina. Hæc Plinius. Sed præterea uulgares calami radices, quas acori esse censemus, assulosè nequaquam frangi possunt, sed transuersim, quemadmodum & iridis. Quo fit, ut eorum innotescat lapsus, qui calamum odoratum radicem esse contendunt, qui tamen (ut aperte ostendimus) aliud est, quam arundo. Cæterum si quispiam dixerit, has radices, quarum est usus, esse calami odorati proprias, non acori, illud sanè argumentum destruit, quod intuentibus euidenter apparet. quandoquidem etsi complures illius acori radices habeantur, quæ sicca gerant in cacumine folia, iridi omni ex parte similia; nulla tamen usquam inuenta est, quæ secum arundinis trunculum cacumini annexum deferat. nempe acori proprium, non odorati calami est, prius folia ferre. His itaq; rationibus Fuchsij quoq; sententia improbanda mihi uidetur. quippe qui putauerit in sua methodo, uulgares

Brasauoli error.

Fuch. opinio improbara.

do, uulgarem officinarum calanum ueri odorati calami esse radicem. Porro minimè quidem compertum habeo, Dioscoridem, nedum Galenum, qui ex odoribus, ac saporibus uires æquæ, ac qualitates omnium simplicium medicamentorum accuratissime inuestigauit, dixisse aliquid odorato calamo inesse amaritudinis, quã tamen in acoro haberi Galenus prodidit. Qui Calami odorati uires pluribus descripsit lib. v. 111. simplicium medicamentorum, sic inquit. Calamus odoratus leuiculam quandam adstrictionem, ac minimam acrimoniam possidet: magne ex parte essentia eius terrena est, & ærea, in caliditatis frigiditatisq; cõiugatione temperata. Quamobrem moderatè urinam mouet, & facultatibus, quæ iecori, & stomacho imponuntur, misceri potest. tum in fomenta quoq; uteri, quæ phlegmones gratia, aut irritandis mensibus assumuntur, utiliter admiscetur. Ponatur itaq; habeaturq; secundi ordinis corum, quæ excalfaciunt, & desiccant: ualentius tamen desiccant, quàm excalfaciant. Inest quoq; ei quædam partium tenuitas, uelut alijs omnibus odoratis, Ceterum illorum compluribus tenuium partium plurimum, calamo uerò non nullum adest. Hæc Galenus. Quibus facile patet, Calamum seplasijs uocatum, legitimum esse nequaquam: maior enim illi inest acrimonia, quàm suo refert Galenus. Eaq; propter legitimum calamo odorato nos esse hoc æuo destitutos fateri non dubitauimus. In eius igitur locum sphagnum supponere præstat: ita enim in succidaneis scriptum reliquit Galenus.

Calami odorati uires ex Galeno.

Βάλαμον. BALSAMVM. Balsam CAP. XVIII.

BALSAMVM arbor albæ uiolæ, lycij, siue pyracanthæ magnitudine conspicitur. Folium rutilæ proximum, longè candidius, perpetuò uirens. In Iudæa solùm quadam valle, & Aegypto nascitur: his differens modis, scabritia, proceritate, gracilitate. Quod igitur tenui, & capillacea coma est, theristum uocant, quasi demessile: fortassis quoniam ob gracilitatem faciliè demetatur. Aestiuus sub ortu canis ardoribus, arboris unguibus ferreis inciditur, manatq; è plaga succus, quæ Opobalsamum uocant: sed tam exiguo stillatu, ut annis singulis, ne plures quidem, quàm seni septemue congij cogantur: inibiq; pondus duplo rependitur argento. Succus probatio est, ut sit recens, ualidi odoris, syncerus, non ad acorem uergens, dilui facilis, læuis, adstringens, ac modicè mordens gustu. Sed uariè uitriatur, misto ab aliquibus terebinthi, cypri, lentisci, balani unguento: item fusino, metopio, melle, aut Cypria cera liquida. Quod maleficium faciliè deprehenditur: nanque merus in laneam uestem fusus, neque maculam facit, neque si eluatur, notam relinquit: uitriatus autè inhæret, & lac instillatus coagulat, quod adulteratus non efficit. Quinetiam syncerus in aqua, aut lacte celerrimè liquatur, coloreq; lactescit: uitriatus uerò olei modo innatat, se conuoluens, aut in stellæ modum diffundens. Syncerus senescens crassescit, deteriorq; redditur. Hallucinantur, qui aqua concretum pessum ire, & ad ima fidere arbitrantur: postea dissipatum supernatare. E ligni genere, quod Xylobalsamum uocant, probatur recens, sarmento tenui, fuluum, odoratum, quadantenus opobalsamum spirans. Necessarius etiam feminis erumpit usus: quare eligatur flauum, plenum, grande, ponderosum, mordens gustu, feruens in ore, modicè opobalsamum olens. Adulteratur semine hyperico simili, quod à Petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, uirium ignauia, sapore piperis. Efficacissima uis inest succo, & quàm maximè calfaciens: abstergit quæ tenebras oculorum pupillis offundunt: medetur perfrictionibus uulvæ cum rosaceo cera to appositus: menses quoque, secundas, & partus extrahit: horrores illitu discutit: ulcera sordida expurgat, & cruda concoquit: urinam potu ciet: ægrè spirantibus prodest: datur in lacte contra aconitū haustum, aut serpentium ictus. Miscetur acopis, malagmatis, & antidotis. In summa præcipua autoritas succo, secunda semini, minima ligno. Semen commodè potui datur doloribus lateris, pulmonum uitij, tussi, ischiadicis, comitialibus, uertiginosis, orthopnoicis, urinæ difficultati, torminibus, ac serpentium moribus: ad muliebres suffitus perquàm utile est: vuluam aperit in desefisionibus balnearum decoctum, & humorem euocat. Lignum easdem habet uires, aliquantò minores. Ex aqua potum cruditatibus, torminosis, vulsis, venenatorum ictibus opitulatur: urinam cit: ad capitis vulnera cum sicca Iri conuenit: squamas ossium extrahit. & ad vnguentorum spissamenta additur.

ANTIQUITVS BALSAMVM (ut Plinius libro xii. cap. xxv. est autor) in duobus tantum hor-  
tis, utroque regio, altero iugerum uiginti non amplius, altero pauciorum uni terrarum Iudææ concessum erat. Sed postea propagata admodum fuit species, cùm Iudæa ipsa simul cum Balsamo Romani potiti sunt. Qui ueluti  
politiarum, pretiosarumque rerum propagatores, tam dignam, claramque stirpem raram esse non tulerunt. Itaque eam malleolis serendo, atque iterando non secus ac uites in collibus propagantur, latius accreuerunt. Quo circa  
Iustinus quoq; hæc de Balsamo memoriz prodidit. Opes genti Iudaicæ ex uestigalibus opobalsami creuere, quod in  
his tantum regionibus gignitur. Est namq; uallis, quæ continuè montibus, uelut muro quodam cincta ad instar castrorum clauditur. Spatium loci ducenta millia iugera, nomine Hierico dicitur. In ea ualle sylua est & ubertate, et amœ-  
nitate arborum insignis: siquidem palmeto, & opobalsamo distinguitur. quanquam species huius insignis, ac pretio-  
se arboris plurimum adauctæ sit. Hæc Iustinus. Scripsit Balsami historiam etiam Strabo lib. xvi. suæ geographiæ, ubi sic habet. Hiericus est campus à montana quadam circumdatus, quæ in theatri speciem ad ipsum declinat. Hoc in  
loco est palmetum palmis abundans spatio stadiorum centum, & totum irriguum, & habitationibus plenum, ubi &  
regia est, & Balsami uiridarium. Quæ arbor odorata est, & fruticosa, cytho, & terebintho persimilis. Eius corti-  
cem uulnerantes, succum in uasis suscipiunt tenaci lacti persimilem. Sed alibi etiam, quàm in Iudæa nasci Balsamum

Balsami confi-  
deratio.

eodem libro idem testatur, præter Plinij, & Solini sententiam, cum inquit. Et apud Sabæos thuris, & myrrhæ, & cin-  
 momum nascitur: in ora etiam Balsamum, & quædam alia planta ualde odorata. Hæc ille. Oriri etiam Balsamum in  
 Arabia testis est Pausanias in Beoticis magnitudine fructus myrti, folijs anaraci, sub cuius umbra innuere & ap-  
 cantur uiperæ, & suauissimo eius liquore aluntur. Sed quoniam modo sit factum (ut in Syriam peregrinantes uno ore  
 fatentur) quod hoc tempore omnibus sanè Balsami plantis Iudæa sit penitus destituta, cum olim sola Balsami ferax  
 compluribus crederetur, quid certi dicam, & quibus auctoritatibus id comprobem, sanè non habeo. Verum cum cer-  
 to sciam probatissimorum uirorum testimonio, qui ex Italia soluentes pluries in Aegyptum nauigauerunt, Memphis Bal-  
 sami iuridarium extare, illud fortasse euenisse putandum est, quod è Iudæa ab Aegypti regibus, quibus uniuersa subij-  
 ciiebatur Syria, omne in uniuersum Balsamum eo fuerit translatum, quò decoris inde plurimum regie accederet. Ve-  
 runtamen diu est, quod in Italiam, ne in totam dicam Europam, neq; lacryma, neq; semen, neq; lignum, neq; cortex im-  
 portantur, nisi adulterijs, & imposturis uitiata. Ceterum non modò fuit id ætatis nostræ adulterium, sed et antiquo-  
 rum, ut autor est Theophrastus: qui hæc de Balsamo lib. 1. x. cap. v. 1. de historia plantarum posteritatis memorie  
 mandauit. Balsamum in ualle Syriæ provenit. Eius hortos duos tantum affirmant, alterum uiginti iugerum, alterum  
 multò minorem. Arboris magnitudo, quæ malo puniceæ magnæ: rami multi: folium rutæ simile, candidum tamen, per-  
 petuò uirens: fructus similis terebintho tam magnitudine, & figura, quam colore. Is quoq; admodum odoratus est,  
 & magis quam lacryma. Colligi lacrymam in caudice, & parte superna tradunt, facta incisura unguibus ferreis sub  
 fodere, cum æstus maxime angit. Collectum uerò æstate fieri tota. Sed quod manat, multum non esse: uix enim toto  
 die concham posse impleri: odorem tamen inferri eximium, & copiosum, adeò ut ex paruo spatium per longum odor  
 ualeat permeare. Verum sincerum ad nos nullum aduehi, sed quod mixtum colligitur: plurimis enim mixtionibus ui-  
 tiari, quodq; Græciæ uenditur. Ideoq; Galenus lib. primo de antidotis narrabat, cum non ignoraret, opobalsamum  
 diuersis modis adulterari posse, ita ut difficulter ementi discerni queat, se proprio oculorum intuitu cernere uoluisset  
 & quomodo cresceret Balsamum, & quomodo lacrymam mitteret: uoluitq; sinceræ eius lacrymæ partem habere,  
 ueluti regulam ad dignoscendū alios Balsami liquores, qui per orbem ab impostoribus uitiati circumferebantur. Mo-  
 dus autem incidendi corticis, ut inde liquor effluat, apud autores sanè uarijs est. quadoquidem Theophrastus, & Dio-  
 scorides arborem dixerunt unguibus ferreis scalpi, ut inde uulnerato cortice fluat lacryma. Plinius uerò contrà, si  
 ferro incidatur statim siccari, atq; emori scribit: ob idq; qui opobalsamum colligunt, inquit, uitro lapide, ossisq; cul-  
 tellis ad corticem uulnerandum utuntur, deinde succum lana excipientes in corniculis colligunt. Ceterum cum mecum  
 sæpius cogitauerim à tot imposturis, quæ indies fiunt, nos cauere non posse, non alienum fore duximus illud in hominū  
 memoriam reuocare, quod si unquam opobalsamum uenale inueniatur (tametsi in Italia per lōgas ætates non amplius  
 ipsum uenturum putem) non ematur, nisi prius de eo omne fiat periculum, quo clarè cognoscatur omnibus ijs præ-  
 stiare tū notis, tum facultatibus, quæ illi ab autoribus tribuuntur. Ad hæc Balsami fructus, siue semen, quod Carpobal-  
 samum uocant, ab eo quidem longè differt, quod his temporibus ex Alexandria comportatur. Siquidem optimum le-  
 gitimumq; flauum sit oportet, factum, ponderosum, gustu mordens, et feruens in ore: non autem nigrum, leue, inane,  
 non acre, & nullum spirans odorem, quale, quod circumfertur, deprehenditur. Quo fit, ut non aliud suspicandum sit,  
 quam quod hoc idem sit semen hyperico simile, quod etiam Dioscoridis æuo à Petra Palestina oppido deferbatur.  
 Hoc idem ligno euenit, quod Xilobalsamum uocat seplasiæ, Græcos secutæ. quippe quod passum in ijs habetur, potius  
 myrrum, quam Balsamum refert. Corticis non meminit Dioscorides, quanuis dixerit Plinius libro 6. cap. superius  
 citatis, ipsum quoq; in usu medentium esse. Balsamum memoriæ prodidit Galenus lib. v. 1. de simp. medicament. facul-  
 sic iniquiens. Balsamum desiccatur, & excalescit secundo excessu. Est autem tenuium partium, adeò ut odoratum su-  
 Sed liquor eius subtiliorum etiam partium est, quam ipsa planta, non tamen adeò calidus, ut quidam existimant tenui-  
 tate partium falsi. Porro fructus eius persimiles genere facultatis est, ceterum longè in subtilitate partium inferior.  
 Placet eidem Galeno (ut in libello de supposititijs medicamentis illi adscripto legitur) ut Balsami uice stacte myrrhæ,  
 aut oleum irinum, in compositis medicamentis commodè inferi possit: xilobalsami uerò loco leucosij radix. Porro  
 quid carpobalsami uice supponendū sit, nullibi apud eundem reperi. tametsi in quodam incerti autoris libello, quem  
 seplasiæ Q. u. pro quo nuncupat, pro opobalsamo oleum terebinthinum, uel laurinum, uel gummi hederæ, subiicitur,  
 pro carpobalsamo hederæ corymbus, & pro xilobalsamo hederæ ipsius lignū: tantum ille hederæ tribuit auctoritatē.  
 Sed alia est opinio nostra: nam ipse libentius pro opobalsamo oleum myrristicæ nucis, uel styracinū supposuerim, quam  
 terebinthinum, uel laurinum, pro xilobalsamo agallochum, & pro carpobalsamo uulgares cubebas. Ceterum af-  
 fertur iam (ut audio) ex occidentalibus Indijs liquor odoratissimus liquido styraci admodum similis, quem qui deferunt,  
 appellant Balsamum, quod notas nonnullas Balsami præ se ferat. Veruntamen cum teste Strabone Balsami lacryma  
 lacteo colore sit, crediderim potius nouum liquorem hunc, ueram esse stactem, uel styracis liquorem, quam Balsam:  
 ob idq; non esse penitus ab re, si quispiam eo Balsami loco uteretur. Quidam recentiores cum se Opobalsamo desti-  
 tutos conspicerent, illud artificio quodam non sanè damnando componunt. Faciendi modus sic habeto: ego enim hæc  
 ratione pluries ipsum mihi confeci. Sumito resinæ terebinthinæ, abiegne, cuiusq; libræ: thuris albi, ladanu, cuiusq;  
 unc. sex: nardi Indicæ drac. duas: radicum phu, iridis, acori, asari, cyperi, singul. drachman: mastiche, galangæ,  
 caryophyllorum, cassiæ odoratæ, zedoariæ, cuiusq; drach. sex: nucum myrristicarum unc. quatuor: macis unc. unam  
 agalochi unc. duas: gummi elemi unc. sex: aloës hepaticæ, myrrhæ, cuiusque unc. unam & semis: castorei drach.  
 decem: ossium cariotarum, styracis calamiti pinguis, laseris odorati sing. unciam: lacrymæ sanguinis draconis sex-  
 cunciam: florum laudulæ unc. quatuor: olei unguentariæ glandis unc. sex. Quæ ex his atterenda sunt, in pulue-  
 rem contertio, liquoribusq; admisceto, & uitreo organo (si nescis Chymistas consulito) diligentissimè ui commiscetur  
 ignis

Balsami uires  
 ex Galeno.

Liquor ex In-  
 dijs nuper al-  
 latus.

Balsami facti-  
 ti conficiendi  
 ratio.

ignis oleum elcito. Primum enim clarissima tenuissimaque emanat aqua, tenuissimarum utique partium, quæ igni admodum modo quodam admirabili flagrat: hæc aqua Balsami dicitur. Deinde defluit oleum colore aureo, et substantia inter tenuem, et crassam, quod oleum balsami uocant. Postremo uero id manat, quod Balsamum uocant, rufo colore. Aqua, quæ prius fluxit, uentriculi imbecillitate affectos hausta mirum in modum iuuat: siquidem tum pituitam, tum flatum ualenter consumit. sed quod acerrima sit, dari sane per se nequit, nisi uino, aut iure aliquo admixta. Liqueor deinde qui secundo stillicidio fluxit, quem quidam cæteris præferunt, mirifice neruorum uulneribus, compaginum cruciatibus, conuulsis, resolutis, comitialibusque succurrit. Vltimum uero oleum hæc omnia similiter præstat, uerum debilius. Pollent hi liquores et ad alia innumera corporis incommoda, quæ breuitati consulentes silentio inuoluenda duximus.

Ἀσπάλθος. ASPALATHVS, CAP. XIX.

ASPALATHVS, alijs erysiceptron, frutex est furculosus, multis spinis horrens. Nascitur in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula: quo ad unguentorum spissamenta pigmentarij utuntur. Optimus est grauis, detracto cortice rubescens, aut in purpurâ uergens, densus, odoratus, gustatu amarus. Est & alterum eius genus candidum, lignosum, sine odore: quod deterius habetur. Vim calfaciendi cum adstrictione obtinet. Vnde decoctum cum uino ad tetra oris ulcera colluenda conuenit: ad nomas genitalium, & sordida ulcera infunditur: subiectum in pecto, partum extrahit. Aluum sistit eius decoctum: & sanguinis reiectionem potu cohibet: urinæ difficultatem, inflammationesque discutit.

ASPALATHVS quidem ex Creta, Rhodo, uel Syria ad nos (quod sciuerim) non aduehitur: etsi existima-  
 20 rint nonnulli santalum rubrum uocatum esse Aspalathum. Quorum errorem Serapio manifestè prodidit: quandoqui-  
 dem de santalo agens, nullum (ut assolet) affert Dioscoridis testimonium, sed tantum suæ gentis nititur auctoritati-  
 bus. Quod maximo argumento est, santalum rubrum nihil cum Aspalatho habere cognationis. Meminit tamen Se-  
 rapio Aspalathi sub Arabico nomine Darisfahan, ubi leguntur omnia, quæ de ipso tradidit Dioscorides. Huic alia uis-  
 lidior accedit ratio, siquidem Aloisius Cadamustus, Columbus, et Pinzonus in suis nauigationibus ad orientales In-  
 dias, aliasque ignotas terras, continuas santalorum recta proceritate sylvas unanimiter uidisse narrant. Quod longè  
 abest ab Aspalatho, qui frutex humilis est suauiter odoratus, amarulento gustu. quæ in rubro santalo non deprehen-  
 duntur: rubrum enim santalum odoratum non est. Quod si quandoque odoratum sentitur, id (ut optime norunt periti  
 myropole) non euenit, quod ex se tale sit, sed quod, dum unâ cum albo, et flauo importatur, quæ odorata sunt, ex il-  
 lis sibi odorem ascriuerit, qui tamen tractu temporis facili euanescit. Porro Ruellius mediocri censura non uacat, quod  
 30 pro certo asserat, id legitimum esse Aspalathum, quod Rhodium oleastrum nonnulli uocant: quo item quondam agala-  
 lochi uice utebantur myropolia. Cuius materiem cum et in seplasijs, et apud artifices, qui precatorias (ut ita dicâ)  
 coronas ad Deiparæ uirginis salutationes torno conficiunt, diligentissimè sim perscrutatus, ea sanè nigra partim, par-  
 tim uero ex nigro, flauoque uenosa mihi sese obtulit. Rubram autem, et subrubram (ut Ruellius inquit) nusquam me  
 uidisse ingenue fateri possum. Adde etiamnum, quod sit (quemadmodum Rhodij narrant) hæc planta ex olearum ge-  
 nere Rhodio tractu abunde proueniens, quæ oliuas etiam proferat, sed nec multis spinis horrens, nec detracto cortice  
 rubescens. Quamobrem (ut mea fert opinio) Aspalathus non erit Rhodium oleastrum, neque santalum rubrum. Ita-  
 que cum nobis Aspalathus desit, qui tamen facile ex Rhodiorum insula afferri posset, suppleat eius locum uiticis se-  
 men: sic enim in Galeni succidaneis scriptum reperio. Meminit Aspalathi Galenus lib. VI. simp. med. sic inquit. Aspalathus  
 40 Aspalathus gustu quidè acris simul et adstringens est: facultate uero ex dissimilibus constat, nempe partibus suis acri-  
 bus excalcaciens, partibus uero alijs, austeris scilicet, refrigerans. Itaque utriusque ratione desiccet, et proinde ad pu-  
 tredines, et fluxiones est utilis. Hactenus Galenus. Ceterum quod etiam hi nostri cõmentarij Santala redoleant, pos-  
 stequam antiquiores Græci eorum non meminere, de his hic differere non alienum duximus. SANTALVM itaque  
 in utraque India syluis densissimis, ingentissimisque nascitur. Cuius tria numerantur genera: quorum præfertur pallidum,  
 secundum locum habet album, postremum rubrum, quod nullo commedetur odore. priora duo suauiter spirant. Quæ  
 propter Mauritanorum sententiam minime probadam putauerim, qui Santalum tertio ordine frigefacere, siccare ue-  
 rò secundo memoriæ prodiderunt. Rubrum (ut ipsi asserunt) priuatim defluxiones prohibet: incandescentibus in-  
 flammationibus, podagrisque ex succo solani, aut sedi, uel portulacæ utiliter illinitur. Candidum, ac pallidum, ex rosa-  
 rum aqua fronti imposita, capitis dolores mulcent. Aduersantur omnia calidis febribus: epota æstuanti uentriculo  
 50 mirifice auxiliantur. Fiunt ex ijs, et aqua rosarum epithemata, quæ uentriculo illita eius feruorem in ardentissimis  
 febribus extinguunt. Ad hæc (ut autor est Auicenna libro de uiribus cordis) Santalum non modo cordi efficacissimè  
 letitiam affert, sed et robur non paruum addit. Quare his immiscetur medicamentis, quæ cordi, et cordis palpitati-  
 oni maximam opem præstant.

Aspalathi con-  
sideratio.

Ruellius erro-  
re notatur.

Aspalathi ui-  
res ex Gal.

Santalorum cõ-  
sideratio.



Musci arborū  
hystoria.Musci arbo-  
rei vires ex  
Galeno, & A-  
rabibus.Moschi odo-  
rari hystoria.

**BRYON**, id est, Muscus, à quibusdā splachnon ap-  
pellatur. In cedro arbore, populo alba, & quercu inue-  
nitur. Optimum est cedrinum, proximum populneum  
in quo genere candidum, & odoratius præstat: nigri-  
cans improbat. Adstringēdi vim habet. Decoctum  
infidentium vuluis utile. Vnguēto balanino, oleisque  
inspissandi gratia inferitur: thymiamatum, acopori-  
que compositionibus conueniens.

**GALENVS** lib. VI. de simplicium med. facultate, & post  
ipsum **Paulus**, non modò Muscum, qui cedris innascitur, intactum  
non reliquere; sed præterquàm quod populnei, & querni memi-  
nerint, de eo etiamnum, qui in picea arbore abieti cognata oritur,  
tradiderunt. A qua ipse quidem in uallis Ananie mōtibus supra  
Tridentum muscum admodum uillosum proprijs manibus quam-  
pluries decerpit, multò sanè odoratiorem, pulchrioremq; quàm  
qui in populo, et quercu prouenit. Nec minus piceo suauiter olet  
abiegnus, quo in eorundem mōtium syluis, abietes innumeras adeò  
uillosas, incanasq; mihi uidere sæpius contigit, ut prima statim sa-  
cie crediderim uillos frondium loco ijs in arboribus genitos esse.  
Sortitur arboreus Muscus uaria, ac diuersa nomina: quippe &  
muscus, & bryon, & sphagnos, & splachnon, & hypnon appel-  
latur. Meminit huius **Plinius** lib. XII. cap. XXIII. sic inquit.  
Sphagnos in Cyrenaica prouincia maxime probatur: alij bryon  
uocant. Secundum locum obtinet Cyprius, tertium Phœnicus.  
Fertur & in Aegypto nasci: quin & in Gallia non dubitauerim.  
Sunt enim hoc nomine cani arborum uilli, quales in quercu maxi-  
mè uidemus, sed odore præstantes. Laus prima candidissimè, atq;  
altissimè: secunda rutilis: nulla nigris. Et in insulis, petrisq; ne-  
tini improbantur, omnesq; quibus palmarum, atq; non suus odor u

est. Hactenus **Plinius**. Ceteram in eo genere, quod in Italia prouenit, is & nobilior, & odoratior apparet, qui in la-  
rice nascitur: quapropter & uiribus fortasse præstātor erit. Nimirum recorder me non parum eo quandoq; suis-  
se oblectatum, dum nocturno tempore quibusdam in montibus super fœno recumberem, ex conquisitis plantis defange-  
tus, ubi larices innumere erant omni ex parte uiloso musco incanæ. Quandoquidem pastores, ut nos ueluti re noua,  
& uoluptuosa reficerent, quodam paruo ignis lumine hos uillos incendebant, qui tanto flagrabant impetu, & crepi-  
tū, ut nobis quidem uiderentur tormentorum puluerem faciliè superare. Quippe flammæ unā cum ingenti fauillarum  
copia, in obscuræ noctis silentio ad astra tolli uidebantur, relicto sui odoris oblectamento. Vnde illud existimaui,  
quod **Galenus**, cum bryon in quercubus, & piceis inueniri tradiderit, non solum de picea intellexerit, sed etiam de con-  
generibus plantis, nempe abiete, larice, & pinu. Is autem lib. VI. simp. med. citato, ita de eo scriptum reliquit. Bryon, &  
quidam uerò splachnon. Inuenitur autem in quercubus, & piceis, & populis albis. Vim habet adstringentem, inue-  
lidam. Nec enim multum est frigidum, sed propinquum ferme medijs; quia uidelicet & digerendi, & emolliendi sa-  
cultatis est particeps, maxime quod in cedrinis lignis reperitur. Muscum officinæ Arabas secutæ Vñeam uocant.  
Inter quos **Serapio** epotum uinum retulit, in quo diebus aliquot usnea maduerit, altum somnum inducere, uentriculum  
roborare, uomitiones compescere, & aluum sistere. Ad hæc Muscus (ut **Auicenna** inquit) utiliter inter cordis me-  
dicamenta inferitur, quod odoris fragrantia animi defectus inuuet. Sed quoniam arboreus muscus odoratissimus **Mo-  
schon** mihi in memoriam redegit, qui ab oriente, & occidente, quibusdam pilosis utriculis conclusus defertur, & si **Di-  
scoridis** **Galeni**q; æuum hunc silentio præterierit, nos tamen haud quaquam dissimulanda putauimus, quæ ad hanc rem  
pertinere arbitramur. Siquidem hi nostri commentarij merito de me conqueri potuissent, si eos tanta odoris suau-  
tate destitutos reliquissim; præsertim cum omnibus palam sit ubiq; terrarum Moschum inter pretiosa odoramenta  
primam sibi comparasse sedem. Quippe non modò collo, auribusq; suspensus, uestimentis interpositus, chirothecis illu-  
tus, crumenis conclusus, ore retentus, & barbæ & supercilijs inunctus defertur Moschus, quò alarū, nariumq; letas,  
sudoris graueolentia, & insuauis corporis halitus occulantur, lasciuie oblectamenta augeantur, mollior que poli-  
tia fiat; sed etiam ut odoris suauitate Deiparam uirginem concilient, ne dicam, ut hac fucata hypocrisis lasciuia  
dissimulent (eò enim uanitatis peruentum est) Moschum ipsum in orbiculos componunt, quibus funiculo traictis  
angelicas salutationes in cælum eruant. Omnia deniq; quibus miscetur Moschus, sua odoris iucunditate commen-  
dat. Quod si hæc lucubrationes eo fortè caruissent, uerendum quidem erat, ne cum illis gratiam inississent, qui miranda  
que odoramentorum fragrantia redolet. Quamobrem ut & ij sibi unguenta omnium præstantissima, odoratissima  
que comparare ualeant, Moschi primum, deinde uerò liquoris Zibetti uocati, & Ambari denique historiam, &  
facultates describam. MOSCHVS itaque (ut **Ruellius** ex **Ætio** transcribit, si tamen ea **Ætij** legitima sunt,

cum potius Simeonis Sethi esse uideantur ) plura habet genera . Præfertur qui in municipio quodam nascitur , quod magis , quam Chorasa ciuitas ad orientem uergit : hoc barbaro nomine Pat dicitur , colore subflauo . Secundum sibi sedem arrogat , qui ab India defertur , priori bonitate cedens , colore subnigro . Eo infirmior censetur , qui à Sinarum agro mittitur . At Moschus omnis in umbilico cuiusdam animalis gignitur , quod capreæ simile est , unico armatum cornu , prægrandi corpore . Huic cum in uenerem agitur , furoris uehementia umbilicus intumescit , fitq; uomicæ prægnans congestio inibi et asiore sanguine : quo tempore et pabulo , et potu seruum animal abstinet , humiq; crebro uioluitur : quæ uersatione umbilicum lutofo , sæculètoq; sanguine turgentem exprimit . Ceterum emissæ sanies post aliquid tempus sibi magnam odoris suauitatem aspicit . De Moscho inter Arabas scripsit diligenter accuratèq; Serapio , his uerbis . Animalia capreis non absimilia , quæ Moschum gignunt , in Tumbascorum , et Sinarum agro potissimum habentur , loca inuicem contermina . Tumbascinus Sinico longè præstantior est , quod capreæ Moschum gignentes et nardum , et alias odoratissimas plantas depascantur . Quod Sinicis non euenit . nam etsi hæ quoq; odoratis uescantur herbis , et tamen odoris , et facultatis præstantia , nardum , et cetera Tumbasci plantas non equant . Quinetiam in causa est demetendi ratio . quippe Tumbascini è uomicæ folliculo saniem nunquam eruunt , quò adulteria permisceant , et non nisi sereno celo syncerum legunt . Sinici uerò uomicæ utricululum exprimunt , et exclusa sanie imposturas quosdam admiscunt , nubilo parumq; aridente celo , et alabastris recondunt . Is ceteris præstat , qui maiore odoris fragrantia redolet , et qui è uomicæ maximè matura eruitur . Sunt et inter hæc animalia , quæ ab alijs Moschum ferentibus nullo discrimine differunt , præterquam caninis uocatis dentibus . quippe hæc uerum modo exertos palmi longitudine dentes habent , et pariter Moschum præstantissimum gignunt . Moschus præcox tetro , et insuauis odore difficit . uerum uenatores immaturi folliculos excutientes , tantisper eum libero aëre sustinent , dum abactò prorsus fetore maturuerit . Is enim aëris coctione perfecta , miram sibi conciliat odoris suauitatem . Veruntamen præcipuus habetur , qui suapte natura in animalis utriculo sibi maturitatem comparauerit . Hunc incolæ per saxa metunt , et arborum truncos : namq; animal cum uomicam maturam esse præsentit , saxis et truncis sese magno oblectamento affricat , donec factò uomicæ emissario tota saniei uis effundatur . Hic ceteros sanè antecellit , tanquam solis coctione , et cæli benignitate maturitatem ultimam consecutus . Hunc itaq; Moschum inde uenatores colligentes eorum animalium utriculis asseruant , quæ aliàs uenatione captauerant . Isq; ille Moschus est , quo reges et donantur , et utuntur . Moschus excalfacit ordine secundo , siccatur uerò tertio . Cor frigidum , ac tremulum roborat , et omnibus ipsius affectibus opem præstat potius , atq; illius . Detergit tenuis oculorum albugines , et humidæ defluxiones exiccat : cerebrum roborat , et diuturnum capitis dolorem mulcet , si tamen pituitæ redundantia proueniat . Coles ex eo cicino oleo macerato perunctus , promptius in uenerem excitatur . Probant nonnulli an Moschus legitimus sit , hoc modo . Pondus libra examinatum in labellum humore perfusum immittunt , tum paulò post iterum æqua lance ponderant . Quod si superferatur , syncerum et legitimum existimant : sin cedat , spurium , et adulteratum putant . Huic simile aliud quodpiam habemus , sed præterquam quod mirum in modum oleat , primo statim occurso odoris uehementia nares admodum ferit . Hoc uulgari sermone uocamus ZIBETTO , unguentarijs maximè expetitur ad ea odoramenta componenda , quæ propriè mixturas appellant . Gignitur id in exteriori testiculorum utriculo cuiusdam animalis , feli , qui ueteribus ædificiorum ruinis oberrat , non absimilis . Catos hæc animalia uocant , quos sæpius Venetijs uidi ex Syria delatos . Est autem Zibettum tanquam sudor inter huiusce animalis testiculos concreescens , calidæ , humidæq; facultatis . Id cauernule umbilici impositum uulue stranguinationibus mirificè prodest : proinde nec mirum est , si eo uiri peniculi magno mulieribus in coitu asserant solatium . Porro ex quo AMBARVM aliud odoramenti genus gignatur , quod nos uulgò uocamus Ambracane , uarij uariè opinantur . Alij namq; tradunt ipsum in maris alueo non secus , atq; in terra fungos oriri , ac deinde sauientibus procellis , è profundo elici , et in litus expui . Nonnulli uerò referunt piscem Azelum nomine Ambarum hoc audissimè prosequi , cuius esu necem sibi statim consciscere . Quod cum sciant piscatores huius rei periti piscem hunc mortuum , undiq; fluctuantem coniectis uncis et funibus extrahunt : et Ambarum scisso animalis uentre eruunt . Quod uerò ( ut perhibent ) proxime dorsi spinam inuenitur , id maximè præfertur alio . Quidam præterea in fontibus quibusdam Ambarum natare scribunt , qui bituminis modo illud eructant . Tria Ambari faciunt genera . Præfertur colore fuluum è Selachito Indis petittum . Aliud subalbidum , quod è Sincbrio felici Arabiæ oppido aduchitur . Tertium atrum , et ceteris uiribus imbecillius . Excalfacit Ambarum , et siccatur : cerebrum , et cor olfactu roborat . Senibus , et natura frigidis opem mirificè præstat . Quare ipsæ potius , quam iuuenibus chirothece Ambaro imbutæ conceda deberent . Vino insusum temulentos efficit .

Moschi odorati uires .

Zibetti historia , & facultas .

Ambari historia uaria .

Ambari genera , & uires .

## ΑΓΓΛΟΧΕΥ. AGALLOCHVM. *ῥαυδύς* CAP. XXI.

AGALLOCHVM lignum est , quod ex India , atque Arabia deportatur , thuiæ ligno simile , maculatum , odoratum , gustu adstringens cum quadam amaritudine : cute uerius quam cortice uestitur , aliquantulum uersicolore . Manditur , aut decocto os colluitur , commendandi halitus gratia : sudores arcet toto corpori insparsum : pro thure ad suffimēta substituitur . Radix epota drachmæ unius pondere , humida stomachi uitia , & imbecillitatem , feruoremque mulcet : si lateris , iocinerisue dolor ex cruciat , si dysenteris , aut tormina infestant , ex aqua bibere prodest .

AGALLOCHVM à Græcis , et Latinis recentioribus , sicuti ab Apbris lignum Aloës appellatur . Optimam à Lusitanis è Calecut Indis emporio ad nos conuehitur . Etsi etiam Venetijs hac etate ex Alexandria Aegypti præstantissimum asseratur : siquidem igni accensum suauissimum , ac periuicundum spirat odorem . Nec ob id putandum hoc illicguum esse , quod ἐσιγμένον id est punctis maculatum nō sit : quoniam Oribasius non legit ἐσιγμένον , sed ἐσιμνέον

Agallochi cōsideratio .

Agalloch. fabu-  
loſa opinio.

Agallochi hi-  
ſtoria ex Se-  
rap. & Sum.

Fuchſii ſenten-  
tia improba-  
ta.

Agallochi fa-  
cultas.

Narcaphthi  
conſideratio.

cui evādes, id eſt. Eſt igitur odoratū &c. Quemadmodum nec id etiam legit Serapio, qui nec punctorum, nec macula-  
rum meminit: ſicuti nec Paulus. Ceterum non diu eſt, quod legitimum importari cepit: nam licet antea, quibusdam  
non deſſet Agallochum uerum: nihilominus, quod rariffimum eſſet, ſeplasia ſerē omnes eius loco, ut ſuperius diximus,  
oleaſtrum Rhodium ſuppeditabant: quem falſo exiſtimauit Ruellius aſpalathum eſſe. Naſcitur Agallochum (ut La-  
ſitani per meridiem in orientem nauigantes teſtantur) in inſula Taprobana, alijsq; conſtribus locis, cuius integros tra-  
cos in Luſitaniam, & Hiſpaniam iſdem ſecum attulere, qui non modō incenſi, ſed manuum tantum attritu ſuauius (u-  
aiunt) redolent. Porro ubiq; pretioſum Agallochum eſt: nam & in locis, ubi naſcitur, plurimi penditur. Verum  
Agallochum, quod tantopere preſtet, haecenus mihi uidere non licuit. Sunt, qui ſomniantes dixerint, Agallochi ar-  
borem uidiſſe neminem, cūm terreſtri tantum paradiſo proueniat: illudq; ferri fabulantur fluminibus, quæ (ut ſacri  
teſtantur monumenta) ex eo manant. Atqui pro comperto habetur (ut paucis innuit Serapio) Gangem Indiæ amphi-  
mum fluuium quā plurima ſecum Agallochi fragmina uehere, quæ tamen in ipſum ducuntur aliorum fluminum cur-  
ſu, qui in eam confluunt. Quippe cūm fluuij tranſluant loca, ubi Agallochū prouenit, aquarum inundationibus torge-  
tes huius truncos, fragmina, ac ramenta rapiunt unā cum alijs uarij generis lignis, & in Gangem tranſferunt: quem-  
admodum in noſtris etiam fluminibus ſæpe ac ſæpius uiſitur. Cuius rei indicium aſſert illud, quod Venetijs uenditur,  
utpote quod longo aquarum diſcurſu omni ex parte laceratum, exeuſum, comminutumq; ſpectetur. Quamobrem mi-  
rum non eſt, ſi dum manibus tractatur, id odoris non preſtet, quo illud fragrare predicant ex natali ſolo in Luſitania  
aduectum. Eius plura numerantur genera, ſi Serapioni fides eſt adhibenda, qui ex Abohanifa Arabo ita tranſcribit.  
Dicunt Agallochum in Arabia nunquam oriri; tametiſi quedam ibi creſcat planta neuig uocata, quæ quadantem  
Agallochum reſert. Verum preſantiſſimum India mittit: & quauis hoc genere differat (plura enim Indiæ Agal-  
lochi ſunt genera) id tamen quod uiribus cætera præcellit per excellentiam Indium peculiariter uocant, quemadmo-  
dum nigra myrobalana, quod cæteris præſtet, Inda pariter appellant. Indium in quadam Indiæ inſula inuenitur, quæ  
Fimua nominatur. Selectiſſimum eſt nigrum, quod uarium oſtendat colorem, ſucci plenum, ponderoſum, duritie com-  
pactum, craſſum, non albicans, & quod accenſum ægerrimè flagret. Secundæ bonitatis eſt Mondunum à Mondel In-  
diæ urbe denominatum. Tertium eſt Seiſicum, quod non obſcuræ bonitatis præſumitur, quod ſua præſtanti uia, ac græ-  
dine in aqua coniectum, non innatet, ſed ſtatim ſubſidat. porro ex hoc genere id magis præſtat, quod craſſum eſt, &  
plurimo humore prægnans. Poſtremam ſedem habet Alcumericū Seiſico bonitate cedens: tametiſi Alcumeri non lon-  
gius à Seiſi diſtet, quā itinere triduoano. Præſtat in Alcumericū genere nigrum nulla albedine uarium, græue, ignem  
flammis diu reſiſtens, ueruntamen uiribus Seiſico inferius eſt. Item ex auctoritate Cheaſetebeni idem ita ſcribit. Fe-  
runt præterea, quod incolæ Agallochum ſtatim ab arbore diſſectum integro anno ſepeliunt, ut ita terra obrutum mar-  
ceſcat cortex, lignumq; tantum purū remaneat, adeo ut è ligno nihil erodatur. Ferunt inſuper illis in regionibus col-  
labentes ex Agallochi arboribus ramos, raptos à fluminum inundationibus per circumſtantes regiones deſerri. Hæc  
Serapio. Cui ſubſcribit è recentioribus Græcis Simeon Sethi, cauſam etiam reddens, cur annua ſepultura diſſectum  
Agallochum recondatur, cūm inquit. Non aliās odoratiſſimum futurum exiſtimant, niſi prius marcorem aliquem,  
& terebinthum ſenſerit: proinde harum regionum incolæ diſſectum ſub terra condunt, ſuoque tempore exiunt, &  
negociatoribus uendunt. Nicolaus Myreſſicus ſæpius in ſuis componendis medicamentis Agallochi crudi meminit,  
ubi Fuchſius prima de antidotis ſeſſione, ſic adnotauit. Sæpe Agallochi crudi mentionem facit Nicolaus, ideo  
que hoc loco, quæ noſtra de illo ſit ſententia, exponemus. Per crudum itaque lignum intelligo, quod non putruit: nam  
(ut teſtis eſt Simeon Sethi) eius regionis in qua prouenit incolæ idipſum concidunt, et ſub terra multo puluere obrui,  
& poſt aliquod temporis ſpatium, quantum ſcilicet ſufficere uidetur, ligni partes educunt, & mercatoribus uendunt.  
crudū itaq; erit, quod terra non obruitur, ſed ſtatim ab arbore exciſum ad uſum rapitur. Hæc Fuchſij ſententia. A  
quo tamen nos pace ſua diſſentimus. nam ſi in componendis medicamentis præſtantiſſima ſimplicia ſemper expoſcimus,  
ſicq; Agallochum illud præſtantiſſimum, odoratiſſumq; (ut etiam Simeon ille reſert) quod terra, uel puluere fuerit ſepultum,  
non uideo, cur potius in ſepultum, & ſtatim ab ipſa arbore exciſum (id enim ob locorum diſtantiā recens habere ne-  
quimus) crudum uocauerit Nicolaus, præſtantiſſumq; exiſtimauerit. Puluere enim uel terra conditum coqui non po-  
teſt, quod nullus ibi ſit ignis, neq; calor, ſed potius recrementitia humiditate exui, quæ fortāſſe odorem eius obtundit.  
Verum crediderim potius, per crudum Agallochum Nicolao illud designari, quod non fuerit antea elixum: quod in-  
de fortāſſis odoratiſſima lauacra ex Agallochi decocto ſibi conſiciant Indi, aliāq; odoramenta in regales præparent  
uſus, ut etiam cum rhabarbaro fieri narrant. Vel fortè per crudum illud intelligit Nicolaus, quod impetu fluminum,  
longoq; eorū ductu per regiones deſertur. In his nanq; calorificis regionibus aquæ à ſolibus non obſcurè caleſcente  
non modō illud omni ex parte diluunt, ſed etiam elixant. Illud præterea addiderim, quod cūm non modō crudum, ſed  
etiam bonum addiderit Nicolaus, nullum aliud expetere uidetur, quā quod ſepultum præſtantiſſimum euaserit.  
Ceterum Agallochi omne genus exciſcit, & exiſcat ordine ſecundo. Facit, ut Auicenna ſcribit, ad cordis aſſectum:  
ob idq; inter ea medicamenta, quæ cordi præſidio ſunt, Agallochum recensuit. Huius non reperiō memiſſe Galenum  
alibi, quā in ſuccidaneis, ubi centaurium ſupplet pro Agallocho.

ΝΑΡΚΑΡΘΗΝ. NARCAPHTHVM. C A P. X X I I.

NARCAPHTHVM ex India deſertur, corticoſum, ſimile ſycomori libro: quod iucundi odo-  
ris gratia ſuffitur. Miſcetur thymiamatis compoſitis. Conſtrictionibus uulue ſuffitu prodeſt.

Tam breuiter tanq; parçè de Narcaphtho ſcripſit Dioſcorides, ut nimirū mihi per difficile ſit explicare, quidnam  
hac ætate ad nos ex India aſſeratur, quod legitimum Narcaphthū referat. Eoq; magis quod nūc il de hoc (quod equidem  
ſciam)

scilicet Theophrastus, & Plinius suis monumentis posteritatis memorie prodiderunt. Attamen non desunt indicia, quae pre se ferant (si modo ad nos deferatur) id omnino esse Narmacothum, quod uirgo seplasia uocant Tigname. Nam tigname non aliud integrat, quam thymiam apud Græcos, quod apud Latinos suffimentum significat. Proinde huius in suffimentis frequentissimus sit usus, nil mirum si nouum ex usu sibi uendicauerit nomen, quod est thymiam. Id quod corrumptentes posteri tigname pro thymiamate dixerunt. Ad hæc (ut Dioscorides inquit) iucundi odoris gratia per se sufficitur, ac etiam alijs suffimentis inseritur. Quod in Tigname facile probatur. quippe id tantum usu uenit in compositis odoramentis, quæ ad sufficiendum parantur, ita ut præterquam quod per se id muneri præstet, rare quoque fiant suffimentorum compositiones, quæ ipsum non recipiant. Quare admirari sinamus, si relicto proprio sue arboris nomine, sibi ascritam nomenclaturam ex suffimentis usurpauerit. Serapio Narmacothum Lasabaten uocat: & illud odorati calami uice supponi posse autumat.

Κάναμον.

CANCA MVM.

CAP. XXIII.

CANCA MVM Arabici ligni lacryma est, myrrhæ quodammodo similis, uirosi gustus, quam ad suffimenta usurpant. Vestes eo, additis styrace, & myrrha, suffiuntur. Vim proditur obtinere extenuandi obesos, si ternum obolorum pondere ex aqua, aut mulso aceto plusculos dies ebibatur: lienosis datur, comitialibus, & suspiriosis: menses cum aqua mulsa pellit: oculorum cicatrices cōfestim emendat: uino madefactum medetur eorundem hebetudinibus. aduersus gingiuas humore prægnantes, doloresque dentium, non aliud efficacius.

CANCA MVM, quod notis omnibus Dioscoridis historiæ referat (ut recentiorum ferè omnium medicæ materie studiosorum fert opinio) nec ex Arabia, nec aliunde ad nos aduehitur. Quidam tamen pro Cancamo gummi quoddam rufum, ac pellucens ostendunt, quod sirculos incognite arboris undiq; circumuestit, myrrhæ quadantenus simile. Veruntamen quod nulla (ut Dioscorides inquit) in comanso saporis uirositas deprehendatur, alij id potius mentiri, quam esse legitimum Cancamum uolunt. Expetit hoc gummi genus hoc tempore maxime insectoribus ad inficienda serica staminina, idq; uulgari sermone quidam in Italia appellant Lacca, quidam diminutè Lacchetta. Cuius duo habentur genera, quæ tantum (ut opinor) bonitate differunt. Præstantius uulgò appellant Lacca sumetri: quod uerò deterius est, Lacca comberti, cognomentis fortasse à locis Arabi, à quibus deferuntur, acceptis. Primum surculis perpetuo obuolutum usitur: alterum absq; sirculis in glebas concretum myrrhæ modo, quod etiam uiliori pretio uendunt. Hinc itaq; factum est, ut crediderint illi Serapionis auctoritate freti, hoc legitimum esse Cancamum: nempe quod is Cancamum Lacca appellet, & quod arboris sit gummi, uel lacryma myrrham quadantenus referens: quodq; etiam eius meminerit Serapio, postquam de Dioscoridis & Pauli Cancamo egit, his uerbis. LACCA (ut inquit Isac amran) res quedam est rubea, quæ tenuibus lignorum surculis inheret, sapore non ingrato. Coquitur hæc, & inficiuntur inde panni rubeo colore, quam insecturam chermes appellant. Quod uerò post insecturam subsidet, & insectoribus remanet, pariter Laccam uocant. Caterùm Lacca ex Armenia deferitur exiccans, & excalfaciens ordine secundo. Venter triculum, & iecur roborat, eorumq; infarctus expedit, ictericos iuuat, & aquas pellit. Eluitur ad medicamenta hac ratione. Ramuli, qui hoc scatent gummi, diligenter franguntur, ac subinde aqua perfunduntur, in qua odoratus iuncus aristolochiaq; inferbuerint, deinde pistillo agitantur, cum autem ab agitatione resederint, aqua leuiter abijcitur. quod si una tantum lotionem non pelluceat, secundo item repurgetur, demum siccetur in umbra, et recondatur in uase uitreo. Hæc Serapio. Quibus palam est gummi, quod insectoribus uulgò Lacca dicitur, Laccam esse Arabum, & à Græcorum Cancamo differre: quod Dioscoridi Cancamum lacryma sit Arabicæ arboris, uirosi gustus: Serapioni uerò res quedam rubea, ex Armenia, non ex Arabia allata, tenuibus lignorum surculis inherens, sapore non ingrato. Item Dioscoridi Cancamum obesos extenuat, lienosos iuuat, suspiriosis, & comitialibus prodest, menses pellit, oculorum cicatrices delet, & hebetudinem curat, tumentes gingiuas cohibet, & dentium dolores tollit. Serapioni autem tantum obstructions aperit, uiscera imbecilla roborat, iecoris dolores mulcet, & regum morbum, & hydropem sanat. quæ omnia medicamentorum diuersitatem pre se ferunt. Quo fit, ut non ab re existimauerint peritiores medici, nos omnino Dioscoridis Cancamo esse destitutos. Veruntamen non desunt rationes, nec probatissimorum autorum testimonia, quibus etiam probari possit, Græcorum Cancamum, & Arabum Laccam idē esse. Nam etsi hæc, quæ allata sunt, omni ex parte uera uideantur, si quis tamen Dioscoridis codicem hoc capite scaterere mendis animaduertit, & rem omnem accuratius, diligentiusq; perpenderit, certior fortasse fiet, nos Cancamo non omnino destitui. Ego enim cum Paulum, qui in omni simplicium censu omnia ex Dioscoride transcripsit, accuratius perlegerem, inuenissemq; illi Cancamum lacrymam esse Arabicæ arboris, myrrhæ simile, odore grato, et quod nullius uirosi gustus meminerit, illico orta est suspicio, quod ea particula Dioscoridi illegitimè accesserit. Auxit deinde suspicionem hanc Serapio: quippe qui capite de Lacca de Cancamo agens, dum (ut assolet) ex Dioscoride transcribit, nusquam huius particule mentionem fecerit. quod fortasse Dioscoridis codex, à quo transcripsit, hac menda facile uacauit. Sed illud adhuc magis rem ita se habere mihi persuasit, quod primum legatur in Dioscoride, Cancamum uirosi esse gustus, quod fixtoris, non suauolentis induciū est: mox cum styrace, & myrrha ad sufficiendas uestes expeti, ut grato commendentur odore, quæ ut inter se maxime repugnant, ita etiam deprauatæ lectionis præbent suspicionem. His itaq; rationibus, & auctoritatibus non ab re adductus esse uideo, ut quasi crediderim Dioscoridis codicem hoc in loco uiriatum fuisse. Vnde postea factū sit, ut eius Cancamum ab Arabico diuersum sese ostenderit. Neq; sanè huic opinioni illud obstare uidetur, quod plura in morbis curandis Cancamo assignauerit Dioscorides, quam Serapio. siquidem nulli dubium est, quin ea medicamenta, quæ obesos extenuant lienosos iuuant, & menses cient, possint pariter uentericulum et iecur roborare, eorumq; infarctus

Cancamum con  
siderant.

Laccae Arabi  
opinio uaria.



Laccæ faci-  
tæ genera.

Fuchsii opi-  
nic i probata.

Pharmacopo-  
larum error.

Monachorū  
lapsus.

factus expedire, & cutem subeuntes aquas, & felle suffusos sanare. Hæc autem silentio inuoluenda non duximus, non ut nostra hæc probetur, uel improbetur opinio, sed ut alijs ueritatis inuestigande pateat aditus. Sunt etiam scitæ Laccæ plura genera: quæ ex diuersarum infectionum sedimento pictoribus tantum parantur. Alia namque conficitur ex pimpinellæ bacca, quam uulgò uocant cremese, & cremesino: ex infectorio cocco alia: alia ex natua Serapionis laccæ: alia deniq; ex ligno, quod brasiliū uocant, omnium deterrima, quarum nulla ad medicamenta admittitur. Non tamen desunt, qui credant, chermesinum infectoriis uocatum esse arboris gummi: imò illud idem, quod Serapio, autore Isac, rem rubeam (ut paulò ante diximus) esse ait, quæ tenuibus lignorum surculis inhereat, & quod ea inficiantur panni rubeo colore, quem chermes appellant. quandoquidem huius sententiæ reperio fuisse Fuchsum. Sed meo iudicio non exactè rem explorasse uidetur. quippe chermesinum, quo puniceo, et purpureo colore sericis tæmina inficiuntur, est (ut Itali optimè norunt) pilula, uel bacca exigua pimpinellæ radicibus in orientalibus regionibus adnascens, non autem gummi, uel roscidum, uel aliud per se manans, ab eo perquam longè diuersum. Siquidem hoc nil aliud est, quam natua Serapionis laccæ, quam propriè Itali uocant uulgò laccæ & lacchetta, infectoriis tantum expetita ijs inficiendis sericis, quæ uiliori ueneunt pretio. Nec obstat, quòd dixerit Serapio, què hic secutus est Fuchsus, huiusce laccæ infecturâ uocari chermes: quippe proprio capite de chermes, nil sanè aliud per chermes intelligit, quam coccum infectorium Dioscoridis. quo fit, ut existimauerim in eo capite de laccæ omnino subesse mendam, uel auctoris, uel interpretis: & fortè melior hæc esset lectio. Coquitur hæc, & inficiuntur inde panni rubeo colore, adeò ut cocci nei uideantur: uel adeò ut ijs similes sint, quorum infecturis inigitur chermes. Aberrant præterea pharmacopolarum quam plurimi Dialaccæ antidotum componentes, quòd legitimæ Armeniacæ laccæ loco, quam Arabes prodidere, scitatis, & pictoribus tantum dicatas immisceant. Sed cauant, quæso, ne hunc errorem corrigentes in alterum non minus detestandum incidant: id namq; ijs facillè cõtinget, si Monachis, qui in Mesuem scripserunt, morem gerent. Hi enim iam rei medicæ professores asserere non dubitarunt, immiscendam esse loco cæcam, seu laccæ in magnam dialaccæ antidotum eam Africæ arboris lacrymam; quam seplasiæ sanguinem draconis appellant, quæq; Dioscoridis cinnabaris ab omnibus esse censetur. Sed certè ij magis hallucinantur, quam ut resilli debeant, quòd ea lacryma in compluribus facultatibus canamo aduersetur. Quippe Arabicum Cancanum, quod potissimè antidotus illa exposcit, tanquam à Mauritanis inuentum, præterquam quòd uentriculum, & iecur roborat; adeò eorū infarctus, & obstruones expedit, ut ictericos quidem, & aqua intercute laborantes uiuet. Contrà uerò draconis lacryma propria uel efficaciter adstringit ita ut scriptum reliquerit Dioscorides, eam lacrymam iisdem pollere uiribus, quibus hæmatitis lapis: cuius tamen uis est, ut mensium profluuia sistat, non autem ut eliciat, Cancani modo, præsertim ubi uasorum infarctus remouentur. ob idq; maximè expetitur ad sanguinis emanationes, ad uulnera cohibenda, & ossium fracturas ferruminandas. Sed monachos missos facianus: & seplasiarios admonemus, ut si nostro consilio uti uelint, nò aliud pro laccæ in eam antidotum imponent, quam laccam ipsam Serapionis, quæ natua ex Armenia ad sericorum uellorum infectum copiosissima ad nos defertur. siquidem de hac intellexerunt Mauritanii: quos secutus Nicolaus Myrepsicus in sua Dialaccæ confectiōe laccam infectorum immiscuit.

ΚΥΦΙ. CYPHI. C A P. XXIIII.

CYPHI odorati suffimenti compositio est, dicata dijs: quæ abunde Aegyptij sacerdotes utuntur. In antidota misceri solet: suspiriosis datur in potu. Permultæ componendi rationes, quarum una hæc est. Sumito cyperi dimidium sextarium, cum pari baccarum iuniperi adultæ modo: uuae passæ pinguis, exemptis uinaccis, minas duodecim: resinæ purgatæ minas quinque: calami, & iunci odoratorum, & aspalathi, singulorum minam: myrrhæ duodecim: uini ueteris sextarios nouè, cum duabus mellis minis. Vuam passam, detractis uinaceis, tufam cum uino, & myrrha subigito: cætera tufa, & cribrata adijcito: die uno humorem combibere finito. dein mel coquito, dum sibi glutinis asciscat crassitudinem: eliquatam resinam accuratè permisceto cū reliquis diligenter contritis, & in fictile uas recondito.

Cyphi caput  
adiciuntium.

Non omnes sanè Dioscoridis codices, præsertimq; uetustiores hoc Cyphi caput recipiunt. Quo fit, ut crediderim cum plerisq; rei medicæ peritis, id illegitimè hic acceßisse. siquidem non rationi consentaneum esse uidetur, Dioscoridem hic de simplicium materia scribentem, composita medicamenta tam inconsultè, ac præter rem simplicibus inseruisse: præsertim cum id nulli superiorum commodè adnecti possit, quemadmodum est de multis alijs cõpositionibus.

ΚΡΟΚΟΣ. CROCVM. C A P. XXV.

CROCVM optimum in medendi vsu Coryceum, recens, & boni coloris, paulum candidi gerens in capreolo, oblongum, omnibus suis partibus constans, non fragile, plenum, à quo detractum est nihil, quòd madefactum manus inficit, nec situm redolet, aut cariem sentit, subaere: sin huius generis non est, aut uetus, aut humore perfusum creditur. Secundus locus datur Coryceo, è tractu Lyciæ contermino. Tertius Lycio, è monte Olympo. Dein ex Aegibus Aetoliæ. Cyrenaicum et Centuripinum inter Sicilicæ omnia uiribus infirmius est. Omnium natura oleracea. Itali tamen ob succi copiam, & coloris uenustatem, tingendis mortarijs dicauerunt; quibus de causis magno uenditur. Vtilissimum in medicina quòd antè descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate ruso, atque etiam sapæ sublitu: contrita, quòd pondus adijciatur, simul argenti spuma, aut plumbagine. Sed maleficio declarat insidens puluis, præsertim si defrutum in odorando subolet.

Thessalus



Theſſalus ipſum tantum odoratum eſſe uoluit. Alij ex-  
tioſum, tribus drachmis ex aqua potis. Procul dubio  
vim coquendi, emolliendi, atque ſubſtringendi habet:  
vrinam cit: elegantem colorem præſtat: qui ex paſſo  
biberint, crapulam non ſentient: oculorum fluxiones  
illitum cum humano lacte cohibet: additur in potio-  
nes, quæ interaneorum cauſa temperantur: ad vuluæ  
etiam, ſedisque cataplaſmata, utiliter inditur: uenerè  
ſtimulat: uergentes ad ignem ſacrum inflammationes  
mulcet: auricularijs collectionibus utile. Quod faci-  
lius conteratur, in calido fictili ſole ficcari oportet, ce-  
leriterque uerſari. Vrinam mouet radix ex paſſo pota.

Κρόκος μαγνα. CROCOCOMAGMA.

CAP. XXVI. *Ἰνδία*

CROCOCOMAGMA fit expreſſis unguenti croci-  
ni odoramentis, & in formas digeſtis. Optimum eſt  
odoratum, modicè myrrham olens, graue, nigrum, li-  
gni expers, læue, ſubamarum, quod madefactum croci  
colorem reddit, guſtatumque vehementer dentes ac  
linguam inficit, multis durans annis: quale eſt quod à  
Syria deſertur. Habet ſuas uires ad delenda, quæ cali-  
ginem oculis obuerrant: vrinam cit, calfacit, conco-  
quit, & emollit. Vires croci proportionem quadatenus  
repræſentat: quandoquidem plurimam croci partem  
ſibi Crococomagna uendicat.

CROCVM quidem ubiq; terrarum cognoscitur. In Ita-  
lia, & præſertim in Hetruria, Mauritanorum modo uulgo uoca-  
tur Zaffarano: quanquam non deſunt rura in agro noſtro Se-

Croci confi-  
deratio.

30 nens, quæ corrupto à Croco uocabulo ipſum appellant Gruogo. Cæterum Crocum Coryceum, & Lycium in Olym-  
po monte decerptum (quod ſciam) ad nos non aduehitur. Quapropter quod ab Aquila Veſtinorum urbe aſſertur,  
primum ſibi locum uendicat in Italia. Conſtat optimum eſſe, & Aquilano longè præſtātius, quod in Germania oritur,  
è Vienna Auftriæ metropoli deuectum. Sed huiusmodi ſanè perexiguum eſt, idq; difficulter tranſit ad Italos, ob eius  
frequentiſſimum in cibis uſum apud Pannonios, & Germanos. Floret Crocum (ut Theophrastus autor eſt) uergilia-  
rum occaſu, paucisq; diebus: conſeſtim uerò cum folio florem quoq; expellit. Gaudet calcari, & melius ita euadit.  
Crocus meminit Galenus lib. VII. ſimplicium med. ſic inquit. Crocus paululum etiam adſtringens quid obtinet, quod  
terreum, frigidumq; oſtendimus. Sed ſuperat in eo calfaciens & qualitas, & facultas, ut tota eius eſſentia ſecundi ſit  
ordinis excalfacientium, & primi exiccantium: proinde concoquendi quoq; uim quandam habet, adiuuante ſcilicet in  
hoc & pauca adſtrictione. Quippe quibus medicamentis, cum non admodum excalfaciant, paucula adeſt adſtrictio,  
40 ea parem facultatem habent eſſentijs emplaſticis uocatis, quas cum iunctas eſſe caliditati non uehementi contigerit, cō-  
coquentes eſſe oſtendimus. Et lib. I. de comp. med. ſecundum locos: Crocum, ait, ſuo odore caput ferit, & mentem  
tentat, peucedani, & fructuum lentis ſci modo.

Croci uires  
ex Galeno.

ΕΛΕΝΙΟΝ. HELENIVM. *Ἰνδία* CAP. XXVII.

HELENIVM folia habet uerbaſci anguſtioris folij, aſperiora, oblonga: caulem quibuſdam  
in locis non emittit: radicem ſubalbidam, interdum ſubrufam, odoratam, ſubacrem, uegetam, ma-  
gnam: ex qua agnatæ propagines liliorum, aut ari modo ſeruntur. Montanis, umbroſis, & ficcis  
locis prouenit. Foditur æſtate radix, particulatimque diſſecta ficcatur. Potum radice decoctum  
40 menſes, & urinas ciēt. Ipſaque in ecglemate ex melle prædeſt tuiſi, orthopnœæ, ruptis, conuulſis,  
inflationibus, & ſerpentium morſibus. In ſumma excalfaciens eſt. Folia eius ex uino cocta utili-  
ter iſchiadicis illinuntur. Helenij radix & ſtomacho utilis eſt in paſſo condita: ſiquidem ſalgā-  
marij paululum ſiccata eam, mox decoctam, & frigida aqua madefactam, in ſapam conijciunt, &  
ad uſus recondunt. Trita, potaque ad cruentas excreationes efficax eſt. Alterum Helenij genus  
in Aegypto gigni Crateuas tradit. Herba eſt cubitalibus ramulis, ſerpylli modo per humum re-  
pentibus: folijs lenticulæ circa ramos, ſed longioribus crebrisque: radice pallida, digiti minoris  
cræſſitudine, per ima tenui, ſupernè craſſiore, cortice nigro. Naſcitur in maritimis, collibusque.  
Radix una in uino epota, contra ſerpentium ictus auxiliatur.

Helenii confid-  
deratio.



Helenii Aegyptii confid.

Helenii vires ex Galeno.

Fabulosum.

**HELENIVM**, quod Latinis etiam Inula dicitur, plurimum vulgaris notitiae. Quod autem in Italia provenit, folio est longe maiore, quam tradiderit Dioscorides. Quippe non solum verbasco angustifolio Inulae Italicae maiora insunt folia; verum etiam ea magnitudine longe superant, quae latifolio exoriuntur. Quod tamen si pro locorum varietate evenire facile possit; crediderim tamen hoc in loco Dioscoridis codicem pluribus scaterere mendis. Siquidem testatur Marcellus Florentinus vir quidem apprime doctus, se habuisse Dioscoridis vetustissimum, ac probatissimum codicem, in quo longe plura legebantur, quam in ceteris fere cunctis Graecis exemplaribus. Sed praesertim in hoc capite haec de caule, floribus, et semine habebantur. Caulis ex se mittit Helenium crassum, hirsutum, cubitalem, et aliquando maiorem, angulosumque; flores luteos; et in his semen verbasco simile, tactu pruritum faciens. Quare mirum non est, si etiam alia hic desiderari possint, cum non facile adducatur, ut credam, Dioscoridem Helenii radice, cuius tantum est in medicamentis usus, tum amaritudine, tum formam subiecisse. Meminit Inulae Plinius lib. xix. cap. v. ubi sic habet. Sifer his satus mensibus, februario, martio, aprilis, augusto, septembri, octobri, brevior his est, sed torosior anteriorque; Inula, per se stomacho inimicissima. Eadem, dulcibus mixtis saluberrima. Illustrata maxime Iulia Augusta quotidiano cibo. Superuacuum eius semen, quoniam oculis ex radice excisis, ut arundo feritur. Item lib. xx. cap. v. Inula quoque, inquit, a ieiunis commendata dentes confirmat, si ut eruta est, terram non attingat. Condita tussim emendat. Radicis vero decocta succus tinea pellit. Siccata autem in umbra farina, tussa, et convulsis, et inflationibus, et arterijs medetur. Venenatorum morsus abigit. Folia ex vino lumborum dolori illinuntur. Haec Plinius.

Ceterum Aegyptium helenium, quod Crataeus auctoritate memoriae prodidit Dioscorides, ad nos (quod scierim) non deferitur, nec in Italia provenit. Hoc a nostrate non distinxit Avicenna, sed utrumque simul confudit. Meminit huius etiam Plinius libro xx. cap. x. his verbis. Helenium est lacrymis Helenae dicitur natum: et ideo in Helena insula laudatissimum. Est autem frutex humi se spargens, dodrantalibus ramulis, folio simili serpyllo. Item lib. eodem cap. xx. Helenium, inquit, ab Helenae lacrymis (ut diximus) natum, fauere creditur formae: cuem mulierum in facie, reliquoque corpore nutrire incorruptam. Praeterea putant usu eius quandam gratiam ipsi, veneremque conciliari. Attribuunt et hilaritatis effectum eidem potae in vino, eamque quae habuerit nepenthes illud praedicatum ab Homero, quod tristitia omnis aboleatur. Est autem succi praedulcis. Prodest et orthopnoicis radix eius in aqua ieiunis pota. Est autem candida intus, et dulcis. Bibitur et contra serpentium ictus ex vino. Mures quoque contrita dicitur necare. Haec Plinius. Quibus satis constat, non modo in Aegypto hoc Helenii genus provenire, sed etiam in Helena Aegei insula praestantissimum haberi. Helenii vires scripsit Galenus libro 40 v. 1. simp. medic. sic inquit. Helenii herbae radix maxime utilis est, non primo statim occurso excaesciens: ac proinde non dicenda est calida, et sicca exaeste, seu piper tum atrum, tum candidum, sed cum recrementis humorum. Quapropter ecligmatis, quae faciunt ad educendos ex thorace, et pulmone crassos, lentosque humores idonee commiscetur. Rubrificat quoque ea partes frigidas, ac diuturnis vexatas affectibus, cuiusmodi sunt nonnullae coxarum passiones, aschiadas vocant, et exiguae assidueque articulorum quorundam praehumiditate procidentiae, ac luxationes. Haec ille. Ceterum sunt, qui dicunt (ut etiam testatur Galenus libro de theriaca ad Pisonem, si tamen liber ille Galeni legitimus est) quod si Helenii succo tela venatoria inficiantur, venenata efficiuntur, idque in Dalmatia fieri narrant, ut ferus omnino perdant. Quod tamen potius fabulosum, quam historicum crediderim.

ΟΜΦΑΚΙΝΟΝ, καὶ πᾶν ἔλαιον.

**OMPHACINVM**, ET OMNE OLEVVM CAP. XXVIII.

**OLEVVM**, quod ex immaturis oliuis exprimitur, ad multos usus recte valentibus accommodatissimum est. omphacinum id appellatur. Praestat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale unguentorum compositionibus idoneum intelligitur, Stomacho utile est, quod astringat: gingivas contrahit, dentes firmat, si contineatur in ore: sudores cohibet: quod autem vetustius, ac pinguius, eo ad medicamenta aptius est. Et (ut reliqua in commune dicatur) omne oleum calfacit, emollit ventrem, a perfrictionibus corpus tuetur, ipsumque promptius ad obeunda munera reddit. aluum emollit, ulcerantium medicamentorum vires permixtum hebetat: contra uenena datur, assidue potum, redditumque uomitionibus: soluit aluum heminae mensura cum pari pistanae succo, aut aqua potum: ad tormina calidum simul decocta ruta tribus sextariis in potu datur: ventris animalia pellit: idem maxime ilei intestini morbo laborantibus infunditur. Vetus magis cal-

facit,

facit, & nelementius discutit: oculorum claritati sublitum confert. Si uetusti non sit occasio, in uase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut uetustatem repræsentet.

Ἐλαὸν τῆς ἀγριελαιῆς. OLEVM SYLVESTRIS OLIVAE. CAP. XXIX.

OLEVM, quod sylvestres oliuæ fundunt, uehementer astringit, & ad sanorum usus secundum sibi locum uendicat. In doloribus capitis utiliter pro rosaceo substituitur: sudores arcet, defluentes capillos inhibet: furfures, ulcera capitis manantia, scabiem, leprasque abstergit: tardius canitiæ sentiunt, qui eo quotidie perunguntur. Candidum oleum fit hoc modo. Album colore, nec anniculo uetustius, in nouum fictile oris patuli funditur, centum heminarum mensura, & sub solem media quaque die concha refunditur, ex altoque demittitur, ut assidua deuolutione, ictuque agitatum respumet: octaua die scenum græcum mundum quinquaginta denariorum pondere, calida aqua madefactum, donec emollescat, in supradictum oleum deijcitur, ita ne extillet aqua: postea tede præpinguis piceæ, assulatim cæsæ æquale pondus adijcitur, & transactis octo diebus, oleum concha mouetur. Vbi candorem contraxerit, in uas nouum uetere uino affusum recondi debet, substratis fertulæ Campanæ corollis drachmas undecim pendentibus, cum pari iridis pondere. sin minus, rursus soli mandandum, & idem munus obeundum, usque dum inalbescat.

Σικωνίον ἔλαον. SICYONIVM OLEVM. CAP. XXX.

SICYONIUM componendi ratio hæc est. In lebetem oris lati, stanno inductum, funditur noui olei albi, quod crudæ oliuæ reddiderunt, congius unus: aquæ semicongius. Leni id igne coquitur, leniter mouendo: at ubi bis efferbuit, & subtracto igne refrixit, innatans oleum concha decapulatur, & adiecta noua aqua conferuescit, & reliquis, ut diximus, peractis reponitur. In Sicyonia maximè fieri consuevit, Sicyonij inde accepto cognomine. Calfactoriam ad quendam usque modum uim habet. Febri, ac neruorum uitij prodest. sceminæ ad commendandum faciei nitorem eo utuntur.

Πῦρος. STRIGMENTVM. CAP. XXXI.

STRIGMENTA à balneis calfaciunt, molliunt, discutunt: ad sedis rimas, & condylomata illinuntur. Illa uerò, quæ ex palæstris puluerem sibi asciuerunt, in sordis speciem redacta, articulorum nodos imposita adiuuant: ischiadicis in forus, aut malagmatis locum, calida commodè sufficiuntur. Derasæ gymnasiolorum parietibus, simulacrisque sordes, calfaciunt: tubercula, quæ ægè ad coctionem producuntur, dissipant: desquamatis, & ulceribus antiquis profunt.

MULTO quidem artificio ueteres utebantur ad componendum multifariam oleum, ut ex Dioscoride satis superque constat. Quod tamen hac tempestate à nobis fieri non solet: quanuis fortasse apud Græcos eiusmodi parandi olei consuetudo minimè exoleuerit. Quippe id tantum in communi omnium usu apud nos habetur, quod è maturis oliuis exprimitur: tametsi quidam, quod & gustatu iucundius, & sanitati conducibilius sibi oleum comparare uelint, id ab immaturis oliuis exprimant, quas eo tempore legunt, cum ipsæ iam plenè flauæ tantillum subrubescere cœperint.

Ceterum non mirum est, si ueteres & illud candidum reddere, & multis parare modis curabant: siquidem non modò in ciborum condimentis oleo frequenter utebantur; sed ut agiliores, promptiores, ac expeditiores euaderent ad obe-

40 da corporis munera, frequentius sibi totum corpus oleo perungebant. Qua de causa & balneas frequentabant, & thermas. namque olei contracta sordes, ut corpora sæpius perluerentur, maximè expetebat. Obibant autem id muneris serui in balneis, qui non modò corpus totum intrantibus abluabant; sed & ipsum quibusdam strigilibus abradebāt ad hoc opus aptissimis, quas alij ex auro, nonnulli ex argento, quidam ex ferro, aliqui ex ebano, ac etiam ex præclaris lapidibus sibi comparabant, denique pro nobilitate, & facultate eorum, qui ad balneas confluabant. Quapropter dum se in ipsis balneis abraderent, sudoremque emanantem detergere curabant, olei strigmenta, quo se prius perunxerant, in balnei aquam decidebant: quorum hic meminit Dioscorides. Fuit præterea in magno, ac præcipuo usu apud ueteres oleum ad perungendos athletas, qui in theatri palæstræ nudi luctabantur, nō solum ut eorum corpora agilia, expeditioraque in certamine redderentur, sed ut etiam ij difficiliter sese manibus comprehenderent. Cum autem ibi puluis ob pedum frequentiore motum concitaretur, athletæ ipsi oleo affatim peruncti, illum in se faciliè contrahabant; ac multa

50 to magis cum in terram alter alterum consterneret. Quare balneum ingressi, strigilibusque abradi coenosa strigmenta relinquebant, quibus artuum affectibus Dioscorides mederi tradidit. Sed cum plurimi athletæ oleo copiose peruncti inter luctandum palæstræ parietibus, ac statuis lapideis sese sæpius affricarent, contracta loca olei pinguedinem contrahabant. quo faciliè fiebat, ut adueniente puluere coenosis quoddam unguen parietibus inheresceret: de quo etiam Dioscorides disseruit. Olei facultates susius prosecutus est Galenus lib. vi. de simplicium medicamentorum facult. sic inquit. Oleum, quod ex oliuis conficitur, quod sanè propriissimo nomine oleum appellamus, cuiusmodi sit temperaturæ, superioribus libris definitum est. quippe humectatorium esse, & moderatè calidum ostendimus. Eiusmodi est, quod est dulcissimum, sitque potissimum ex oliuis, quas Græci δρυπτερῆς uocant, nos drupas. Ceterum quod omotribes, & omphacinum nuncupant, id quantum in se habet adstrictionis, tantum etiam illi inest frigiditatis. Porro oleum uetus, quod quidem ex dulci inueterato efficitur, & calidius est, & magis discussorium. Quod uerò ex immaturo, id deum reliquum quippiam serauerit adstrictionis, mistæ permanet facultatis: ubi uerò illa prorsum abiecerit, reliquo

Olei consideratio.

Olei usus apud ueteres.

Olei facultates ex Gal.

e fit simile.



Oleum sylue  
stre.

fit simile. Quinetiam quicumque in præparando germina iniiciunt, ij & ipsi omphacino simile oleum efficiunt. Ceterum rogamus non est, quo pacto sit præparatum, sed gustandum est potius: ac si præferat adstrictionis quippiam, ceterum etiam frigidum esse existimandum, cum illud, quod ab Iberia portatur, quod Spanum, id est Hispanicum nominat. Quod si nequaquam gustantibus adstringere appareat, sed adamsim uideatur dulce, id modice esse calidum putandum. Porro si tenue quoque cernatur (tale est, quod purum est, quodque intuenti translucidum uidetur) ac modicum eius latissime per cutem extensum sibi maneat continuum, celeriterque à cute combibatur, id utique pro optimo ducendum, ac olei uirtute quam maxime pollere, quale est Sabinum. Porro quod oleum lotum maxime expers sit mordacitatis, supra positum est. Ceterum quo potissimum modo id probissime laues, in sequenti tradam opere, quod inscribetur de medicamentorum compositione, ubi & de Sicyonio, & si quod eius generis præterea oleum est, agatur. nunc simplicia prosequor, adiciamque & de alijs olei speciebus sermonem. Iam quod ex agresti oliua oleum exprimitur, non simplicem temperaturam obtinet; sed extergit, simulque adstringit. Squalidissimum id est ex omni olei genere, & post istricum quoque: deinceps illis est Hispanum. Pinguisimum est Libycum, & Cilicium: simul autem pingue, & tenue Sabinum. In medio comprehensorum omnium sunt tum id, quod per Cyclades insulas nascitur, tum quod per Græciam, Asiamque. Porro oleum pingue estimatur, iudicaturque uiscositate: tenue uero si perlucet, si purum sit, si plurimum à minima eius portione inungatur, si facile à cute combibatur. Ex dictis cognoscere iam liceat & de alijs olei generibus, quæ æquiuoce ipsis dicuntur unguentis, puta rosaceo, melino, liliaceo, & quæcunque id genus floribus, fructibus, germinebus, folijs in oleo maceratis conficiuntur. Horum quodque ubi unà cum aromatibus præparantur, unguentum efficitur. Pro cuiusque iniectionum natura oleum uariari contingit. Ex ijs ergo, quæ in toto hoc opere de quoque iniectendorum generatim discas, sigillatim quoque confectum ex ijsdem oleum cognoscere dabitur.

Ελαίου μελι.

ELAEOMELI.

CAP. XXXII.

IN PALMYRIS Syriæ, quod elæomeli uocant, ex quodam caudice manat, oleum melle crassius, sapore dulci. Bilem, cruditatesque detrahit, sextario cum una aquæ hemina dato. Sed qui sumpsere, torpescunt, & uiribus deficiuntur. quod minimè uereri oportet: uerum crebro excitare, ne ueterno pressi somnos captent. Fit & oleum è pinguitudine surculorum. Optimum uetus, crassum, pingue, non turbidum. Calfacit: priuatim caliginibus oculorum illinitur: lepras, neruorumque dolores illitum emendat.

Hermolai lapsus.

QUANQUAM quotidie plura, uariaque mercurionum genera nobis ex Syria conuehantur; Elæomeli tamen (quod sciuerim) non modò non conuehitur, sed neminem unquam audiui, qui ipsum uiderit, uel nouerit. Ceterum Hermolai uir quidem præstantissimus dubitat, utrum elæomeli sit manna, elæomelitis, & æromelitis, quod mel aëris significat, uicinitate deceptus. Quapropter non possum non admirari, doctissimum uirum hac in re dubitasse, cum tum Dioscorides, tum etiam Plinius, quibus cum longam contraxerat consuetudinem, communi sententia scribant, elæomeli oleum esse è quodam arboris caudice manans in Syriæ Palmyris, non mel aëreum, neque rorem ab æthere cadens. Eoque magis, cum addiderit Dioscorides, non modò elæomeli per se ex arbore manare, sed & factitium haberi tuis, expressisque arboris surculis.

Κικινον έλαιον.

CICINVM OLEVM.

CAP. XXXIII.

CICINVM oleum hoc modo temperatur. Maturi ricini qua uoles quantitate torrido sole flaccescunt, & aliorum more cratibus intrati tantisper insolantur, dum uestiens cortex fractus decidat. Caro colligitur, & coniecta in pilam diligenter tunditur: postea in lebetem stanno illitum, qui aquam habeat, demittitur, subiectoque igni feruescunt: & ubi insitum prorsus humorem reddiderunt, sublato ab igni uase, innatans oleum concha tollitur, & reconditur. Sed in Aegypto, ubi largior increbuit usus, longè secus fieri solet. Nam repurgatos ricinos molæ mandat, & accuratè mollitos per sportulam torculo exprimunt. Tum quidem ematuruerunt ricini, cum continentibus orbiculis exuuntur. Cicinum oleum ad pforas, & ulcera capitis manantia ualet: prodest sedis inflammationibus, uuluis conuersis, atque præclusis: item indecoris cicatricibus, & aurium doloribus: emplastra efficaciora reddit additum: potu aquam aluo extrahit: uentris animalia pellit.

Ricini olei consideratio.

Ricinus unde dictus.

RICINVM, siue Cicinum oleum, Cheruz oleum seplasijs dicitur; quauis rarioris sit usus. Namque semine plantæ, quam Dioscorides ricinum appellat, Arabum esse cheruam nemo est, qui ignoret: quod etiam Serapio pentadactylum uocat, ut diffusius suo loco libro quarto explicabitur. Ceterum ricinus animalculum est fœdum, liuidum, & sanguine plenum, quod Italis Zecca uocatur, suisque canibus, capellis, & id genus animalibus infestissimum. Cui cum hoc semine forma, & colore sit quam simillimum; idcirco Ricini nomen sibi comparauit. Meminit huius olei etiam Mesues, qui præter uires ei à Dioscoride redditas, addidit, id ualide crassas coercere inflationes. Proinde uentriculi, laterum, colique doloribus prodesse illitum, potum, & insusum.

Αμυγδαλινον έλαιον.

AMYGDALINVM OLEVM.

CAP. XXXIIII.

AMYGDALINVM oleum, quod aliqui metopium uocant, hoc fit modo. Semodius ex amaribus nucibus repurgatis, siccatisque, in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas, aquæ, quæ ferbuerit, sextarius adijcitur, & ubi dimidia hora humorem hauserit, uehementius quam antea tunditur:

ditur: mox tabellis premitur, & quod digitis hæsit, concha excipitur. Pressis nucibus rursus hemina aquæ inspergitur, & postquam ebiberint, idem opus prosequendum. singulas heminas reddunt singuli modij. Contra uuluarum dolores, strangulatus, conuersiones, & eorundem locorū inflammationes efficax est: uitijis renum, calculosis, difficili urinæ, suspiriosis, lienosisque proficit: dolores capitis, grauitatem auditus, sonos incertos, tinnitusque discutit: maculas, & uitia cutis tollit è facie: & eam erugat cum melle, radice lilij, & Cypria cera, aut rosaceo cerato: & oculorum hebetudines emendat: ulcera capitis manantia, & furfures cum uino abstergit.

40 CUM amrum omnino dulci sit temperandum, delinquere sanè existimarem, si oleum ex dulcibus amygdalis expressum (etsi illud Dioscorides silentio inuoluerit) ex amaris confecto non adicerem, rectumque conficiendi modum non explicarem: præsertim cum nostræ ætatis medicis maximo sit usui, & pauci sint myropole, qui ipsum rectè probèque conficiant. Parandi igitur rationem (ut Mesues tradidit) sic habeto. Præstantiores, dulcioresque amygdalæ, quæ lubet quantitate, ab utrisque corticibus repurgatæ, optime in lapideo mortario tunduntur, et in loco calido reponuntur, quinque horarum spatio. dein parum iterum contunduntur: mox prælo tandiu premuntur, quousque omne, quod continent, effluit oleum. Elicitur etiam hoc modo. Collocantur delibratæ, contusæque amygdalæ in uitreo, uel stanneo uase, infunditurque uas in balneo calentis aquæ. eximitur deinde tribus peractis horis, extrahunturque amygdalæ, & statim prælo calentes subiiciuntur: itaque oleum copiosius excipitur. Tritæ rursus amygdalæ, & repurgatæ in sacculis panno duplicato inuolutis sub arena, cinerèue calido reconduntur, & postquam effruberint, prælo oleum elicitur.

Amygdalini  
parandi ratio.

Sed nostrates seplasiarj plurimum negligentie, segnitieque indulgentes non modò amygdalas non repurgant, neque delibrant: sed & amaras, & rancidas commiscent, & omnes simul conterentes, in aerem cacabum iniiciunt, ignique admovent affuso aquæ tantillo, ne penitus torrearantur: deinde sacculum coniiciunt, & prælo summittunt, & quod inde fluit oleum excipiunt. quod plerumque exustionis nidorem tantum obolet, ut haurientibus illico euomendi pariat nauisem. Qui autem sic parant oleum amygdalinum, eius lenientem facultatem peruertunt, ac destruunt: siquidem contusis amygdalis non delibratis, oleum inde confectum corticum uires asseruat. Proinde & constipat, & exasperat, et febricitum inducit. id quod etiam adauget ignis uiolentia, dum in lebetibus amygdalæ torrentur. Hòc itaque diligenter animaduertens optimus Mesues Amygdalini faciendi rationem prodidit, ut uidelicet, cum purgatæ, contusæque essent amygdalæ, calore quodam suauis, ac lento leniter calefierent, sicut diximus, non autem carbonibus ardentibus, quemadmodum hodie ij faciunt myropole, qui etiam alia pleraque confundunt. Amygdalinum igitur, si rectè, probèque conficiatur, mirifice lenit. quare potum ad libræ dimidium aluum leniter deiecit: asperæ arteriæ, pulmonis, ac pectoris scabritias tollit: duritias omnes emollit: & compaginum, & membrorum omnium siccitates humectat. quocirca he-  
30 sticis plurimum conducit. Contra uuluarum dolores illitum & potum facile præstat: sicuti uesticæ cruciatibus est efficax, si argentea fistula coniectum impulsorio instrumento iniiciatur. Quod autem ex amaris amygdalis exprimitur, dulci in omnibus efficacius habetur. Idcirco in prouocandis lapillis, cõciliandisque uiscerum cruciatibus statu crassiore genitis, dulci longè præstantius reperitur. Nimirum & obstructions aperit, & interaneorum timeas enecat.

Myropolarū  
ignauia, & la-  
pius.

Amygdalini  
uires.

Βαλανίνον ἔλαιον.

BALANINVM OLEVM.

CAP. XXXV.

SIMILI modo fit Balaninum oleum. Quod repurgat maculas, lentigines, uaros, & cicatrices nigras: aluum soluit, stomacho aduersatur: contra aurium dolorem, sonos, & tinnitus auxilio est, cum anserino adipe instillatum. Similis sesaminum ex sesamo conficiendi ratio. Fit etiam è nuce iuglande oleum, quod caryinium uocant. Eandem uim habet, quam balaninum.

40 OLEVM unguentariæ glandis, quod Balaninum uocant, à pharmacopolis, & unguentarijs oleum de Ben appellatur: quoniam myrobalanum, quod Latini unguentariam nucem dicunt, ex qua hoc conficitur oleum, Mauritanii Ben appellant, ut latius libro quarto differemus. Consimili modo id Mesues fieri tradit. Et (ut idem etiam est autor) abstergit, mundat, & obstructions aperit. Illitum strumas dissoluit, duosque tumores. Frigidis tum iocineris, tum licenis affectibus opem mirifice præstat: facit & ad frigidas neruorum conuulsiones, & compaginum cruciatus. Sed illud sibi peculiariter asciuit, quod etiam si diu ueterascit, haud quaquam rancidum euadit. Ideoque unguentarijs expectitur ad suauissima odoramenta excipienda: præsertim cum moscho, & ambaro chirothecas illinunt. quo fit, ut nullo temporis tractu rancorem unquam respiciant, ut facile eueniret, si alio quouis oleo eo in opere uterentur. Quamobrè mirari non licet, si ueteres fructum, à quo elicitur hoc oleum, glandem unguentariam nominauerint. Sesaminum uero (ut Mesues inquit) amygdalini modo exprimitur. Quippe sesami repurgatum semen primò contunditur, deinde  
50 eodem artificio calefactum prælo supponitur, tandiuque premitur, quousque oleum reddat. Id (ut idem testatur) pingue ministrat alimentum: semen adauget, asperitates quasunque lenit, sed præcipue gulæ: uocem expedit, & dura apostemata mollit. Adijcitur Sesaminum plerisque unguentorum compositionibus, quorum in officinis est usus. Verum quod è iuglandibus nucibus elicitur, nullius in medicina usus esse reperio, etsi lucernis, & lampadibus, qui parsimonie student, id maximo opere expectant. quippe ignis funiculo non tam citò consumitur, quam id, quod ex oliuis paratur. Præfertur etiam pictoribus eo, quod è lini semine exprimitur. siquidem hoc cerussæ admixtum tractu temporis colorem immutat, illud uero incorruptum perpetuò asseruat.

Balanini con-  
sideratio.

Balanini facul-  
tates.

Sesaminum, et  
cuius uires.

Oleum è nuci-  
bus iuglandi-  
bus.

Υόσκαμινον ἔλαιον.

HYOSCYAMINVM OLEVM.

CAP. XXXVI.

HYOSCYAMINVM sic fit. Semen candidum, recens, ac siccum tunditur, & calida aspergitur aqua, ut in amygdalino diximus: dumque insolatur, siccatur, quæ sub manu sunt, partes cum reli-

qua massa permisceantur: hoc autem fieri oportet, dum nigrescat, & grauiter oleat: mox pressum, atque excolatum reconditur. Ad aurium dolores efficax est: pectus miscetur, ad emolliendum utile. Fit & è grano gnidio purgato, & tuso. Vis ei aluum soluere potu. Non secus cnicinum oleum temperatur. cui facultas eadem est, quæ factò è gnidio grano, uerùm inualidior. Rhabbaninum è raphani semine fieri solet, cæterorum more. Phthiriasis mala uoletudine contractas tollit: scabritias cutis in facie emendat. Ad obsonia utuntur Aegyptij. Melanthinum idem, quod rhabbaninum potest, eodemque modo paratur. Tritum sinapis semen, & calida aqua madefactum, adiecto postea oleo exprimitur. Id ad diuturnos dolores efficax est: transfert humores, qui in aliqua parte concreuerunt.

Hyoscyami-  
ni uires.

Hyoscyam.  
parandi ratio.

Gnidium.

Cnicinum.

Rhabbaninũ.

Melanthinum.

Sinaphum.

T A M E T S I per pauci reperiantur medici, qui Hyoscyaminum oleum nouerint, ne dum in usum receperint uiam; ego tamen id ipsum pluries confeci. Siquidem ad tollendos omne genus dolores, ubi cætera præstidia non ualerint, efficacissimum est medicamentum, præsertimque inflammationibus pudendorum utriusque sexus. Item acutissimis aurium doloribus medetur cum castoreo, uel croco instillatum. Prohibet præterea gonorrhæam, renibus & testibus illitum. Mensium exuberantiam cohibet, & albicantia uteri profluvia, tum pubi & lumbis perunctum, tum pectus infusum. Mammis à partu inflammatis utiliter illinitur. Dentium dolores mirifice mulcet, si tepidum in ore continetur. Pilorum exortum admodum retardat, alijs quibusdam additis, ita ut euulsi pili integro anno non renascantur, si eodem depilata loca sæpius perungantur. At ipse in eo faciundo Dioscoridem minimè secutus sum, sed aliam parandi rationem adinueni, quæ hæc est. Sumito nouum, siccumque hyoscyami semen, tundito deinde, ponitoque in stanneo, uel uitreo uase, ardenti aqua, quæ è uino fit, parumper prius affusum. His factis ponito uas in calentis aquæ balneo die, ac nocte, demum adhuc feruens sacculis imponito, & prælo subycito, sicque oleum habeto. Quod autem è grano Gnidio, quod rustici Ananenses montanum piper appellant, paratur, recessit hoc æuo à medicorum usu, eo quod in deiectione alio uolentissimum sit medicamentum, rusticis tamen aptissimum, cum sæpius, ne medicos consulant, coctum Gnidium deuorent: quo etiam sæpius morte occumbunt. Porro Cnicinum (ut Mesues inquit) potius aqua intercutis laborantibus, uiscerum obstructionibus, uentriculi, & coli cruciatibus flatuositate genitis, efficax est. Suffrictis mirifice prodest, & uocem clarificat. Epotum pituitam tum uomitionibus elicit, tum per inferna ducit. Rhabbaninum præterea, & Melanthinum aboleuerunt, sicuti etiam Sinapinum: etsi ubi ad summum excalfacere opus fuerit, maximam opem præstare ualeant. Sinapinum uero non nisi collacrymantibus oculis exprimi potest: tanta enim est uaporis acrimonia, ut concepto uapore, illico prodeant lacrymæ. Miscetur quandoque cum eo, quod è pistaceis nucibus elicitur: perungunturque eo genitalia in frigidis, ut felicius coquant, addito lasere, & moscho.

Μυρσίνιον ἑλαιον.

MYRTEVM OLEVVM.

CAP. XXXVII.

M Y R T E I faciendi ratio hæc est. E myrto nigra syluestri, aut satiuæ, foliorum mollissima quæque tusa premuntur: succo pares omphacini olei portiones adiunguntur, subiectisque carbonibus inferuescunt, donec concoquantur: innatans oleum deraditur. Sed longè facilius hæc compositio. Tenera folia contusa coquuntur in oleo & aqua, & quod innatat, eximitur. Priuatim alij deiectiona in oleum folia in sole macerant: alij prius oleum inspissant malicorio, cupresso, cypero, & iuncò odorato. Efficacius est amarum gustu, & oleosum, aride, translucens, & olens myrtum. Astringit, & indurat: ideo medicamentis miscetur, quæ cicatricem obducunt: prodest ulceribus in capite manantibus, ambustis igni, & papularum eruptionibus. Facit ad attrita, & furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos: corporis sudores compefcit: & ad omnia ualet, quæ astringentem, & inspissationemque desiderant.

In myrteo  
officinarũ la-  
psus.

Olei omnis  
generis paran-  
di ratio.

Myrti paran-  
di ratio.

M Y R T E V M myropole ferè omnes non quidem ex tenellis myrti frondibus, Dioscoridis more, conficiunt, sed è fructibus tantum, nulla seruata parandi ratione. Quandoquidem myrti baccas contundentes, oleo, nigroque uino immiscunt, & in æneum cacabum transferunt, subduntque (ut citius opus expediant) ignitos carbones, ibique tandiu inferuescere sinunt, donec uinum totum absumatur: mox ab igne tollunt, percolant, & asseruant. Neque animaduertunt conficiendi regulam à Mesue explicatam. Siquidem is in calentis aquæ balneo, non quidem uiolento carbonum igne Myrteum parari iubet: ex oleoque omphacino fieri, non (ut ipsi parant) ex maturis oliuis expresso. Namque, ut balnei huiusmodi, ac leni calore olei compositio mirifice digeritur, ac eius omnes conseruantur partes: sic contra uiolento igne subito perucritur, & destruitur tota rei compositio: Sed quoniam reipublicæ beneficio (ut etiam ab ipso exordio pollicitus sum) decreui non prætermittere quicquam, quod errores, qui indies contingunt, è medio tollantur, dico, oleum omne, quod officinæ ad medicamenta usurpant (illud excipio, quod ab arborum resinis, stirpiumque aliarum gummi, uitreis organis per sublimationem, ut chymistæ uocant, elicitur) uase uitreo, uel saltem stanneo in balneo calentis aquæ fieri debere: & inibi primùm impositis imponendis tribus diebus macerari: post tertium uero diem expressis cunctis prius impositis, & recentibus infusis pari temporis spatio, eodem in balneo, eadem macerari. Itaque tandiu opus proseguendum, donec sibi oleum amplissimas exceptorum medicaminum comparauerit utres. Verum ingens hominum læcri auaritia, aurique ingluuius, ut admodum superlucrentur, arcumque auro ad summum usque impleant, non patitur myropolas necessarium tempus impendere ad medicamenta exactè paranda: eos, inquam, qui continuè magis cruentis intendunt, & inbiant, quam ut uitæ egrotantium satagant. Probi tamen, & diligentes hæc mea uerba boni consulant, his uero mali errores emendent suos. Idcirco Myrteum oleum, quod myrti præstantiam ad plenum referat, hoc modo temperatur. Sumito fructuum myrti libram, foliorum eius recentium uncias decem, uini nigri adstringentis li-

# In Librum primum Dioscoridis.

53

bras duas olei omphacini libras quinq; : deinde confusis baccis, ac folijs omnia oleo excipito, & uase uitreo, uel stanneo reposito, tectoq; uasis ore in balneo calentis aquæ immergito, & post tres dies extrahito, ac percolato. Rursus assumptis recenter baccis, folijs, & uino, ut antea oleo exceptis, in eodem balneo omnia recondito ad tertium usq; diem. At postremo uasis ore detecto, tandiu id apertum finito, donec balnei feruore uinum totum exiliat, & oleum tantum remaneat. Nec audiendi sunt ij, qui Dioscoridis testimonio, eneo cacabo ( ut supra dictum est ) substratis carabonibus Myrtinum conficiunt. Quippe Dioscoridis tempore ars medica non adeo exulta erat, quin nec seplasiaria, ut nostra hac ætate esse uisitur. Quamobrem putandum, quod si huius balnei artificium Dioscoridi innotuisset, haud quaquam silentio præterisset, ueluti nec illud Mesues, nec alij cõplures præterierunt, qui summo studio, & diligentia medicam facultatem excoluerunt, & in ordinem redigerunt.

## 10 ΔΑΥΡΙΝΟΝ ἔλαιον. LAVRINVM OLEV. CAP. XXXVIII.

LAVRINVM fit hoc modo. Lauri baccæ cùm maturæ sunt, in aqua coquuntur: siquidem ex obducto cortice quandam pinguitudinem reddunt, quæ manibus subacta, concha excipitur. Alij omphacinum prius oleum cypero, iunco odorato, & calamo inspissant, deinde tenera lauri folia concoquunt. alij etiam baccas, donec oleum odorem contraxerit. alij styracem, & myrtum addunt. Optima laurus ad id latifolia, & montana. Oleum laurinum utilius, quod recentius, quoque uiridius colore, amarissimum, & acre. Vis ei exalfactoria, emolliens: venarum spiracula aperit, lassitudines discutit: omnibus neruorum uitrijs, algoribus, destillationibus, aurium doloribus, malis renum frigore contractis, illitum non aliud iuuantius: attamen potum nauseam parit.

20 LAVRINI conficiendi rationem aliter à Mesue institutam legimus, sed tamen ab hac parum recedentem. Ideoq; quod id parum, uel nihil referat, rem ipsam silentio prætereundam auximus: præsertimq; quod non me latet, Laurinum, cuius est usus in officinis, à seplasiarijs nequaquam fieri, sed ab alijs confectum emi, qui lecta magna lauri baccarum quantitate ipsum eliciendi artem exercent. Mesues præter facultates à Dioscoride traditas, id summè laudat & ad iocineris dolores, & ad hemicraniam, quæ frigidis contrahitur succis. Quin & ad uentriculi dolores, colicis, uulnè, & lienis efficax esse tradidit.

Laurini confideratio.

Laurini uires ex Mesue.

## ΣΧΙΣΤΙΝΟΝ ἔλαιον. LENTISCINVM OLEV. CAP. XXXIX.

SIMILIS Lentiscini ratio. Nam è maturo fructu temperatur, factis prius spissamentis, ut in laurino diximus. Hoc scabiem iumentorum, canumque sanat: utilissimum pessis, acopis, & lepræ medicamentis: sudores cohibet. Nec secus Terebinthinum fieri solet: quod t refrigerat, & astringit.

30 LENTISCINVM pluribus in locis Hetruriæ conficitur, sed præsertim in agro nostro Senensi, Ilua, & Giliio Tyrrheni insulis, non longè à continenti nostra distantibus. Fit autem ab incolis hoc modo. Racemosas lentiscibaccas assument, & à putaminibus cunctis expurgant, permittuntq; aliquot diebus simul flaccescere: deinde magnum in ahenum collocant, affusa aqua: & igni tãdiu feruent, donec baccæ debiscant, demum eas extrahunt, & saccis includunt, præloq; subiiciunt, expressuntq; asseruant oleum. Quod & quibusdam Adriatici insulis hac similiter ratione confici audio, absq; alterius cuiusuis olei adminiculo: siquidem fructus is per se olei satis emittit. Incolæ ( ut experimento comprobatum affirmant ) ad acuendam oculorum aciem, & aliginesq; delendas, illud cibis commiscunt. At ego eo sæpius usus sum magno sanè iuamento in dysentericis, non quidem potu exhibito, sed clysteribus infuso. Lentiscinum summis laudibus extulit Galenus lib. v. de compos. med. secundum locos, ad gingiuarum, & lingue inflammationes, si os eo colluatur. Quod autem sit è fructibus terebinthi, quos Mauritanii grana uirida nuncupant, non fit in Italia, neq; ad nos ( quod scierim ) aliunde conuehitur: proinde non uenit in usum. Hoc tamen ( ut Mesues inquit ) uulnera consolidat. Medetur item conuulsis, opisthotonicis, neruorumq; duritijs, & creberrimè cataplasmatis admiscetur.

Lentiscini parandi ratio, & uires.

Terebinthini confideratio, & uires.

† In his uerbis mendum subesse putamus, ut etiam doctissime adnotauit Manardus Ferrariensis lib. VII. Epist. prima. Aliàs siquidem sibi ipsi repugnasset Dioscorides, cùm scripserit in Terebinthi mentione eius fructus exalfacere: hic uerò dicatur, oleo ex eisdem parato inesse refrigerandi facultatem. Huic deprauatæ lectioni illud quoq; refragatur, quod sint nobis Græci Dioscoridis codices, in quibus uerba illa de Terebinthini olei facultatibus non leguntur, sed de eius tantum conficiendi ratione mentio habetur.

## 40 ΜΑΣΤΙΧΙΝΟΝ ἔλαιον. MASTICHINVM OLEV. CAP. XL.

MASTICHINVM è trita fit mastiche. Quod contra omnia uulnè mala efficax est: medio-criter calfacit, astringit, & emollit. Aduersus prominentes stomachi duritias, coeliacorum, dysentericorumque cruciatus utile: faciem emaculat, & colorem nitidum facit. optimum in Chio insula componitur.

MASTICHINI parandi rationem, sanè quàm paucis Dioscorides perstrinxit. quippe è trita tantum Mastiche fieri tradidit, nulla alia explicata conficiendi ratione. Seplasiarij autem nonnulli prorsus obliti, scripserunt Mesuem in balneo calentis aquæ Mastichinum confici debere, communi oleo, albo uino permixto, mastichen admiscere, & creto uase carbonum igni adiuuente, ibiq; tanto tempore effereuiscere sinunt, quoad uinum prorsus exiliat, ac inde usui asseruant. At ipse uitreis organis è purissimo tantum mastiche illud sæpius confeci.

Seplasiariorum lapsus.



Μύρον συνθεσις.


VNGVENTORVM COMPOSITIO. CAP. XLI.

DE RATIONE vnguentorum consequenter tractandum existimauimus: quandoquidem et in nonnullis corporum uitijs, aut medicamentis mista, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimum profunt. in quorum probationibus consulere nares oportet, an ea oleant, ex quibus temperantur. Optimum huiusmodi iudicium. quod tamen in quibusdam planè obseruari non potest, propter ea, quæ admiscuntur, odore cæteris præualentia: ut in amaracino, & crocino, telino, & plerisque alijs, quæ crebra circa hæc meditatione experiri conueniet.

Ρόδον.

ROSACEVM.

CAP. XLII.



ROSACEVM sic fit. Iunci odorati quinque libras & bessem tūdito, & subactas aqua in uiginti olei libris, & quincunce subinde mouēdo, coquito: dumque percolaueris, in olei libras uiginti, & quincuncem, adijcito rosas non madefactas numero mille, & manibus melle perunctis identidem moueto, interdum premens, finito nocte tota macerari, postea exprimito: & ubi rēremētum pessum ierit, mutato uase, in craterem melle illius recondito: Cæterum rosas, quæ antea pressæ fuerunt, in labellum demittito, & affusis octo libris & quadrante spissati olei, iterum premito, eritque secundarium oleum: Quod si tertias usque, quartasue perfusiones infundens exprimere uoles, secundarium fiet, tertiarium, & quartarium vnguentum. Sed quoties id feceris, nasa melle oblini debent: Si uerò secundam infusionem instituere libet, in expressum oleum, numero pari recentes rosas, nullo humore imbutas inijcito: manibus melle præmadefactis agitantis præmito: & iterum tertio, aut quarto simili modo exprimens facito, totiesque recentes rosas detractis vnguibus immittito: fiet enim ita oleum multo validius. nam septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. Prælum melle perungatur, oleum à succo diligenter fecerni oportet: nam si minimum quid relinquitur, vnguentum corrumpet. Alij autem detractis vnguibus, rosas tantum oleo macerant in sole hoc modo. Rosæ, quæ selibrām pondere æquant, in sextario olei diebus octo madefcunt, & usque tertiam perfusionem quadraginta diebus insolantur, & sic oleum reconditur. Alij calamo, aut aspalatho prius

olei spissamenta faciunt. Alij coloris causa anchusam admiscunt, & salem, quod minus oleat. Vim astringendi, & refrigerandi obtinet: fomentis, & cataplasmatibus utile. Porum soluit aluum: stomachi ardorem restinguit: vlcera caua replet, & mulcet, quæ cacoëthe uocantur: vlceribus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur: caput dolens eo perfunditur: dentes inter initia doloris collui prodest: ad genarum duritias illitum efficax est. ad lacescita interanea, & concitatas vuluas utilissimè subijcitur.

Vnguentorū  
consideratio.

Hoc sub olei nomine comprehendit Dioscorides oleum omne, quod per se tantum, nulla alterius olei admixtionis, aut ex arborum fructibus, aut herbarum diuersorum generum seminibus, aut stirpium resinis elicitur. Sed unguentum appellatione intelligit oleum omne genus, cui et odoramenta, et alia simplicia medicamenta admiscuntur, ut in presentia de Rosaceo agens, et deinde in sequentibus manifestè ostendit. Quo fit, ut apud Dioscoridem oleum uocetur, quod simpliciter expressum sit: unguentum uerò oleum quodlibet, cuius componendi ratio pluribus constet medicamentis. Quapropter Galenus lib. v. i. simp. med. de oleo agens, sic inquit. Ex dictis cognoscere iam liceat, et de alijs olei generibus, quæ æquiuocè ipsis dicuntur unguentis, puta rosaceo, melino, liliaceo, et quæcunque id genus floribus, fructibus, germunibus, folijs in oleo maceratis conficiuntur. Horum quodque ubi una cum aromatibus præparatur, unguentum efficitur. Cæterum oleum rosaceum, quod hoc tempore officinæ completum appellant, à Dioscoridis rosaceo longè distidet, quod etiam eo præstantius existimandum est, summum ob artificium, quod in ipsa parandi ratione diligentiores adhibent myropole. Quod eorum tamen perpauci (ita ut ingenium est multorum à labore prociue ad ignauiam) illud secundum Mesuem temperant; tamen si plures ab eo optimi rosacei conficiendi modum sint consecuti.

Rosacei consideratio.

Rosaceū omphacinum.

Fit etiamnum rosaceum rosas non affatim dehiscentibus in omphacinum demissis, modò calentis balnei uiribus (ut in quibusdam alijs superius adnotauimus) modò insolatu perquam longo. Sunt et qui, ut magis uiribus præstet, oleum prius ex aqua rosacea lauent, deinde plusculo temporis spatio ter, aut quater rosas infundant, quæ haud penitus satiscant, demum expressione peracta immaturarum rosarum succum adijciunt, ac inde diu insolant. Postremo oleum à succo

facco fecerunt, & diligenter asseruant. Hoc inflammationes discutit, roborat, adstringit, fluxionesq; cohibet, ne ad eas defluant partes. Potum torminibus dysentericis medetur. Capitis uulneribus aptissimum est, quod roborat, siccat, resoluit, inflammationesq; non modo prohibeat, sed etiam extinguat. Quocirca hac in re maxime probatur Galeno lib. 11. de comp. medic. secundum locos, ubi de dolore capitis scribit, qui uel ex uulnere, uel casu excitatur. Cuius etiam meminit lib. 2. simp. medic. de sanguine agens.

Rosacci omphacini uires.

## ΕΛΑΤΙΝΟΝ. ELATINVM. CAP. XLIII.

FRACTA elate, tusa, & scarificata, in labellum deiicitur: omphacinum oleum triduo infunditur, mox per sportulam exprimitur: uerum pares esse debent utriusque portiones. dein mundo uase ad usus reconditur. Viribus rosaceo proportionem respondet: aluum tamen non mollit.

ELATINVM, quod ex Dactylorum inuolucris antiquitus parabatur, hac nostra tempestate absoluit.

## ΜΕΛΙΝΟΝ. MELINVM. CAP. XLIII.

MELINVM hoc modo temperatur. Olei congius decem aquæ sextarijs admiscetur. Adijciuntur elatæ palmarum fractæ quadrans, & iunci odorati uncia: quæ die uno macerata coquantur, mox in uas oris patuli oleum excolatur, & indita arundinacea crate, aut rara tegete, cotonea mala superponuntur, & uestimentis operta tantisper inibi resident, dum malorum vires ad se oleum alliciat. Aliqui cotonea decem dierum spatio operimentis inuoluunt, ut contineatur odoris suauitas, nec euanescat: postea biduo macerata oleo exprimuntur, oleumque reconditur. Id uim refrigeratorem, & astringentem habet. Contra scabiosa vlcera, & quæ serpunt, ac furfures, perniunculosque effectum præbet: exulceratis vuluis infunditur: citatam vrinam sistit infusum: sudores cohibet: contra cantharidas, buprestim, pinorum erucas, bibitur. Laudatur maxime quod cotonea mala oler.

MELINVM oleum ad hodiernum officinarum usum hoc modo conficitur. Cotonea nondum planè matura in taleolis dissecta omphacino oleo maceantur, & uino ex eis expresso superaddito insolantur. Deinde in calentis aquæ balneo iterum, atq; iterum perfunduntur, & extrahuntur, ut in alijs superius ostendimus.

Melini conficiendi ratio.

## ΟΙΝΟΚΕΝΑΝΘΟΝ. OENANTHINVM. CAP. XLV.

OENANTHE è labrusca, optimè olens postquam emarcuit, deiecta in omphacinum oleum mouetur, voluiturque: & cum biduo manserit, exprimitur, & reconditur. Astringit, proximum rosaceo effectum præbens: sed aluum non resoluit, aut mollit. Probatissimum est, quod odore cenanthen refert.

OENANTHINVM nullam à nobis requirit explanationem: quoniam à Dioscoride tam aperte proditur eius parandi ratio, ut non sit opus, illud pluribus explicare.

## ΤΕΛΙΝΟΝ. TELINVM. CAP. XLVI.

FOENI græci libræ quinque, calami libræ una, cyperi libræ duæ, olci libris nouè septenis diebus macerantur, quotidie ter mouentur, postea premuntur, & reponuntur. Aliqui pro calamo cardamomum substituunt, & cyperi loco xylobalsamum macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato fœnum græcum macerantes exprimunt. Hoc telinum abscessus emollit, & concoquit: omnibus vuluarum duritijs magnopere conuenit, fœminis difficilè parientibus subiicitur, ubi præ excretis humoribus loci siccitatem contraxerunt: sedis inflammationes lenit, tenesmo subditum prodest: vlcera capitis manantia, furfuresque expurgat: ambustis, & perniionibus addita cera proficit: vitia cutis in facie emendat: pigmentis ad conciliandum faciei nitorem inferitur. Eligi oportet recens, quod non vehementer fœni græci odorem præ se ferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato: tale enim optimum iudicatur.

OFFICINARVM Luminaria ex Rasis auctoritate aliam, quamvis exoletam, Telini componendi rationem tradunt, in quo calamo odorato, & cypero elaterij bessem adijciunt.

## ΣΑΜΨΥΧΙΝΟΝ. SAMPSUCHINVM. fol 34r CAP. XLVII.

SERPILLI, cassiæ, abrotoni, florum sisymbrij, frondium myrti, sampsuchi singulæ portiones, quadam pro uiribus ipsorum coniectatione, unà tunduntur, atque is omphacini olei modus adijciuntur, qui madentium uires non euincat: hæc post quadriduum exprimuntur. denuo noua alia simili mensura, & æquali tempore macerata premuntur: ita enim ualidius reddi solet. Eligi oportet sampsuchum colore ex atro uiridi, plurimum redolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantem: aduersus vuluæ præclusiones, conuersionesque efficax est: menses, & secundas, & partus extrahit: vuluæ strangulatus recreat: lumborum, inguinumque dolores lenit: sed cum melle uriceo præstat; quandoquidem vehementi astrictione locos indurat. Lassi- tudines illitum discutit: in opisthotonicorum, vulforumque cataplasmata utilissimè additur.

QUANQVAM ex Theophrasti, Dioscoridis, & Plinij sententia idem esse constat sampsuchum, & amaracit: cion tamen Galenus, & Paulus de his diuersis capitibus seorsum scripserint, eorumque temperamenta per gradus dis- sidere

Sampsuchini consideratio.

Solutio con-  
trouersie.Opinio quo-  
rundam.

fidere tradiderint; non ab re credere nonnulli aliud esse sampsuchum, aliud uero amaracum. Quorum opinionem auxit etiam Dioscorides, quod in his unguentorum compositionibus Sampsuchinum, & Amaracinum diuersis capitibus digesserit. Quod facile plerisque; ad credendum induxit, has stirpes tum facie, tum uiribus differre, hac ratione fructi, quod si alterum ab altero non distaret, omnino prae ter rationem de his uarijs in locis scripsisset Dioscorides, alterum unguentum Amaracinum, alterum uero Sampsuchinum appellans. Porro ut huiusmodi controuersia tollatur, sciendum est, stirpem eam, quae Galeno, & Paulo amaracum appellatur, id sane amaracum non esse, quod Theophrastus, Diosc. & Plinius sampsuchum uocauerunt, sed potius (ut ego existimo) marum, id quod etiam sentiunt clariores nostri seculi simplicium indagatores. Nam; mari nec Galenus, nec item Paulus quicquam prorsus in simplicium medicamentorum libris meminerunt. Quare non deest suspicio, quin librariorum culpa, in Galeno mari titulus in amaracum abiit: quandoquidem in eius tum gradibus, tum facultatibus assignandis Galenus à Dioscoridis maro non longè recesserit. Sunt et qui uelint apud Paulum, & Galenum id amaracum dici, quod Dioscorides parthenium uocat: quippe & hoc quibusdam amaracum uocatur. Cuius rei indicium esse existimant, quod tam Galenus, quam Paulus nullibi in simplicium medic. libris aliquid de parthenio posteritatis memoriae prodiderunt. quorum opinio non omnino reprobanda uidetur. Ceterum licet Dioscorides Sampsuchini, & Amaracini diuersis per se capitibus meminerit; non obstat propterea, quod minus idem esse possint sampsuchum, & amaracum. Siquidem duabus de causis ut alterum ab altero distingucret, Dioscorides facile impulsus fuit. quarum altera est, quod si diligenter animaduertantur utrorumque compositiones, utique Amaracinum tum multo odoratius, tum Sampsuchino pretiosius iudicabitur. Ideoque autor, eo quod notabat unguentum hoc apprime nobile intactum relinquere, quodque ob eius claritatem id particulari descriptione dignum censebat, ut praestantiae discrimen faceret, utque etiam minus probatum à probatissimo dignosceretur, homonymiam inmutauit, ipsumque non quidem Sampsuchinum, sed Amaracinum appellare uoluit: nam si id non fecisset, quodnam altero praestantius esset, discerni non potuisset. Huc accedit alia ratio, qua alterum Sampsuchinum, alterum uero Amaracinum Dioscorides appellauerit: quod (ut libro tertio proprio capite legitur) in Cizico sampsuchum amaracum appellabatur, inde hoc unguentum insigne petitur. Et quoniam à Cizicenis claris illius compositoribus ex eorum more Amaracinum uocabatur, talem nomenclaturam Dioscorides haud quaquam permutandam censuit. Quare ipsum in eadem reliquit appellatione, quam secum ex Cizico tulerat.

## ΟΚΙΜΙΝΟΝ. OCIMINVM. ΕΥΧΙΝΤΙΑΚΟΝ. CAP. XLVIII.

**OCIMINVM** oleum fit ut cyprinum. Ocimi folia decerpta librarum undecim, & besis podo, die noctuque uiginti, olei libris macerato, premito, colato: cumque exhauseris quallum, rursus parem olei modum fundito, & exprimito. Vocatur autem id secundarium: nam tertiae perfusionis non est capax. Deinde recens ocimum aequali pondere, ut in rosaceo diximus, rursus maceratur, & cum tanto temporis spatio maduerit, exprimitur, & oleum reconditur. quod si in animo fuerit ter, aut quater madefacere, semper ocimum recens addes. Potest ex omphacino confici: sed illo modo melius. Idem quod sampsuchinum potest, sed inefficacius.

## ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ. ABROTONINVM. CAP. XLIX.

**OLEI** cyprini odoribus imbuti libris nouem & quincunce, foliorum abrotoni libras octo die noctuque madefactas, premito. Quod si in longum tempus oleum uelis asseruari, eiectionis prioribus folijs, noua appones, & macerata exprimes. Calfacit: ad nularum duritias, praeclosurenesque efficax est: menstrua, & secundas pellit.

## ΑΝΗΘΙΝΟΝ. ANETHINVM. CAP. L.

**OLEI** libris octo & dodrante, florum anethi libras undecim & besslem, maceratas in oleo die una, manibus premito, & recondito. Quod si iterum perfundere uelis, recentes anethi flores consimiliter madefacito. Vuluarum duritias emollit, uenarum spiracula laxat, contra horrores febrium circuitu redeuntis auxiliatur: calfacit enim, & lassitudines discutit: prodest articulorum doloribus.

## ΣΥΣΤΙΝΟΝ. SVSINVM. ΕΥΧΙΝΤΙΑΚΟΝ. CAP. LI.

**SVSTINVM**, quod alij lilinum appellant, sic temperatur. Olei librae nouem cum quincunce, calami librae quinque & quadrans, myrrhae uinciae quinque, permixto odorifero uino decoquantur, & colato oleo, cardamomi tusi & coelesti aqua madefacti librae tres & semis macerantur, premunturque, tres librae cum semisse spissati olei assumuntur. mille lilia decerptis folijs, in latum, non tamen profundum, labellum demittuntur: iniectum oleum manibus melle perunctis agitur: die noctuque conquiescunt, & in pixidem matutinis exprimuntur. quod defluat oleum, protinus ab aqua, quae simul expressa fuerat, colo incerni oportet: non enim, ut rosaceum moram tolerat; nam concalfactum feruet, & computrescit: quare saepius decapulandum. Vasa melle illinenda, tenuis sal inspargendus, & si qua sordes uasis fucibus haesit, eximenda. Odoramentis iam expressis ex quafillo in labellum transfusis, rursus olei prius odoribus imbuendi, quod primum pondus aequet, & cardamomi tusi drachmae decem coniiciuntur. Haec manibus scite pressa, interiecta

teriecta breui mora exprimuntur: quod profluit, repurgatur. Tertiò eadem infunduntur, adiecto cardamomo, & sale, & manibus melle madefactis. Longè optimum erit, quod prius exprimit: secundum, quod sequitur: tertium locum sibi uedicat, quod nouissimum prodit. Denuo in mille lilia euulsis folijs expressum primo oleũ infunditur: tum eadem ratione prosequendum, idemque faciendum, ut prius: addito cardamomo, dein expresso, fac eadem in secundo, & tertio, ut dictũ est: & quò frequentius recentia lilia maceraueris, eò validius vnguentum efficies. Denique cum factum abunde videbitur, singulis cõpositionibus miscere conuenit myrrhæ quàm optimæ duas & septuaginta drachmas, & croci decem, cardamomi quinque & septuaginta. Croci uerò, & cinnamomi pares portiones tunduntur, & cribratæ in lutram cum aqua demittuntur, expressumque primò unguentum infunditur, & paulò post excipiuntur uasculis siccis, myrrha, aut gummi antea persufus, & croco, & melle, & aqua madefactis. Eadem sunt in altera, aut tertia expressione. Aliqui simplex ex balanino, alioũe oleo, & lilijs componunt. Optimum esse constat in Phœnice, mox Aegypto factum. sed cum primis laudatur, quod lilia redolet. Excalfacit, emollit: uulvæ præclusiones, & collectiones aperit: utilissimum ad muliebria mala: vlcera in capite manantia, feruidas eruptiones, uaros, furfuresque emendat: uibices, cicatricesque celerrimè ad colorem reducit, ita ut sæpe fallant. In summa extenuat: potum bilem per aluum extrahit, urinam ciet: sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

Hoc, quod ex lilijs temperatur: illud item, quod ex ocimo, abrotano, anethoq; conficitur oleum, cum uniuscuiusque parandi ratio per se clara sit, ideo nostris explanationibus non indigent. Ceterum Susini compositio mihi quidem pluribus in locis librariorum potius, quàm auctoris incuria deprauata uidetur.

Ναρκισσιν.

NARCISSINVM.

CAP. LII.

NARCISSINI spissamenta ita fiunt. Sex libræ aspalathi cum sextante tunduntur: olei eloti libræ septuaginta cum uncijs quinque assumuntur. Aspalathus aqua madefactus in tertia olei parte coquitur: quo exempto, calamus quinque libris & besse adijcitur, cum myrrhæ gleba contunditur, cribrataque ac uino ueteri odorato immista, decoquitur: simulac autem cum ijs efferbuerit, eximitur. refrigeratum oleum excolatur, cuius portio in labellum mittitur, flores narcissi quàm plurimi conijciuntur, qui bidui spatio (ut in susino dictum est) permoti exprimuntur. Oleum subinde decapulandum: siquidem celerrimè putredinem sentit. Valet hoc ad emolliendas uulvæ duritias, præclusionesque: sed capitis dolores facit.

NARCISSINVM, quòd sciuerim, non paratur nostratibus myropolis. quod mirum non est, cum id etiam Plinij ætate parari desisset, ut ipse libro XIII. capite primo memorie prodidit.

Κρόκινον.

CROCINVM.

CAP. LIII.

CVM Crocinum componere uoles, prius olei, ut in susino diximus, spissamenta facies, eisdem ponderibus, & mensuris: cuius olei libras tres & semissem, croci unciam unam assumes: identidè quotidie moueto, & sexta diè, quàm hoc assiduo peregeris, oleum à croco colis incernito, eidem croco parem olei modum adijcito: moue triduo, dein contusæ myrrhæ, atque cribratæ drachmas quadraginta permisceto, & in pila agitatum recondito. Aliqui oleo aromatibus ad cyprinum imbuto in crocini compositione utuntur. Optimum est, quod abunde crocum spirat, in medendi usu expetitur. Proximum quod myrrham refert. Calfacit, somnum allicit: quare persæpe phreniticis subuenit persufum, aut naribus admotum, aut illitum: pus mouet, ulcera purgat: contra uulvæ duritias, atque præclusiones, & ulcera, quæ cacoethe uocantur, prodest cum croco, cera, medulla, duplicato olei pondere: concoquit enim, emollit, humectat, & permulcet. ad oculorum glauitates ex aqua illinitur. Huic autem proportionem respondent butyrium, onychinum, & styracinum: quæ etfi nominibus distant, uiribus, & compositione cognata sunt.

Κυπρίνον.

CYPRINVM.

CAP. LIIII.

OLEI omphacini eloti pars una, aquæ cœlestis tantundem cum semisse, cuius una parte oleum diluitur, altera adijciendis odoramentis admiscetur. Dein assumptis aspalathi libris quinque & semisse, calami libris sex & semisse, myrrhæ libra una, cardamomi libris tribus & dodrante, olei libris nouem & uncijs quinque, aspalathus tusus, & aqua affusus decoquitur in oleo, donec conferuescat: myrrha autem uino uetere odorifero subacta, contususque simul calamus, digeruntur in offulas, quæ exempto aspalatho immittuntur, & ubi efferbuerint, sublato ahenò oleum percolatur. Cardamomum tusum reliqua aqua aspersum infunditur, spatha agitur, nulla, dum refrixerit, interpellatione. Post hæc colato oleo in uiginti octo libras olei, floris ligustri, quod cyprum uocant, sex & quadraginta libræ cum besse instillantur, quæ sufficienter madefactæ per sportulam exprimuntur. Quòd si copiosius desideretur, idem recentium florum pondus iniectum simili modo prematur: & iterum aut tertiò, si quis uelit, madefacere poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat. Aliqui cinnamomum addunt. Calfacit, emollit:



emollit: ora uenarum adaperit: uuluz, neruorumque uitij conuenit, pleuriticis, fractisque, per se, uel cerato immistum. malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationique inguinum opitulantur: item in acopa adijcitur.

Ἰρίων. IRINVM. CAP. LV.

SPATHAE quam minutissimè contusæ sex libras cum besse, in tribus & septuaginta libris & quincunce olei, æreo uase, additis decem aquæ heminis incoquito, quoad odorem acceperit: postea in capulam melle oblitam colato: ex eo aromatibus imbuto oleo, irinū primò temperatur, inde ex oleo inspissato macerata, ut scripsimus. Sed alia est componendi ratio. In olei septuaginta libris & quincunce, xylobalsami (ut dictum est) contusi libras quinque & sextantem excoquito: postea detracto xylobalsamo, tusi odorati calami nouem libras & dextantem adijcito, & mirrhæ glebam uetere uino odorato perfusam, & in olei ita odoribus imbuti quatuordecim libris, totidem rusæ iridis, binis diebus ac noctibus madefacito, strenuè, & uehementer distringito. Quod si uis ualidius fieri, par pondus iterum ac tertio similiter maceratum exprimito. Longè optimum est, quod solam irin olet, quale illud est, quod in Perga Pamphiliæ, & Elide Achaiæ cõponitur. Vim habet calfactoriam, atque emollientem: crustas adimit, sordida ulcera & putrida purgat: cõfert sceminis uuluz causarijs: item inflammationibus eiusdem, atque præclusionibus: partus eijcit, hæmorrhoidas recludit: contra aurium sonitus ex aceto, ruta, & amaris amygdalis, prodest. diuturnis destillationibus, naribus illitum, & contra graueolentia earum ulcera, quas ozænas uocāt, auxiliatur: aluum purgat cyathus epotus: facit ad ilei cruciatus, urinam mouet: difficiles uomitiones adiuuat, perunctis eo digitis & immisis, uel ijs, quæ ad uomitum ciendum induntur: angina etiam illinitur, aut ex aqua mulsa gargarizatur: item contra arteriæ scabritiam. datur etiam ijs, qui cicutam, coriandrum, aut uenena fungorum hausērunt.

Irii consideratio.

QUANQUAM Irii præparatio (est enim per se clara satis) nō magis, quàm Crocini, & Ligustrini explanari expostulat: illud tamen silentio minime prætereundum uidetur, quod non Iridis flores, sed radices, cum hæc odore fragrent, illi uerò malè oleant, in hoc olei spissamento imponi debent. Quod etsi Dioscorides non explicauerit: cum tamen unguenta odorum iucunditate commendentur, de Iridis radice, non de floribus intellexisse Dioscoridem existimandum. Quippe quæ & suauiter oleant, & ad unguentorum spissamenta floribus præstantiores habeantur.

Γλεῦκινον. GLEUCINVM. CAP. LVII.

GLEUCINVM absolutè constat omphacino oleo, iunco odorato, calamo, Celtica nardo, spatha, aspalatho, fertula Campana, costo, & musto: circumdatis interim uinaceis uasi, quod aromata, uinum, & oleum conceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur, postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emollit, remittit: horroribus, & neruorum, uuluzque uitij auxiliatur. omni acopo iuuantius: quippe quod emolliat.

Gleucini consideratio.

MINIME quidem mirari licet: quod Gleucini parandi rationem simplicem appellauerit Dioscorides. Si quæ aliæ habentur unguentorum compositiones, quæ multo pluribus simplicibus constat odoramentis: sicuti Columella lib. xiii. capite quinquagesimo aperte indicat. Ceterum non potest Gleucinum (si rectè admixta simplicia considerentur) non uehementer excalfacere: tametsi Plinius lib. xxi. cap. iiii. id tum adstringere, tum refrigerare scripserit. Quod euidēti argumento est, aut Plinij gleucinum, siue musteum, ab hoc Dioscoridis, & Columellæ diuersum esse, aut Plinium non exactè illius temperamentum perpēdisse. Verum cum is libro. xv. capite vii. scribat, gleucino mustum incoqui in uapore lento, non ut alia admoto igne, sed circumdatis uinaceis per se calentibus: uidetur non parum cum Dioscoride conuenire. Quamobrem crediderim potius Plinium, cum dixit gleucinum refrigerare, lapsum fuisse, quàm secus. Nam etsi oleum omphacinum, cum quo musteum conficitur, tantum (ut Galenus inquit) frigiditatis, quantum adstrictionis habeat: cum tamen sit aliarum qualitatum susceptiuum, fieri quidem non potest, quin admixtis calidis odoramentis, puta cypero, calamo odorato, Celtica nardo, dactylorum operimento, aspalatho, meliloto, & costo, ualde calidum euadat. Quippe eadem ratione aqua, cum frigida admodum sit, temperamentum permutat (ut Galenus asseruit, & experimento comprobatur) cum calida in ea macerantur medicamenta: quandoquidem & ipsa se cile alia recipit qualitates.

Plinii lapsus.

Ἀμαράκινον. AMARACINVM. CAP. LVIII.

AMARACINVM longè optimum in Cyzico fieri solet ex omphacino oleo, & balanino: spissa mentis ex xylobalsamo, iunco odorato, & calamo factis: conditisque amaraci, costi, amomi, nardi, calsiæ, carpobalsami, & myrrhæ odoribus. aliqui, quod pretiosius fiat, cinnamomum addunt. Mel autem, & uinum assumuntur: hoc in vasorum illitionem, illud ad cogendas tusorum aromatum offas. Amaracinum calfacit, soporem mouet, venarum spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, urinam cit: putrilaginibus, ac fistulis perquam utile: necnon humentibus hernijs, postquam medica manus operam suam impenderit: crustas, & tetra vlcera, quæ theriomata vocant, rumpit: difficili vrinæ illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur: hæmorrhoidas illitu soluit: vuluz subditum menstruos cursus euocat: duritias, ac vuluz tumores discutit: vulneratis neruis, & muscularis confert, laneo centunculo modicè madefactum, & impositum.

**SUPERIVS** in sampfuchini commentario abunde de Amaracino à nobis dictum est. Quo fit, ut hic de eo plura scribere non sit opus. Huius meminit Galenus libro primo de antidotis, dum hedychroum explicat, quod theriacæ admiscetur, ubi diffusius de eo agens scribit, quod sui temporis unguentarij amaraci loco, ex quo in Cyzico antiquitus parabatur, marum imponebant, ut maiorem expiraret odorem. Ceterum se iussisse ait, ut legitimum experiretur amaracinum, id sibi ex solo amaraco præparari: quod ceteri odoris fragrantia uideretur inferius, non tamen uiribus imbecillius fuisse testatur.

Amaracini cōsideratio.

## Μεγαλίνον MEGALINVM. CAP. LVIII.

**FACTITABATVR** olim Megalinum, sed nunc compositio exoleuit, & prorsus oblitterata est. Cuius ad historiæ complementum meminisse non fuit alienum. Mistura cum amaracino eadem erat, sed resina exuperabat, hac tantum ratione differens. Quare leuiter emollit. Resina unguentis, neque tutelæ, neque uoluptatis gratia adijcitur, sed coloris, crassamenti que causa. Ea tantisper coquitur, dum desinat olere: cuius coquendæ ratio declarabitur, cum de resina differemus.

## Ἡδύχρον HEDYCHROVM. CAP. LIX.

**QVOD** Hedychroon vocant, in Co fieri solet: eisdem præditum viribus, & misturis, quibus amaracinum, sed suauius spirat.

**HEDYCHROI** compositionis meminit Galenus libro primo de antidotis, cum omnia, quæ continet, odoramentano subacta Andromachi theriaca recipiat. Ceterum ceteri hedychroi parandi rationes plures dicat reperiri, unã tamen elegit, quam hoc modo descripsit. Hedychroum habet mari drachmas duas: asari, amaraci, aspalathi, schœni, calami odorati, pbi pontici totidem: xylobalsami uerò, & opobalsami, cinnamomi, costi, singulorum drachmas tres: myrrhæ drachmās sex, totidē folij malabathri, nardi Indici, croci, casia: duplo autē plus amomi, aduectæ uerò ex Chio abundante plurimis fontibus insula mastiches drachman unam: uino salerno omnia excipe. Cum igitur hæc miscueris, fac trochiscos similes theriacis, et scillinis, quos exiccabis eo modo, quo diximus. Productus fuit Galenus; ut hunc parandi modum describeret, tum quod Andromachus hedychroum (ut inquit) nullibi literis mandauerit: tum etiam ut rei medicæ imperitos doceret, quidnam esset hedychroum in theriacæ præparatione, ne in eum errorem caderent, in quem sua ætate medicum quendam Romæ lapsum fuisse commemorat: qui compositurus antidotum, quærebatur apud myropolas Hedichroum; existimans esse herban, aut radicem, aut quodpiam simplex medicamentum. id quod etiam hac nostra tempestate quàm plurimis euenisse comperimus. Auicenna, & ceteri Arabicæ familie scriptores in sua theriacæ compositione hedychroum trochiscos Alindaracaron appellauere, tradentes uarias eorum compositiones in simplicibus medicamentis, pondere, & mensuris à Galeni doctrina plurimum differentes. Quare mirari non licet, si iandiu legitima Theriacæ compositio infeliciter successerit; cum & ab Arabibus, et à myropolis, adulterinis medicamentis fuerit deprauata.

Hedychroi cōpositio ex Galeno.

Theriace deprauatio.

## Μετόπιον METOPIVM. CAP. LX.

**FIT** in Aegypto vnguentum, quod Metopion patrio nomine appellatur, propter galbani miftionem: nam lignum, in quo galbanum enascitur, metopion uocant. Constat amygdalis amaris, omphacino oleo, cardamomo, odorato iunco, calamo, melle, uino, myrrhæ, balsami semine, galbano, & resina. Probatur pingue, graui odore, quod magis cardamomum, & myrrham, quàm galbanum respiciat. Calfacit uehementer, & adurit, atque extrahit: ora venarum aperit: vlcera purgat, extrahitque: ad præcisos neruos, & musculos, ad hernias humore contractas, cum erodentibus medicamentis efficax est. ceratis, & malagmatis inferitur: horribus, conuulsisque, præsertim quibus ceruix in scapulas deiecta, & retrorsum contracta est, uile habetur: sudores ciet, vuluæ spiracula recludit, & eiusdem duritias laxat. In summa molliendi naturam habet.

## Μενδίσιον MENDESIVM. CAP. LXI.

**MENDESIVM** constat balanino oleo, myrrhæ, casia, & resina. Aliqui tamen post singulorum pondera, cinnamomi exiguum addunt, nullo compendio: nam quæ simul excocta non fuere, vim nullam exhibent. Similem metopio vim obtinet, sed inferiorem multo.

## Στάκτη STACTE. CAP. LXII.

**STACTE** vocatur pinguitudo recentis myrrhæ cum exigua aqua tufa, & organo expressa. Ea perquam odorata, ac pretiosa est, atque vnguentum per se facit, quod Stacte nominatur. Maxime probatur, quæ nullam olei miftionem admisit, cuius minima portio compos est virium plurimarum. Vim calfactoriam, myrrhæ, & calidis vnguentis respondentem habet.

**STACTE** Serapioni, quemadmodum & reliquis Mauritanis, pariterque officinis Styrax liquidus appellatur, cuius copia non solum Venetijs ubique uenalis habetur, sed in omnibus fere officinis reperitur, quæ medicamentorum componendorum artem exercent. Quod autem Stacte myrrhæ sit liquidus uocatus Styrax, facile probat Serapio. quippe qui capite de Styrace calamita, liquidum styracē ex myrrhæ primum aqua conspersa, ac deinde expressa, fieri tradidit: quæ in re Dioscoridem ad unguem imitatur. Cui quidem sententiæ illud adstipulatur, quod liquidus styrax (de legitimo

Stactes cōsideratio.

Medicam. pe  
regina cur  
adulterentur.

( de legitimo sanè loquor ) sit perquam odoratus, & gustui non obscurè amarus. Porro animaduertendum est, quòd hoc æuo sincerum haud facile inuenias, ut sermè euenit cum cæteris medicamentis, quæ ex Alexandria Aegypti, ad Syria ad nos conuehantur. Siquidem cùm omnia hæc per Mauritanorum, Turcarum, Iudeorumq; manus transeant, qui nobis Christiculis semper dolos, fraudesq; moluntur, Dijs sacrificium facere sibi persuadent, cùm nos aliqua fallere possunt. Ceterum, ut redeam, unde diuenter am, mea quidem fert opinio, si sinceram statim nancisci possem, non alienum fore, ipsam in myrrhæ locum substituere.

Κιννάμωμον. CINNAMOMINVM. CAP. LXIII.

CINNAMOMINVM confitè balanino oleo: & xylobalsami, calami, iunci odorati spissamentis: atque cinnamomi, & seminis balsamini suauitate conditur, quadruplaque myrrhæ ad cinnamomum portione: mel ad cogenda omnia adiicitur. Laudatur non acre, molli odore, planè myrrham redolens, crassum, odoratum, gustu perquam amaro. Id non à resina, sed myrrha crassitudine obtinuit: resina enim neque amaritudinem præbet, neque ullam odoris gratiam adiicit. Vim habet admodum acrem, amaram, & calfacientem. Itaque ora uenarum aperit, calfacit, discutit, diffundit: humores & spiritus attrahit, caput aggrauat: contra uulnè uitia cum duplo oleo, cera, & medulla efficax est. Ita enim ferè multum acrimoniæ exolefcit, & quædam emolliendi uis contrahitur: alioqui adurit, & præ omnibus crassis unguentis indurat. Facit mirum in modum ad fistulas, & ulcera, quæ putredinis uitium senserunt: item ad hernias humidiores, carbunculos, gægranasque cum cardamomo: quin & ad febrium horrores, & tremores: aduersus serpentium morsus ilinitur: scorpionum, & phalangiorum ictibus, cum tritis grossis imponitur.

Νάρδιον. NARDINVM. CAP. LXIIII.

RATIO Nardini faciundi euariat, Nam aut malabathrino folio, aut sine eo fit: plerunque autem balanino oleo, aut omphacino. Iuncus odoratus spissamenti gratia adiicitur: sicuti propter odoris suauitatem, costus, amomum, nardum, myrrha, balsamum. Laudatur tenue, non acre, nardi aridæ, aut amomi odorem referens. Vis ei extenuans, acris: expurgat, calfacit, absterget humores, rarefacit. Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi resinam recipiat. Fit etià simplex ex omphacino oleo, iunco, calamo, costo, & nardo.

Μαλαβάριον. MALABATHRINVM. CAP. LXV.

MALABATHRINVM spissamenta nardini habet: insuper myrrhæ plusculum additur. Quæ de causa calfacit, crocino, aut amaracino uiribus respondens.

Ιάσμιον. IASMINVM. CAP. LXVI.

APVD Perfus fit, quod Iasminum cognominatur, ex albis floribus uiolæ: quorum sextans in Italicū sextarium sesamini olei demittitur, uiolis, ut in lilino diximus, uicissim permutatis. Apud Perfus inter epuladum usurpatur odoris causa. Quinetiam toti corpori conuenit: præsertim cùm in balneas descensum est. Sed his opitulatur corporibus, quæ calfactionem, laxationemque desiderant. grauius tamen spirat, quàm ut libenter à plerisque recipiatur.

Iasmini conf  
deratio.

IASMINVM unguentum non eo quidem silentio prætereundum duximus, quo aliqua in præcedentibus à nobis omissa sunt: in illis enim nihil sanè, in hoc uero aliquid nobis se se offert declarandum. Itaq; primùm scire conuenit, quòd Iasme uocabulum apud Græcos, aliorum etiam testimonio, nil aliud significat, quàm uiolaceum. Et certè eam scribat Dioscorides, unguentum hoc fieri ἐκ τῶν ἀνθῶν τῶν λευκῶν τῶν ἰσθμίου, hoc est uerbum uerbo reddendo, ex floribus albis uiolæ, id Violaceum meritò appellari debet. Sunt tamen è recentioribus, qui pro certo sibi persuadent, uocabulorum fortasse uiciniate decepti, illud ex floribus ijs perquam odoratis fieri, quos in Italia Gelsomini uulgò appellamus. Quorum opinioni non parum suffragantur tum Hermolaus Barbarus, tum Marcellus Florentinus. Qui præcipue, ut suam comprobet sententiam, ueteres asserit, præsertimq; Dioscoridem, inter leucoij genera nostratam gelsiminum comprehendisse, illudq; speciatim gelsiminum intellexisse, quod floribus cæruleis prouenire nonnulli pro certo asserunt. Cuius sententiam non modò non probandam censeo, sed omnino refellendam existimo. siquidem nullo pacto cogitandum est, nedum credendum, quòd Dioscorides, qui in simplicium historia, & in eorum declarandis separatimq; generibus, omnium diligentissimus fuit, adeò imprudenter nullo discrimine existimauerit cæruleum leucoium gelsiminum esse: cùm id folijs, uiticuloso caule, radicibus, ramis, floribus, cæterisque notis ab omni leucoio dissideat. Sed hoc uerum esse Marcello concedamus, etsi minus concedendum sit, quàm ratione dicet unquam, Iasminum unguentum fieri ex floribus gelsimini, quod cæruleum Dioscoridis leucoium esse asserit, si Dioscorides ipse palam prodit, Iasminum ex albis uiolis temperari. Ad hæc differre gelsiminum à leucoio abundè ostendit Serapio, qui non modò fuit Dioscoridis imitator, sed etiam interpret, cùm alterum ab altero diuersis capitibus distinxerit, & de utrisq; tanquam de rebus diuersis differuerit. Quinimo de gelsimino agens capite centesimo septuagesimo sexto nullam Dioscoridis, nec Galeni auctoritatem asserit, sed tantum suæ gentis monumentis inheret, asseritq; gelsiminum floribus tum albis, tum luteis, tum cæruleis reperiri, quale etiam atate nostra uisitur. Quod nobis maximo argumento esse potest, ut credamus, gelsiminum Dioscoridi cæterisque ueteribus incognitum fuisse. Ceterum cur Arabes stirpem hanc IBSMIN appellauerint, causa

Hermolai, &  
Marcelli opi.  
improbata.

Iscemin unde  
dictum.

causa facile assignari potest: quod cum gelsimini flores odoratos, albicantesq; albæ violæ modo conspicerent, Græcos barbaricè imitari uolentes, ipsi violæ nomen indidere, quod est Iesemin: tametsi uernacula eorum lingua Zambach, siue Sambach uocitetur. Id autem sicut odore fragrat, ita et uiribus pollet: siquidem Serapionis testimonio, exco-

Iesemini uires ex Scrap.

Ioannis de Vigo lapsus.

## Σμύρρα. MYRRHA. CAP. LXVII.

MYRRHA lacryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ non dissimilis: è cuius vulnere defluit lacryma in subiectas tegetes: alia circum caudicem concrescit. Dicitur ex his aliqua pediasimos prepinguis, qua expressa, Staete emittitur. Alia gabirea pinguisissima, leto & pingui solo nascens: ea copiosam fudat itacten. Omnium prima est, quæ Troglodytica appellatur, accepto cognomine à loco, in quo prouenit, splendens, subuirdis, ac mordens. Quinetiam legitur tenuis quædam, quæ à troglodytica secunda est, bdellij modo mollis, verum odore grauiuscula, apri-

20 cis nascens. Alia caucalis cognominatur præter modum exoleta, nigra, & retorrida. Omnium deterrima, quæ ergasima dicitur, pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummi imaginem uergēs, & uiribus eius proxima. Improbatur aminnea cognomine. Ex ijs pastilli fiunt, sed è pinguibus pingues, & odorati: è ficioribus haudquaquam pingues, & inodorati. Minus odore pollet, quæ oleum non admisit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gummi aqua, in qua myrrha maduerit. Eligenda est recens, fragilis, leuis, undique concolor, quæ confracta uenas unguium modo candidas & læues ostēdat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens. superuacua, & inutilis est ponderosa, coloris picei. Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccit, astringit, vul-

30 uam emollit, & præclusam aperit: menses & partus celeriter extrahit cum absinthio, lupinorum cremore, uel succo rutæ admota: tuberculo fabæ deuoratur in vetere tussi, orthopnoea, in laterum pectorisq; doloribus, in alui profluuio, & dysenteria: horrores discutit duabus horis ante febriū accessiones fabæ magnitudinē pota cum pipere, & aqua: subdita linguæ liquataq; scabritiem arteriæ expolit: obtusam vocem expedit, ventris tineas enecat, contra grauem oris halitum mādatur, & aduersus alarum tædia cum liquido alumine illinitur: gingiuas, & dentes stabilit colluto cum vino, & oleo ore: vulnera capitis illitu glutinat: medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleæ carnibus: item purulentis auribus, inflammatisq; cū meconio, castorio, & glaucio: ad varos autem cum casia, & melle illinitur: impetigines ex aceto purgat: defluentes capillos cum ladano, & vino myrteo illita, firmat: diuturnas destillationes lenit, & illitis penna naribus: oculorum vlcera complet, albugines tollit, caliginem discutit, scabritiem læuigat. Fit è myrrha,

40 perinde atque thure, fuligo: & ut postea ostendemus, ad eadem conueniens. Bæotica myrrha dissecta radix est arboris cuiusdam in Bæotia nascentis. Melior est, quæ myrrham odoris suauitate repræsentat. Vis ei calfactoria inest, emollit, discutitq; sustinentis commodissimè inseritur.

MYRRHA, quæ ex Alexandria Aegypti hac ætate ad nos affertur, admodum sanè ab ea differt, quam inter præstantissimas Myrrhæ species recensuit Dioscorides. Quippe uniuersa serè myrrhæ, quæ in officinarum usu habetur, ijs omnibus qualitatibus, ac notis destituitur, quibus optima commendatur. Namq; ea (ut uidere est) minime uirescit, pinguis non est, non odorata, non undiq; concolor, nec confracta uenas unguium figura leues intus ostendit, nec sapore acri deprehenditur; tametsi gustui amaritudinem relinquat. Verum si fortasse cupiā uideretur et hæc inter Myrrhæ species esse recipienda (quod tamen non satis compertū habeo) aut caucalim, aut ergasimam, esse crediderim, aut potius quam Plinius ex India deferri ait, cum hæc ceteris deteriores habeantur, certoq; sciāmus ex India in Alex-

50 andriā myrrham importari: Nam ea, quæ plurima ad nos affertur, non modò sicca, nigraq; est, sed etiā retorrida, macilentius, et cano quodam situ obducta: et quanquā inter huiusmodi globulos aliquod quandoq; reperitur fragmentū, quod et clarum sit, et pellucens; confractum tamen diuersicolor apparet. Ecquid magis? nec gustui insigniter amarum, nec myrrhæ odore præditum sentitur. Quo fit, ut credere liceat, eiusmodi Myrrham aut è deterioribus esse, aut gummi dicuius, aliarumq; mistionum adulterio minime uacare: hac enim impostura (ut Dioscorides inquit) myrrha adulterari solet. Sed hæc ita de illa conijcimus, quæ passim uulgaris habetur. Ceterum electam Myrrham iam ad nos aduehi scimus, quæ et legitima, et probatissima esse censetur. Verum ea hætenus tam rara est, ut non nisi ad ostentationem afferretur, et ad aliarum dignoscendarum regulam. Adulterabatur myrrha Galeni tempore opocalpaso, quæ calpasi letalis, uenenosaq; est lacryma. Idcirco libro primo de antidotis. Opocalpasum (inquit) exitiale est multisq; nos forte quadam uidimus nostræ ætatis decursu mori, quod insciū myrrham, cui opocalpasum admixtum erat, assumpsissent. De industria namq; nonnulli eorum, qui ipsam præparant, ut laudatissimam imponebant, eo quod uideret col-

Myrrhæ consideratio.

Myrrha adulterata opocalpaso.



Brasauoli la-  
psus.

Myrrhæ hi-  
storia ex Pli.

Myrrhæ hi-  
stor. ex Theo-  
phrasto.

Myrrhæ ui-  
res ex Gale-  
no.

brijs indit. an optimam esse medicamentum. Quippe quæ pus citra mordicationem discutiat, & interdum incipientem oculorum suffusionem substantia tenuem: siue autem in emplastrum, siue in ceratum, siue in aliquod digerens medicamentum, quod extrinsecus imponitur, huiusmodi myrrham iniicias, iam ipsius augebis: at intra corpus assumptam tale est medicamentum. Hæc igitur fusius dicta sunt, tum quod orationis series ita exposcularet, tum etiam quia hæc speculati non est inutile. Hactenus Galenus. Adhibenda itaq; diligentia est, ne & nos Myrrham quandoq; opocdps- fo adulterat. an emamus. Ad hæc Brasauolo Ferrariensi animus inclinare uidetur, ut existimet Myrrham officinis uulgarem bdellium esse. Cui haud quaquam assentiendum putauerim: siquidem myrrha hæc pellucens adeo non est, nec taurino glutino similis, ut bdellium esse tradidit Dioscorides. Et licet quedam nostratis myrrhæ frusta quandoq; translucida reperiuntur; sunt tamen potius hæc (ut dictum est) gummi adulteria, quam myrrha, uel bdellium; nempe gustu maleficium detegitur. Præterea bdellium incensum (Dioscoridis testimonio) odorem unguibus odoratis similem spirat, quod in nostrate myrrha nunquam, facto periculo, sum consecutus. Huic etiam alia accedit ratio, quæ magis, ac magis Brasauoli animi immutare poterit. Quod bdellium diu digitis ductum, tractatumq; facili lentescat, & confractum pingue spectetur: myrrha uero, quæ officinis uenditur, digitorum attritu conteritur, & si frangatur per quæ arida sese offert. Ceterum improbavit Dioscorides, omniumq; Myrrhæ specierum deterrimam iudicauit, quæ aliquibus minea, alijs aminnea uocatur, quam cum Galenus probauerit libro primo de antidotis, omnibusq; Trogodyticis prætulit, factum est, ut existinauerint quidam, in hoc loco Dioscoridis codici mendam subesse. Sed cum in Dioscoride Græco legatur aminnea, & in Galeno minea, ego potius crediderim, eos non idem myrrhæ genus intellexisse.

Plinius libro .xii. capite .xv. myrrhæ arboris faciem diligenter expressit, his uerbis. Myrrhā in iisdem syluis, ubi & thus, permixtā arborem nasci tradidere aliqui: plures separatim. Quippe multis in locis Arabiæ gignitur. Conuechitur & ex syluis laudata, petuntq; eam etiam à Trogodytis Sabæi transitu maris. Satiua quoq; prouenit multum syluestri prælata. Gaudet raris, & ablaqueationibus: melior radice refrigerata. Arbori altitudo ad quinq; cubita, nec sine spina: caudice duro, & intorto, crassiore quam thuris, & ab radice etiam, quam aliqua sui parte: corticem leuicem, similemque unedoni: scabrum alij spinosumq; dixere: folium oliuæ, uerum crispius, & aculeatum: iuba oliuæ satri. Aliqui similem iunipero, scabriorem tantum, spinisq; horridam, folio rotundiore, sed sapore iuniperi. Necnon fuisse qui e thuris arbore, utrunq; nasci mentirentur. Inciduntur bis & ipsæ thuris modo, iisdemq; temporibus, sed à radice usq; ad ramos, qui ualent. Sudant autē sponte priusquam incidantur, staten dictā, cui nulla præfertur. Ab hac satiua, & in syluestri quoq; melior æstiuā. Non dant ex myrrha portiones Deo, quoniam & apud alios nascitur. Et sequenti capite inquit. Adulteratur myrrha lentisci glebis, & gummi: item cucumeris succo amaritudinis causa, sicut ponderis argenti spuma, Reliqua uitia deprehenduntur sapore gūmi dente lentescentis. Facillime autem adulteratur Indica myrrha, quæ ibi de quadam spina colligitur. Hoc solum peius India affert, facili distinctione, tanto deterior est. Hæc Plinius. Quo fit, ut facile crediderim nostri usus myrrham Indicam esse. namq; per mare rubrum, & inde per carouanas (ut dicunt) Alexandriā importatur. Myrrhæ quoq; historiam non iniucundè scripsit Theophrastus lib. ix. cap. iiii. de plantarum historia, sic inquit. Gignitur thus & myrrha regione Arabum media circa Saba, & Adramytta, et Citibæna, & Mamali: & exeunt thuris, mirrhæq; arbores aliæ super montem, aliæ in pedemontis culturis proprijs: quamobrem aliæ coluntur, aliæ uitam agunt incultæ. Montem istum præ altum affirmant, & ningi solitum: annes quoq; de eo in plana fluere. Myrrhæ arborem thure altitudine minorem, fruticosioremq; narrant: caudice duro, contortoq; iuxta terram, crassiori; sura hominis, cortice leui adrachnæ simili. Alij uero, qui se uidisse affirmant, de magnitudine ferè consentiunt. Neutrā e earum arborum magnam referunt, & minorem myrrhæ humilioremq;. Sed thuris folium laurinum; Leuicq; myrrhæ aculeatum, non leue, uimeo simile: crispum tamen, extremis spina horridulum, ilignei modo. Videm ea nauigatione, qua ex sinu heroum uehementer egressis sese aquam in monte quæsisse dixere, atq; ita uidisse hæc arbores, & lectionem notasse hoc modo ambarum: & caudices, et ramos incisios quidem, sed alios ueluti securi percussos uideri, alios tenuiores incisuras habere: & lacrymam aliam decidere, aliam arbori inherere: nonnusquam etiam subiectas tegetes ex palmis contextas, alibi solum tantummodo circumspauimentatum. Montem autem uniuersum Sabæis diuisum dixere: hos enim loci illius dominos esse, iustitiæque mutua degere, quamobrem nullum suas arbores custodire: unde & thus, myrrhamq; sese largè ad naues solitudine deportasse narrant. Illud quoq; se audiuisse dixere, myrrhā, thusq; collectum undiq; ad solis delubrum conuehi: quod Sabæorum esse sanctissimum inter omnia regionis illius, custodesq; Arabes armatos habere, quibus singulos suam thur acceruat, & myrrham eodem modo relinquere, posita super aceruam tabella, literis significante numerum mensurarum, & pretium, quod pro singulis mensuris ponendum sit, mercatores uero, qui uenerint, tabellas aduertere, quisq; quod placuerit, acta mensura pretium in eodem ponere loco, unde merces acceperint: sacerdotem deinde uenire, parteq; tertij pretij Deo accepta, reliquum ibidem relinquere: idq; seruari tutissimè dominis, donec acceptum uenerint. Alij myrrhæ arborem terebintho similem reddidere, sed scabriorem, spinosiorēq;: folium paulo rotundius, gustu proximum terebintho: earum quoq; ueteres præstantiores haberi. Nasci uero hanc, & thus in eodem loco, terra subargilia, & sabulosa: & aquas fonte fluentes raras admodum comperiri. Hæc ergo illis repugnant, uelutet nangi, & imbribus perlui, & annibus locum illum exhilarari. Sed hi quidem altera quoq; longè maiore ignorantia laborarunt: thus enim, & myrrham nasci ex eodem arbore putauerunt. Quamobrem uerissimilius ipsi narrant, quos ex heroum oppido profectos naui retulimus. Myrrhæ aliud stillatitium, aliud fictitium constat. Probatur melior gustu, eiusq; norma concolorem accipiunt. Hactenus Theophrastus. Myrrhæ meminit Galenus lib. viii. simplicium medicam. ubi ita scriptum reliquit. Myrrhæ secundi ordinis est tum excalfacientium, tum desiccantium. Itaq; capiti uulneribus illita glutinare ea potest. Inest & amaritas non pauca, per quam factum, & lumbricos tum enecat, tum eijs:


eijcit : adeſt binc ei & abſtergendi potentia . Sic igitur ocularibus miſcetur facultatibus , utiq; quæ ad ulcera , & craſſas cicatrices præparantur . Eadem de cauſa inditur & medicamentis , quæ ad tuſſim ueterem , & aſthma , ſiue anhelationem exhibentur : non tamen arteriam exaſperat , ſicut abſtergentium nonnulla . Verum adeò moderatam obtinet abſterſionem , ut nonnulli eam arteriacis quæ uocant medicamentis commiſceant , tanquam ſufficienter excalſaciens , et deſiccans medicamen : ſcilicet abſterſionem proficiſcentem ab amaritudine nihil uerentes . Hæc Galenus . Porro ubi myrrha deſit , Galenus in ſuccidancis odoratum calamum ſupplet : Conſtantine uerò amaras amygdalas eodem ponere . Sed equidem hic myropotas admonitos uelim , ut nullo pacto eorum ſequantur doctrinam , qui iubent , Auicennæ auctoritate malè intellecta , myrrhæ loco piper nigrum ſupponere . Namq; Auicenna hanc ſententiã omnino reſellit , cum utitur his uerbis . Pro myrrhã ſubſtituendum piperis nigri dimidium aliqui perhibent : ſed hoc falſum eſt . Poſtremo illud etiam notandum eſt , quòd ( ut Galenus inquit lib. ſecundo de comp. medic. per genera ) myrrhã ſemper medicamentis eſt commiſcenda , cum ab igne tolluntur : quippe quæ coqui minimè patiatur , ueluti etiam thus , & aloë . De Bœotica autem myrrhã , quid dicam non habeo , quòd ætate noſtra ſit ( ut arbitror ) omnibus incognita .

Myrrha ſuccidanca.

Bœotica myrrhã.

† Exemplaria Græca typis expreſſa habent , διὰ τοῦ μύρω τῶν μυρωμάτων , id eſt , illita alæ narium . Quæ uerba inunctionem ad partem naſi referre uidentur , non autem ad inſtrumētum , quo debeat fieri inunctio . Siquidem teſtè etiam Galeno lib. xi. de uſu partium , τῶν τῶν μύρων ſeu τῶν τῶν μύρων pars quædam naſi uocatur .

## ΣΤΥΡΑΞ. STYRAX. CAP. LXVIII.



STYRAX lacryma eſt arboris malo cotoneæ ſimilis . Præfertur pinguis , flauus , reſinoſus , albicantibus grumis , quàm plurimùm in ſua odoris gratia permanens , qui dum mollitur , melleū liquorem reddit : qualis eſt Catabalis , Piſidia , & Cilicia deuchitur . Deterior niger , furfuſoſus , friabilis , canoq; ſitu obductus . Cæterum lacryma inuenitur gummiū ſimilitudine , per lucida , & myrrhæ æmula : uerùm per pauca manat . Adulteratur ligni ſcobe , quam uermiculi erodentes excuſſerunt , melle , & iridis ſedimēto , & quibuſdam alijs . Alij ceram , aut adipem odoribus imbutū , fragantiſſimis ſolibus cum ſtyracē ſubigūt , & per laxa cribri foramina in frigida aqua ueluti uermiculos exprimūt , uanundantq; . Styracem hunc , † quoniam in uermiculorum ſpeciem contrahatur , ſcoleciten cognominant , quem tanquam ſyncerū imperiti approbant , non animaduertētes ad præcipuam odoris fragrantiam : ſiquidem acer admodum eſt , qui adulterationis uitio caret . Styrax calfacit , emollit , & concoquit : medetur tuſſi , deſtillationibus , rauedini , grauedini , & interceptæ uoci : vuluæ præcluſæ , duritiæue laboranti conuenit : cit menſes potu , appoſituq; : aluum leuiter molliſcit , ſi exiguum cum reſina terebinthina catapotij modo deuoretur . Miſcetur utiliter diſcutientibus malagmatis , acopisq; . Adoletur autem , & igni torretur , ut fiat ex eo , ueluti ex thure , fuligo : ad eadem conueniens , ad quæ thuris fuligo . Ex eo etiam in Syria ſtyracinum oleum componitur , quod calefacit vehementer , & emollit : uerùm caput dolore afficit , aggrauat-

que , & ſoporem adfert .

STYRAX paſſim in Italia Storax calamita officinis appellatur , quod cognomen ex Galeno libro primo de antidotis acceptum crediderim . Namq; ipſe de ſimplicibus medicamentis agens , quæ ad theriacæ compoſitionem faciunt , optimum iudicauit ſtyracem , qui in calamis eſt Pamphylia ferebatur : unde calamita cognomen ſibi facile uendicauit . Itaq; cum non aliud habeatur ſtyrax , qui ſit hoc genere præſtantiſſimus , in uſu medentium eſt , ut dum pharmacopolis imperant fieri medicamenta , quæ ſtyracem excipiunt , calamitæ cognomen adijciant , quo indicent , ſe primum dotibus intelligere . Nec illud quidem ab re : quandoquidem Galenus eodem loco memoriæ prodiderit , hoc ſtyracis genus tantum præſtare ceteris , quantum uinum ſalernum illud bonitate excellit , quod à cauſonibus uenditur . Quo argumento fretus Manardus Ferrarienſis exiſtimauit , ubi in Dioſcoridis codice legitur τοιοῦτος ἐστὶν ὁ κατὰ βάλανος , hoc eſt , talis eſt Catabalites , potius legendum eſſe , talis eſt calamites . Neq; probat lectionem mutandam eſſe in Gabaliten , quæ almodum ſecit Marcellus . Sed proſectò hac in re ( eſſi Manardus fuerit uir ſumma doctrina præditus ) mihi magis Marcelli ſententia probanda uidetur . Quippe quæ Plinij teſtimonio comprobatur lib. xi. cap. xxv. ubi ſic inquit . Styracem Syria ludææ proxima ſupra Phœnicem gignit circa Gabala , & Marathunta , & caſium Seleuciæ montē . Atq; etiã ei adſtipulatur Oribasij codex manu ſcriptus , in quo lib. xi. legitur γὰρ βάλανος , & non κατὰ βάλανος .

Styracis conſideratio.

Manardi lectio non probata.

Syracis vires  
ex Galeno.

Laudatur Syrax Plinio loco citato post supradicta ex Pisidia, Sidone, Cypro: ē Creta uerò minime. Reddidit Plinius causam, quare est, quod Syrax plerumque puluerulentus existat, dicens, quod in eum circa canis ortum aduolant pennati uermiculi erodentes, ob idque ipsum in scobe sordescere. Adulteratur etiam Syrax (ut idem scribit) cetrile cruma, uel gummi, melle, aut amaris amygdalis. quocirca retinendæ sunt notæ, quibus Dioscoridis auctoritatem præstantissimum cognosci potest. Syracis arbor uiret Venetijs pluribus in locis, præsertimque in uiridario clarissimæ medici Massæi à Massæo. Huius meminit Galenus lib. v. i. i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Syrax excelsa facit, emollit, concoquit: quamobrem tussibus, catarrhibus, pituitæ destillationibus, raucedinibusque, quas vocant, ἰσχυρὸν βρογχὸν οὖν uocant, prodest. Tum menses seu potum, seu admotum prolicit. Combusti eius fuligo, thuris fuligo quo dammodo est similis.

† quoniam in uermiculorum speciem contrahatur. Hæc uerba non leguntur in Græcis codicibus. Sed ea ut arbitror à Ruellio interprete adiecta sunt ob maiorem rei declarationem. Quæ hanc ob causam, lectore tamen admonto, nobis quoque relinquere placuit.

BDELLIUM.

BDELLIUM.

CAP. LXIX.

BDELLIUM alij bolchon appellant, alij madelcon: lacryma est † Saracenicæ arboris. Probatur gustu amarum, translucidum, taurini glutinis in morem, intus pingue, liquefcens facile, ligniacæ fordoris expers, suffitu odoratum, yngui simile. Est etiamnum bdellij genus fordidum, nigrum, vberioribus glebulis in offas conuolutum, aspalathi odore, ex India aduectum. Defertur etiam à Petra oppido siccum, resinofum, liuescens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi, sed ita uitiatum non perinde gustui amaritudinem repræsentat, nec usque adeo suffitionibus odoratum. Calfacit, & emollit: duritias, & turgentia guttura, humiditasque hernias discutit cum ieiuna salua diluta: uulnæ spiracula laxat appositum, & suffitu: & partus, humiditatesque omnes extrahit: calculos potu comminuit, urinam mouet: tussientibus, & à serpente percussis utilissimè datur: valet ad rupta, vulsæ, laterum dolores, & discursantes spiritus. Malagmatis inferitur, quæ contra duritias, & neruorum nodos profunt. Contusum resoluitur affuso vino, aut aqua calida.

Bdellij consi-  
deratio.

PRAESTANTISSIMUM Bdellium Dioscoridi translucidum est, taurini glutinis in morem, amarum, lactu liquefcens facile, & quod incensum odorem emittat unguibus odoratis similem. Quod si modo nostro tempore in Italiam importatur, adeo rarum est, ut quemadmodum de myrrha diximus, ad ostentationem tantum afferretur, uel ad adulterini, & reprobati dignoscendi normam. Credidere quidam, hoc uulgare Bdellium, cuius passim in officinis est usus, constare partim ex nigro, quod India mittit, partim uerò ex eo Arabici genere, quod siccum, resinofum, liuensque ex Petra defertur, utrisque à mercatoribus simul mixtis. Quod si ita res se haberet, non esset planè molestè ferendum, quod saltem mediocre impertiretur, postquam nobis optimo interdictum est. Verum etsi hoc fieri possit, cum tamen in eo parum, uel nihil amaroris sentiat, cumque cæteris ferè omnibus tum notis, tum qualitatibus sit expers, quæ ei Dioscorides tribuit: est potius opinandum factitium id, & adulterinum esse, quam legitimum. Hinc factum est, ut quidam recentiores simplicium indagatores, cum nobis persuadere uellent, Bdellium in officinis reperiri, licet non aduectum ex Saraca felicis Arabiæ ciuitate, unde aduehi consueuerat: somniauerint, communem myrrham legitimum esse bdellium, ut eorum sententiam refellentes, in præcedenti commentario scripsimus. Huius, quo passim utimur, plura quidem habentur genera. Siquidem aliquod quandoque uidetur nigrum, resinofum, odore foetido laseri quadantenus proximo: aliud translucidum, utpote taurinum glutinum, sed siccum, amaroris expers, nulloque odore præditum: quoddam uerò adeo uulgari myrrha persimile, ut ab ea uix dignosci posset. Quæ omnia genera tametsi illegitima censeantur: offi-

Bdellij vulga-  
ris genera.

Bdellij succi-  
dancum.

Bdellij histor.  
ex Plinio.

Bdellij vires  
ex Galeno.

cinis tamen tanquam legitima, & præstantissima in medicamentis passim temerè usurpantur. Bdellio deficiente (si succidanæis Galeno ascriptis credimus) arboreus muscus est supponendus. Bdellium scriptis tradidit Plinius lib. xii, cap. ix. his uerbis. Vicina est Bactriana, in qua bdellium nominatissimum. Arbor nigra est, magnitudine oleæ, folio roboris, fructu caprifici natura. Gummi alij brochon appellant, alij malachran, alij maldacon. Nigrum uerò, & in offas conuolutum hadrobolon. Esse autem debet translucidum, simile cere, odoratum, & cum fricatur pingue, gustu amarum citra acorè. In sacris uino perfusum odoratus. Nascitur & in Arabia, Indiaque, & Media, ac Babilone. Aliqui peraticum uocant ex Media aduectum: facilius hoc, & crustosius, amariuscque. At Indicum humidius, & gummosius. Adulteratur amygdala niuce. Hæc Plinius. Bdellij facultates prodidit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Bdellium quod Scythicum nominant, quod sanè & atrius est, & resinofum magis, emollientis admodum, & efficacis uirtutis est. At alterum, nempe Arabicum, quod dilucidius est, magis desiccatur, quam emolliat. Igitur recens, & humidum est, & contusum facile mollescit, ad omnia, ad quæ Scythicum idoneum. At quod antiquius est, & admodum gustu amarum, & acre, & siccum, ab eorum, quæ indurata molliunt, mediocritate excidit. Utuntur autem quidam illis, & potissimum Arabico, & ad gutturis ramices, & hernias aquosas, salua matutina, ieiunaque subigentes, ut emplastri consistentiam accipiat. Porro Arabicum & calculos renium in potu sumptum frangere apparet, tum urinas ciere, & crudorum flatuum discursus, præterea laterum dolores, & rupturas persanare. Hæc tenus Galenus. Ceterum inuenio Serapionem duobus capitibus Bdellij meminisse: quorum alterum appellauit la-daicum, quod nimirum est ipsum Dioscoridis bdellium: alterum uerò cuiusdam plantæ palmæ similis fructum esse tradidit. Hoc Neapoli frequentissimum uidimus, ijsque in officinis accepimus, ubi sacchari arundines è Sicilia petitis uenduntur. Nam cum illic essem cum Bernardo Clesio Cardinali, & Principe Tridentino, qui apud Cæsarem Carolum v. inuictissimum Imperatorem agebat, multarum uidendarum rerum, quæ ad medicam materiam spectant, fuit mihi

Bdellium alte-  
rum Serapio-  
palmæ genus.

*multi facultas.* Hoc igitur palme genus (ut ab incolis accepi) ex Sicilia cum folijs palmeis, ac radice defertur cubitali, vel paulo ampliori longitudine. Ex quo facile crediderim, Auicennam capite de Bdellio, ubi Bdellium quoddam Siculū inueniri tradit, de hoc intellexisse, quod ē Sicilia ex palmarum genere deuehitur. Vocantur hæ plantæ Neapoli vulgò CEFAGLIONI. quarum quoddam duntaxat, germiculum comedunt, tenerrimum, sapidum, & ori gratissimum. Cefilionis cōsideratio. Includitur hoc mille quibusdam inuolucris, tanquam totius plantæ corculum. Hoc quidem tuberibus, & carduis, & arduorumq; echinatis c. spitibus (carcioffi, & archichiochi Itali vulgò uocant) præferunt. quandoquidem id secundis mensis pro bellarijs cum pipere, & sale solenniter assumunt, tum quòd gustuius cibus admodum arrideat, tum etiam quòd uenerem conciliet. Porro illa uulgaris Cefaglioni appellatio (quantum conijcere possumus) à Mauritanis accepta est: siquidē Serapio sic inquit. Cefilio est cor istius palme, & natura eius est, sicut natura palmerij. Quamobrem mecum sepenumero cogitavi, cum hic cibus sit suauissimus, nam Bdellium hoc illud esset, quod in terrestri paradiso in sacris literis magnus ille Moses secundo Geneseos capite reperiri sempiternæ memoriæ prodidit. Galenus insuper lib. v. iiii. simplicium medic. de palma differens, eius medullam encephalos appellari tradidit. Ex quo adducor, ut suspicer, inde Arabes Græca uoce corrupta suum Cefilionis nomen accepisse.

† Licet Saracenice arboris lectio aduitti possit, quòd Saraca, unde Saraceni dicti sunt, urbs sit in Arabia; non tamen improbanda uidetur lectio Arabicæ arboris. Quòd non solum Plinius scribat bdellum in Arabia nasci, & Galenus alterum bdellij genus Arabicū faciat; sed etiam quòd Oribasius lib. xi. legat δάκρυον ἐστὶ δένδρον ἀραβικόν. hoc est: lacryma est arboris Arabicæ.

## Λιβανός. THVS.

## CAP. LXX.

THVS in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primatum tenet in eo genere masculum, stagonias appellatum, suapte natura rotundum: tale autem † indiuiduum est, candidum, cum frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicum verò fuluescit, & colore liuet, sed rotundum industria factitant: nam in quadrangulares formas dissectum fictilibus versant, donec rotunditatem contrahat: verum huiusmodi thus tempore flauescit, quod atomum, aut syagrum appellant. Secundum locum habet † Arabicum, & in Smilo nascens, quod aliqui copiscum uocant, minus multò, & fuluius. Est & genus aliud, cui atomite cognomen est, alioqui candidum: quod dum molliitur, mastiches more digitis cedit. Adulteratur omne thus † in itinere pini resina, & gumi. quod facile deprehendi potest: siquidem suffitum gummi flammam non eiacularur, & resina in fumum euanescit, thus uerò statim ardet: idem maleficium odor prodit. Ad calfaciendum, & astringendum pollet: oculorum caliginem discutit, caua vlcera complet, & ad cicatricem perducit: cruenta vulnera glutinat, infrænatque cunctas sanguinis eruptiones, etiam si cerebri membranis effluat: vlcera, quæ cacoethe vocantur, & sedis, & reliquarum partium permulcet tritum cum eo & lacte linamentum: formicantes verrucas inter initia, impetiginesque ex aceto, & pice illitū tollit: ambusta igni, pernionesque cum suillo adipe, aut anserino, & vlcera in capite manantia cum nitro, si infricetur, sanat: paronychij cum melle, auribus fractis cum pice, medetur: ad reliquos aurium dolores cum dulci uino infunditur: inflammata à partu mammæ cum cimolia, & rosaceo magna uilitate perunguntur: additur ad arteriæ, viscerumque medicamenta: prodest sanguinis excreationi potum. Sed in secunda ualitudine hauustum insaniam mouet, & largius cum uino potum interficit. In fictili mundo thus crematur, flagrante glebula succēsum à lucerna, donec exuratur: post perfectam uisionem operire oportet, usque dum restinguatur: sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam æneo uase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, ut in eius mentione mox ostendemus. Alij crudo fictili luto oblito, & in fornacem indito, cremant. Fictili etiam nouo uiuacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut pinguitudinem, vaporemue emitat: facile enim comminuitur, quod perustum non est.

## φλοιὸς λιβάνου. CORTEX THVRIS.

## CAP. LXXI.

PRAEFERTVR thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, lauis, minimè scaber, sine membranis. Adulteratur admisto pini, aut nucis eius cortice. sed horum index ignis est: siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eructant: thuris uerò cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporem eiacularur. Thuris modo uirritur: & vis eadem, quæ thuri, sed validior, adstringentiorque. Quare potu cruentis excreationibus, uuluis fluxione laborantibus in pello confert: ad cicatrices oculorum, & caua, sordesque efficax est. tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

## Μάννα λιβάνου.

## MANNA THVRIS.

## CAP. LXXII.

MANNA thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem, quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui cribrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris contusi adulterant. Sed hæc igne deprehenduntur: neque enim æquè suffitu aerium vaporem, sed fuliginosum, & impurum expuit, & permistum sua uolentia halitus virus habet.



**FVLIGINEM** thuris sic facito. Forcipicula lucernis accensas singulatim thuris glebas in uam fictilem ollam concauam imponito: & æreo uase in medio perforato, deterfa diligenter forde obtegito: alteram admoueto, ex altera eius parte, aut utraque subiectis quaternum digitorum altitudine lapillis, quò facilius perspicì queat, si vrantur: & quà locus capax fuerit, glebular alias supponito, & antequàm prorsus prior gleba restinguatur, aliam imponito, donec sufficientem fuliginem uidearis coëgisse. Continuo tamen externæ æramenti partes spongia, aqua frigida madefacta, abstergantur: ita enim temperato æris feruore, fuligo omnis inhærebit, quæ alioqui per leuitatem decidua thuris cineribus admiscetur. Dersa itaque fuligine, cinis cremati thuris seorsum substrahendus est. Idem opus, quoad satisfactum tibi uidebitur, obeundum. Oculorum inflammationes mitigat, fluxiones suspendit, vlcera purgat, caua explet, carcinomata fistit. Simili modo è myrrha, resina, styrace, reliquisque lacrymis fuligo excipitur ad eadem conueniens.

Thuris histo.  
ex Theophr.  
& Plin.

**CVM THVS**, Thuris cortex, manna, & fuligo ab una tantum arbore proueniant, non alienum duci de his omnibus unico commentario differere. Sed primam à thure exordians, cum Dioscorides in eius scribenda historia, non late se diffundat, ut eos uoti compotes faciam, qui eam audire desiderant, hic referam, quæ ex Theophrasto lib. ix. cap. 1111. quæq; ex Plinio libro xii. cap. x1111. diligenter excerpti. Gignitur itaq; thus (ut illi prodiderunt) præter Arabiam nullis, ac ne Arabiæ quidem uniuersæ, sed priuatim cuidam loco in medio ferè regionis post Atramitis pagum Sabæorum, qui caput regni est. Tractus is spectat ad orientem undique rupibus inuius, & à dextra maris scopulis inaccessus. Sylvarum, quæ thus proferunt, longitudo est centum millia passuum, latitudo autem dimidium eius: quæ & Minæi attingunt alium pagum colentes, per quos thus euehitur uno tramite angusto, à quibus etiam thus Minæi dictum est. Siquidem hi primi fuere thuris repertores, eiusq; commercium primi fecere, maximeq; exercent. Ceteris interdictum est, his exceptis, uidere thuris arbores, ac ne Minæiorum quidem omnes (ut perhibent) ipsas arbores uidere possunt. Ius enim in thus, ipsumq; legendi potestas, tricenis tantummodo esse familiarium dicunt, quæ per successiones id sibi uendicant; quæ etiamnum ob id à propinquis populis sacræ uocantur; quòd cum uulnerant arborem, quò liquor defluat, aut cum metunt, nec seminariam, nec fructuam congressu polluunt; atq; ita religione merces augentur. Quodam promiscuum ius Minæis omnibus esse tradunt, & unoquoq; anno inter ipsos diuidi. Ceterum quam priusci Romani in Arabia bellagessere; thuris tamen arboris facies à nullo (quòd equidem legerim) Latini tradita est: neque Græcis, etiamnum autoribus (etsi plures de ea conscripserint) de eius effigie satis inter se conueniunt, licet dixerit Theophrastus, quòd arbor thuris, quæ super Sardes apud delubrum quoddam surrexit, fronde lauri consistet. Thus dumtaxat meti solebat inciso arboris cortice, canis ortu, flagrantissimis æstibus, quòd tunc esset hiemalioribus maxime prægnans, quòd postea legebatur sequenti autumno. Verum dulcedo quæstus aliam uiam attulit, quæ etiam primo uere ipsum legeretur, incisis per hyemem arboribus. Excipitur quod ex arbore profluit, atque distillat præmea tegete, ubi loci natura poscit, aliubi area circumpauit. Purius, & perlucidius illo modo, sed hoc ponderosius, minus pellucet, minusq; uiribus pollet. Vindemia uerna thus rusum emittit, nec comparandum priori: uires enim mbecilliores sibi sortitur. Creditur nouelle arboris candidius esse; quàm ueteris. Quod hæsit in arbore, ferro depectitur, ideoq; corticosum. Tradidit Dioscorides præter Arabicum inueniri & Indicum, id tamen flauescere, quòd indicat, thus & in alijs regionibus nasci præter illud, quòd ex Arabia deuehitur. Quòd etiam Theophrastus, & Plinius satis compertum haberent, quauis prius scripsissent, thus præter Arabiam nullis gigni; dixere tamen postea, quòd ex relatu acceperant, id etiam nasci in quibusdam insulis. Thus (ut scribit Galenus lib. v. 11. simp. medicamentorum) excoarctat ordine secundo, desiccatur uerò primo, paululumq; adstringit. Sed candido minimè adstrictio manifesta. Cortex eius euidenter adstringit: proinde sanè strenuè quoq; desiccatur, adeò ut ex secundo sit ordine completo desiccantium. Est autem crassiorum partium, quàm ipsum Thus, & minime particeps acrimoniæ. Ob has igitur tum facultates, tum qualitates multus est eius usus apud medicos in hæmoptoicis, stomachicis, coeliacis, & dysentericis, non tantum ijs, quæ extrinsecus applicantur, ipsum admiscentes, sed & ijs, quæ intrò in corpus sumuntur. Ramus eius (lego fuligo eius, & infra rationem reddam) tum sicioris, tum calidioris est facultatis, quàm ipsum thus, adeò ut ad tertium usq; excessum perueniat. Habet uerò etiam adsterforium quiddam: itaq; eo nomine expurgare, & implere, quæ in oculis consistunt ulcera uidetur, uelut & myrrha, & styracis. Hæc Galenus. Verum, ne quissam fortasse me perperam Galeni lectionem immutasse existimet, illud sciendum est, quòd in Galeni loco citato non solum Gerardi Gandani uersio reprehendenda (quòd tamen interpreti uitio minime dandum est) sed etiam in Græcis tum ipsius Galeni, tum Pauli Aeginetæ codicibus communis lectio deprauata uidetur: quippe ubi in thuris capite legitur apud Galenum, ὁ δὲ θαλλὸς αὐτῷ ξυροτέραις ἐστὶ, καὶ θερμότεραις ἢ κατὰ αὐτὸν τὸν λιβατωτὸν ἐν τῷ αἵματι, hoc est, ut uertit Gerardus: Ramus eius tum sicioris, tum calidioris est facultatis, quàm ipsum thus, rectius legendum putauerim, ὁ δὲ αἰθάλ αὐτῷ, hoc est: Fuligo eius etc. Quæ quidem lectio primo Dioscoridis testimonio comprobatur: qui præterquam quòd ramorum non meminit, ipsi thuris fuligini, non ramis, tum expurgandi, tum implendi, quæ in oculis consistunt ulcera, facultatem inesse testatur. Deinde id manifestè innuisse uidetur Galenus in prædicti capitis calce illa comparatione, cum inquit, uelut & myrrha, & styracis. Nam libro vii. simp. medic. de styrace agens: styracis combusti fuligo, inquit, thuris fuligini quodammodo est similis. Et libro vii. de fuligine scribens: Primam enim, ait, thuris fuligine utuntur, in ocularias medicinas mista, eas uidelicet, quæ ad oculos etiamnum phlegmone tentatos accommodantur, atq; etiam fluxione tentantur, & ulcera habent: nam & illa expurgat, & carne replet. Ad

plet. Ad hæc usurpant quoque eam ad facultates, quas uocant calliblepharas. Præterea terebinthine, myrrhæque; fuligo molestia caret, non aliter, quam thuris: sed styracis his quodammodo ualentior est. His igitur rationibus asserere non dubitauerim, hoc in loco uulgatos Græcos codices fortasse librarium incuria uocum similitudine deceptorum deprauatos esse: quodque loco huius uocis αἰθαλα, quæ Latine fuliginem reddit, successerit βαλλός, quæ rancum germinis significat. Quod etiam apertissime confirmat Serapio: qui cum hunc Galeni locum suo tempore legitimum, et incorruptum haberet, quæ hoc Galeni loco nostra ætate de thuris ramo leguntur, ea ipse Galeno accepta referens, de thuris fumo, seu fuligine legit. Quod item apud Aëtium uidere licet: tametsi Paulus hac menda non uacet, uel sui ipsius fortasse, uel potius librarium culpa. Nam aliis non possem non admirari, quod in Galeno lectionem hanc deprauatam esse non animaduertisset, quemadmodum hac in re nostra ætatis interpretes mihi quidem admiratione digni uidentur. Ceterum thus (ut Galenus scribit lib. 1111. de compos. medicamentorum per genera) concoquit, et pus mouet in temperatis corporibus, nam in humidis sarcoticum est. Præterea cum dixerit Dioscorides, thus in secunda uisitudine haustum insaniam facere, et largus cum uino sumptum interficere, hunc Auicennam errasse crediderim, quia et deprauatis sensibus, et abolitæ memoriæ thus opem præstare tradit. Porro credere nonnulli thuris Mannam apud Græcos esse, quam nostra ætate è celo collapsam super arborum frondes colligimus, quamque tanquam omnem ex parte innocuum medicamentum, et utero gerentibus mulieribus, et pueris, et delicatis deiciendis alui gratia præcipimus. Verum res quidem aliter se habet: namque Plinius, et alij complures produnt, Mannam thuris esse micæ etus concussu elisas, quod dum conuehitur, euenit. Quod etiam testatus est Galenus lib. 1111. de compositione medic. secundum locos. Sed quoniam thuris Manna mihi redegit in mentem Mannam hanc purgatoriam cælitus demissam, ut plenius legentibus satisfiat, cum huius nusquam meminerit Dioscorides, de ea tradam, quæ ex Arabum monumentis deprompsi, quæque ipse etiam in Calabria uidi, ubi laudatissima colligitur. Est igitur MANNA quidam ros, siue liquor suauis, qui ex ære ueniens sublucanis temporibus, arborum ramis, et frondibus, herbis, lapidibus, et solo interdum inuenitur herere. qui breui temporis curriculo coalescens, grumosus in gummi morem efficitur. Huius duo tantum genera ipse in Italia uidi, quorum alterum ab orientali plaga, alterum uero à Calabria defertur. Eius, quod ex oriente petitur, duplex habetur species, præstantissima altera, quam Mastichinam appellant, nomine à granorum mastiches similitudine sumpto: infirma uero, et uilis altera, quæ Bombicina nuncupatur: quippe quæ nil aliud est, quam aut euanda, et senio exhausta Mastichina, aut saccharo, aliisque imposturis adulterata. Calabriensis plurimi penditur, quæ stirpium frondibus insidens colligitur, proinde foliorum Manna cognominata, minutis granulis constans, trans lucida, grauis, mastiches granulis similis, candida, gustu dulcis, atque suauis. Secundas partes sibi asciscit, quæ ramis instat: tertias uero, quæ lapidibus, et solo inheret: nimirum hæ granulis constant crassioribus, et colore longè minus sincero. Ex ea, quæ nocte peracta è celo ceciderat, Cossentis, quæ est Calabriae ciuitas, mihi facta fuit copia super fraxineis frondibus, quæ iulapij perfecte cocti guttas prorsus referebat. Accepi inibi ab incolis, quod hæc mane legitur, priusquam sol exortus admodum excalfaciat: namque postea sole liquefacta, absortaque, facile euanesceat. Quo fit, ut plerique ubi in magna deciderit copia, summo mane arborum ramos præscindant, et in opacis collocent, ubi concretam maiori commodo legunt. Duo Mannæ genera etiamnum à Mauritanis diuersis capitibus prodita reperio: quorum alterum Mannam, alterum uero Tereniabin appellant. Tamen non aliam inter ea specierum differentiam esse constat, quam quod alia liquefscens, melli similis, alia in grumos concreta uideatur: quæ profecto illa est, quæ ad nos aduehitur. Quam uero ij Tereniabin uocant, Serapionis testimonio et ipsam esse Mannam manifestè ostenditur. Namque Abicis auctoritate, Tereniabin, inquit, febrium ardentium inflammationes mulcet, sitim extinguit, aluum mediocriter emollit, pectori, et tussi opem præstat, nec aliud est, quam Manna. Testatur Brasauolus Ferrariensis, Nicolaum quandam Ferrariæ (ut arbitror) pharmacopolam emisse à quodam Mauritano uas plenum cuiusdam Mannæ melli similis, quæ in medicamentis non satis laudari potuit. Hanc equidem ex eo genere fuisse existimauerim, quod Mauritani Tereniabin nominant: etsi Brasauolus ipse contrarium senserit, cum uelit, Tereniabin Mauritanorum eam esse Mannam, qua communiter utimur: eorundem uero Mannam esse huiusce liquide speciem. Quæ tamen sententia Arabum scriptis prorsus refragatur. quandoquidem ipse inuenerim apud Serapionem, quod Tereniabin quidam ros est è celo cadens melli grumoso similis, et quod aliter mel roscidum appellatur. Auicenna uero de Manna agens, inquit, eam gummi modo concrefcere: à quo Mesuem nihil dissentire comperio. Credidit Auerroes, et post eum alij quamplurimum, Mannam ueteribus, præsertim Galeno, incognitam fuisse. Quibus illud reclamationat, quod ipse Galenus scriptis tradidit lib. 1111. de alimentorum facultatibus, capite de melle, sic dicens. Memini aliquando cum æstate super arborum, ac fruticum, herbarumque, folia mel quam plurimum fuisset repertum, agricolas uelut ludentes cecinisse, Iupiter melle pluit. Præcesserat autem nox, ut per æstatem, satis frigida (nam tum tempus anni æstiuum erat) pridieque, calida, et sicca fuerat aeris temperies. Atqui peritis naturæ interpretibus, halitus è terra, et aquis prodeuntes, solis calore exactè attenuati ac cocti, à frigore secutæ noctis in unum coacti, ac densati fuisse uidebantur: sed apud nos raro id accidit: in monte autem Libano quotannis persæpe. Itaque coria super terram extendentes, et arbores excutientes, quod ab eis defluit, excipiunt, et ollas, ac fictilia melle implent, uocantque id roscidum mel, et ærium. Hæc Galenus de Manna memoriæ prodidit. Ex quibus eorum error deprehenditur, qui putant hanc ei fuisse incognitam. Existimandū igitur est, quod hunc Arabes suum deduxerint Tereniabin; præsertimque eum scribat Serapio, hoc ab eis mel ærium appellari. Huius etiam memini Plinius lib. 11. capite 111. his uerbis. Venit mel hæc ex aëre, et maxime siderum exortu, præcipueque ipso sirio explendente fit, nec omnino prius uergiliarum exortu sublucanis temporibus. Itaque cum prima aurora, folia arborum melle roscida inueniuntur. At si qui matutino sub dio fuere, unctas liquore uestes, capillumque concretum sentiunt. Siue ille est calidi sudor, siue quedam siderum salua, siue purgantis se aeris succus, uti-

Auicē. lapsus.

Māna thuris.

Mannæ celestis historia, & genera.

Mannæ Arabum.

Brasauoli lapsus.

Mannæ historia ex Galen. Pli. & Theop.

nam effect

Manna in com-  
mitatu Gori-  
tienti, & Foro  
Iulii.

Monachorū  
opinio explo-  
sa.

Manna secto  
arborum cor-  
tice manans.

Serap. lapsus.

Mannæ tem-  
peramenti, &  
uires.

nam esset & purus, ac liquidus, & sue naturæ, qualis defluit primò. Hactenus Plinius. Sed tam antiqua Manna  
est, ut ante Galenum, & Plinium, eius etiam meminerit Theophrastus Hesiodi auctoritate, lib. III. cap. IX de pla-  
tarum historia, his uerbis. Sin autem autore Hesiodo, mella, apesq; quercus ferat, magis quoq; illud confirmatur. En-  
go nascitur uel hic mellis humor è celo cadens, in hac maxime insidens. Mannam utriusq; consistentie è celo de-  
missam uidimus in Comitatu Goritienti, uniuersq; Foroiulienſi agro, ac circumuicinis locis, Anno à CHRISTO  
nato. M. D. XXXXVI. maio, & iunio mensibus: fuitq; mihi ambarum colligendarum amplissima facultas. Siqui-  
dem ea, quæ fici, fraxini, & orneoglossi frondibus inherat, gummi modo concreuerat, colore candida. At quæ super  
amygdalæ, persicæ, ac quercus folia deciderat, mellis modo liquefces ab arbore defluebat, flauo colore. Quo factum  
est, ut facile crediderim, quòd non sui ipsius facultate gummi modo Manna concreſcat; sed foliorum, in quibus delapsa  
recumbit. Quare ab Arabibus diligentissime perspecta, utriusq; Mannæ historiā diuersis per se capitibus suis mo-  
numentis prodidere. Sed profectò non admittenda, quin potius explodenda uidetur sententia Monachorum, qui in  
Mesuem commentarios scripsere, eim pro certo asserant, sirio ardente Mannam non soliam roris modo super arborum,  
& herbarum folia reperiri aëris, & celi clementia; sed etiam ab arboribus, fraxino scilicet, & orneoglossi  
absq; aliquo celi rore, gummi modo inciso earum cortice in lacrymas concreſcere. Quod tamen ut à rei natura,  
ita etiam à ratione, & à ueritate abhorre putauerim. Siquidem ea Manna, quæ inciso harum arborum cortice in  
Apulia, & Calabriensi agro hac ætate canicularibus diebus collacrymare cœpit, nullus quidem plantæ liquor est, sed  
ipsa eadem Manna, quæ diebus superioribus easdē in arbores ab aëre deciderat. Nam cum illis regionibus usu ueniat,  
quòd præ cæteris prædictæ arbores eo mellis suo rore affatim, abundeq; madescant, sitq; cortex solis ardore nimio  
tiens, ac rimosus, magnam liquoris quantitatem intra se absorbet. Quo fit, ut postmodum exurgente canicula inciso  
dem cortice idem liquor exiliat, & in grumos concreſcat: qui tamen cum leues, fungosq; sint ob arboris succi mix-  
tionem, infelicitè operantur, nec alterius Mannæ uiribus correspondent. Quòd autē id tantum fraxino, orneoglos-  
soq; eueniat, cum melleus ille ros in uniuersum omnes occupet plantas, in causa est harum arborum nobis occultæ po-  
testas, ut magnetis ad ferrum, & succini ad paleas. quippe omnibus clarum est, apud Calabros, & Apulos solam fra-  
xinum, eiq; congenerem orneoglossum Mannam in se contrahere, retinere, densare, ac cobibere: ex alijs uerò arbori-  
bus eandem statim defluere, & in subiectas herbas, petras, solumq; diffundi. Quare ab his duntaxat arboribus inciso  
cortice non sanè primò, & secundum naturam, sed ex accidenti defluit Manna. Verum optimi illi patres cõtenti (ni  
fallor) cortice, internis illarum arborū partes penetrare neglexerunt. At incolæ, qui ex maiori huius liquoris pro-  
uentu, plus auri referunt, rei naturam diligentius inuestigauerunt. Ceterum ex his, qui thuris Mannam celestem bac  
esse crediderunt, unum Crinitum Florentinum fuisse comperio. In cuius censuram Manardus Ferrariensis libro pri-  
mo suarum epistolarum peculiare epistolam conscripsit. Veruntamen uenia illi danda est, cum & Serapio, qui Ma-  
ritanis omnibus in simplicium medicamentorum historia præstitit, thuris Mannam cum celesti ineptè confundat. Me-  
minit Mannæ inter alios Græcos etiam Actuarius libro de medicamentorum compositione, ibiq; de eius uiribus ac sa-  
cultatibus disseruit. Manna tam Auicennæ, quàm Mesuis testimonio, æquali fere temperamento consistit, licet ad co-  
lidum paululum inclinet: at Auerroï calida, humidatq; habetur. Aliam deuorata, aut hausta ciet, per se tamen in-  
becilliter. Ideoq; tum foeminis utero gerentibus, tum pueris ipsis tutò semper exhiberi potest. Alijs medicamentis ad-  
dita uires eoriam auget. Bilem facile educit: sitim extinguit, aperit, emollit, leuigatq; gulæ, pectorisq; partes. Quæ  
ex Alexandria Aegypti adfertur Mastichina uocata, uno duntaxat anno in suis uiribus persistit: sed quæ in Italia pro-  
uenit, præsertimq; Calabriensi agro, pluribus annis incorrupta perdurat.


† ἄτομος. Hæc dictio hic, & paulò post legitur in uulgaribus Græcis codicibus: qua in primo loco thus natu-  
ra rotundum insignitur, in secundo uerò arte tale factum cognominatur. Sed quia absurdum uidebatur Marcello, &  
Dioscoridem usum fuisse homonymia, ideo mutauit lectionem, alterum scilicet ἄτομον in ἐντομον, ad rem nomen  
accommodans. Quam tamen lectionis mutationem minime probat Manardus: qui præterea dubitat, quo modo ἄτο-  
μος Latinis sit reddendus. Hæc difficultates mihi quidem uidentur ab Oribasio sublata lib. xii. ubi primò non ἄτο-  
μος, sed ἄτμιος legitur, quæ uox sine controuersia ille sum, atque non scissum thus facit: secundo uerò nihil legi-  
tur. quod argumento est atomum secundum accreuisse Dioscoridi. Legitur autem σπᾶγρος, quæ uox ut est illius  
factitij thuris cognomentum, Oribasio teste, legitimum, ita non mutanda uidetur.

† Hic uulgaris lectio habet, ὁ ἀραβίας, καὶ ὁ ἐν σμίλῳ, ὃν ἐννοῖ κοττίσκον καὶ λαύσι, id est: Arabias, & in  
Smilonaſcens, quod aliqui copiscum uocant. Marcellus non ἀραβίας sed ὁρόβιος legit. Cui lectioni ad stipulam  
Oribasius libro xii. ubi ὁ ὁρόβιος tantum, reliqua uerò ut addititia non leguntur.

† Exemplaria Græca uulgata hoc in loco legunt μεθοδεύομενος: quæ uox, in itinere, à Ruellio, et artificiosè cor-  
formatum, uertitur à Marcello. Sed equidem eam aduentitiam putauerim, quòd non legatur ab Oribasio.

PICEA.

PINVS.



ΠΕΥΚΗ, καὶ ΠΙΤΥΣ.

PICEA, ET PINVS.

CAP. LXXIIII.

PINVS, ET PICEA generi eidem ascribuntur, sed quandam flagitant specierum distinctio-  
nem. arbores vulgò cognitæ. Quarum cortex astringit: prodest tritus, & illitus intertrigini, vlce-  
ribus summum corpus occupantibus, ambustisque cum spuma argenti, & manna: vlcera delictu-  
lorum acrimoniam recusantium cerato myrtino exceptus ad cicatricem perducit: tritus cum su-  
torio atramento serpentia cohibet: suffitu partus, & secundas eijcit: potus aluum sistit, vrinâ mo-  
uet. Folia eorum trita, & illita inflammationes leniunt, vulnera ab inflammatione vindicant: tri-  
ta autem, & decocta in aceto feruenti collutione dentium dolores mulcent: hepaticis vtilia sunt  
drachmæ pondere in aqua, aut mulsa pota. Pineæ nucis cortex, & folia potu idem præstant. Teda  
earum particulatim secta, si in aceto coquatur, & decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his e-  
tiam fit spatha acoporum, pessorumque compositionibus idonea. Quinetiam earum crematarum  
fuligo ad librarij atramenti confectionem excipitur: ea circumlitionibus efficacissimè imponi-  
tur, quibus palpebras ornant, coloremque mentiuntur, calliblephara Græci vocant: arrosio ocu-  
lorum angulis, callosis, glabrisque genis, & collacrymationibus opitulatur. Pityides appellantur  
pinorum, piceæque fructus, qui in conis inueniuntur. Vim astrictoriam habent, & aliquantulum  
excalfacientem: tussi, & pectoris vitijs auxiliantur, per se, aut ex melle sumpti. Nuces pineæ cum  
repurgatæ manduntur, aut cum passo, aut cucumeris semine bibuntur, vrinam cient: acrimonias  
in renibus, & vesica hebetant: stomachi rosiones leniunt. datæ cum portulacæ succo, virium in-  
firmitatem roborant, corruptorum quoque humorum labem obtundunt. Pineæ nuces integræ  
recenter arboribus decerptæ in passo franguntur, & decoctæ, vetustæ tussi, ac tabitudini conferunt,  
si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

NOSTRÆ nimirum negligentæ ascribendū foret, cum nos assidue habeant pinorū, abietum, picearum, & la-  
ricū sylue, nisi harum omnium amplius, an, uerumque historia traderemus: eoq; magis ad hoc teneri uideor, cum animadu-  
uerterim Plinium, recentiorumque nonnullos eum secutos in huiusmodi plantarum historia, qui resinas fundunt, longè  
ab eo dissentire, quod in Tridentinis montibus nostris oculis perspectum, apud alios etiam testatum relinquere possu-  
mus. Rem itaq; a Pinu exordiens, inuenio Theophrastum libro III. capite x. de plantarum historia, duas Pini spe-  
cies adnotasse, domesticam alteram, alteram uerò syluestrem: huiusq; in maritimam, & montanam distinctionem fe-  
cisse, hisce uerbis. Pinorium aliam urbanam, aliam syluestrem assignant. Syluestris binum statuunt genus, quorum al-  
terum

Pini historia,  
cuiusque gene-  
ra.



terum *Ideam*, alterum *maritimam* uocant. Harum rectior, celsior, materieq; crassior *Idea*: folio imbecilliori, tenuisq; *maritima*: & cortice leuiori, utiliq; ad coria. quod alteri minus. *Nux maritimæ* rotunda, breuiq; debilis: *Idea* oblongior, uiridis, minusq; hiscens, tanquam syluestrior. Hactenus Theophrastus. Cui in nostro climate refertur, quæ sensibus clarissime patet experientia. siquidem agrestes, quæ plurimæ in maritimis nostris Senescibus proueniunt, fructum ferunt spitham oblongum, pyramidalem, firmum, ac solidum, nec per se facile dehiscen- tem. Quæ uero numerosa uirescunt in Ananijs, reliquisq; Tridentinis montibus, fructu constant paruo, breui, qui quam primum aruerit, affatim dehiscit, & ex arbore decidit. Sed id euenire existimamus, climatû, & regionum uarietate, uel etiam quod maritimæ plura sint genera. quâdoquidem in maritimis Pisanum oris syluestres proueniunt pini, qui breues rotundasq; nuces edunt, cupressi modo. Quinetiam in eodem Tridentino agro ipsidem Ananijs, & uallis Fiemarum montibus aliæ duæ syluestrium uisuntur species à prædictis longè figura disidentes: quarum unam uulgò Mughi incolæ uocant. quæ sine stipite medio, ramos circunquaq; à radice fundentes humi repunt spatio cubitorum decem, quâdecimq;: quales etiam apud Ananios Rouena monte, & in alijs plerisq; harum uallium locis aperte confici possunt. Proferunt hæc fructus paulò maiores cæteris syluestribus, sed qui magis resinam fundant. Harum ramis utuntur uicæle ad uasa uinaria cingenda: sunt enim tenaces admodum, & flexiles. Alterius uero speciei sunt, quas Cembali, & Cirmoli uulgò uocant, quarum numerosissimas plantas ipse sepe, ac sæpius uidi, tum in Gauiæ Phœbeæ uallis, tum in Fiemensibus, Vulturenæ, & Rhetinorum montibus. Hæc quidem speciosa proueniunt proceritate, ita ut ad tabulas parandas materiem non modò pulcherrimam præbeant, sed etiam suauiter odoratam: attamen non tanta assurgunt dititudine, quanta cæteræ syluestres. Ramos è caudice promunt, ceu & picea, qui pini frondibus uirent. Caudicis cortex nò ut pino subrubet, sed abietis modo subalbet. Fructus tam longitudine, quàm crassitudine piceo æquè similis est, breuior tamen, resinosus, colore in nigrû purpurascens: inter cuius nucamenta nuces recluduntur domesticis similes, minores tanè, triangulares, breues, fractu faciles, ut quæ dentibus facile cedant: sapore quadantenus domesticis referunt, nisi quòd gustui quandam penè insensibilem relinquunt asperitatem: quod omnium syluestrium proprium est. Ab his resina tum alba, tum odorata, ueluti ab alijs sui generis manat. Tabulæ ex his paratæ ad extruenda edificia Germanis plurimi fiunt, non modò quòd pulchra uenarum serie placeant, sed quòd odoris fragrantia præstent: id enim ad eorum hypocausta paranda, quibus maxime ob frigidissimam regionis temperiem & indigent, & utuntur, plurimè offert ornamentum. Ceterum non potui nò admirari dixisse Plinium, scandulas è pino ad contegendas domos, ex omnibus, quæ resinam fundunt arboribus, aptissimas esse, cum laticè non ignoraret materiei præstatiâ, duritiæ, & firmitatè, nulli equiparandæ esse. Præterea scribit Theophrastus (nos id quotidie uidemus) quòd pini interitus est, ut teda fiat. Cuius uerba sunt hæc loco supra citato. Morbum pinis accidere talem *Ideæ* incolæ narrant, cum non solum cor, sed etiam pars externa caudicis in teda transiuerit, tunc strangulari quodammodo. quod sponte accidit ubertate arboris largissima, quoad quis coniectare possit: teda enim totû efficitur. Ergo hæc pini propria affectio est. Quare autè pinus teda fiat, scribit idem Theophrastus lib. v. cap. xv. de causis plantarû, sic inueniens. Pinus enim radicem agit teda totam refertam, ut ante dictum est. Ratio eadem, quæ in animalibus est, quòd pars alimenti, quæ ferbuerit, excostiq; sit, quomiam purgatissima est, asidet: & collecta, desat atq; pinguedinem reddit. Reliquum uero sursum transmissum, partes, quæ supra terram eminent, nutrit: non per illam pinguedinem subiens, sed per alios quosdam meatus. Nam quæ in teda omni ex parte mutata sint, obesitate moriuntur, ut dictum est: cum enim nullum transitum habeant, spiritus strangulantur, sicut animalibus accidit, quæ ultra modum pinguerint. Hæc ille. Ceterum quòd teda opus sit ad picem conficiendam, non defuit sanè ratio, qua etiam arte fieri possit, ita ut pinus non sua utiq; sponte, sed artificio teda fiat. Id enim idem docuit Theophrastus libro ix. cap. i. de historia plantarum, his uerbis. *Ideæ* ubi arboris caudicem cortice dispoliarint, quod parte solari, binis, aut ternis à terra cubitis facere consueuere, confluxum istuc fieri non sine teda uno cum plurimum anno affirmant. Idq; cum securi detraxerint, secundo iterum anno teda locum expleri: & tertio pari modo. Posthac ob eam paulatimam incisuram arborem extenuatam, putrefactamq; bium facile à flatu prosterni, tum eius cor extrahi (hoc enim teda maxime præfert) necnon et radicem effodi. Hæc etiam ille. Quibus palam est contabescere pino, tam sponte, quàm arte fieri oririq; teda. Quamobrem putauerim hæc in re nò parum cecutisse Plinium: quippe qui lib. xv. cap. x. ubi resiniferas enumerat arbores, teda propriam, & per se esse arborem censet, cum inquit. Sextum genus est teda propriè dicta, abundantior succo, quàm reliqua: parciore liquorq; quàm picea: flammis, ac lumini sacrorum etiam grata. Et lib. eodem cap. xv. i. i. Nunc, ait, celeberrimis arborum dictis quædã in uniuersum de cunctis indicanda sunt. Montes amant cedrus, larix, teda, & cæteræ, è quibus resina gignitur. Hæc Plinius. Verum si quis Plinij defensor diceret, per teda ipsum hoc in loco non aliud intelligere, quàm pinum, itaq; eum tueri uellet, hanc tutelam illud (ut puto) uanam esse ostendit, quòd cum eo capite Plinius resiniferas arbores omnes per genera describat, et primum omnium genus pinum faciat, nullo pacto pinum pro teda accepisse uideatur, cum sexto resinarum generi teda postea adscripserit. Hinc fortasse & Marcelli error defluxit, qui in hoc Dioscoridis capite, pinum teda interpretatur. In hoc etiam uersatur errore Adamus Lonicerus Ruellien secutus in suo de plantarum historia uolumine, ubi fictam potius, quàm ueram arborem pro teda pinxisse uidetur. Sed animaduertendum est, non è pinu tantum fieri teda, sed ex alijs etiam plantis resinam fundentibus, nempe Larice, & picea: à quibus nos in Ananien- sibus syluis pinguis- simam excisimus. Quapropter dicebat Theophrastus lib. i. i. i. cap. vi. de historia plantarum, quòd in Ponto ex syluestribus desint pinaster, abies, atq; picea, & omnino quæ teda in se se gerunt. Quibus clarè patet, alias præter pinum arbores esse, quæ in teda contabescunt. Sed quòd id morbi magis pino eueniat, quàm cæteris, propria pini affectio esse creditur. Quo fit, ut & in hoc Plinium errasse crediderim, qui non pini, sed laricis morbum esse ait, ut teda fiat: ac eadem omnes attribuit tum uires, tum notas, tum qualitates, quas

Plinii lapsus.

Teda cõsideratio.

Plinii error, & quorundã.

Plinii & Ruellii error.

quæ Theophrastus pino reddidit. Quare cum Ruellius cum sibi familiarissimum ab huiusmodi lapsu vindicare  
 uellet, non mirum, inquit, quod in hoc Plinius equiuocatione sit usus, quando & perpetua fronde perinde ac pinus, sit  
 Larix, & situs idem in montibus, eademq; facies, minime animaduertens, quàm magno ipse quoq; fuerit errore implici-  
 tus: quicquidmodum & recentiorum alij. Quandoquidem pro certo attestari possum, laricem me uidisse nunquam  
 (et si centenas laricum sylvas uiderim) cui per hyemem folia non deciderent, & quæ tantam contraheret cum pino  
 cognationem, quantam Ruellius tradidit. Itaq; ut uera eius quoq; promulgetur hystoria, hic ea de larice differemus,  
 quæ & uidemus, & experientia comprobauimus. LARIX igitur arbor est eximie proceritatis, cortice perquam  
 crasso (non autem leuiori, quàm picea, ut Adamus Lonicerus scribit) in rimas undique dehiscente, intusq; rubente:  
 ramos gradatim circa stipitem totum emittens, adnatis compluribus salicis more lentis, colore luteo, odore non inui-  
 10 curdo: folijs circum ramulos prodeuntibus, densis, oblongis, mollibus, comosis, pincis angustioribus, minime acue-  
 tis, quæ aduentante hyeme pallida effecta ad caudicis radices decidunt, ibiq; marcescunt: ita ut sola Larix inter ceteras  
 resinas fundentes arbores, spreta omni algoris immanitate, nuda per hyemem uitam transigat. Nouella cupressum  
 prorsam emulatur, non autem piceam, ut Ruellio placet. Eius coni (quanquam credidit Plinius laricem sterilem es-  
 se) cupressinis admodum similes sunt, neq; ingratum efflant odorem. Veruntamen flores longè odoratiore sunt, qui  
 uere emergentes è ramusculorum cacuminibus arborem uiuicam mirum in modum condecorant. quippe cum in pur-  
 pura erdenter rubescant, comantibusq; foliolis, miro quodam nature artificio annectantur, non parum uiatorum ocu-  
 los remorantur. Ligni materies durissima, præsertimq; rubescens, & in caudicis medulla sita: eaq; propter in ædi-  
 ficijs omnibus extruendis, ceteras longè præcellit. Vanam profecto est credere (ut Plinius, Vitruuius, & recentiorum  
 pleriq; perhibent) quod nec flagret Larix, nec in carbones uertatur, sed ueluti calcarium saxum in fornace  
 20 curatur. Quandoquidem baud rectè cum fornacibus ageretur, in quibus sit ferrum in Tridentinis montibus, & in ea  
 præsertim ualle Ananijs contermina, quam Solis nuncupant, ac alijs multis Canonice, & Eliotropie uallis fornaci-  
 bus, in Brixiensi agro, si larigno carbone carerent, cuius inibi maxima conflatur copia. Namq; (ut referunt in hac  
 arte periti) nullo alio carbone in fornacem indito rude ferri metallum tam celeriter colliquescit, quàm lariceo. quin  
 & lignum eius siccum cum abunde sit resinosum, impetu flagrat perquam uehementi. Quamobrem in Tridentinis  
 montibus laricinis tantum lignis furnos incendunt, tam eos, quibus panis coquitur, quàm quibus hypocausta calefiunt.  
 Ceterum selectissimum agaricum in larice prouenit. namq; ipse quidem sæpius in Ananiensibus montibus præstan-  
 tissimum agaricum parua quadam securi à laricibus quàm pluribus deiecti, emiq; sæpius ab his, qui resinas colligunt.  
 Nasatur etiam agaricum (ut prodit Plinius) in Gallia, non in larice duntaxat, sed in alijs arboribus, præsertim glæ-  
 dferis. Dioscorides, sicuti & Galenus, non satis compertum habet, an Agaricum fungus sit, aut radix, licet asserat in  
 30 cedro gigni. Brasauolus Agaricum Comachij in ilicibus inuenisse fatetur, necnon per Galliam equitans, id uidisse ait  
 quercuum caudicibus inherere. Enimuero ipse in tota Hetruria, in alijsq; quàm plurimis Italiæ locis, deniq; in multis  
 Germaniæ, Carniolæ, Dalmatiæq; prouincijs, ubi syluæ quercubus, ceris, ilicibus, suberibusq; refertæ conspicuntur,  
 non solum nunquam uidi, sed ne quidem audiui in his agaricum prouenire: tametsi illis inherere uiderim fungos  
 alios plurimos lignea materie concretos, dueros, ac nigros: quibus ubiq; passim fomites fiunt ad suscipiendum ignem,  
 cum è filice cabybe excutitur: quinetiam ijs ignitis ad machinulas exonerandas uenatores frequentissime utuntur. Ad  
 hæc quando in Tridentinis montibus, præsertimq; Ananiensibus præter abietes, pinos, larices, & piceas, innumera-  
 biles adsint quercus; in nulla tamen agaricum, præterquam in larice nascitur. Porro ex larice etiamnum præstan-  
 tissima illa resina manat, quæ falsò officinis terebinthina uocatur, cum terebinthina ex terebintho proueniat. Verum  
 cum mercatores præterito iam æuo terebinthinam ad nos minime afferrent, ob idq; larigna eius loco uterentur tū me-  
 40 dici, tum myropolæ, facile factum est, ut Larigna ex usu sibi terebinthinæ nomen uendicauerit. Quippe etiam Galeni  
 tempore liquida picea terebinthinæ loco uendebatur, ut ipse libro tertio de comp. medic. per genera memorie prodi-  
 dit, sic inquit. Ex harum genere est & Larigna uocata, prædictis planè humidior: substantia uerò similis liquide  
 piceæ, quàm loco terebinthinæ institores uendunt ignorantibus eas discernere. est autem talis resina odore gustu, &  
 facultate, quàm terebinthina acrior. Cum hac igitur, & terebinthina, larigna uocata persimilem potentiam obtinet,  
 sed tenuiori substantia, maioreq; discutiendi uirtute prædita est. Hanc Tridentini, ac etiam qui ijs cõtermini sunt, uera-  
 naculo sermone Largà appellant, deflexa à larice, à qua emanat, appellatione. Hæc tamen sponte sua non defluit: sed  
 qui ipsam colligunt, magno, & longo terebro laricis caudicem ad medullam usq; per æstatem perforant, & inde ma-  
 nantem resinam uasculis quibusdam è piceo cortice paratis excipiunt. Splendidiorem mittunt iuenculæ arbores, si-  
 cuti de thure diximus: turbidiorem uerò annosæ. Reperitur præterea in annosis laricum caudicibus prope me-  
 50 dullam ipsam pannum quoddam albicans quandoque cubiti amplitudine, corio, ex quo chirothece conficiuntur,  
 adeo persimile, ut uix alterum ab altero discerni possit. Utuntur hoc incolæ ad uulnera glutinanda, & ad san-  
 guinis fluores compescendos. Ceterum admodum inter se similes ex his, quæ resinam fundunt, arbores sunt  
 PICEA, & ABIES, ita ut sæpe etiam lignarios fabros fallant. Siquidem eadem utriq; proceritas: ambe iisdem  
 sunt folijs oblongis, duris, ac densis: utriusq; ramusculi produntur crucis in morem à duorum duntaxat ramorum la-  
 teribus exeuntes: quod & folijs euemut. Veruntamen hoc tantum discriminis inter se habent, quod piceæ folia colore  
 sunt abiegnis longè nigriora, quin & paululum latiora, molliora, leuiora, minusq; pungentia. Præterea piceæ cortex  
 nigrescit, tenax est, lentus, & lori modo flexilis: abieti uerò albicat, & si flectatur, facile perfringitur. Piceæ rami  
 plerumq; ad terram flectuntur: quod in abiegnis non uisitur. Lignis deniq; materies piceæ multò speciosior, ac etiam  
 uilior: habet enim uenas rectiores, minusq; nodosas. In picearum genere sola foemina fructus adfert, sed in Ananiensibus,  
 ceterisq; Tridentinis montibus abies omnis infructifera est, et si Plinius abietem fructiferam fecerit. Picea fert  
 resinam

Laricis hysto-  
ria.

Error Plinii,  
& Vitruuii.

Agaricum la-  
rici innascēs.

Resina lari-  
gna.

Pannum in la-  
rice nascens.

Piceæ, & A-  
biegnis hystor.  
Symon & Iacob

Abietis lacry-  
ma.

resinam inter corticem, et lignum gummi modo concretam, licet nonnunquam ex ea defluat liquida, larigna scilicet. Abies uero inter corticem et corticem prestantissimum liquorem illum concludit, quem uulgo LAGRIMO, quod abietis lacrymam, appellant, de quo ueteres nihil (quod scierim) posteritatis memorie prodidere. Nisi quisquam exerit per abietis lacrymam intellexisse Galenum libro 111. de compositione medicamentorum per genera paulo citato, piceam illam liquidam resinam, quam pro terebinthina institores uendebant. Cuius rei illud indicium esse uetur, quod scribat ipse, hanc et gustu, et odore terebinthinae esse persimilem, quod in abiegna lacryma maxime notatur: et quod insuper sit quadantenus terebinthina acrior: namque huiusmodi qualitates in liquida piceae resina minus reperiuntur. Quo fit, ut suspicandum putauerim, in his Galeni uerbis librariorum fortasse culpa mendum aliquod fuisse; licet constet antiquos scriptores in arborum resinas ferentium historia in quam plurimis inter se differre, et de teram saepe pro altera (ut supra diximus) substituere. Auxit mihi suspicionem hanc Galenus: quippe qui scripsit, deinde eodem libro in Euphorbij medicamento, inter resinas ceteris odoratiores haberi terebinthinam, et abiegnam, hancque illa calidiorem esse. Falluntur autem, qui putant abiegnam lacrymam, clarissimam esse larignam: quidem illa inter abietis cortices uomicae modo coaceruatur, et secto corio (ut in abscessibus sanie uexatis fieri solet) elicitur: haec uero manat e laricis caudice ad medullam usque perforato, ut ego experientia doctus facile attestari possum. Nam, ut rem omnem hac in historia exactius exploratam haberem, et a larice larignam, et ab abiete abiegnam per memet elicere libuit, Sunt qui huic illam admisceant, ut hac impostura magis lucrentur, eo quod omnes abiegnam plurimi faciunt, quam larignam. Nec desunt qui percolatam larignam, et ad ultimam claritatem redactam pro abiegna uenditent, cum rarissimi reperiuntur myropolae, qui rectius alteram ab altera dignoscant. Sed fraus cognosci potest, quod abietis lacryma substantia minus consistat, odore prestantissimo fragret, et gustui larigna sit anarior, alannumque asseruata quadantenus flavescat. Ea uulneribus recentibus maximum affert praesidium, quod non solum glutinet, sed et mundet, et sarcotica habeatur. Pota renum calculos eiecit, arthriticos dolores mulcet, coxendiciumque citatus lenit. Capitis uulnera mirifice sanat, adeo ut hac sola nonnulli utantur. Additur et in antidotis balsami uice.

Abiegna lacrymae uires.


Affirmat Ruellius abieti croceum florem innasci: uerum in Tridentinis montibus, ubi undique ea montes solueunt, Abies omnis est et floribus, et fructibus infecunda.

ΣΧΙΥΟΣ.

LENTISCVS.

C A P. LXXV.

*Nastur Lantim*



Lentisci con-  
siderano.

LENTISCVS in Italia frequentissima nascitur, praesertimque in Hetruria maritimis nostris Senensibus. Gignitur in collapsis Romanorum edificijs, ac rudibus. Quinetiam in tractu Tyrrheni ubique copiosa oritur, in Campania maxime. Ceterum Lentisci nonnullae sunt plantae, quae in arborem mediae proceritatis assurgunt: nonnullae uero humiles, quae nullo grandiore caudice a radicibus sublato, sed uirgultis, stolonibusque; innumeris corylorum syluestrium modo disiliunt. ueruntamen Lentiscus tum ramis, tum folijs densior constat, magisque uirgultorum cacuminibus

LENTISCVS nota arbore est. Cui tori uis inest astringendi: semini enim, folio, ramo, cortici, radicibusque cognatae insunt uires. Liquamentum autem ita fieri solet. Folia, cortex, & radix in aqua coquuntur, & ubi abunde cocta, refrigerataque sunt, folia abijciuntur: aqua denuo coquuntur, donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua astringendi dote, ualet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu: item contra eruptionem sanguinis e nula, & eiusdem, aut sedis procidetia. In totum acaciae, & hypocistidis uicem repraesentat. Idem facit succus e tritis folijs. Decoctum fortu caua explet, & fracta ossa ferumminat, uuluae fluxiones sistit, noimas arcet, urinam pellit, motus dentium collutione stabilizat. Virentes furculi calamulorum uice dentibus repurgandis affricantur. Fit e semine oleum astringentiorum uim habens: quod prodest, cum quid astringi opus est: Lentiscus resinam gignit, quae lentiscina cognominatur, & ab aliquibus mastiche. Pota utilis est sanguinem reijcientibus, & tussi ueteri: stomacho auxiliatur, sed ructum mouet. additur in dentifricia, & illitiones faciei, ad nitorem cuti conciliandum: palpebras oculis incommodas replicat: manducata: halitus oris commendat, gingiuas contrahit. Optima, & copiosissima in insula Chio prouenit. Praefertur, nitedulae modo, resplendescens, & candore Tyrrhenicae cerae similis, adulta, retorrada, friabilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris, resinisque pineae nucis mistura.

bus ad terram deflectitur. Folij utraq; est pistacij graueolentibus, pinguibus, friabilibus, & in obscurum uircentibus, in ambitu tamen rubent, sicuti et quibusdam uenulis. Perpetua fronde uiret. Cortice est subrufo, lento, tenaci, flexuoso. Profert terebinthi modo, præter racemosos fructus, folliculos corniculi modo intortos, in quibus includitur liquor limpides: qui tandem ueterascens uertitur in bestiolas ijs persimiles, quæ ex ulmi, et terebinthi folliculis exolat. Tota plâta grauer olet: quapropter nonnulli, quod olfactu caput aggrauet, ipsam deuitant. Sed Lentiscum, quæ roboris magnitudine proueniat, folio sorbi, acinis syluestris punicæ rubentibus, ut Ruellius scribit, hæcenus non uidi, nec id unquam me legisse memini apud probatos autores. Idcirco Ruelliū hac in re hallucinatum crediderim. quæ admodum & Hermolæum, quia ea esse lentisci folia existimat, quibus coriarij Venetijs pelles corificiant, uirgō propriè appellata folia. Siquidem planta, à qua hæc folia decerpuntur, maxime à lentisco differt; & si cum terebintho aliamquam habeat similitudinem. Fert etiam Lentiscus Italica mastichen, ut ipse attestari possum: quanquam non ea copia, quæ in Chio, & Creta Aegæi insulis. Itaq; immerito à nonnullis notatur Auicenna, quod mastichen Italianam morte prodiderit. Quippe quod ijs, qui maiori in errore uersantur, existimauerint non alibi fuisse, quàm in Chio nasci. Indicam mastichen è spinosa quadam planta manare, non solum Theophrastus, sed etiam alij tradidere, quemadmodum & Plinius: qui lib. xii. cap. xvi. non modò Chia mastiches meminit, sed aliarum quoq; quæ in Arabia, Asia, Græcia, Pontoq; proueniunt. Lentisci meminit Galenus lib. viii. de simp. medicament. facultatibus, sic inueniens. Lentiscus facultate ex aquea essentia leuiter calida, & terrena frigida non pauca compositus est, ob quam & moderatè adstringit. Desiccatur igitur secundo ordine completo, aut tertio incipiente: in caliditatis, & frigiditatis differentia quodammodo est medius, & symmetrius: Similem omnibus sui partibus adstrictionem obtinet in radicibus, ramis, extremis turionibus, germinibus, ac folijs, præterea fructu, & cortice: ac si succum ex folijs eius uiridibus exprimamus, similis hic ordinis est, moderatè adstringens. Itaq; bibitur & per se, & cum alijs medicamentis, quæ dysenterias, & alui affectus sanant. quoniam & ad sanguinis expuitiones, sanguinisq; ex utero eruptiones, tum sedis, uulueq; proceritatis idoneus est, utpote ad hypochrystida nonnihil prope accedens. Meminit idem & mastiches libro vii. simpli. med. his uerbis. Mastiche candida quidem, & Chia consueto more cognominata, quodammodo ex contrarijs composita facultatibus est, adstringente uidelicet, & emolliente: Proinde stomachi, uentris, intestinorum, iccorisq; inflammationibus competit, ut puta secundo ordine excalfaciens, & desiccans. Nigra uerò, quæ Aegyptia cognominatur, tum magis desiccatur, tum minus astrictorie facultatis est particeps: quoniam aptior est ad ea, quæ ualidiorē digestionem per halitum exposcunt. hæc igitur ratione & furunculis bonum est remedium. Porro oleum, unguentumq; mastichinum ex Chia conficitur, non admodum sanè ex Aegyptia. ceterum similis est & ipsum mastiche facultatis. Hæc de lentisco, & mastiche Galenus posteritatis memoriæ prodidit. Sed cum mastiche mihi Caphuram in memoriam redegerit, quod certò sciam, eam mastiche, ardenti aqua, xedoariq; ab impostoribus adulterari, cumq; Dioscorides, Galenus, & ceteri illius seculi scriptores ipsam non solam non adnotauerint, sed ne nouerint quidem, silentio minime dissimulandum fore putauimus, quò magis legentibus satisfiat, quantum tum à Serapione, tum etiam ab his, qui meridianam plagam, & Indiæ ora hoc æuo nauagationibus perlustrarunt, memoriæ proditum est. CAPHURA igitur est gummi arboris cuiusdam in India nascentis tanta magnitudine, ac proceritate, ut sub eius umbra hominum centurie recondi possent. Nascentur hæc arbor in montibus mari propinquis, materie leui, ferulacea, qua prodit Caphura. Huius largioris prouentus augurium est, cum frequentibus celum fulgetris corruscat, aut crebro tonitru constrepit, uel cum terra motu concutitur. Huius multa traduntur genera. Vna in interuenijs ligni, lamellarum modo impacta figitur. Alia foras emergit cortice abrupto, ueluti resina, illiq; gummi modo inhaeret, maculis inter initia rubentibus, postmodum uel calore solis extosta, uel ignium ui candescit. hanc sumpto à rege quodam Riach illius loci nomine, indigenæ Riachinam appellant: quandoquidem is primus dealbande Caphuræ rationem adinuenit. Hæc cæteris & bonitate, & tenuitate præstat, longiorq; perdurat tempore. Alia crassior, nec pellucens, atro colore: proinde bonitate cedens. Tertia uilior reperitur, fusco colore. Succedit huic impurius alia, quæ arboris, scobe, ramentis, & assulis implicata, gummi more agglutinata lentescit, tuberculo amare nucis, aut fabæ, aut ciceris. Hanc pontificum, & sacerdotum suffimentis, sicut thui, & myrrham, costumq; in templis dicant. Sed hæc omnes in duo tantū fastigia rediguntur, in rudem, & elaboratam. siquidem rudis est Caphura omnis ignem non experta: elaborata uero, quæ solis, uel ignis ardore excocta, atq; purgata album contraxit colorem, utpote & cera. Fuchsius lib. primo de componendis medicamentis, putat Caphuram esse bituminis Indici genus, quod scripserit Serapio auctoritate Almarodi, largioris Caphuræ prouentus augurium esse, cum celum crebris fulgetris corruscat, aut plurimis strepit tonitruis, uel cum regio, in qua prouenit, terræ motu concutitur: argumento, quod similiter ex terræ concussu magna tum sulphuris, tum bituminis copia profundi soleat. Sed dissentit ab eo opinio nostra: quandoquidem nec Serapionis, nec aliorum quoruncunq; hanc fuisse sententiam existimem: cum tam ipse, quàm ceteri, qui de Caphura scripsere, arboris cuiusdam uastissimæ proceritatis gummi, uel resinam Caphuram esse scribant. Nimirum oscitanter de hac scripsisse uidetur Platearius Salernitanus: quippe qui Caphuram gummi arboris esse inficiatur, Dioscoridis, & complurium testimonio, ex succo cuiusdam herbe fieri tradens. Quod profectò falsum est, cum nullibi Caphura meminerit Dioscorides. Eam autem esse gummi non solum Auicennæ, & Serapionis testimonio probatur, sed & Lusitanorum, qui nostro æuo per meridiem ad Calicut orientalis Indiæ emporium nauigant. Credidere Serapio, & Auicenna, Caphuram tertio abscesu & fliccare, & refrigerare: quæ tamen cum uehementer etiam in aquam proiecta conflaret, si perquam odorata, & adeo tenuium partium, ut sepe per se in auram euanescat, illis reclamare uidetur. Quo fit, ut quis suspicari possit, aut legitimam Caphuram ad nos non aduehi, aut hoc loco Arabum monumenta (ut in alijs quàm plurimis) esse uitata. Capitis dolores (si tamen in hac parte credendum est Mauritanis) ex calore proueniē-

Ruel. & Hermolai lapsus.

Mastiches consideratio.

Lentisci uires ex Galeno.

Mastiches uires ex Gal.

Caphuræ historia, & genera.

Fuch. opinio non probata.

Platea. error.

Caphuræ temperamentum, & uires.




tes Capbura illita mulcet, incandescentes inflammationes refinguit, præsertimq; iocineris. Renes, & semina refa refrigerat, sanguinemq; cogit. Circumcisionibus imponitur ad cutis nitorem conciliandum, & ad arcendas tã nerum, quàm ulcerum inflammationes. Erysipelas extinguit, & aduersus gonorrhœam, & albas uulue fluxionesq; ficax est cum succino, & aqua nymphæe hausta. Idem præstat pubi, seu imo uentri, testibus, renibusq; illita: que tamen antea psyllij seminis spissamento, aut omphacio, aut solani succo probè sit macerata. Sanguinem e naribus profluentem sistit, aut cum urticæ semine immissa, aut ex maioris sedi, & plantaginis succo fronti circumlita. Collyrijs ad calidas oculorum lippitudines utiliter imponitur. Renibus, ac testibus illita uenerem extinguit. Corpora à putredine præseruat: proinde commodè antidotis admiscetur, quæ contra ueneria, uenenosorum animalium ictum, & pestilentes affectus conficiuntur. In uniuersum uiribus innumerk pollet, quas breuitati consulentes prætermittimus.

Capburæ probatio.

Legitimæ probatio talis est. In calido pane è furno recentissime sublato, bipartitoq; manibus scisso Capbura posatur. quod si humore madeat, sincera est argumentum: sin contrà perarescat, spuria ac fictitia signum. Ceterum si non diligenter asseruetur, ex operculatis etiam capsulis nonnumquam euanescit: itaq; sæpe deluduntur seplasiarj. Asseruatur tamen securè uasè marmoreo, aut alabastrino, lini & psyllij semine sepulta. Nec desunt, qui eam piperi felicius asseruari putent. quod nec planè comprobandum uidetur. Venetijs Capburam omnem rudem importat, ibiq; igne, & arte uitreis organis elaboratur, sic ut candescat, atque pelluceat.

Τερεβινθος. TEREBINTHVS. Τερ. π. 2. CAP. LXXVI.



TEREBINTHVS cognita arbor est. Cuius folia, & semen, & cortex astringunt, & ad eadè, ad quæ lentiscus, cõueniunt, simili parata modo, sumptique. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersatur: excalfacit, urinam mouet, uenerem excitat: cõtra phalangiorum morsus conuenienter in vino bibitur. Resina eius ex Arabia petraea defertur. Prouenit etiam in Iudæa, Syria, Cypro, Aphrica, & Cycladibus insulis. Sed præuallet candida, perlucida, uireo colore, & in ceruleum uergente, terebinthum olens. Terebinthina resinas omnes antecedit: proxima lentiscina, & è pinu, & abiete: has sequitur è picea, & pineis nucibus resina. Natura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurgare. Tussi, ac tibi conueniunt per se, aut in ecglemate ex melle: uitia pectoris expurgant, urinam cient, cruda concoquunt, uentrem emolliunt, palpebras commodissime replicant: lepras tollunt, cum æruginè, ac sitatorio atramento, nitroq; auribus saniem emanantibus cum melle & oleo, itè in pruritu genitalium utiles: malagmatis, acopisque admiscuntur. Laterum doloribus per se, illitu & appositu auxilio sunt.

Ρητινα ἄλλα. RESINÆ ALIÆ. CAP. LXXVII. Ἰατρ.

LIQUIDA resina è pinu, & picea, à Gallia, & Hetruria conuehi solet, atque olim à Colophonè petebatur: hinc Colophonix sibi cognomentum uedicauit. A Gallia quoque subalpina: quàm tiernaculo nomine larica, hoc est, larigna, appellant incolæ. Ea in lin-

tu, & per se magnopere prodest tussi ueteri. Colore inter se distant: siquidem alia cãdida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, ut larigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinam, quæ ad eadem pollet. Quæ uerò aridarum generi ascribuntur, quædam ex pineis nucibus, aliæ abiete, aliæ picea, & pinu exierunt. Eligi debet longè omnium odoratissima, translucens, non retorrída, neque diluta, quandam ceræ faciem præbens, & friabilis. E picea, & abiete resinæ cæteras antecedunt: odoratæ enim sunt, atque thus odore imitantur. Præstantiores à Pityusa insula deferuntur, quæ secundum Hispaniam sita est. Sed quæ è picea, nucibus pineis, & cupresso manarunt, nihil ad illas, nec tantis uiribus potiuntur. veruntamen eorundem gratia, quorù & illæ, sumi solent. Lentiscina terebinthinæ respondet. Vritur resina omnis liquida in uasè quadruplæ capacitatis ad humorem, qui infunditur. itaque resinæ congius in duobus aquæ pluuiæ coquitur, subiectis leuibus prunis, resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis, & retorrída reddatur, ac digitis cedat. Cæterum ubi refrixit, in sicile non picatum, quod aconitum uocant, id est, non illitum, reconditur. Fiet etiam eximij candoris, si resina omnis eliquata præcoletur, quod sæculenta sordes excernatur. Vruntur quoque sine aqua, primum lento igne, & ubi coire cœperunt, maior carbonum

carbonum strues supponitur, & triduo citra intermissione discoquantur, usque dum antedictas naturæ suæ notas exuerint: mox, ut dictum est, reponuntur. Aridas unius diei spatio decoxisse satis est. Vix odoratis malagmatibus, & acopis, & unguentorum colorationibus magnopere utiles sunt. E' resina perinde atque thure, fuligo excipitur, ad circumlitiones idonea: quibus palpebras fucant, & colorem mentiuntur. prodest glabris genis, collacrymationibus, erosisque oculorum angulis. Ex ea fit atramentum scriptorium.

**T E R E B I N T H O R V M** ( ut Theophrastus memoria prodidit lib. III. capite xv. de historia plantarum )  
*diu mascula, alia femina. Masculula sterilis est, ob idq; sexui maris adoptatur. Feminarum alia fructum protinus rufum promit, magnitudine lentis, qui concoqui nequit: alia uiridem editum, rufum postmodum tingit, & cum iua matrescente, nigrum nouissime facit, magnitudine fabæ, resinosum, & sulphureosum. Circa Idem, & Macedoniam breuis, fruticosa, contortaq; nascitur: at apud Danasum Syriæ magna, copiosa, decoraq; montem enim inibi terebinthis refertum, ut nul aliud habeat, referunt. Materies ei lenta, radices ualide in profundo, atq; in totū incorrupta hæc arbor habetur. Flos oleæ, uerim colore rufus. Folia circa unum pediculum, pleraq; specie laurinarum coniugata, quemadmodum sorbo, quodq; parte postrema acuminet, impar exit: uerim minus angulata, quam sorbo, ambituq; laurino similiora, & pingua cum uniuerso fructu. Fert & ad nucis similitudinem quedam concava, ut ulmus: quibus bestiolæ tanquam culices innascuntur. Fit in his resinosum quid, lentumq;: sed resina tamen non hinc legitur, sed à ligno. Fructus resinæ copiam non mittit, sed manibus tantum adheret: etsi non lauctur, postquam collectus est, inter se coherescit: cum uero lauitur, candidus, probeq; non maturus supernat, niger subsidit. Idem refert deinde lib. IIII. cap. v. historię plantarum, indicat etiam Terebinthum haberi: cui folia, & rami, & reliqua omnia terebintho similia: fructus autem diuersus, similis enim amygdalis. Nam & in Bactris terebinthum hanc esse, ferreque nuces amygdalarum magnitudine: quoniam non magnas, sed uisu similes, & suauitate amygdalis præstantiores: & ideo loci illius incolæ his potius uti. Hæc Theophrastus. Terebinthum uidi ego primū in colle uulgo cognomine Cassel Trento, non procul à ciuitate Tridenti prope Athesin, à Theophrasti historia haud quaquam dissimile, facta huius uidendi mihi copia à clarissimo medico Iulio Alexandrino Tridentino: reperiq; ipsam deinde in alijs cōpluribus Hætruræ locis, uidelicet in collapsis Romanorum ædificijs, ac ruderibus: sed frequentem admodum in lapidæ collibus prope Puccinum castrum, Adriatico sinu non longè à Tergesto. Ab hac sæpe, dum illac iter haberem, & fructus, & folliculos caprarum cornibus non absimiles, quibusdam intus bestiolis culicis figuram præ se ferentibus, & resinam decerpfi: quæ etsi omnū præstantissima sit; non tamen diu est, quod Venetias deferretur ex Cypro. Antea coctā afferebāt, uel quod esset aduectū aptior, uel quod impostoribus ad adulterationē aditus hoc modo facilius fieret. Verum liqui  
da ut per se ex arbore manat, iam frequens facta est. Ceterum quia terebinthina iamdū in Italiam non aduehebatur (ut supra in laricis mentione diximus) larigna non modò terebinthinæ locum sibi uendicauerat, sed etiam cognomen. At cum eodem loco à nobis de pinea, picea, larigna, abiegnaq; resina, & earum à quibus colliguntur arboribus, abunde scriptū sit, operæ pretiū quidem non est, ut hic iterū ea repetamus. Scire tamen cōuenit, rarissimas esse abietes in montibus Tridentinis, quæ præter fluentem lacrymam, aridā fundant resinam: sed si quædam inueniuntur, hæc est (ut Plinius inquit) arboris morbus. Cuius rei manifestum argumentum est, quod omnis abies, quæ resinam fundit, tabida sit, putris, & cariōsa. Brasauolus de resinis differens, Pliniū in earum historia à Dioscoride dissentire autumat, quod. s. Plinius libro XXIIII. capite VI. tradiderit summas resinæ species duas, siccam & liquidam: siccam in pinu, & picea fieri: liquidam è terebintho, larice, lentisco, cupresso. Dioscorides uerò ex pinu, & picea, & liquidam præter siccam haberi, scriptum reliquerit. Quos tamen melius erat sic conciliasse, quod quauis afferat Plinius, siccas resinas è pinea, & picea colligi; non propterea obstat, quominus ferant pariter huiusmodi arbores & liquidas, & siccas resinas. Quandoquidem in Tridentino tractu pluribus uarijsq; locis, è pinu, piceaq; antea longo tempore casis, solisq; ardore estuantibus liquidas resinas exudare comperimus larignæ non absimiles. Quod etiam sæpe euenit in asseribus ex hisce arboribus paratis, & in tignis, uel trabibus, quæ ædificijs coaptantur. Verim enim uero malū dicere Pliniū errasse, quod liquidarum generi lentiscinam adscribat, quæ est nostra mastiche, ceteris proscō durior. Ad hæc scire etiam conuenit, quod quæ in officinis Colophonia, Hispanica, Græcāq; dicitur, illius species est, quam coquere Dioscorides edocuit. Constat hæc coloribus diuersis, utpote crystallina, hyacinthina, saturatoq; colore, pro resinarum, ex quibus conficitur, uarietate. quippe ( ut Dioscorides ait. ) alia candida est, alia olei, alia mellis colore, qualis est larigna. Quæ uerò à Colophone Ionie urbe sibi cognomen comparauit, est ( ut refert Plinius lib. XIIII. cap. xx. ) præter ceteras filua: neque alia de causa uocatur & Hispanica, & Græca, nisi quod ex iisdem etiam regionibus aduehatur.  
Attamen animaduertendum est aliam ab hac, quæ neq; fricta, neque excocta est, haberi Colophoniam: siquidem scribit Dioscorides quod pinea, piceaq; liquida, ac pinguis resina ex Colophone afferebatur: ob idq; Colophonia per excellentiam uocabatur. Quod item testatur Galenus libro VII. de compositione medicamentorum per genera, cum inquit. Quoniam uerò piceam resinam & frictam, & colophoniam appellare consueuerunt, sciendum uenit, aliā quandam esse colophoniam Cibiæ mastiche persimilem, mollicens aliquid habens, quemadmodum illa, & thus. Et libro II. eiusdem. Est, inquit, inter liquidas etiam colophonia thuris redolens, quæ nonnullis sola uocatur colophonia, odorata suauitatem quandam refrens, ut abietina, & calore sicut illa mediocri prædita. nascitur admodum modica, atque ob id pretiosa est. Porro si quispiam diceret, non cognouisse Plinium, neque Dioscoridem, liquidam abiegnam, quam aliqui lacrymam, nonnulli uerò abietis oleum nuncupant, eum ne tantillum quidem à ueritate desciscere putauerim: siquidem hi de liquida abiegnâ ( quod legerim ) nihil memoriæ prodiderunt. Terebinthi, & resinarum meminit Galenus lib. VII. de simplic. medicam. facultate, ubi ita scriptum reliquit. Terebinthi tum cortex, tum folia, tum frus*

Terebinthi hi  
 flor. ex Theo  
 phraito.

Resina tere-  
 binthina.

Bras. opinio  
 non probata.

Colophoniz  
 consideratio.

Terebinthi ui  
 res ex Gal.

Refinarum u-  
res ex Gal.

etus adstrictorium quiddam obtinent: sed & secundo ordine excalfaciunt. Itaq; quod etiam desiccant manifestum est recentibus quidem etiam humidiq; modice; sicci uero, ordine secundo. Ceterum fructus aridus propinquus est tertiio ordini desiccantium: est enim adeo calidus, ut mandentibus protinus eius caliditas percipitur. Itaq; etiam non prouocat, & licibus prodest. Paulo superius de resinis differens, sic inquit. Resinae omnes desiccant, & excalfaciunt. Ceterum inter se discrepant, quod plus, ac minus habeant in gustu quidem acrimonie in facultate uero caliditatis: tum quod alie plus, alie minus sortite sunt partium tenuitatis: praeterea quod nonnullae adstrictionis sunt participant, alie nequaquam. Primas meruit omnium non iniuria lentiscina: eam uocant mastichen. Nam praeterquam quod paucula ei adest adstrictio, adeo ut stomachi uentrisq; & iecoris imbecillitatibus, & phlegmonis conuulsis praeter illi inest mordacitate uacans desiccatio: minimum enim acris est, & maxime tenuium partium. Inter alias praefertur terebinthina, manifestam quidem, non tamen similiter atque mastiche, adstrictionem possidens. Ceterum aduicam habet amaritudinem quandam, per quam magis etiam, quam mastiche digerit. Ob eandem qualitatem inest & abstersio, tanta quidem, ut & psoras sanet. quinetiam quae in profundo resident, ceteris resinis magis attrahit, nimirum cum illis maiorem habeat partium tenuitatem. Attamen picea, & hac etiam magis strobilina acriores quidem ea sunt, sed non magis tamen digerunt, neq; attrahunt. Medie inter has sunt pinea, & abietina, acriores quidem quam terebinthina, minus tamen, quam aut picea, aut strobilina. Habet porro etiam emolliens quiddam terebinthina: secundum locum habet in emolliendo lentiscina, sicut & cyparissina acrimonie. Et lib. 111. de compositione medicamentorum pergenera inquit. Etenim cera ad liquiditatem multo pingui indiget: at resinae, quae quidem aridae prorsus sunt, modico: liquida & siccam quandam substantiam ad emplatri crassitudinem assumere postulant. In ceris igitur non magna humiditatis, ac siccitatis differentia est: in resinis, sicut etiam in picis genere contra, aridae ab humidis permultum differunt. Omnium ergo resinarum siccissima est, quam nonnulli frictam, alij colophoniam appellant. Huic succedit, quae ex fictilibus impura, nec frixa sumitur, quam si purges, in frictam mutabitur. His ambabus sicciore est, quae dicitur ptynon physema, ac si dicas pinea germinatio. Hanc sane, seu squalidam in praesentis emplatri compositionem non esse idoneam ratus, abiecti; usus autem sum fricta, & liquidis, iam uero ex his quoque nonnullae diutius liquidae permanent, quemadmodum terebinthina, aliae cito inarescunt, sicut strobilina: media utriusq; est abietina. Quinetiam facilitate calidior est quidem strobilina, mox uero abietina, deinde terebinthina: cupressi resina miscere non ausus sum, ne quae nonnihil adstringeret. Putabit forsitan aliquis nobiscum dissentire Dioscoridem Anazarbeum in sermone de resinis haec uerba scribentem, primo de medica materia commentario. Ex omnibus resinis principatum terebinthinae datur, post eam lentiscina, tum ei, quae de pinu raditur, & abiete, post quas picea, strobilinaq; numeratur. In his etiam Dioscorides tanquam de infima strobilina, optima uero terebinthina sentire uidetur. Verum ego ex his tribus resinis strobilina, abietina, terebinthina, principem certe strobilinae calore; secundam abietinam, postremam terebinthinam esse dixi: Haecenus de resinis Galenus. Sed hac in re animaduertendum est, quod hoc in loco ceteris strobilinae non aliter praefert Galenus, nisi quod omnes caliditate tantum antecellat: siquidem in uniuersum in medicamentis componendis à Dioscoride nequaquam dissentit, uidelicet quod inter omnes terebinthina primas occupet sedes, ut paulo post declarauit, dicens. Inter resinas optimam, tanquam medicamentum in multiplices usus accommodatum, merito terebinthinam affirmaueris, non tamen caliditate primas obtinere.

Πίσσα υγρή.

PIX LIQ. VIDA.

CAP. LXXVIII.

PIX liquida, quam alij conum uocant, e pinguissimis pini, piceaeque lignis congregatur. Optima est splendens, sincera, laevis. Contra uenena, phthisim, purulentam excretionem, tussis, suppuria, & pectoris humores, qui difficile extussumuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato: tonsillarum & uuae inflammationes, anginaeque utiliter perunguntur: purulentis auribus infunditur cum rosaceo, & illinitur cum trito sale serpentium moribus; adiecta uero pari cera, scabros vngues extricat, impetiginesque emendat: yuluae duritias, ac sedis tubercula discutit: cum farinaeque hordeacea, & pueri impubis vrina decocta, strumas rumpit: cohibet vlcerum, quae serpunt, cum pinco cortice, aut sulphure, aut furfuribus illita. Ceterum cum thuris manna, & cerato profundos vlcerum sinus conglutinat: rimis sedis, & pedum magno auxilio illinitur: vlcerum replet; & cum melle purgat: quin & cum uua passa, & melle carbunculos, & putrida vlcerum emarginat, diripitque. Erodentibus medicamentis, quas septas uocant, probe immiscetur.

Πισέλαιον.

PICINVM OLEVVM.

CAP. LXXIX.

PIX fit quod pisselæon appellant, separato liquore aquoso, qui supernatat pici, sicut serum lacti. Nam expansa, quandiu pix coquitur, supra cortinam uellera pura madescent, acceptoque habitu eius exprimuntur in uas, idque tandiu fiat, donec pix coquatur. Quas pix liquida, praebet utilitates: alopecias capillo replet cum farina hordeacea illitum: quibus & liquida pix medetur: iumentorum vlcerum, scabiemque emendat.

Διγνύς τῆς υγρᾶς πίσσης.

FVLIGO LIQ. VIDAE. PICIS.

CAP.

LXXX.

FIT НОС МОДО èliquida pice fuligo. In lucerna noua, quae ellychnium habeat, nonnihil picis incendio, lucernamque fictili uase in clibani speciem conformato, superius in angustum fornicato,

cato, inferius perforato, ut clibani esse solent, operito, & adoleri finito: consumptoque liquore novum infundito, quoad sufficientem usui fuliginem collegeris. Vis ei astringens, acrisque. Vsuus est ad pigmenta, quibus palpebras linunt, & uenustant, & ad circumlitiones. Item ubi glabris genis pilos restituere oportet, ad imbecilles, lacrymososque oculos, insuper ad eorundem ulcera non inutilis est.

*Πίσσα ξηρά.* **PIX ARIDA.** *Πίσσα ξηρά.* **CAP. LXXXI.**

**LIQUIDA** pix decocta in spissam coit, quam uocant aliqui palimpissam. quo in genere quaedam uisci modo lentescit, boscas cognominata: altera sicca est. Probatum pura, pinguis, & odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia, & Lycia, picis, resinæque simul naturam habentes. Calfactoriam uim habet: dura emollit, pus mouet, tubercula panosque discutit, ulcera replet: vulnerarijs medicaminibus commodè permiscetur.

*Ζοπίσσα.* **ZOPISSA.** *Ζοπίσσα.* **CAP. LXXXII.**

**ZOPISSAM** aliqui aiunt derafam nauibus resinam cum cera, quam alij apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet: quoniam marino sale macerata sit. Alij pineam resinam hoc nomine uocauerunt.

**TAMETSI** de pluribus Picis generibus, de oleo, earumque fuligine diuersis, ac proprijs capitibus differat Dioscorides: cùm tamen horum omnium historia notior sit, quàm ut à nobis explicari debeat, operæ pretium non est, ut de his pluribus agamus. Sed quoniam fortasse nonnullos delectabit audire, quoniam modo pix ipsa conficiatur, ut illis et mihi sit satisfactum, hic rem paucis aperiam, omniaque de ea referam, quæ Tridentino tractu in Flenarum montibus coram clarè perspexi. Sic ergo picem, quæ passim naualis dicitur, eo quod picandis nauigijs sit aptissima, artifices conficiunt. Veteres pinos, quæ prorsus tecta confectæ sint, in particulas securibus concidunt, ut ex aliarum arborum truncis ad carbonis opus fieri solet. Deinde uerò area ex creta pauit in medio pauluim elata, extremitatibus æqualiter dependentibus, ut liquor è tecta resudans in canalem totam aream ambientem facilius defluere possit. Itaque cõsasan tectâ in area struis congerie locant, uelut in carbonis artificio: mox hac primum abietum, picearumque frondosis ramis undique tecta circumdataque, tum demum terra septa, lutoque obstructa, ne quouis modo fumo ac flammis pateat exitus, per foramen in cacumine paratum igne succendunt eadem quoque ratione, qua & carbones coquuntur. Quare cùm desit locus, per quem flamma erumpere possit, sentiatque ob id congesta moles maximum ignis ardorem, pix liquitur, & per areæ pauimentum confluens in canalem circumpositum defluit, qui per alios canales inibi artificiosè paratos picem fluentem corriuat in scrobes ligneis asseribus circumdatas, ne terra defluxam picem combibat: unde postea & dolia, & cadi, & utres implentur. Operis perfecti signum, si rogus decumbat, subsidatque, & liquor defluere desinat. Sic enim picem fieri uidimus à syluiculis eam parantibus, qui quodammodo secuti uidentur Theophrastum lib.

Picis conficiendæ ratio.

ix. capite 111. de historia plantarum, ubi eadem serè ratione Macedones picem urere latius tradidit. **Picis facultatem** memorie prodidit Galenus lib. v 111. simplicium medicamentorum, sic inquit. Pix sicca quidem desiccatur, & excalfacit secundo à mediocribus, siue symmetris excessu: ac plus desiccare potest, quàm excalfacere. Humida uerò contrà, plus uidelicet calfacit, quàm desiccatur: habetque nonnullam partium tenuitatem, qua & asthmaticos, & purulentos adiuuat. satis est autem cyathi linisse mensuram melli mistæ. Sed & abstergerendi quandam uim habent, atque concoquendi, digerendi: ueluti & in gustu subamarum quid obtinent, & acre. Sic leprosos ungues eximunt mistæ cum cera, lichenisque detergent: concoquunt item duos, & crudos tumores omnes cataplasmatibus inditæ. Ad ea omnia humida ualentior est: arida uerò pix tametsi ad hæc, quidem deterior est, glutinandis tamen uulneribus magis congruit. Ex his itaque clarum est, humidæ pici calidam humiditatem assatim esse admixtam. Meminit item Galenus picis fuliginis lib. v 11. eorundem simp. ubi ita de omni fuligine scriptum reliquit. Fuligo omnis exicatoria est, ac proinde terrestris est essentia, habens quasdam etiam ignis, qui materiam combustit, reliquias: sed id pusillum est. Porro tota eius natura terrena est, tenuium partium. Sed quæ speciatim in ea differentie sunt, eæ pro uita materia eueniunt: ex acriore, & calidiore, tali etiam proueniente fuligine: ex dulciore simili quoque & hinc fuligine proueniente. Primum enim thuris fuligine utuntur in ocularias medicinas mistæ, eas uidelicet, quæ ad oculos etiamnum phlegmone tentatos accommodantur, atque etiamnum fluxione uexantur, & ulcera habent: nam & illa expurgat, & carne implet. Ad hæc usurpant quoque eam ad facultates, quas uocant calliblepharas. Præterea terebinthinæ, myrrhæque fuligo molestia caret, non aliter quàm thuris: sed styracis his quodammodo ualentior est: magis etiam picis liquidæ, qua etiam magis cedri. Porro acrioribus utuntur ad uitia palpebrarum uocata ptila, & erosos oculorum angulos, humidosque citra phlegmonem. At mollioribus, mitioribusque tum ad hæc, tum ad ea, ad quæ competere paulo superius diximus thuris fuliginem.

Picis facultates ex Gal.

Fuliginum uires ex Gal.

† Hoc loco non ἐνώδης, id est, odorata, ut communis lectio habet, sed ἰνώδης, hoc est, uiscosa legitur in Oribasij codice manu scripto, libro x 11. simplicium. Harum lectionum quæ sit melior in probatione picis sicce, aliorum sit iudicium.

*Ἀσφαλτος.* **BITUMEN.** *Ἀσφαλτος.* **CAP. LXXXIII.**

**BITUMEN** Iudaicum cæteris antepositum. Cuius probatio est, ut purpuræ modo splendeat, sitque ponderosum, ac ualidum odorem uibret. nigrum autem & sordidum, uitiosum est. Adul-



teratur pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. Liquidū inuenitur in Agrigantino Siciliæ, fontibus innatans: quo utuntur ad lucernarum lumina, olei uice. Hallucinatur, qui id Sicilicum oleum nominant: nanque liquidi bituminis genus esse constat.

ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟΣ. PISSASPHALTVM.

CAP. LXXXIIII.

NASCITVR in Apolloniatarum agro circa Epidaurum, quæ pissasphaltos appellatur. Et Ceraunijs montibus deuoluta impetu fluminis rapitur, æstuque in litus expuitur, illic coacta in glebas, mistam bitumini picem redolet.

ΝΑΦΘΑ. NAPHTHA.

CAP. LXXXV.

NAPHTHAM uocant Babylonij bituminis colamen, colore candidum: inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita ut ex spatio protinus in eam transilient. Ad suffusiones oculorum, & albugines utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur: uuluarum procidentia, strangulationesque olfactu, fuffitu, imposito, emendat: comitiales morbos fuffitum deprehendit, gagatæ lapidis more: purgationes mulierum cum uino, & castorio potū elicit: tussim ueterem, & anhelitum adiuuat: serpentium morfibz, coxendicum, laterumque doloribus auxiliatur: datur cœliacis in catapotio deuorandum: cum aceto potum discutit sanguinem concretum: dysentericis cum ptisana liquatam infunditur: destillationibus suffitione medetur: mitigat dentium dolores oblitum. Cæterum pilos incommodos siccum replicat, specillo impositū: concafactum autem, & cum farina hordeacea, nitro, & cera illitum, podagris, articulorum doloribus, lethargicisque prodest. Pissasphaltos eadem, quæ pix, & bitumen, si misceantur, potest.

Bituminis consideratio.

LEGITIMVM quidem Iudaicum Bitumen hoc euo (quod sciam) in Italian non aduehitur: id namque, quo officinæ utuntur, impostura quædam est, pice, petroleo, & alijs nonnullis parata. Igitur mirari non licet, si id Dioscoridis historiæ minimè correspondere uideatur. Optimum in Iudæa prouenit in quodam lacu, quæ Iordanis amnis influit, qui ab urbe Hierico quindecim tantum millia passuum distat, si Brocardo fides habenda est, qui Palestinæ topographiam edidit. Nil uerò aliud bitumen est, quam pingue quoddam lacus illius aquis supernatans, quod undis uentisq; agitatum in litore concreuit, densatur, coit, tenacissimumq; redditur. Nullum in hoc lacu (ut Galenus testatur lib. IIII. cap. xx. simp. medicamentorum) animal, nullaq; stirps inascitur, neq; uisitur ob aque ingentem sedesinem. Imò cum duo ingentia flumina in eum confluant, in quibus pisces innumeri, præsertim in eo, quod prope Ierichontem fluit, quod Iordanem appellant, nullus omnino piscium fluminum ostia excedit. Quinimo, eodem autem, de hic, quæ in eum proiciuntur, nihil mergitur, sed instar nauis, super aquam fertur. Quippe hoc esse uerum probari facile potest experimento, quod sensibus patet: nam unaquæq; nauis leuius admodum marinis, quam dulcibus fertur aquis. Proinde loco citato hæc scite prodidit Galenus. At aqua, quæ ex lacu Syriæ Palestinæ, quem alij quidem mare uocant mortuum, alij stagnum bituminosum, gustantibus non salsa modò, sed & anara est. Salem uerò etiam habet ex sese natum, perinde subanarum: primoq; statim aspectu una cum uniuerso mari tum candidior, tum crassior apparet, salsugini meræ similis: in quam si salem iniicias, ne liquari quidem etiam possit: plurimum enim eius in se habet: ac si quis in eam se mergat, continuo sale tenuissimo uelut conspersus, undiq; emergere conspicitur. Quapropter etiam aqua illa, quam cetera marina grauior est, idq; tanto pondere, quanto fluuiiali marina. Itaq; si uolueris te ipsum deprecere in profundum, ne sic quidem poteris deorsum ferri: ita attollit, eleuatq; aqua, non sanè quia natura leuis sit, quod quidam ueterum sophistarum prodidit, sed ut censuit Aristoteles, propter grauitatem instar luti, quæ leuiora sunt, gestans. Proinde si hominem ligatis manibus, pedibusq; in stagni illius aquam conieceris, deorsum haud feretur: quis uerò sicut naues in mari onera plura, quam in fluuijs citra submersionem portare ualent, eundem in modum in stagno mortuo multò plura, quam in mari. Tanto enim est quæ in illo est aqua, marina grauior, quanto marina lacustri, aut fluuiiali: inest enim ei salis substantia, quæ terrea, grauiusq; est. Ipsiq; tibi marinam, si lubet, efficere licet, sale in aqua fluuiiali colliquato, cognoscereq; quanto grauior reddatur aqua eiusmodi, quam sit dulcis. Quin & modum iam inueniunt, moderatam ad salendum conficiendi salsuginem, si ouum in ea uideatur natum: nam ubi etiamnum fidet, ac rōdum super salsuginis superficiem innatat, aquosa magis est, & dulcis: grauius uerò salsa est, ubi tantæ est salis copia indita, ut amplius liquari, qui postea adijcitur, nequeat. quam aquam si pendere non graueris, omnium aquarum comperies grauiorē. Itaq; ego quandoq; inanem esse diuitis cuiusdam ambitionem ostendi, qui tantā in Italia maris mortui aquam deuexit, quæ cisternam implere posset. Nam id ipsum ego expedite præstiti, sale plurimo in aquam potabilem coniecto. Hæc Galenus. Lacus iste, quem aliqui mare mortuum uocant, ille quidem est, quem sacra testatur monumenta exortum esse, ubi Sodoma, Gomorrha, aliæq; finitimæ ciuitates cælesti igne absorptæ, subuersæq; fuerunt. Quod etiam Galeni auctoritate comprobatur, qui eodem loco citato lacum hunc Sodomeum appellari scribit. Eruat continuè is (ut quidam Patriarcha Hierosolymitanus suis scriptis perhibet) nebulosos quosdam uapores fœtorem intollerabilem uibrantes, qui postea uentorum flamine per conualles olim fertilissimas exagitati, perpetuum fertilitem relinquant, ita ut longo terrarum spatio nec herba, nec arbor, nec ullum deniq; germin proueniat, neq; uirescat, nisi iuxta Hiericum, ubi ab Elisei fonte irrigantur horti. Tradit Plinius hunc lacum longitudine centum millia passuum excedere, latitudine maxima uiginti quinq; millia passuum implere. Idem Pissasphalti inter picis genera meminit libro XXIIII. capite VII. sic inquit. Est & Pissasphaltos mixta bitumini pice naturaliter ex Apolloniatarum agro: quidam autem ipsi miscent. Affertur ex eodem agro etiamnum hoc euo: siquidem ex Apolloniæ Epri,

Pissasphalti consideratio.

eferri, quam unguo Delonam nuncupant, Venetias pissasphaltum pro picandis nauigijs copiosum importatur: quippe  
 quod pice & picis commixtum, ualentissime id muneris præstet. Nuper ex Dalmatia asferri coepit, ubi prope Lesinā  
 non longe à Narenta fidetur: cuius amicus quidam mihi copiam fecit. Foditur & in Pannonia, ubi uiciorū sibiā  
 ceram esse exstant. Scribit Fuchsius libro primo de componendis medicamentis, pissasphaltum nunc etiam tri-  
 bus frē miliaribus ab Ispruch reperiri, uocariq; Germanico sermone Trischemblut, cuius portionem aliquam adhuc  
 se habere fuitur, sibi à Georgio Collimutio transmissam, quæ succensa bitumen ac picem uerissime redolet. Sed equi-  
 dem uereor, ne ipse quoq; decipiatur, quemadmodum Ioannem Transletterum clarissimum medicum in Ispruch dece-  
 ptum esse scio unā cum Georgio illo. Is enim lapidem gagatem, qui frē tribus ab ea ciuitate Germanicis miliaribus  
 (ut Fuchsius inquit) in litore cuiusdam torrētis frequentissimus reperitur, pro pissasphalto ostendebat. Sed illius er-  
 20 tor, dum ego in Ispruch essem, à clarissimo Ioanne Petro Merendio medico Regio, & à me pariter deprehensus est:  
 quod lapis Germanica lingua Trischemblut uocatus, & si lapidis gagatæ modo conflagret, & bitumen redolet ac-  
 census; nunquam tamen ut pice, & asphaltus igne liquefit, sed ligni, uel tede modo comburitur. Præterea ulti-  
 mum bituminis genus, quod Naphthan uocant, Plinius libro 11. capite CVIII. in Austagenis Partibz inueniri pro-  
 dicit, tantūq; esse huic ignium cognationem, ut transilient protinus in ipsum undecunq; uisum. Quod etsi in Italiam  
 aliunde (quod sciam) non inerat; inibi tamen pluribus in locis id generis erumpit, quod eisdem cum igne præstat  
 effectus: quale est, quod in agro Mutinensi scatuit, petroleum, siue saxcum appellatum. Sed ut redeamus, unde di-  
 gressi sumus, bitumen Sodomum non nisi fictitium, uel impostorum malitia adulteratum aduehitur. Proinde Brasæ  
 uolus in sinceri defectu Mumiam à Mauritanis uocatam substituit, quod certò crediderit, mumiam esse legitimum  
 Palæstrinum asphaltum. Quandoquidem existimauit, siccatum Arabum, tum aliarum gentium corpora, quæ pro mu-  
 30 mia ex Syria, & Aegypto Venetias deferuntur, cum sint ex infima illius regionis plebecula, uice aloës, myrrhæ, cro-  
 ci, & balsami ex more Iudaico, duntaxat asphaltum impleri: quod eorum pauperies aromatum sumptus non toleret.  
 Hoc fundamentum hinc iecisse uidetur, quod Strabo literis mandauerit bitumen Sodomei lacus in usu esse ad tutanda  
 hominum cadauera. Sed quantum ipse ex Arabum scriptis deprompsi, apud eos M V M I A potius est pissasphal-  
 tum, quàm asphaltum: siquidem scribit Auicenna, mumiam eadem præstare, quæ asphaltus pice commixtus. Ex quo  
 facile conijcere possimus, cadauera illa pissasphalto tantum impleri. Cui etiam subscribit Serapio, qui de Mumia dis-  
 ferens, ex Dioscoridis auctoritate, eadem, quæ Dioscorides de pissasphalto tradidit, ipse uerbótenus ad mumiam re-  
 tulit, sic inquit. Mumia est in terris Apolloniæ: descendit namq; ex montibus, qui ducunt flumina cum aqua, &  
 eicit eam aqua fluminis in ripis, & est coagulata, & fit sicut cera, & habet odorem picis mixtæ cum asphaltum cum  
 aliquo factore: & uirtus eius est, sicut picis, & asphalti mixtorum. Vnde potius asserendum putauerim, nostram  
 40 Mumiam esse pissasphaltum, quàm asphaltum. Et quanuis dicat Strabo bituminis Iudaici usum fuisse ad conseruanda  
 cadauera; non tamen negat, quin bitumini picem admisceant, fiatq; pissasphaltum factitiū. Verum Serapio, & Au-  
 cenna has mixturas optime nouerant, utpote quibus non modò Syri, sed & suæ gentis Mauritani uterentur. Quo  
 fit, ut Brasæ uolū sententiam non probandam existimem, quod scilicet uulgaris Mumia bituminis loco in componendis  
 medicamentis substituitur. Namq; Mumia præterquam quod est (ut puto) sincerum pissasphaltum, uel asphaltum  
 pice mixtum, concepit defluentem humorem, qui continuo & cadaueribus in sepulcris liquatur. Ex quo credendum est,  
 eam non parum suam immutasse naturam. Porro satius ducerem Galenum, & Paulum consulere, qui in succidanis,  
 si desit asphaltus, picem liquidam subdunt. Ceterum notare conuenit, Serapionem Mumiam Dioscoridis pissasphal-  
 to adieciisse, ut quæ aliquam inter se cognationem haberent, abinuicem non disiungeret: non enim erat nescius, huiusce-  
 modi cadauera pissasphalto impleri, quemadmodum myrrha, croco, aloë, ac etiam balsamo simul admixtis impleban-  
 40 tur, quæ ueram tractu temporis conficiebant mumiam, cuius meminit eiusdem capituli initio, his uerbis. Mumia sepul-  
 crorum fit è myrrha, aloë, alijsq; rebus his additis, & humiditate, quam exudant humana corpora. Veruntamen hac  
 nostra tempestate in Italiam haud quaquam aduehitur: quippe quod hac mixtione nulla earum regionū cadauera præ-  
 ter nobilitatem, ac diuturnitatem condiantur, & hi quidem sepulcra habent sibi constituta, diligenterq; occlusa. Idcirco non  
 ita facile istorum corpora surripi possunt à mercatoribus illuc profectis, ut minori tum difficultate, tum suspitione au-  
 ferri possunt pauperum, & ignobilium, asphaltum pice mixto, uel ipso pissasphalto confarcta. Ideoq; apertissime fallun-  
 tur, qui pro legitima mumia arefactam istiusmodi cadauerum carnem assumunt, non autem eorum infarctum, ueluti se-  
 plasiorum quàm plurimi, qui carnes & ossa contundunt, eaq; medicamentis admiscunt, quæ mumiam exposcunt.  
 Necessum igitur esset legitimam mumiam expetentibus, ut in hospitibus nostris cadauera obeuntium aloë, myrrhæ, et  
 croco repleri curarent, eamq; deinde suo tempore eximi. Mumia enim (ut Arabes tradunt) quàm plurimis pollet fa-  
 50 cultatibus: siquidem secundo ordine tum siccatur, tum excalfacit: capitis dolores frigiditate abortos absq; humorū præ-  
 sentia mulcet. Medetur hemiplegiæ, paralysi, oris distractionibus, comitialibus, uertiginosisq; si ex anaraci aqua na-  
 ribus immittatur. Leucoij oleo, siue hyoscyamino graui pondere subacta, ad aurium dolores frigidos utiliter in eorum  
 concussatatem infunditur. Prodest quatuor granorum pondere ex thymbræ decocto resoluta, gulæ cruciatibus. Epos-  
 ta ex zizipharum, hordei, & myxorum decocto tribus diebus continuis, sufficientibus opem non modicam præstat. Gra-  
 norum item quatuor pondere sumpta ex aqua menthæ cordis affectus remouet: cum decocto uerò cumini, annui, &  
 cari, tum uentriculi, tum intestinorum status discutit. Bibitur utiliter ab alto deuolutis ex siliquæ Aegyptiæ medulla,  
 additis Lemnia sphaeride, & rubiæ radice. Hausta trium, uel quatuor granorum pondere singultum inhibet, si tamen  
 ex cumini, & apij decocto assumatur. Erinis imposita, additis moscho, castoreo, caphura, & oleo balanino, naribus  
 commodè inditur ad diuturnos capitis dolores, præsertimq; cum adbibitis alijs contumax morbus non soluitur. Gar-  
 garizatur cum oxymelite aduersus anginam: & ad lienis affectus ex cari decocto utiliter bibitur: & contra letalia  
 uenena

Fuch. & quo-  
rundi lapsus.

Naphthæ mē-  
tio.

Brasæ opinio  
improbata.

Mumia: confi-  
deratio.

Mumia: uires

Bituminis hi-  
stor. & uires  
ex Galeno.

uenena ex decocto tribuli marini, & foetidi laserpitij gumi iuuamento non modico sumitur. item ex mero contri-  
pionum istius bibitur, & istisq; locis cum recenti bubulo butyro utilissime imponitur. Adstringit munda illa externa sa-  
guinis profluua, pota uero interna: proinde perutilis ad cruentas excreationes. Ex caprillo lacte pota operi-  
exulcerata uescicæ, internis penis desquamationibus, & urinam egrè continentibus. Non desunt qui credant, tan-  
norum cadauerum ossa in puluerem redacta, & in potu exhibita uarijs corporis languoribus prodesse, os suum  
cuique membro tribuentes. Quod penitus refellendum non est: siquidem ipse pluries iudi in comitali morbo et  
humanum in puluerem redactum maxime profecisse, sicuti etiam calculosis renibus, & eorum doloribus. Sed ad bi-  
tumen redeamus, à quo nos penè disiunxerat mumia, ne à nostro instituto recedamus. Huius meminit Galenus lib. xi.  
simp. medicamentorum, sic inquit. Bitumen, unū & ipsum est ex ijs, quæ in aqua marina proueniunt, & in alia que-  
piam, quæ non est marinæ dissimilis, ut in Apollonio Epiri, & per alia id genus loca, multis aquis sponte nascentibus, in  
cecu spuma quedam innatans hoc medicamen reperitur, & molle quidem est, dum innatat, postea uero resiccatur, per  
sicca durius efficitur. Optimum uero bitumen in mari, quod mortuum uocant, prouenit. Est autem id stagnum salsum  
in cæle, hoc est caua, Syria. Ceterum medicaminis ipsius uis est tum resiccatoria, tum excalfactoria in secundo or-  
dine. Merito itaq; eo utuntur & ad glutinationes uulnecum cruentorum, & ad alia omnia, quæ exicari debent  
modica excalfactione.

Κυπάρισσος.

CYPRESSVS.

CAP. LXXXVI.



Cupressi hi-  
storia.

CYPRESSVS refrigerat, & astringit. Cuius folia  
ex passo, & exiguo myrrhæ pota, uescicæ rheumatismis,  
& urinae difficultati auxiliantur. Pilulæ autem ex uino  
tusæ in dysenteria, alui fluxione, tussi, & orthopnea, an-  
si reiiciatur sanguis, conuenientissime bibuntur: earum  
decoctum eosdem præbet effectus: tusæ cum fico duri-  
tias emolliunt, nariumque polypo medentur: in aceto  
coctæ, & cum lupinis detritæ scabros ungues eiciunt:  
hernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu repri-  
munt. Folia eadem præstant. Pilulæ cum arboris coma  
suffitæ, culices abigere existimantur. Folia trita, & im-  
posita uulnera conglutinant, sanguinem supprimunt:  
trita ex aceto capillum tingunt: illinuntur, perse, aut  
cum polenta ignibus sacris, ulceribus quæ serpunt, cer-  
bunculis, & oculorum inflammationibus: ad mota cum  
cerato stomachum corroborant.

TAM ET SI Cupressus arbor notissima sit in Italia: quin  
et si uulgaris sint notitiæ eius fructus, quos tam Græci, quam Latini  
conos appellant; attamen cum nihil de eius historia memorie  
prodiderit Dioscorides, ut lectoribus unde quaq; sit satisfactum, hic  
nobis differendum est, quantum hac in historia à Plinio, alijsq; non-  
nullis, edocti, cognoscere quiuimus. Aduena igitur quondam  
fuit Italiae Cupressus, & difficillime nascentium, natuq; morosa,  
ut quæ in educatione plurimum diligentie expetatur, & præsertim  
in locis, ubi suapte natura non prouenit. Tradiderunt ueteres cu-  
pressum, diti sacram: & ideo funebri signo eius ramos ante do-  
mos ponere solebant, ubi aliquis defunctus iaceret. Ex quo more  
creditur eius umbra infausta, nec quidem gratiosa. Duo habetur  
Cupressi generas, scilicet, & forma: hæc metâ in sagittâ

conuoluta: ille uero ramos in latus spargens. Harum patria, ac proprium natale solum Creta insula est. namq; ubi  
quocunq; loco terra moueatur, subactaq; sit, nisi serantur alia, hæc sua sponte gignitur, atq; protinus emigrat. In  
Idæis etiam montibus, qui ad Troadem spectant, non appellato solo, Cupressus numerosa spôte profilit. Quod ad-  
ratione non uacat, alibi non nisi tempore, & perquam diligentia cultura proueniens, & cultorè magnopere fastidians.  
Odere Cupressi flumina, lacus, omnesq; aquosos tractus. quo fit, ut in eiusmodi locis satæ confestim inarescant. Quod  
si rectè sciuisset Adamus Lonicærus, non tam facile (ut puto) scripsisset, cupressum humidis gaudere locis. Aspersus  
est simum, quo etiam, si circumfossura impleatur, non multo post tempore pereunt. Mira est Cupressi fecunditas:  
etenim triseria est. colliguntur eius coni mensibus ianuario, maio, & septembri. Semen ijs innascitur, & miraculo, ex  
pissillis, ac minimis, ut atomis comparari possit: ob id enim egrè perspicitur. Non omittendum naturæ miraculum, ex  
tam paruo semine gigni tam proceras arbores. Semen mirè formicis expetitur, ampliato etiam miraculo, tantuli  
malis cibo absuami natalem tantarum arborum. quo fit, ut fructifera Cupressi nunquam formicis sint destituta. Cu-  
pressus perpetua coma uiuet, cuiusq; materies nec cariem, nec uetustatem sentit, ut etiam cedri, ebeni, loti, taxii, buxi, &  
oleæ. Proinde ueteres non aliam ob causam ex cupressina materie simulacra sculpebant, nisi quod ad eternam di-  
urnitatem permanens putarent, ueluti Romæ illud louis in arce. Fert & Cupressus liquidam resina largæ  
milia,

milcm, sapore uero acerrimam. Reliqua semina trahunt, folijs cupressi tufis si misceantur, à uermiculis quibuscumq; non tangi, neq; erodi. Lignum autem (ut aiunt) nulla temporis diuturnitate suauolentiam exuat. Sunt qui pusillam cupressum, nonnullis etiam Cipresso uulgo dictam, abrotonum seminum uocent, à similitudine, quam hæc cum arbore in multis habet. Idcirco nec fortasse aberraret, qui certo crederet, Plinium libro xxiii. capite xv. de chamaecyparissio herba differentem, de hac intellexisse: præsertim cum tradat, ipsam ex uino potam contra serpentium omnium uenenæ, scorpionumq; ictus pollere: siquidem et nostra hæc ætate pleriq; abrotonum seminum ad idem usurpant. Quod uero ad alui tinea necandas bellarijs immiscet, ut arte pueros ad comedendum alliciant. Hetrusci hanc Santolam uulgo nominant, de qua cum libro tertio in abrotoni mentione nobis latius sit differendum, hic plura dicere superæcaneum esset. Cupressi meminit Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cupressi folia, germen, pilule recentes, et molles magna uulnera conglutinant in duris corporibus: ex quo clarum est, quod resiccandum habeat absq; insigni acrimonia, aut caliditate, sicut certè et gustus testificatur. Apparet enim in ea leuis quidam acrimonia, sed plurima amaritudo, multoq; etiam plus acerbatis in tota planta. Tanta ei inest acrimonia caliditasq; quanta satis sit deducende in altum acerbitati, ac nullam tamen mordicationem, aut caliditatem in corporibus efficiat. Proinde in alio latentes in flaccidis, putrescentibusq; affectibus humiditates innoxie, tutoq; depascitur, atq; absorbetur: cum quæ excalescunt simul desiccantq; eas quidem quæ contentæ sunt, absorbant: ceterum acrimonia, et caliditate alias attrahant. Sic enterocelicos iuuat: siquidem exiccat, roburq; addit corporis partibus præ humiditate laxis, utpote cum adstrictio in altum subeat, deducende ipsa caliditate, quæ admixta est, cum seruante modum, ut deducere quidem ualeat, non tamen mordicare queat. Quidam ea utuntur ad carbunculos, et herpes polenta miscentes, tanquam absorbat citra excalescentiam eos morbos facientem humiditatem. Sunt qui ad erysipelata utantur, admixta nitritum polenta cum aqua, aut oxycrato aquoso.

Cupressus pusilla.

Cupressi uires ex Gal.

## Agneus. IUNIPERVS. CAP. LXXXVII.



IUNIPERI genera duo: altera maior, altera minor. utraque acris est. Excalescit, & urinam mouet: accensa serpentes fugat. Baccarum nonnullæ nucis iuglandis magnitudine nonnunquam grandescere, aliæ nucem Ponticam equare inueniuntur, rotundæ, odoratæ, in mâdendo dulcēs, subamaræ, quæ arceuthides etiam, id est, baccæ Iuniperi, nominantur. Modicè calfaciunt, & astringunt, stomacho utiles: contra pectoris vitia, tussim, inflationes, tormina, & serpentium ictus efficacissimè bibuntur: urinam cient, unde ruptis, conuulsis, & vuluæ strangulatui subueniunt. Folia acrimoniā habent: ideo tam ipsam, quam eorum succum ex uino contra viperarum morsus illant, aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus, lepras eximit.

REPERIUNTUR Græci Dioscoridis codices ( ut etiam adnotatum reliquit Marcellus ) in quibus Iuniperi caput prorsus deprauatum legitur, quibusdam additis, quæ Dioscoridis doctrinam minimè sapiunt. Siquidem nec Galenum, nec item Paulum Aeginetam, minusq; Serapionem, qui tamen uerbote nus Dioscoridis scripta per capita singula refert, illud usquam posteritatis memoriæ prodidisse constat, quod scilicet ramenta ligni Iuniperi epota homines perdant; præsertim cum eius baccæ contra serpentium ictus efficacissimè deuorētur: bibaturq; ac illinatur foliorum expressus succus ad uiperarum morsus. Adde etiam quod factò periculo id omnino falsum esse deprebèdatur. Quare non modò non credendum, sed ne cogitandum quidem, eiusmodi ineptias à Dioscoride scriptas: quin potius illi ascriptas esse existimandū. His ergo rationibus adductis, nō temere partem illam, utpote additiciam, ex hoc capite rescandam duxi. Maior, et minor Iuniperi species in pluribus Italia locis reperitur. Tuscia urbanas alit, quæ in proceram arborem assurgunt, uisunturq; hæc frequentes in agro nostro Senensi: quarum fructus syluestribus et crassior, et dulcior habetur. Iuniperi materies ad ceterarios annos incorrupta perdurat: proinde uisus Hannibal ( ut Plinius tradidit libro xvi. capite xl. ) templum Dianæ Ephesiæ Iuniperinis trabibus extrui, quod per multas ætates esset duraturum. Igitur mirari non licet, si chymistæ assuerant, carbonem Iuniperinum accensum, et suo cinere obrutum ignem integro anno fouere. Profert ex se Iuniperus gummi mastiche simile, quod et Sandaracham, et Vernicem appellant. Hoc primum cum metitur, candido splendet colore: senescens uero in rufum abiit. Porro haud ignorandum est, hanc Arabum sandaracham à Dioscoridis sandarachæ perquam longè distidere. Namq; Græcis sandaracha est fossilis ad arsenici, siue auripigmenti genera referenda, erodens,

Iuniperi costæ descriptio.

Gummi Iuniperi.



Gummi Iu-  
niperi usus.

Sandaracha  
alia Plinii.

Iuniperi ui-  
res ex Gal.


erodens, & exitiale medicamentum, ut amplius in quinto libro Deo duce dicemus. Verum hæc sandarachæ & nomen elatio in gummi Iuniperi inuecta fuit à medicis, qui Mauritanos secuti sandarax Arabicum nomen (sic enim Arabes Iuniperi gummi uocant) in sandaracham conuerterunt. Quamobrem illud adnotandum esse uidetur, quod ubi Arabes, sandaracham medicamentis inferenda esse præcipiunt, gummi Iuniperi immiscendum intelligunt: ubi uero & Grecis de sandaracha sit mentio, fossilis illa rufa, & auripigmento similis, est intelligenda. Tradit Plinius libro xiiii. cap. xi. plura gummi genera, ubi gummi Iuniperinum ad nihil esse utile scribit. Cuius tamen frequens usus in medicamentis contrarium indicat. Quippe hoc syncero, & oleo ex lini semine presso, fit uernix liquidus: cuius est usus ad illustrandas picturas, & ad nitorem ferri conciliandum: utilis etiam unum ad ambusta, & præcipuus ad dolores, et tumores hæmorrhoidum. Siccus uernix hoc est gummi Iuniperi (ut autor est Serapio) destillationes suspendit, mensuram profluvia sistit, sinus exicat immustus, haustus uero pituitam, quæ uentriculo, & intestinis hæserit: tunc & cetera uentris animalia necat. Nervorum resolutionibus, quas humores frigidi contraxerint, opitulatur. Capitis destillationes suffitu discutit. Idem exceptus sanguinis excreationes supponit, & hæmorrhoidas fluentes illius. Adde tum rosaceo, tum myrtino sedis rimas coercet, & hiantibus frigore manuum, pedumque scissuris illitu succurrit. In summa calfacit, & siccit primo recessu. Est & Sandaracha ceraginosi mellis genus apud Plinium, qui de ea libro xi. cap. vii. ita scribit. Præter hæc conuehitur Eritbace, quam alij sandaracham, alij cernithum uocant. Hæc eritbace, dum operantur, cibis, qui sepe inuenitur in fauorum inanitatibus sepositus, & ipse amari saporis: gignitur rore uerno. hætenus Plinius. Ceterum oleum, quod ex Iuniperi materie (ut chymistæ dicunt) per descensorium duobus alio-  
sis fistilibus, tum pariter uitreis instrumentis elicitor, calidum ore contentum dentium dolores mirifice mulcet, sitamen frigida defluxione afficiantur. Fit ex baccis hoc longè præstantius, odore perquam iucundo. Iuniperi meminit Gal. lib. vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Iuniperus, calida, & sicca utrinque, tertij ordinis. At fractus similiter quidem calidus est, sed non similiter siccus, uerum in hoc primi fuerit ordinis.

Rebus.

SABINA.

CAP. LXXXVIII.

*Sabinæ uires*



Sabinæ confi-  
deratio.

Selago Plinii.

Sabinæ uires  
ex Galeno.

SABINA duorum generum est. Vna folijs cupressi similis, spinis horridior, grauiter olens, acris, & feruens. arbor est coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit. huius folijs nonnulli pro suffitu utuntur. Altera tamarici folio similis est. Vtriusque folia nomas sistunt, collectiones illitu mitigant: quin & cum melle illita nigritias, sordēsque repurgant, & carbunculos rumpunt: cum uino pota sanguinem peruinam eliciunt: partus apposita extrahunt, & suffitu idem præstant. Unguentis calfacientibus immiscetur, & priuatim gleucino.


DE NICHILIO MINVS: uulgaris est notitia Sabina in Italia, quàm quæuis alia uulgaris planta, tam illa inquam, quæ cupressi, quàm quæ tamarici folio est persimilis. Quod tamen nonnunquam imperitis negotium exhibet: siquidem aliquando uiderim pro sabina assumi quandam herbam dodrantalē, quæ quibusdam in montibus plurima nascitur, folio tamaricis, licet nec odore, nec sapore sabinam referat. Hanc sepius existimaui esse Selaginem à Plinio lib. xiiii. cap. xi. commemoratam. Nanque inibi selaginem esse affirmauit, sabinæ similem. Olim selaginem contra omnem perniciem habendam prodidere Druidæ Gallorum, & contra oculorum uitia suffitam prodesse: At tanta extitit tunc temporis superstitionum magorumque uanitas, ueluti & hoc æuo apud plerasque gentium turbas uisitur, ut ij nūquam ad selaginem legem accederent, nisi prius Dijs sacra fecissent. Quin & eam inualidā omnino censebant, nisi dextra manu, & nudis pedibus legeretur. Hæc, quæ sequuntur, de sabina scriptis tradidit Galenus lib. vi. simplicium medicam. sic inquit. Sabina ex numero est fortiter exiccantium: idque secundum tres qualitates, quas in gustu præse-

fert, similiter cupresso, nisi quod ea & acrior est, & ut sic dixerim, magis aromatica, seu odoratio. Igitur huius, quæ modo dixi qualitatē est particeps, nempe acrimoniæ consistentis in temperamento calido, præterea amaritudinis, & adstrictionis obscurioris, quàm in cupresso. Siquidem quantò magis acrimonia superat, tantò etiam potentius digerit. Itaque glutinare nequit ob siccitatis, & caliditatis robur. nam utriusque illi tantum inest, ut etiam tendat, & inflammationem afferat. At putredinibus similiter cupresso accommodari potest, maxime ubi rebelliores fuerint, & doctores res. nam hæc citra noxam uim medicamenti perferunt. Quin & quæ atra sunt reddita, & admodum sordida, ea cum melle expurgat: carbunculos item soluit. Porro essentia tenuitate menses quoque prouocat, ut si quid aliud, & sanguinem per urinam mouet. Fortum etiam uiuentem interficit, & mortuum eiicit. Esto autem hoc medicamen tertij ordinis.

dris, tum exalſcientium, tum deſiccantium ex numero eorum, quæ uel maxime tenuium ſint partium. Et hoc utiq; romme unguentis inditur, & maxime gleucino, & in multis antidotos inſicitur. Quidam uerò etiam cum anoni uice duplam eius ſubſciunt. Eſt enim extenuandi, & digerendi facultatis, ſi eorum fuerit.

Kēpos. CEDRVS.

CAP. LXXXIX.



**CEDRVS** arbor magna eſt, ex qua picem colligunt, quæ cedria uocatur. Iuniperi modo baccas parit, baccarum myrti magnitudine, rotundas. Cedria optima eſt craſſa, perlucida, grauis odoris: quæ dum effunditur, guttatim non diſſipata coit. Cui ea uis ineſt, ut deſuncta corpora conſeruet, & uiuentia corrumpat: qua ex cauſa mortuorum uitam aliqui eam appellauere. Veſtimenta quoque, & pelles eximia calſaciendi, & ſiccandi dote, corrumpit. magni ad ocularia medicamenta uſus: quippe illita oculis claritatem aſſert, albugines cicatricesque detergit: inſtillata autem cum aceto, uermes aurium necat: cum hyſſopi decocto inſuſa ſonitus, ſibilosque ſedat: cauis dentium indita eos frangit, & dolores leuat: idem facit cū ex aceto colluitur: perunctio ante coitum genitali, cōcipiendi vim adimit: anginae ea perunguntur, tonſillarum inflammationibus auxilio eſt: lendes, pediculosque illitu enecat: ceraſtæ morſibus cum ſale impoſita ſubuenit: contra hauſta leporis marini uenena, in paſſo ſumpta, auxiliatur: in elephantia aut linctū, aut perunctione proficit: pulmonū vlcera purgat, & ſi cyathus, eius abſorbeatur, perſanat: vermes, & tineas ſubter indita necat, & partus extrahit.

Fit & oleum à cedria ſeparatum dum coquitur, uelle-ribus ſupra halitum eius expanſis, ſut in pice. Eiuſdem ad omnia uſus: priuatiu vehemente perunctum, ſcabiem quadrupedum, canum, bouumque perſanat: ijsque in hærentes ricinos enecat, & ulcera, quæ ex tonſura acceperunt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fructus uocantur. Calſactoria vim habent: ſtomacho ad-

uerſantur: auxilio ſunt tuſſi, conuulſis, ruptis, ſtranguriæ: menſes ciunt ex polline piperis poti: contra hauſtum leporem marinum in uino ſumuntur: ſerpentes fugantur, peruncto ex adipe certuino, aut medulla corpore. In antidota adduntur. Fuliginem, quomodo ex pice congeri oportet: quæ eandem, quam picea fuligo uim præbet.

**QVAVVIS** Cedrus (ut Theophrastus memorie prodidit) arbor ſit eximia proceritatis: paucis tamen, ac raris conſtat radicibus, non profundis, ſed per ſumma terra diſperſis. Hæc eſt iunipero non abſimilis: nam & ipſa folio eſt longo, duro, anguſto, pungente. Cedrus eſt ramis denſiſſima: nodoſo admodum caudice: aliis frequentibus, ubi rami ex ipſo caudice prodeunt: medulla odorata, non ſecus ac larigna rubente: baccis iuniperinis, ſed myrti magnitudine, flauis, hilaribus, odoratis, eſculentis. Matureſcunt per autumnum nouis prius editis. quo ſit, ut eodem tēpore & nouos, & ueteres gerat fructus. Saxoſis, & frigidis gaudet, & montes amat præ ceteris tractibus. Perpetua coma uiuet, quæ ſi caſtretur decacuminata demoritur, nec unquam inde regerminat, utpote & cupreſſus, pinus, larix, & aliarum plures. In Cypro maxima prouenire traditur, nempe centum triginta pedum longitudinis: craſſitudinis uerò ad quiniū hominum complexum. In Syriæ quoque montibus tanta huius craſſitudo fertur, ut homines terra caudicem amplecti nequeant, tam inibi longitudine, & craſſitudine præſtat. Eius ſumma genera duo, maioris, & minoris diſcrimine. Minoris item due ſpecies, Lycia, & Phœnicia iuniperi ſimilitudine, differunt tamen folio: nā quæ acutius, durum, ſpinoſum habet, oxycedros appellatur, ramoſa, & nodis obnoxia: altera odore præſtat. Fructum ſeu uicini ambe myrti magnitudine, ſapore dulcem. Et maioris duo ſimiliter genera: quæ floret, fructum non fert: fruſtra uerò non floret, & in ea antecedentem fructum (ut ſuprà dictum eſt) nouus occupat. Cedro materies duriffima: quam ob cauſam credidere maiores, eam neque cariem, neque uetuftatem ſentire, ſed æternam eſſe. Quæ etiānum ratione ductus Salomon, Dei optimi maxima templum ex cedri materie extruendum curauit. Ex ea quoque priſci ſimulacra ſactarunt, exiſtimantes tantam illis ineſſe diuturnitatem, quantam marmoreis, aut metallicis. Cedri materies optima nauigijs non modo extruendis, ſed & palatiorum, & arcum fabricis conueniens: quippe quomam incorrupta in perpetuum perdurat. Quæ Oxycedrus appellatur, frequens in Iſtria naſcitur iunipero admodum ſimilis, nec niſi fructu differens maiore, rubente, ac dulci: quo tamen ab incolis à iunipero non ſecernitur. nanque cedrus iſs omnino ignota eſt, utpote qui neſciunt hanc eſſe adeo iunipero ſimilem, ut non facile imperiti alteram ab altera dignoſcere queant. At cum ipſe oxycedri ramoſculo eſſem donatus à Georgio Reſſingero primario prouinciæ Carniolæ medico,

Cedri hiſtor.  
ex Theophr.  
& alijs.

Oxycedri cō  
ſideratio.

dico, quem ipse ex Pefino Iſtrie oppido ſecum attulerat, rubentibus baccis undiq; reſertum, eaq; in memoria haberi, quæ apud Theophrastum, ac ueteres alios legeram, mihi quidem fructum illum intuenti ſtatim inclinauit animus, hanc minorem eſſe cedrum. Etenim, ut memorant ſiripiam ſcriptores tum ueteres, tum recentiores, difficile admodum eſſet ſecernere cedrum à iunipero, niſi huic cæruleus, pumilusq; : illi uero flauus rubenſiue, ac grandior fructus cerneretur. Manat ab arbore maioris cedri etiam reſina, quæ proprie Cedria dicitur, utilis ad multos in medicina uſus. ſed hæc ad nos non deferunt Cyprij, tamenſi eorum regio cedris (ut aiunt) quàm plurimis ſcateat. Variat ad hæc in Dioſcoridis codicibus de cedria lectio. Quippe uulgata Βαφίνα τῆ ὀσμῆς habet, id eſt grauis odore, cùm tamen antiquiſſimus codex manu ſcriptus habeat ἐν τοῖς τῆ ὀσμῆς, id eſt uehemens odore. quod indicat cedriam eſſe uehementer odoratam, non autem grauiter olere. Quod etiam maximè teſtatur Virgilius libro V I I. Aeneidos his uerſibus de Circe canens.

Cedria conſideratio.

Proxima Circeæ raduntur litora terra,

Diues inaccessos ubi ſolis filia lucos

Aſiduo reſonat cantu; teſtisq; ſuperbis

Vrit odoratam nocturna in lumina cedrum;

Arguto tenues percurrans peſtine telas.

Cedri & Cedree uires ex Galeno.

De Citris autem, quibus aurea totius ferè Italie uiridaria exornantur, tam in Tyrrheni, quàm Benaci litoribus in frequentibus, capite de malis, ubi ipſorum mentionem facit Dioſcorides, adiuvante Deo plura dabantur. ſiquidem arbor illa ab hac, de qua nunc agitur, plurimùm differt. Cedri meminit Galenus lib. V I I. ſimp. medicamentorum his uerbis. Cedrus ſpecie duplex eſt, altera fruticoſa iuniperis aſſimilis, altera arbor, non exigua. Vtraq; eſt calide, ſiccèq; temperaturæ tertij quodammodo ordinis ſecundum utruq;. Ceterum Cedrea (uocatur ita cedri oleum) quædam etiam ordinem uidetur attingere, abunde calida ſimul, & tenuium partium. Molles itaq; carnes promptè citràq; dolorem putrefacit, ſicut alia omnia, quæ cùm eiſdem ſint in caſfaciendo ordinis, adiunctam etiam habent ſubſtantiæ tenuitatem. At in duris pluſculo tempore, & uix operatur. Porro talia omnia medicamenta ſeptica uocantur, & ſepta: ſed inter ſeſe maioris, minorisq; ratione diſident. Eſt autem in hoc genere medicamentorum ex primo, & iſſimiſſimo ordine cedrea: pleraq; enim eorum admodum ſunt efficacia. Talia itaq; & mortuorum corporum carnes corrumunt: at cedrea exiccat, ſimulq; à corruptione tuetur corpora demortua, utpote humiditates eorum ſuperfluas depaſcens, ceterum ſolida corpora haud attingens. At in uiuentibus calor ipſe, qui in corporibus eſt, cedree uires adaugens, cauſa efficitur, ut teneræ ab ea carnes deuantur. Nèc mirum uideri debet, ſi cùm tanta pollea potentia lendes, pediculos, & tineas, & in auribus natos uerues interficere ualeat, tum ſectum appoſita uiuentem quædam interimat, mortuum autem eiſciat, ſicut fanè etiam in coitu ſemen, pudendo circumſita. proinde conceptum impediens eſt medicamentum, ſi ſic utaris, nulli ſecundum: aliaq; multa eiſmodi particulatim efficit. Itaque argumentum eſt, ex ſum ualenter excalfacere, ſicut ubi dentium foraminibus inſtillatur: ſiquidè dolores eorum mitigat, ſed & ipſos coſfringit. Extenuat quoque oculorum cicatrices, & uisus hebetudini ab humorum craſſitudine ortæ medetur. Porro quod eius eſt pinguiſſimum, & ad unguem oleoſum, quod ſuſpenſis ſuprà eam dum coquitur, lanis excipitur, ac coſgitur, tota cedrea tenuius quidem eſt, ſed minus acre; quanquam non minus excalfaciens. Eandem quippe rationem habet ad id quod reliquum eſt cedree, craſſius illud uidelicet, quàm oleum ad amurcam. Proinde illud utpote craſſius, mordax eſt, & maiore aperiendi facultate præditum. Itaque ulcera irritat, phlegmonenq; illis excitat. Porro olentiſſa illa cedrea adeò clementibus eſt uiribus, ut etiam plebeiſ experientia docti uulnera omibus occaſione tundendi à ſorſice facta, illa illita ſanent, ſicut etiam pice humida. Utuntur autem ea & ad ouium ſcabiem, & ricinos, Græci τρωας uocant. Porro cedrides (nam ita fructum cedri nuncupant) moderatiores uires obtinent, adeò ut comedi quæque poſint. Attamen ſi liberalius iſis utare, capiti dolorem inferent, ardoremq; ac morſum in uentre percipiunt.

† Hic leſtorem admonitum uolumus, illa de ſuligine Cedri uerba non legi in Græcis tum uulgatis, tum etiam antiquis quibusdam codicibus. Quare cùm neq; à Marcello uertantur, qui plura exemplaria Græca habuiſſe ſatetur, ut potius additiua, quàm legitima cenſenda uidentur.

### Διάφορα ΛΑΥΡΥΣ. Lavrus. CAP. X. C.

LAURYVS quædam tenui folio conſtat, altera latiore. Vtraque excalfactoriam naturam habet, & emollientem. Vnde decoctum earum in muliebres inſeſſus additum, vuluæ, & ueſicæ uitijs conuenit. Virentia folia ſenſim ſubſtringunt: illita quoque, ac trita ueſparum apiumque iſtibus opitulantur: eadem cum polenta, & pane illita inflammationem omnem mitigant: ſed pota ſtomachum effundunt, & uomitiones mouent. Lauri baccæ magis, quàm folia caſfaciunt. ergo in eclegmate tritæ cum melle, vel paſſo proſunt tabi, orthopnoæ, & omnibus thoracis rheumatifmis: contra ſcorpionum icтус ex uino bibuntur: uutiligines emaculant. Succus baccarum utilifſimè aurium dolori, & grauitati inſtillatur cum uino uetere, & roſaceo. In medicamèta autem adijciuntur, quæ neruorum laſſitudines reficiunt, acopa uocant: & ad unguenta, quæ caſfaciunt, & diſcuriunt. Cortex radicis calculos rumpit, partus necat, hepaticis prodeſt, tribus obolis in uino odorato potus.



LAVRVS tam tenuifolia, quàm latifolia arbor odoratissima, & si antiquis credimus, Apollini lucidissimo sacra: quinetiā à Ioue colitur. Vna quoque laurus Romæ antiquatus imperatorum sanctificumq; domos exornare solebat. Quod similiter, atque alijs complures gentilium mores, in hunc usq; diem apud nos perdurat. Namq; ubi dies festus aduenerit, laurus non modò templorum ualuis decorat, sed & ubi dies geniales adfuerint, ingentium palatiorum est iantrix. Quo fit, ut magnis aduentantibus principibus, lauri frondibus & columnæ, & arcus in pacis signum extruantur: siquidem pacifera laurus est, non secus ac olea. Ideo antiquitus etiam, si eius rami prætendebantur inter armatos hostes, firmum quietis erat indicium. Qua obseruatione ductus Bernardus Clesius Cardinalis amplissimus Tridentinus, tum pacis, tum quietis sectator maximus, lauri, & palma floridæ rorum adnectabat, ut nitida marmora, præclara metalla, speciosa picturæ, aurea, & argentea uasa, ac reliqua admiranda demonstrant, quibus magna eius palatia fulgent. Romanis laurus ferebatur lætitiæ uictoriarumq; signo. Idcirco laurum in templis in Iouis gremio reponebant, quoties Romæ lætitiæ uictoria noua attulerat. Quinetiam grata Apollini dona unoquoque anno mittere solebant in Parnaso monte, quod ibi laurus spectatissima cresceret. Ceterum quod laurus Romæ à Ioue è cælo missa fuerit, ut ea imperatores coronarentur, facile perhiberi potest: namque Livia Drusilla, quæ postea Augusta matrimonij nomen accepit, cum pacta esset illa Cæsari, gallinam conspicui candoris sedenti in hortis aquila ex alto abiecit in gremium illæ sanæ, intrepideq; miranti accessit miraculum, quod teneret rostro laureum ramum suis baccis onustum. Quod audientes conseruari alitem, & sobolem iussere.

Lauri historia.

aruspices, rorumq; eum feri, ac ritè custodiri. Quod factum est in uilla Cæsaris fluuio Tyberi imposita, iuxta nonnū lapidem flammia uia, quæ ob id uocatur ad gallinas. Porro tam creuit ramus laureus, tanq; se propagauit (tametsi radicibus destitutus) ut breui tempore ibi mire sylua prouenerit. Ex qua triumphans postea Cæsar laurum in manu tenuit, coronamq; in capite gesit. Ac deinde imperatores Cæsares cuncti triumphantes lauro coronabantur, tenebantq; in manu eiusdem ramos. Quos post triumphos traditus est mos ferendi in eminentioribus locis in celebratis Romæ collibus. Quo factum est, ut plures laurorum syluæ Romæ uirescerent, quæ ob id laureta uocabantur: quælis erat, quæ in monte Auentino multo ante alios tempore uiguit. Nimirum indicat laurum dijs gratissimam esse arborem, quæ sui habetur ab impetu fulminū ratio: siquidem nulla habita, cum è cælo ruunt, nec diuinitatis, nec principum amplitudinis ratione, plerunque templorum turres iciunt, superba mundi palatia dilacerant, ac sæpius homines immaniter interimunt. hæc tamen sola arbor fulmine non percutitur, nisi in futura calamitatis prodigium: ac ne quidem domus, in quibus adsint eius rami, de cælo tangantur, pro certo creditur. Proinde Tyberius Cæsar fulminibus perterritus, tonante cælo lauro coronabatur. Laurus ex sese uim habet ignem producendi: quippe si exicca te ramus rano frequentius confricetur, super asperso sulphuris puluere, ignis statim exiliet. Eadem perpetua fronde uaret, tantaq; pollet ui, ut eius ramis in aruo defixis, rubigo, maxima segetum pestis, abigatur, transeatq; in earum folia ex aruis. Poëtæ perfectionis signo lauro coronantur, idq; præmium est Apollineorum musas colentium. Coruus occiso chameleonte, fronde lauri deuorata infestum utrus extinguit. Quæ etiam palumbes, graculi, merule, & aliæ per plures aues annum fastidium purgant. Ceterum lapideas lauros oriri in mari rubro scribit Theophrastus lib. 1111. cap. 1111. de plantarum historia, sic inquit. In sinu autem Heroo cognominato, ad quem descendunt Aegypti, laurus est, & olea, & thymum: uerum non utridia, sed lapidis specie parte à mari eminente, similia tamen utridibus tam folijs, quàm germinibus. Colos quoq; floris in thymo, tanquam nondum perfecte floruerit, liquido deprehenditur. Longitudo arbuscularum cubitorum ternorum est. Hæc ille. Laurum scriptis commendauit Galenus lib. 11. simplicium medicament. sic inquit. Lauri arboris & folia, & fructus desiccant, & calfaciunt uehementer, plusq; etiam fructus, quàm folia. At radicis cortex minus quidem acris est, & calidus, plus tamen amarus, habetq; etiam adstrictionis nonnihil. Quamobrem & calculos confringit, & iccori prodest. Bibitur ex uino fragrante trium obolorum pondere.

Lauri natura.

Laurus lapidea.

Lauri uires ex Galeno.



Platani confi-  
deratio.



Platani uires  
ex Galeno.

**TENERRIMA** Platani folia in uino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt: tumores, & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilule in uino pota, serpentium moribus auxiliantur: excepta autem adipe igni ambusta sanant. Insidens foliorum, pilularumque lanugo, oculos, & aures offendit.

**PLATANVS** Italia aduena, peregrinaq; est; quam uero regionem diluunt (ut Theophrastus est autor) multi, magisq; fluuij. Verum enim uero si ibi nonnulla uirescunt Platani plantae, ut quas ipse Neapoli, & Patavij uidi, sunt quidem ex longinquis regionibus allatae, ut etiam antiquitus à Romanis per mare Ionium inuectae fuere, eorum duntaxat umbra grata Romae petita, ubi platanis tantum honoris increbuit, ut diu nutrita fuere mero radicibus infuso. Nanque haec arbor plurimum umbrigatione gaudet: tamen si maiorem in modum fontes, & flumines amet. Platanus ad amplissimam ramorum amplitudinem adtingit, adeo ut Licinius Mutianus cuius Romanus, Plinio teste, hoc prodendum etiam posteris putarit: qui prouinciae Lycae legatus affirmat, in ea fuisse platanum sociam gelidi fontis amoenitatem itineri appositam, octoginta atq; unius pedum specu, numerofo uertice, se uastis protegentem ramis arborum instar, & agris longis obtinentem umbris: ac ne quid desit speluncae imago, sexa intus crepidinis corona, muscosos complexa pumices: intra quam se epulatio cum duodeuigesimo comite, laege ipsatoris praebente fronde, ab omni afflatu securum, optatem imbrum per folia crepitus, letiorem, quam mariorum nitore, picturae uarietate, laquearium auro, cubuisse in eadem. In Creta insula ad Coriniam platanus stetit fertur apud fontem quendam, quae sihi

hyeme non amitteret, sub qua Ioui compressam Europam indigene fabulantur. Quae in Italiam inuectae fuerunt, climatis inclementia in magnam proceritatem non adolescunt: attamen sunt cortice crasso, fronde uirginea, lata, longa rubroq; pediculo, flosculo paruo ac pallido, bacis rotundis, scabris, & lanuginosis: ex quibus oleum fieri prodit Plinius libro xv. capite vii. Platani umbra usque eo delectatum Xerxem in terra Lydia scribit Aelianus, ut diem integrum sub ea cum maximo exercitu consumpsit, floccipendens tam breui uoluptate tot copias remunerari. Platanu aduersantur uestertilionibus. Earum pilulae addito melle, & illitae, lentigines, ueteresq; nigrities emendant. De platano differuit Galenus lib. viii. simplicium medicament. sic inquit. Platanus humidioris, frigidioreq; essentiae est, non ita multo quam symmetra. Proinde folia uiridia trita, & illita, non obscure pblegmionas nascentes adiuuant. Cortex autem, & pilulae magis desiccantem uim obtinent, ut ille quidem in aceto coctus ad dentium exhibeatur dolores: pilulae uero cum adipe ad ulcera ambusta. Sunt autem qui cortice combusto medicamentum desiccatorium, & absterforium efficiunt, ut cum aqua lepras sanet; per sese autem illitum, ob humorem numium, uetera, & sordida. Vitandus est puluis folijs arboris insidens: alioqui si spiritu attrahatur, arteriam offendit, ualenter desiccans, & exasperans, uocemq; ledit, sicut sane etiam usum, & auditum, si in oculos, aut aures inciderit.

**FRAXINVS** arbor nota est. Cuius foliorum succus, & ipsa ex uino pota, & illita uiperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ligni ramenta, scobemque potum perniciem afferre tradunt.



**FRAXINUS.** arbor est notissima. Eius (ut Theophrastus memorie prodidit lib. iii. cap. xi.) duo reperiuntur genera: quorum alterum excelsum, procerumque est, lignum habens candidum, et assuenum, neruatum, mollius, enodius, ac crispus: alterum humilius, minus auctile, scabrius, durius, et flauius. Folia laurinis, lauri latifoliae similia, in acutius tamen coacta, et ambitu leuiter serrata. Ramulus totus, quem solum unum putaueris, quod simul cuncta folia ferat, singulari pediculo, et singulis folijs coniugatim, ueluti per genicula, pendentibus constat: amplo interuallo coniugationibus distinctis, perinde atque in sorbo. Fert fructum in siliquis minutum, nucosum, qualem amygdale, gustu subamarum. Tradidit Plinius fraxini folia iuuentis mortifera, ceteris ruminantium innocua. Que de taxo, non de fraxino Theophrastus prodidit, inquiens. Si iumenta (ut ferunt) taxi folia comederint, emoriuntur: si ruminantia, nihil incommodi patiuntur. Sed nominum uicinitate Plinium deceptum esse crediderim: nam Graecis fraxinus *μελία*, taxus uero *σπίλαξ* appellatur. Vnde unum pro altero sumēs Plinius, facile (ut diximus) in errorem incidit. Rei fides fuerit in hoc Plinium lapsum fuisse, clara in Italia experientia: siquidem taxi folijs, non fraxini iumenta non ruminantia necantur. Quinimo haec salutare praestant remedium letalibus serpentium uenenis: quibus adeo inimica est fraxinus, ut ne matutinas quidem occidentesue umbras quam libet spatiosas serpens arboris huius attingat. Quapropter expertum proditur, si fronde ea gyro claudatur ignis et serpens, in ignem potius, quam in fraxinum fugere serpentem. Mira naturae benignitas, priusquam haec prodeant, florere fraxinum, nec ante conditas folia dimittere. Fraxini species sunt Ornus, itemque orneoglossum dictum, quod ferat semē illud, quod auis lin-

Fraxini histo-  
ria Theophr.

Plinii lapsus.


Fraxini species  
ornus.

quam appellant, ut ipsum quoque fraxinus fert. De quo differens Plinius libro xxiii. cap. viii. mederi id iocineris, et lateris doloribus in uino tradidit: aquam, quae subit cutem, extrahere: corpus obesum leuare onere, et ipsum sensim ad maciem reducere. Id quoque in recentiorum medicorum usu est ad stimulandam uenerem. Folia fraxineis similia fert stirps illa apprimē celebris, quam uulgo **DICTAMUM ALBUM** nuncupant, ob idque a recentiorum nonnullis pumila fraxinus cognominatur. Haec nullis tam Graecorum, quam Arabum autoribus (quod equidem legerim) usquam descripta est. Quare non possum non admirari, quoniam pacto sibi dictami nomen uendicauerit. Ea est uisu pulcherrima, speciosaque: floribus formosis, impensē redolentibus, in purpura albicantibus, citrei arboris modo. Radix ei candida, amaro sapore: proinde mirum non est, si uentris tinea perimat. Tradunt etiam super te uallere aduersus letalia uenena, ac omnium uenenosorum animalium morsum, ictumque, nec minus aduersus pestilentiam. Prodest stomachicis, et suspiriosis. Elicitur e floribus aqua, quae naribus infusa capitis morbos frigiditate abortos mirifice propellit.

Dictami albi  
consideratio.

POPVLVS ALBA.

POPVLVS NIGRA.



Λεύκη, καὶ Αἴγυρος. *Populus nigra* *Populus alba* CAP. XCIII.

POPVLVS albæ populi cortex unciz unius pondere, ischiadicis, ac urinæ stillicidio prodest. firmitatem inducere tradunt, si cum mulino rene bibatur. Folia quoque cum uino post purgationes pota idem præstare produntur. Tepens foliorum succus utiliter aurium dolori instillatur: Pilulæ, quæ primo foliorum partu exiliunt, trite & cum melle illitæ, oculorum hebetudini medentur. Memoriz prodiderunt, corticem albæ populi, & nigre particulatim cæsum, & sulcis stercoreatis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre. Populi nigre folia cum aceto illita, magna utilitate podagricis doloribus illinuntur. Resinam populus fundit, quæ in malagmata additur. Semen potum ex aceto comitialibus utile est. Lacrymam populorum commemorant, quæ in Padum amnem defluat, durari, ac coire in succinum, quod electrum uocant, alij chrysophorum. Id attritu iucundum odorem spirat, & aurum colore imitatur: tritum, potumque stomachi, uentrisque fluxiones sistit.

Populorum  
consideratio.

POPVLVS Theophrasto triplici recensetur genere lib. III. cap. XIIII. de historia plantarum, ubi sic habet. Populus alba, nigraque uniformes habentur: ambæ natura erectæ, sed excelsior, læuiorque nigra: figura foliorum adsimilis, et ligni materies albedine similis uisitur: utranque ne florem quidem habere existimant. Kεραϊς (quæ quidam Alpinam, quidam Lybicam uertunt) populo albæ non absimilis, cum magnitudine, tum uero quod ramis abicantibus spargitur: folio hederæ, sed parte altera sine angulo, altera uero oblongo, inque angulum exeunte acutum: colore parte resupina, pronaque ferme simili: pediculo prolixo, tenuique annexo. Quamobrem non erecto, sed inflexo. Cortice asperiori, quam populus alba, scabrioreque ut pyrus sylvestris. Hæc Theophrastus. Priora omnibus passim nota sunt, sed quænam arbor nobis sit κεραϊς, compertum sanè non habeo. Plinio hæc libro XVI. cap. XXIII. minima folio est, ac nigerrima, fungisque enascentibus laudatissima. Alba folio bicolor, superne candida, inferiore parte uiridi. Sed hic Plinius aperte errore notatur, quod hæc contra superne uireat, inferne uero albicet, candida efflorescente lanugine, quæ tamen in nigra non uisitur, ut Plinius existimat, cum indifferenter inquit. Populorum folijs grandissima lanugo. Sed et tertio idem errasse deprehenditur: quippe qui scripserit eodem libro capite XXV. populum nec fructum, nec semen ferre, cum tamen utraque fructum ferat, uuarum speciem præ se ferentem, intus alba lanugine refertum: atque etiam scribat Dioscorides, semen ex aceto potum comitialibus prodesse. Sed quid opus est pluribus, si Plinius seipsum accusat; siquidem lib. XXIII. cap. VIII. populum et uuas, et semen ferre fatetur, illas utique unguentis, hoc uero comitialibus præferens. Sed cunctis

Plinii plures  
lapsus.

myrica.

Myropole, ne ob id communis usus unguentum populneum uocatum, ex populi uuis conficiant, ut Ruellius credidit à Plinio deceptus, & quod ijs ad unguenta odorata uteretur antiquitas. Quandoquidem Nicolaus Myrepsicus non uuas, sed germina, uere primo prodeuntia admiscet: odorata enim sunt, & ceraginosas, cum tamen nullus prorsus uuis sit odor. Verum enim uero an antiquitas populi uuas odoratis unguentis admiscuerit, dubitandum sane est. Nā Plinio libro xli. cap. ultimo, ubi de unguentorum materia egit, nil aliud est populi uua, quam bryon, Latine muscus uocatus. Quem etiam præter cedrinum, & quernum prætulere ad unguenta Dioscorides, & Galenus, & in cetera odorata recensuerunt. Quo fit, ut facile credi possit, Plinium errore ductum existimasse, muscum in populo nascentem nihil ab eiusdem uuis differre, cum inquit. Eodem & bryon pertinet uua populi albæ. Optima circa Gnidum, & Cariam in sitientibus, aut siccis; asperisq; locis. Secunda in Lycia cedro. hæc ille. Sed cum cedrus nullus ferat uuas, sed muscum perquam odoratum, hinc Plinij error manifestè deprehenditur. Populus utraq; frequentissima nascitur in agro Mantuano, ac Ferrariensi, non modo in Padi amplissimi fluminis litoribus; sed & per agros, & prata in fossarum aggeribus. Ideoq; fabulantur poetæ, isti Phaëthontis fulmine sorores fletu mutatas in populos arbores iuxta Eridanum amnem, quem Padum uocant, ex corticis meatibus instar auræ lacrymæ, electrum, siue succinum funderet, ut adhuc uiuentes lacrymas effundebant: quæ nostro tempore in orbiculos, quibus Deiparæ uirginis formæ salutationes enumerant, effunguntur; & uulgaribus & infimis mulierculis monilium uice, collo gestantur decoris gratia. Quare Dioscorides, qui poetarum fabellis adhibere fidem haud quaquam censebat, noluit pro comperto fabuloso succini historiam asserere, sed dubiam, & suspensam tenere. Ideoq; inquit. Lacrymam populorum commemorant, quæ in Padum amnem defluat, durari, ac coire in succinum, quod electrum uocant, alij chrysophorum. Ex quo facile percipi potest, quod cum Dioscorides aliquid de succino suis monimentis mandare decreuisset, nullam eius certam tenens historiam, ipsum populi generi utriq; adiunxit: ea tamen ratione id diiudicans, quod non alio in huiusce operis loco aptius succinum accommodari posset. Quandoquidem in fabulis nactus esset poetæ cecinisse carminibus, succinum populos fundere, tanetsi non ignoraret, succinum populorum gummi esse nequaquam: siquidem huic fabulæ datus est locus ob succini innumeros globulos, qui olim filo tractati ab Eridani accolis collo suspendebantur. Quippe cum pleriq; ipsorum, præsertim uero foeminae, ob nimis humidum regionis aërem in gulæ morbos, ac strumas incurrent, his existimabant succinum aduersari. Quod fortasse non erat ab omni ratione alienum: namq; cum facultatem habeat succinum sistendi fluxiones, collo etiam gestatum, facile inhibere poterat, ne capitis destillationes in guttur defluerent. Quo fit, ut non demirer, si etiamnum Germani in oculorum defluxionibus magno successu succineos globulos occipitio adnectant: Reperio in enarranda Succini historia, autores complures, sed re uera admodum uarios, qui etsi grauius (ut historicos decet) hæc de re loquantur; tamen cum ipsi succini originem nusquam uiderint, & quicquid de eo scripserunt, alijs acceptum referant, his nulla, aut sanè pauca adhibetur fides. Philemon succinum fissile esse dixit, & in Scythia erui duobus in locis, uno candidum, altero uero croceum. Sudnes, & Metrodorus succinum prodiderunt in Liguria arboribus effluere. quod Sotacus credidit in Britannia euenire. Pythias tradidit esse locum in Britannia prope Gutones, ubi à fluctibus maris non procul ab Abalo insula succinum aduehitur: quo incolæ ad ignem pro ligno utuntur, ipsumq; Teutoni uendunt. Nicias historicus succinum solis radiorum succum esse uoluit: hic enim credit radios uehementius actos in terram pinguem sudorem in ea parte relinquere, deinde æstate siccari, & à fluctibus maris in Germanorum litora eijci. Idem & Aegypto nasci simili modo dixit. Item in India, gratiusq; thure esse Indis. Non defuerunt etiamnum, qui succinum nasci tradiderint iuxta mare Atlanticum in lacu Cephyside dicto, qui sole excafactus è limo fundat electrum. Non defunt præter hos plures, qui de succino differentes in diuersas iuerunt sententias, quas nunc, utpote non probandas, silentio inuoluam. Vnde iure dici potest, succinum apud eos uel cereum, uel figulino luto similem haberi, cum ipsum in tot uarias formas, ac imagines transmutauerint. Sed ut tandem refragum, quod pro comperto habetur, gignitur succinum in insulis septentrionalis oceani. Id olim à Germanis Glesum appellabatur: unde à nonnullis, qui erant cum Germanico Cesare ibi clasibus rem gerente, una insularum ob succini copiam, Glesaria fuit appellata, quæ prius Austrauia à barbaris dicebatur. Hic nimirum (ut Plinius inquit) nascitur succinum arboribus pinei generi defluens in terram, ubi postea densatur. Cum uero intumescens æstus fertur in proximæ siluas, ex ijs in se rapiunt fluctus maris, & in Germanorum litora expuunt. Itaq; Cornelius Tacitus rectè scriptum reliquit, Germanos huius maris accolas solos omnium succinum habere, & legere. Quod succinum sit arboris ex pinorum genere lacryma, olim Romanis testimonium perhibuit quidam eorum eques illuc missus ad id comparandum à Iuliano curante gladiatorum manus Neronis principis, qui ea litora peragravit, ipsum uidit, ueram eius originem didicit, & secū ingentem copiam Romā inuexit. Præterea succinū esse pineæ arboris gummi indicio est pineus in attritu odor, & quod accensum tedæ & refinæ modo deflagret. Liquorem esse copiosè stillantem, tenacem, ac lentum, argumento sunt quædam intus implicita, ut formicæ, culices, ac etiam lacertæ, se stucæ, ac palæ, quæ transparentia inspicuntur. Cum enim hæc animalia, & alia stramenta humoris lentore facile implicentur, durecente deinde materia, ueluti carcere includuntur. Hæc partim ex Plinio, partim uero ex aliorū scriptis decerpimus. Tanetsi rationibus non aspernendis probare nitatur Georgius Agricola, succinum non aliud esse, quam bituminis genus, quod à quibusdam scopulorum crepidinibus erumpens in mare defluit, ubi aquarum salsedine durefcit. Nam succinum, quod nigerrimum est, ex quo etiamnum globuli ad angelicas numerandas salutationes conficiuntur, aliquid cognationis cum pississimò habere uidetur. Adde etiam quod à pinæ, neq; ab arboribus alijs resinam per se fundentibus tam pullo colore nulla defluit lacryma. Succinum incoctum adipe lactentis suis expolitur, & redditur translucidum, quemadmodum tradit Archelaus, qui rubeum corticibus arboris, ex qua defluit, inherens, se uidisse affirmat contra Agricolæ sententiam. Quo fit, ut de succini historia adhuc lis sub iudice pendeat. Ceterum compertum est, quod sicuti magnes fer-

Succini uaria historia.

Brasauoli opi-  
nio reproba-  
ta.

rum respuit, si adsit adamas, uel si alio affricetur; ita nec succinum ad se paleas allicit, quæ sint oleo perfuse. Verum eorum opinio uana est, qui succinum tradiderunt peculiari dote ocimum respuere: nam ipse sæpe ac sæpius hanc periculum feci, & semper succinum ad se ocimum trahere comperi. Officinæ communi nomine succinum uocatur Karabe Mauritanos secute. Licet Brasauolus Ferrariensis in suo de simplicium examine deceptus existimaret, Arabum Karabe succinū esse nequaquā, sed uerum populi albe gummi. Serapionis, & Auicennæ testimonio: esse neuter, sicut nec Dioscorides, quem illi sequuntur, id quidem pro comperto assueuerit. Namq; Serapio (ut in cæcis adsolet) quicquid de Karabe annotauit, uerbatenus ex Dioscoride deprompsit, sic inquit. Et dicitur, quod gummi Haur romi, quod nascitur iuxta fluuium, qui dicitur Eridanus, quādo distillat in flumine illo, coagulatur ibi, & est illud, quod dicitur Aipton, id est electrum, & sunt, qui nominant ipsum Arfopodon, & est Karabe. Eadem sententia ciuitur ex Auicenna: quippe qui capite de Haur itemq; capite de Karabe, nō asserat eam esse populorum gummi, sed quod ita perhibetur. Nec alia ratione duobus capitibus de Karabe differuit, nisi ut ostenderet, Karabe per se ē populorum gummi differre. Præterea comprobatur id esse Karabe apud Mauritanos, quod electrum apud Græcos, nominis significatio: quandoquidem Karabe lingua Persica, Auicenna autore, non aliud designat, quā rapens palea. Quod sensu comprehenditur proprium esse succini, aut electri, non autem populorum gummi. Insuper astruuntur pastillos, quos Galenus lib. v. de compositione medicamentorum secundum locos, Paulus sui uoluminis etiam septimo, & Actuarius in suo de compositione medicamentorum, electri trochiscos uocant, Arabes de Karabe appellant, eosdem à Galeno, & Paulo assumentes. Quo fit, ut hac in re manifestè aberrasse Brasauolus deprehendatur. Itaque dicendum esse putauerim, electrum idem esse apud Græcos, quod succinū apud Latinos, et Karabe apud Arabes. Neq; etiam illud ideo populorum gummi esse crediderim, ut Brasauolus asseuerat, quod Paulus quoq; dixerit: Electrum populi albe lacrymam dicunt, quæ iuxta Eridanum annem destillat, & in spissitudinem coit, aureo colore. Nam his uerbis non probatur electrum esse alba populi gummi, sed id tantum refert ex aliorum opinione, quemadmodum fecit Dioscorides, quem secutus est Paulus. Ex his igitur satis patere arbitror, falsum esse, quod idem sint electrum, gummi populi, & Karabe: quin potius clarum, succinum, & gummi populneum esse inter se diuersa. Credidit Demonstratus fieri succinum ex lyncis urina (quemadmodum credidere pharmacopœ, & uulgo medicorum ex eadem fieri Lepidos, quos lyncis appellant) succinum asserēs, quod stauescit, fieri ex urina maris; album uero ex urina scemine. Quibus refragatur Plinius: quandoquidem ipse manifestè dicat, hoc esse falsum. Quod cum & Diocles, & Theophrastus credidissent (non autem Dioscorides, ut ei falsò Brasauolus imponit de lapidibus lyncis agens) eos eiusdem criminis Plinius accusat. Quod autem Diocles, & non Dioscorides (ut Brasauolus putat) huius erroris accusetur, ostendat ipse Dioscorides libro secundo capite de urina, ubi in eandem Plinij sententiam ueniens, hæc uerba protulit. Lyncis urina, quam lyncurium appellant, simul ac excernitur, glaciari, coire in calculi duritiā, uulgo creditum est. Quod quod de ea proditum est, uanum esse conuincitur. Est enim quod à nonnullis uocatur succinum pterygophoron, id est dictū, quod pennas ad se allicit. At cum Brasauolus minus fortasse accuratè Dioscoridis uerba legendo percurrisset, dixit de Karabe agens, sensisse Dioscoridem electrū esse lapillum, in quem lyncis urina concreuit. Quod tamen falsum esse facile constat ex prædictis Dioscoridis uerbis. Ceterum cum non desint etiam poëtæ, qui Phæthontidas non in populos, sed in alnos mutatas fabulantur, Alni quoq; historiam, & uires, præcedentibus adnectere non ab re fore existimauimus. Est itaq; ALNUS (ut Theophrastus est autor libro III. cap. XIIII. de plantarum historia) sterilis & unigena, natura caudice recto: ligno, medullaq; molli, adeo ut graciliores uirgæ totæ concauentur: folio pyri, sed ampliore, neruosioreq;: cortice scabro, rufoq; intus, quæ de causa coria tingit: radice summa, nec maiore, quā lani. nascitur in aquosis, alio nullo pacto. Hactenus Theophrastus. Qui tamen eodem lib. cap. xv. non utiq; pyri filio dnum uirescere tradidit, sed ponticæ nucis. Nec eandem prodidit esse sterilem libro eodem cap. vi. cum inquit. Terebinthus circa tritici messem, aut paulò serius semen reddit: fraxinus, æque ætate: alnus, nux iuglans, pyrorumq; syluestrium genus quoddam autumno. Quo fit, ut alterum omnino suspicandum uideatur, aut sibi ipsi Theophrastum repugnare, aut eius codicem his locis mendis scattere. Alnus in Italia nascens, folio est coryli crassiore, neruosioreq;: materie molli, rubente, in aquosis ferè semper proueniens. Hetrusci uulgo appellant onio: alij uero in Italia auno. Italica fructum fert uiride, oblongum, moris forma similem, squamis quā plurimis in se compactis. Maturarescit autumno, minuto intus semine, colore in nigrum fuluo. Præfertur lignum ad ædificiorum fundamenta, quæ in fluminibus, lacubus, paludibusq; fiunt, quod in aqua nunquam putrescat. Ob id enim expetitur maxime Venæ ad iacienda palatiorum, ædumq; fundamenta, quod crebrò fixa non modò ad eternitatem permaneat immortalis, sed quod ingentes admodum ferat moles. Recentia, folia tumores imposita dissoluunt, & inflammationes restingunt. Eadem nudis pedum plantis supposita uiatoribus itinere defatigatis leuamentum præstant. Quin & rore maturo madentia cubiculis ad necandos pulices per æstatem utiliter sparguntur. Præstat cortex tingendis corijs airo colore. Sed nec BETULA omittenda uidetur: quæ cum cortice albo sit alba populo adsimilis, nunc nobis sese offert describenda. Hæc Theophrasto folio est caryæ sic Græcis uocata (quid autem sit carya compertum hactenus non habeo) præterquam quod paulò augustiori, cortice autem uersicolore, & materie læui, non nisi ad baculos uult. Plinio lib. xvi. cap. xvi. Betula arbor est Gallica mirabili candore, atq; tenuitate: terribilis magistratum uirgis: eadem circulis flexilis: item corbium sportis. Bitumen ex ea Galliæ excoquunt. Hactenus Plinius. Betula in Triden- no agro frequentissima prouenit, materie adeo tenaci, lentæq; ut ad uasa uinaria cingenda circuli ex ea parati omnium præstantissimi habeantur. Ananij è suis Betulis non modò optimos conficiunt carbones, ad coquenda liquendaq; tallia, sed è delibrato, contortoq; cortice, faces ad nocturna lumina parant, quæ quod bituminosa pinguitudine redudent, tedæ modo conflagent, & resinofiam quoddam picis colore reddunt. Nec fortasse alia de causa Betula dicitur,

Betule confi-  
deratio.

ouit enim uanum



# In Lib. primum Dioscoridis.

91

nisi quod bitumine scateat. Hanc Tridentini corrupta uoce uulgo appellant Bedollo. Gaudet frigido tractu ac niuoso: fido est nigrae populi, sed parte prona asperiori, uiridioriq; per ambitum serrato, et minutissimis quibusdam punctis, ipsiq; albicantibus in uniuersum resperso. Sterilis haec, nec fructum ferens. Huius caudex terebro perforatus ingentem aquae copiam reddit, cui uim maximam inesse quidam asserunt ad comminuendos tam renem, quam uesicae calculos, si diutius bibatur. Eadem maculas in cute delet, nitoremq; conciliat: oris ulcera sanat collutione ex ea facta. Foliorum succus coagulo admixtus, caseos à carie, et uermibus uindicat.

Betula uired.

Μάκρη.

MACER.

CAP. XCIII.

MACER ex Barbaria aduehitur, cortex flauescens, crassus, gustu perquam astringens. Qui contra cruentas excreationes, dysenterias, & alui fluxiones bibitur.

NUNQVID officinarum Macis, quo myristicae nuces praeextus instar conteguntur, Dioscoridis sit Macer, non modo dubitandum est, sed etiam credendum (ut ego arbutor) magnam inter utrumq; esse differentiam. Cum enim Dioscorides dicat: Macer, qui ex Barbaria aduehitur, est cortex crassus, flauescens, et gustu perquam astringens, manifeste declarat, Macerem non esse officinarum macim, quod hoc tenue sit, gustu feruens, acce, perquam odoratum, amarumq;. Adde quod dixerit Plinius lib. xii. capite viii. Macir ex India aduehitur, cortex rubens, radice magne nomine arboris suae: qualis sit ea, incompertum habeo. Hanc etiam differentiam non ignorauit Serapio: nam postquam tradidisset ex auctoritate Isach, Macim esse nucis odoratae operimentum, dixit secus esse, de quo loquebatur Dioscorides: quippe quod scriptum reliquerit, Macerem esse ligni corticem, siue corium. Quod cum copertum haberet Auicenna, de utroq; seorsum tractauit, et Macim odoratae nucis inuoluerum ad caput 456. releget: Macerem uero radice corticem capite 694. sub titulo Thalissar descripsit. Praeterea maximo est argumentum, quod Macis et Macer utique inter se differant, quod Dioscorides, Galenus, et Paulus de odoratis nucibus, quorum Macis est tegumentum, nihil scriptis memoriae reliquerint. Quippe si Macer, qui eis conuehebatur, Macis nobis uulgare extitisset, credendum sane est, quod cum illo quoque aduectae essent myristicae nuces, quarum illi historiam, et facultatem, cum sint et in uiribus, et in odore admirabiles, nequaquam describere praetermississent. De macre Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, haec scriptis tradidit. Macer cortex est, qui ex India conuehiunt, gustu multum acerbo, cum leuicula quadam acrimonia odorata, iucundum sane redolens, ut plerumq; aromata, siue odorata, quae ex India conuehantur. Videtur itaq; et ipse ex mista constare essentia, pleraque terrena frigida, paucula uero calida, et tenuium partium. Quamobrem ualenter desiccatur, astringitur: proinde coeliacis, et dysentericis miscetur facultatibus: in tertio exiccantium consistens ordine, in caloris, frigorisq; differentia neutrum insigniter efficiens. Haec Galenus. Ex quibus haud obscure colligi potest, quod Macer longe differat à Maci. Namq; ipse gustu non reperio hoc esse adeo acerbum, nec tam leuiscula acrimoniae: quin potius si degustetur, linguam, et fauces admodum uellicat: odorem iucundum perfundit, et leuisculum amarorem quadam cum siccitate relinquit. Quod facile ostendit, quod Macis tantum calidi, quantum sicci conceperit, uel fortasse plus calidi: et quod pleraque ipsius essentia sit tenuium partium. Idcirco errare non crediderim, qui dixerint Macim odoratum ex desiccare, et pariter siccare in fine secundi, uel in principio tertij. Quamobrem id Macer esse non potest, cum dicat Galenus constare macerem essentia pleraque frigida terrestri, paucula uero calida. Quibus facile concludi potest: quod macer à Dioscoride, et Galeno descriptus hoc uero ad nos non aduehatur: siquidem nullus in officinis reperitur cortex, qui possit maceris historiam explere. Et quantum Monachi illi, qui in Mesum commentarios scripsere, nullam inter macim, et macerem ponendam esse differentiam pro certo affirmant, nulla tamen auctoritate (quod eundem sciam) aut ratione nituntur. Ceterum haud ignorandum est nec Galeno, nec Plinio, quod dixerint ex India aduehi macerem, Dioscoridem repugnare, cum ex Barbaria ipse asserri dixerit: quoniam (ut Ptolomeus est autor) quaedam in Indo flumio insula, uel urbs sita est, quae Barbaria dicitur, ex qua facile comportabatur macer. Vel quod afferretur ex Arabia eo maris sinu, qui à Barbaria insula Barbaricus appellatur. Quandoquidem (ut inquit Strabo) omnia, quae in India proueniunt, ea scilicet parte, quae ad austrum uergit, similiter in Arabia nascuntur.

Maceris considerano.

Maceris facultates ex Gal.

Monachorum opinio falsa.

Πτελέα.

VLMVS. Wolunv basim

CAP. XCV.

VLM & folia, & cortex, & rami vim habent spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur: vulnera glutinant, sed multo magis corticis tilia, si fasciae loco intorqueatur: nam in lori morem flecti potest. Crassior cortex in uino, aut aqua frigida unciatim potus, pituitas trahit. fracta ossa celerius solidescunt, si decocto foliorum, corticis, aut radiceis foueantur. Humor in folliculis enascens prima germinis eruptione, cuti illitus nitorem inducit, faciemque splendidiorem praestat: qui dum siccatur, in animalia abit, quae culicum formam gerunt. Folia cum tenerescunt cocta, olerum more ad obsonia usurpantur.

Vlmi histo-  
ria.



Theophr. &  
Plinii error.

Vlmi facul-  
tates.

Vlmi vires  
ex Galeno.

**T**IMETSI Vlmi notissima omnibus ferè sit arbor; ne-  
tamen ob hoc silentio inuoluenda putauimus; quæ de ea poëti-  
tatis memorie prodidit antiquitas. Vlmi itaq; (ut Theophras-  
tus est autor lib. III. cap. XIII. de plantarum historia) du-  
bus distinguitur generibus: cuius altera montana; quam Græci  
ἀγρίαν ἑλεάνον uocant; altera campestris, ulmus propriè uocat;  
fruticosior hæc, illa uerò auctior: folium indiuiduum, leuiter cir-  
cumferratum, oblongius quàm pyrro, scabrum, non leue. Pre-  
stat hæc arbor et amplitudine, et celsitudine, non crebrè canu-  
Idam, sed rara, irriguis amica: materies flaua, robusta, ner-  
sa; deformis, ut quæ tota cor sit. Utuntur ea ad fores lauiore:  
uiridis facillè ceditur, sicca difficilè. Sterilis deniq; putatur: sel-  
gummi in petiolis gignit; et animalia quædã culicea: cæteris uero  
peculiares gerit, autumnino multas, minutas, nigras: cæteris uero  
temporibus quid ferat, minus animaduersum est. Hactenus Theo-  
phrastus: Plinius uerò quatuor ulmi genera statuit lib. XVII. c.  
XVII. his uerbis. Inter hæc, atq; frugiferas, materie nitenti-  
micitia accipitur ulmus. Græci duo eius genera nouere: mon-  
tosam, quæ sit amplior: campestram, quæ fruticosa: Italici at-  
tineas uocat, excelsissimas: et ex ijs siccanas proferi, quæ non  
sint riguæ: alterum genus Gallicas: tertium nostrates, densiore  
folio, et ab eodem pediculo numerosiore: quartum syriacum.  
Attineæ non ferunt samaram; ita uocatur ulmi semen, omnesq;  
e radicum plantis proueniunt, reliquæ uerò semine. Hæc Pla-  
nius. Qui tamen unã cum Theophrasto errasse deprehenditur,  
quod hic ulmum cuiusvis generis sterilem esse scripserit: ille au-  
tem, quod attineam sic Italici appellatam, semine nullum ferre pro-  
diderit. Quandoquidem Theophrasto præter id, quod experien-  
tia nobis compertum est, repugnat Plinii auctoritas: quippe

qui ulmos omnes præter attineam semine prouenire scribit. Plinio deinde, qui attineam semen ferre negat, refragum  
Columella lib. V. cap. VI. cion inquit. Vlmorian duo esse genera conuenit, Gallicum, et uernaculum: illud attineæ  
nostras dicitur. Attinian ulmum Tremellius Scrofa non ferre samaram (quod est semen eius arboris) falsò est opi-  
natus. Nam rariorem sine dubio creat, et idcirco pleriq; et sterilis uidetur, seminibus inter frondem, quam prius  
germinatione edit, latentibus. Itaq; nemo iam ferit ex samara, sed ex sobolibus. Est autè ulmus longè letior, et pro-  
cerior, quàm nostras, frondemq; uicundiorẽ bubus præbet. Sed ulmi facultates hæc sunt. Folia, et cortex, et re-  
mi uim habent spissandi, et uulnera contrahendi. Corticis utique interior tilia, lepras sedat, et folia ex aceto illa.  
Corticis denarij pondus potum in hemina aquæ frigide aluon purgat: pituitasq; et aquas priuatim trahit. Imponi-  
tur et collectionibus lacryma, et uulneribus, et ambustis, quæ decocto fouere prodest. Humor in folliculis arboris  
huius nascens cuti nitorem inducit, faciemq; gratiorem præstat. Confert mirum in modum et pueris enterocelcis, si  
duplicatis linteolis in eo madefactis sub perizomate, seu femorali subnectatur. Cauliculi foliorum primi uano decocto  
tumores sanant, extrahuntq; per poros. Folia trita, aqua respersa, pedum tumoribus utiliter illinuntur. Humor quo-  
que e medulla castrate arboris effluens capillum reddit capiti illitus, defluentesq; continet. Vlmi meminit Galenus  
lib. VIII. simpl. medicam. sic inquit. Vlmi folijs quandoque recens uulnus glutinauimus, confidentes adstringentem  
pariter et abstergentem inesse illis facultatem. Cortex amplius etiam subamarus est, et adstrictorius: itaq; cum ac-  
to et lepram sanat. Porro uiridis etiãnnum ac recens, si uulneribus uinculi uice circumligetur, ea glutinare potest.  
Radices eandem uim obtinent: nam et decocto earum quidam perfundunt fracturas, quæ topbo, siue callo intacto  
opus habent.

Σαπρότης ξύλων.

LIGNORVM MARCOR.

CAP. XCVI.

**E**X CAUDICIBVS, lignisque ueteribus caries congeritur. quæ farinæ modo illita ulcera  
purgat, & ad cicatricem perducit: serpentia cohibet, si cum pari aniso & uino subacta, linteisque  
imposita illinatur.

Cariæ ligno-  
rum confide-  
ratio.

**N**ON SANE prorsus negligenda est lignorum ueterum, et contabefactorum caries, cum tãta facultate pos-  
seat, ut ulcera expurgat, solidetq; et eadem serpentia sistat. Quod eo præstat efficacius, si ex lignis arborum colligatur, quæ tum adstringendi, tum etiam abstergendi uim possident. Quo fit, ut ligni Guaiaci caries cæteris hæc uirtus  
facillè præstet: quippe quæ non modò ulcera, quæ contumacia non sunt, sanat; sed et quæ cacœthæ dicuntur, quæ  
Gallica peste contracta sunt. Quare pudendorum exedentibus ulceribus inspersa mirificè medetur. Ceterum nos  
modò lignorum marcor, siue caries in medicum usum uenit, sed et VERMES in cariosis lignorum caudicibus nascen-  
tes, si Plinio credimus, qui libro XXX. cap. XIII. de his sic scriptum reliquit. Costi, qui in ligno nascuntur, sanant  
cera omnia: nomas uerò combusti, cum pari pondere anisi, et ex oleo illiti. Delicatiores fuisse hos olim et in eis


Vermium li-  
gnorũ usus.

id est posteritatis memorie tradidit libro xvii. cap. xxi. cum inquit. Vermiculantur magis minusue quedam, omnes tamen ferè, idq; aues caui corticis sono experiuntur. Iam quidem & in hoc luxuria esse cœpit, prægrandesq; roborum delictiore sunt in cibo, cossos uocant: atq; etiam farina saginati, hi quoq; atiles fiunt. Quapropter mirum non fuerit, si etiam antiquitas cicadas, quæ nondum alas deprompserunt, in cibis deuorauerit, Aristotelis testimonio, qui etiam addidit gustantibus esse suauissimas. Sed cur illud admirandum fuerit, si nostris etiam temporibus uermes, qui carosis caseis innascuntur, magna admodum cum uoluptate à compluribus deuorentur? Gal. cum & ipse ad artorem, ex qua caries decidunt, particularem scopum habuisset, lib. viii. simp. medic. sic de illa scripsit. Caries lignorum, & maxime, quæ particeps est adstrictionis simul, & absterfionis, uelut ulmus, expurgat, impletq; ultra tetrabionida.

Carici uires  
ex Galeno.

Κάλυμος. HARVENDO. Ῥοτὸν

CAP. XC VII.



IN HARVNDINVM genere quedam nastos, id est, farctior uocatur, ex qua sagittæ facitari solent. Alia foemina, qua tibiæ ligulas efficiunt. Alia, quod fistulis addita sit, syringias: cui multum inest carnis, crebris cincta geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, concava, apud amnes nascentis: quæ à quibusdam cypria, ab alijs donax appellatur. Alia phragmites, seu uallatoria, gracilis, candidans, uulgò cognita: cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula aculeosque corpore extrahit: luxata, lumborumque dolores cum aceto mulcet. Virgentia folia tusa, & imposita ignibus sacris medentur, & cæteris inflammationibus. Corticis cinere perunctæ cum aceto alopecie sanantur. Panicula lanugo, si aures intrauerit, exurdat. Eundem effectum implet harundo, quæ cypria dicitur.

HARVNDINVM quinq; genera tantum, ueluti notiora hoc in loco à Dioscoride produntur: licet Plinius lib. xvi. cap. xxi. & libro xxi. capite xi. uiginti nouem harundinum species describeret: inter quas (ut superius diximus) odoratam recensuit, quæ Græcis καλὴν ὀσμὴν ἔχουσαν, appellatur, in India, Syriaq; nascentis, odoris iucunditate unguentis accommodata. Quod aperte indicat calami odoratum esse inter harundinum genera reponendum, non autem inter radices, ut uulgi medicorum, & Brasauolus Ferrariensis contendunt, acori radices pro legitima odorata harundine assumentes: illa, quæ nastos dicitur, solida, farctaq; , quæuis gracilis & leuis, in communem sagittarum usum à Syris accepta, non oritur, quod scierim, in Italia, nisi nascatur (ut tradidit Plinius) in Rheno Bononiensi amne. Illa

Harundinum  
consideratio.

etiam, quæ thelys, hoc est, foemina appellatur, cuius tantum est usus ad tibiæ ligulas, hætenus mihi incognita est. Namq; nostra tempestate fiunt eiusmodi ligulae ex communibus harundinibus, ex ea scilicet specie, quam Dioscorides uallatoria nuncupat, qua nostri in uiridarijs, ac hortis in topiarijs extruendis utuntur, ac palos uitibus aptissimos efficiunt. Quod autem uallatoria sit hæc nostra communis, mihi aliquando dubitandi præbuit ansam Dioscorides: quippe qui dicat, eam esse gracilem, & candidam, cum tamen communis nostra sit crassior. Verum cum postea inueniam Theophrastum scribentem libro. iiii. capite xii. de plantarum historia, crassiorem, firmioremq; illam harundinem esse, quæ uallatoria nominatur, facile sum ad credendum inductus, huc Dioscoridis locum esse deprauatum, eoq; magis, quod septis, palis, & topiarijs operibus crasse sunt tenuibus aptiores. Illa uero, quæ ad scribendum usurpatur, cui auctoritatem pennæ derogarunt, plurimè reperitur in locis, estq; omnibus notissima: ueluti & ea, quæ Cypria uocatur, in paludibus nascentis, & apud amnes. Traditur à pluribus rei agrarie autoribus, tum etiam à Plinio inter harundinem, & filicem herbam intestinum esse odium: proinde harundinem uomeri alligatam filicem in agro destruere, ac enecare prodiderunt. At eò maior harundini cum asparagis intercedit amicitia: nam si serantur in harundinibus, inibi mirifice proueniunt. Quidam præterea prodiderunt, harundines in India ad tantam assurgere molem, ut singula internodia nauigiorum uicem præstent per fluuios, & lacus, ternos homines capiente alueo. At si plura de harundinum generibus quis audire cupiat, Theophrastum legat, qui longiori sermone earum historia literis, memorieq; mandauit. De harundine Galenus libro vii. simplicium medicam. hæc scripta reliquit. Calami phragmitis radicem cum bulbis aculeos, & stipites ex alto extrahere quidam scripsere, seu trahendi quedam uis ei inesset. Nos tamen eius rei periculum non fecimus: uerum quantum gustu liceat conijcere, abstergentem facultatem possidet non paucam, minimeq; acrem. Cæterum folia ipsa abstergentis sunt facultatis. Cortex uero eius combustus admodum tenuium partium, & digerentis facultatis efficitur, adiunctum habens absterforium quiddam, ut exiccet, & excalescat

Harundinis,  
& filicis odiu.

Harundinis  
uires ex Gal.

tertio

tertio quodammodo ordine, plus tamen desiccet, quàm excalsfaciat. Vitandum autem est eius id, quod antea cant: nam si in aures incidat, adeo tenaciter adherens affigitur, ut auelli non possit, auditumq; laet: quoniam sepius exurdat.

Πάπυρος. P A P Y R V S. CAP. XC VIII.

P A P Y R V S, qua chartæ fiunt, nullis non cognita, præcipue in medicina utilitatis ad lacerandas fistulas: madefacta lino inuoluitur, usque dū inaruerit: constricta enim, atque immissa in eorum humore completur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimeti radix: in Ægyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes, & māsā expuunt. Ipsi radicibus pro ligno utuntur. Crematæ papyri cinis depascentia ulcera cum omnium partium, tum oris maxime, combat: uerum melius id combusta charta præstat.

Papyri conficiendatio.

Q V A L I S Papyrus sit, Italia nescit: siquidem (ut Theophrastus est auctor lib. III. cap. IX. de plantarum historiâ, & Plinius lib. XIII. capite XI.) Papyrus in Italia non nascitur, sed in Ægypto quibusdam in locis tantum prope Nilum fluuium, quiescentibus Nili aquis, ubi hæc euagatæ stagnant, duo cubita non excedente altitudine gurgum: triangulari oblique radicis crassitudine, triangulis lateribus decem non amplius cubitorum longitudine, in gracilem se stigmatum, thyrsi modo cacumen includens: semine nullo, aut usu eius alio quàm floris ad deos coronandos. Radices incolæ pro ligno utuntur, nec ignis tantum gratia, sed ad alia quoq; utensilia uasorum. Ex ipso quidem papyro uigia texunt: & è libro uela, tegetesq; necnon & uestem, etiam stragulam, ac funem. Mandunt quoq; crudum, detestumq; succum tantum deuorantes. Nascitur & in Syria, circa quem odoratus ille calamus lacum. Nuper & Euphrate nascens circa Babylonem. Papyrus intellectum est eundem usum habere, quem chartæ: & tamen etiam maluit Partibi literas uestibus intexere. Preparantur ex eo chartæ diuise acu in prætenues, sed quàm latissimas pilulas. hæc Plinius. Qui deinde sequenti capite fusi docuit Papyri conficiendi rationem, his uerbis. Post hæc papyrus est, extremumq; eius scirpo simile, ac ne frangibus quidem nisi in humore utile. Texunturq; omnes tabule medietes Nili aqua. Turbidus liquor uim glutini præbet, cum primo supina tabula scheda adlinitur longitudine papyri, que potuit esse, res geminibus utrinq; amputatis. Transuersa postea crates peragitur: premittitur deinde prælis, & succatur sole plagula, atq; inter se iunguntur. proximarum semper bonitatis diminutione ad deteriores. Nunquam præres scapo, quàm uicene, magna in latitudine earum differentia XIII. digitorum optimis. Hactenus de papyro Plinius. Videntur & Papyri quoddam esse genus, tenuia, leuiq; illa folia è iunce quadam planta prodeuntia, que ab insulis diui Thomæ, Brasiliæ, & Mederæ, ad nos conuehantur, saccharis ut uocant panibus inde delatis circumuoluta. Quod quidem fragmentum retinemus à clarissimo medico Luca Ghino Pisfis ad nos missum, nigris rubrisq; Arabicis characteribus manu scriptum, quod clarissimum præbet indicium, earum insularum incolæ tenuissimis his folijs, pro papyro passim uti. Veruntamen hoc non esse papyrum, è quo antiquitas suas confecit chartas, certò scimus, quòd hoc an (ut Plinius est auctor) fieret, illud uero talè à natura producatur, & proprium suæ stirpis sit folium. Antiquitatem ex Papyro chartam factitabat, quemadmodum nos ipsam ex contritis linteis conficimus, unde hactenus antiquam retinens nomen, etiamnum Papyrus apud plerosq; dicitur. Credidere nonnulli, ueram esse Papyrus harundines illas, quas Indicas uocant, quibus imbecilles principes, atq; hierarchæ, prelati uulgò dicti, ad agram senectutem fulciendam pro scipione utuntur, materiem auro, uel argento succingentes. Quod tamen asserere non ausim, nec utiq; reprobare, cum huiusce rei certā cognitionem adhuc assequi non potuerim. Papyrus meminit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum sic inueniens. Papyrus ipsa quidem per se in usum medicinale non uenit: at macerata, aut uis uis efficitur. Igitur oxycrato, uinoue macerata, recentia ulcera glutinat, maxime in circulum circumposita. Verum bic quidem est, ceu materia, que medicamina sanantia accipiat: at ubi usta fuerit, medicamen est exiccatorium, uelut & chartæ combustæ cinis, nisi quatenus infirmior est, quàm papyri. hæc Galenus. Ceterum animaduertendum est, quòd nostri usus charta, que ex ueteribus conficitur linteis, iisdem non pollet facultatibus, quibus ea commendatur, quam ueteres ex papyro arbore parabant. Quo fit, ut dubium mihi sit, quoniam modo parari possit illud Galeni medicamentum, quòd de charta combusta dicitur, ulceribus sordidis, & sinuosis utilissimum: itemq; pastillus Faustianus à Paulo libro VII. traditus.

Indica harum do.

Papyri uires ex Galeno.

Μύριαν. MYRICA. Nrijdt

CAP. XCIX.

MYRICA, seu tamarix, arbor vulgo cognita est, cum apud pigras, & stagnantes aquas nascatur, fructum quasi florem ferens, compage muscosum. Ægyptus, Syriaq; altera gignunt mitiorem, syluestri cætera similem. Fructum parit gallæ proximum, inæqualiter astringentem gustu: quo conuenienter utimur uice gallæ in medicaminibus oculorum, orisque. Datur cruentæ excreationi in potu, & cæliacis, & contra profluuium sceminarum, regium morbum, & phalangiorum morsus: illitus tumores inhibet. Cortex in eisdem usus adhibetur. Decoctum soliorum cum uino potum, lienem absumit: ad dolorem dentium in collutionibus salutare, & mulieribus fluxione vuluæ opportunis in defensionibus: phthiriasi, lendibusque circumfusum prodest. Abundantiam sceminarum sistit impositus arboris cinis. Potorios calices è caudice lienosis mouliuntur, quòd datus in his potus proficiat.



VRBANA Myrica, quod sciam, non nascitur in Italia; Myrica con-  
sideratio.

quoniam in Aegypto, et Syria gignitur. Quae uero alicubi re-  
peritur in hortis, et in quibusdam uiridarijs mitior credita, non  
alia est, quam sylvestris, in locos mitiores translata. Cuius rei  
certo sunt indicio fructus, et flores, quos omnino sylvestribus si-  
miles profert, non autem galle modo, ut domestica. Umbra arbo-  
ris insigni proceritate saepe, per aestatem Romae me oblectatum  
fuisse recorder ad Tyberis ripas, in hortulo quodam hospitalis  
Sancti spiritus. quae etsi domestica haberetur ab omnibus, florem  
tamen, et fructum ferebat sylvestri similem. Haec in fluminum ri-  
pis frequentissima nascitur in Italia. Quare non potui non admi-  
rari Dioscoridem: quippe qui dicat tantum nasci Myricam apud  
paludes, ac resides aquas, cum oppositum sane eueniat in Italia.  
Quod me sepius adduxit, ut crediderim, aut Dioscoridis codicem  
hoc loco deprauatum esse, aut in Graecia secus, quam in Italia myri-  
cam proxime stagna, ac paludes oriri. E myrica truncos alui  
excavantur (ut Columella scribit) aquae replentur, ut subinde  
postea bibant sues: nam hoc potu splenis incremento sanantur,  
quod morboestate maxime torquentur, dum, quae eorum est pabu-  
li insatiabilis auditas, arborum fructus confectantur, qui pluri-  
mo eo tempore ariditate in terram decidunt. Porro myrica ci-  
mentum omnia ulcera ignis exustione contracta, efficaciter exi-  
care, auctor est Serapio. Folia simul cum tota planta foris frigi-  
das collectiones inbibent, ac reprimunt. Elephantiasim ex lienis  
tumor abortam myricae radicem decoctum, et cum passis uinis epo-  
tum, sanare tradidit. Alcanzius Arabs: id quod se uidisse ait in  
modicis mulieribus, quae hac labe laborarunt. Ex quo mihi per-  
suasum est, id non incongruum in Gallica peste fore medicamen-  
tum, Guaiaco forsitan ligno non absimile. Myricae radices pro

odorata casta uenditabant impostores. Sed postquam fraus a peritis medicae materiae uiris deprehensa est, eius in of-  
ficinis usus penitus exoleuit. Meminit myricae Galenus lib. vii. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Myri-  
ca abstergens est, ac incidentis facultatis, absque perspicua desiccatione: habet uero etiam adstrictionem nonnullam.  
Has ob qualitates, facultatesque admodum prodest lieni indurato decocta cum aceto, aut uino, siue radice, siue folijs,  
siue extremis ramulis: sanat porro dentium dolores. Ceterum fructus, et cortex non paucam sortita sunt adstri-  
ctionem, adeo ut galle omphacitidi proxima sint, nisi quod acerbitas euidentis est in galla, sed myricae fructui tempera-  
tura inest inaequalis: immista est enim naturae eius multa partium tenuitas, atque uis abstergendi: quod sane galla non  
accidit. Attamen ubi galla forte ad manum non erit, eo uti liceat ad omnia, ad quae illa utimur: in eisdem et cortice.  
Porro myricae combustae cinis admodum desiccatoriae facultatis est, plurimam habens abstergendi facultatem, pau-  
cillam adstringendi.


Myrica medi-  
cina.

Myricae uires  
ex Galeno.



Εἰς ἡν. ERICA. Ἑρική.

CAP. C.

Ericæ confide-  
rant.Ericæ facul-  
tas ex Gal.

(ita appellatur uicus) ad Vipacum fluiuium itur. incolæ uernaculo sermone eam nominant Grione. Sed in Hattuu longè magis adolescit, fiuntq; ex ea scopæ aptissimæ ad mundandas edes, et ob id uulgo hæc planta propriè uocatur Scopa. Marcellus, nescio qua ratione ductus, ericam magno errore genistæ speciem putat. Hanc paucis perstrinxit Galenus libro v. i. simp. medic. sic inquit. Erica digerendi per balitum facultatem obtinet. Flore eius possimum, ac folijs utendum.


Ἀκακάλις. ACACALIS.

CAP. CI.

ACACALIS fructus est nascentis in Aegypto fruticis, seminis myricæ quadantenus similis. Cuius aqua, inqua maduerit, ad collyria additur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

ACACALIM Aegyptiæ arbusculæ semen ad nos hæc ætate conuehi non equidem arbitror. quippe quodlibet semina, quæ peregrina nobis importantur, nullum adhuc repperim, quod Acacalim legitime referat.

RHAMNVS PRIMVS.

*Quercus alba*

RHAMNVS SECVNDVS.



RHAMNVS TERTIVS.



Rhamnus. CAP. CII.

RHAMNVS fruticat in sepibus; ramos ferens re-  
ctos, & aculeos in acutæ spinæ modum: folijs par-  
uis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterum ei ge-  
nus candidius. Tertium nigrioribus, latioribusque  
folijs constat, & quadantenus rubentibus: cuius ra-  
mi quinum ferè cubitorum longitudinem implent,  
spinosiores quidem, sed infirmioribus, minusque ri-  
gentibus aculeis. Fructum edit latum, candidum, te-  
nuem, folliculari specie, uerticillo similem. Omniū  
folia igni sacro, & serpentibus ulceribus, efficaciter  
illinuntur. Fama est ramos huius ualuis, fenestrisue  
impositos, ueneficia depellere.

RHAMNI tria genera facit Dioscorides. Primum, &  
tertium ubiq; in Hetruria fruticant. Illud priuatim in sepibus  
nascitur, quo nostrates mulieres utuntur ad insolandas fici:  
siquidem eas adhuc recentes logis huiusce fruticis aculeis per-  
forant, & ad solem appendunt. Fert aculeos in acutæ spinæ  
modum: folia oblonga; mollia; suppinguia: corticem habet  
admodum album. Hoc, quod nigrius est (ut etiam Dioscorides  
inquit) quinum ferme cubitorum altitudine attolitur, infirmio-  
ribus aculeis: fructu tenui, folliculari specie, rotundo, uerticil-  
lo non absimili. Secundum uerò genus, quod cæteris candi-  
dius est, ad nos misit clarissimus medicus Lucas Ghinus, cuius  
etiam hic effigiem damus. Cæterum Ruellium deceptum esse  
crediderim, quippe qui Rhamni genus eam esse stirpem arbi-  
tretur, quam nos uulgari sermone Spino merlo, Longobardi  
Venetiq; Spin ceruino, Foroiulenses uerò Spin guerzo appel-  
lant.

Rhamnorum  
consideratio.

Ruellii error.

Lut. Hic enim folijs est latis, pyri quadantenus modo: fructu ligustri effigie, baccarum instar, cuius succo ~~uicini~~ pictores, ubi colore uiridi inficere sit opus: alij uero ad resoluendam aluum: eijcit enim atram bilem, & ~~pura~~ quæ sanè notæ Rhamni minime correspondent. Aberrasse præterea Ruellius deprehenditur, quod Theophrastus testimonio ea de Rhamni fructu tradiderit, quæ statim Theophrastus absoluta rhamni historia de paluro ~~de~~ ~~tra~~.

Monachorū  
error.

Rhamni ui-  
res ex Gal.

Sed in errore longè maiore uersantur Monachi, qui in Mesuem commentarios edidere, cum Rhamnum existimauerint rubum quendam, qui humi repens, incultisq; proueniens, mora cæruleo potius, quàm nigro colore profert. Rhamni meminit Galenus lib. viii. simplicium medicam. sic inquit. Rhamnus desiccatur, & digeritur excessifcundo, refrigerat in primo completo, aut secundo incipiente. proinde herpes sanat, & erysipelata non magis potest calida. Cæterum ad hæc teneris utendum est folijs.

Αΐμος.

HALIMVS.

CAP. CIII.

HALIMVS frutex est sepimentis idoneus, similis rhamno, sine spinis, folijs oleæ, sed latioribus. Nascitur in sepibus, & maritimis. Folia decoquantur ciborum gratia. Radix conuulsa, rupi, torminaque mitigat, drachmæ pondere in aqua mulsa pota: eadem lactis ubertatem facit.

Halimi confi-  
deratio.

EST profectò & Halimus planta, cuius uariæ sunt inter autores sententiæ. Alij enim (ut Plinius autor est libro, & cap. xxi.) halimum fruticem esse dicunt, Dioscoridem secuti. Alij maritimum olus, salso sapore. Tertium quoq; genus addidit Crateuas sub hederæ tâtum nasci, longioribus folijs, hisutioribusq; odore cupressi. Quæ autem à Dioscoride hoc loco describitur, etsi alicubi fortassis proueniat in Italia; tamen qui illam mihi ostenderet, adhuc reperi neminem. Verum, si Ruellio credimus, frequens in Gallia nascitur in sepibus. Solinus plurimam in Creta nasci tradit, mirabili, si credamus, effectu, quod ea tantum adnorsa famæ arceatur. unde si nomē adinuenisset, ea procul dubio sine aspiratione scribenda esset. Halimus Mauritanis molochia, & atriplex marinus appellatur. Cuius historiam referens Serapio, narrat, quod eam uenalem circumferentes in manuales fasciculos componunt, & per Babyloniam clauitant, molochia, molochia. Quod manifestè indicat, Halimum apud Mauritanos herbam potius esse, quàm fruticem, uel arborem, eamq; fortasse, quam Plinius maritimum, ac salsam prodidit. Quo fit, ut salsam quandam herbam (uicula Bidone uulgò appellant) quæ frequentissima in litoribus Venetis prouenit, hæc esse putauerim: quippe quod ea testis oleris in ciborum usum recipiatur. Putat Adamus Lonicerus, Halimum eam esse plantam uicula ferentem, quæ uulgò Ribem uocant. Sed cum huius folia non correspondant oleaginis, sed potius uitigineis, eum planè hallucinatum esse constat. Halimi meminit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Halimum hæc planta frutex est plurimo in Cilicia præcipue prouentu, ubi & germina eius recentia existant, & reponunt quoq; in postera futura usui. Semen pariter, & lac planta ipsa generat, estq; gustus salis, & subadstringētis. Ex quibus omnibus palam est, ipsam esse dissimilem. Maior autem pars eius substantiæ calida est temperatè, cum humiditate incoacta, & leniter flatuosa.

Halimi uires  
ex Galeno.

Παλιύρος.

PALIVRS.

CAP. CIIII.

PALIVRS frutex cognoscitur, aculeatus, durus: cuius semen, pingue, & fuliginosum inuenitur. Quod potum tussi opitulatur, uesciæ calculos comminuit, serpentium ictibus aduersatur. Folia & radix astringentia uim habent: quorum decoctum potu aluum fistit, urinam trahit: contra uenena, & serpentium morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresque omnes discutit, trita, & imposita.

Paliuri confi-  
deratio.

AD EØ inter se in quibusdam plantarum historijs discrepant scriptores, ut persæpe eorum mētēs maxime perturbent, qui rerum ueritatem indagare student. Id autem discriminis nimirum euenit de Paliuro. Nam quæ huius stirpis à Dioscoride traditur historia, omnino differt ab ea, quam diuersis generibus protulit Theophrastus. Hæc autem non conuenit cum ea, quam memorie prodidit Agathocles: neq; huic illa correspondet, cuius Plutarchus est autor: & hæc à prædictis omnibus prorsus dissentire uidetur. Paliurus Dioscoridis (ut ab eo primò exordiar) est frutex spinosus, durus, omnibus notus: cui semen pingue, & fuliginosum. Paucis eius historiam perstrinxit Dioscorides, nulla habita de folijs mentione, quod superuacaneum existimauerit pluribus agere de Paliuro, utpote plantæ apud suas regiones notissima. quod nobis est impedimento, quominus ueram Paliurum, de qua ipse intellexit, cognoscere ualeamus. Theophrasto deinde libro iii. capite xvi. de plantarum historia plura sunt Paliuri genera, quæ omnia siliquis semina terna, aut quaterna proferunt, lentorem præ se ferentia, ut lini semen. Amat nasci locis aridis, quæ modum & rubus, nec minus quoq; dilutis. Cæterum ab hac non parum differre uidetur & illa, cuius idem memorat ferius libro, & capite quarto: siquidem hanc plurimam nasci testatur in Africa folijs ei, quæ in Græcia nascitur, potest absimilem. Quæ quauis folio Græcam emuletur; fructu tamen diuerso prouenit, ut qui non latus, neq; foliolarum specie; sed rotundus, ruberq; sit, cedri fructibus magnitudine similis, cui & nucleus inest acinorum punici modo, qui tamen manditur. Fructus uero per se iucundus habetur, atq; si quis uinum infundat, tum ipsum suauiores, tum uinum suauius reddi aiunt. Ex quo aliquando mihi persuasi, cum non longè aberrare, qui dixerit, hanc illam esse stirpem, quam nos

Agrifolium.

Agrifolium dicimus, quod folijs sit undiq; aculeatis loto maioribus, fructu cedri, rotundo, rubro, nucleum intus habente, iucundo

- et iucundo, et gustui non ingrato: non tamen, quod pro certo hoc asserere uelim, quod hæc propria sit Africæ planta: sed quod aliquando his notis persuasus putauerim, Paliurum hanc aut Agrifolium esse, aut omnino arborem sibi similem. Pinus ex Theophrasto hanc ipsam literis mandauit libro xiiii. capite xxvii. Sed cum de uiribus eius differeret libro xxiiii. eam recensuit, quam et Dioscorides. Nullam ego arborem hætenus reperi, quæ Paliuro Africæ æ similitudine respōdeat, præter Agrifolium, ut dixi. Nō dico Aquifolium: nam (ut Plinius refert lib. xxvii. cap. viii.) Aquifolium ea est in Italia arbor, quam Theophrastus Cratægona uocat, omnibus fere notis m. espilo similis. Illa uero, quam Agrifolium appellamus, constat folijs perpetuis, lauri, latioribus tamen, subpinguibus, et per ambitum aculeatis: cortice uiridi: ramis lentis, ac flexilibus. Fructus ei rotundus, lucidus, ruber, ruscum et cedrum baccis æmulans. Huius radicem cortice incolæ uscum parant, quo etiam modo ex uiburno conficiunt. Hanc non desunt, qui uelint eam esse stirpem, quam Theophrastus Agriam, siue Ariam appellat, sempiternæ frondis arborem inter robur, et uicem mediam. Verum ut ad nostrum institutum redeamus, Agathocles Paliurum omnino ab illis differetem tradit: quippe quoniam assurgat in Alexandria (ut ipse inquit) ad pinus, ulmiq; proceritatem, ramis frequentibus, et aculeatis: folio uiridi, rotundo, tenui. Hæc bisera est, nam tam uere, quam autumnò fructum profert, oliuæ phauliæ uocata magnitudine. Crudus mādatur is ac iurens: ubi uerò exaruit, in farinam molitur, atq; ea ita estur nullo liquore subacta. Aliud Paliuri genus in monte Coccycio nasci prodit Plutarchus ex Ctesiphontis autoritate libro arboribus dicato, cui si auris, aut aliud animal uolucres fidat, uelut inuiscatum cohæret, præter cuculum, cui soli parcat, si tamen his fides est adhibenda: Quare cum de Paliuro, tot ac diuersæ ferantur sententiæ, et habeantur historiæ, facile crediderim, Paliurum esse nomen ad nationum placita uarijs, ac diuersis aculeatis stirpibus impositum: etsi Iosephus Saladus medicus apprime doctus, et in stirpium historia non imperitus, dum Veneta classe in Græciam traieciisset, Dioscoridis Paliurum se uidisse mihi pro certo affirmauerit, semine fuliginoso, ac pingui: atq; inibi proprium adhuc nomen retinere. Sunt tamen e recentioribus, qui putent Paliurum Dioscoridis eam esse arborem, quam nos sequenti capite oxyacantham esse pluribus comprobabimus. Sed profectò non placet eorum opinio, quod planta, quam oxyacantham censemus, arbor sit, non frutex: quodq; fructum proferat myrti magnitudine, confertum, fragilem, rubrum, osculos intus habentem, et in racemi modum coherentem. Paliurus uerò non fructum, sed semen ferat fuliginosum, pingue, et (ut Theoph. inquit lib. iii. cap. xvi. de historia plantarum) in siliquis conclusum, lentum, pingueq; lini seminis instar. Verum ij fortasse Theodorum Theophr. interpretem sequentes, hac in re decipiuntur. Siquidem is lib. primo. cap. xvi. sic uertit: Quædam folia cum extremo, tum etiam lateribus sinuata concidunt, ut ilicis, roboris, similacis (glândifera scilicet, et ilici similis) rubi, paliuri, et aliorum. Vbi animaduertendum est, cum perperam uertisse πῶς αὐτῶν ὅτι αὐτῶν sinuata, cum ea dictio Græca nil aliud Latine significet, quam spinis horridula. Error præterea ex eo manifestè deprehenditur, quod omnibus sensu pateat, ilicem, similacem, rubum folia non proferre aliqua parte sinuata, uti ea esse cernuntur, quæ plantæ illi exeunt, quam nos acutam spinam arbitramur: sed longa, et per ambitum ubique tenuissimis, ac crebris aculeis circumsepta, ut in eiusdem capituli progressu idem ostendit Theophrastus, cum inquit. Simili modo nonnulla ex his eandem primo muem, post horridulum spinis gerunt, ut lactuca, et cuncta folia spinosa redduntur, atque etiam magis in fruticum genere, ut rubus, paliurus. Quibus palam sit, plantam, quam nos uulgo uocamus Bagaia, alij uerò Amperlo, non esse Paliurum, sed potius acutam spinam ijs tum rationibus, tum autorit. tibus, quæ sequenti capite nobis adducentur. Galenus Paliuri à Dioscoride descripti meminit lib. viii, simp. med. his uerbis. Paliuri folia, et radix adeo non obscuram habent adstringendi facultatem, ut et uentrem fluentem cobibeant: adeoq; digerunt, ut et phymata curent, quæ quidem non admodum phlegmonode sunt, et calida: Fructus porro tantam obtinet incidendi uim, ut et calculos uescicæ comminuat: et pectoris, pulmonisq; excretionibus auxiliatur.

Aquifolium.

403

Recentiorū opinio reproba.

Paliuri uires ex Galeno.

O'ξυάκινθα.

ACVTA SPINA.

Hagm. Dorn

CAP. CV.

ACVTA spina, quam pyrinam, aut pityanthem aliqui uocant, arbor est pyrastro similis, spinosa ualde, & minor: baccas profert myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum: radicem multifidam, altè descendentem. Huius baccæ potu, aut cibo, alui profluuium, & abundantiam fœminarum sistunt. Radix illita aculeos, & spicula extrahit: abortum fieri tradunt, si ter radice uenter aut sensim feriat, aut perungatur.

Acute spinæ  
consideratio.



Acuta spinæ  
non est offic.  
Berberis, siue  
Crespinus.

HABET pro comperto tota recentiorum medicorum  
milia, quod arbor Dioscoridi dēvix arbor, id est. Acuta spinæ  
cata, quam Mauritanii Berberim dixerunt, ea sit nimirum arbor  
la spinis horrens, quam rura Trudentina, ubi in sepibus, siliis  
et conuallibus frequentissima nascitur, Crespino uulgo rō-  
nant: medicorum uero uulgu, ac officine. Arabes sicute Ber-  
berim appellant, ita esse certō credentes, ut opinione ducuntur.  
Verum amen si recte delineationes, notæq; perpendantur, quæ  
oxyacanthæ reddidit Dioscorides, crespini notis prorsus acuta  
spinæ reclamare constabit. Quæ potissimum ratione adducta,  
quod magis ueritas eluceat, errorisq; nebula tollatur, non dubitā  
eorum opiniones refellere: qui inter recentiores medicos de stir-  
pibus commentaria conscribentes, Crespinum uocatum legiti-  
mam oxyacantham esse asseuerant. Neq; me fugit, nō parum se-  
cepisse negotij, ut eos à concepta iamdū opinione in sententiam  
nostram, quam ueram putamus, uenire compellam: cum magis  
admodum sit tum medicorum, tum seplasiariorum turba, quæ hæc  
in historia longo usu aberrat. Verum cum compertum habeam,  
quod ueritas sit nunc candidior, soleq; splendidiore, et eorum tum  
uera, tum fida comes, qui uirtutibus, ac probitate præstant, hæc  
meas rationes multorum auctoritate comprobatas, nullam horū  
doctissimorum uirorum auribus molestiam allaturas, qui nolent  
aberrare: quinimo ijs, utpote ueri defensoribus, fore inuolū-  
simas, atq; gratissimas. Nam qui, ut sibi placeant, malunt errare,  
quàm ueritati, et æquo cedentes, errores cognoscere, eosq; cor-  
rigere, non sunt in philosophorum, ac rationabilium hominum  
numero recipiendi. Sed ne apologeticis uerbis tempus conte-  
ratur, rem institutam aggredior. Dioscorides acutam spinam ar-  
borē esse pyraastro similem scribit, minorem tamen, magisq; ac-  
leatam, fructumq; gerere myrti similitudine, plenum, fragilem, rubentē, et intus nucleum, cui radices subsint multæ, et  
altæq; descendentes. Ex quo palam est, ipsum nō alias acutæ spinæ notas expressisse, quàm proceritatis, crassitudinisq;  
stipitis, ramorum, radicum, ac fructuum, ommissa foliorum, florum, et corticis historia. Quæ omnia ipse accurate perpe-  
dens, in prunis Crespinum omnibus notis pyraastro reclamantem comperio, cui tamen prorsus ad stipularem acutam spinam  
Dioscorides est autor. Siquidem sylvestris pyrus, quemadmodum et oxyacantha, simplex è solo profilit, atq; uic-  
duntaxat caudice attollitur, ac inde tam in longum latumq; crescit, ut ad communem arborum proceritatem assurgat.  
Crespinus uero, cuius sanè innumeræ mihi præ oculis quotidie sese offerunt plantæ, nullum ab radicibus mittit caude-  
cem, sed pluribus, ac diuersis aculeatis stolonibus fruticat, quæ iurgarum modo in altum se attollunt, nec unquam arbo-  
rescunt, nisi raro, et longo temporis tractu: quippe qui omnium maiores habentes, pollicarem crassitudinem raris-  
sime excedunt, nisi etate longa incrementum susceperint. quin et rara inueniuntur eius uirgulta, quæ hominis longi-  
tudinem æquant. Ad hæc pyraaster cortice constat aspero, squamoso, inæquali, crasso, colore in nigro rufescente.  
Crespinus uero cortice uestitur albo, leui, et admodum tenui: quo fit ut non adeo leuiter ferro, uel lapide tangi possit,  
quam statim cortex frangatur, et crocea ligni materies detegatur. Præterea pyraaster prunorum modo aculeis  
conspicitur, aculeis singulis ex eodem loco erumpentibus, licet rami frequentissimis horreant spinis, ijsq; nigris, ualde  
candidi rhamni modo mucronatis. At crespinus ternis per interualla armatur aculeis, simul ex uno, eodemq; puncto  
prodeuntibus, adeo ut trifurcato ordine prodeant, duobus scilicet utrinq; se pendentibus, tertio uero medium occupa-  
te, albis, planis, non quidem rotundis, fragilibus, et admodum pungentibus. Illud insuper discriminis addam, acutam  
spinam fructum asferre myrti magnitudine. Crespinum uero racematim in uiae modum, cuius oblongi acni tritico pa-  
lō maiores, uiuidi, ac rubentes, eleganterq; racemis adnexi, puniceos acinos quadantenus representant: quæquam mi-  
nores, oblongiores, acidiores, et colore etiam multo uiuaciores habeantur. Crespini deinde folia minime pyra-  
strum referunt, sed potius puniceam malum, quamuis latiora, nec adeo in mucronem desinentia, per ambitum spinis tri-  
nuissimis, frequentissimisq; horrida. Radices etiam, quæ profectō eque flauæ sunt, ac si croco essent infectæ, est  
plures sint, atq; exiles; nihilominus altè non descendunt, ueluti acutæ spinæ, sed in latus summo cespite usantur.  
Flos denique pyraastro admodum refragatur: nanque melinus ex racemo uiae simili erumpit, sui fructus  
terno colore, à quo dum explicatur, atq; dehiscit, perquam suauem spirat odorem. Quibus euidentissimè colligi po-  
test, et oxyacantham Græcis, et berberim Arabibus non esse crespinum, cuius communis est usus apud medicos, et  
seplasiarios. Sed præter hæc illud etiam certō credendū est, quod si Dioscorides per acutam spinam crespinam uerba  
lexisset, nunquam silentio dissimulasset folia mirabili opere per ambitum aculeata: neq; fructum, quem rami per  
lum gerit, acinis inter se racematim coherentibus, myrti bacis assimilasset: nec scriptum reliquisset, radices in pro-  
fundum agi: nec deniq; flauum earum colorem unquam reticisset, quo insigniter natura infectæ sunt. Non præter-  
misisset etiam spinarū historiam, utpote quæ ternæ suis uirgis innascentur, à pede ad uerticem: non corticis candorē,



non tenuitatem: non item, quod sepius sine caudice, uarijs ueluti stolonibus fruticet: non deniq; ipsam pyraastro prorsus similem reddidisset, à qua profectio non minus discedet, quam quercus ab olea. Ceterum si modo dicendum est, *Oxyacantham* nasci in Italia, eam equidem aculeatam arborem esse crediderim, stipite, cortice, ramis, floribus, proceritate, ac ligni materie planè pyrastrum referentem, quam in Hetruria rura nostra Senensia *Bagala* uulgo nominant, *Anticenses*, & ceteri *Tridentinarum* uallium incolæ quidam *Amperlo*, quidam uerò *Pan d'orso* uernaculis nominibus uocant, & *Coritienses* *Barazzo bianco* uulgari sermone appellant: quippe quæ omnibus notis, ac lineis aculeatam spinam referat. Primam enim hæc manifestio indicio esse possunt, arboris scilicet stipites, rami in qualibet parte aculeatis, firmisq; aculeis armati, ligni materies, subcaber squamosusq; cortex, ueluti pyraastro. Tum ita esse comprobant radices in profundum descendentes, & fructus, quem fert myrti crassitudine, uisu iucundus, rubescens, plenus, fructu facilis, ori subausterus, in quo modo unus, modo plures concluduntur nuclei. Flos etiam, quem album edit, pyraastro admodum adstipulatur: quippe quod sit illi haudquaquam absimilis. Porro folia duntaxat à pyraastro dissidere uidentur: nam dissecta sunt apij modo, paululumq; longiora. Verum mihi quidem illud non uidetur ob multas rationes aliqua ex parte nostræ repugnare sententiæ: convenientias enim pluribus ex partibus peti certum est, non eam ex paucioribus. Quasi ergo acuta spina uireat fronde, hic non explicauit Dioscorides; sed tantum dixit, eam esse arborem pyraastro similem: quod magis ad stipitis, ramorum, corticis, florum delineationem, & ligni materiem respiceret, quam ad folia, quæ nihilominus laciniata constant apij modo: tunc si hoc in loco id adnotare prætermiserit Dioscorides. Hoc autem probatur manifesto ipsius Dioscoridis, ac etiam Theophrasti testimonio. Nam Dioscorides, cum de mespilo ageret, duo mespilorum genera constituit, & relicta in capitis calce uulgata, quæ frequens, & communis uisitur in Italia, illam in primis descripsit, quæ Neapoli nostra tempestate uulgo *Azarola* uocatur, & ueteribus *aronia* dicta est, sic inquit. *Μέσπυλον τὸ δένδρον, ὃ παρ' ἐ. τοῖς ἀρβύλαι καλεῖται, ἀκακῶδες ἐστίν. ὁμοῖον τοῖς Φύλλοις τοῦ καυκάου. καὶ πὸν ἐξ ὧν μὴ καὶ μὲλιν ὁμοῖον, ἢ ὅτι.* id est, uerbum ex uerbo. Mespilus arbor, quæ à nonnullis *aronia* uocatur, spinosa est, similis folijs *oxyacanthæ*: fructum ferens exiguu malo similem, suauem. Quibus autem folijs constet illa mespilus *Azarola* uocata Theophrastus libro 111. capite 111. demonstrauit his uerbis. Huius folia dissecta sunt, extremitateq; apio similia. Ita fit, ut concludamus oporteat, si mespilus *aronia* folio *oxyacanthæ* prouenit, eoq; scisso (ut Theophrastus produxit) apij instar, hanc spinosam arborem *Bagala* uulgo dictam, esse procul dubio acutam spinam, quandoquidem eius folia in modum apij dissecta sunt, mespili *aronia* modo. Theophrastus lib. v. 1. cap. ultimo de historia plantarum scribit, *oxyacanthæ* fructum fuisse antiquis in coronarum usu. Quod etiam non paruo est argumento, illam legitimam esse *oxyacantham*, quam in medium attulimus. Quandoquidē fructus eius, qui autumno toto, & ad mediam hyemem usq; perdurat, adeo leuore quodam pellucet, ruboreq; decoratur, ut globulos è præstantiori corallo paratos referat: id quod in coronis maxime præstasse crediderim. Reliquum igitur est, ut dicamus, Crespinum aliud esse ab *Oxyacantha*, plantamq; ideò fuisse ueteribus incognitam, quod eorum nullus, qui de plantarum historia scripserunt, huius aculeate stirpis (quod sciuerim) meminerit. Porro *CRESPI* frutex potius, quam arbor est, è terra uirgultis plurimis assurgens, ueluti corylus, è quibus non desunt, quæ quandoq; longo temporis tractu, ægrè tamen, arborescant. Hæc ab uno ad summum spinis quibusdam acutissimis horret longis, compressis, albicantibus, fractuq; minime contumacibus, quæ (ut supra dictum est) per interualla ternæ ex eodem procedunt puncto. Cortex toti plantæ candidus, leuis, ac tenuis, cui subest ligni materies flaua, fragilis, atq; fungosa. Numerosis tota uirgultorum congeries nititur radicibus impensè flauis, quæ per summa terræ diuagantur: folijs ferè punice, tenuioribus tamen, latioribus, minusq; in mucronem extensis, per extremum ambitum minutissimis spinis circumseptis. Flores emittit incuneis maio luteos, racematim coherentes in uia ferè modum, odore non ingrato. Quibus postea succedit fructus acinis oblongis, racemo pendulis, qui maturitate maxime rubent, punice mali acinis haudquaquam absimiles, quanquam figura longiores, gustu acido, & subaustero, paruis reconditis intus nucleis. È fructu post uindemias incolæ unum exprimunt, quod falsò de Berberi uocant officinæ, cui austeritatis aciditatisq; longè plus inest, quam mali punice succo. Quod si in acutis, permiciosissq; febribus, uti causus, & quæ pestilens est, uisapio uolaceo commixtum, ac aqua egrotantibus exhibeatur, non modò sitim restinguit, sed biosas, pestilentesq; exhalationes supprimit. Datur uiliter coctis, cibum reiicientibus, & dysentericis, et ubi bilis à iocinere in uentriculo regurgitat cholericos excitauerit affectus. Non secus tam sumptum, quam inditum mensuram profluua cobibet. Tineas uentris enecat, præsertim si bibatur ex aqua graminis, uel portulacæ, uel abrotoni, addito sacchari tanillo. Prodest cruentis excreationibus: firmat commotos dentes, si eo sepius foueantur: quinetiā gingiuis roborat, & garzarizatu faucium, uisq; inflammationes discutit, atq; destillationes eò confluente reprimunt. Vulnere recentia in carnis superficie glutinat, & ulcèra uetera desiccant: Nihilominus nocet his, qui ex flatu, ac frigida laborant uentriculi doloribus, atq; etiam ægrè spirantibus. Ceterum postquam acutæ spinæ historia eò me deduxit, ut de nonnullis alijs aculeatis stirpibus disseruerim, non erit ab re, ut plantarum facultas augeatur, si illam addiderim plantam, quæ folio etiam apij constat, & undiq; spinis riget, ab aliquibus *VVA SPINA*, à nonnullis *Vua marina*, & à pluribus *Vua crespina* uocata. Planta hæc antiquis fortasse incognita fuit, nunc autem omnibus notior est, quam ut à me pluribus describi debeat. Huius bacce in usu ciborum sunt uis omphacis loco. Quæ et febrientibus uisculis incoctæ nō sine utilitate exhibentur. In summa mulieribus utero gerentibus magnopere expetuntur. Huic accedit & altera planta ueteribus, quantum reor, incognita & silentio inuoluta, quam aliqui falsò *Martianorum* *RIBEM* esse contendunt. Ea fruticosa est, folio paruo, uirginco, perinde ac albæ populo. Ramuli sunt ei lenti, ac flexibiles, è quibus fructus paruarum uuarum modo, ut in crespino, racematim dependent, rotundis, simulq; coherentibus acinis magnitudine piperis, qui maturitatem adepti, maxime rubent, sapore subacido, admixto

Legitima oxyacantha.

Crespini forma, & uires. *Crespina* forma.

Vua spinæ mentio.

Ribis officinæ consideratio.

Error quorū  
dam.  
Ribes  
Jesambrī, nūm.

mixto etiam dulci. Vulgaris est planta, in hortisq; frequens: quippe quoniam ad sciendos hortorum pulmos de-  
ganter feratur. Verum eos hallucinari abunde constat, qui putant, hanc arbusculam esse Arabum Ribem. Siqui-  
dem, ut posteritatis memorie prodidit Serapio, Ribes est arbor proferens capreolos colore uiridi rubescente, et  
lata, magna, et rotunda. Quas sane notas huic non respondere satis notum est: neq; enim fert hæc capreolos, neq;  
eiusmodi folijs uiret. tamen si fructu Ribem admodum referat, quod is gustui sit acidus simul et dulcis, qualem esse Ri-  
bis baccam autor est Serapio. Quamobrem is ad ea, quæ ille iure poterit usurpâri, utpote quod febribus acutis op-  
tuletur, æstuantem uentriculum refrigeret, sitim restinguat, nauſeam et uomitiones sistat, cibi appetitum incitet, ca-  
liacos, et lientericos iuuet, et biliosis defluxionibus uexatos: sanguinis feruorem demulceat, bilis acrimoniam re-  
tundat, impetumq; domet. Quare non damnandi, quin potius laudandi uidentur seplasiarij, qui ex huiusce arbuscule  
fructu unum exprimunt, et per annum asseruant, ut illud Ribis loco medicamenti immisceant. Non desunt, qui di-  
esse hanc plantam arbitrentur, quod Galenus libro VII. de compositione medicamentorum secundum locos Vrsi uicem  
appellat. Quorum error satis ab ipsomet Galeno refellitur eodem loco: quandoquidem asserit huiusce uicæ plantam  
memæyli folio uirescere. Oxyacanthæ meminit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit.

Oxyacanthæ  
uices ex Gal.

Oxyacanthus, arbor ut pyro syluestri similem habet speciem, ita et uires non dissimiles: quin et ipsi fructus, pyri  
quidem syluestris absolute acerbus est, ceterum oxyacanthæ, et tenuium est partium, et paulum quiddam incisum  
obtinet. Porro arboris huius fructus pyri syluestris fructui similis non est, uerum myrtis, scilicet rubens et rarus.  
Habet uero et nucleos. Porro non esus tantum, sed et bibitus affectus omnes fluxionum, quos eodem es Greci no-  
cant, cohibet.

Κυνόβατος.  
Cynobastus.

RUBUS CANIS B. Arab. rosm. CAP. CVL

FRUTEX est arboris instar, rubo longè maior. Folia fert multò latiora myrto, robustis circa  
ramos spinis, flore candido: fructu oblongo, nucleò oliuæ simili, qui per maturitatem fuluescit, &  
flocculos intus continet. Fructus exemptis interioribus floccis arefactus; aluum sistit: seruesciti  
enim ij in uino, mox poti, arteriam infestant.

Rubi canis  
consideratio.

NON EVIDEM putauerim esse Rubum canis illud rosarum syluestrium genus, quæ rosas edunt ijs que-  
dantenus similes, quas Moschette uulgò uocamus; quæq; rubentes baccas rosarum fructibus non ab similes, licet immo-  
res, proferunt: nec etiam quoduis aliud syluestre rosarum genus, quemadmodum nonnulli existimant. Nam si uires  
se haberet, sat erat Dioscoridi dicere, quod canis Rubus rose similis esset, non autem quod arboris instar assurgeret,  
rubo longè maior, quodq; folia ferret myrto latiora, à quibus syluestris rosa profecto plurimum distidere uidetur, fr-  
uctumq; mittere non modò oliuarum nucleis, sed oliuis ipsis multò crassiorum. In eam autem sententiam non modò  
pluries deduxit, sed etiam confirmauit Plinius: quandoquidem ipse libro VIII. capite XII. peculiari nomine rosam  
syluestrem cynorrhodon appellat, id est, caninam rosam, non cynosbaton, id est, caninum rubum, cuius radicem ad ca-  
nis rabidi morsum miris laudibus extulit. Quod iterum asseruit lib. XXV. capite II. ubi illud etiam addidit, quod apud  
ueteres nil aliud cynorrhodon erat, quàm spongiola illa, quæ medijs syluestrium rosarum ramis oboritur. Ceterum  
cum de cynosbato, hoc est, canirubo idem differeret, eum à rosa syluestri longè diuersum fecit, ut uidere est lib. XXIII.  
capite XIII. ubi ait, cynasbaton folio esse uestigio hominis similem. Huc illud etiam accedit, quod posteris scriptis re-  
liquit Theophrastus lib. III. capite XVII. de plantarum historia, ubi sic inquit. Canirubus fructum subrubrum pa-  
rit malo punico similem: est inter arborem et fruticem medius, et punice proximus, folio uicis. Ex quibus patet  
est, non parum inter se habere discriminis canirubum, et syluestrem rosam, de qua postea libro et cap. VI. particu-  
larem tradidit historiam. Vbi cum primum satius rosas longa prosecutus fuisset oratione, de syluestri ita paucis dis-  
seruit. Syluestres rose domesticæ asperiores tum uirgis, tum folijs constant, et florem minus odoratum, minusq; colo-  
ratum, nec tanta magnitudine ferunt. Quare pro comperto habetur, aliud genus esse rosam syluestrem à canirubo,  
quorum alterum κυνόβατος, alterum κυνόβατος à Græcis appellatur. Quocirca manifestò in errore fuisset de-  
prehenditur Marcellus Dioscoridis interpres, et commentator: quippe qui idem esse crediderit cynosbaton, et cy-  
norrhodon, non animaduertens, quàm illa inter se dissimilia fecerit Plinius sibi familiarissimus. Hunc forsitan secuti  
Monachi in Mesuem scribentes, ipsi quoq; in eundem lapsum inciderunt, credentes syluestrem rosam legitimum esse ca-  
nirubum. Quibus præterea animo exciderat, Dioscoridem scripsisse rubi canis fructum oliuarum nucleis esse similem  
quandoquidem ipsi illum pyris compararunt. Ex quo aliquis facile iudicabit, hos nullam canis rubi cognitionem ha-  
buisse. Ad hæc non reperio, quod dixerit Dioscorides, canis rubi fructum semen aliquod includere, quo tamen rosarum  
syluestrium fructus reſertus inuenitur: sed lanosum quoddam continere dixit. Accedit his Serapionis autoritas, qui  
de canino rubo inter alia rubi genera egit, non autem inter rosas: quod omnino compertum haberet, hunc à rosis quæ  
plurimum differre. Illud insuper addiderim, quod cum rose syluestres ferè omnes non leuiter ex albo purpureſcant,  
cynosbato uerò flos perpetuò sit candidus, non est legitime asserendum, syluestrem rosam esse cynosbaton. Ex ijs igitur  
tur omnibus satis (ut arbitror) liquet, canirubum à syluestri rosa longè abesse: tantoq; magis, quod memorie prodide-  
rit Theoph. lib. et cap. IX. de plant. historia, caninæ sentis fructum auerso flatu colligendum esse, alioqui periculis  
oculis imminere. Quod aperte demonstrat, super eo uel tenuem quandam lanuginem, uel quid puluerulenti insidere,  
quod si à uento expellatur in colligentium oculos, facile ijs cecitatem inducat. quod tamen in syluestrium rosam  
fructibus nunquam uisitur. Meminit Rubi canis Galenus lib. VII. simp. med. sic inquit. Huius fruticis fructus, non  
segniter adstringit, folia uerò mediocriter. Itaq; particularis eius usus haud ignotus est. Cauendum ab eo, quod is  
fructu eius lane speciem habet, et arteriæ infestum.

Rubi canis ui-  
res ex Gal.

Ligustrum



LIGVSTRVM arbor est oleæ folijs circum ramos similibus, latioribus, mollioribus, & colore uiridioribus: flore candido, muscoso, odorato: semine sambuci, nigro. Optimū nascitur in Canope, & Ascalone. Folia astrictoriam uim habent: quare commanducata ulceribus oris medentur: illita feruidis inflammationibus, carbunculisque profunt: decocto eorumdem igni ambusta fouentur: capillum rufant trita folia, quæ in radicula succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorem sedat. Cyprinum oleum, quod ex eo fit, odoratum, excalfacit, emollitque neruos; si quæ feruenti natura prædita sint, assumat.

LIGVSTRVM in Hetruria Guistrico corrupta uoce uulgus nostrum appellare consuevit. Quod inibi etiam aliqui Oliuetta, nonnulli Oliuella, quidam Chambrossene uulgò uocant. Mauritanis uero Alcanna nominatur. Nascitur frequēs in sepibus secus uias passim in Italia. Floret abeunte uere, & ineunte æstate, flore muscoso, uel (quandoquidem Oribasius legit ΡΟΤΕΥΩΔΑ) racemoso, candido, odore suauis, sed qui decerpitus statim flaccescat. Oriuntur ex eo bacce in cacumine racematim coherentes pyramidis modo, hederæ baccis minores, leuiiores, ac nigriores, quarum in medicamentis est usus. Sunt qui has baccas à Virgilio, uacinia uocari putent. Sed meo quidem iudicio non recte planè sentiunt. Quemadmodum nec Fuchsius, qui rubi mora, quoniam Græcis ΒΥΤΙΥΑ, uacinia esse putat: siquidem uacinium florem, non fructum esse pluribus constat. Ceterum innothis Dioscoridis stirpium nomenclaturis legitur, hyacinthum uacinium Romanis fuisse uocatum. Ex quo facile crediderim, uacinium

Ligustri consideratio.

Vacinii uariæ opiniones.

Virgilio nil aliud designare, quàm hyacinthum. Neque mirum est, quod Virgilius hyacinthum uacinij nomine nigrum appellauerit: nam hyacinthus facillè cum uiolis colore purpureo certat, purpureus autem color à compluribus niger intelligitur. Hanc nostram sententiam comprobant Virgilius: quippe qui semper uacinia floribus admiscet, ipsedemq; comparat, non autem fructibus. Quod manifestè declarauit in Bucolicis, ubi de uacinio sic cecinit.

Alba ligustra cadunt, uacinia nigra leguntur. Eclog. I I. Ibidem.

Mollia luteola pingit uacinia caltha. Item Eclog. ultima.

Et nigra uiolæ sunt, & uacinia nigra.

Nec placet præterea Marcelli opinio, qui pluribus comprobare nititur, uacinium esse Irim. Siquidem præterquam quod nunquam legerim Irim in coronis uenisse, color non æquè promptè correspondet, quod uariis adeo sit, ut non aliunde sibi nomen cõparauerit, quàm à cælestis arcus colorum uarietate. Adde etiam, quod cum Iridis flos omnium fragilissimus caducissimusq; sit, poëta nullo pacto hunc ligustro prætulisset. Quidam Ligustrum eam conuoluuli speciem esse autumant, quæ sepibus fruticibus, & arbutis se circumuoluit, ac etiam sæpius uitium palis in uinetis, flore candido, lilij, seu calathi effigie, quam ego leuem esse simulacem nunquam dubitavi. E quorum numero fuit Seruius Grammaticus Virgilij commentator Ecloga secunda Bucolicorum. Nempe falsus (ut arbitror) quod neglexerit in hac historia Plinium consulere, Dioscoridem, & alios de stirpium natura differentes. Non desuerunt etiam qui existimauerint ligustrum esse Mauritanorum caprifolium, quod sanè nil aliud est, quàm Dioscoridis pyracantha, seu lycium, non autem periclymenon, ut Ruellio placet. Sed isti quoq; à ueritate desciscunt. Ligustri meminit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cypru seu ligustri folia, summaq; germina in usum ueniunt, & facultatis, & temperamenti maxime misti: habent enim quiddam digerens cum aqua substantia modicè calida, habentq; etiam adstrictorium quiddam ex terrena substantia frigida. Itaque eorum decocto quiddam ambusta fouent. Utuntur uerò etiam aduersus igneas phlegmonas, & carbunculos. Nam absque molestia & morfu desiccant. Quinetiam spontè prouenientibus in ore ulceribus aphthodesi, & ipsis puerorum aphthis commansa accommodata sunt.

Seruii Grammatici lapsus.

Ligustri uires ex Gal.

PHILLYREA arbor est ligustri magnitudine, folijs oleæ nigrioribus, & latioribus: fructu lentisci, nigro, subdulci, racematim coherente. asperis nascitur. Huius folia astringunt: ad eadem utilia, ad quæ oleaster, cum astrictione est opus: maximè ad oris ulcera commanducata, aut si decocto colluantur: pota urinam, ac menses cient.

Phillyrea, &  
Tilia confide-  
ratio.

*Lindera Baum*

Interpretum  
Dioscoridis.



RECENTIORES Dioscoridis interpretes, ut Ruellius, Ruellius, & Marcellus Florentinus, Phillyream de-  
scriptam à Dioscoride, eam esse arborem certò credere. Tilia dicitur, nimirum falsi nominis similitudine. Quamope-  
dem tilia Græci Φιλυρα, non autem Φιλαγέα dicatur. Quia  
nullus horum animaduertisset, alter alterum secutus con-  
cedes phillyream tiliam appellarunt, ita Græcum nomen me-  
meo quidem iudicio, in Latinum uertentes. Quo factum est, ut  
multis sit persuasum, uel quòd Dioscorides tiliam nunquam u-  
derit, uel quòd illi à uulgari tilia alia esset longè diuersa, utpote  
quæ omnibus notis tilie refragatur. Porro hinc facile compre-  
hendi potest, quòd ij non solum nomina, sed etiam rem confite-  
runt: nam si tiliam cognouissent, nulli dubium est, quin phillyri  
Dioscoridis proprio nomine separassent à phillyra, hoc est tilia  
Theophrasti, qui eam libro III. capite x. de plantarum historia  
his uerbis memorie prodidit. Tilia quedam mas est, quedam  
fœmina. Distant inter se tum materie, tum totius corporis for-  
ma, & quòd altera sit fructifera, altera uerò sterilis. Nam ma-  
teries mari dura, flaua, nodosior, spissiorq;: fœminæ candidior,  
& cortex mari crassior, detractusq; inflexibilis propter duri-  
tiam est: fœminæ candidior, flexibiliorq;: ex quo citius facie-  
rit fœminæ odorator, & mas sterilis, nullòq; flore cæ: sa-  
mina & florem, & fructum gignit. Flos calycula intectus præ-  
ter folij pediculum, amentumq; futurum, pediculo altero ex-  
sertus, uiridis, dum in calycula est, detectus autem leuiter flauus:  
floreit cum urbanis. Fructus oblongus, orbiculatus, rugosus  
ne fabæ similis bederæ acino, quinque angulis, ueluti neruis coe-  
necentibus, inq; acutum, cum sese contrahentibus partibus, qui-  
bus scilicet masculus est, minutiusculus autem, confusior confu-

tion ille masculus scabitur, paruula quedam, ac prætenua semina, quanta atriplicis emittit. Foliū, & cortex  
dulcia, suauiaq;: folium forma bederæ acutum, nisi quòd in angulum acutiorē rotundatur: & quanquam iuxta pe-  
dulum curuatus; tamen de medio in acutius coactum prætendit, seq; prolixius protrahit, crispum in orbem leuiter,  
atq; serratum. Medullam exiguan materies continet, nec multò reliquo molliorem corpore: nam & reliquæ igne  
molle est. Hæc de tilia Theophrastus. Quibus sanè notis adamussim respondet nostra tilia. Sed eas, mea quidem sen-  
tentia, non inuenias in phillyrea Dioscoridis: siquidem hæc folio constat oleæ, illa uerò bederæ: hinc fructus lenis  
similis, racematim coherens, rubens, granis, quæ uocant paradisi, non absimilis; illi uerò oblongus, orbiculatus, et  
fabæ magnitudinem, quinque angulis, ueluti neruis, disjunctus, cui intus semen atriplicis instat. Quod aperte ostendit  
earum discrimen. Id etiam declarat tilie proceritas, amplitudoq;: ac ramorum densitas: nam phillyrea Dioscori  
Plinii lapsus, arbor est pumila, ligustri magnitudine. Et quanquam tradat Plinius, tiliam arborem esse proceritate perquam no-  
dica; tamen cion sensibus, & experimento contrariam constet, credendum certe putauerim, Plinium quoque dæ-  
ptum propinquitate uocabuli & Theophrasti phillyram, & Dioscoridis phillyream simul confudisse, à quibus facile  
ea, quæ de tilia scripsit, accepit. In quam sententiam hæc quoque ratio me deducit, quòd Plinius uni tantum speciei,  
scilicet nostræ uulgari tilie, uires attribuit, quibus pollere phillyream Dioscorides est autor, præter alias plantas,  
quæ ipsi tilie sunt propriæ, quemadmodum fecit & Ruellius illum secutus. Est itaque Phillyrea arbor longè diuer-  
sa à tilia, multis cognita, quoniam in Italia provenit asperis tantum montibus, quibus maxime gaudet. Adamus Lo-  
nicerius in suo de stirpium historia libro affirmanter asserit, nulla tamen huc allata ratione, nec autoritate, ligustrum  
& phillyream unam & eandem esse plantam: contenditq; caput hoc omnino Dioscoridis spurium esse. Verum si talis  
hallucinatus uidetur, quòd primùm phillyreæ delineatio à ligustro, quod Græcis λυγιστρον dicitur, non parum distat:  
secundò quòd non solum codices Dioscoridis Græci, & ij quidem probatissimi habeant phillyream: sed etiam  
Oribasij codex manu scriptus, in quem ipse ex Dioscoride simplicia transtulit, quemadmodum eam etiam habent Pa-  
lus, & Serapio, qui Arabico sermone phillyream Mahaleb appellauit. Tiliæ cortex commansus, ac inde illius res-  
neribus agglutinandis efficax est. Folia uerò trita, & aqua confersa pedum tumores discutunt. Humor e mediis  
castrate arboris defluens capiti illitus capillos reddit, defluenteq; continet.

Plinii lapsus.

Adami Loni-  
ceri error.

Tilie uires.


CISTVS MAS.

CISVTS FOEMINA.



HYPOCISTIS.

Kisos. CISTVS. CAP. CIX.



quem aliqui citharon, aut cissaron uocant, ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus: saxosis locis nascens, folijs rotundis, acerbis, hirsutis. flos: in masculo, ut mali punice, foeminae albet. Vis astringens: unde flores in uino austero bis in die poti, profunt dysentericis, & nomas per se illiti cohibent: uerustari ulcerum, & igni ambustis cum cerato medentur. Hypocistis rhobethron, aut cytinus a nonnullis cognominata, iuxta cisti radices nascitur, floris punici similitudine. Quaedam rufa, altera herbacea, tertia candida. Liquatur acaciae modo. Aliqui tamē exiccant, fractamque macerant, & incoquant, reliquaque ut in lycio prosequuntur. Vires acaciae habet, uerum aliquantō magis siccatur, & astringit. Prodest dysentericis, coeliacis, sanguinem excreantibus: foeminarum profluuio & pota, & indita.

Nascitur uterque Cistus, e cuius radicibus Hypocistis profilit, in pluribus asperis Hetruria locis, & praesertim in Apennino monte. Quare probi quidem, ac diligentes seplastris omni studio, atque ope niti deberent, ut sibi utrunque genus cum hypocistide uel ex Apennino ipso, uel aliunde comportare possent: quandoquidem sine legitima hypocistide legitima non possit fieri iheriaca, nec praeterea alia quaedam, quae in medicinae usum ueniunt, antidota, ac medicamenta. Namque hypocistin, qua passim utuntur officinae, ex hirci barba radicibus impostores conficiunt, succum inde exprimentes, ac ut concreseat, insolantes. Errandi tanien, ac simul imposturam faciendi causam dederunt Arabes, quod cistum hirci barbula appellent. Quo factū est, ut ij omnino aberrauerint, qui officinis hypocistidem parant, sibi persuadentes

Cisti, & hypocistidis consideratio.



Hypocistidis succidanea.

Plinii lapsus.

Cisti, & hypocistidis uires ex Galeno.

persuadentes hirci barbam, quam Græci τριχογόνα uocant, illam esse stirpem, de qua Arabes in digne. Quo errore ducti non modo seipsos decipiunt, sed etiam alios, qui passum adulterina hypocistide utuntur. Hypocistidis locum supplere acaciam tradidit Dioscorides, ut etiam habetur in Galenicis succidaneis: quæ illius uice præsentent officinæ, si modo ea careret adulterio. Potest etiamnum, si desit hypocistis, assina eius loco storiæ agnoscitur. Punicæ succus: quippe qui eadem præstet, quæ hypocistis, autore Dioscoride. Plinius deceptus uocabulorum generalitate ineptè satis, meo iudicio, commiscet cisti, & cisti historiam: quamobrem non immerito cum damna cisti distinctus Leoniceus. Cisti meminit Galenus lib. v. 11. simp. medicament. sic inquit. Cistus, aut Cistæus frutex est gustu adstringens, omnibusq; particulatim operibus. Attamen folia, & parua germina trita adeo desiccant, & stringuntq;, ut uulnera glutinare ualeant. At flores magis sunt efficaces, adeo ut cum uino poti dysenterias, uires imbecillitates, fluxusq; ac humiditates sanent: cataplasmatibus ritu illis ulcerum putredinosa iuuant. Est enim tota facultas non instrenue desiccans, ferèq; secundi excessus à temperatis absoluti. Adeo uero frutex hic frigidus est, & tepidi caloris sit particeps. Porro Hypocistis, quam uocant, multo est magis adstrictoria, quam folia, admodum efficax remedium ad omnes fluxionum affectus, puta sanguinis reiectiones, profluua muliebria, coeliacos, dysentericosq; affectus. Quin si quam partem roborare consilium sit, quæ uidelicet plusculo humore exoluta fuerit, roborem ac firmitatem illi non imbecilliter addit. Sic sanè stomachicis epithematis, hepaticisq; commiscetur, & ex uiperæ caesio antidoto inditur, nimirum quo corpora confirmet, ac roboret.

† Hæc dictio non legitur in Græcis codicibus. Sed eam huc ad clariorem (ut puto) sensum ex Plinio transiit Ruellius: quod uerbum illud à Dioscoride studio fortasse breuitatis omissum; satius addendum esse duxerit, quia subintelligendum. quod etiam Hermolaus fecit.

† Nil mirum esse debet, quod Plinio duo tantum hypocistidis genera prodantur, coloribus rufis, & candidis distincta: quandoquidem ijs duntaxat Oribasius quoque contentus fuisse uidetur libro xii. ubi genus χλαδί, hoc est, herbaceum, ut uulgati codices habent, non legitur.

Λάδον. LEDVM.

Λάδανον. LADANVM. CAP. CX.



Ladani confideratio.

EST alterum cisti genus; Ledon à nonnullis appellatum frutex simili modo nascens, longioribus folijs, & nigrioribus: quæ uerno tempore quiddam contrahunt pingue. Foliorum uis astringens, ac edè, quos cistus, effectus præbens. Fitex eo quod Ladanum dicitur. siquidem cum cisti frondes præsentantur capræ, hircique, pinguitudinem conspicuè barba carpunt, & suo lentore uillosis cruribus adhærescentem reportant, quam depectentes in colæ, colasq; cogunt in offas, & ita recondunt. Alij uero attritis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergent, conglomérantque in ladanum. Maxime probatur odoratum; subuiri de, facillè mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec squalore oblitum est, resinofum, quale in Cypro gignitur. Arabicum uero, Lybicumque uilius. Natura ei spissandi, calfaciendi, molliendi: ora venarum patefacit: capillum fluentem continet, addito uino, myrrha, & myrteo oleo: citatricibus decorem reddit, cum uino illitum: medetur aurium doloribus, cum hydromelite, aut roseo infusum: suffitu secundas, eicit: pepsis immittit uulnè duritiem sanat. In medicamenta, quæ dolorem, rursusque finiunt, & malagmata utiliter inferuntur: alium sistit cum uino uetere potum, & uinam ciet.

LADANVM, quod uulgo alij appellant Laudano, alijs uero Odano, tametsi plerumq; impostorum malitia adeo scilicet, & alijs adulterijs sit uitiatum, ut nihil ualoris præstet; ego tamen præstantissimum sæpius Venetijs emi ab unguentarijs, &

odoramenta conficiunt. Verum apud pharmacopolas, qui medicamenta nobis parant, Ladanum, quod syncretis purumq; sit, rarissime reperitur, cum eorum plurimum potius curent, ut rem minoris emanent, quam ut feligius legitur ab adulterinis. quod tamen iniquum est, inhumanum, ac detestabile crimen. Arbuscula, è qua Ladanum colligitur.

Plinii lapsus.

Ladani uires ex Galeno.

Ledum appellatur, & inter cisti genera recensetur. Ceterum Plinius uocabulorum uicinitate deceptus (ut ex in superiori commentatione dictum est) ex cisso, id est, hedera, non autem ex cisto ladanum colligi dixit. Ex quo multis falsò persuasum est, quod non à cisto, sed ab hedera Ladanum legeretur. De Ladano plura memorie prodidit Galenus libro v. 11. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cistus, aut Ladanum. In calidioribus regi-

has hic Cistus proueniens, tametsi aliud sit genere, quam qui apud nos nascitur; exiniuum tamen à regione, ac peculiarem, digerentemq; caliditatem nactus est: atq; utroq; à nostrate differt, tum quia frigiditatem deposuit, tum quia calorem assumpsit. Itaq; cetera quidem huius cisti, illis que in nostrate uisuntur, similia sunt. Verum Ladani, quod uocant, ex eo prouenit, medicamentum primo excessu iam quodammodo completè calidum, ut uidelicet & secundum attingat, habens etiam adstrictionis paululum. Ad hæc substantia tenui, ac proinde emolliens, siue malacticum, pariterq; moderatè digerens, ac uidelicet etiam σμυτερσιον, hoc est concoquens. Itaq; mirandum non est, si peculiariter ad uteri uitia conueniat: quandoquidem ad dicta paulum quiddam adstrictionis obtinet. Quocirca disfluentes capillos retinet. Nam quicquid ad radices eorū prauis humoris fedit, id omne absorbit: tum meatus, quibus infixi sunt, contrahit, & constringit adstrictione. Ceterum alopecias, & ophthalmias siue lippitudines, sanare non potest, utpote magis discussorias uires, quam que Ladano insunt, poscentes. quippe proueniunt hæc ex prauis succis, lentis, crassiq; quos secantia, ac digerentia medicamenta potissimum euocant, atq; euacuant. Ceterum tenuium partium sint facultatis oportet, & minime astringentis: non tamen usq; adeo tenuium partium, & desiccatorie, ut nimio plus desiccet, unaq; cum collectis inibi succis præter naturam, naturalem quoq; humiditatem incrementa pilis suppeditantem absorbeat, nam sic non tantum alopecia liberabunt, sed & caluiciem afferent. Sed hæc ad curandi rationem pertinent.

Ε' ΒΕΥΟΣ.

EBENVUS.

CAP. CXI.

ERENS optima habetur Aethiopica, & nigra, nullos habens venarum discursus, factitij cornus leuore: cum frangitur, densa apparet, mordens gustu, atque astringens. Suffitur iucundo odore supra carbones, sine fumi tadio. Recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinem accenditur, & trita ad cotem rufescit. Altera est Indica, internatis segmetis candicantibus, & modicè fuluis, item frequentibus maculis. cæterum prior bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna cõsimilia pro ebenuzeunt. Quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas asculas resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentiæ in suffitu præferentia. Caliginem oculorum absterget: ad ueteres destillationes, pustulasque mirum in modum pollet: si quispiam facta ex eo coticula collyrijs utatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes, ramentæue uino. Chio die, noctuque macerata, in collyria digerantur. Nonnulli præterita ipsa excolant, reliquaque eundem in modum peragunt. Alij pro uino aqua utuntur. Vritur in fictili nouo, donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi usti modo, & ita siccis, scabrisque lippitudinibus conducitur.

CREDIT Theophrastus in India tantum nasci Ebenum libro IIII. capite v. de historia plantarum, ubi sic habet. Ebenus quoq; eius regionis uernacula est. Huius duo genera constant: alterum materie laudatum, pulchrumq; alterum uile, et uitiatum. Rarum, quod prestantius: reliquum permultum habetur. Colorem commendatum non recondita, sed statim sua natura capescit. hec Theophrastus. Quod etiam sensisse uidetur Virgilius in Georgicis libro II. ita canens: *Sola India nigrum*. Sola India nigrum.

Fert ebenum, solis est thurea uirga Sabæis.

Plinius etiam lib. xiii. cap. iiii. Ebenum nusquam alibi, quam in India nasci scriptum reliquit: nec eam tamen Indiam universam mittere, sed exigua sui parte gigni, præter quoddam fruticosi generis cytisi modo in tota India diffusum. Herodotus uero (eodem autore) Ebenum Aethiopiæ solam ferre intellexisse uidetur: quippe qui de Indica nullam fecerit mentionem. Veruntamen ex hoc Dioscoridis capite palam est, nasci Ebenum in ambabus his regionibus. Indi quidem non nisi ex ebena Deorum simulacra fingunt, regesq; ex eo tantum sceptrum sumunt. Item pocula, craterasq; ex ebena faciunt, quod sane credant contra maleficia efficacissimum esse, et quicquid ueneficii fuerit, tactu eius auerti. Itaq; nihil mirum, si quod peregrinum in Italiam importatur, summo sit in pretio, cum etiam ab ipsis, quibus prouenit, maximo honore habeatur. Ebenum ex India Romæ primùm magnus Pompeius Mithridatico triumpho ostendit, cuius materies densissima omnium constat. Quo fit, ut quauis multis annis exarescat, non fluitet in aquis, sed tota mergatur. Ebeni siccatos truncos maxime hac ætate nouit Italia: namq; innumeri uisuntur in eorum officinis, qui pectines conficiunt ad explicandos, aptandosq; capillos: itemq; apud illos, qui globulos funiculo traiciendos ad mulierum preces numerandas torno in orbiculos expoliunt. Ebeni uires scripsit Plinius lib. xx. iiii. capite xi. his uerbis.

Non omitam propter miraculum eburnum. Scobem eius oculis unice mederi dicit: lignoq; ad cotem trito cum passo caliginem discutit, ex aqua vero et radice albugines oculorum. Item tuſim pari modo cum melle, ac draçuculi adie- ctâ radice. Eburnum medici et inter erodentia assumunt. Ebeni meminit Galenus lib. v. i. simplicium medicament. sic inquit. Ebonus ex ijs lignis est, quæ trita cum aqua in succum solvuntur, ut lapidum nonnulli. Vis ei inest ex- calfaciendi, extergendi, et tenuium partium. Quamobrem quæ pupillas offuscât, extergere creditur: miscetur alijs remedijs ocularibus, quæ ad ulcera vetera, fluxiones, et bullas, siue pustulas accommoda sunt. hætenus Galenus.

Ebeni vires  
ex Galeno.

Sunt qui lignum ex intij petiit, quod quidam *GVAIACVM*, nonnulli *Guaiacum*, pleriq; uerò *Lignum sanctum* appellant, cuius aduersus Gallicam lue[m] precipue est usus, ebene genus esse crediderint. Quod quidem nec asserere, nec negare ausim: quandoquidem nusquam inueniunt apud quenquam tum ueterum, tum recentiorum scriptorum, quas frondes, quos flores, quosq; fructus proferat ebenus. Illud tamen omnibus perspicuum est, *Guaiacum* nihil, nisi summa nigritia, ab ebena dissidere, quæ in hoc summo splendore nigricat, in illo albescit: ceteris uerò qualitatibus id maxime

**Guziaci confideratio.**

Guaiacium li-  
gnum præ-  
stantius.

Guaiaci cor-  
ticis electio.

Guaiaci plan-  
ta.

Guaiaci facul-  
tates.

maximè cum ebena certat. Tria ad nos Guaiaci genera afferuntur, ut in suis Epistolis doctissime annotauit Ma-  
dus Ferrariensis: quod & nobis iandiu planè compertum est, cum hæc omnia sæpius nobis præ manibus fuerint. Pri-  
mum itaq; genus crassiori, uegetiori q; mole constat, quo resecto materies apparet interiore parte nigra, exterior:  
uero subpallida, & ueluti perplexis lineis quibusdam ad fuscum tendentibus per longum intersecta. Alterum caudice  
minori, nec adeo uegetiori habetur, cuius extimæ partes maiore ambitu se diffundunt; intus uero, quæ parua ni-  
gricant, minore satis orbe concluduntur. Tertium, quod propriè sanctum appellant, caudice cæteris exiliore uicino,  
intrinsecusq; & extrinsecus albicans, cuius materies lineis admodum exilibus in longum actis perplexe distinguuntur:  
estq; hoc longè cæteris & acrius, & odoratius. Cæterum credendum non est eiusmodi ligna, etsi colore, magni-  
tudine, ac pondere inter se discrepent; idcirco diuersarum esse plantarum, diuersoriamq; generum, ut quidam fortasse exi-  
stiment. Nam quod hoc tam intus, quàm extra candicet, illud uero interiore sui parte nigricet, non aliunde proueni-  
re, quàm quod hoc magis, illud uero minus adoleuerit, uel consenuerit. Quippe eo sanè nigrius cernitur lignum Guaiaci,  
quò ad maturiorem ætatem peruenerit arbor, à qua decisum fuerit: & per consequens tanto magis album appari,  
quànto minus adoleuerit illa, quemadmodum conspicitur in nostris nonnullis Italiæ arboribus, & præsertim in moro,  
nuce, & anagyri. Veruntamen illud cuiq; persuasum sit, ætatem uni plus, quàm alteri uirium addere, ac demere. Qu-  
de re uerba facturi, dicamus, cum illud, quod planè omni ex parte albidat, odoratius, acrius, & amarum habeat,  
cuiusq; eius decoctum crassius, & cæterorum decocto pinguius sit, & acrimonia, & amarore admodum repleti, ut ip-  
sa me docuit experientia, nil mirum esse crediderim, si in eo, utpote iuniore, uis insit uegetandi præstantior, ac prop-  
erea plus in se succi contineat: quin & cæteris uiribus præstet. Eaq; propter putauerim ego, hoc illis in usu perpe-  
tuo fore, quibus ob Gallicam lucum ulcera emerferint depascentia, contumaciaq; ossa uero cariosa sint, ac putrilagine  
consumpta, & tumores in osseam penè duritiem occaluerint: & quibus deniq; perpetuus articulorum cruciatus, ac-  
turnusq; capitis dolor inheret, eoq; magis, quò patiens iunior, extiterit, fortior, & natura robustior. Huic illud  
succedere existimamus, quod medium obtinet locum: siquidem hoc & odoratius est, & acrius eo, quod nigrius, &  
crassius inuenitur: neq; illud quidem ab re, quandoquidem id minus est ætate confectum, & maiore humoris copia re-  
dundat. Quocirca commodissime hoc uti poterunt, qui natura delicatiores sunt, & temperamento imbecilliores, atq;  
etiam ij, in quorum artus huiusce luis furor nondum crassari cœperit. Postremo illud minus cæteris præstat, uiribus:  
que infirmus habetur, quod nigrius, crassius, & annosius reperitur. Namq; quelibet consensescens planta (quemad-  
modum etiam cunctis animalibus euenit) continuo exarescit, humidoq; priuatur. Cuius rei certissimum est argumentum,  
quod in annosarij arborum truncis maior appareat nigredo; quàm in alijs: uel iunioribus, uel ætate tenellis: nigredo  
enim siccitatis indicium est, quinetiam deperditi caloris innati. & humidi naturalis: id quod tam in plantis, quàm in  
animalibus locum habet. Nihilò tamen fecius illud diligenter animaduertendum est, quod Guaiacum albicans pro-  
prie colore præditum, recens, incorruptumq; sit: quippe cùm cæteris exilius sit, citius ac facilius exarescit, & ob hu-  
moris redundantiam uelocius cariem sentit, atq; fracescit. Quam ob causam satius quandoq; foret uetustiore recen-  
ter cæso uti, quàm iuniore, quod multo ante tempore fuerit ab arbore decisum. Sunt quoq; recentiorum nonnulli, de  
quorum numero unus est Alphonsus Ferreus, qui de ligni guaiaci decocto elegans admodum opusculum edidit, qui tæ-  
tium Guaiacum illud præferunt, quod è plantarum ramis ætatis mediæ desumptum fuerit. Quorum opinio non planè  
refellenda uidetur: nam quicumq; rem naturalibus expenderit rationibus, ramos antiquioris à caudice mediocris æta-  
tis parum differre cognoscet: item ramos huius à caudice iunioris. quippe plus humoris ad se trahit ramorū auctior  
facultas, quàm caudicis. Idcirco non alià de causa plantæ reuiuenscunt, cum earum rami implantantur, feruntur, &  
propagantur, nisi quod illud idem humidum innatum intra se continent, et eodem uigent temperamento, quo qui adole-  
scunt: etenim furculi, atq; rami sunt caudici, perinde atq; filij, & propterea animalibus ætate tenellis non absimiles.  
Atqui mihi longè magis iunioris caudicis placeret usus: siquidem in hunc immediate à terra humor, & alimentum  
desertur, ac præterea quoniam is fortasse nullum adhuc fructum protulerit: quandoquidem foetus à plantis, ut etiam  
ab animalibus, multum uirium aufert. Præstantissimum itaq; lignum Guaiacum illud erit, quod ex iuniori caudice re-  
center cæsum fuerit, tam exterius, quàm interius albicans, ramis carens, densum, ponderosum, minime cariosum, odo-  
ratum, gustui & acre, & subamarum. Cæterum quoniam nostra ætate æque cortices, atq; lignum in usum ueniunt,  
eandem in ijs rationem seruandam censeo, ut quinam meliores, præstantioresq; sint, dignosci possint, quam nos in eli-  
gendo optimo ligno in medium attulimus, ut scilicet illi eligantur, & probatissimi habeantur, qui à præstantiori ca-  
dice detracti fuerint. Importatur Guaiacum tam ex occidentalibus, quàm orientalibus Indijs: nam & Hispani è  
suis regionibus nouiter repertis, & Lusitani ex Calicut, Taprobana, & Iaua insulis, & Mauri, Aegyptij,  
Arabes, ac Persæ à mari rubro per camelorum carouanas (ut aiunt) Guaiacum ad nos conuehant: quin & ex Aethiopia, ut quidam narrant. At cum omnibus compertum sit, ea in medicamentorum genere longè magis cætera præ-  
cellere, quæ ex orientali plaga comportantur, ob id omnino cæsendum fuerit, Hispanicum uiribus esse imbecillius, quàm  
quod ex Lusitania, uel Alexandria in Italiam importatur. Guaiaci planta (ut ij refrunt, qui eam in solijs se uidisse  
testantur) ad fraxini proceritatem, & ad hominis mediocris habitus crassitudinem plerumq; assurgit. Folia fert qua-  
dantenus plantaginis æmula, dura, ac breuia. Flores eius produntur lutei: fructus uero iuglandis magnitudine, qui  
esui alium subducit: cortex annosis niger, iuuenibus uero subrutilus. Porro si Guaiaci uires, ac qualitates rectè  
perpendantur, procul dubio liquido constabit, ea præstare posse, quæ in arcenda Gallicæ lue requiruntur: nam cum  
id ex partibus admodum calidis, ac tenuibus consistat, itemq; siccis, habeatq; sibi resinæ plurimum admixtum, nimirum  
etiam potest suis uiribus ea efficaciter exiccare, attenuare, liquefacere, atq; expurgare, quæ humores inscerant: quæ  
etiam sudorem ciere. Huic accedit etiam, quod parte resinosa, quam possidet, contagioni, atq; putredini mirifice resistit: quæ

fit: quæ quidem incommoda hanc pestem comitari solent. Ceterum eo tempore, quo primum in Italiam Guaiacum introcepit, necnon etiam multis post annis, non sine summo timore dabatur potandum. Etenim ferebatur illi remissionem necis periculum imminere, qui rectam exquisiti uictus rationem per panis, et uisæ passæ modicum non seruasset, quique non perstitisset in curatione ad quadragesimum diem usque in tenebris inclusus, ita ut ne aeris quidem claritatem inspicere, nedum pedem e cubiculo efferret: ijs insuper carniū esu, et uini potu interdictum erat, non secus atq; ueneno. Verum enimuero cū sapius euenisset, ut ante constitutum tempus quidam ob tenuissimam uictus rationem ita umbecilles, ac uiribus destituti conspicerentur, ut penè spiritus, et uita deficerent, ij ne in tam manifesta uite discrimine uersarentur, à consanguineis, et afidentibus persuasi, caporum, gallinarumq; uirga, ac conuulsas carnes in cibum sumere, tantum inde percipiebant iuuamentum, ut uitam quasi deperditam recuperarent. Quo postea medici experimento edocti, uanam illorum doctrinam ridentes, qui tam grauem ægris legem imponebant, paulo plerique uictu uti iusserunt, nempe iuuenum gallinaceorum carniū, ac maiore panis portione. At nullus tamen horum ausus erat uinum exhibere. Quare à me sæpius animaduersa, ego primus (ni fallor) inter Italos medicos rationibus non obscuris adductus tentare uolui, posset ne uinum dari ex Guaiaci maceratione ijs maiori cum iuuamento, qui Gallica lue correpti essent. Quod cū mihi in frigidis morbis felicius cecidisset, quàm ex aqua tantum lignum decoquere, id potissimum me adduxit, ut hanc uini potandi rationem ad commune omnium commodum literis, posteritatisq; memorie mandarem. Ad quod feci pluribus iam annis elapsis, quo scilicet tempore Dialogus noster de morbo Gallico Bononiæ excussus prodijt in lucem, ubi eodem anno Carolus v. inuictissimus Imperator à Clemente vii. Pontifice maximo imperiali diademate feliciter est coronatus. Ex quo postea factum esse audiui, ut plerique medici ex illis nostris lucubrationibus, breui temporis tractu plurimum laudis, ac gloriæ sibi comparauerunt, utpote qui uinum Guaiaci ad suam praxim uertissent, prospero admodum successu. Licet fuerint, qui alijs persuadere conati sint, suum illud esse inuentum: qui ut rem facilius prætexerent, omnibus huiusmodi uini præparationem distulabant, et occultabant: uel id facerent, ut rem ita plurimi facientes, inde maiorem questum consequi possent. Sed cauendum profectò est à quibusdam impostoribus, qui cū sint earum rerum ignari, quæ ad medicæ facultatis contemplationem spectant, dum lignum, uel eius cortices ex uino decoquunt, cyclaminum, brioniam, pityusam, colocyntidem, et turpetum admiscunt, atque alios mille cacodæmones, qui eos de medio tollant. Quippe nulla habita temperamenti, ægritudinis, temporum anni, sexus, nec ætatis ratione, singulis diebus huiusce decocti tepidi cyathū omnibus indifferenter præbent potandum. Quo fit, ut si sorte quadam uinum quandoque persanant, decem postea uingent, tanquam improbi carnifices. Verum ut quisq; horum manus euitare, atque effugere possit, operæ pretium uisum est, uini Guaiaci conficiendi rationem subiungere, ac subinde hauriendi modum addere. Sumito igitur ligni

30 Guaiaci præstantissimi lima in scobem tenuissimam attriti, aut tornatili instrumento minutim concisi libras quatuor: corticum eiusdem libras duas: cardui benedicti libram unam et semis: adianti, aspleni, florum utriusq; buglosi, cuiusque libram: cassiæ odoratæ drachmas sex: seminis anisi fescunciam: sacchari libras quinq;. Deinde conyiciantur omnia in cado uinario mundo aptæ capacitatis, desuper affusis uini albi quàm optimi et feruentis, libris centum, et quinquaginta, mox diligenter uas operculetur, omniaq; sic macerari triduo dimittantur. Post triduum æro luteo percolentur, asserueturq; huiusce macerationis uinum in alio uase ad ægotantium potum. Siquidem bibitur hoc tam in prandio, quàm in cœna secundi Guaiaci decocti loco: non mane, neq; uesperis serapij uice, quemadmodum temerè multi facere consueuerunt. Hoc idem uinum longè etiam melius, et maiore quantitate uindemiarum tempore confici potest, admixtis ligno, cortice, cæterisq; alijs, recentibus uuis albis in mustum compressis: ibiq; tandū dimissis, quousq; mustum effuerescere desinat, et pellucidum, clarumq; reddatur: ueruntamen multiplicandæ sint omnia, quæ conueniunt medicamenta, pro uuarum quantitate. Præter huius uini potum cibis associandis, bis in die mane scilicet, et uesperis tribus, aut quatuor horis, antea quàm sumatur cibus, ægotantibus exhibeo decocti ligni ex aqua secundum communem medicorum usum senas uncias, admixtis uncijis duabus liquoris hoc modo parandi. Sumito primum adianti, lupi salictarij, fumaris, aspleni, senæ, singulorum manipulos tres: radicum centaurij magni, glycyrrhizæ, filicule, utriusq; buglosi, singularum uncias quatuor: seminis anisi, melanthij, florum satiui, et erratici buglosi, omnium santalorum, cassiæ, quam cinnamonum uocant, singulorum drachmas quinq;. Hæc ex aqua libris uiginti quatuor decoquantur ad tertias, demum colentur. Sumito deinde præstantissimæ senæ libras duas, conijctioq; in uas fictile oris angusti, demum percolatum decoctum feruens superimponito, ac inde obturato fictilis ore puluonari asseruinis plumis sarcto, igniq; prius calefacto fictile inuoluto, et loco calido collocato, itaq; per diem, ac noctem reponito. Postridie uerò manibus sena premitur, mox dilutum percolatur, cui adiiciuntur diluti rosarum effusæ alium subducetis libras sex, sacchari libras octo: effuerescunt deinde simul subiecto igne, quousq; tertia pars euascescat. quo facto additur electissimæ Rhabarbari minutim concisi uncia, ac ita iterum feruent omnia, donec iulapij modo consistat liquor. Postremo percolatur linteolo, et uase uitreo reconditur. At si ægotantes multa pituita reuerdent, decocto præscripto optimi turpeti uncia utiliter addi potest. Superest uictus ratio, quæ ægro talis præscribenda est, scilicet ut tam in prandio, quàm in cœna edat panis ternas tantum uncias, sitq; is similaceus, ac probe in cubano coctus: item totidem carnis pullorum gallinaceorum, perdicum, attagenarum, turdorum, ac auicularum in fluis, uanis, ac montibus uictitantium, assatæ potius, quàm elixæ: quin et uisæ passæ modicum. Bibat autem oportet præscripti uini equam cum cibo mensuram. Quod si quis purum id bibere non posset, diluatur aqua, quæ in phialis uitreis addita Guaiaci unceola breui temporis spatio efferbuerit. Tempus autem huic curationi aptissimum profectò uer est martio, aprili, et maio mensibus. quod si hoc tempore fieri non possit, fiat mense septembri in autumno: nam sicuti æstiuis ardoribus, et exurente iam siccitate non modò diuturna pharmaca, sed ne quidem breuia tolerant homines;

Vini Guaiaci  
conficiendi, &  
exhibendi ra-  
tio.

Chinæ radi-  
cis considera-  
tio.

Salsa parillæ  
consideratio.

mines; ita nec brumali tempore, dum ingenti frigore sæuit hyems. Interea ægris sine metu noxæ indulgere licet, modo cæli serenitas adsit, ut quandoq; in proximis hortis, ac uiridioris solatij causa læto gradu deambulent: quippe quæ-  
niam eiusmodi hortorum amenitate animus plurimum leuari solet. In hac etiam curandi ratione quosdā magis, et  
minus perseverare oportet, pro morbi necessitate, et salutis mensura. Hac ergo ratione uinum Guaiaci exhibere  
nō modō medetur cuiq; acerrimo Gallicæ pestis incommodo; sed etiam diuturnis articulorum, capitis, neruorum, ne-  
triculi, iocineris, lienisq; morbis pituita genitis mirifice succurrit. Nec minus etiam podagra laborantibus opem ferit,  
modo diuturna admodum non fuerit ægritudo. Porro in hoc illud etiam obseruandum est, quod ego Guaiaci uinum q̄  
tantum potandum exhibeo, quibus pituita redundet, uel saltem non exuperet bilis. Siquidem biliosis secundum, ac ter-  
tium ligni ex aqua decoctum, uini loco semper cum cibus præbendum censui, ut communiter ab alijs fieri solet. Non  
desunt præterea hoc tempore, qui radicem illam, quam alij CINAM, alij Chinam uocant, Guaiaco præferant, effi-  
Vesalius admirabilis humani corporis fabricæ professor oppositum senserit. Huius radiceis iamdudum apud Hispanos  
inualuit usus contra podagras, maximeq; apud inuictissimum Imperatorem Carolum v. cui meritō præclarā lau-  
dem acceptam referre potest. Adueritur hæc (ut audio) tam à Lusitanis, quàm ab Hispanis ex regionibus equino-  
ctiali proximis, legiturq; in litoribus maris è terra euulsa. nam in paludibus exorta, ac inde maris fluctibus raptā,  
in litus reijcitur. Radix est fungosa, perinde ac arundinacea, leuis, colore rufescente, Rhodiæ radiceis admodū emu-  
la. Præfertur recens, firma, et quæ neq; teredinem, neq; cariem senserit, et quæ magis rubescat. Damnat eam acri-  
ter Vesalius, ut dixi. Sed quibus ualidis rationibus id faciat, compertum satis non habeo, præsertim cum illud certū  
sciam Cæsarem inuictissimum nunquam ea toties usum fuisse, nisi ex ea plurimum adiumenti percepisset. Sunt et qui  
radici illi, quam nuper aliqui SALSAM, aliqui Spartam parillam nuncupare cœperunt, tum guaiaci, tum etiam  
ipsius chinæ uires, et facultates tribuant. Hæc ebulli tam ad unguem emulatur radices, ut quandoq; crediderim  
Spartam parillam, et ebulum esse idem: tamen id asserere non auiſim, cum hætenus eius folia non uiderim.

Родов.

ROSA.

Росы

CAP. CXII.



ROSA refrigerat, & astringit, sed sicca magis astrin-  
git. Succus recentibus folijs exprimitur, defectis for-  
fice unguibus (sic appellantur candidæ foliorum par-  
tes) reliquum in pila premi, & teri debet in umbra,  
donec cogatur, & ita ad oculorum circumlitiones re-  
condi. Siccantur etiānum folia rosarum, continuo  
uerſata, ne muceant, neue sitis in ijs insideat. Aridis  
rosis, & in uino decoctis expressus liquor, facit ad do-  
lores capitis, aurium, oculorum, gingiuarum, sedis, re-  
cti intestini, ac uulue penna illitus, aut infusus. Eadē  
sine expressione tusa, præcordiorum inflammationi-  
bus, humidis stomachi uitijis, igni sacro illini prodest:  
siccis, ac tritis semina asperguntur. Misceri solent uul-  
nerarijs antidotis, atque compositionibus, quas anthe-  
ras uocant. Folia uruntur in calliblephara: Flos, qui  
in medijs rosis inuenitur, siccatus, gingiuarum fluxio-  
nibus efficaciter inspergitur. Capita pora citam al-  
uum, & cruentas reiectiones sistunt.

Родов.

ROSEI PASTILLI.

CAP. CXIII. Росы

PASTILLI, quos rhodides uocant, hac ratione  
conficiuntur. Rosarum uiridium, quæ nullo antea hu-  
more madefactæ extabuerint, drachmæ quadraginta,  
Indicæ nardi drachmæ decem, myrrhæ drachmæ sex,  
tritæ digeruntur in pastillos, qui trium obolorum pō-  
dus æquent: siccatiq; in umbra in fictili non picato,  
atque obturato reconduntur. Alij adiiciunt costi dra-  
chmas duas, iridis Illyricæ totidem, & uinum Chium

cum melle miscent. Mulieribus monilium uice collo circumdato usui sunt, ad retundendum gra-  
ue sudoris uirus. Tritis etiam utuntur ad illitiones, & diapaſmata, quæ fiunt ad sudores coërcen-  
dos, ita ut à balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

Rosarum con-  
sideratio.

MULTA quidem sunt Rosarum genera, quæ in usum medicum ueniunt. At uulgatissime in Italia sunt, albi-  
cantes, puniceæ, et quæ ex albo rufescunt, quas uulgò appellant incarnate. Præstantissime, quæ puniceo colore ru-  
bent: proxima laus ijs, quæ in rufum candicant: ualissime albicantes, in quarum tamen genere eæ odoratissime exci-  
piuntur, quæ Hetruscis Damascenæ, et alijs Moschette uulgò dicuntur. Siquidem non modò ceteras excellunt, quod  
odore admodum suauis fragrent, sed quod etiam magis aluum subducant, id quod indicat earum iucundissimus odor.

Rose



# In Lib. primum Dioscoridis.

III

Rosæ diuersis partibus constant. quo fit, ut pro diuersis tam internis, quàm externis particulis, diuersum quoq; temperamentum sibi ascendant. Primum itaq; terrestribus, & aqueis partibus, quæ tamen in ipsis mediocriter se habent, substantiam, & adstrictoriam facultatem acceptas referunt. Ab æreis uerò & subdulcem, & odoratum saporem assumunt. Ex his denum, quæ ignis naturam sequuntur, amarorem concipiunt, ac etiam coloris rubedinem, quæ scilicet ratione spectantur. quo fit, ut plus insit caloris puniceis, quàm subrubentibus. In recentibus adstrictioni præstat emolumento, in siccis uerò minime: eaq; propter compertum est, earum deiciendæ alui facultatem, quàm priores Græci non animaduertunt. tantum ex amaritudine prouenire, cum recentes aluum subducant, siccæ uerò nequaquam. Succus medicamentis componendis expetitus, præstantior è puniceis elicitur, item ex subrutilis, uerum huic infirmior facultas. Dilutum Græcis ἀπό ῥοσῶν, è quo rhodopharmacum aluum innoxie deiciens conficiunt, plerumq; ex subrubescētium maceratis aqua folijs paratur: etsi hac in re ijs Damascenæ Hetruscis uocata longè præstent: quippe ex earum uicenis deuoratis folijs facili quidem, & citra noxam subducitur aluus. Rosarum succus reserat, discutit, æstergit, & deiecit: quapropter & bilem trahit, & sanguinem biliosum expurgat. Idem felle suffusus, & uentriculi, & ceterisq; obstructionibus opem mirificè præstat. Cor item corroborat, eiusq; palpitationi salutare est remediū: non illos deiecit humores, qui cordi officiant. Facit & ad biliosas febres; cuiusmodi sunt cuiusuis generis tertianæ. Ad hæc rosarum dilutum, ex quo conficitur rhodopharmacum, quod pharmacopœ Sirupum rosatum solutiuum appellant, in eorum medicamentorum genere recentiores medici recensent, quæ quoniam absq; aliqua noxa aluum subducunt, suo more Benedicta nuncupant. Albicantes deinde rosæ (Damascenas tamen exceptas uelim) non aluum in medicina sibi uendicant usum, quàm ut ex se aquam stillent: siquidem ijs deiectoria uis, qua pollent puniceæ, ac subrutile, multo infirmior inest. Quamobrem uidetur Manardus Ferrariensis, uir alioqui doctissimus, immerito id Mesui uero uertisse. Nam albæ, quas Damascenas appellamus, etsi maiore deiciendi uis ceteris præstent; credendum tamen est, de his non intellexisse Mesuē, quod eas illi facile incognitas fuisse existimem; uerum de ijs albis tantum, quibus passim rosæta florent. Cuius rei illud maximo argumento esse potest, quod Damascenæ Hetruscis uocata nuper in Italia florere ceperint, quodq; eas ueteribus cognitæ fuisse (quod sciebam) memoriæ prodiderit nemo: ni fortasse eas credemus esse, quæ Plinio spineolæ appellantur. Sane rosæ magnificandæ sunt, summoq; in pretio habendæ, non modò quod uiridarijs, & hortis sint ornamento, ac aspectu perquàm iucundo; sed etiā quod in præclarissimis medicamentis conueniant, quibus humane uitæ succurritur. Syluestres maiore adstringendi facultate sunt præditæ, quàm satiuæ, sed minori fragrantia redolent, atq; deiciendæ alui ne tantillum quidē facultatis retinent. Idcirco Theophrastus libro, & cap. v. de historia plantarum: Syluestres, inquit, rosæ domesticis asperiores tunc uirgis, tunc folijs constant: florem præterea ferunt, quo ab illis odore, colore, atq; magnitudine superantur. hæc Theophrastus. Ceterum quedam etiā rosæ nascuntur in Italia, quæ æreo colore fulgent, sed odore sunt admodum ingrato, atq; insuauis. Rosarum differentias longa historia prosequitur Plinius libro. xxi. cap. quarto, ubi sic inquit. Contra rosæ genera nostri fecere celeberrima, Prænestinam, & Campanam. Addidere alij Milesian, cuius sit ardentissimus colos, non excedentis duodena folia. Proximam ei Trachiniam, minus rubentem. Mox Alabandicam uiliorem, albicantibus folijs. Vtilissimam uerò plurimis, sed minutissimè spineolam. Differunt enim multitudine foliorū, asperitate, leuore, colore, odore. Paucissima quina folia, ac deinde numerosiora. Cum sit genus eius, quàm centifoliam uocant, quæ est in Campania Italiæ, Græcæ uerò circa Philippos, sed ibi non suæ terræ prouentu. Pangæus namq; mons in uicino fert, numerosis folijs, ac paruis: unde accolæ transferentes conferunt, ipsaq; plantatione proficiunt, non autem talis odoratissima est, nec cui latissimum, maximumq; folium: breuiterq; indicium est odoris scabritia corticis. Cyrenis odoratissima est: ideoq; ibi arguentum pulcherrimum. Carthagine Hispaniæ hyeme tota præcox. Refert & cæli temperies: quibusdam enim annis minus odorata prouenit. Præterea locis siccis, quàm humidis, omnis est odorator. Seri nec pinguibus uult, nec argillosis locis, nec riguis, contenta raris, proprièq; rudèraturum agrum amat. Præcox Campana, sera Milesia, non ratione tamen definit Prænestina. Rosa ex spina nascitur. Germinat primo inclusa granoso cortice, quo mox intue scemæ, & in uirides alabastris fastigiato, paulatim rubescens dehiscit, ac sese pandit, in calycis medio sui stantis cōpleta luteos apices. hæcenus Plinius. Partes in Rosa sex antiqui adnotarunt, quæ omnes sunt & scitu dignæ, & in medicina utiles; etsi pauci habeantur seplasiarij, qui separatim eas reponant. Primum quidem duæ partes inueniuntur in folijs: quarum altera est, ubi calyci folia inseruntur, unguum modo albicans, ob idq; rosarum ungues hæc extremitates appellantur: altera uerò foliorum reliqua. His aliæ duæ succedunt, in ijs flosculis, qui ueluti minuta semina tenuissimis capillis annexi flauescunt in rosarum umbilico: horum enim partem faciunt granulæ, partem uerò capillæ. Postremo quæ reliquæ sint, in ipso Rosarū alabaistro continentur, una scilicet in cacumine, altera in fundo. Folia & uentriculum, iecur, & retentricæ insuper facultatem corroborant: dolores ex caliditate prouenientes leniunt, & inflammationes auferunt. Ungues etsi propriam à scriptoribus non receperint dotem; inseruntur tamen utiliter lotionibus, & clysteribus ad inhibendas fluxiones. Flosculi medij cum suis capillis gingiuarū defluxiones cohibet, quin etiam, autore Plinio, alba feminarum profluvia mirificè inhibent. Calyx deniq; quem caput etiam aliqui dicunt, cum reliqua parte basis, alui fluores, & cruentas excreationes sistit. Ceterum præter has, quæ in florentibus rosis consistunt, tres etiam in fructu comperiuntur partes, ubi rubescit is, & maturitatem sensit, uidelicet, substantia carnis, semen, & lanugo conclusa: quibus non obscura inest adstringendi uis: Idcirco & ipse remedio sunt contra alui fluxus, & feminarum abundantiam qualencunq; item contra gonorrhæam, in qua præcipue pollent. Sunt, qui flosculos capillis appensos, qui uerò alabastris, auheram esse existimant. Sed re uera hac in re plene hallucinantur: quæ a ueteribus Celso, Galeno, & Paulo nusquam simplex est medicamentum, sed quedam ex pluribus rebus composita, cuius frequens erat usus apud antiquos, ad oris ulcera: item ad pedum rimas, digitorumq; pterygia. Cuius etiam

Rosarum succus, & dilutū.

Rosarum genera ex Plin.

Partes in rosa, earumque uires.

Quorundam lapsus.

Aqua rosarū  
prestantior.

parandi rationem adnotatam reliquit Galenus lib. v. 1. de compositione medicamentorum secundum locos de oris & ceribus differens. Ex Rosis ui ignis fit aqua pluribus, ac diuersis instrumentis: ueruntamen ea ceteris prestatior, ac odore fragrantior habetur, quæ per balneum calentis aquæ uitreis organis elicitur, cuiusmodi & alie sunt, quæ eodem modo ad uniuersum medicinæ usum confici solent. Quandoquidem inter has, & illas, quæ plumbæ instrumentis lignorum, uel carbonum igne extrahuntur, tanta deprehenditur differentia, quanta inter plumbam, & aurum deprehendi potest. Quippe quæ sunt in balneo calentis aquæ uitreis rostratis organis, ab herbis, & floribus, à quibus manant, nec sapore, nec odore dissentiunt, adeo ut non solion proprias plantarum qualitates secum referant, sed ne etiam tantillum quidem tum fumi, tum rei adustæ respiciant. Quod quidem in ijs non inuenias, quæ uulgo plumbæ, & æreis instrumentis eliciuntur: has enim nunquam, uel rarissime gustaueris, quin tibi fumum uirus, nidoremque reddant. Quæ res non modo ægris ingentem molestiam afferunt, & nauseam plerumque mouent, sed & plurimum noxæ pectori, uentriculo, iocineri, uisceribusque omnibus inferunt: quod à metallicis organis, à quibus distillant, malam eorum qualitatem sibi uendicent, ut libro tertio in absinthij commentatione, annuente Deo, latius explicabimus. Quæ re hac ætate perspecta, doctissimi, ac peritissimi medici ueteres secuti decoctis, ac dilutis tantum uti cœperunt. Quæ tametsi uiribus aquas qualescunque sublimatas (ita enim stillatitias uocant) præcellant; ceterum, quæ calentis aquæ feruore (ut supra diximus) sunt, cum proprios tum odores, tum sapes herbarum, ac florum, à quibus extrahuntur, secum trahant, iure quidem decoctis non modo ipsas æquipollere, sed etiam præstare crediderim: non tamen, quod uiribus præcellere dixerim, sed quod gustui suauiores; & usui iucundiores habeantur: quod non parum solatij egrotantibus affert. Nos quidem alijs aquis non utimur, quam his, ad quas elicenda nobis organum affabrè parari fecimus, cuius ope hæc stillatitias, ac præstantissimas aquas suo tempore conficimus. Quarum alie sapore constant amaro, alie uerò acri, alie austero, alie acido, alie denique insipido pro uarijs simplicium medicamentorum qualitibus, à quibus eliciuntur. Quapropter seplasiarij, & medici, quos magis decet humanam charitatem colere, quam aurum & argentum, dent operam, ut iam plumbea, & ærea organa aboleantur, & balnea, de quibus diximus, in eorum locum succedant. quippe in hoc etiam (quanuis plus laboris, minus uerò emolumenti suscipiant) & Deo, & hominibus simul rem gratam facere poterunt. Rosarum uires collegit Galenus lib. v. 1. simplicium medicamentorum, sic inueniens. Rosarum uis, atque facultas superioribus libris pluribus uerbis exposita est, nempe quod ex aquea substantia calida mista duabus alijs qualitibus, adstringenti uidelicet, & amara, composita sit. Quinetiam cuius sit naturæ utraq; amara scilicet, & adstringens, in horum commentariorum quarto declarauimus. Flos earum magis etiam ipsis rosis adstringit, ac proinde sanè etiam exicatorius est.

Rosarum facultas ex Galeno.

Λύκιο.

LYCIVM.

CAP. CXIII.



LYCIVM, quod aliqui pyxantham uocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus: folijs buxi, densis: fructu piperis, nigro, læuissimo, densoque: cortice pallido, non dissimili lycio madefacto: radicibus multis, obliquis, lignosis. Nascitur plurimum in Cappadocia, Lycia, & plerisque alijs locis, aspera loca amat. Succus extrahendi ratio hæc est. Rami cum radiculis tusi, & antè per multos dies macerati coquuntur, tum abiectis lignis, in idem liquor coquitur, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta decoctione amurcæ, aut absinthij succo, aut felle bubulo. Innatus spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamentis additur, reliquò ad alia utuntur. Simili modo fit lycium semine expresso, & insolato. Optimum, quod uri potest, restinctumque rubentem spumam ostendit, glebis intrinsecus nigris, intus, cum frigeris, rufis, odore minimè uiroso, cum amaritudine astringens, crocino colore: cuiusmodi Indicum est, cæteris præstans, & efficacius. Lycium adstringit, caliginem oculorum discutit: genarum scabiem, pruritus, ueteresque fluxiones sanat: facit ad purulentas aures, exulceratas gingiuas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusque illitum: coeliacis, dysentericis, potum, inditumque conuenit: datur sanguinem excreantibus, & rufi ex aqua: contra rabiosi canis morsus in catapotio deuoratur, aut in aqua bibitur: flauos facit pilos: reduiis, ulceribus, quæ serpunt, aut putrent, medetur: feminarum profluvia appositum sistit: rabiosorum ictibus ex melle potum, aut uice catapotij deuoratum, auxiliatur. Tradunt Indicum fieri Lyciū, ex frutice

ictibus ex melle potum, aut uice catapotij deuoratum, auxiliatur. Tradunt Indicum fieri Lyciū,

ex frutice

ex frutice lonchitide appellato. Ea spinarum generi ascribitur, ramos rectos habens, ternum cubitorum longitudine, maioresue, rubo crassiores, à radice numerosos: fractus cortex rubescit: folia oleæ similia. Herba in aceto decocta proditur lienis inflammationibus, & regio morbo mederi, & foeminarum purgationes elicere. Assueverant etiam crudam in potu, eosdem effectus præstare: semen cyatho dimidio potum, pituitam expurgare, venenis quoque auxilio esse.

**LYCIUM** medicamentum, quo hodie officinæ passim utuntur, nimirum notis illi plurimum reclamationat, quod nobis hic reddidit Dioscorides. Siquidem illud officinarum igni adnotum non acceditur, nec intus rufescit, nec ullam gularibus affert amaritudinem. quæ omnia certo sunt indicio, id omnino imposturis, & adulterijs non uacare. Tradidere quidam hoc ab impostoribus fieri: ligustri fructu, alij id tribuunt periclymeni baccis, alij sanguineæ uirgæ corymbis, alij porro ex his omnibus simul confusis elici produnt, ac inde insolari. At legitimum, & quod sincerum sit, quoquomodo se res illa habeat, compertum est, hoc ex Lycia, unde illi nomen, ad nos non importari. Verumtamen & in Italia lycij arbor nascitur: quandoquidem (ut Brasauolus testatur) in Liguriæ alpius frequens illa uisitur. Eadem & in Dalmatia prouenit, unde nuper eius ramuli suis baccis onusti mihi allati fuerunt: quippe (ut mihi retulerunt) uia, qua ex Zara itur Nonam ubiq; uirescit. Sed, quæ maxima tum seplasiariorum, tum etiam medicorum incuria, ac negligentia est in ijs exquirendis, quæ ad artem medicam spectant, plerumq; fit, ut ne illud quidem, quod nobis sponte natura tribuit, cognoscatur, nedum recipiatur in usum. Lycij uires Dioscoridi explet amurca in cupreo uase decocta, aut etiam rhus decoctus, quousq; eius liquamentum mellis crassitudinem acquirat. Lycij meminit Galenus lib. vii. simp. medicament. sic inquit. Lycion, siue pyracanthon, arbor spinosa, ex qua lycium, quod uocant, conficitur, id uidelicet medicamentum liquidum, quo ad sugillata utuntur, & sedis, orisq; phlegmonas, ulcerationesq; tum herpetas, putredines, & ulcera contumacia, & aures pure fluentes, & intertrigines, ac paronychias. Est autem facultatis exiccatoriae, compositum ex diuersi generis substantijs, quas & τερφορέες Græci uocant: altera quidem tenuium partium digerente, atq; calida: altera terrestri, & frigida, ex qua adstrictionem obtinet. Porro hæc qualitas pusilla medicamento inest, digerit uerò, & desiccatur non parum, nempe in secundo recessu, in calore autem medijs, & symmetris proximum est. Proinde ad diuersos affectus hoc utuntur medicamine, ut abstergente quidem ad ea, quæ pupillas obtenebrant: ut contrahente uerò, coeliacis, dysentericis, ac muliebri profluuiio adhibentes. Lycium hoc in Lycia, & Cappadocia plurimum prouenit: alterum uerò Indicum ad omnia ualentius est. Et primo de antidotis, non facile adulterinum lycium à legitimo dignosci idem memoriæ prodidit. hæc Galenus.

Lycii cōsideratio.

Lycium in Italia nascens.

Lycii uires ex Galeno.

Ceterum quoniam Pyracantha, quo nomine lycium ab aliquibus appellatur, mihi Buxum, quæ Græcis βύξος dicitur, in memoriam redegit, non omittendum duximus, quin de ea etiam aliquid dicamus. Buxus itaq; nobis notissima est planta, quod plurima in Italia proueniat, folio myrti minore, crassiore, uiridioris, ac subrotundioris: uiret perpetua coma, eaq; propter topiario operi accommodatissima: flore herbaceo: semine rufescente, omnibus animantibus inuiso. Crassissima in Corsica, flore non spernendo, quæ causa amaritudinis mellis. Frigidis gaudet, & apricis. Materies buxo honorata, raro crispanti, nec nisi radice: ceterò lenis quies materis, silentio quodam, & duritie, ac pallore commendabilis. Eadem spississima, & densissima, atq; ponderosissima, adeo ut in aquis non fluitet, nec carrem sentiat. Hæc etsi nullius sit in medicina usus, ut ueteres prodidere; non desunt tamen & recentioribus, qui uelint non aliud esse italis buxum, quàm Indis lignum, quod guaiacum appellant, ea tantum ratione ducti, quod pluries experimento compertum sit, eius decocto etiam felicius eos sanatos esse, qui Gallica lue affecti erant. Quod etsi experientia concedi posset, illud buxi lignum præstare: attamen quod buxus in Italia nascens, & guaiacum ab Indis petiitum una, & eadem sint planta (ut in secunda centuria Amatus Lusitanus asserere uidetur) nunquam profectò crediderim. Siquidem guaiacum pingue, resinosumq; uisitur: materie intus nigra ebeni ferè modo: quin & sapor huic amarior, & acris. quibus omnibus notis sicca buxi materiem carere constat. Quinetiam guaiaco (ut narrant ij, qui ab Indis ad nos redeunt) folia insunt plantaginis, breuiora, crassiora, durioraq;: lutei flores, & fructus iuglandis magnitudine. Buxus uerò folia fert myrti, breuiora: flores herbaceos, & fructus myrto nusquam grandiore. Quo fit, ut omnino existens eos hallucinari, qui putant, buxum quæ in Italia nascitur, idem esse cum Indico guaiaco.

Buxi cōsideratio.

Quorundam opinio reprobara.

Αϰαϰία.

ACACIA.


CAP. CXV.

**ACACIA** in Aegypto nascitur, spina instar arboris, fruticosa, non se in rectum attollens. Florem habet candidum, & semen lupino simile in folliculis: ex quo succus expressus siccatur in umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex uiridi. Eligatur modicè rufus, & odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex folijs, & semine succum. Manat & gummi ex ea spina. Vis ei ad spissandum, refrigerandumque efficax. Succus oculorum medicamentis utilis: ualet ad igne sacrum, ulcera quæ serpunt, perniones, pterygia, & oris ulcera: procidentes oculos reprimat: mensesium abundantiam sistit, prociduum uuluum cohibet: citam aluum suppressit, aut potus, aut subter inditus: capillos denigrat. Lauatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuso, quod concreuerat, donec pura extet aqua: & ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in cruda fidelia, donec ficile fornacibus percoquatur: torreturque in carbonum halitu perflata. Spinæ decoctum solutos artus foris committit. Præfertur eius spinæ gummi, quod in vermiculorum speciem contrahatur, & uiri modo perluceat, ligni expers: proximum est candidum: sordidum uerò, ac resinosum inutile. Curis meatus obstruit, & medicamentorum, quibus admiscetur, acrimoniam be-

betat:

## ACACIA ALTERA.

Acaciae hist.  
ex Theophr.



Ex Plinio.

Acacia officinarum.

Gummi Arabicum.

Quorundam lapsus.

dit lib. **xxiiii.** capite duodecimo, cuius sic uerba sonant. Est  $\&$  acaciae spina. Fit in Aegypto alba, nigraque arbore, item uiridi, sed longè melior è prioribus. Fit  $\&$  in Galatia tenerrima, spinosiore arbore. Semen omnium lenticulae simile, minore est tamen  $\&$  grano,  $\&$  folliculo. Colligitur autumno, quoniam antè collectum nimis ualidus. Spissatur succus ex folliculis aqua caelesti perfusus, mox in pila tulsis: exprimitur organis, tum densatur in sole mortarijs in pastillos acacia dicta, arboris uidelicet suæ nomine. Fit  $\&$  ex folijs per se minus efficax. Ad coria perficienda semine pro galla utuntur. Foliorum succus,  $\&$  Galatiacae acaciae nigerrimus improbatur: itè qui ualde rufus est. hæc Plinius. Succus è recenti semine expressus, ac postea longa insolatione cõcretus Græcis nomine suæ arboris Acacia nuncupatur. In cuius defectu supponunt tum officinae, tum medicorũ uulgus succum è syluestribus prunis expressum in tenues quasdam placentulas in sole densatum: siquidem legitima acacia ad nos nõ affertur. Vbi acacia defecrit, licet (si Dioscoridi credimus) eius uice tum rhois arbuscule folia, tum lentisci foliorum succu, tum etiam hypocistidem medicamentis immiscere. Quamobrè his potius seplastarij uti deberent, quàm suppositio syluestrium prunorum succo. Scire etiã munus conuenit, gummi, quod ab arbore acaciae manat, ideo Serapioni Arabicum nuncupari, quod ab Arabia regione Aegypto contermina suo tempore importaretur. Sed animaduertere oportet, quod Arabicum uulgarijs usus gummi longè quidem ab illo differt, quod ab acacia colligitur: namq; illud non contractis uermiculis simile, sed in grumis uersicoloribus conspicitur, quorum alij succinum, alij topatium, alij chrysopatium, alij beryllum colore,  $\&$  nitore referunt. Quod autem nobis gummi Acaciae desit, illud argumẽto esse potest, quod ipsa quoq; legitima acacia hætenus, quod sciam, non defertur. Nam si hoc, quo utimur, sincerũ, legitimumq; acaciae esset gummi, procul dubio ipsa quoq; acacia ad nos conueheretur, cùm longè magis in paranda theriaca, alijsq; componendis medicamentis expetatur, quàm gummi. Hinc itaq; facile quisq; coniscere potest, gummi ex Aegypto spina defluens ab eo sanè plurimum differre, quod Arabici gummi nomine officinarum uulgus habet. Hoc igitur uulgo gummi illud equidem esse existimauerim, quod Græcis gummi simpliciter uocatur. In quam sententiam me adduxit Galenus: siquidem libro **vii.** simplicium medicamentorum sic inquit. Gummi lacryma est congelata, concretãq; in truncis arborum ipsam fundentium, uelut resina quoq; in multis uisitur plantis, quæ resinam fundere possunt. Ceterum quod exiccatorum, emplasticũq; sit facultatis, constat. hæc Galenus. Ex cuius uerbis palàm est, gummi sic in uniuersum Græcis appellatum, nostrum gummi esse uulgò Arabicum dictum. Quod quidem (quantum sensuum iudicio consequi possumus) ex pluribus arborum gummi miscellaneum est. Cuius rei manifestò indicio sunt ciam grumorum formæ diuersitas, tum colorum uarietas. Huc etiam accedit, quod Galenus unica nomenclatione omnia earum arborum gummi comprehendit, quæ resinam non proferunt. Quamobrè omnino explodenda uidetur eorum sententia, qui ubi Græci gummi absolutè scriptum reliquerunt, illud gummi intelligendum esse contendunt, quod è spina Aegyptia manat. Non desunt præterea, qui gummi spinae Aegyptiæ illud esse opinentur, quod gummi Dragaganti, hoc est, tragacanthæ officinis appellatur.

betat: ambustis ex ovo illitum, pustulas non petunt erumpere. Alterum Acaciae genus in Cappadocia, Pontoque prouenit, Aegyptiæ spinæ similitudine, longè minus, tenerius, humile aculeorũ uallo munitur, folia habens rutæ: semen lenticula minus fert autumno, in loculis connexis, ternũ, quaternũ uel quinquernũ. Succus eius adstringit, viribus inferior,  $\&$  ocularibus medicamentis inutilis.

**ARBOR.** quæ Dioscoridi Acacia uocatur, Theophrasto spina simpliciter dicitur libro quarto, capite tertio de plantarum historia, ubi de ea ita scriptum reliquit. Spina ex eo nomen accepit, quod tota arbor aculeis horret, excepto candice: nam ex super germina, foliaq; aculeos gerit. Magnitudine ex cellit materies quippe duodenorum cubitorum, tectis idonea creditur. Eius duo genera sũt: quedam enim candida, quedam nigra:  $\&$  altera imbecillis, facilẽq; putrescens: nigra autem robustior, atq; incorrupta, ob id in nauium fabrica ad costas, nautisq; compagines ea utuntur. Erecta non ualde assurgit. Fructum fert in siliqua, leguminum modo, quo incolæ coria perficiunt uice gallæ. Flos  $\&$  pulcher aspectu, ut coronas ex eo facerent:  $\&$  medicamentis perutilis, quæ de causa colligi à medicis solet. Fit  $\&$  gumma ex ea: manat hæc tum arbore percussa, tum sponte sine ulla plaga: cum autem cesa fuerit, anno tertio protinus resurgit. Copia huius arboris largè habetur,  $\&$  sylua ingens circa agrum Thebanum est: ubi  $\&$  robur,  $\&$  perseæ,  $\&$  olea quoq; eo loco emigrat, non aquis fluij riguo distat enim plus, quàm trecentis stadijs, sed suis fontibus, qui circa eam tractum permulti exiliunt. Materies arboris dura,  $\&$  cesa coloris rem celtis utiq; repræsentat: hætenus Theophrastus. A quo Plinius non dissentiens, ipse quoq; eius historiam memorie pro-

pellitur, propterea quod effigie contractos uermiculos referat, quo nihil certe melius illi competere posset. Sed tamen hoc etiam illud non est, ut suo loco dicemus. Galenus lib. v 11. de compositione medicamentorum per genera, Acacie gummi  $\kappa\omicron\upsilon\mu\iota\ \tau\omicron\iota\beta\alpha\ \iota\chi\alpha\delta\iota$  uocat: hoc fortasse argumēto, quod scripserit Theophrastus (ut supra dictum est) ingentem huiusce spinæ syluam esse in agro Thebano. Sed cum ad nos non perferatur acacia (ut paulo ante scripsimus) nec etiam eius gummi importari credendum est. Gummi acacie meminit Iacobus Syluius uir sanè et atis nostre ingenio et doctrina celebris, suo de natura simplicium medicamentorum libello, his uerbis. Gummi acacie non meminit Galenus in Acacia libro sexto simplicium, uti nec acacie mentionem facit paulo post in Acantha Aegyptia, seu Arabica, quo nomine solo Dioscoridis uocatur. Vnde colligas licet, acaciam, et acantham Aegyptiam, seu Arabicam, diuersas esse in Aegypto spinas arbores. hæc ille. Sed mea quidem sententia, Syluius manifestè aberrasse deprehenditur: quandoquidem Galenus acantham Aegyptiam arbor utiq; non est, sed herba e carduorum genere, quemadmodum et Dioscoridis libro tertio,  $\alpha\kappa\alpha\theta\alpha\ \lambda\epsilon\upsilon\kappa\alpha$ , hoc est, spinæ albe similis, quam Mauritanii suchaa appellant. Quocirca eo capite acacie meminisse Galenum omnino fuisse absurdum. Ceterum alteram Acaciam, quam in Cappadocia, Pontoq; provenire tradit Dioscorides folijs rutæ, quamq; hic depictam damus, accepimus hoc anno ab excellenti medico Augustino Alpago Bellunensi. Et quoniam ea Dioscoridis historiam perbellè representare uisa est, non potuit animus non inclinari ad credendum hanc secundam esse Acaciam. Est enim aculeis horrida, folio rutæ, semine lenticula minore, in siliquis ternum quaternumue capacibus, quod autumno profert, gustu etiam adstringente: color siliquis aureo quodam fulgore respersus, adeo ut in sole auri modo pelluceat. Acacie uires adnotatas reliquit Galenus libro v 1. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Acacie et planta ipsa acerba est, et fructus, et succus, qui lotus quidem et imbecillior, et minus mordax redditur, utpote acrimoniam quandam per lotionem deponens. Porro si parti alicui sanæ illinatur, protinus eam et sicciorem, et contractam efficiet, nullum quidem caloris sensum iniebens, sed nec frigoris admodum ualentem. Vnde constat medicamen id esse frigidum, et terrosum, immixta quadam etiam essentia aquea. Et sanè coniectura est, non esse simulare, uerum quasdam in sese dispersas habere partes terreas, et calidas, que in ipsa ablutione segregentur. Estq; et hoc tertij ordinis exiccantium, et secundi refrigerantium, ubi quidem elotum sucri, illotum uero primum.

Iacobi Syluii opinio reprobara.

Acacie alteri genus.

Acacie uires ex Galeno.

$\alpha\gamma\iota\omicron\varsigma$ , VITEX,  $\chi\alpha\iota\tau\alpha\ \iota\gamma\omicron\gamma\omicron\varsigma$

CAP. CXVI.



**VITEX**, siue lygos, frutex est in arborem assurgens. Nascitur in fluminum ripis, asperisque locis, ac torrentium alueis: ramos gerit longos, fractu peruiraces: folia oliuæ, sed molliora. Duo genera eius: vna harum album florem mittit cum purpureo: altera tantum purpureum, & semen, ut piper. Excelsior uires habet, & astrictorias. Semen eius potum uenenatis ictibus, aquæ quæ cutē subijt, lienosisque auxiliatur: lac euocat: menses ciet, drachmæ pondere in nino potum: genituram exoluit: caput tentat, & soporem affert. Decoctum herbæ, & seminis in defensione, mulieribus vuluæ malo opportunis opitulatur: item inflammationibus. Purgationes mouet semen cum pulegio potum, etiam suffitu, uel appositum capitis dolorem dissoluit illitum: instillatur cum aceto, & oleo capiti in lethargo, & phrenitide. Folia suffitu, aut substratu fugant uenenata: illita quoque serpentium moribus auxiliantur: testium duritias, cum butyro, & folijs uitium emolliunt. Rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat: & cum folijs medetur luxatis, vulneribusque. Virgam qui manu teneat, dum iter facit, negatur intertriginem sentire. Agnum, quasi dicas castum, uocant Græci, quoniam matronæ in Thesmophorijs Atheniensium castitatem custodientes, folijs huius cubitus sibi sternunt. & lygon, quasi uimen, propter inuictam ferè ramorum flexilitatem.

**VITEX**, siue Salix Amerina, quam uulgo herbariorum Agnum castum appellat, arbuscula est in Italia uulgaris notissima.

Vitidis confectio.

Duo eius genera recenset Plinius libro xxiii. capite nono. Maior in arborem salicis modo assurgit: minor ramosa, folijs candidioribus, lanuginosis. Prima album florem mittit cum purpureo, quæ et candida uocatur: nigra, quæ tantum purpureum. Nascuntur in palustribus campis. Non multum à salice utilium usu distat vitex: foliorum quoq; aspectu, nisi odore gravior esset. Græci lygon uocant, alij agnon, quoniam matronæ in Thesmophorijs Atheniensium castitatem custodientes ijs folijs cubitus sibi sternunt. Vitex, ut scriptum reliquit Galenus libro

Vitidis uires ex Galeno.



libro v. i. simplicium medicamentorum, caliditatis, & siccitatis classē tertiam sortita est, uerum ea est multum tenuis substantiæ, tum gustu acris simul & adstringens: ipsas tamen uices ad medicinam habet inutiles: ceterum folia, semenq; calida, siccaq; facultate sunt, substantia uero tenui. Nam & utentibus ita apparet, & gustantibus acris simul & subadstringens percipitur tum folium, tum flos, tum semen. Edendo tamen etiam semen est, uerum tam perspicuo calfacit, ut capiti hoc nomine dolorem pariat. At si frigatur (nam & sic editur cum bellarijs) minus caput tentat. Porro flatus uentris discutit & cum non fructum, & multo magis cum frictum fuerit. Cobibet præterea semen impetus in uenerem tum frictionis expers, tum etiam ipsam expertum. Folia uem, floresq; ipsius fructus idipsum præstare possunt. Itaq; non tantum esca, potaq; ad castitatem conferre creduntur, uerum etiam substrata. Hinc est, quod Athenis in Thesmophorijs, hoc est, sacris Cereris, mulieres totum sibi fruticem substernunt: hinc illi quoque nomen inditum agni, hoc est, casti. Ex quibus omnibus manifestum est, si quidem memoria teneamus, quæ superioribus commentarijs sunt dicta, agnum calfacere, simulq; exsiccare, tum omnium maxime flatus discutere. Porro quod exacte tenuium sit partium, facultas eius indicio est. Nam quod caput tentat, non magis à multitudine uaporum ab eo prognatorum, quam à caliditate eius, ac subtilitate partium fieri rationabile est. Nam si flatusosum spiritum procreare posset, sane & uentrem inflaret, & uenerem stimularēt, perinde ut eruca. Verum cum non tantum non excitare, imò etiam reprimere queat, fuerit profecto secundum rutæ maxime facultatem tum in excalfaciendo, tum in resiccando: non tamen illi par est, nam utroq; paulo est inferior: siquidem ruta tum magis est excalfactoria, tum magis desiccatoria. Differt etiam qualitatis simul, ac facultatis mustione. Nam agni semen, ac germina modicam ferunt adstrictionem: at ruta ubi aruerit, exacte amara est, & acris; ubi uero humida, subamara. Non tamen austerritas, aut acerbitas illi inest: aut si cui uideatur inesse, ea utiq; omnino obscura, scio, uidebitur, nec par ei, quæ est in agno. Quocirca & ad iecur, & lienem indurata, & obstructa agni semen potius, quam ruta competit. Sed hec ad curandi iam methodum pertinent, quam ut omnino non attingam de medicamentorum pronuncians facultatibus, fieri non potest: uerum celeriter ad rem propositam reflectere, uiri est utiq; temperati. Magisq; etiam idipsum in sequentibus medicamentis efficere conabor, hoc est, ubi ex quibusdam paucis euentibus generalem facultatem collegero, particulares postea actiones omittam. Nam in præsens id solum nouisse sufficit, quod agnus calidus est & siccus facultate, idq; non mediocriter, sed tertio excessu, tum admodum tenuium partium. Hæc quæ noui, ac postea methodum curandi didicerit, ipsemet inueniet, quo pacto menses hinc cieat, quo pacto partes induratas digerat, quo pacto lasitudinem soluens, seu acopium, & excalfactorium ex eo unguentum præparetur.

IREA.

SALIX.

CAP. CXVII.



Salicis consideratio.

**SALIX** vulgo nota est. Cuius semen, folia, cortex, & succus spissandi uim habent. Trita folia cum exiguo pipere, & uino pota, ileosis subueniunt: sumpta per se, & cum aqua præstant mulieribus, ne concipiat. Salignum semen in potu sanguinem expuentibus prodest. Cortex eosdem præbet effectus. corticis cinis admixto aceto maceratus, illitu clauos, & callos tollit. Ex folijs, & cortice succus cum rosaceo in calyce punici calfactus, aurium doloribus auxiliatur. Decocto eorum podagras foueri utilissimum: furfures purgat in corpore. Excipitur succus, qui manat ex ea, cum floret, exciso cortice: in plaga enim concretus humor inuenitur, qui ad purganda, quæ obstant oculis, suam uim præbet.

**QUANVIS** de Salice, ut una tantum agat Dioscorides; eius tamen plura traduntur genera tum à Theophrasto lib. III. capite XIII. de plantarum historia, tum etiam à Plinio lib. XVI. capite XXVII. Nam quedam in tantam proceritatem assurgunt, ut ex eis in Liguria fiant & perticæ, & pali maximi usque ad uitium pedamenta. Aliæ non tam proceræ crescunt, colore rufescentes, sequacis lentitiæ, quæ ligandis cadorum uinorum circulis commodè finduntur. Rursum aliæ firmiores corticibus, & rusticane suppellectili admodum expetite. Aliæ deniq; sunt minuscule, ac spectabili tenuitate, texendis canistris, cistellis, ac calathis aptissime. Salicis lacrymam trium generum esse prodidit Plinius lib. XXIII. cap. IX. tametsi unius tantum generis meminerit Dioscorides. Vnam arbor ipsa sponte exuda: altera manat in plaga, cum floret, exciso cortice trium dignorum magnitudine: tertia est detruncatione ramorum autumnali tempore à falce distillans. Ceterum qui Salicis albicantem spumam adnotatam reliquerit, inuenio neminem: quæ delevis statim floribus è ramusculis uive modo dependet, donec uentis arrepta huc, & illuc plumæ modo impellitur. Salix

pore à falce distillans. Ceterum qui Salicis albicantem spumam adnotatam reliquerit, inuenio neminem: quæ delevis statim floribus è ramusculis uive modo dependet, donec uentis arrepta huc, & illuc plumæ modo impellitur. Salix

cui senescit, ac breui uita spatio perdurat. Eius materies ideo scutis faciendis apta, quod lenta admodum sit, tenax, & laevis. Salicis uires memoriae prodidit Galenus lib. v. 1. simplicium medicamentorum his uerbis. Salicis folijs ad cruenti uulneris glutinationem quis uti posset. Verum floribus eius maxime prope omnes utuntur medici ad exiccantes emplastri preparationem: est enim uis eorum ita desiccatoria, ut morsu abstineat: habet uero etiam quandam adstringentem. Sunt uero etiam, qui succum ex ea expressum, medicamen seruent mordacitatis expers, et exiccatorium, et multas res utile. Haud enim inuenias quid ad plures res utilius medicamento citra mordacitatem exiccante, quod possum etiam adstringat: sicut in opere de medicamentorum compositione exactius demonstrabitur. Porro arboris cortex sanalem facultatem obtinet tum floribus, tum folijs, nisi quod temperatior sit siccioris, uelut omnes cortices. Sed hunc quidam comburunt, eiusque cinere utuntur ad omnia, quae ualenter desiccare oportet. Nam clauos quos uocant, callos Graecis τύλοις, myrmeciasque tollunt, aceto acri ipsum macerantes. Nonnulli autem dum floret salix, corticem eius incidunt, & succum quandam colligunt, utunturque ad ea, quae pupillas offuscant, extergente uidelicet, summi tenuium partium medicamine. Vti uero illo ad multa alia quis posset, si quidem talis fuerit.

Salicis uires  
ex Galeno.

## OLEA SYLVESTRIS. &amp; OLEA SATIVA.



Ἀγριελαια. SYLVESTRIS OLEA. *Spilargyrea olea* A.P. CXVIII. *Primum*

Sylvestris olea, quam aliqui cotinon, id est, oleastrum appellant, alij Aethiopicam oliuam, folia astringunt: trita autem & imposita ignem sacrum, ulcera quae serpunt, epinyctidas, carbunculos, reuuias, nomasque cohibent: crustas emarginant cum melle illita: quinetiam fordida ulcera repurgant: inflammationes, panosque cum melle imposita discutunt: cutem à capite vulsam conglutinant: oris ulceribus, & priuarim infantium commanducata medentur. Succus, & decoctum eisdem habent effectus: sanguinis eruptiones, ac muliebri profluuium, admotus succus inhibet: vuae oculorum, pustulisque prodest: ulcera, & ueteres defluxiones sistit: quapropter in collyria additur, ad palpebrarum erosiones perquam utilis. Exprimitur succus tuis folijs, affuso uino, aut aqua, siccatusque sole in pastillos digeritur: sed longe ualidior ad recondendum succus habetur, qui cum uino, quam cum aqua expressus est. auribus subuenit, siue ulcerentur, siue pus effluat. Folia conuenienter coeliacis cum farina hordeacea illinuntur. Vrantur cum floribus folia, ut spodij uicem cinis praestet, in cruda olla, oblito ore luto, usque dum figlinum percoquatur: restinctaque uino, & rursus subacta, eodem modo uruntur: postremo cerusae modo elota coguntur in pastillos. Huiusmodi cinerem in medicamentis oculorum, constat spodio non cedere, sed eisdem uiribus praeditum esse putandum est. Foliorum satiuae olea eadem uis intelligitur, sed aliquantò

*Colymbades  
Oleum*

aliquantò inferior: unde ocularibus medicamentis ob suam mitiorem uim conuenientior est. Sidor ligno uirenti accenso manans, illitu sanat lichenas, furfures, & scabiem. Oleaginum semen illitum medetur furfuribus, & ulceribus, quæ depascunt, uorantque: quod autem intra nucleum est, ex adipe, & farina scabros ungues excutit. Colymbades tritæ, & ambustis illitæ, pustulas gigni prohibent: fordida ulcera purgant. Muræ succus collutas gingiuas contrahit, & motus dentium firmat. Oliua flaua, & recens stomacho utilior est, uentri difficilis: nigra autem, & matura corruptioni opportuna est, stomacho aduersatur, oculis non conuenit, capitis dolorem mouet: arefacta illitu depascentia ulcera sistit, & carbunculos emarginat. Oleum syluestris oliuæ gingiuas puri uligine laborantibus colluitur, dentium mobilitates stabilis: calfacti foris gingiuas fluxione laborantibus utilis est: lanam enim specillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuas ad mouere; donec albæ spectentur.

Δάκρυον αἰθιοπικὸν ἐλαίας. LACRYMA AETHIOPICAE OLEAE.

ΑΥΤΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΟΡΘΟΝ ΚΑΡ. C X I X.

LACRYMA, quam Aethiopica olea stillat, scammonio similis quadantenus est, fulua, stillis exilibus constans, mordax. Quæ autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, superuagua est. Nostrates oleæ, oleastrique similem lacrymam sudant, quæ commodè ad oculorum hebetudines illinitur: cicatrices, albuginesque illitu emendat: urinam, & menses ciet: cauis dentium impressa ad dolores efficax est. Inter uenena scribitur, partus pellit: lepras, & impetigines sanat. Appellatur autem Aethiopica, & agrestis olea.

Αμύργα. AMVRCA. Οὐλῆα ἄμυρκα

CAP. CXX.

AMVRCA expressæ oliuæ recrementum est. Decocta in cupreo uase ad crassitudinem mellis adstringit, cæteros præbens lycij effectus. Insuper dentium dolori, & uulneribus cum aceto, uino, aut mulso commodè illinitur: additur in medicamenta ocularia, & meatus inductu suo obstruentia. Vetustate meliorem fieri constat. Vtiliter infunditur sedis, genitalium, ac vuluæ exulcerationi. Si uerò cum omphacino recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit: iumentorum scabiem cum decocto lupini, & chamæleonte illitu sanat. Cruda, & recenti amurca podagras, articulariosque dolores foueri, utilissimum: peruncta in uillosa pelle, & hydropicis imposita, tumoris molem reprimit.

Oleæ syluestris consideratio.

Oliuarum genera plura.

Oleæ, & quercus odium.

Aethiopice oleæ lacryma.

CVM oliuæ, oleum, oleæ Aethiopice lacryma, & amurca ex una tantum arbore proueniant; non ab re dicimus de his omnibus simul pertractare, & ita singulis partibus unica commentatione, quantum opus erit, satisfacere, & quicquid ad eas spectat, simul perstringere. Nascuntur syluestres oleæ copiosæ in agro nostro Senensi, alijsq; Hetruriae locis: nascuntur & in Dalmatiæ tractu, & in quam plurimis Adriatici insulis. Verum domesticis longe minores, folijs breuioribus, aculeatisq; ramis. Earum baccæ etsi numerosa fecunditate uincant; magnitudine tamen satius cedunt: quin & ori sapidiores existunt. Cuius rei certo sunt testimonio turdi, merulae, ac sturni: quippe quoniam syluestres oliuas libentius deuorant, quam satiuas. Incolæ, qui aucupijs delectantur, agrestes oleas summo studio, ac industria ab auibus tuentur: nempe quod confecta satiuarum uindemia, auiculæ ad has aduolant, ubi mense decembri, & ianuario uisco innumera capiuntur, præsertimq; turdi. Pauci admodum sunt in Hetruria, qui oleastri baccas legant, ut oleum inde expriment: nam ea demum magna satiuarum copia est, quæ facit, ut inibi omnino pendantur syluestres. Oliuarum genera decem in antiquorum notitiam peruenisse reperio, paucissimas uidelicet, digianas, liçinianas, fergias, neuas, culminias, orchites, regias, circites, murteas: etsi Virgilius trium generum tantum meminerit, quemadmodum etiam plura non nouit hac nostra ætate Hetruria, præsertimq; noster Senensis ager.

Primum harum genus eas nostri faciunt, quæ licet à minoribus olearum plantis proferantur: sunt tamen speciosa forma, & magnitudine Bononiensibus non quidem inferiores. His tantum muria asseruatis utuntur in cibis: quandoquidem oleo minus aptæ sunt, quod multo plus amurcæ, quam olei fundant. Proximæ tum colore; tum magnitudine præstantes, quanuis prædictis longè minores sint; sunt tamen omnium aptissimæ ad olei conficiendi usum: quippe quod oleum ex eis expressum, sit non modo flauum, dulce, pellucidum, ac cæteris præstans; sed etiam copiosum. Gignuntur hæc à procerissimis oleis, prægrandibus, iuglandium nucum instar, ramos in altum, latumq; amplissime fundentibus. eas rura nostra Oliuæstrie uulgò uocant. Tertij uerò, ac postremi generis eæ deniq; sunt, quæ passim in uniuersa Italia nascuntur, & omnium uulgarissimæ habentur. Laudatissimæ oleæ Bononiensibus, & nostratibus crassiores muria asseruatae Roman, Venetias, & ad alias complures Italiciæ clarissimas urbes, ubi magnificæ, opiparæq; præstantur mense, ex Hispania importantur. Cæterum oleæ, & quercus tam pertinaci odio inter se disident (si rei agrarie scriptoribus fides est adhibenda) ut altera prope alteram depacta breui tempore pereat. Oleæ item si primo genatiu à capra depascantur, adeo sterilescunt, ut nullo remedio in posterum prolificæ fiant. At si alia de causis eas admodum, uel nullas proferant baccas, nudatas earum radices à circumstante terra hybernis algoribus opponere, certissimè est remedium. Syluestris, seu Aethiopice oleæ lacryma, licet multis polleat uiribus; eius tamen in Italiciis officinis nullus est usus: neq; quod ea ad nos afferatur, adhuc compertum habeo. Sunt, qui hanc putent illud esse gummi, quod medici recentiores, & officine gummi elemi appellant. Verum illud certo argumento est, oleæ Aethiopice lacrymam gummi elemi non esse, quod gustatu mordax non sit, neq; linguam uellicet: tum etiam, quod omnibus perfice-


cum sit, eam lacryman (et si improprie gummi appelletur) non in gummi quidem, sed uerius in resinarum genere esse recipiendam: cum igni exposita statim colliquescat, & diffundatur, quemadmodum & resine, quæ e pinu, picea, & alijs resinam fundentibus plantis colliguntur: licet nobis prorsus ignota sit planta, à qua in oriente defluit. Siquidem eam gummi genus (quod sciuerim) igne colliquescit, nisi addito aceto, uel uino: quin potius statim comburitur. Est & alia oleæ maris rubri lacryma, ex qua (ut Theophrastus inquit lib. II. capite VIII.) medici sistendo sanguini medicamentum componunt. Ceterum quauis ætate nostra obscura admodum sit gummi Elemi origo, eius tamē uires clarissime apud chirurgicos, & uulnerarios medicos reperiuntur: nam in caluariæ fracturis, ac uulneribus mirifice unguentis, & emplastris additur, adeo ut præstantissimum sit in his sanandis medicamentum. De Amurca olei postremo nil aliud dicendum est, nisi quod sit admodum utilis (ut memoriæ prodidit Cato) apothecarum, & officinarum fabricis, ubi lanei, uel sericei panni reconduntur. Nam si calci admisceatur, & ex ea inde parietes incrustentur, oblinanturq; item laquearia, & pavimenta non modo parietes contractos, uel aduentitios humores nunquam col-lacrymant, & situm minime contrahunt; sed nec blatte, nec aranei, nec cuiusuis generis uermiculi ibidem gigni possunt. Oliuæ uires prodidit Galenus libro sexto simplicium medicamentorum, sic inquit. Oliuæ rami quantum habent adstrictionis, tanæ et frigiditatis participes sunt. Fructus uerò, si quidem ad unguem maturuit, moderate calidus est: sin immaturus est, magis tum adstringit, tum refrigerat.



Gumi elemi.

Amurca olei.

Oliuæ uires  
ex Galeno.

QVERCVS  *Quercus*

FAGVS.  *Fagus*



Δρῦς, QVERCVS. Βάλανος, GLANS. Φηγός, FAGVS.  
Ἰλέξ, ILEX. CAP. CXXI.

QVERCVS omnis adstrictoriam uim habet, præsertim liber, qui cortici, & ligno intercédit: quinetiam tunica putamini glandis subiecta. Decoctum ex ijs datur dysentericis, cœliacis, sanguinem excreantibus. Trita in pello fœminis fluxione. Vuluæ laborantibus subijcitur. Glandes eisdem effectus exhibent: urinam ciunt: capitis dolorem, & flarus in cibum sumptæ pariunt: resistunt esitæ uenenatorum ictibus. Decoctum earum, & corticis cum lacte uaccino potum, prodest contra toxica. Intritæ crudæ inflammationes illitu leniunt: ad duritias, quas cœcœthe uocant, & malefica ulcera cum falsa axungia conueniunt. Iligneæ glandes uiribus quercus antecellunt. Fagus, & Ilex quercus generi assignantur, & consimile munus obeunt. Iligneæ radices cortex cum aqua coctus, dum mollitus intabescat, & tota nocte illitus, denigrat capillos; prius cimolia terra purgatos. Folia omnium tusa, & trita tumoribus prosunt, & imbecillas membrorum partes corroborant.

Glandiferarū  
arborum con-  
sicerano.



Quercus quæ  
proferat.

SYNT. Et alie glandiferi generis arbores, præter Quercum, Ilicem, Et Fagum: inter quas numerantur Cerrus, Sabe, Aesculus, Et alie nonnullæ: quæ suo more rura nostra appellant, quarum omnium exacte rationem reddere potest uniuersa: Histuria. Quippe quod Et in maritimis nostris Seneris, Et Faliscorum agro, ac etiam Romano tractu, omnia hæc glandiferarum genera adeo numerosa in uastissimis syluis proueniunt, ut glandibus innumerabiles porcorum greges incolæ ibi quotannis saginent. Verum ne aliquis existimet, harum non meminisse Dioscoridem, quod fortasse eas non cognouerit, sciendum est, eam non quidem iudicio, de quibus nomine comprehedisse in uniuersum omnes glandiferas arbores, non solum quod sciret, una uoce omnia illa genera contineri posse, sed etiam ut breuitati consuleret: deus enim apud Græcos non modo quercum particulatim significat, sed uniuersam quancumque glandiferam arborem. Quo fit, ut dixerit ipse: Δένος πᾶσα συντίκνεται δέναντι, id est: Quercus omnis adstrictoriam uim habet, ac si dixisset, arbor omnis glandifera adstringit. Porro mirum est (ut Theophrastus est autor lib. iii. cap. viii. Et ix. de plant. hist.) quod alia plurima præter fructum ferat quercus. Nam gallam gignit paruulâ, atque alteram resinofam, Et nigram: quin Et aliud specie ueluti morum, sed durum, Et fractu admodum difficile: id tamen rariam. Ad hæc aliud effigiem colis representans. Cum uero perficitur, durum quod parte emicante, Et perforatum, Et tauri caput quodammodo emulans profert, quod præruptum nuclei oleæ speciem intus ostendit. Fert Et quod quidam pilum appellant. Id pilula est eam gerens lanaceam, mollem, nucleo durior, qua in lucernarum luminibus utuntur. Flagrat etenim probe, ut galla nigra. Ferit Et alteram comigeram pilulam, ceterum quidem inutilem, uero

autem tempore succo melligeno inficientem tum tactu, tum gustatu. Inque ramorum alis pilulam aliam gignit sine pediculo, concauamque, sessilem, peculiarem certe, uersicoloremq. Nam eminentes quosdam umbilicos caducantes, uel passim uariantes nigris maculis habet: partem median granum tincturam infectam, splendendamque ostendit, apertâ nigra, Et putricans cernitur. Lapillum quoque puniceum magna ex parte gignit, quanquam raro. Item aliam eo rariorem pilulam est folijs conuolutam, compressam, atque oblongam. Super folijs uero tergo adherentem pilulam fert candidam, aquosam, dum tenera est: hæc etiam interdum muscas intus continet, ueniensque ad incrementum iustum in modum leuissimæ paruulæ galle indurescit. Fungos omitto, qui est radicibus, Et iuxta radices erumpunt: communes enim eos ceteris habet arboribus. Quinetiam uiscum taceo, quippe cum in alijs quoque proueniat. Sed nihilominus (ut dictum est) ferax hæc arbor habetur plurimarum. hæstus Theophrastus. Ceterum non dubitandum est, quoniam omnes in partus suos habeant usus, suisque polleant uiribus. Stillatitia aqua, quæ in balnei calentis aque uitro organo à tendis quercus folijs primo ipsarum exortu decerpitis elicitor, iocineris defluxiones sistit, renum calculos comminuit, Et mulierum alba profluua cohibet. Ad hæc eius echinata pilula sicca, ac trita uim appronè adstrictoriam possidet: eaque propter efficacissimo sunt remedio contra omnes alui fluxiones. In summa præstant, ubi suppressere sit opus.

Fagi confide-  
ratio.

Fagus quoque glandiferis arboribus adnumeratur, tametsi fructus effigies glandibus prorsus reclinat. Hic enim extrema parte calyculo includitur rotundo, quadantenus echinato, hispido, ac scabro: interius uero triangulari formæ nuclei sunt, qui tenui, Et leui cute, castanearum modo, in atrum rubescens obteguntur. Horum sapor dulcis, Et subadstringens. Glires hoc pabulo maxime delectantur, ac pinguescunt. Quamobrem cum eius aduenit maturitas, inter meri capiuntur glires in Carniole, Stirie, Et Carinthie syluis: quippe ijs in locis incolæ mane inspexeris, qui sacos gliribus plenos ferant una tantam nocte captis. Delectantur fagi fructu etiam mures: siquidem è longinquis regionibus natura ducti gregatim syluas ingrediuntur. Item Et scurris gratissimus est cibus, ac etiam turdis, merulis, alijs compluribus uolatilibus. Quin Et obsessos hostibus homines in oppido Chio ea tantam glande uictasse, Corneus Alexander est autor, donec se obsidione liberassent. Fagi folia esitata labiorum, gingiuarumque uitijis mirifice operantur: tusa, illitaque torpentia membra corroborant. Glandis fagine cinis renum calculis utiliter illinitur. Vix insuper arbor est in Italia notissima, spectataque proceritatis, cortice in rufum nigricante. Materies eius densa, ac robusta, in atrum rubescens. Folijs laurinis, ac perpetuis uiret: sed quæ externè canducunt, scabraque internè uero uirescant, læuesque cernantur: quin Et in toto ambitu adeo serrata sunt, ut spinarum speciem præ se ferant. Glandes profert quernis minores, quæ Et in reliquis minus præstant. Iligneus carbo Hetruscis in pretio est, non modò quod ignem diu foueat, sed etiam quod (ut aunt) uapore caput minimè tentet. Hæc præter glandes, pilulas quasdam rubentes gignit, quæ trita cum aceto uulneribus recentibus, et cruentis oculis utiliter imponuntur. Vix Ilicis genere (ut memorie prodidit Theophr. lib. iii. cap. xvi. de plant. hist.) est arbor illa, quæ Arcades similes

Ilicis confide-  
ratio.



aculeis ilici similis ( ea autem non est taxus, quæ etiam smilax dicitur, quoniam de taxo capite x. eiusdem libri differt Theophrastus ) folio tamen non aculeato, sed molliori, profundioriq; differentiisq; pluribus distinguendum : nec materię ut illa, solida, spissaq; sed soluta, molliq; in opere. Meminit huius Galenus libro vi. cap. i. de comp. med. secundum locos in columellæ remedijs, sic inquit. His fortiora sunt myrti, ac baccarum eius decoctum, & ex acerbis cotoneis malis, & uirgultorum tenerorum ilicis, arbuti, smilacis, ac fugi. Super quo loco dubitat Cornarius, quomodo fieri potest, quod smilax ( taxum, uel eius speciem intelligit ) quæ ab omnibus uenenosa describitur, ponatur à Galeno inter gurgulionis remedia. In dubij uero solutione nil aliud determinat, nisi quod, cum non ubique ( sic ipse patet ) taxus sit uenenosa, ex eo genere sumi debeat, quæ letali careat noxa. Sed si Cornarius Theophrastum sibi aliquam familiarem consulisset, qui smilacem quandam ( ut paulò ante ostendimus ) in arborem ilici similem refert, re-

10 cius, meo quidem iudicio, & paucioribus rem hanc explicasset. **SUBER** deniq; arbor est fructu, & folio ilicis, perpetua similiter coma uirens, quanquam id negat Theophrastus, sed crassissimo cortice uestitur, atque ilici magnitudine cedit, ut ij quidē attestari possunt, qui Baccano Roman profecti sunt : eo enim in itinere innumera Suberum plantæ uisuntur. Hec cortice exuta minime arefcit, quemadmodū reliquæ arbores : quandoquidem natura haud ignara, quod sepius cortice expoliata esset, materię duplici cortice munivit. Inter plures, ac uarios corticis suberci usus, qui in rebus domesticis celebrantur, ille præcipuus est, et uulgaris, quod sutoribus maxime sit expetita ad crepidas consiciendas. Quin & globis ex ea factis utuntur piscatores, quod ea nunquam aquis mergatur, sed supernatet sustinendis retibus, plumbis glandibus in altum ductis. Ideoq; Plinius lib. xvi. cap. vii. scriptum sic reliquit. Suberi minima arbor, glans pefuma, raraq; : cortex tantum præcrassus, ac renascens, atq; etiam in denos pedes undiq; explanatus. Vfus eius anchoralibus maxime natiuum, & piscantiumq; tragulis, & cadorum obturamentis : præ-

20 tera in hyberno foeminarum calceatu. quamobrem non infacetē Græci mulieres cortices arborum appellant. Sunt qui Suberem foeminam ilicem uocent, atq; ubi non nascitur illex, pro ea subere utuntur, in carpentarijs præcipue fabricis, ut circa Elin, & Lacedæmonem. Nec in Italia tota nascitur, nec in Gallia omnino. Et eodem libro, cap. xxi. inquit. Eius materies tardissime uetustatem sentit, sicut robur, larix, castanea, iuglans. hæc Plinius. Est

30 & alia arbor glandifera, quam, quod folia ferat suberis, corticem uero, & ligni materiem cerro non absimilem, Hetruria uulgò appellat Cerrosuguro, quasi Cerrisubere dicat. Id quod etiam fecisse uidetur antiquitas : quandoquidem Theophrasto loco superius citato ea Phellodrys dicitur. Suberis cortex tritus ex aqua calida potus sanguinem fluentem ex utralibet parte sistit. Eiusdem cinis ex uino calido sanguinem excreantibus magnopere laudatur. Galeno tam quercus, quam quarundam aliarum glandiferarum arborum medicina commemorantur lib. vi. simplicium medicamentorum. his uerbis. Quercus partes omnes adstringentis qualitatis participes sunt. Sed

40 plus tamen habet, quæ in trunci cortice membrana subest, tum quæ sub glandis ipsius calyculo, ea uidelicet, quæ fructus carnem conuegit. Quamobrem ad profluuium muliebre, & sanguinis exspuitiones, tum dysenterias, & diuturnos uentris fluxus commodam esse credunt. Maxime uero ea utuntur decocta. Valentius tamen adstringunt, sicut, & illex, seu quis eas species esse roboris uelit, seu toto genere diuersas. Quin & folia harum plantarum tenella illa non infrenue desiccare ualent, minus autem quæ sunt alterius roboris, nimirum quanto minus fortita sunt adstrictionis. Siquidem ego quandoq; glutinasse me uulnus memini falce inflatum, cum nullum adesset ad manum medicamen præter ipsius quercus folia : triui ea in leui petra, & uulnus, omnemq; uicinum locum contexi. Eandem uim folijs habet & fructus roboris, eoq; medici nonnulli ad incipientes, & crescentes utuntur phlegmonas. nam quæ iam uehementes sunt, adstringentia respuunt. Sed talia ad curandi potius rationem, quam præsentem tractatum attinent. Cæterum in præsentia nouisse, quod eatenus adstringentem, quatenus dictum est, facultatem quercus obtineat, sufficit : ac proinde desiccandi, atq; adstringendi : ex calsaciendi autem paulò infra media, in genere scilicet eorum, quæ ( ut sic dicam ) tepida sunt.

Suberis: consideratio.

Phellodrys.

Glandiferarum arborum uires ex Galeno.

## ΚΑΣΤΑΝΕΑΕ. CASTANEAE. CAP. CXXII.

**SARDIANAE** glandes, quas aliqui Castaneas, aut lopima, aut glandes Iouis appellant, adstringunt & ipsæ, similesque effectus præbent: præsertim tunica, quæ carnem, & corticem media intercurfat. Caro his, qui ephemerum biberunt, conueniens est.

10 **CASTANEAE** nuces sunt in tota Italia uulgò notissimæ : item & earum arbores haud quaquam incognitæ. Castanearum consideratio. Antiqui castanearum complura fecerunt genera, nominibus plerunque inditis à locis, unde importabantur. Sed duo tantum in Hetruria habentur genera, satium scilicet, & soluestre. Mitiores faciliè purgantur, hærumq; illæ principum locum tenent, quas uulgus Marroni appellat : quippe quod cæteris sint maiores, sapidiore, speciosioresq;. In montanis, ubi quotannis aliarum frugum annonæ deficit, incolæ castaneis per hyemem uictitant. Namq; eas in cratibus fumo prius exicatas ab utroq; cortice repurgant, moluntq; in farinam, ac deinde coquant in panem. Materies arboris edificijs, atq; alijs domesticis utensilibus admodum apta est : siquidem non modò ex ea fiunt trabes, tigna, asseres, & pedamenta; sed & cadorum costæ, & eorum cinctus : uerum ignarijs inepta. Montibus, & opacis gaudet magis, quam campestribus, & apricis. Castaneæ uehementer sistunt tum alui, tum uentriculi fluxiones, idq; maxime

20 fice : quin & sanguinem excreantibus profunt. Tritæ cum sale, melleq; subactæ rabidorum canum morfibz utiliter imponuntur : & cum bordeacea polenta, & aceto illitæ mammarum duritias discutunt. Venerem excitant, eo quod

30 flatum

Castanearum uires.

## CASTANEA.

Castanearum  
uirces ex Gal.

GALLA.

Gallarum cō-  
sideratio.Cornarii opi-  
nio reproba-  
ta.

flatum gignant. Largius in cibis sumptæ capiti dolorem inferre, inflant, alium adstringunt, ac agrè concoquuntur. Attamen quæ cineribus obrutæ torrentur, uulnerato prius in latere cortice, crudis, et elixis innocentiores redduntur, præsertim si cum pipere, et sale, uel saccharo edantur. De castaneis differens Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus, sic inquit. Castaneæ omnium glandium sunt præstantissima. Sunt qui hos fructus λοττοῖς ἰμοῦς appellant: hi namque et soli inter fructus agrestes alimentum memorabile corpori præbent. hætenus Galenus. Illud porro in his uerbis animaduertendum, quod Castaneæ, quæ uis eas Galenus plurimum nutrire prodiderit; non tamen in cibis commendantur, si comedantur frequenter. Namque, ut idem auctor est libro de tenui uictus ratione, sint illæ in aqua coctæ, sint tostæ, sint etiam fixæ, semper esitantibus noxam inferunt, multoque magis, si crudæ edantur. Quod etiam libro de cibis boni et mali succi memorie mandauit.

## KARIS. GALLA. CAP. CXXIII.

Ballayoff.

GALLA. fructus est quercus. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidē, sed et articulorum manus modo rugosa, solida, nullo foramine peruia. Altera plana, leuis, perforata. Eligi debet omphacitis, quæ efficacior est. Vtriusque uis uehementer adstringere, tritæ excrementia in carne, fluxiones gingiuarum et uulvæ, atque oris ulcerationem cohibent. Nucleus dentium cauernis inditus, dolorem sedat. Crematæ carbonibus, donec igne flagrent, et uino, aut aceto, aut acidamuria extinctæ, sanguinem supprimunt. Decoctum quibus insidere expedit, efficax est, et contra vulvas præcidentes, fluxionesque. Capillos denigrant, aceto, aut aqua maceratæ: dysentericis, cœliaciisque cum uino, aut aqua tritæ conuenienter illinuntur, aut bibuntur; obsonijs addi debent, aut integræ in aqua præcoqui, in qua nonnihil excoquendum est, quod his affectibus conferat. In summa his utendum ad adstringenda, aut sistenda, aut siccanda, quæ opus sunt.

GALLÆ uulgò notissima sunt, easque ferunt arbores omnes (ut Plinius auctor est) quæ et glandem. Nascuntur sole de geminis exeunte: et si aestu nimio excipiuntur, arescunt protinus, nec amplius adolescunt. Quercus in Italia præter glandes duo Gallarum genera ferunt. Minores quæ rugosa cute spectantur, fullonibus; et coriarijs expetite, quæ Grecis omphacitides dicuntur. Maiores uerò, quæ leuioribus habentur. Ceterum neque in hoc Cornario mihi uidetur adstipulandum, quod suis in Galenorum commentarijs tam primo, quam sexto libro de compositione medicamentorum secundum locos, acriter contendit, nil aliud omphacitidem gallam esse Dioscoridi, et Galeno; quam catyccem illum, quo glandes in arboribus continentur. Hoc tantum argumento ductus, quod Paulus capite de dysenteria in quodā clysteri scribat: ὀμφακιδος κενανμῆνης. ἐστὶ δὲ τὸ νοῖλον, ἢ οὐ ἐκπέφυκεν ἐκ τοῦ δρυὸς βάλανος, ὡς περ οἱ εὐροῖς χροῖται. Id est: omphacidis uste. est autem cauū illud, ex quo glans quercina enascitur, quo coriarij utuntur. Vbi ipse non omphacidos, sed omphacitidos putat legendum, uulgatam lectionem immutans. Ex qua postea non aliud omphacitidem gallam (ut diximus) esse existimat, quam cauū illud, in quo glandes inseruntur, quod recentiores cupulam uocant. statuitque nunquam a sua opinione recedere, nisi quis planè corruptum apud Paulum locum docuerit.

doctus, aut οὐρανὸς ab eo substantiue pro eo, quod calycem Plinius dixit, et uulgò cupula glandis uocatur, etiam ostendat. Sed equidem non possum non admirari, quod is, quem alioquin suorum scriptorum testimonio, acutissimi ingenij, sanissimi iudicij utrum semper existimaui, in re tam, meo iudicio, clara, tam facile aberrauerit. Nam si Paulus non putasset, quod οὐρανὸς Græcum uocabulū ob sui raritatem permultis fuisset obscurum, quænam illud et Cornario fuisse uidetur, ei certè non fuisset opus per circumlocutionem illud declarare, ut fecit, cum inquit. Est autem οὐρανὸς cauium illud, ex quo glans querna enascitur, quo coriarij utuntur. Quod præterea Paulus pro omphacitide galla glandium calycem non acceperit, illud manifesto argumento esse potest, quod ipse libro septimo de gallis, non autem de glandibus differat, duoq; gallarum genera constituat, quarum alteram omphacitidem appellat; alteram uerò magnam, flauo colore, uiribusq; inferiorem esse scribit. Quod etiam antea Dioscorides, et Galenus fecere. qui omphacitidem gallam glandium calycem esse nusquam, quod sciam, tradidere: quod non ignorauerunt (ut Cornarius ignorasse uidetur) et genere, et specie à gallis differre glandes. Adde, quod Galenus, Dioscorides, et Paulus nusquam, quod equidem legerim, nisi sunt hoc uocabulo οὐρανὸς pro galla, nisi adiectiue, et cum suo substantiuo οὐρανὸς. Quare concludendo putauerim, in Paulo legendum esse, οὐρανὸς, non οὐρανὸς, ut contendit Cornarius: quin etiam crediderim Græcis glandium calycem οὐρανὸς propriè appellari. Tamen si Cornarius, et Andernacus, qui in Paulo uocem illam acerbam uiam interpretatur, Græcæ linguæ peritissimi, hæc non cognouisse, neque animaduertisse deprehendantur. Illud peculiare sibi maiores gallæ uendicare, ut quotannis aut æmone fertilitatem, aut sterilitatem, aut pestilentem auram prænunciant: nam si rumpantur integræ, et quæ perforate non sunt, aut muscam, aut araneum, aut uermiculum exponunt. Si musca uolat, futuri belli; si repit uermiculus, æmone penuriz; si currit araneus, pestilentium morborum præsagium est. Neque cuiquam mirum uideatur, quod ex omnibus gallis ista exoriantur animalcula: etenim ego huius rei sæpius periculum feci, nullamq; unquam sum consecutus, prius non perforatam, quæ ex tribus animalibus unum intra se non contineret: nam foramine conspecto facillè indicium summi potest, iam animal exiisse. Dicamus igitur licet, quercum et fructum, et animal gignere. Cuius rei haud ignari ueteres illi patres, non sine causa quercum dixerunt Ioui summo esse dicatam. Gallarum uires memorie prodidit Galenus lib. vii. simpl. medicamentorum, sic inquit. Galla, quæ omphacitis nuncupatur, admodum acerbum est medicamen, pleraq; sui parte essentiz terræ, et frigida: perquam desiccatur, et repercutit fluxiones: ad hæc constringit, contrahitq; partes laxas, ac languidas: omnibusq; fluxionum affectibus strenuè resistit. Esto uerò tertij in desiccando, secundi autem in refrigerando ordinis. Altera autem galla, flaua illa, et magna, laxior, et ipsa desiccatur quidem, sed tantò minus, quanto minus acerbæ qualitatis est particeps. Cocta itaq; ipsa per se, ac deinde trita, cataplasma est non infrenuum sedis phlegmonarum, ac procidentiarum. Porro coquenda est, si morbus opus sit adstrictione, in aqua: sin uehementiore, in uino. Ac si augere insuper adstrictionem sit opus, uino utare posteriore. Hanc rustici nostrates οἰνον ἰδα, quasi uini gallam dicas, nominant. Deniq; gallæ combustæ sanguinis reprimendi facultatem acquirunt, ac nimirum etiam calorem, et acrimoniam ex ustione assumunt: suntq; ijs, quæ ignem expertæ non fuerint, tum subtiliorum partium, tum maiore desiccandi potestate. Ceterum cum ad sanguinis suppressionem præparare eas uoles, carbonibus impositas, dum inde quaque candeant, aceto, aut uino extinguere oportebit.

Hoc loco Græci codices habent νοδὺλῶδης. Qua uoce constat, iudicio meo, Dioscoridem gallæ omphacitidis figuram designasse, cum prius magnitudinem expressisset. Attamen ex interpretibus Marcellus manifestè eam etiam ad magnitudinem retulit. Ruellius autem, cum eam tuberosam interpretetur, ipse quoq; magnitudinem innuisse uidetur. Quocirca nobis satius uisum est, omphacitim rugosæ parti articulorum in digitis, cum extenduntur, similem reddere: quod non folium id innuat Græcum uocabulum; sed multò etiam magis omphacitides ipsæ apertissime demonstrent.

Gallarū præsagium.

Gallarū uires ex Galeno.

Ρῶς. R H V S. *Sumach*


C A P. C X X I I I

R H V S, quæ obsonijs aspergitur, ab aliquibus erythros appellata, semen est coriarij fruticis, sic uocati, quoniam coriorum infectores eo utuntur ad inspissandas pelles. Arbuscula est in petris nascens binum ferè cubitorum altitudine: folijs oblongis, subrubentibus, in ambitu ferratis filicis modo: acino uuarum gracilium, denso, magnitudine terebinthi, quadantenus lato: cuius corticosa tunica perquam utilis est. Folia uim habent adstringendi, & acaciæ effectus præbent. Decoctum capillos denigrat: dysentericis infunditur, & in potus eorum, in seffusq; adijcitur: instillatur auribus purulentis. gangrænas, & pterygia cohibent folia ex aceto, aut melle illita.

Liquamentum fit ex aridis folijs, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem, ut lycium, conueniens. Semen eosdem effectus exhibet: celiacorum, dysentericorumq; obsonijs inspergitur: fracta, desquamata, liuidaq; illitum ex aqua, ab inflammatione vindicat: linguæ asperitatis cum melle abstergit: candida fœminarum profluvia sistit: hemorrhoidas sanat, cum querno carbone intrito admotum. Aqua, in qua semen maduit, decocta cogitur, coitq; efficacior quodammodo ipso semine. Gummi desert, quod dentium cauis imprimitur, ad dolores finiendos.

R H V S Græcorum, cui (ut scribit Plinius lib. xxiii. cap. xi.) Latinis non est inditum nomen, Sumach officinis uulgò uocatur, uocabulo nimirum à Mauritanis accepto, ut in alijs quàm plurimis ab illis fieri solet. Hæc in condimentis pro sale utebantur antiqui: idcirco Dioscoridi in ipsius capitis fronte, Rhus dicitur, quæ obsonijs aspergitur. Cuius usus, ut audio, et apud Syros, et apud Aegyptios in hunc usque diem perdurat, ubi rhus prouenit.

R H V S.



Monachorum  
error.

Petri Criniti  
lapsus.

Viburnum.

Rhois vires  
ex Galeno.

nit præstantior. Nascitur et in Italia Apennino monte pluri-  
bus in locis, ijs omnibus planè notis, quæ illi à Dioscoride tri-  
buntur. Huius aridis folijs hircorū, caprarumq; pelles ille stiffi-  
santur, crispantur, concinnanturq; quas uulgò Somachi noma-  
pant. Ceterum illud non uidetur prætereundū, quòd etsi Galenus  
alibi, tum præcipue lib. VI. de comp. med. secundum locos, plura  
Rhois nomina, et genera explicasse uideatur, ut qui id modo  
Syriacum appellet, modo Ponticū, modo obsoniorum, modo co-  
riarium, modo rubrum; non tamen propterea censendum est,  
Rhois arbores inter se genere, uel specie differre. Quandoquid-  
dem nobis constat, unum tantum genus Dioscoridi hoc loco de-  
scriptum esse, quemadmodum et Galeno lib. VII. simpl. med.  
Atqui hac in re scire conuenit, quòd Rhus obsoniorum nil aliud  
est, quàm semen: coriariarum uerò nil aliud, quàm folia, et fra-  
ctis ramusculi. Nostræ enim sententiæ subscribit Dioscorides,  
qui scriptū reliquit. Rhus semen est exigue plantæ, quæ coria-  
rij ad inspissandas pelles utuntur. Quod etiam Galen. confirmat  
loco citato. Rhus uerò rubens nil aliud esse comperitur, quoniam  
eius semen immaturū, cui maior adstringendi uis inest, quàm ma-  
turo, cuius acini quadantenus nigricant. Syriaca præterea,  
atque Pontica rhus, etsi in alijs nascatur regionibus, à quibus  
nomen inuenit; nihil tamen genere distat ab Italica, atque  
Iberica, nisi illa magis, hæc uerò minus uiribus præstet. Idcirco  
que Monachos illos, qui in Mesuem commentarios elidere, longe  
hallucinari crediderim: nempe qui sibi persuerint, Rhoem  
Ponticam alterius esse generis ab ea, cuius extitit usus apud an-  
tiquos in obsonijs. Quæ in re et Plinius deceptus esse uide-  
tur, cum de coriario particulariter scripserit, ipsūque dicit  
seri ab eo, quo in ciborum condimentis antiquitus utebantur.

Quem fortasse secutus Fuchsius, duo esse Rhois genera censet.

suo de comp. medic. aliud culinis, aliud uerò excoriarijs expetitur. Et quauis Theophrasto lib. III. cap. XVIII.  
Rhus duplex reddatur, mas scilicet, et foemina, quòd alia sterilis, alia fructifera sit: non tamen ob hoc posteritatis  
memoriæ prodidit, quòd altera cibus, altera corijs nasceretur, sed ambas ad coria inficienda destinauit: quòd coria-  
rij folia, et ramusculos tantum accipiant, non autem semen. Rhoem, quæ in Cornelio Celso ros Syriacus depræ-  
uatè legitur, Mannam, quæ ex Syria nobis aduehitur, esse putauit Petrus Crinitus Florentinus capite septimo li-  
bri ultimi de honesta disciplina, falsus uocum similitudine, quòd ros, quæ dictio rhos Græcè legenda est in Celso,  
aëris rorem significare crediderit: etenim manna ros quidam est. Veruntamen eius sententiam acriter explodit  
Manardus Ferrariensis libro epistolarum suarum primo. Theodorus in Theophrasto, Rhois uocabulum fluidam  
interpretatur, quod nomen Græci etymum secutus sibi Latine finxit: quippe (ut Plinius est autor) rhus Latine  
nomen non habet. Id quod mihi errandi præbuit ansam, cum iamdudum pro certo existimauerim, fluidam Theophras-  
to eam arbusculam esse, quæ uulgò Lantana uocatur, e cuius radicibus uiscum quidam conficiunt. Verum cum ac-  
curatius Græcum Theophrasti codicem perlegissem, Theodoriq; nouum uocabulum non sine bile examinasse, erro-  
ris mei causam facile deprehendi. Quo factum est; ut iam fateri libeat, fluidam Theodori nil aliud Theophrasto de-  
signare, quàm Rhoem, et ob id Lantanam sic à uulgaribus uocatam, ut prius credideram, non esse. Quæ tamē  
mea fert opinio) potius VIBURNUM imitatur, quòd maxime lenta, obsequiosa, flexuq; inuicta sit. Tale enim esse  
uiburnum Virgilius in Bucolicis cecinit hoc carmine.


Quantum lenta solent inter uiburna cupressi.

Exit hæc ramulis digitali crassitudine, bicubitalibus; folijs ulmetis, incanis, et pilosioribus, quæ paribus internodijs  
aduersis pediculis coniugatim adhaerent, per ambitum tenuissimè serrata. Florem edit album, umbellæ modo cohe-  
rentem: à quo acini prodeunt lentium modo pressi, qui primo statim exortu uirides, deinde rubri, demum uerò nigri  
spectantur: radice per summa cespitem uagante. Hanc Ruellius Rhoem existimat, cum tamen alia Dioscoridi, et  
Galeno rhus sit planta, Hetruscis notissima, quòd plurima oriatur eo Apennini tractu, qui Hetruriam respicit. De  
Rhoë hæc, quæ sequuntur, nobis scripta reliquit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit.  
Rhus fruticosa planta adstringit, desiccatur. Nam et coriarij ad desiccandum, et adstringendum pelles planta utun-  
tur: ac proinde Bvgodē, hoc est, excoriaria appellata est. Porro medicis in usu sunt in primis fructus eius,  
et succus multum austeræ qualitatis. Consentaneus est usus particularis ipsi gustus sensui. Fuerit itaq; et hoc  
medicamen ex tertio ordine exiccantium, ex secundo uerò refrigerantium.

† In uulgatis Græcis codicibus hic legitur πρηνάδως, hoc est, illic modo. Hæc dictio qua ratione ab interpreti-  
bus Ruellio, et Marcello omiſsa fuerit, certè nescio. Sed mihi quidem uisa est non omittenda, quòd non modo eam quo-  
que Oribasius legat, sed quòd etiam Rhus folijs pulchrè illicem emuletur.

ϕοινξ.

φοίνις. PALMA. *Attalbanus* CAP. CXXV.



PALMA in Aegypto gignitur. Ea medio maturitatis uigore, autumnino decerpi solet, Arabici myrobalani similis, pomatis cognomine, colore uiridi, & odore mali cotonei: quod si ad maturitatem peruenire sinatur, phœnicobalanus fiet. Palma acerba est, & adstringens: contra alui, fœminarumque profluvia, in uino austero bibitur: hæmorrhoidas sistit: uulnera glutinat illitu. Phœnicobalani recentes plus siccis adstringunt: capitis dolorem afferunt: copiosiores in cibo inebriant. Sicciores sanguinem excreantibus, stomachicis, & dysentericis utiles in cibo: illinuntur cum cotoneo, & cerato œnanthino uesicæ uitijs. Caryotæ, præsertim esu, faucium asperitati medentur. Thebaicarum decoctum potu æstuationem sedat: uires recreat cum hydromelite ueteri sumptu: cibo idem faciunt. Fit ex eis uinum ad eadem conueniens, Decoctum per se potu, & gargarizatione magnopere adstringit, & cohibet. Nuclei palmarum, cæterorum more, cremati in crudo fictili, & uino restincti, cinere loto, spodij uicem efficiunt, miscenturque in calliblephara. quod si non iustam uestionem acceperint, denuo cremandi. Vim adstringendi habent, & spiracula cutis obductu suo claudunt: contra oculorum uuam, & pustulas, palpebrarum defluuia, cum nardo effectum præbent: corporis excrementia cum uino reprimunt: ulcera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas utiles ex palmis humilibus Aegyptiæ.

φοίνις ἐλάτη. PALMA ELATE. CAP. CXXVI.

PALMA, quam aliqui elaten, aut spathan appellant, fructus palmarum adhuc florentium inuolucrum est, calyxque: quo in spissamenta unguentarij utuntur. Optima habetur odorata, adstringens, ponderosa, præclusa, intus pinguis. Vis ei adstrictoria: sistit ulcera, quæ depascunt: laxatos artus committit: trita miscetur cataplasmatibus, & malagmatis: prodest præcordijs, imbecilli stomacho, & iocineri affecto, mista conferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde detersum, capillos denigrat: datur bibendum congruè renum, uesicæ, & uiscerum uitijs: vuluæ, ac uentris fluxiones sistit: scabiem cum resina, & cera sanat, si uiginti diebus recens apponatur. Inuolutusque in ea elate fructus, quem suo amplexu fouet, elate etiam uocari solet, & ab aliquibus borassus. Adstringit, & spathæ effectus præstat, non sic unguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta, eadem facit, quæ borassus.

TAMETSÍ in compluribus Italiæ ciuitatibus, nempe in hortis, uiridarijs, & monachorum claustris dictis, reperiantur Palmæ insigni magnitudine, ac speciosa proceritate; cum tamen climatis nostri temperies earum naturis inclementior sit, fructum nobis non proferunt, sed steriles consenscunt. In Hispania tamen maritimis quibusdam locis fructu edunt, uerum inuitem, et qui nunquam matureseat. Quæ in Creta proueniunt, fructum sanè percoquant, sed magis admodum Cypriæ. Principem locum tenent, & palmulas omnium præstantissimas ferunt, quæ in Iudea proueniunt, & inter has maximè (ut inquit Galenus) quæ in Hiericunte nascuntur. Venetias palmarum fructus, qui nonnullis palmulæ, aliquibus caryotæ, quibusdam uerò dactyli dicuntur, ex Syria, & Alexandria Aegypti educhantur, ac etiam ex Neapoli illuc prius ex Numidia importati. Ex recentibus ab arbore statim decerptis, quibus Italia caret, uinū fieri auctor est Plin. lib. XIII. cap. XVI. quo Parthi, & Indi utuntur, ac ceteri, qui orientalem plagam incolunt. Et ut idem refert libro XIII. capite quarto, Palmæ scemina fructum non proferunt, nisi prope mare conferantur: quo exciso, aut exiccato, uiduæ postea sterilescunt. Nec tamen ob id putandum, quod mares fructum non ferant. Quandoquidem scribit Theophrastus libro secundo, capite VII. de historia plantarum, quod ex fructiferis (plures enim sunt, quæ fructum non ferunt) tam mares, quam scemina fructus edunt. Quorum plures sunt differentie, quoniam alij sine osse, alij duro osse, alij molli proueniunt. Colore quoque inter se discrepant: alij enim candidi, alij nigri, alij flauī: ad summum non pauciores, quam ficorum colores, neque absolute pauciora genera statuant. Ad hæc differre magnitudine, figurâque uolunt: quosdam enim rotundos esse in modum malorum: magnitudi-

Palmæ consideratio.



neq; tantos, ut quatuor tantum in spicam teneantur, alios minutos cicerum magnitudine. Saporibus item plurimum differre inquit, sed optimum tam inter nigros, quam inter candidos, genus, quod regium uocant, cum magnitudine, tum uirtute, sed raram id esse. Quædam non fructu modo, uerum et arbore ipsa, longitudine, formaq; reliqua constant: non enim magnæ, excelsæq; sed breues fecundiores, quam ceteræ, trimæ protinus fructificantes. Tales etiam in Cypro, in Syria quoq; Aegyptoq; palmæ proueniunt, quæ quadrimæ, aut ut plurimum quinquennes fructiferae, hominis altitudine assurgentes. Genus aliud est in Cypro, quod et folium amplius habet, et fructum multo amplexiorem, discriminemq; peculiari discretum, magnitudine mali punici, figura oblongum: non tamen sapidum, tanquam ceteræ; sed radicibus similem, ut non deuoretur, sed succo tantum expresso expuatur. hæc Theophrastus.

Musæ plantæ  
historia.

Sunt præterea, qui palmarum generi adscribant plantam in Aegypto, Cyproq; nascentem, quam Veneti inde redeuntes *MVSAM* appellant, et Musas similiter fructus. Adolescit hæc (ut referunt) ad quinonem, senionie cubitorum proceritatem estolonibus alterius sata: folio est arundineo, quod tamen perquam longo, latoq; ambitu se diffundit, adeo ut in longum trium cubitorum mensuram quandoq; excedat; in latum uero sesquicubitem spatietur, lata, crassaq; per medium excurrente costa. Torrescunt folia æstate sui natura, uel etiam fortasse solis ardore, adeo in mense septembri eorum costæ prorsus nude cernantur, decidente foliorum materia, quod admodum sit tenuis. Caudicis squaroso foliorum cortice uestitur, palmæ, uel arundinis modo. Ramos habet nullos, sed caudice tantum consistit. E uertice germen emergit materie molli, longitudine ferè cubitali, à quo alia ab origine, ad summum produnt germina ternum, quaternumq; digitorum inuicem distantia: è quibus circumminent fructus, parui cucumeris magnitudine, qui per maturitatem quadantenus flauescunt, cortice sici, qui eodem modo digitis detrahitur. Substantia pulpæ consistit melopeponum modo, nullo intus osse, neq; semine. Primum gustantibus fructus insipiditatem quandam præ se ferre uidentur, adeo ut primo statim gustu non placeant, uerum qui esui assuescunt, ijs indies magis delectantur: quippe qui quadam occulta saporis suauitate affecti, quæ nisi tractu temporis cum palato iniit gratiam, nunquam saturi uideantur. Ita Musam mihi describere qui ex Aegypto, et Cypro ad nos reuertuntur. Sed quænam antiquis Musa fuerit planta, quid referam non habeo. Inclinat tanè animus eam esse, quæ Theophrasto in palmarum genere recensetur, quam idem in Cypro nasci tradidit, folio cæteris ampliore, et fructu longè maiore, magnitudine mali punici, et figura oblongo. Palmas plurimas gignunt maritima nostra in uallis Alinæ campestribus, sed pumilas, et quæ cubitalem mensuram nunquam excedant. Paulò his maiores et illæ habentur, quæ ex Sicilia Neapolim inuehuntur, quas uulgò, uocabulo ab Arabicis accepto, Cefaglioni appellant, de quibus supra in Bdellij commentario abunde diximus. Palmæ genus India profert (ut Iosephi Indi nauigationes perhibent) è cuius truncis, excisis consultò ramis mense augusto, distillat liquor, quem incolæ uasis excipiunt, ebibuntq; suauius uini uice: ueruntamen nisi excoquatur, post triduum in acetum acerrimum desciscit. Eaq; propter illum decoquunt, ut nos defrutum, fitq; hoc modo, uelut mel suauissimum, quod postmodum ex aqua resoluunt, et diebus uiginti artificio quadam percolant, donec optimè sit desecatum, atq; pellucidum: quo artificio incundissimus redditur potus, diuq; præternat. Porro Palmulæ, quas Dioscorides Thebaicas uocat, quantum ex pluribus autoribus comperi, adeo tractu temporis insolatae siccescunt, ut molitæ cogantur in panem. Est et aliud ab his palmularum genus, quod officinæ Mauritanos secutæ TAMARINDOS appellant, Græci uerò à saporis acrimonia oxyphœnica: siquidem Mauritanij per Tamar dactylos significant: quare Tamarindorum uocabulo idem intelligunt, quod nostri palmulas Indicas. Indici igitur dactyli producuntur (ut inquit Serapio) à quibusdam plantis, quæ folijs longis, acuminatisq; salignis similibus uidentur: licet à nonnullis existimentur Tamarindi fructus agrestium palmarum. Sed equidem malim ad stipulam Serapioni, quam illis; præsertim cum non constet è ueteribus, qui de Tamarindis quicquam memorie prodiderunt. Ex ijs, qui ad nos importantur, nulli, uel pauci admodum integri reperiuntur. Nam plerumq; contriti, et in massam quandam compacti deferuntur, quam si disieceris, flauos nucleos inuenies, uarias formas referentes. Præstant, qui in obscuro rubescunt, molles, recentesq; et qui nervosis quibusdam uillis sarcti inueniuntur. Adulterantur ab impostoribus prunis, sed deprehenditur fraus tum colore, tum etiam gustu: quippe nec admodum sunt acidi, nec tam saturato colore nigricant. Refrigerant, ac desiccant (ut scribit Mesues) ordine secundo, taneis Auerro tertio adscribantur. Alium cient, quapropter poti bilem faciliè soluunt: item et præassatos humores leniunt, et insaniam, et furorem mulcent. Dantur obstructis, aqua intercute affectis, arquatis, et lienosis utiliter. Faciunt et ad scabiem, lepras, uirilignes, et lichenas: quin et contra omnes cutaneas exulcerationes, quæ à sanguine præassato emersere. Officiunt tamen frigidum uentericulum habentibus: sed noxa tollitur, admixtis maci, mastiche, cassia, aut Indica nardo. Aegrè munus obeunt suum, sed roborantur, si admixto caprino sero, aut fumarie, aut lupi salictarij succo bibantur. In summa palmarum uaria, ac diuersa sunt genera. Quare curiosum remittimus ad Theophrastum loco superius citato, et ad Plinium libro xiii. cap. iiii. ubi de his latissimè scripsit. Ceterum quid in palma illud sit, quod aliqui elaten, aliqui spathan uocant, manifestè declarat Dioscorides, cum inquit. Palma, quam aliqui elaten, aliqui spathan appellant, fructus palmarum adhuc florentium inuolucrum est. Cui ad stipulam Theophrastus loco iam citato, ubi ita scribit. Fructiferarum alie masculæ, alie femine. Interest autem, quod mas primum super spatham floret: femina fructum oblongum illico præstat. Sed elatæ, siue spathæ Galeno duo uidentur esse genera lib. vii. simplicium medicamentorum, alterum quod tenerum sit palmæ germen, alterum quod eius sit tegumentum. Veritas hæc in re maximè cecutisse Plinium illud apertissimè ostendit, quod ipse libro xiii. cap. ultimo scriptum reliquit, sic inquit. Est præterea arbor ad eadem unguenta pertinens, quam alij elaten uocant, quod nos abietem, alij palmam, alij spathen. Quibus palam est, Plinium palmæ adhuc florentis fructus inuolucrum cum abiete arbore confudisse, uocabulorum propinquitate deceptum: Græcis enim ἐλάτη Latinis abietem significat. Quinetiam eundem puerisse elaten

Tamarindorum  
confideratio.

Tamarindorum  
uires.

Palma elate.

Plinij, & Lo-  
nicerij lapsus.

elaten palmam arborem esse, ciam tamen uel germen palmæ tantum, uel florum sit inuolucrum. Nec minus inter recentiores hallucinari deprehenditur Adamus Lonicerus Germanus, qui spatham in palma nil aliud esse censet, quam filix, quod ensiformis uideantur. De Palmarum uiribus pertractans Galenus lib. viii. simp. medicam. ita scripsit: reliquit. Phoenix arbor adstringentis facultatis omnibus sui partibus est particeps. Igitur ramorum succus asperus est, ex aquea substantia tepida, & terrea frigida constans. Similis naturæ est encephalos, quem uocant, hoc est cerebrum, siue medulla, esui aptus. At fructus eius, & maxime dulcis, non paucam obtinet caliditatem. Ceterum cum elato sit, multo est usui, non tamen foris impositus, ubi quid roborare, & desiccare, contrahere, stipare, densareque consilium est; sed & tanquam cibus sumptus & simul cum alijs, & per se. Porro quod elaten uocant, nempe tenerum illud palmæ germen, eandem cum cerebro eius facultatem possidet. Quod uero uelut tegumentum eius est, adstringentem & ipsum qualitatem habet: uerum plus quam dicta omnia exiccat, utpote quod & essentia consistentia sic hiccus est, & minime particeps est humiditatis. Itaque iure utuntur illo ad ulcerum putrescentia, miscentque medicamentis articulos plus iusto laxatos contrahentibus: ad hæc facultatibus hepaticis, & stomachicis, seu intro sumantur, seu foris admoveantur. Sed & radix plantæ desiccatoris citra morsum facultatis est, adiunctum habens & ipsa adstrictionis quippiam. Et de Palmarum fructu differens libro secundo de alimentorum facultatibus, sic inquit. Est autem non parua in Palmulis differentia: alie namque siccae sunt, & adstringentes, ut Aegyptiæ: alie molles, & humide, & dulces, ut quæ caryotæ appellantur. Hæ autem præstantissime in Syria Palestina nascuntur in Hieridunte: reliquæ omnes palmule inter dicta duo genera mediæ censentur. Verum concoctu difficiles sunt, capitiq; dolorem inferunt: quarum alie quidem magis, alie minus sunt humide ac dulces, siccae atque adstringentes. Sed constitutis extremis, iam omne quod in medio est, facillime deprehendes. Nulla ergo ex ipsis est, quæ non dulcedine quamdam, & adstrictionem habeat. Siquidem caryotæ leuiusculè adstringunt, & Thebaicis obscura quedam inest dulcedo. At succum quidem dulcem nutrire, austerum autem gratum esse stomacho, & aluum sistere ostendimus. Omnes autem palmule, si largius sumantur, concoctu sunt difficiles; & capiti dolorem adferunt. Quedam etiam morsus cuiusdam sensum ori uentriculi, quod medici stomachum uocant, inducunt. Succus autem ex his in corpus distributus, et assus quidem omnino est, cum quodam etiam lentore, ubi pingues fuerint palmule, ut caryotæ. Cum autem huic succo dulcedo etiam mista fuerit, celerrimè quidem hepar ab eo obstruitur: leditur autem maxime ab ipsorum esu, quod & inflammetur, & scirrhus obideatur. Post hepar autem & lien obstruitur, ac leditur. At multo sanè maxime uirides palmule ad omnia sunt noxiæ, si paulò largius sumantur. Perspicuum porro est, dulces quidem calidiore; adstringentes uero frigidiore succo præditas esse. Virides præterea palmule inflationes pariunt, ueluti & ficus: eadem namque palmularum uiridium ad alias est proportio, quæ ficuum ad caricas. Ceterum in regionibus non admodum calidis, palmule non perfecte maturescunt, adeo ut reponi queant. Quo fit, ut homines ipsis uiridibus uesci coacti, crudis succis impleantur, rigoribusque, qui agrè calefiant, & hepatis obstructionibus prehendantur.

Palmarum uires ex Galen.

Palmularum facultas ex eodem.

ΠΟΙΩ. ΜΑΛΥΜ ΠΥΝΙΚΥΜ.  
CAP. CXXVII.

ΜΑΛΥΜ ΠΥΝΙΚΥΜ ὅμνε boni succi est, stomacho utile, perexiguū sufficiens alimentum. Dulcia stomacho utiliora habentur, sed aliquantulum in eo calorem gignunt, inflationes pariunt, unde in febris abdicantur. Acida adstringunt, æstuantī stomacho auxiliantur, & multo magis contrahunt, ac urinam cient: ora, gingiuasque lædunt. Vinosa uero mediam sortiuntur naturam. Nuclei acinorum acidi punici in sole siccant, & obsonijs insparsi, concoctiue, fluentem aluum, stomachumque sistunt; coelesti aqua madescunt, bibunturque comode sanguinem excreatibus: ad desensus dysentericorum, foeminarumque fluxione uulue laborantium utiles sunt. Expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris, uirilatis, & sedis ulcera, nomas, reduuias, & ea, quæ in corpore extuberant, aurium dolores, & narium uitia; præsertim acidorum. Huius flores cytini uocantur: qui adstringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta glutinant: quas punicum, præstant utilitates. humida gingiuarum uitia, mobilesque dentes decocto colluuntur: herniam prolapsu intestini erumpentem, cataplasmate repellunt. Memoriz tradunt, qui tres quam minimos cytinus deuorauerit, nullam eo anno lippitudinem passurum. Eliquatur hypocistidis exemplo. Malicorium asperum est mali punici putamen, quod aliqui sidion appellant.

Id spissandi



Id spissandi vim habet, & quos cytini, præbet usus. Decoctum radicis, poru latas uentris tinea pellit, & easdem euocat. Balauſtium sylueſtris punice flos est; cytino ſimilis. Cuius complura genera reperiuntur, candidum, fuluum, colore roſaceo. Succus ex eo exprimitur, hypociftidis modo: cui adſtriſtoria uis ineſt, eadem faciens, quæ hypociftis, & cytinus.

Punici mali  
conſideratio.

PUNICA mala in pluribus Italiæ locis uulgo, ſicut etiam Latine Granata dicuntur, à multis intus cõcluſis granis: quãquam non deſunt, qui ita appellari uelint à Granata Hiſpaniæ regno, quod ubi numeroſa proueniât. Sed quomodo conſue-  
docunq; ſe res habeat, nuſquam non cognita ſunt in Italia: ſiquidẽ inibi & in hortis, & in uinetis, & in uiridarijs po-  
rum frequentiffimè uiſuntur arbores. Triplici (ut etiam ſcribit Dioſcorides) diſtinguuntur ſpecie: quippe quod  
alia dulcia ſint, alia acida, alia uiuofa. Vinolenta ea ſunt, quæ uulgo Vaiani uocat Hetruria, quæq; aliubi Schiæ, &  
alibi di mezzo ſapore Italico ſermone appellantur. At Plinio libro XIII. capite XVII. quinq; enumerantur ſpe-  
cies, dulcia ſcilicet, acria, mixta, acida, & uiuofa. Verum hæc omnia Dioſcorides in tria redegit ſaſtigia: utpote quæ  
uni dulcia; alteri acria, & acida; tertio uerò generi mixta, & uiuofa adſcripſit. Hæc omnia Italia habet, & ce-  
lebrat: ſed & fructus, & acinorum magnitudine, tum liquoris copia excellunt dulcia, & uiuolenta. Acida miteſce-  
re, & dulcia fieri tradunt, ſi ſuillo, aut humano ſtercore foueantur arboris radices, & uetere urina ſæpius irrigen-  
tur. Ceterum ne fructus in arbore debiſcant, remedio ſunt lapides tres, cum ſeritur arbor, ad radices collocati: quin  
etſi iam conſita ſit, & fructum ferat, eadem ratione emendatur. Sed & hoc item præſtabitur, ſi ſcilla ſecundum ra-  
dices conſeratur. Si florem arbor non continet, urinam ueterem cum pari aquæ menſura temperare, & ter per annu  
radicibus infundere, efficaciffimum eſt remedium. Eundem præſtabis effectum, ſi arboris florentis truncum plumbeo  
concluſeris circulo, uel anguis corio inuolueris. Seruantur punica mala incorrupta anno toto, ſi cum ſerè matura  
ſuerint, petioli, quibus pendent, intorqueantur in arbore: uel ſi poſtquam decerpta ſuerint, argilla ex aqua reſoluta  
undiç; oblinantur, ac deinde pluribus diebus inſolentur. Sunt & qui, ut diu integra perennent, ea in ſeruientem aquam  
immergant, ſtatimq; eximant, & ſole ſiccanda exponant, octo dierum ſpatio. Vini ex omnibus conſiciendi ratio hæc  
eſt. Acini maturi diligenter à corijs, & membranis purgati prælo committuntur, ac exprimuntur: mox uinum ſac-  
cis ad id accommodatis percolatur, & in uasculis reponitur, quouſq; ſex reſidat: deſecaturq; deinde, & clarum repo-  
nitur, affuſo de ſuper oleo, ne corrumpatur, uel aceſcat. Sunt & qui ſine oleo illud in cadis aſſeruent, ſed id per æ-  
tem facile aceſcit. De floſculi nomine inter ſe diſcrepant autorum ſententiæ. Dioſcorides florem ſatiuæ punice  
cytinum appellat, balauſtium uerò ſylueſtris. Plinio libro XXI. capite ſexto, primus tam ſatiuæ, quam ſylueſtris  
partus florere incipientis cytinus uocatur; balauſtium uerò flos utriuſq; in ipſo erumpens cytino. Laudatiſſimi ſati-  
uarum flores colore perquam rubro ex Creta, & Cypro hoc æuo Venetiis importantur, aſpectu quidem ſpecioſo,  
& uiribus cæteris præſtantes. Sed & mangonio ſunt in Italia peregrinis non diſſimiles, nõ tamen uſq; adeo præ-  
ſtantes. Immaturus punici cortex ideo Malicorium antiquis dicebatur, quod eo, ut Rhu ad perficienda coria uti-  
rentur. Dulcia punica, quæ apyræna alio nomine uocantur, uentriculo inutilia haberi, dentes gingiuasq; ledere, autor  
eſt Plinius; etſi rectius fortè id Dioſcorides acidis attribuat. Puluis mali punici in olla noua operculo indito in ſarno  
toſti, potus fluentem aluum efficaciter ſiſtit. Sylueſtris uerò acinorum oſculi utiliter bibuntur triti ad aquam, quæ  
cutem ſubierit, ſiccandam. Cortice punici ex uino decocto, & impoſito perniones ſanantur. Punica, & myrtus,  
(ſi rei agrariæ autoribus credimus) mutua conſuetudine mirum in modum oblectantur, ita ut etiam reddantur ſer-  
uiores, ſi altera in alteram inſeratur. Malorum punice uires prodidit Galenus lib. VII. ſimp. medicamentor-  
um, ſic inquit. Malum granatum omne adſtringentẽ qualitatem obtinet, non tamen in omnibus ea exuperat. Sunt  
enim inter ea quedam acida, quedam plus dulcia, quam auſtera: & ſanè quæ ab unoquoq; eorum procedit utilitas,  
ſecundum uincientem eueniat qualitatem neceſſe eſt. Dictum autem in quarto horum commentariorum eſt ſuper dul-  
ci ſapore, auſtero, & acido. Itaq; ex illis de malorum punice differentia liceat colligere. Porro acini magis, quam  
ſuccus tum adſtringunt, tum exiccant, his etiam magis putamina: uocantur autem ſidia. Adſimilem illis uim habent  
cytini.

Cytinus, &  
balauſtium.

Malicorium.

Mali punici  
uires ex Gal.

Mvgolva. MYRTVS.

CAP. CXXVIII.

MYRTVS ſatiua nigra utilior eſt medicinæ, quam candida, & in hoc genere multò magis mó-  
tana: ſemen tamen imbecillius parit. Vis & myrti, & ſeminis adſtringit. Semen uiride, aut ari-  
dum in cibo datur ſanguinem excreantibus, & ueſicæ eroſionibus. Succus uiuentibus baccis ex-  
preſſus, eoſdem effectus exhibet: ſtomacho utilis, urinam cit: prodeſt contra phalangij morſum,  
& ſcorpionis ictus in mero. Seminis decoctum capillum tingit. Ius decocti in uino ulcera in ex-  
tremis membris nata ſanat: oculorum inflammationes illitum cum polline polentæ lenit: contra  
ægilopas illinitur: crapulam arcet præſumptum uinum, quod feruefacto aliquantum eius ſemine  
exprimatur: aliàs enim acorem contraheret. Præſtat idem ſeminis effectus: utile procidentie vul-  
uarum in deſeſſionibus, ſedis uitij, & foeminis fluxione vuluæ laborantibus: purgat furfures, ul-  
cera capitis manantia, atque eruptiones papularum: fluentes capillos continet. Additur quoque  
in medicamenta, quas liparas uocant, uti oleum, quod ex folijs eius factum eſt. Decoctum folioru  
ad deſeſſiones balnearum conuenit, & contra laxatos artus, & malè ſolideſcentes: eo fracta ferru-  
minationi repugnantia utiliſſimè fouentur: uiriliginem emendat, purulentis auribus infunditur,  
& capillos denigrat. Succus eorum eadem efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis ulceribus,  
& partibus

MYRTVS.

& partibus omnibus fluxione laborantibus, celiacis-  
que profunt: & admisto omphacino oleo, aut exiguo  
rosaceo cum uino, ad ulcera serpentia, ignem sacrum,  
testium inflammationes, epinyctidas, & condyloma-  
ta. Arentium foliorum farina utiliter inspargitur pa-  
ronychijs, pterygijs, & contra alarum, feminumque  
perfusiones: cardiacorū sudores cohibet. Folia cru-  
da, seu cremata cum cerato, ambustis, paronychijs,  
pterygijsque medentur. Exprimitur folijs succus,  
aduso uetere uino, aut aqua cælesti, cuius recētis usus  
est: nam exiccatus planē cariem sentit, & uires amit-  
tit. Myrtidanum dicitur, adnatum inæquabile, uer-  
rucosum, intumescensque, & concolor: quod perin-  
de quasi manus, myrti caudicē amplectitur, coactum-  
que in pastillos ficcatur in umbra: multò efficacius  
& folio, & femine, cerato, pēsis, infessionibus, cata-  
plasmatis admistum, ubi adstringendum aliquid est.

MYRTVS arbor frequens in Italia nascitur. Cuius duo  
produuntur genera: satiuum, quod in candidum, & nigrum diui-  
ditur: & sylvestre, quo uniuerſa ferē Tyrrheni litora uireſcūt,  
ac redolent. Siquidem in agro nostro Senensi in maritimis, ac in  
uniuerso Liguria tractu, Romano, atq; Neapolitano ubiq; Myr-  
ti sponte proueniunt. Satiuæ in arbores faciliē adoleſcunt, ramis  
flexilibus, ac lentis: rubro cortice: folijs longiusculis, perpe-  
tuoq; uirentibus, punice æmulis; quanquam in nigris nigriora,  
in candidis candidiora spectantur. Flores omnibus insident cā-  
didi, odorati: ideoq; aqua ex ijs confecta odoris suauitate unguē-  
tarijs plurimum expetitur. At cum nostras æquē sit odorata,  
atque olfactu iucunda; eam tamen odoratissimam existimaues-



rim, quæ ex Aegyp̄tia myrto elicitur: siquidem & odoratissimam, & iucundissimam in Aegyp̄to nasci Myrtum me-  
moræ prodidit Theophrastus. Satiuarum utrunque genus baccas fert oblongas, agrestes oleas quadantenus refrenan-  
tes; multò sanè sylvestribus maiores: etsi contrarium asseueret Marcellus. Quippe experientia compertum est, quòd  
ubicunque satiuæ Myrtus colitur, grandiores, uegetioresq; baccas edit, quàm sylvestris: cultura enim Myrti manſue-  
ſcunt, & longè magis humore replentur, utpote & aliæ satiuæ stirpes omnes: quod quidem indomita tellus sylvestri-  
bus denegat. Ceterum, ne quis decipiatur, hic lectorem admonendum esse duxi, cum de sylvestri Myrto loquor, non  
me de rusco intelligere, qui & Dioscoridi, & Plinio sylvestris, & acuta myrtus appellatur; sed de uera sylvestri  
Myrto, quæ sua sponte in litoribus sine cultu oritur: quæ item in mediterraneis in collibus, syluis, ac cæpestribus pro-  
uenit. Hæc tamen si præter ruscum à Dioscoride non fuerit expressa; cùm tamen dicat initio capitis, Myrtus satiuæ,  
& reliq. his uerbis & sylvestrem eiusdem generis myrtum tacite dari fatetur. Porro inter sylvestres alba quoq;  
& nigra reperitur, quemadmodum & inter urbanas: quandoquidem ipse quàm plurimas sylvestres myrti plantas  
uidi in mille locis, quibus maturæ inerant bacca, nō sanè nigra; sed in purpurā albicantes. Myrti montes non amāt,  
quin & frigidos odere tractus: tamen cùm in mediterraneis, nēpe in hortis, uiridarijs, uinetis, & cæpis maxime pro-  
ueniunt; tū in maritimis præcipuè, atq; amœnis stagnorum, & lacuū ripis à natura nullo studio editæ, mirificè proſi-  
cunt, satq; letā agunt. Quod Dioscoridi Myrtidanum nominatur, uulgo notissimum est, ubi scilicet myrtus fre-  
quens nascitur. Sunt & alia ueteribus Myrti genera, nobis quoq; non ignota, nempe Tarentinū, & exoticum: quo-  
rum Plinius meminit lib. xv. cap. xxxi. his uerbis. Satiuarum genera topiarij faciunt. Tarentinam folio minuto,  
rostratē patulo, exoticam densissimo, senis foliorum uersibus. Hæc non est in usu: ramosa utraq; alia. Myrti no-  
stratis in Hetruria coria ubiq; perficiuntur: quippe quòd ea pelles densentur, crispentur, atq; crassescant. Myrti bac-  
cæ ultimā maturitatem adeptis, nostrates mulieres utuntur ad ciborum intinctus, qui cū assatis carnibus esitati maxi-  
mè tam palato ineunt gratiam. Ideoq; Plin. loco suprā citato ita scriptum reliquit. Succorum natura præcipuam  
admirationem in myrto habet, quando ex una omnium olei, uiniq; bina genera fiunt. Item myrtidanum, ut diximus. Et  
etius usus bacca fuit apud antiquos, anteaquàm piper reperiretur, illius obtinens uicē. Quodā etiam generosi obsonij  
nomen inde tracto, quod etiānum myrtatum uocatur. Eademq; origine aprorum sapor commendatur, plerunq;  
ei intinctus additis myrtis. Hæc Plinius. Myrteum condimentum languidos uentriculos roborat: idcirco & cœlia-  
cis, & dysentericis utile: quin & foeminarum fluxiones, qualescunq; sint, ualenter inbibet. Myrti frōdes, itemq; bac-  
cæ senen tritum contra fungorum strangulationes mirificè præstant. Myrtus (ut memoriæ prodidit Galenus  
libro septimo simplicium medicamentorum) ex contrarijs substantijs planta constat: uincit tamen in ea frigidū ter-  
reum. Habet uerò etiam tenue quiddam calidum: unde ualèter desiccet. Porro tum folia, tum germina, tum fructus,  
tum succus non parum inter se in adstrictione disident. Ceterum quod ramis, & trunco adnascitur tuberosum, quam  
quidam

Myrtus confici-  
ratio.Myrti confi-  
deratio.Marcelli lap-  
sus.Myrti alia ge-  
nera.

Myrti usus.

Myrti uires  
ex Galeno.

quidam Myrtada nuncupant, quanto dictis siccus est, tanto et desiccatur, et adstringit uehementius. Quidam id tunc res reponunt, postea uino subigentes in pastillos formant. Folia item arida uiridibus plus desiccant: miscetur enim uirentibus humiditas quedam. Porro succus non tantum ex uirentibus folijs exprimitur, sed et fructu. Restringentium haec omnia habent tum foris imposita, tum intro sumpta in corpus, quod scilicet nondum ullam delectationem, et purgatoriam substantiam habeant admixtam.

Κεράσια. CERASIA. *Rosifolia*

## CAP. CXXIX.

Ceraforum  
consideratio.Cerasiorū ge-  
nera.

CERASIA aluo utilia sunt, si uiridia sumantur: eadem siccata illam sistunt. Gummi, quod cerasi sudarunt, cum uino diluto, tussi vetusta medetur: colorem commendat, uisum exacuit, appetentiam inuitat: idem ex uino potum calculosis auxilio est.

NULLA hodie arbor est in Italia, quae uulgo notior sit Cerasis. Has scribit Plinius libro xv. capite xxv. nouas, et peregrinas, nec antea uisas ē Ponto secum primū aduexisse in Italiam Lucullum, postquam debellato Mithridate is uictoria positus Romam uenit. Sed postea tanta agro Italo amoenissimo cum hac arbore intercessit affinitas, et consortium, ut non solum ager is satiuarum plantas seruauerit, propagauerit, et adauxerit: sed et ueluti ex eius humore (quae summa fuit inter se societas) grauida terra facta, sine aliquo semine in campis, in montibus et soluis numerosissimas plantas procreauerit, et ediderit. Satiuarum speciosissimi fructus, qui Cerasa, et Cerasia Latinis etiam appellantur, diuersorum sunt generum: quo fit, ut diuersa quaeque sortiantur nomina. Inter haec illa principem sibi locum uendicant, quae Hetruscis uulgo Marchiane, et duracine uocantur: tamen si horum alia maiora, alia minora, alia saturato colore ruberent, alia uero potius albicent. Quae autem Plinio Iuliana, nobis uero uulgo Acquaiuolo, hoc est, aquea dicuntur, in nullo sane habentur pretio: quandoquidem adeo sunt tenera, et fragilia, ut nisi sub arbore sua comendantur, facile gestatu collidantur, et marcescant: quin et ob aqueae partis redundantiam insipida sunt, orique ingrata. Quae autem, quod admodum nigrescent, Corbine nos uulgo uocamus, Plinius uero actia, et ceciliania, cum sint duriuscula, et dulcia, gustatu habentur non in-

iuuanda: ueruntamen quod manus, dentes, ac labra atro colore inficiant, discumbentesque deturpent, mensis raro exponantur. In cerasiorum genere numerantur et illa, quae Romae Visciole, Senis Amarine, et in alijs compluribus Italiae locis Marasche uulgo nuncupantur, a sapore (ut puto) dicta, quod non inuicundi amaroris tantillum respiciunt. Horum porro uaria notantur genera, quae etsi omnia sibi acidum asciscant saporem; haec tamen eius plus, illa uero minus habent. Rura Tridentina ea Marasche uulgo nominant, quae minus acida gustu deprehenduntur, quorum genus quoddam est, quod ori admodum gratum habetur: quippe quod in ijs acido dulce sit admixtum, ob idque illa palato maxime placeant. Quedam praeterea inibi Marine, et Marinelle cognominantur, quae et minora, et rotundiora sunt, et breuiori pediculo appensa, gustu nihil ferē praedictis reclamante. Est et horum tertium genus, quae uulgo illud Verule nominat, longiore pediculo, bacca etiamnum ceteris crassiore, gustu acerbior, et admodum acido, colore perpetuo rufescente, nec unquam in atrum uergente. etsi cetera, ubi plene maturuerint, in atrum rubescant. Omnia haec cerasiorum (ut ita dicam) Amarinorum genera aptissima sunt, ut insolentur, et ut saccharo condiantur. Quinetiam sapore commendantur ad intinctus conficiendos, quibus non modo sanis edulia iucundissime conduuntur; sed etiam egrotantibus, praesertimque biliosis febribus uexatis. Siquidem illis non modo sitim extinguunt, sed oris insuauitatem emendant, et cibi appetentiam conciliant. Syluestre horum genus nulla adhibita cultura Ananienfibus in Tridentino agro sponte prouenit, nihil prorsus tum colore, tum etiam sapore ab illis disidens, quae mihi, ut diximus, Verule uulgo uocantur. Haec breui pediculo pendent in arboribus admodum pumilis, tantaeque breuitatis, ut raris uel potius nullae dodrantalem aequent mensuram. Quo factum est, ut crediderim (etsi id pro comperto asserere non ausim) haec eadem esse, quae Plinio Macedonica dicuntur. Syluestria, quibus plerumque uescuntur aues, raro in cibis admittuntur, praeterquam a rusticis, tum quod plus ossis, quam carnis habeant, tum etiam quod cum quadam acerbitate etiam ra sentiuntur. Degenerant cerasi quocumque sumo radicibus admo, id usque adeo oderunt, et horrent. Contra proficiunt, si sui ipsius putamina falce concisa circum radices sepeliantur, ibique marcescant. Praecoces illae fructus ferunt, quibus ante florum exortum calx iuua radicibus circumponitur: uel quibus aqua calida saepius pedes irrigantur, et postea paruo temporis tractu inarescant. Galenus habita Cerasiorum omnis generis ratione libro vii. simpl. medic. ea hisce paucis perstrinxit. Cerasus arbor fructum fert non parui adstrictionis in omnibus particulatim plantis

Syluestria ce-  
rasia.Cerasiorū ui-  
res ex Galen.



te participem. Nam & in borum, sicut etiam malorum granatorum, & malorum, quibusdam austeris qualitas, in quibusdam uero dulcis, in nonnullis autem acida exuperat. Quinetiam ipsorum dulcium ea, quæ nondum cocta sunt, ætate matura, quedam admodum acerba sunt, quedam similiter moris acida. Sed in moris immaturis acida qualitas ætatem exuperat, in cerasijs non semper. Ergo quæ dulciora sunt, magis quæ in intestinis sunt, subducunt, sed minus in stomacho sunt. Contrà austeris. Quæcunque uero acida sunt, ea pituitosis, excrementosisq; stomachis conueniunt: siquidem austeris magis desiccant, & nonnihil etiam incidunt. Porro ipsius arboris gummi communem omnibus viscosis, & mordacitate carentibus medicamentis facultatem obtinet, quæ & ad arterias exasperatas accommodata est. Proprie autem (si quidem uerum est quod quidam scribunt) calculis uexatos cum uino potum adiuuat. Nam sic illi tenuium partium quedam facultas inest.


Κεράτια. Siliqvæ. 59 anni. Brot. CAP. CXXX.

SILIQVÆ recentes stomacho aduersantur, aluum soluunt: eadem siccatæ fistunt, stomachoque utiliores fiunt: urinam ciunt, sed præcipuè, quæ uinaceis condiuntur.

SILIQVÆ, quæ Græcis κεράτια dicuntur, in Italia officinis uulgò Carobe, & Carobole appellantur. Nascuntur arbores, quæ Siliquas ferunt, in regno Neapolitano, præsertim in Apulia, ac etiam in Campania, ut optime sciūt ij, qui Fundo Itrum, & hinc Molam iter faciunt: siquidem in illa ob leuigatos lapides inibi stratos laboriosa admodum uia, quam Appiā uocant, frequentissimæ conspiciuntur. Incolæ has plantas Salequa uulgò nominant; uocabulo nimirum à Siliqua detorto. Arbores in spectatam satis proceritatem attolluntur, ramis in latitudinem potius, quam in longitudinem protensis: cortice cineritio ad cæruleum inclinante, loti arboris instar. Folio uirent fraxineo, latiore tamen, duriore, rariore, ac magis circinnato. Florèt discedente hyeme, aut uere iam appetente: fructificat uero æstate, & autumnio. Siliquæ recenter ab arbore decerpæ ingrato displicent sapore, sed tractu temporis in cratibus expansæ, & siccatæ, adeo mitescunt, ut & dulces euadant admodum, & gustui suaves fiant. Aliud siliquarum genus, quod sicum Aegyptiā cognominant, scriptis tradiderunt Theophrastus, & Plinius, de quibus mihi differendum non proposui, tum quod Italis nusquam (quantum equidem sciam) nascantur, neq; cognoscantur; tum etiam quod nullum habeant usum in medicina. Siliquas in cibis damnauit Galenus lib. secundo de alimentorum facultatibus, his uerbis. Ceratia, quorum tertia syllaba per, s, literam & scribitur, & pronunciat, nubilicam cerasijs per, s, scriptis habet

Siliquarum consideratio.

Siliquarum uires ex Gal.




similitudinis. Est autem prauis succi edulium, ac lignosum: unde necessario sequitur, ut cōcoctū sit difficile: nihil enim quod lignosum est, facile coquitur. Præterea incommodum illud ipsis inest non paruum, quod non celeriter deisciantur. Proinde satius esset, ea ad nos nō importari à regionibus orientalibus, in quibus nascuntur. Sed de uiribus, quas & arbor, & ipsæ habent in medicina, idem Galenus differens libro VII. de simpl. medicam. facultate, sic inquit. Ceratonia exiccantis est, & adstringentis facultatis, sicut & fructus eius, quæ ceratia uocant, nonnihil etiam dulcedinis continent. Accidit autem istis quiddam simile cerasijs. Nam si humida sumas, magis uentrem subducunt: sicca uero magis fistunt: utpote cum humiditatem expirent, & quod essentia est crassioris, tantum reliquum habeant.

Μάλα. M A L A. Cotonea. Quidam CAP. CXXXI.

FOLIA, flores, & germina cum omnis mali, tum maximè cotoneæ adstringunt. Pomis acerbis adstringendi uis inest, maturis uero longè secus. Ex ijs uerna bilem gignunt, nervos omnes ledunt, inflationes pariunt. Cotonea stomacho utilia, urinam cient: uerum tosta mitiora habentur. Profunt cœliacis, dysentericis, purulenta extusisientibus, cholericis, præsertim cruda. Maceratorum liquor commodè in stomachi, aut uentris fluxionibus, potui datur. Succus crudorū assumptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fouentur vuluæ, & sedes, si procidant. Cotonea, quæ melle condiuntur, urinam mouent: mel autem sibi constringentem illorum uim, & inspissantem adsciscit. Quæ cum melle coquuntur, stomacho, atque ori gratiora sunt, sed minus inspissant. Cruda cataplasmatibus adijciuntur, ad cohibendū aluum, aut si stomachus æstuet, aut in uomitiones fundatur, ad mammarum inflammationes, præduros lienes, & condylomata. Fit uinum ex ipsis


Μηλέα. MALVS.




Κυδάνιος μηλέα. COTONEA MALVA.




Περσική μηλέα. PERSICA MALVS.



Αρμενιάκη μηλέα. ARMENIACA MALVS.



Κίτρος. MEDICA MALVS. AVRANTIA MALA.



LIMONIA MALA.

*honey apple*

ipsis tuis, expressisque: sed quò perduret, quindecim  
 sextarijs succi unus mellis adiungitur, alioquin in acorem  
 degenerat. Prodest ad omnia, quæ dicta sunt. Fit  
 & oleum ex ijs, quod melinum uocauimus: quo uti-  
 mur, quoties adstringenti oleo est opus. Eligi oportet  
 uera, quæ sanè sunt rotunda, parua, & odorata. quæ ue-  
 rò struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus  
 utilia. Flos & uiridis, & ficcus cataplasmatibus imponi-  
 tur: ijs conueniens, quæ adstrictionem desiderant, in-  
 flammationibus oculorum, reiectionibusque sangui-  
 nis: contra citam aluum, & mensium impetus, in uino  
 bibitur. Melimela uentrem molliunt, & ab eo ani-  
 malia expellunt: stomacho negotium exhibet: æstua-  
 tionem faciunt. ea multis dulcia mala vocantur. Epi-  
 rotica mala, quæ Latinè orbiculata dicuntur, stomacho  
 utilia: fistit aluum, urinas euocant: malis tamen coto-  
 neis inualidiora. Syluestria mala familia sunt vernis,  
 & adstringunt. Sanè in hunc usum immatura omnia  
 opus sunt. Perfica poma matura tamen stomacho, quàm  
 ventri utilia sunt. acerba aluum cohibent, sed sicca ue-  
 hementius. Decoctum è ficcis alui, stomachique flu-  
 xiones fistit. Armeniaca, quæ à Latinis præcocia di-  
 cuntur, minora sunt supradictis, & stomacho utiliora.

Medica mala, perficaue, aut cedromela, quæ Latini  
 citria uocant, nemini non cognita: Arbor ipsa omni-  
 bus anni temporibus pomifera, alijs deciduis, alijs sub-  
 nascentibus. Malum oblongum est, rugosum, colore  
 aurum imitans, cum grauitate odoratum. semen habet  
 pyri. Id in uino potum uenenis resistit, aluum monet:

oris suauitatem commendat, decocto eius colluto, aut succo: estur in malacia mulieribus. Vesci-  
rijs impositum ab erosionis uitio uestes vindicare existimatur.

Malorum co-  
sideratio.

IN MALORVM quoq; genere Dioscoridi recensentur Persica, Præcocia, Cotonea, & Citria: quippe quæ  
eandem effigiem, & formam representare uideantur. Sed nos primam de uulgaribus malis agemus, reliquæ sub  
sigillatim prosequemur. Eorum itaq; (ut Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus posteritatis memore  
prodidit) uarij, ac multiplices sunt sapores, quos etiam uariæ sequuntur functiones. Alia namq; astringentia, alia  
dulcemie saporem gerunt. Sunt etiam quæ ex ijs mixtum habeant, ita ut appareant & dulcia simul & astringentia.  
Quædam præterea cum dulcedine manifestè acida sentiuntur: ad hæc alia cum acore acerbæ. Inueniuntur autem non  
nunquam & quæ tres simul sapores planè referant, dulcem scilicet, & acidum, acerbique: nonnihil. Ceterum mala quæ  
dem, quæ astringunt, succum habent frigidum, ac terreum. Quæ uerò acida apparent, frigidum quidem succum ha-  
bent, uerum tenuum est partium. Mediæ autem temperaturæ sunt dulcia, quæ ad calidius uergunt. Quædammodum  
quæ omnis qualitatis sunt expertia, insipidaue, ac ueluti aquosa, ad frigidius inclinant. Malis igitur utris pro uarietate  
saporum facultatibus: austeris quidem, cum uenterculus uel propter calidam intemperiem, uel ob multam humiditatem  
fuerit imbecillus: acerbis autè, cum hæc aucta admodum fuerint: acidis, cum crassum succum, qui non magis prope  
re frigidus sit, suspicaberis in ipso esse collectum. Siquidem succus frigidus non acida, sed acris postulat. Vtrique  
& acida & acris succos crassos incidunt: in eo tamen differunt, quòd hæc quidè cum refrigeratione; illa autem cum  
calfactione id præstent. Porro dulcis malorum succus, cum sine acrimonia, & crassitie, hoc est, cum solus exquirat  
fuerit, celerius, quantum in ipso est, distribuitur. Quòd si acrimoniam, aut crassitiam habuerit, citius subducitur. Ce-  
terum optima etiam genere mala uitanda sunt, antequàm in arboribus maturuerint: quippe quoniam concoctu sunt  
difficilia, & frigida, tardèque permeant, & prauis sunt succi: ad hæc succum habent frigidum, & leuiter crassum.  
Quæ uerò belle matura in hyemem, & uer proximum asseruant, ea morbis se penumero perquam utilia sunt, aut ser-  
ua aqua subacta circumluta, aut calidis cineribus mediocriter assata, aut pulchrè in aquæ bullientis uaporibus perco-  
cta. Dare autem ipsa conueniet statim post cibum, aliquando etiam cum pane, ad uentrem, & stomachum roborant,  
ijs qui cibum fastidiunt, tardèque concoquunt, quique uomitu, diarrhœa, ac dysenteria infestantur. In hunc quoque usum  
apta sunt acerbæ: nam parata ut modo dixi, mediocrem retinent adstrictionem. In Hetruria principatum obtinent,  
quæ Appie, & Mele rose uulgo uocantur: quandoquidem hæc duo genera, cum suauiter oleant, gustuque arrideant, cæ-  
naribus, & palato maximam ineunt gratiam. Eaque propter non longè eum aberrare putauerim, qui dixerit Appi  
esse Dioscoridi melimela: Rosea uerò, quæ eidem epirotica, & Latinis orbiculata dicuntur. Quæ uerò adeo rubent,  
ut cruore perfusa uideantur, & acido gustu sunt prædita, non alia de causa ita rubescunt (si rei agrarie auctoritas  
credimus) nisi quòd ex mali, & mori nigre insitione suam traxerint originem. Cornarius sua tantum in fallor opi-  
nione ductus, putat in suis commentarijs in Galeni libros de compositione medicamentorum secundum locos, Cestiana  
poma esse arantia, siue aurantia mala, quæ in Citrei mali genere ab omnibus recensentur. Nec eum potuit à sua sen-  
tentia reuocare Plinius, qui libro xv. cap. xlii. apertissime scribit à Cestio cestiana, à Matio matiana, à Manlio  
maniana, à Claudio claudiana, & ab Appio appiana mala per inuentorum nomina, à quibus habuerunt originem,  
Romanis fuisse cognominata. Quocirca eo loco scriptum reliquit Galenus ex auctoritate Apollonij, quòd in capitis  
dolore ex ebrietate cestiana mala sic in urbe Romana appellata, in cibis cocta conferunt, quòd austeræ sint facultate  
non ut somniasse uidetur Cornarius, aurantia, quæ præterquam quòd Apollonio, & Galeno incognita fuisse censetur,  
nusquam gentium, quòd equidem sciam, cocta exhibentur. Quo fit, pace omnium dixerim, ut qui suæ cernicis  
duritiam consulunt, suas sæpius reprobare sententias audiant. Malos, quæ fructus suos tãquam steriles, dare recu-  
sant, secundas effeceris, si plumbeo circulo earum caudicem altitudine pedis à terra strictim concluderis ante flor-  
aduentum, & cum mala cœperint adolescere, soluto uinculo eas libertate donaueris. Mala Cotonea primam in

Cornarij opi-  
nio reproba-  
ta.

Cotonea

Malorū coto-  
neorū consid.

Italiam aduecta fuerunt à Cydone Cretæ oppido, unde Græcis cydonia dicta sunt. Horum tria in Italia inueniuntur  
genera. Palma illis, quæ peculiariter Mala cotonea cognominantur, pressa, incisuris intersecta, colore ad aurum  
inclinato, lanuginosa, & longè cæteris odoratiora. Proximum locum sortiuntur, quæ maiore admodum corporis  
mole proueniunt, Dioscoridi, & Galeno struthia uocata. Hetrusci hæc pyra cotonea uocant: quippe quòd forma  
magis pyra, quàm mala referant. Pulpa, ac succo cæteris præualent, colore tamen, sua uolentia, ac uiribus cedunt.  
Postremo Plinio miluiana sunt, quæ nonnullis notha dicuntur, quòd tantum proueniant ex cotoneis malis, quæ stru-  
theis insite fuerint, uel ex strutheis, quæ cotonearum surculos receperint. Hæc malis grandiora, pyris uerò, siue stru-  
theis minora uisuntur: forma uerò, ac facultate inter utrunque media. Ceterum sanè hæc omnia, præcipue mela,  
maximè officinis expetuntur in medicinæ usum. Nempe quòd ex omnibus præter uinum, miuam, oleum, & quod  
Diacidonum uocant, conficiantur & intinctus, & congelati liquores, quæ omnia non agris modò apta sunt, sed  
etiam sanis utilia equè & grata. Galeni æro (ut ipse testatur in libris, quos de alimentorum facultatibus conscripsit)  
Cydonitè placenta, quam officinæ Diacidonum nuncupant, ex Iberia, & Syria Roman conuehebatur, ex medi-  
le tantum, & cotoneorum carne confecta, tam ad cibi, quàm medicamenti commodum. Quæ saccharo, uel melle  
condita reponuntur, perfectè matura legi debent, aliàs indurescunt lignorum instar, ita ut dentibus confici nequeant.  
Quæ cruda per hyemem asseruantur, seorsum à pensilibus uuis reponenda sunt, quòd uuas suo acerrimo sapore  
adeo uitiunt, ut eæ statim marcore conficiantur. Persicorum quoque plurimè reperiuntur species. nam quædam  
rubent, alia aureo colore fulgent, alia uirescunt, alia candida sunt, alia sanguinea, alia duracina, alia cotonea uocantur.  
Ad hæc quædam habentur dulcia, quædam acida, quædam uinosa, quædam amariuicula, & quædam etiam  
austera.

Persicorum  
consideratio.

essera. Prima laus in cibis duracinis, sic ex re dictis, quod caro tam pertinaciter hereat osi, ut nullo pacto ab eo  
 10 anelli queat. Præcipua autem in hoc genere illis laus, quæ ab aurei coloris nitore, odoreq; perquam iucundo Coto-  
 nea cognominant. Secundas sibi uendicant partes, quæ cortice detracto sanguineum succum fundunt, non propter  
 res modo quod sint gustu reliquis suauiora; sed etiam quia magnitudine, et colore sunt speciosa. Proxima sunt,  
 nec prædicto generi fortasse cedunt, quæ à nucis similitudine Nucipersica cognominantur: hæc enim cum colore, et  
 sapore non refragentur persicis cotoneis, tum etiam non ingrata dentibus duritie, gustum mira efficiunt uoluptate.  
 Est et genus aliud Persicorum in Hetruria, ac in alijs Italiæ locis agriculturalium mangonio factum, quæ ideo Persica  
 amygdala appellant, quoniam persicorum osium uice dulces amygdalarum nucleos includunt. Ceterum sanè  
 multis contendit Cornarius, in suis commentarijs in secundum Galeni librum de compositione medicamentorum secun-  
 20 dum locos, ubiq; corruptum esse Plinij codicem, ijs in locis, in quibus de duracinis persicis tractat: quin et Pauli, et  
 Palladij, et Constantini Cæsaris libros corruptos esse, ubi in ijs de duracinis persicis aliquid scriptum reperitur.  
 Quandoquidem is, ubi in horum monumentis de duracinis persicis factam fuisse mentionem legitur, ibi de rhodacenis,  
 non autem de duracinis legendum esse censet. Verum cum inibi nulla uel ratione, uel auctoritate nitatur, quibus id  
 comprobet, sua tantum ductus opinione uidetur: atque ob id facile pronunciasse, horum omnium codicibus (quod  
 tamen absurdum esset credere) mendum subesse. Quamobrem in hoc potius Cornarium hallucinatum, quam libros  
 deprauatos esse crediderim. Quinimo uirum alioquin doctissimum admiror, quod rem per se claram obscuram red-  
 dere conatus sit, quodq; non intellexerit, quid Plinio, et Palladio duracina, quid Paulo *δοράκια*, quidue Aëtio, et  
 Constantino, ac alijs quibudam Græcis *δόρακνα* extiterint. Nam si animaduertisset, hæc inter se et nominibus,  
 et re ipsa differre, facilius, meo quidem iudicio, rem dubiam explicasset, nec omnes in uniuersum autorum codices  
 30 deprauatos pronunciasset, cum, ut equidem arbitror, eorum nullus his in locis sit uitiat. Paulo enim *δοράκια*, ut  
 uulgata habet lectio, non *δόρακνα*. Cornarij modo, legendum semper existimari, quod ipse eo loco de præcoci-  
 bus, et armeniicis tantum malis differat, non autem simpliciter de persicis. Siquidem, ut Cornarius ipse fatetur, Rhod-  
 acene non est alia, quam malus persica, quemadmodum Rhodacena nil aliud sunt, quam mala ipsa Latinis persica  
 uocata. id quod et nos sine ulla controuersia probamus. Sed Paulo *δοράκια* (ut diximus) genus est præcoci-  
 ne armeniici mali, ut ipse declarat his uerbis: τὰ δὲ πρᾶκόνια τε καὶ δοράκια, καὶ ἀρμένια κρείττονα τῶν  
 περσικῶν. οὗτε γὰρ εὐφρατα, οὗτε ὠσαύτως διαφθείρεται, id est. Præcocia, doracia, et armenia persicis  
 præstant: neque enim aescunt, neq; similiter corrumpuntur. Quibus palam est in Paulo potius *δοράκια*, quam  
*δόρακνα* esse legendum, quod tantum persica malus Græcis *δόρακνα* uocetur, non autem armenica, doracia, et  
 præcox: quarum fructus, tanetsi à quibusdam inter persica numerentur; quod forma tantum ijs similes uideantur;  
 40 non tamen uera sunt simpliciter persica, quæ propriè Græcis nonnullis *δόρακνα* μᾶλλον in uniuersum uocantur,  
 ut ipse etiam Cornarius testatur. Quippe nugaretur ineptè Paulus, si uellet quod rhodacena persicis præstarent,  
 cum nil aliud sint rhodacena, quam persica. His itaq; rationibus liceat nobis dicere, *δοράκια* Paulo nec *δόρακνα*  
 12, nec duracina designare, sed præcociis, siue armeniici mali genus sibi peculiare. Sed iam ad Plinium uenio, cui  
 duracina persica persicorum species sunt, quibus palma inter omnes, non autem genus, quemadmodum et duracina  
 cerasa, et uuae etiam duracinae inter uarias cerasorum, et uuarum species eodem Plinio, et Palladio describuntur.  
 Quod maxime arguit, aliud eisdem designare duracina, aliud uerò Græcis *δόρακνα*, quod uerbum hoc uniuersaliter  
 de omni persico prædicetur, non autem de aliqua particulari specie. Neq; ut ait Cornarius, uocat nostra ætas quæ-  
 dam persica mala duracina, quod osse cæteris duriora sint, sed antiquos secuta, quod pulpæ consistentia gustui gra-  
 50 tiora sese offerant, et longiori tempore perdurent. Quod quidem palam facit Plinius lib. XIII. cap. III. cum ait.  
 Duracina uua sine ullis uasis in uite seruabilis est: tanta est contra frigora, æstus, tempestatesq; firmitas. Hanc et  
 Columella prætulit in cibis. Postremo quod rhodacene arbor, persicam arborem in uniuersum significet, cum Cor-  
 narius ipse id firmiter asserat, opus sane non esset, hoc pluribus comprobare. Sed ne fortassis putaret sibi ipsi non esse  
 adhibendam fidem, Aëtium consulat, Constantinum Cæsarem, et Simeonem Setbi inter recentiores Græcos. Siqui-  
 dem ij pluribus in locis manifestè demonstrant, nil aliud per Rhodacenam se intellexisse, quam ueram, legitimamq;  
 persici plantam. Persicorum omne genus dannauit Galenus libro 11. de alimentorum facultatibus, ut prauis succi,  
 et quæ facile corrumpantur, ac noxam uentriculo inferant: quapropter Persica primis mensis semper edenda  
 præcipi. Quæ ego certè nescio, ex quorum scriptis deprompserit Plinius, quod innocua expetantur ægris. Nisi  
 60 fuisse et ipse pro persico perseum deceptus acceperit, quemadmodum fecere recentiorum nonnulli. Persici flo-  
 res esu aluum deiciunt, itemq; uomitiones cient, sed non absq; labore, ac detrimento. Non defuerunt, ut Marcellus  
 Florentinus, et Simphorianus Campegius in historialibus Galeni campis, qui existimauerint eadem plantam esse per-  
 sicam, et perseam, de qua agit Dioscorides in huiusce primi uoluminis calce. Quæ (ut tradunt) ea profecto est, quæ  
 in Perside exitiosa nascitur, etsi translata in Aegyptum cæli illius clementia mortiferam in salutarem uerterit natu-  
 ram, adeo ut in cibos recepta, tam sanis, quam morbofis prorsus habeatur innocua. Huius historiam latius prosequi-  
 tur Theophrastus libro quarto de plantarum historia (ut infra suo loco dicemus) quam si quis perlegerit, hanc à no-  
 stris persicis plurimum distidere comperiet. Manifesto etiamnum argumento sunt Dioscorides, et Galenus, quod  
 hæc plante inter se differant: quandoquidem ij de his ut forma, et genere differentibus seorsum suis scriptis tradi-  
 derunt. Armeniaca præterea, quæ Latini, ut in Dioscoride legitur, præcocia nominant, et Græci bericocia  
 pronunciant, nos in Hetruria Græcos imitati uulgò Bacoche, et Moniache corruptis uocabulis appellamus, ac si  
 diceremus Bericocia, et Armeniaca. Plura eorum uisuntur genera magnitudine potius, quam genere differentia.  
 Quod cuenit non modò cæli clementia, et terræ admodum frugiferæ dotibus; sed et cultorum mangonio: namq;

Cornarij opi-  
 no reproba-  
 ta.

Plinij lapsus.

Marcelli, &  
 Simphoriani  
 error.

Armeniacorum con-  
 sideratio.



Medicorū ma-  
lorum confi-  
deratio.

Theodori la-  
pius.

Citriorū mi-  
ra facultas.

Citriorum ui-  
res.

Citrij mali ui-  
res ex Gal.

ex multiplicata infusione maxime proficiunt. Porro omnia, ubi maturitatem senserint, aureo colore splendent. Idcirco Romanis uulgo Grisomele, quasi chrysomela dicuntur, eaque precipue, quae eo tractu cum persicis magnitudine certant. Maturescunt ineunte aestate mense iunio ante alios fugaces fructus, unde merito Praecocia dicta. Ea parum genere, et naturae dotibus à persicis disidere, testis est Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus: sed non item in uentriculo, ut illa, tam cito corrumpi. quanquam recentiores medici ea longe magis, quam persica, corruptioni obnoxia experientia contendunt. Insuper Medica mala, ut ex nomine cognosci potest, ex Media primion aduecta sunt. haec Latinis Citria, uel Citromala uocantur. Eorum arbor aut antiorum, ac limoniorum plantas magnitudine aequat. Folia, quae perpetuo ei uirescunt, aut antijs parum, uel nihil refragantur, foraminibus uisum ferè effugientibus ubique punctim traiecta. Quamobrem nesciuerim ego, qua ratione Theophrastus (ut Theodorus interpretatur) ei folia assignauerit portulacae, quae illi nullis notis consentiunt. Quo fit, ut admirari non liceat, si recentiorum plerique existimauerint Theophrasti codicem hoc in loco scaterere mendis, et quod ubi legitur ἀνδρῶν, id est, portulacae, legi potius debeat ἀράων, id est, araneorum tele. Quandoquidem ijs fortasse uidebatur, quod, cum mali Medicae folia sint ubique minutis admodum punctis perforata, ita ut linteoli spissioris modo sint transparentia, facile telis araneis comparari possent. In quorum sententia ego quoque persisti, quousque Plinius inde me reuocauit. Quippe cum accuratus Plinium perlegissem, comperi Theodorum, alioquin uirum et Graecum natione, et Latinae linguae peritissimum, male Theophrastum hoc in loco fuisse interpretatum, et uocabuli significatum minus rectè accepisse. siquidem, ut apertissime declarat Plinius lib. xiii. cap. xxii. Adrachne arbor est arbuto admodum similis. Inquit enim, Adrachnem omnes ferè Graeci portulacae nomine interpretantur, cum illa sit herba, et andrachne uocetur, unius literae diuersitate. Ceterum adrachne est sylvestris arbor, neque in planis nascens, similis unedoni, folio tantum minore, et nunquam decedente. Hinc ergo facile colligi potest, huius plantae, quae arbuti frondibus perpetuo uirescit laurinis similibus, Medicae mali folia comparasse Theophrastum. Citrea arbor omnibus horis pomifera est: alia namque matura cadunt, alia maturescunt, alia uero subnascuntur. Haec Plinij uero non erant in Italia, ut ipse testatur libro xii. cap. iiii. ubi inquit, saepius tentasse gentes, plantas Media transferre ad se, quae tamen ibi diu uiuere nequiuerunt, licet magna cultorum solertia fuerint enutritae. Nunc uero contra translatitiae factae sunt, atque cum Italo solo tantam inire gratiam, ut non modo in maritimis, sed in mediterraneis tum hortis, tum uiridarijs, tum etiam nobilium lacuum ripis frequentissima feliciter germinant. Postquam cultu, et diligentia Palladij (is enim proditur primum artem adinuenisse) factum est, ut ex Media in Italiam translate profuissent, ac propagauerint. Theophrasti etate. Citria mala nondum in ciborum usum uenerant, eorum testimonio, quae ipse libro quarto de plantarum historiae memoriae prodidit, sed tantum odoris gratia uestibus inferebantur. Quin et eorum usus erat antidoti loco contra uenena, ad quae demolienda semen praecipue efficacissimum habent. Refert Athenaeus, quod cum princeps quidam Aegyptius maleficos quosdam damnosissimos nebulones, quo suorum facinorum luerent poenas, assidibus secundum Aegyptiae leges in praedam exponendos, in Citrium in itinere, dum ad bestiarum pabulum ducerentur, comederunt, quod caupona quaedam uicem eorum dolis, atque miseriam, illis dederat. Mox cum in theatrum descendissent, et ab immanibus, ferocissimisque feris demorsis essent, nihil sane molestiae senserunt. Qua de re praefectus non paruum coepit admirationem, et à militibus diligenter inquirens, an antidotum aliquod praesumpsissent, certior factus est, citrium tantum ex integra simplicitate donatum, eos comedissee. Postridie uero iussit uni praebere, alteri denegari, et denuo in theatrum trudi ad supplicium. Quo facto, qui comederat, demorsus nihil incommodi passus est: alter uero à fera ictus undique liuidus factus, confectus interiit. Narrat praeterea Theopompus Chius duodequadragesimo suarum historiarum uolumine, Clearchum Heraeacleotam Ponti tyrannum multos ueneno necasse: sed ille, inquit, plures adhuc interfecisset, si populum praestantissima citrij uis latuisset. Seruantur Citria mala diutius incorrupta, si bordei, uel milij acceruis obruantur. Sed habita medicinae ratione, iam de eorum uiribus plenius differendum est. Citria itaque uenenis aduersantur, eorumque maxime semen. Citrij decoctum collutione, horis balitum commendat, suauitatemque accersit. Ipsa autem integra uestiarijs condita, uestes non modo gratissimo odore perfundunt; sed eas etiam à tineis, et blattis uindicant. Si cruda tamen manduntur, non facile coctioni obediunt: quin et crassum generant succum: ob hoc uesci ijs melle, aut saccharo conditis satius est, quod uentriculum commodè calefaciant, ac roborent: quauis haec nostra etas gale nimium indulgens in cibis citria cruda praeferat cum assatis carnibus esitata. Citria aduersus atram bilem, et morbos maestos, quos illa excitat, opitulantur. Semen priuatim scorpionum ictibus et potum, et appositum mirifice medetur. Acidus eorum succus flauam reprimat bilem, et cetique pestis contagia. Proinde recentiores medici ad febres pestilentes serapijs ex eo confectis feliciter utuntur. Ea principem in cibis obtinent locum, quae in lacus Benaci ripis proueniunt, quae etsi parum mala Limonia dicta magnitudine superent; maiorem tamen ceteris ab ore inueniunt gratiam. Quae uero ex Liguriae uiridarijs, et Adriatici, et Aegei pelagi insulis, alijsque locis afferuntur, etsi mollepeponi modo crasseant, speciosaque magnitudine excellent, cum tamen insipido gustu non multum placeant in cibis non aequè ac illa, praestant: uerum quod pulpa copiosiore consistit, officinis expetuntur saccharo, uel melle assensae. Citrij mali meminit Galenus lib. vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Mali medicae fructus non amplius malum medicum, sed ab omnibus Citrium nuncupari adsolet. In semine quidem uincetentem habet qualitatem acidam, et siccam; ut ipsum tertij sit ordinis resiccantium, refrigerantiumque. In cortice uero itidem desiccantem temperiem est sortitus, non parum tamen habentem acrimoniam: proinde desiccet hic secundo excessu non tamen frigidus est, sed aut temperatus, aut paulò infrà. Porro caro eius pariter crassi succi est, et pituitosa, frigidaque: nam et ipsa editur, sicut et cortex. Semen omne edi ineptum est, tum humidum illud, et acidum, de quo primion duffer-

et tum nucleus, qui in illo inuenitur, id quod re uera semen est. Hic amarus est, et digerendi uidelicet, siccandi; scilicet caliditatem obtinens, secundo quodammodo ordine à temperatis recedens. Folia uero denique exiccandi, ac digerendi sunt obtinent. haftenus Galenus. Vbi animaduertendum est; quod cum initio capitis inquit, In semine quidem iuncetur habet qualitatem acidam, et siccam; ut ipsum tertij sit ordinis reficcantium, ac refrigerantium, Galenus non de nucleis intellexit, neque de uero eorum semine; sed tantum de acido Citrij succo, in cuius medio ubique includitur semen. Eam autem fuisse in hoc Galeni sententiam, eius uerba in calce ferè capitis ostendunt, quæ ita sonant. Semen omne est inepsum est, tum humidum illud, et acidum, de quo primum differui: tum nucleus, qui in illo inuenitur, id quod re uera semen est. Hic amarus est, et discutit, hoc est calefacit, et exicat secundo recessu. Quam rem male, meo quidem iudicio, affectus Auicenna, utpote qui non rectè distinxerit, neque hac in re planè Galeni sententiam acceperit, libro suorum canonum secundo semini Citrij secundam calidiorum, et siccorum sedem assignauit: tractatu uero, quem cordis uiribus dicauit, eidem tertiam frigidorum, et siccorum classem adscripsit, nullum quidem uerbum faciens de acido Citrij succo, quem à Galeno sub seminis nomine comprehensum fuisse demonstrauimus. Non longe natura, et uiribus à citrij distans mala LIMONIA, et AVRANTIA dicta, et illa, quæ ADAMI poma uulgò vocantur, nos uero Lomie dicimus: tanetsi Limonia, cum sint gustu omnibus ijs speciebus acidiora, ob id succo et frigidiore, et sicciore esse, argumento duci possit. Quin et Aurantia cortice calidiora censenda sunt, quandoquidem is reliquis acrior, atque amarior gustatu deprehenditur. Aurantium (quemadmodum etiam de punice superius diximus) in Italia tria obseruantur genera, dulcia, acida, et uiuolenta, siue mixta. Dulcia in omnibus partibus exaltant. Aliorum uero succus refrigerat, prout maiore, seu minore referta sunt aciditate. Quocirca febricitantibus ad restinguendam sitim, acida quidem, et uiuolenta, non autem dulcia sunt exhibenda. Fit è Limoniorum succo, sicut et citriorum, serapium ad restinguendum bilis feruorem non inutile. Item et ad pestilentes febres, et eas, quæ contagione non uascent. Aquasque è Limoniorum succo calentis aquæ balneo, et uitreis organis extrahitur, præterquam quod mulieribus expetitur pro fuco ad faciem expoliendam, utiligines ubicunque sint, et totius corporis maculas emendat, uaros delet, et acaros interimit. Serapijs admixta febribus acutis, et contagiosis mirè succurrit. Epota uentris tinea enecat: id quod etiam præstat succus recenter expressus, uncie pondere potus. Ceterum non parum laboris impendisse uidetur Brasauolus in præfatione sui de simplicium examine libri, ut doceret, unde emanauerit Arantium uocabulum. Sed licet ibi plura de eius origine referat; ea tamen, meo quidem iudicio, non multum nomini quadrant. Quandoquidem ego potius existimauerim, uulgò Arantia, quasi Aurantia, altera expuncta litera, dicta fuisse. Nam cum hæc poma auri colore reluceant, ab auro meritò nomen accepisse uidentur: unde, quantum equidem reor, Aurantia, hoc est, aurea mala dicta fuisse.

Auicenna notatur.

Limonia, Aurantia, & Adami poma.

ΑΠΙΛΑ. ΠΥΡΑ. ΠΥΡΟΡΟΝ

CAP. CXXXII.

ΠΥΡΟΡΟΝ multa genera. Quæ tamen omnia adstringunt: proinde adduntur conuenienter in repellentia cataplasmata. Decoctum è siccis, & cruda ipsa aluum sistunt: ieiunos esitata lædunt. Achras pyrastri genus est, quod tardissimè maturescit. Vim pyro adstringentio rem habet, & ad eadem conuenit. stringunt etiam eius folia. Ligni pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strangulant. Aiunt fungos, si syluestria pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

QVONIAM Pyra uulgatissima sunt non modò in Italia, sed ubique in tota Europa; ideo superuacaneum duxi eorum arbores per historiam explicare. Multa, ac uaria apud nos Pyrorum numerantur genera, quemadmodum et apud antiquos. Qui, ut Plinius refert libro, et capite xv. celebrauerunt superba, salernana, decumiana, dollobelliana, pompeiana, liceriana, seueriana, tyranniana, fauoniana, laticiana, antiana, tiberiana, signina, purpurea, sementina, laurea, amphorina, coriolana, cucurbitana, et alia, quorum enumeratio longa foret. Quas sanè uarias appellationes mutuati sunt, uel ab hominibus, qui primum ea in ciborum usum reuocauerunt; uel à locis, unde uenerant; aut à notis, quas aliquibus fructibus acceptas referebant; aut à colore proprio; aut à tempore, in quo ab arboribus decerpebantur. In hoc itaque nostri quoque Hetrusci antiquorum consuetudinem secuti, uarijs nominibus à diuersis inditis causis sua Pyra uulgò appellant moschatelle, giugnole, ciampoline, roggie, ghiacciuole, spinose, quæ drane, carouelle, papali, san Nicolo, durelle, zuccae, campane, uernateccie, gentili, porcine, sementine, et plura alia habent alijs nomenclaturis appellata. Ceterum si quis uellet in nostras

Pyrorum consideratione.



Pyrorum facultas.

Pyrorum uires ex Gal.

tibus uterum Pyra collatione assequi, operæ pretium esset, ut unumquodq; eorum genus peculiarem, perspicuam habuisset descriptionem: quandoquidem fieri non potest, ut ex sola nomenclatura innotescant. Porro in unum de eorum uiribus differentes, dicamus, sicuti etiam de malis diximus, quod pyrorum facultates, ex saporibus gustu dignoscuntur: cum dulcia natura distent ab acerbis, acidis, austeris, et ab his, quæ unum, uel plures præ se ferunt saporibus: et contra, hæc deinceps ab illis sint diuersa. Pyra (ut scriptum reliquit Galenus libro v. simplicium medicamentorum) esu stomacho grata sunt, quin et uim habent exiccandi. Atque syluestribus magis adstringentis facultas inest: ob id etiam magis præstant contra fluxiones. Et lib. 11. de alimentorum facultatibus ita scribit. Quæ de malis diximus, si omnia ad pyra, et pumica transferantur, nihil nouo alio super his sermone opus erit. Non in ijs quoq; alia austera tantum, uel acerbæ apparent: ueluti quedam acida, quedam dulcia, quedam demique exhorum mixture composita: sunt quæ nullam penitus huiusmodi qualitatem excuperantem habent: quos fit, ut cum quæ sint, ac bebetia, nulla roborandi ui polleant. Talis igitur omnino pyrorum usus, qualis malorum. At pyris, præsertimq; grandibus, quæ apud nos menate uocantur, aliqua alendi facultas donata est. Proinde ea secta in rotas orbiculos, siccataq; reponunt. Quibus coctis per hyemem, et uer, cum fames est, ciborum parum nutrimentum necesse uestuntur.

### MESPILVS PRIMA.

### MESPILVS ALTERA.



### ΜΕΣΠΙΛΟΝ. MESPILVS. *Mespilum* CAP. CXXXIII.

MESPILVS, quæ à nonnullis aronia uocatur, spinosa arbor est, folio t pyracanthæ, siue oxyacanthæ. Fert pomum suaue, exiguo malo non dissimile, tribus intus ossiculis: quæ ex causa id nonnulli tricoccon appellauere. Tardè maturescit, esu adstringit, stomacho gratum est, aluumque supprimit. Alterum mespili genus in Italia nascitur, quod aliqui setanium, alij epimelida uocant. Arbor folijs mali, sed minoribus. Pomum fert rotundum, esui aptum, umbilico latiore: quod adstringit, feròque maturescit.

Mespilorum consideratio.

MESPILORVM hic à Dioscoride duo recensentur genera: quorum illa, quæ folijs est pyracanthæ, siue oxyacanthæ nostratibus baid quaquam adstipulari uidetur. Quippe (ut sensu patet) nostrates Mespili folijs oblongis, laurinis ferè similibus uirent, non autem apud modo per ambitum incisjs, ueluti oxyacantha. Fructum ferè quidem gustatu suaue, sed potius imucundum, quod acerbus sit, et austerus. Quin et is quina includit ossiculis, non sanè terna, ut prano Mespilorum generi assignat Dioscorides. Ceterum si fructum profert Italia, quæ priori Mespilo legitime ascribi posset, eius nimirum arboris erit, quæ Neapoli, ubi copiosa feritur in hortis, uridijs, et in

reis, Azarolo uulgò nominatur. Huius plures plantas uidi ego primum Neapoli in amplissimo uiridario Pompei Car-  
 dinalis à Columna uia, qua itur ad poetæ Maronis sepulcrum, uel ut uulgò dicunt à Pe de grotta. Arbor est mediocris  
 proceritate, cortice, ac materia pruno haud abfimilis: spinis horrida, non tamen admodum acutis: folijs laciniatis,  
 apij emulis. Ex quo perspicitur, eos Dioscoridis codices hoc loco scaterere mendis, in quibus deprauatè legitur,  
 hanc arborem folijs esse pyracanthæ, non autem, ut legitime legi debet, oxyacanthæ. Nam (ut superius suo loco ex-  
 plicauimus) oxyacanthæ folijs germinat dissectis; pyracanthæ uerò buxi modo oblongis. Cuius rei illud manifesto  
 est indicio, quod de hoc Mespilorum genere posteritatis memorie prodidit Theophrastus libro 111. capite 111.  
 cum inquit. Magnitudine arbor ista excellit, gyroq; comatur. Folium magna ex parte infissum, quod uel apium par-  
 te postrema imitatur, ampliore figura, quodq; promissum, neruosum, apio tenuius, oblongius, totumq; circumsum-  
 10 est, & pediculo tenui, ac longo dependet: antequàm decidat, uehementer rubet. Radice numerosa, altaq; arbor co-  
 heret: ob id diuturna, & inextirpabilis est. hæc tamen uerba certo sunt argumento, eam  
 Dioscoridis lectionem planè deprauatam esse, quæ huic Mespilorum generi pyracanthæ frondes reddit. Quinetiam  
 folium explicant oxyacanthæ à Dioscoride eius in historia silentio dissimulatum, quod scilicet apij modo per am-  
 bum sit dissectum. Sed illud etiam non ignorandum, tantam oxyacanthæ cum hac Mespilo intercessisse cognatio-  
 nem, ut si Mespilus hæc oxyacanthæ inseratur, omnium speciosissima proueniat, & longè magis fructifera euadat.  
 Sed ut redeamus eò, unde codicis mendæ, quæ librariorum incuria est, nos diduxerant, dicimus, quod Azaroli  
 uocata fructus nullis prorsus notis reclamant Mespilis, quæ primo loco à Dioscoride descripta sunt. Siquidem ij  
 exigui sunt, terna includunt oscicula alijs Mespilis duriora; quanquam magnitudine, & forma dissimili, seram  
 sentiant maturitatem, ori grati habentur, stomacho non iniucundi, & reliquis deniq; notis, ac qualitatibus illo-  
 20 rum speciem adeò representant, ut non aliud hæc in re asserendum putauerim, quàm quod idem sint Azarola, &  
 Dioscoridis Mespila à quibusdam Aronia dicta. Quæ porro Mespili aliquibus Setanæ, & Epimelides appellan-  
 tur, uulgariibus nostratibus collatæ, nihil inter se dissentire comperiuntur. Quapropter nil mirum scriptis mandasse,  
 Dioscoridem, alterum hoc Mespili genus copiosum in Italia nasci. Veruntamen Galenum Epimelidis appellatione  
 aliam arborem à nostratibus Mespilis diuersam sumpsisse, liquidò constat. Quandoquidem libro vi. simplicium me-  
 dicamentorum scribit, eius fructum acerbum esse, & uentriculo noxium. Epimelida autem à rusticis Italie unedonè  
 nominari. Hoc insuper illud confirmat, quod Galenus de utroq; Mespilorum genere, seorsum diuersis capitibus tra-  
 diderit. In Mespilorum historia Serapio aperte hallucinariprehenditur: quippe qui sorbi titulo omnia refe-  
 rat, quæ de utroq; Mespilorum genere scripsit Dioscorides. Verum etsi hæc in re is quidem aberret; declarat tamen  
 primum Mespili genus nobis Italis Mauritanos secutis Azarolum esse: namq; is Arabico idiomate Mespila Zaror  
 30 appellat. Mespilorum uires recensuit Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Mespili fru-  
 ctum, alij tricoccum nominant, quod tria intus in uniuersum gerat grana, quorum unumquodq; arboris est semen, ceu  
 ea quæ in malis inueniuntur, ipsius mali; & acini, ipsius uitis; & ficus, minuta illa grana, quas cenchramidæ Græci  
 uocant. Arboris huius fructus admodum acerbus est, uixq; edi potest, uentrem strenuè coercens. Quin & in germi-  
 nibus, & folijs acerbæ hæc qualitas non pauca reperitur. Et libro 11. de alimentorum facultatibus sic inquit.  
 Horum eadem quoq; prædictis est ratio. Ambo enim adstringunt, sed multò fortius Mespila, quàm sorba. Quamob-  
 rem alio fluenti in cibo accommodatissimè exhibentur: sorba tamen ipsis sunt suauiora. Prorsus namq; nihil acerbi,  
 uti Mespila obtinent, sed succus eorum citrà acerbicatem austerus est. Illud porro neminem puto latere, hæc omnia  
 perire, non affatim, ut ficus, uixq; esse comedenda: nequaquam enim eis, ut cibus, sed ut medicamenti potius indige-  
 mus. Hec nouisse longè tibi fuerit utilius, quàm si primam huius dictionis ouon syllabam ab antiquis Atheniensibus  
 40 per o solam prolata, scriptamq; fuisse cognoscas.

Mespilus alte-  
ra.

Serap. lapsus.

Mespilorum  
uires ex Gal.

1 Ne uideatur hic temerè communem lectionem immutasse, quæ est pyracanthæ, lectorum admonere non alienum  
 duximus, uariam esse huius loci scripturam in Græcis tum impressis, tum uetustis exemplaribus. Verum ea nobis ma-  
 gis probanda uisa sunt, quæ habent pyracantham, uel oxyacantham (idem enim esse putamus) innixi rationibus, quas  
 in commentario adduximus.

## ΛΩΤΟΣ ΔΕΥΔΡΟΝ. LOTVS ARBOR.

## CAP. CXXXIIII.


LOTVS arbor est uastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maiorem, dulcem, cibus gratam,  
 stomacho facilem. Aluum sistit baccis. Ramentorum ligni decoctum siue potu, siue infusione  
 dysentericis, ac foeminis fluxione uuluarum laborantibus, auxilio est: rufat capillos: citam aluum  
 50 cohibet.

LOTVS arbor Latinis Celtis uocatur. Differentiæ generum plures (ut libro & capite quarto de plantarum  
 historia prodidit Theophrastus) eaq; maxime fructuum uarietate inter se discreta produntur. Sed Loti proprium ge-  
 nus conjungit pyri magnitudine, aut paulò minore: folijs per ambitum serratis, alioquin ilicis uiderentur. Fructum  
 proferit magnitudine fabæ, qui uuarum modo maturefcit, uariè colores immutans, gustatu prædulcis, suauis, atq; etiã  
 stomacho salubris. Gignitur alter absq; interiore nucleo, qui non modò ceteris præfertur, quod uentriculo suauior  
 sit; sed etiam quod uinum reddat. Numerosa hæc arbor in Phariide insula, ideo Lotophagia uocata, quod inibi Loti  
 fructu uictit incole. Ceterum non minor Lotorū copia in continenti, sed longè largior: plurima enim hæc in A-  
 frica, ubi tanta fructus & arboris copia narratur, ut diebus pluribus exercitum Ophelli Carthaginem petentis in cõ-  
 60 muniu defectu, hoc tantum fructu uictitasse, ex historijs habeatur. Scribit Plinius libro xiiii. capite xvi. Lotum  
 arborem etate sua extitisse Italie familiarem, ac uulgò cognitam, licet mutato solo, cœliq; climate, unde nobis allata  
 est, à

Loti arboris  
historia.

## L O T V S.

Lotus Italica.



est à grata illa fructuum dulcedine degenerauerit. Dioscorides non alijs notis reddidit Lotum, quàm quòd arbor esset ualde proceritatis. Cui subscribens Plinius lib. xvi. cap. xxx. sic inquit. Lotos. præcipuè domibus expetitur, ramorum petulantia, letissima expatiantium umbra, et in uicinas domos saepe transfiliatum. Item eodem loco ita scribit. Loti fructus sylvestris quidem est, sed cerasorij penè natura. Nulli breuior opacitas, nec austeriorem hyeme decidentibus folijs. Nulli cortex iucundior, aut oculos excipiens blandius. Nulli rami longiores, ualidioresq; aut plures, ut dixisse totidem arbores liceat. Cortice pelles tingunt, radice lanæ. Quamobrem putauerim ego, si modo hodie Lotus nascuntur in Italia, eum non aberrare, qui ueram lotum, præferim Dioscoridis, et Plinio, eam esse arborem dixerit, quæ in Tridentino, et Soritensi agro uulgò Bagolaræ uocatur: in Veronensi uerò, et in alijs quibusdam Italiae locis Perlaro. Siquidem licet harum arborum multe pyri magnitudinem, æquent; pleraque tamen conspiciuntur, quæ longè pyrum proceritate uincunt. He itaq; præterquam quòd caudice constant crassissimo, ramis latissimis in altitudinem se extollentibus; cortice spectantur leui colore in ceruleum nigrescente. Quo fit, ut is grato coloris aspectu respicientium oculos: mirum in modum ad se alliciat, ut tradidit Plinius. Folijs uirent ilici proximis, per ambitum serratis, æstatisq; quæ medio autumnio flaccescunt. Fructus eis cerasorum similitudine, qui ut illa, longiorè pediculo pendet. Is primo uiridis, mox in candidum flauescit, deinde per maturitatem rubescit, denique, postquam maturuerit, nigricat, gustu suauis, non ingratus. Quæ omnes huiusce arboris delineationes, ac notæ Theophrasti, Dioscoridis, et Plinii loto planè respondere uidentur. Quare non equidem diffitebor, Lotum quoque hoc æuo Italiae esse copiosum. Ceterum nesciuerim ego, quorum testimonio, et auctoritate fretus Ruellius lotum existimauerit plantam exiguam illam, quam Hetrusci uulgò Agrifolio dicunt, e cuius cortice (ut superius de paluro differentes diximus) uti ex uiburno nostro, uulgò uerò lantana, quidam uiscum conficiunt, quo aues capiuntur. Quæ sanè opinio tantum abest ab historia loti, quam ex Theophrasto, Plinioq; retulimus, ut etiam ei prorsus aduersetur. Quippe quoniam Agrifolium arbor est, perpetua uirens coma, folijs admodum peracutis aculeatis, exigua proceritate, et cortice uiridi: quæ notæ penitus loti descriptioni repugnant. Lotum scriptis tradidit Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, his uerbis. Lotus arbor non ita multa adstrictionis qualitatis est particeps, sed et tenuium partium est, et exiccatoria. Itaq; lignorum ipsorum ramenta muliebri commodantur profluuiis, et dysenterijs, et cæliaciis affectibus. Decoquantur uerò interim in aqua, interim in uino, nimirum prout usus poposcerit, nec infunduntur tantum, sed et bibuntur. Quinetiam quòd pilos defluentes cohibeat, non paruum signum est ipsam adstringentis esse cuiusdam, similiter mediocriter desiccantis facultatis. Deum quippe est et in sermone de ladano, eiusmodi esse facultatis oportere, quòd fluentes capillos esset cohibitura.

Ruellij error.

Loti uires ex Galeno.

tate fretus Ruellius lotum existimauerit plantam exiguam illam, quam Hetrusci uulgò Agrifolio dicunt, e cuius cortice (ut superius de paluro differentes diximus) uti ex uiburno nostro, uulgò uerò lantana, quidam uiscum conficiunt, quo aues capiuntur. Quæ sanè opinio tantum abest ab historia loti, quam ex Theophrasto, Plinioq; retulimus, ut etiam ei prorsus aduersetur. Quippe quoniam Agrifolium arbor est, perpetua uirens coma, folijs admodum peracutis aculeatis, exigua proceritate, et cortice uiridi: quæ notæ penitus loti descriptioni repugnant. Lotum scriptis tradidit Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, his uerbis. Lotus arbor non ita multa adstrictionis qualitatis est particeps, sed et tenuium partium est, et exiccatoria. Itaq; lignorum ipsorum ramenta muliebri commodantur profluuiis, et dysenterijs, et cæliaciis affectibus. Decoquantur uerò interim in aqua, interim in uino, nimirum prout usus poposcerit, nec infunduntur tantum, sed et bibuntur. Quinetiam quòd pilos defluentes cohibeat, non paruum signum est ipsam adstringentis esse cuiusdam, similiter mediocriter desiccantis facultatis. Deum quippe est et in sermone de ladano, eiusmodi esse facultatis oportere, quòd fluentes capillos esset cohibitura.

Cornus. CORNVS. CAP. CXXV.

CORNVS dura arbor est, baccas ferens oliuæ modo oblongas, quæ primùm uirent, dein per maturitatem rubescunt, aut ceræ colorem representant. In cibo adstringunt: profluuiis alui, atque dysenterix salutare, siue in edulio, siue in defruto exhibeantur. Muria, ut oliuæ, condiuntur. Saniem, quam uirentia folia torrendo refudarunt, impetigini conuenienter illinuntur.

Corni consideratio.

CORNVS arbor est uulgaris notitiæ. Ceterum (ut libro iii. de plantarum historia, capite xii. memorie prodidit Theophrastus) sexus in ea duplex inuenitur. Namq; consurgit mas duodecim cubitorum altitudine: folijs amygdale, nisi quòd pinguius, crassiusq;: cortice neruoso, et tenui: caudice non minus crasso. Fœmina uirgas paruas, sicut salix amercina, suo latere proferit, et fruticosior est. Nodos ambæ, perinde ac iutex, tum geminatos, tum uicem congruos habent. Materies mas excors, totaq; solida, cornibus densitate, firmitateq; similis, unde illi nomen. Fœmine uerò medullam continet, et mollior est, atq; cauatur: ob id ad uenabulorum usum inutilis. Qui Idam Troianam incolunt, marem sterilem dicunt; fœminam autem fructuosam. Nucleum fructus oliuæ similem habet, gustu dulcis, odoratuq; gratus. Flos oleæ, et floret, fructificatq; eodem modo, ut singulari pediculo plura proferat. In Macedonia uerò (ueluti etiam in Italia) ambæ fructiferae sunt: sed mas per æstatem, fœmina uerò per autumnum baccas maturat, huius tamen baccæ tantum mascule bonitate cedunt, ut mandi uix possint. Porro cauendum est, ne Corni arbores prope aluaria conferantur, uel à natura producta ibidem permittantur: quandoquidem apes flore



## CORNVS.



## SORBV.S.



eius degustato alio citata commoriuntur. At certe mirandum est, quod scriptis mandauerit Theophrastus, Cornum arborem amygdalæ folio uirescere, cum longè diuerso prorumpat. Eaq; propter dixerim ego, aut in Theophrasti exemplaribus hoc loco mendum subesse, aut in Ida monte prope Troiam tuam soli, tuam etiam celi magis aestuante natura, corno folia adeo restringi, ut amygdalæ quadantenus æmula uideantur: etsi, meo quidem iudicio, potius putandum sit, Theophrasti lectionem hoc in loco deprauatam esse. Fit ex baccarum pulpa quoddam obsonij genus, cydonitæ non dissimile. Quin & ex eorum decocto, & saccharo liquor ignis opere, & coctura concreuit, coagulaturq; qui præterquam quod gratissimo placeat gustu, datur utiliter dysentericis, ac foeminis mensium profluuio laborantibus. Corni uires memoria prædidi Galenus libro VII. de simplicium medicamentorum facultate, sic inueniens. Corni arboris fructus admodum acerbus est, esui aptus. Itaque mirum uideri non debet, ipsum ualenter uentrem restringere, sicut & mespila. Folia quoque, & germina gustu acerba sunt, ualenterq; desiccant. Itaque maxima uulnera glutinare possunt, potissimum durorum corporum: at paruis uulneribus, & mollioribus corporibus magis contraria sunt. Nam nimium ea contendunt, ac plus satis desiccant.

Theophrasti locus suspensus.

Cornorum usus in cibus.

Corni uires ex Galen.

## Οἶα. SORBA. CAP. CXXXVI.

SORBA colorem luteum referentia, priusquam maturecant, dissecta, & sole siccata manduntur, ut aluum fistant. Eadem est functio molitorum farinæ, si polente loco sumatur. Quod & decoctum eorum in potu præstat.

SORBA fructus sunt in Italia uulgatissimi, nullisq; non cogniti. Veruntamen illud non duxi prætereundum (ut hic nonnulla perstringam ex his, quæ de Sorbis latius tradit Theophrastus lib. III. cap. XII. de stirpium historia) quod in sorbo etiam maris, ac foemine differentia dignoscitur, certo quidem argumento, quod una sterilis sit; altera uero fructifera. Quinetiam in pomis discrimen, quod alia sint orbiculata, & succo odoratiore, dulcioreq; placeant: alia uero ouata, ut quæ etiam pyri effigiem representent, gustui acidiora, & asperiora prædictis, minusq; olentia. Sunt & syluatica Sorba, quæ maturitatem adeptæ ori non insuauia habentur. Hæc adstrictoria uero domesticis longè excellent; si tamen immatura insolentur. Sorba, testimonio Galeni tum libro VIII. simplicium medicamentorum, tum libro II. de alimentorum facultatibus, eandem adstringendi naturam præstant, quàm mespila, sed imbecilliore effectu. Vtraq; tamen in medico usu magis, quàm in cibus expetuntur; probanturq;.

Sorborum cōsideratio.

Sorborum uires ex Gal.

## Κοκκυμυλέα. PRVNVS. CAP. CXXXVII.

PRVNVS arbor est nota. Cuius pomum estur, sed stomachum malè habet, aluum mollit. Syriacæ pruna, & præcipuè quæ Damasci gignuntur, exiccata stomacho utilia sunt: aluum adstringunt. Folia pruni in uino decocta collutione, & gargarizatu, uiam gingiuas, & tonsillas fluxione laborantes reprimunt. Præstant idem syluestrium Prunorum baccæ, post maturitatem exiccata: eum sapa uero decoctæ stomacho utiliores redduntur, aluumque magis adstringunt. Gummi prunorum agglutinat: potum in uino calculos comminuit:

Prunorū con  
sideratio.

Galenī tutela  
contra Brasa-  
uolum.



Prunorum  
usus.

Sebesten con  
sideratio.

PRVNORVM differentie inexplicabiles ferè sunt. Sæ  
alia reperiuntur herbaceo colore persusa, alia rubeo, alia eburnea,  
alia luteo, alia purpureo. Quædam deinde magna, quædam uerò  
parua, quædam mediocria. Dulcia nonnulla, alia acida, alia mi-  
sa, alia dura, alia mollia. Alia deniq; rotunda, alia oblonga, alia  
ouata cõspiciuntur. Ceterum licet Dioscorides pruna Damasce-  
na sicca aluum sistere prodiderit; Galenus tamen aliter sensisse  
uidetur septimo simplicium censu, ubi sic inquit. Pruni fructus  
uentrem subducit; recens quidem plus, aridus uerò minus. Sed  
haud scio, cur Dioscorides pruna Damascena siccata uentrem si-  
stere dicat, cum et ipsa perspicuo soluant, minus tamen ijs, que  
importantur ex iberia. hactenus Galenus. Atqui in hoc Bra-  
sauolus Ferrariensis medicus nostræ etatis clarissimus, aperte re-  
fragatur Galeno in simplicium medicamentorum omnium perispi-  
cimo æquè atq; doctissimo, suo de simplicium examine, ubi Galeni  
scribit hac in re, non Dioscoridem fuisse deceptum. Quippe quod  
Galenus non animaduertit, Dioscoridem de siccis prunis Damas-  
cenis loqui, quæ præterquam quòd sicca sunt, gustu etiam acida  
sentiuntur, et adstringentia. Quæ quidem in re Brasauolus potius  
(pace sua dixerim) planè hallucinatus, et à recto ueritatis tra-  
mite lapsus deprehenditur. Quandoquidem non meminerit, quòd  
non solum pruna Damascena sicca, sed etiam alia quàm plurima  
simplicia medicamenta deiectionem stimulat et adstringentem vim  
obtinent, ut manifesto testimonio sunt tamarindi, et myrobalana  
omne genus: item rhabarbarum, et alia pleraq; que præ-  
ter id quòd primum aluum deiciant, postea illam adstrictam re-  
linquunt. Quam sanè prunorum facultatem etsi Brasauolus non

perpenderit; Galenus tamen optimè nouit, et expertus est. Idcirco cum loco citato pruna Damascena sicca tra-  
diere tradiderit, eadem etiam adstrictoria ui polleat, lib. 11. de aliment. facultatibus his uerbis attestatur. Prunis æqui  
ac ficibus concessum est, ut uel exiccata utilia permaneant. Damascenis à Damasco Syriæ monte, in quo nascuntur,  
appellatis, prima laus bonitatis magna hominum opinione deferretur. Proxima ijs, quæ in iberia, et Hispania proce-  
nunt. Verum hæc quidem nihil adstrictionis præ se ferunt: nonnulla uerò Damascenorum uel plurimum. Probe-  
tissima in his sunt, quæ cum mediocri adstrictione, magna, laxaq; sunt. At parua, dura, acerbq; et in cibo praua sunt,  
et uentri subducendo minus idonea. hæc Galenus. Ex cuius uerbis satis constare arbitror, nulla ferè ratione, nec u-  
si inualidis admodum argumentis Brasauolum adductum fuisse, ut hac in re Galenum ipsum accusaret, quasi Galenus  
omnino ignorauerit, quam sapores, quam odores, quam ceteræ deniq; non fructuum modo; sed et omnium ferè simpli-  
cium medicamentorum qualitates naturam, et facultatem sortitæ essent. De quibus omnibus adeò doctè, et copiose  
disputauit, ut parem unquam repperit neminem, ut omnibus perspicuum est ex suis primis quinque libris, quos de sim-  
plicium medic. facultatibus accuratissimè conscripsit. Huic sententiæ æquè et rationibus accedit quoque communis  
medicorum experientia: nempe quòd compertum sit, pruna Damascena laudatissima, ijs similia, quæ Galeno præ-  
feruntur, esu uentrem soluere non inefficaciter, adstricta aluo postmodum relictæ tamarindorum, et myrobalanorum  
modo. Sic igitur Galenum à Brasauoli reprehensione seruasse uolumus. Sed si Dioscoridem quoq; tueri uelimus, ad  
aliud dicendum putauerim, quàm quòd pruna Damascena siccata aluum adstringere tradiderit, ut referuntur et alia,  
quæ minus adstringunt: non tamen, quòd uoluerit, ea esse deiectionis facultatis expertia. Porro pruna bilem de-  
ciunt: proinde ea utiliter usurpant medici ad febres, aliosq; biliosos affectus. Quin et seplasiarijs expetitur: quippe  
qui ex ijs quotannis electaria, intinctus, liquoresq; uarios parare consueuerint, quibus non modo sani gustu non ingra-  
to delectantur; sed etiam qui languent, refocillantur. Habetur et in Aegypto prunus (ut Theophrastus est autor lib.  
111. cap. 111. de plant. historia) insignis magnitudinis, fructum ferens natura, et magnitudine messilibus proximam;  
nisi quòd rotundum nucleum habet. Florere incipit mense iulio, fructum circa brumam perficit, nec folia dimittit.  
Qui circa agrum Thebanum habitant, propter arboris copiam fructum siccant, et osse exempto tundunt, offisq;  
faciunt. Non disident effigie à prunis, nec dissimili admodum sunt facultate fructus ijs, quos officinæ Arabes siccæ  
te SEBESTEN nominant, quiq; Græcis Myxa, et Myxaria uocantur. Quòd etsi Dioscorides, et Galenus  
horum suis monumentis non meminerint; de ijs tamen à posterioribus Græcis, nempe Paulo, Aëtio, Psello, et Aq-  
uario frequens facta fuit mentio. Arborea feri in Italia cœperunt Plinij ætate: nunc uerò non ubiq; familiares, sed re-  
ris admodum hortis, et uiridarijs uiuent. Arbor est pruno ualde similis, ei tamen magnitudine cedens. Cortex cor-  
dici candicat, ramus uerò uiret. Folijs comatur rotundis, ac firmis. Fructus adolescunt exigui pruni magnitudine,  
nucleo intus triangulari forma, qui satis bæccæ proportionem respondet. Fructus maturitatem adepti, in atrium ure-  
scent,

sunt, quæ sunt prædulci, ac lenta, tenaciq; pulpa. Ex qua Syri, & Aegyptij uiscum conficiunt, quod Venetijs. *Sebestenam* appellant, aucupijs commodissimum. Argumento sunt nuclei, qui in eo reperiuntur, color, & dulces. *Sebestena* quæ ista deprehenditur. Pollent autem deiectoria facultate, non secus atq; pruna, tam Græcorum, quam Arabum testimonio: id quod etiam comprobatur quotidiana medicorum experientia. Tamen si contrarium senserit Fuchsij medicus hac nostra ætate celeberrimus: quippe qui suis in paradoxis cap. xxv. ut fortasse in Arabes inue-  
nitur, quos ubiq; ferè odisse uidetur, nullam *Sebestenis* deiectoriam esse facultatem contendit, quin potius ea adstri-  
ctoria polleat. Sed longe dissentit ab eo opinio nostra, & iulgata, comprobataq; continua medicorum experien-  
tia. Quandoquidem quod *Sebestena* assumpta in medicamentis aluum cieant, testis in primis est Paulus Aegineta, qui  
libro vii. de ijs uerbis faciens, sic inquit. *Myxa* arboris fructus est, minor quidem prunis, facultate uerò consimi-  
lis. Ex quibus Pauli uerbis elicitur, quod ita uentrem molliant *Sebestena*, quemadmodum pruna. de quibus idem dis-  
serens eodem libro Galenus secutus: Pruni fructus, inquit, uentrem subducit, recens quidem magis, aridus uerò mi-  
nus. Neq; huius rei nescius Actuarius hæc pluribus commiscet medicamentis, quæ bilem eiiciunt, ut uidere est suo  
de compositione medicamentorum compendio. Eorum insuper deiiciende alui facultatem maximè comprobât uul-  
garis experientia, clarissimum omnium lumen. Siquidem (ut iam millies expertus sum) eorum pulpa drachmiarum  
decem pondere deuorata, aut ad summum duodecim, eosdem ferè præbet effectus, quos Aegyptia siliqua casta uocata.  
His ergo rationibus, & auctoritatibus adducor, ut illam quoq; Fuchsij opinionem minùs probem, quæ est, quod ele-  
ctum de *Sebesten* officinis dictum uentrem deiiciat, non *Sebestenorum* facultate, sed aliorum simplicium medica-  
mentorum deiectoria uel prædiorum, quæ ijs adduntur. Nam si id per se præstant, ut ostendimus, idem etiam alijs  
coniuncta præstarent. Quare, ut ingenie dicam quod sentio, non Fuchsius tantum, quem alioquin semper admira-  
tus sum, ut uerum doctissimum, & de medicina amplissimè meritum; sed plerique alij, nunquam adeò Græcis addicti  
esse deberent, ut prorsus à Mauritana familia desciscerent, nonnunquam & rationes, & experimenta, firma nostræ  
artis, & ueritatis præsidia, cogantur deserere. Sed ut eò nostra reuertatur oratio, unde diuerterat, dicimus auctori-  
tatibus, & experientia freti, *Sebestena* deiectoriam uim habere. Quocirca utiliter dantur ex bile febricitantibus, at-  
que (ut autores sunt Paulus, Aëtius, Psellus, & Actuarius) lingue asperitatem mirificè leniunt: quin & pectori,  
æque tussi opitulantiur: uentris tineas pellunt: urinae ardoribus à bile, uel salsa pituita provenientes maximè opem  
præstant. Ceterum quoniam *Sebestena* nobis *ΖΙΖΥΡΗΑ*, quæ officinis *Iuiuba* dicuntur, in mentem reuocau-  
imus, cum eorum Dioscorides nusquam, quod extet, meminerit, duximus non fore quidem ab re, hic id de eorum uiribus  
differere, quod à Galeno, qui ea *Serica* nominat (si tamen *Serica* esse Galeno *Iuiuba* asserere liceat) libro i. de ali-  
mentorum facultatibus proditur, ubi sic ait. Ne his quidem quid ad tuendam sanitatem, morbosue profligandos ual-  
deant, testis esse possum. Nam ab insolentibus, ac effrenatis pueris, & mulieribus cibo duntaxat expetuntur. Exi-  
guum præbent alimentum, difficile concoquantur: ideo stomacho non sunt utilia. Eandem sententiam ex ipso Gale-  
no scriptam reddidit Auicenna, cui tantum illud addidit, quod ea ad pectoris, atq; pulmonis uitia conferant, & quod  
quidam (ut ferunt) cum maximè renum, tum etiam uesicæ affectibus prodesse censeant. Verim quoniam (ut di-  
ximus) scribit Galenus, nullam se adinuenisse in *Sericis* facultatem ad corporum affectus curandos, hinc capta occasi-  
one Fuchsius iterum digladiatur, honesto quidem studio, non modò cum Auicenna; sed etiam cum cæteris Arabicæ  
familie autoribus, asserens id omne, quod de *zizyphis* Arabes suis monumentis commendarunt, omnino falsum esse,  
& à ueritate alienum. In quo tamen si uitium aliquod Mauritani ascribendum est, illud quoque Græcis posterioribus  
ascribendum erit. Quandoquidem constat, Actuarium & Græcum, & medicum peritissimum suo de composi-  
tione medicamentorum uolumine, *zizypha* ad pectoris uitia compositis medicamentis compluribus admiscere, ubi sci-  
licet ex calidorum humorum redundantia morbus emergerit: item eadem in his usurpare, quæ bilem deiiciunt. Quod  
& Nicolaum Alexandrinum in suis compositis medicamentis, persæpe fecisse comperio. Ideoq; nil mirum, si ad hæc  
omnia præstare *zizypha* tradiderit Auicenna: nanque suo lentore, ac sua, qua ægrè permeant, crassitie (ut rei uerita-  
tis adstruit) sanguinem crassum reddunt, qui flauæ bilis redundantia tenuior, quam par sit, redditur. Cum itaq; tra-  
dit Auicenna, *zizypha* & pectori, & pulmone prodesse, non temerè quidem eum locutum esse crediderim (ut fortas-  
se aliqui putant) sed illud ea ratione scripsisse, ut in morbis tantum calidis, & acutis intelligendum esset, in quibus  
rederet utiliter *zizyphis* uti possint & debeant. Id quod eius uerba aperte indicant, cum dicat, quod sanguinè incras-  
cet. Neque enim erat Auicenna adeò ignarus, ut datis iam præmissis nesciret subinde conclusionem inferre. Sed  
certè pulchrum, atque tutum esse iudicio, quod quandoque cum mortuis luctemur. Et quoniam (ut sæpe antea pola-  
uimus) nulli medicorum sectæ, nec huic magis, quam illi noster animus erit addictus, sed ueritati propagandæ,  
etiam ex prædictis rationibus cum Auicenna, eos meo quidem iudicio, labi, ac falli, qui *zizyphis* sanguinem expura-  
tori, ac abstergi contendunt, quicq; ea ijs commiscet medicamentis, quæ pectoris affectibus frigiditate obortis para-  
nolent, ut recentiorum nonnulli, qui *zizyphis* nulla eorum habita ratione ad quoduis pectoris uitium indifferen-  
ter uentur, & plerumque cum maximo ægrotantium discrimine. Ceterum an Galeno *Serica* *zizypha* sint, du-  
bitandum sane fuerit, cum aliud Plinio fuisse reperiatur lib. xv. cap. xiiii. ubi sic habet. Aequè peregrina sunt  
*zizypha* & tuberes, quæ & ipsa non pridem uenere in Italiam. Hæc ex Africa, illa ex Syria Sextus Papinius, quæ  
cosalem uidimus, primum utique attulit, diu Augusti nouissimis temporibus in castrorum aggeribus sata, baccis  
penuriam, quam malis: sed aggeribus præcipuè decora, quoniam & tecta iam syluæ scandunt. Tuberum duo gene-  
ra, candidum à colore *Sericum* dictum. Et libro xv. cap. xxv. Ab amygdala, inquit, proxime florent armeniaca,  
etiam tuberes, & præcoces: illæ peregrinæ, hæc coactæ. Item libro xv. capite x. Et *zizypha*, ait, grano seruntur  
mensis aprilis. Tuberes melius inferuntur in pruno syluestri, & malo cotoneo, & in calabrice, ea est spina sylue-  
stris.

Fuchsij opi-  
nio reproba-  
ta.

*Zizyphorum*  
consideratio.


Auicennæ de  
sensu contra  
Fuchium.

stris. hęc Plinius. Columnella tamen tuberum nusquam, quod legerim, meminit, sed xxyphorum libro ix. cap. iiii. duo tradidit genera, quod harum floribus maxime delectentur apes, nempe rutillum, & album. Quo fit, ut suspicandum sit, Plinij codicem hoc in loco deprauatum esse. Illud suffusionem auxit, quod inter Arabes Auccens, & Græcos recentiores Simeon Sethi, duas xxyphi species scriptis mandauerunt, & quod tamen in Plinio ueritas traditur xxyphus. Verum cum Actuarius, Nicolao Myresico, & Simeone Sethi ξίφηρα, ξίφυρα, & ξίφηρα (tot enim modis scripta inueniuntur) ea esse uideantur, quę Galeno serica, eademq; Auccens, Serapion, & pluribus Mauritanis, mihi quidem statuendum uidetur, Galeno serica non aliud designare, quam xxypha. Eibę preterea omnibus maximum esse argumentum crediderim, in Plinio hic subesse mendam, si illi de xxyphis id est tubendum esse, quod de tuberibus deprauatę fortasse legitur.

Κόμαρος. ARBUTVS.

CAP. CXXXVIII.

Arbuti confectio.



ARBUTVS, siue vnedo, arbor est cotoneę malo non dissimilis, tenui folio: cuius fructus pruni magnitudinem implet, nullo intus nucleo. huic memæcio cognomen est. Maturus aut flauet, aut rubescit: in esu acerosus, stomacho aduersatur, capitisque dolorem mouet.

ARBUTVS in Hetruria frequentissima prouenit, ubi und per hyemem perpetuis uirescit frondibus. Hęc etsi Dioscoridis reddatur malo cotoneę adsimilis; magis tamen putauerim, esse arboris proceritatem representari cotoneę, quam folia, & corticis corticem. Vel deprauatus fortasse (ut magis suspicor) est hoc in loco Dioscoridis codex: quandoquidem Serapio, Dioscoridis ipsius testimonio, Arbutum non describit in uniuersum cotoneę malo similem, sed eam tantum proferre folia malo cotoneę minora. nec scribit tenuia habere folia, ut uulgata hęc Dioscoridis lectio. Siquidem, ut palam est, Arbuto folia insuper lacinis, & iligineis crassiora. Meminit Arbuti Theophrastus libro iii. cap. xvi. de plantarum historia, sic inquit. Arbutus, quę pomum cibo idoneum ferat, magnitudine non nimis prestat: corticem tenuem, tamarici similem habet, folium inter ilicem, & laurum: floret mense iulio. Flores singulari appendice parte postrema racematim cohererent, specie quisq; merito oblongo similis, & magnitudine tantus: non foliatus; concavus, tanquam ouum exalptum, ore aperto. cum autem defloruerit, retinaculum perforatur: quodq; defloruerit, tenue, sicut uerticillus circa fustum. Fructus anno integro maturescit, ut simul hunc haberi, atque alterum flore sponderi contingat: hactenus Theophrastus. Quę in Hetruria nascitur, folia proferit laurum, &

gneisue similia, breuiora tamen paulo, & crassioraq; colore potius pallido, quam uiridi, in ambitu ubique serrata, infra per medium excurrente costa. Caudex cortice uestitur subrubro, aspero, squamosoq; a quo rami prodeunt rubriores, ac leuiore. Floret mensibus iulio, & augusto, floribus candidis, paruis, liliij conuallij uocati figura, & acutim dependentibus. E quibus fructus gignuntur rotundi, sorborum ferę magnitudine: qui primo exortu uirent, & inde flauescunt, maturi uerò rubent, aspero tactu, nullo intus osculo, fragorum modo, quorum etiam effigiem referunt. Sapor his insipidus, simul & austerus: quinetiam dum eduntur, linguam, & palatum stimulant acerosa quędam substantia, qua exterius conteguntur, ita ut plane acerosi uideantur. His maxime delectantur turdi, & merula.

Arbuti usus, &amp; uires.

Quo fit, ut hyeme, quo tempore ipsa poma maturitatem sentiunt, eiusmodi aues inibi laqueis, retibus, alijsq; & cupij generibus facile capiuntur. Arboris folia coriarijs expetuntur. Sunt qui credant, arbutum maxime opem prestare aduersus pestem. Quamobrem aquam, quę ex folijs extracta sit, admixto osse in cerui corde reperio, ea statim morbus inuasit, magno (ut ipsi aiunt) iuuamento egrotantibus exhibent. Arbuti meminit Galenus libro vii. simp. medicamentorum, ubi paucis inquit. Arbutus arbor ipsa qualitate acerbata una cum fructu est. cum melleolum nuncupant. Est autem hic, & insensu stomacho, & capiti dolorem inferens.

Αμυγδαλί. AMYGDALAE.

CAP. CXXXIX.

Mundus noster.

AMYGDALAE amarę radicum tritarum decoctum uitia cutis in facie corrigit. Illitz neces idem munus prestant: menses admotę ciunt: capitis dolori auxiliantur, illitz fronti, aut temporibus cum aceto, uel rosaceo: epinyctidas sanant ex uino: item putrescentia ulcera, & quę serpunt, & morsus canum cum melle. Earum autem esu dolores finiuntur, aluum emolliunt, somnum faciunt.

## AMYGDALAE.



faciunt, urinam cient: contra sanguinis reiectiones cum amylo, & mentha assumuntur: renum uitijs, & pulmonum inflammationibus ex aqua in potu, aut eclegmate cum resina terebinthina dantur: calculosis, difficultique urinae in passu auxiliatur: & illinctu cum melle, & lacte hepaticis, tussi, & inflationibus coli, nucis auellanae magnitudine. quinis, septenisue praesumptis, ebrietatem non sentiunt potores. Vulpes si cum quadam esca eas uorauerint, emoriuntur. Gummi eius calfacit, & adstringit: reijcientibus sanguinem, potum auxilio est: impetigines, quae summum corpus occupant, illitum cum aceto tollit: tussi uetustae cum diluto uino potum medetur: calculosis cum passu bibere prodest. E nucibus Graecis, dulces cibo idoneae, sed multo minus ualent in remedijs, quam amarae: attamen extenuant, urinam ciunt. Recentium esu cum suo putamine, humida stomachi uitia emendantur.

AMYGDALAE tam dulces, quam amarae fructus sunt ubique uulgo notissimi. Differunt tamen inter se: nam amarae maiore excalfaciendi, exiccandi; facultate praeditae sunt, quam dulces: quo fit, ut etiam dulcibus longe praefertantur ad crassos, pituitososque humores expectorandos: Galenus dulces paucis perstringens libro 11. de alimentorum facultatibus, sic inquit. Amygdalae nihil prorsus adstrictoriae facultatis sortitae sunt: sola enim extenuandi, atque abstergendi ui pollent: quae tum uiscera purgant, tum humorum in pulmone, ac thorace excreatus moluuntur, ac promouent. Et de utroque Amygdalarum genere differens libro VI. simplic. medicamentorum, primo amaras, deinde dulces prosequitur his uerbis. Amygdala, quae quia-

Amygdalarum consideratio.

Amygdalarum uires ex Gal.

dem palam amara sunt, omnino extenuandi uim possident: quod et qualitas ipsa indicat, et experientia comprobatur. Ac de amara quidem qualitate in quarto horum commentariorum proditum est. Ceterum duo experientiae exempla proponi satis est, unde uim eorum possis discere. Siquidem ephelin expurgant, et excreationibus ex pectore, pulmoneque, crassorum, lentorumque humorum impendio conferunt. Porro haec ostensa sunt genere quidem incidentis, specie uero extergentis esse facultatis. Quin et quod per accidens facultatem item habeant ab obstructione liberandi, et ipsum supra demonstratum est, sed et experientia monstrat: nam in iecore crassorum, uiscosorumque humorum in extremis uasis impactorum obstructiones abunde expurgant, expediuntque. Quin et laterum dolores ab huiusmodi causa natos, et lienis, et coli, et renum sanant. Porro et ipsa arbor uniuersa similem sortita uim est. Nam huius radices coctae, atque illitae ephelis purgant. Quotquot uero sunt amygdala dulcia, et ipsa leuiculam amantudinem possident, quae tamen dulcedine superante occultatur: ceterum id temporis spatium clarum fit. Demonstratum autem retro est, qualitatem dulcem moderate esse calidam. haecenus Galenus. Amygdalae, ut Theophrastus, et Plinius prodidere, ex amaris dulces fiunt, si circumfosso stipite, et ab ima parte circumforato, defluens undique humor abstergetur. Et contra, dulces amarescunt, si primo germinatu tenellae arbores a pecore decacuminentur. Amygdalae (ut etiam tradidit Galenus) non multum suppeditant alimentis: quanquam eis plerique utuntur et ad roborandam uenerem, et ad reficiendas uires.

† In uulgatis Graecis exemplaribus hic non legitur ἄνθος, id est, et mentha. Veram dictionem hanc uertit Marcellus ex antiquis codicibus, quos habuisse testatur. eam quoque et Oribasius, et Serapio ex Dioscoride transcribunt. Quae ut uere Dioscoridis lectioni adstipulantur; ita hoc loco mentham addendam esse putauimus.

## ΠΙΣΤΑΚΙΑ. PISTACIA.

## CAP. CXL.

PISTACIA, quae constat in Syria gigni, pineis nucibus similia sunt, & stomacho amica. Trina cum uino contra serpentium ictus profunt, siue edantur, siue bibantur.


PISTACIA, quorum est communis in officinis usus, ex Syria Venetias importari solent. Quae et Syria (ut Plinius auctor est) Lucius Vitellius censor in Italiam primus intulit, cum legatus in ea prouincia fuisset, nonis-  
is Tyberij Caesaris temporibus. Horum arbores Venetijs, Caieta, Neapoli, et in alijs Italiae locis uidimus, folijs lentis maioribus, colore ex uiridi in luteam inclinate, ac eodem ordine extremis ramusculis emergentibus, e quibus racematum suis quaeque pediculis pendent Pistacia. Haec (ut libro 11. de alimentorum facultatibus scriptum reliquit Galenus) parum praebent alimentis; tamen si infarctas humore iocineris uias expediant, et a uitijs liberent. Porro an stomacho noxia sunt, an utilia, an aluum molliant, an adstringant, nullum huius rei certum habere testimonium scribit Galenus.

Pistaciarum consideratio.

Pistaciarum uires ex Gal.



## PISTACIA



Staphylocodon.

Nuclei pinci uires.

Galenus. Cuius sententiae refragatur Auicenna, qui cum palm, & nominatim Galenum refellere nolle, libro secundo hac dicitur ratione utitur, his fere uerbis. Inquit quidam, non inuenio, quid Pistacia stomacho prosint, aut sane officiant. Ego autem dico, quid nauseam discutiunt, & uentriculi os roborant. Argumento est subamara, subausterque qualitas, quae gustu in ijs deprehenditur. Hac igitur ratione freti medicorum nonnulli, non modo ad iocineris infarctus Galenum secuti Pistacia exhibent; sed ad iecur ipsum, uentriculumque roborandum, ea tam cibis, quam medicamentis immiscunt. quin & ad conciliandam uenerem, & ad pinguedinem inducendam macie, & marasmo affectis commendant.

Quibusdam in locis pistaciorum syluestrium nomine appellatur cuiusdam arboris fructus, quam Plinius libro, & capite decimo sexto STAPHYLODENDRON nominat, etsi à pistacijs effigie, & sapore plurimum dissideant. Planta haec huius est, folio sambuci, materie admodum imbecilli, floribus albicantibus, racematim dependentibus, quemadmodum & fructus: qui folliculis prouenit, rufo colore, ciceris effigie, maior tamen: in quo subuirens nucleus includitur; sapore dulcis, sed nauseam commouens. Sapore pistacijs similes sunt Pinci nuclej, qui in strobilis includuntur. Hi enim (ut loco citato tradidit Galenus) corpus alunt, bonum procreant succum, sed crassum; tamen si aegri coquantur. Verum si Auicennae etiam credimus, digerunt, leniunt, resoluunt, ac impingunt. Prosunt praeterea pulmonum uitij, purulenta excreantibus, & tussi molestatis: sed priusquam edantur, aqua calida macerare eos oportet, alioquin uentriculum ledunt. Semen augent, & uenerem excitant. Renes, & uescica non modo expurgant; sed etiam roborant, eorumque ulcera prohibent. Urinae stillicidio opem mirifice praestant. Quam ob causam Strobili nuclej apud recentiores medicos in frequentissimo habentur usu ad huiusmodi affectus.



Nucum Iuglandium considerano.

Καρύων Βασιλικόν. NVX. IUGLANDS.  
Nucifera CAP. CXXI.

NV. CES Iuglandes, quas nonnulli Perficās uocāt, sunt difficiles concoctu, stomacho inutiles, bilioz, capitis dolorem inferentes, tussietibus inimicæ: uomituris tamen ieiunis in cibo aptæ. Cum ruta uerò, & caricis praesumptæ, & à summo cibo, uenenis resistūt, nec minus si à ueneni haustu comedantur: largius extatæ, tinea latas pellunt: illinuntur mammarum inflammationi, abscessibus, luxatisque, cum mellis triguo, & ruta: cum cepa autem, sale, & melle, canis, hominisque morfui proficiunt: tormina, cum calyce suo perustæ, & umbilico admotæ, sedant. Putamen combustum, tritumque in oleo, & uino, infantium capite peruncto, nutrit capillū, alopecias replet. Sistunt menses nuclej usti, si triti ex uino admoueantur: iidem ueteribus illiti carbunculis, gangranis, & ægilopis medentur: alopecijs commanducati, & impositi praesenti sunt remedio. Nucibus rufis oleum exprimitur. Recentes stomacho innocentiores sunt, utpote. suauiores: itaque allio mistæ eximunt acrimoniam. liuores in corpore illitu tollunt.

NV. CES Iuglandes, quæ in communi sunt usu, itemque arbores, à quibus eduntur, omnibus uulgo in Italia notiores sunt, quam ut à nobis representari debeant; cum nulla arbor Nucubiq; frequentius occurrat. Haec Latini Iuglandes, quasi Iouis glandes

glandes inter illis lucris appellantur. Quo nomine primo mundi ævo eas appellatas esse, plures tradidere auctores. Quæpe ceteri homines primum glandibus tantum diu uictitassent, inuenta tandem arbore, quæ nuces ferebat, degustato nucleorum sapore, horumq; dulcedine mirum in modum affecti, nuces Iouis glandes ob excellentiam appellauerunt. De ijs differens Galenus libro v 11. simplicium medicamentorum, ita scriptum reliquit. Nucis arbor tum in folijs, tum in germibus adstrictionem quandam possidet: ceterum euidentem, multatq; in nucis putamine rectè præparatur & sicco. proinde eo tinctores quoque uti solent. At nos eius expressi succo similiter, ut mororum, & ruborum in melle decocto, iace stomatici medicaminis utimur, & ad omnia reliqua adhibemus, ad quæ modò dicti succi conueniunt censentur. Porro nucis ipsius id, quod edendo est, oleosum est, & tenue: itaq; ob id etiam facillè exprimitur, & quo ductus reconditum fuerit, magis tale efficitur. Quamobrem oleum ex eo inueterato exprimere liceat. Tunc sane timendum sit per balneum euaporatorium. Itaq; quidam eo gangrenas, & carbunculos, & agilopas sanant, ac nonnulli ad repositæ, hoc est, neruorum uulnera utuntur. Et libro 11. de alimentorum facultatibus sic inquit. Habet Iuglans & adstringentis qualitatibus non exiguum, quæ temporis processu marcescit, degenerante tota eius substantia in pinguem succum, adeo ut cibo prorsus fiat inidonea, quòd ueteri oleo, sua pinguitudine ad similes appareat. Viridis autem, atq; etiamnum humida, neq; adstringentis qualitatibus, neq; oleosa conspicuè est particeps; sed magis est quodammodo ἀραια, id est, qualitatis expers: quod saporis genus aqueum (ut dixi) uocare consueuimus. Iuglans facilius, quàm ouellana concoquitur, stomachoq; utilior est, & multò magis, si unà cum caricis edatur. Produrum autem est à plerisque medicis, si ambo hæc cum ruta ante alios cibos sumantur, hominem non magnopere à letalibus pharmacis ledi posse. Constat præterea humiditas deiectioni magis, aridas uerò minus conuenire. Non parua quoq; cum garo Iuglandes præsumunt, uentris subducendi gratia. Ad hoc autem uirides aptiores sunt, utpote quæ adstringentis qualitatis minus participes sunt. Quin & aridarum quoque, ubi prius in aqua fuerint macerate (ut nonnulli faciunt) similis, ac uridium facultas habetur. hæc Galenus. Ceterum Iuglandes uirides deceptæ mense maio, uel iunio appetente, antequàm earum putamina obduruerint, saccharo, uel melle asseruata stomacho utiles euadunt, & ori non ingræte. Sed quoniam sermo nobis est de nucibus, cum Dioscorides, Galenus, ac ceteri posteriores Græci de Indicis, Myristicis, Metellis, ac Vomacis nihil, quòd constet, memoriæ prodiderint, hic ea non dissimulanda putauimus, neq; alienum duci recensere, quæ de ijs ex Mauritanorum monumentis, & recentiorum quorundam historiis sum consecutus. Sed primò de Indicis dicamus. Nuces igitur INDICAE myropoljs omnibus uulgatissimæ, fructus sunt arboris cuiusdam (ut Mauritani auctores sunt) palmæ effigie, prægrandes, magnorum melonum instar, ab arbore dependentes: namq; magna inuolucrorum mole obteguntur. Cortex ijs extimus colore constat in ærum rufescente, subdurus, tenax, callosusq; intus uerò uillosa materie compactus, quæ in capillamenta manibus 30 exteriùs fatiscit. Subtus est putamen triquetrum, uillosum, barbaturq; cornu instar prædurum, eiusdem ferè coloris nucleum continens, oui asserini magnitudine, intus concavum: substantia illi pinguis, crassitudine semidigitali, duruscula, tenax, callosaq; albicans, sapore dulci, butyrum referens, tenui sed aspero obiecta cortice, putaminis colore. Probantur recentes, eaq; præsertim, in cuius concauitate liquor quidam dulcis includitur: siquidem hoc argumẽto recentiores facillè cognoscuntur. Excalsciant secundo abscessu, humectant uerò primo. In cibis sumptæ, et si noxum admodum succum non gignant; uentriculo tamen laborem inferunt: semen augent, & uenerem excitant. Oleum, quod è nucibus Indicis exprimitur, utiliter hemorrhoidibus inungitur, oleo præsertim admixto, quod è persicorum nucleis elicitor: per se illud lumborum, & genarum dolores mulcet, & uentris animalia pellit. Quod uerò recentes nuces presse stillauerunt oleum, densum est, candidum, & pingue: in summa substantia, qualitate, sapore, ac deniq; facultatibus butyro non dissimile, sed longè melius subministrat alimentum. Nux Indica letiore sagina coram 40 paratificat. Idcirco strigosas mulieres mirum in modum impingat, & ad crassitiem reducit. hæc de Indicis.

Hæc succedunt MYRISTICÆ, quæ uulgò officinis ob odoris præstatiã Muscatæ, quasi moschatæ dicuntur. Hæc (ut refertur ij, qui Indica litora perlustrarunt) proueniunt copiosissime in insula quadam nomine Badan: ibiq; eas proferunt arbores quedam nostratibus persicis baud absimiles, angustioribus tamen folijs, ac breuioribus. Hæc post foliorum germinationem, florem statim emittunt, quem Macim Arabes uocant. Panditur is syluestrium rosarum modo: è cuius medio nux erumpit, & processu temporis perficitur, & ubi maturitatem senserit, macis rosarum instar, expansus eam circumplectitur: quam postea suo tempore cultores legunt certatim, & quàm quisq; potest uberius, quoniam sunt ibi omnia cõmunia. Arbores absq; cultu, suppeditante tantum natura, suos fructus edunt. Myristicæ 50 nuxes suo maci, tanquam rete cõprehensæ Venetijs in officinis quàm plurimis uisuntur, duro putamine conclusæ, auel larum modo, colore subnigro: quo fracto compactilis subest globulus, nuclei uice, & is est nux Myristica, quam

scattered soleamus. Præferuntur recentes, quæ nullam præsenferint cariẽ: item ponderosæ, satietæ, præpingues, humore redundantes, ita ut adacta acu confectum è uulnuscule exeat humor. Siccant (ut Mauritani scribunt) & excalsciant ordine secundo completo. Adstringunt, oris suauitatem commendant, & scetentis animæ uirus commas se abolent: lentigines in facie emendant, usum acuiunt, uentriculum & iecur roborant: lienem absuntunt, urinam cœnt, fluentem aluum sistunt, flatu discutiunt, & frigidis uteri affectibus mirificè prosunt: & ut in uniuersum dicam, facultas eis eadem, quæ & caryophyllis. E recentibus prius contusis, & in cacabo calefactis prælo exprimatur liquor, qui refrigeratus ceræ nouæ instar concreuit, fragrantissimum spirans odorem, neruorum & articulo rum duritibus doloribus à frigore excitatis utilissimus: quoniam & ueneris inunctionibus maxime expetitur. Myristicæ nuxes ueteribus Græcis ignotas fuisse illud fides facit, quòd Theophrastus, Dioscorides, & Galenus earum, quòd in suis monumentis legerim, nusquam meminerint. Quare & hic quoq; asserere non dubitauerim, macerem (ut in eius ratione diximus) Dioscoridi, & Galeno myristicæ nucis florem esse nequaquam. Nam si ad eos floris cognitio

Iuglandis uires ex Gal.

Iuglandes cõditæ.

Nucis Indicæ confid.

Oleum ex nucibus Indicis.

Nucis Myristicæ confid.

Maris Muscatum Plin.

Muscatum nux

Myristicarum uires.

Nuces uomi-  
cz, & metelle

Multorum er-  
ror.

Fuch. lapsus.

Anacardij mē-  
tio, & uires.

Auellanarum  
consideratio.

peruenisset, ueri quidem simillimum est, quod etiam fructus notitiam habuissent: quos, certo scio, ob sua admiranda  
facultates, & nature dotes nunquam scriptis disimulassent. Præter odoratas, eas etiam nuces memorant Ma-  
ni, quas VOMICAS, & METELLAS uocant. Sed tam officinæ, quam medicorum uulgus has magno erro-  
re confundunt, quod plerumque legitimas uomicas metellarum loco usurpent, & contra metellas nonnunquam uomi-  
carum uice. Nam Vomicas quidem eas appellant errore ducti, quæ lupinorum instar compressæ sunt, & tenuis  
lanugine contextæ, quarum esu canes necantur. Metellas uero, quæ nonnihil extuberantes, quibusdam uocis  
ueluti paruis oculis, per ambitum sunt refertæ. At eorum lapsus facile deprehendi potest Serapionis testimonio, qui  
Abrahami autoritate reddidit nucem Vomicam colore inter glaucum, et album, auellana paulo maiorem, nodosamque.  
Quibus notis eas esse prædicas constat, quas seplastiariorum uulgus metellas appellat, quæ nullo modo respondent legi-  
timis metellis à Serapione descriptis, his uerbis. Nucis metellæ arbor, uomicæ arbori non dissimilis, fructu gerit ma-  
dragoræ, oleosum, birsuto cortice, sapore non iniucundo. Quæ notæ perspicuo adlupulantur ijs, quas Vomicas nec-  
cupant: eæ siquidem corticem habent birsutum, oleosæ sunt, & gustui non ingrata. quin & facultatibus, non mi-  
notis (ut quidam falso exultimant Serapionem intellexisse) mandragoræ fructus referunt, cum autore Serapione,  
quarto refrigerent excessu, ita ut drachmarum duarum pondere esitæ interimant, minore uero mensura temera-  
tiam faciant. Quos quidem effectus præstare uidemus non modo in canibus, sed etiam in hominibus, quibus hæc  
fuerint, quas uomicas esse contendunt: siquidem Serapio de Vomicarum facultatibus differens, nullam letalem uicem  
adscribit, sed quod tantum duarum drachmarum pondere cum anethi decocto, uel sale haustæ, mirifice uomitus di-  
ciant. Quamobrem dixerim ego, illas, quibus callosa tubera supereminent, nodique uisuntur, oculorum ferè instar legi-  
timas esse uomicas: metellas uero, quæ pressæ, & birsutæ canibus necandis aptissimæ habentur. Ceterum nesci-  
rim ego, qua ratione ductus Leonarthus Fuchsius ultimo libello, ubi tantum stirpium imagines in exiguum forum  
contraxit, dixerit nuces metellas hispido esse fructus peregrinæ illius plantæ, quam antea magno uoluntate Strabo-  
niam uocauerat. Quod prorsus reclamare uidetur Mauritanorum sententiæ, à quibus harum historias accepimus.  
Sed quoniam scribenti mihi de Nucibus omnibus ANACARDIA sese obtulere Græcis ueteribus ignota, cum  
et ipsa in officinarum usu expetantur, de eis quoque uerba facere ex Arabum testimonio, non quidem ab re fore duxi-  
mus. Sunt igitur Anacardia (ut testis est Serapio) fructus cuiusdam arboris auicularum corculis non dissimiles, u-  
de et nomen, colore etiamnum cordis modo rufescente, cum scilicet ab arbore decerpuntur. Inest ijs liquor uell  
crassitie sub cortice residens, sanguinis modo rubicundus, sub quo est & nucleus parue amygdalæ effigie. Nasce-  
tur in Siciliæ montibus, qui continuè ignem eructant flammæ. Excalsaciunt, & exiccant tertio excessu. Præse  
in medicina liquor; etsi myropole communi errore & cortice, & nucleo utantur. Anacardia (ut auunt) labas  
reuocant sensus, memoriæ iacturam resarciunt, & neruorum, & cerebri affectibus, quos frigida causa attulerit, ex-  
xiliantur: nihilominus sanguinem exurunt, & cutim ulcerant. Quare Anacardia iuuenibus noxia sunt, cum & de-  
rant, & deleteria facultate non uacent: cui tamen remedio op-  
lac affatim potum, & oleum ex eorum nucleis expressum.

Καὶ τὰ Ποντικὰ ΝΥCΕΣ ΑΥΕΛΛΑΝΑΕ.  
hæfulmif CAP. CXLII.

NΥCΕΣ auellanae, quas & leptocarya uocant, sto-  
macho infestæ sunt: ipsæ tamen tritæ, & in aqua mul-  
sa potæ, tussi ueteri medentur: toste, & cum exiguo pi-  
peris potæ, distillationem concoquunt. Crematarum  
cinis cum axungia, aut adipe ursi perunctus, alopecij  
capillum reddit. Aiunt nonnulli uita earum putami-  
næ, & in cineris speciem redacta, cum oleo, cæciorum  
oculorum pupillas infantibus denigrare, perfuso sin-  
cipite.

ΑΥΕΛΛΑΝΑΕ nuces ideo Græcis Ponticæ dictæ sunt,  
quod in Græciam (ut Plinius inquit) è Ponto præmion allatæ su-  
runt. In Italia tamen & in urbanarum, & in syluestrium gæ-  
re numerose reperiuntur. Ceterum ex domesticis aliæ oblongæ,  
aliæ rotundæ sunt: ueruntamen oblongas & præstantiores, &  
gustui gratiores esse constat; & illæ præsertim, quæ putamine  
uehementer rubent, & fractu minime sunt contumaces, quales  
sunt Vicentine. Oblongæ serius maturitatem sentiunt, cæteræ  
uero rotundæ. quas propter illæ uetiori sunt nucleo, diu per-  
durant. Syluestribus coryletis ferè innueneris scatent Tridentini  
montes, quæ oblongas pariter, & rotundas largiuntur nuce,  
tanta ubertate, ut eas rura saccis legant, ubi maturitatem sensa-  
runt. Auellanae (ut memoriæ prodidit Galenus tum lib. vii.

simplicium



simplicium medicamentorum, tum secundo de alimentorum facultatibus) plus habent essentiae terrestres, ac frigidae, quam laglantes. quin et plus praebent alimenti: siquidem densiores sunt, et minus pingues. Diocles autor est, Aueclanarum uires minus amygdalis alere, cibis in uentriculo supernatare, largius esitatas caput tentare; innocen- tiores tamen esse uirides, quam aride.

Aueclanarum uires ex Gal.

Mapia. MORVS. Maulbebaum

CAP. CXLIII.

**MORVS** arbor nota est. Cuius fructus aluum soluit, stomacho inutilis est, & facile corruptionem sentit. Hoc idem praestat mori succus: decoctus autem aereo uase, atque insolatus, adstringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & tonsillarum inflammationes addito mellis exiguo. Sed inolefcit uis eius, adiecto scissili alumine, galla, croco, & myrrha: item myrticae semine, iri, & thure. Immatura mori poma ficcantur, tusaque acinorum rhois uice, obsonijs miscentur, sicut coeliacos iuuent. Radicis cortex decoctus in aqua, & potus aluum resoluit: latas uentris tineas excutit: his quoque auxiliatur, qui aconitum hauserunt. Folia trita ex aceto illita, ambustis igni medentur: tinguntque capillum, uitiū, & fici nigrae froncibus simul coctis in aqua coelesti. Succus foliorum cyathi mensura potus, contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruesfacti corticis, & foliorum iure, dentes aptissimè in dolore colluuntur. Radix circiter messem incisa, facto in ambitu scrobe, succum emittit, qui postridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est: tubercula discutit, & aluum purgat.



**EST ET** Mori utrunque genus album, & nigrum passim uulgaris notitia in Italia; praecipue his in locis, ubi bombyces sericifici aluntur. Constat alba mororum poma adstringentem facultatem longè minorem, quam nigra esse adepta (et si Dioscorides, & Galenus alborum non meminerint) ex multa et perspicua, sed paululum insipida dulcedine, quae gustatu deprehenditur: siquidem in maturis nulla planè adstringendi uis percipi potest. Morus nouissima urbanarum germinat, foliaque emittit: eaque propter ueteribus dicta fuit arborum sapientissima. Morus (ut prodidit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, item secundo de alimentorum facultatibus) maturas quidem uentrem subducunt, immatura uerò ubi aruerint, admodum restringunt. Itaque ad dysenterias accommodata sunt, item ad coeliacas, & quascunque alias fluentes affectiones. Porro quod maturorum succus ad oris medicamentis sit utilis, propter eam uidelicet, quae inest illi, adstrictionem, neminem latet. Praeterea ad alia complura particularia, quae mediocriter exposcunt adstrictionem, competit. At immatura mora praeter acerbitatem, sortita sunt et aciditatem, & tota adeo arbor in omnibus suis partibus mixtam aliquam uim obtinere uidetur, ex restringente, & purgante compositam. Attamen in radicis cortice purgatoria cum quadam amaritudine exuperat, adeo ut et latas interaneorum tineas perimat. In alijs autem partibus restringens uincit; in folijs tamen, & germinibus quodammodo media utrisque temperies est. Mora ubi primum mansa fuerint, ingesta citissime transeunt, & alijs cibis suo ueluti ductu uiam struunt. Verum secundo loco sumpta, celerrimè alijs una cum cibis corrumpuntur: id quod etiam faciunt, si cum eduntur, prauo in uentriculo humori occurrant. Quod si corruptionem non sentiant, corpus quidem humefieri, sed non planè refrigerant, nisi actu frigida assumantur. Paucissimum ministrant alimentum similiter atque perones; haud tamen uomitum cient, nec stomacho, ut illi aduersantur. De Moris autem, quae rubi ferunt, lib. III. in Ruborum commentatione, Deo saeunte, latius differemus. Sed quoniam mori folijs et uescuntur, & aluntur uermiculi, qui admirabili naturae spectaculo nobis SERICVM uellus conficiunt, quo recentiores medici in his, quae cordi conueniunt, medicamentorum compositionibus utuntur, ut, quantum per me fieri potest, omnibus rei medicae studiosis fiat satis, ea de Serici uiribus hic perstringam (quandoquidem non inuenio è ueteribus Graecis, qui de hoc quicquam prodiderit) quae Auicenna posteritatis memoriae commendauit tractatu, quem de uiribus cordis inscripsit. Sericum uaque (eodem autore) mirifice exultat. quae in re crudum eo longè praesiat, quod ignem fuerit expertum; tamen si coctum quandoque in usum ueniat, uerum antequam in insectorum cortinis immersum inficiatur. Excescit Sericum, resiccatque ordine primo: exiccat, & attenuat ea naturae dote, ut cor recreet, letumque efficiat. Quae propter laxat, firmat, purificat, & illustrat spiritus. neque eius facultas uni tantum assignatur spirituum generi: una tantum dispositione; sed ei proprium est, omnibus aequè spiritibus opem ferre, ita ut spiritus tam uitales, & animales,

Mori confideratio.

Mori uires ex Galeno.

Serici metio, & uires.

Et animales, quam naturales reficere ualeat. Ceterò quauis negauerit Auicenna decoctum sericem, & fulcom coloribus imbutum in medicos uenire usus; Mesues tamen in eo serapio, quod de pomis inscribitur, id sericem mittit, quod cocco legitime sit infectum. Idq; similiter inserit in ea medicamenti compositione, quam Alibet ipse nuncupauit.

## ΣΥΚΟΜΟΡΟΣ. SYCOMORVS.

CAP. CXLIII.



Sycomori hi-  
stor. ex Theo-  
phrasto.

Sycomori  
mēto ex Ga-  
leno.

Ficus Cypria

Vulgaris cr-  
ror.

**SYCOMORVM**, aliqui etiam sycaminum, id est, mori uocant, cuius fructus sycomori etiā, propter inefficacē gustum, appellatur. Arbor est magna, fico similis, frōdosa, multo lacte abundans: folijs mori: pomum ter, aut quater anno fert, non ramis, ut fico, sed caudice ipso, caprifico non dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus: quod non maturescit, nisi ungue, aut ferro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria, Rhodo, Iocisque non multi tritici feracibus: ubi prouentu facundo, restibilibus iuuamentum adfert, cum annonae caritas premit. Pomum aluo utile est, sed perquam ci-lem præbet alimoniam: stomacho aduersatur. Sucus primo uere tenera arbore antequam fructum ferat, eximitur, lapidis ictu summo cortice desquamato: si enim altiore plaga uioletur cortex, nihil effluet. Spōgia, aut uellere lacryma excipitur, quæ siccata, & in pastillos coacta, fictili uase reponitur. Vis succi emollit, vulnera conglutinat, discutit collectiones coctioni repugnantes: bibitur etiam, aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & perfrictiones. celerrimè teredinem sentit. Gignitur & in Cypro arbor genere distans, quæ cum sit vlmus, prædita tamen est folijs sycomori, fructu pruni magnitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis.

**SYCOMORVS** (ut Theophrastus est autor libro 111. capite 11. de plantarum historia) arbor est mori nostri similis, quippe folio, magnitudine, aspectuq; proxima. Fructu præter cæteras peculiariter gignit: nō enim germinibus, non ramis extre-

mis, sed caudice pomum parit magnitudine ficus, & uisu proximum, succo atq; sapore caprificis sanè simile, uerū longè dulcius, granisq; internis omnino carens, multitudine numerosius maturescere nequit, nisi scalpatur. Scalpatur autem unguibus ferreis: & cum scalpita poma sunt, ad quartum diem maturescunt: hisce ablatis, alia, & alia ex eodem loco subnascuntur, terno ita, & quaterno partu copiosa. Lactuosa arbor admodum est, & materies (quod sit solida, & robusta, & nigra) ad multa commoda existit. Hæc inter cæteras arbores id sibi proprium uendicauit, quod cæsa continuo iaret, neq; siccatur unquam, nisi aqua obruatur. Ea q; propter & lacubus, & stagnis demergitur, madefacta; in profundo siccatur, cionq; sicca omnino fuerit, superfluitat, atq; innatat. hætenus Theophrastus. De Sycomoro differuit Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus, ubi ita scriptum reliquit. In Alexandria Sycomori plantam uidi unā cum fructu, parue, candidæq; ficui adsimilem. Is fructus nullam habet acrimoniam, exigue dulcedinis est particeps, estq; facultate humidior quodammodo, ac frigidior, ueluti mora. Quinimo inter mora, ac ficus medium iure quis ipsum collocarit, atque hinc nomen ipsi inditum esse mihi uidetur. Ridiculi nanq; sunt, qui fructum hunc ob id aiunt sycomora fuisse nominatum, quod paruis ficubus asimiletur. Ipsius autem nascendi ratio ab alijs arborum fructibus quodammodo est diuersa: hæc enim ex primoribus ramulis, ac germinibus, sed ex prægrandibus ramis, & caudiceq; enascitur. hæc Galenus. Sycomoro similis est (ut loco citato memoriæ prodidit Theophrastus) quæ in Creta uocatur Cypria ficus: nam & ipsa fructum edit, caudice, ramisq; crassissimis. Differt tamen à priore, quod genia quoddam emittit sine ullis folijs, radicle simile, cui fructus præpilatur. Caudex arboris magnus, & populo albe proximis, eiusq; folia ulmum representant. Quater anno fructum fundit, sed nullum ad maturitatem perducit, nisi pomum ipso immaturo inciso, emissioq; lacte. Dulcedo ficubus non absimilis, & interna grossis planè conueniunt. magnitudo autem pruni est. Quod maximo est argumento, hanc quoq; plantam in Sycomori genere annumerandā esse. Quæ re apertè hallucinantur ij, qui putant arborem Sycomorum esse, quæ plerunq; uisitur in monachorum ciuitatibus, & uocatis, & in templorum plateis, ubi mortuorum cadauera humanantur, & cuius baccis monachi uerticillos faciunt, quibus mulieres suas numerant preces. Hanc (ut Bellunenſis castigauit) Azadaracht appellat Auicenna, & deleteriæ facultatis participem esse prodit Fen sexta quarti, ut latius libro sexto dicemus.



ΣΥΝΔ. FICI. *Ficus carica*

CAP. CXLV.



FICI maturæ recentes stomachum lædūt, aluum soluunt, sed faciliè contracta ab eis fluxio sistitur: sudorem euocant papulasque, sitim sedant, calorem restinguunt. Siccis natura exsalfaciendi, vires autem, sed sitim magis stimulant, aluo utiles: rheumatismis ventris, & stomachi contraria: gutturi autem, arteriæ, renibus, uesicæ, & ijs, quos longa uoletudo decolorauit, anhelatoribus; hydropicis; comitialibus aptissimæ. feruifacitæ cum hyssopo; & potæ, thoracem purgant: tussi ueteri, diuturnisque pulmonū uitij cōueniunt, aluum molliunt tussæ cum nitro; & cnico, dein manducatæ. Decoctum arteriæ, & tonsillarum inflammationibus gargarizatu prodest. cum hordeacea farina cataplasmatibus miscentur, & in muliebres fatus cū fœnogræco, & ptisana. Cæterum cum ruta coctæ, torminibus infunduntur: coctæ, illitæque duritias discutunt: parotidas, & furunculos emolliunt: panos ad maturationem perducunt, maximè nitro, iri, aut calce addita. Crudæ, si cum antedictis tundantur, eadem efficiunt: cum malicorio, pterygia purgant: cum atramento sutorio, deploratis ferè tibiæ fluxionibus, & cacoëthicis ulceribus medentur: quin & cum uino decoctæ addito absinthio, & hordeacea farina, utilissimè hydropicis illinuntur. Crematæ cum cerato sanant perniones: prurigines, sonitusque, si crudæ terantur, & sinapi, liquoreque aliquo exceptæ auribus instillantur. Tam syluestris, quàm satiuæ fici lacteus succus coaguli modo lac contrahit, cōcretumque dissoluit, ut acetum: exulcerat corpora, meatus aperit.

soluit aluum, vuluam recludit cum detrita nuce Græca potus: menstrua ciet cum luteo oui appositus, aut Tyrrhenica cera: podagricorum cataplasmatibus cum farina scængræci, & aceto utilis: lepras, lichenas, uirilgines, uitia cutis in facie, pforas, ulcera in capite manantia, cum polenta expurgat: instillatus plagæ, percussis à scorpione, uenenatorum ictibus, & rabiosi canis morsibus auxiliatur: prodest dentium dolori lana exceptus, & cauis eorum additus: uerrucarum informicationes tollit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem præstat succus è teneris ramis syluestris fici, qui lacte prægnantes, silente adhuc oculo, rufi exprimuntur, & siccatus in umbra reponitur. Et lac, & succus imponuntur exulceratorijs medicamentis. Decocti cum bubulis carnibus ramuli ficulni, facilem afferunt decoctionem. Lac efficiunt, quod magis soluat, si inter coquendum ficulneo furculo, spathæ loco, moueatur. Grossi, quæ erinei nonnullis uocantur, coctæ illitæ, strumas, nodosque omnes emolliunt. Crudæ formicas, uerrucas, & thymos, nitro, farinaque additis, tollunt. Folia eadem possunt. Illita cum sale, & aceto ulcera in capite manantia, epinyctidas, & furfures sanant: ijs ficosæ extuberationes, & palpebrarum scabritæ perfricantur. Nigræ ficus folijs, cauliculisque, candidæ uirilgines perunguntur: faciunt ad canum morsus, & ulcera, quæ cecia, id est, fauos, uocant. Grossi cum syluestris papaueris folijs ossa extrahunt: furunculos cum cera discutunt: contra muris aranei morsus, & scolopendræ uenena, cum eruò, & uino illitæ, auxiliantur. Fit ex cinere ficus tam syluestris, quàm satiuæ lixiuium, crematis ramorum cauliculis, quod subinde macerari opus est, & inueterascere: siquidem inter caustica intelligitur. Gangrænis prodest: nanque expurgat, & consumit, quæ excrescunt, eoque sic utendum est: spongia assidue hoc lixiuium imbuta superponitur. Interdum dysentericis, & in fluxiones uetustas, & sinus cuniculati exedentes, magnosque, instillari conueniet. Etenim purgat, conglutinat, carne replet, & oras committit, non secus atque emplastra, quæ cruentis vulneribus injiciuntur, enæma uocant. Bibitur ad discutendum sanguinem concretum, & contra præcipitationes, rupta, conuulsa, cum cyathotho aquæ recenter colatum, addito olei exiguo: cœliacis, dysentericis, per se cyathus datus prodest: neruorum uitij, conuulsionibus, commodè illinitur ex oleo, utpote quod sudores moueat: aduersus gypsi potum, & phalangiorum morsus bibitur. Hæc eadem præstant reliqua lixiuia, præsertim quernum: omnia tamen adstringunt.

FICI fructus sunt in Italia uulgò notissimi. Quarum etsi plura notentur genera in candicantium, & nigrescentium discrimine; sunt tamen omnibus notiores ob frequentissimum in autumno earum in cibis usum, quàm ut nobis præstantiores

Ficorum consideratione.

Ficorū facultas ex Gal.


prestantiores representars, ac describere sit opus. Siquidem omnes satis gustus edocuit, eas esse laudatissimas, et plane maturæ pinguedine, et sapore cæteras antecellunt. Sed ut præter id, quod à Dioscoride produrum est, et omnibus facultas innotescat, et temperamentum: quin et ut omnes cognoscant, quod præbeant alimentum, quæque utilitatem, ac noxam inferre possint, ea paucis edisseram, quæ ex Galeno deprompti. qui in primis lib. 11. de alimentorum facultatibus sic scriptum reliquit. Ficus tametsi minus pravi succi gignant, quam cæteri omnes non modo frigidi, sed etiam autumnales fructus, non tamen id uitium prorsus effugere potuerunt. Ceterum hæc ipsis insunt bonæ, nempe quod comestibiles sint, et facile in totum corpus peruadant, penetrentque. Nam et abstergendi ut poltræ haud obscura: cuius gratia post ipsarum esum nephritici multas arenulas excernunt. Cùm porro omnes autumnales fructus exiguum corpori alimentum præbeant, minimè omnium ficibus id usuuenit. Carnem tamen non compactam, neque firmam generant, ceu panis, et iuilla caro, sed turgidulam, et subinane, ueluti fabæ. Quin uentrem flant implent et ipsæ, et non mediocrem hinc profectò molestiam intulissent, ni etiam celerem descensum essent adeptæ, et ius beneficio, cùm celeriter peruadant, flatus, quem excitant, non diu manet, atque ob id minus cæteris autumnalibus lædere consueuerunt. Ceterum maturæ ficus immaturas non mediocriter antecellunt, quod et in alijs quidem omnibus cernitur fructibus: quanquam non tantum in illis discrimen existit. Siquidem ad plenum maturæ ficus paulò minus omni prorsus noxa uacant. Et sequenti capite, ubi uuarum facultates recenset, sic inquit. Ficus, et uae quemadmodum inter fructus autumnales principatum obtinent; ita fugacibus omnibus magis nutriunt, minimeque pravi succi habent, præsertim cùm exactam maturitatem fuerint adeptæ. Porro quod ipsa nutrant, maximo argumento sunt ij, qui uinearum fructum custodiunt: siquidem hi cùm duos menses solis uuis, ac ficibus, quorum custodie præsumunt, uescantur (nisi forte panis quidpiam cum illis addant) obesi tamen, ac pingues fiunt. At caro, quæ ex ipsis gignitur, haud quaquam est firma, ac densa, quemadmodum ea, quæ ex carnibus fit; sed laxa est, ac præhumida: ob id celeriter etiam, cùm uesci ipsis defierint, contrahitur, ac confidet. Idem etiam de Ficibus siccis differens loco prius citato, ita scribit. Caricæ multiplicem quidem habent utilitatem; si quis tamen largius esitauerit, ab eis offenditur: non admodum enim probum sanguinem gignunt, quapropter pediculorum quoque agmen eas comitatur. Incidendi extenuandique uim habent, quæ et uentrem ad excretionem irritant, et renes expurgant. Iecori autem, lienique inflammatione obseisis sunt noxiæ, quemadmodum et ficus, non peculiari quadam eximia facultate, sed communi ratione dulcium omnium ciborum, ac potuum. Obstructis autem illis, aut scirrhis tentatis, ipsæ ex sese nihil prosunt, nec obsunt: sed medicamentis incidentibus, ac extenuantibus, et abstergentibus mistæ, non mediocriter auxiliantur. Ideoque nonnulli medicorum in dictis lienis, ac hepatis affectibus exhibent ipsas longè ante cibum cum thymo, aut pipere, aut zingibere, aut pulegio, aut satureia, aut calamintha, aut origano, aut hyssopo. Ad eundem etiam modum, si caricæ cum alio quopiam eorum, quæ facultatem habent acrem, aut omnino incidendi, ac extenuandi assumantur, non solum sic affectis; sed sanis quoque utiles erunt. Siquidem iecoris meatus, per quos fertur alimentum, apertos esse non egrotantibus modò; sed bene ualentibus etiam tutissimum est. Proinde hoc pacto ficus cum sale extenuante, ac eto, et gero præparatus uulgò comedunt, quod id utile esse experientia didicerint. Verissimile autem est, ipsorum nonnullos medici cuiusdam consilio adductos, ficus hoc modo primum comedisse; deinde eam notitiam ad uulgus dimanasse. Qui uerò cum cibo aliquo incrassante ficus, et caricæ edunt, non mediocriter offenduntur. Item libro VIII. de simplicium medicamentorum facultate idem Galenus ita scribit. Ficus aridæ uim habent excalfaciendi ordine primo etiam completo, aut secundo incipiente: habent uerò etiam partium tenuitatem quandam. Ex istis duobus idoneæ sunt, quæ tumores duros concoquant: statim uerò etiam ea discutunt. Atque ipsæ per se illæ eiusmodi uim obtineant. Sed et decoctum earum eiusdem utique naturæ est. Verum ubi magis concoquere consilium est, miscenda est farina triticea: ubi uerò plus discutere, hordeacea. panis horum in medio est. Sed hæc magis sunt propria tractatus de medicamentorum compositione, et rationis curandi. uerum in præsentia hæc de caricis nouisse sufficiat. Porro scire oportet, quod quæ pinguiiores sunt, magis possunt concoquere: quæ uerò gustu acriores, magis tum extergere, tum discutere. Ceterum quod ex ijs plurimum in aqua coctis efficitur, simile est melli, non solum consistentia, sed et facultate. Porro ficus uirides comessæ, propter admistam humiditatem, facultatis sunt imbecillioris: subducunt tamen alium utæque tum humidæ, tum siccæ. Ficus arbor calidæ, tenuiumque partium temperaturæ est, ceu indicant tum liquor eius, tum foliorum succus: ualenter enim eorum uterque calidus est. Itaque non mordicat tantum, aut absterget uedementer; sed et ulcerat, et ora uasorum reserat, et formicas, quas myrmecias uocant, eiecit: quinetiam purgare potest. Porro ficus agrestis, quam erineum Græcè (Latine caprificum) nominant, tum liquor, tum succus ad omnia quàm satius ualentior est. Sed et cradæ, hoc est, rami earum adeo sunt calidæ, tenuiumque partium temperamento, ut carnes bubulas duras, si coquendis adijciantur, friabiles, ac teneras efficiat. hæc de ficibus Galenus. Democritus præcoces ficos fieri pollicetur, si oleo, et columbaceo fimo arbor illustratur. Et contrà, serotinas; si primæ grossi, cùm fabæ magnitudinem excessere, detrahantur. Ficum arborum item atque laurum, è celo fulminibus non ici compertum est.

Fici præcoces.

#### PERSEA. CAP. CXLVI.

PERSEA arbor est in Aegypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho utilem. in quo phalangia cranocolapta nomine inueniuntur, præsertim in Thebaide. Arida folia in farinam redacta, illitu sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perfide exitiosam esse, translataque in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

QUEMADMODUM



QUEMADMODUM superius in malorum commentatione prodidimus, Persea arbor Aegyptia non est (ut putat Marcellus Virgilius Florentinus) nostras Italica malus persica, sed planta plurimum dissidens ab ea, ut et Dioscoridis, et Galeni testimonio facile probari potest: quandoquidem ij utranq; sed ut alteram ab altera diuersam, diuersis capitibus tradiderunt. Hæc (ut libro IIII. de plantarum historia cap. II. scribit Theophrastus) arbor est Aegypti, aspectu magna, formosaq;: folio, flore, ramo, totaq; figura potissimum pyro uicina; nisi quod altera folio perpetuo, altera decido est. Fructum abunde parit, omniq; tempore perficit: quippe nouus anniculum semper occupat. Maturitas anniuersariorum afflatu conficitur: reliquum crudiores auferunt, atq; recondunt. Est magnitudine pyri, figura oblongus, amygdalæ modo, colore herbidus. Nucem intus habet, ut prunum: uerum longè minorem, mollioremq;. Caro eius suavis, ac prædulcis manditur, concoctaq; facilis, et innocua, etiam largiore cibo sumpta. Radice arbor exuperat, tum longitudine, tum etiam crassitudine, multitudineq;. Materie constat robusta, dura, usq; decora, ueluti lotus. Quapropter ex ea et simula cra, et lectulos, et mensas, et reliqua similia factitant. Ex his igitur Theophrasti uerbis, si Persea notæ, ac delineationes cum nostra persica malo diligenter conferantur, liquido patere arbitror, has plantas inter se diuersas esse. De Persea uerba faciens Galenus libro II. de alimentorum facultatibus, hæc memorie commendauit. Hanc etiam plantam uidi in Alexandria, quæ et ipsa magnis arboribus est annumeranda. Tradunt autem fructum huius apud Persas adeo noxium esse, ut edetes interimat: in Aegyptum uero translatus, in esculentum mutescere, et pyrori, malorumq; modo, cum quibus et magnitudine conuenit, esitari.

Persea arboris consideratio.

Persea mentio ex Gal.

Eadem recensuit Galenus libro II. de compositione medicamentorum secundum locos, ubi de cephalæe curatione agens, sic inquit. In sola Alexandria persea arborem uidi, at non in alia Romanis subdita gente. Quidam per sion ipsam appellant, aiuntq; in Persis lethalem eius arboris fructum esse, cum tamen is in Aegyptiorum regione innocuus existat. hæc Galenus. Ex cuius etiam uerbis palam esse crediderim, perseam à persica malo prorsus dissidere, cum in tota ferè Europa persica malus frequentissima proveniat. Quin et ex ijs facile dixerim, Columellam errasse, quod existimauerit, persica ea esse poma, quæ à Persis ad Aegyptios allata persea dicuntur, ut libro cultui hortorum dicato his uerbis testatur.

Columellæ lapsus.

Tunc præcox bifera descendit ab arbore ficus,  
Armeniisq; et cereolis, prunisq; Damasci  
Stipantur calathi, et pomis quæ barbara Persis  
Miserat (ut fama est) patrijs armata uenenis.  
At nunc expositi paruo discrimine lethi  
Ambrosios præbent succos, oblita nocendi.

IBERIS.

CAP. CXLVII.

*Ualida & nra*

† IBERIS, siue cardamantica, folia habet nasturtij, uere uirentiora: caule cubitalem, aut minorem. in incultis nascitur. Aestate lacteum florem promit, quo tempore efficacior est. Radices duas nasturtio similes habet, calfacientes, & adurentes. Ipsæ enim ischiadicis cū salsa axungia emplatri modo utiles, quaternis horis alligatæ, ut dein in balneas descendatur, & postea oleo cum lana locus perungatur.

VIDIMVS primum Iberidem, quam nobis indicauerat Iulius Alexandrinus medicus Tridentinus, qui nunc ob præclaras eius ingenij, et doctrine dotes, apud Sereniss. Ferdinandum Regem Roman. artem medicam exercet, extra ciuitatem Tridenti, ubi uulgò dicitur alle Laste, effigie nimirum, qua describitur à Dioscoride, ac alijs pluribus Grecis autoribus. Huius Galenus in simp. censu nusquam separatim meminit, sed hanc, et Lepidium non nisi nomine differre prodidit. Quod etiam idem testatus est libro X. de compositione medicamentorum secundum locos circa finem de coxendicæ curatione agens, ubi ex Damocrate sic inquit. Damocratis extat libellus, qui Clinicus inscribitur, in quo uerbis iambicis, quemadmodum solet, de tribus differit medicamentis. Ac primò quidem de eo differit, quod ex herba constat, quam ipse Iberidem appellat, quod ad coxendicæ dolores commendauit. In Iberide medicum quendam amicum

Iberidis consideratio.

infra 295

## IBERIS.

Iberis, & Lepi-  
dium idem.



Iberidis caput  
addititium.

Monachoru  
lapsus.

Iberis altera  
Paulo.

Barbari, &  
Ruell. lapsus.

amicum suum curatum fuisse ait herba, quam (ut dixi) ipse Democritus Iberidem vocat, ut qui tantum visu herbam cognov-  
rit, nomen autem eius nullum audierit, cum etiam id ipsum ignor-  
verit is, à quo eius usum didicerat. Porro ex notis, quibus eam  
representat, videtur Iberidem appellare, quæ à Græcis lepidium  
nominatur, appellatione ducta à regione, in qua amicum eius cu-  
ratus fuit. Describit autem ipsius formam ijs carminibus.

Herba hæc ubiq; multaq; frequens nascitur;  
Monumenta iuxta antiqua, muros & veteres,  
Tritasq; quondam publicè pedibus vias,  
Quas iuxta aratrum duxit haud quis agricola.  
Semper virescens, folijs nasturtij  
Florentibus vere, attamen maioribus.  
Caulem cubitalis longitudinis gerit  
Paulò minorem, aut rursus ampliorem, ab hoc  
Aestate pendent folia, donec multa hyems  
Sarmentitiam deducat hæc ad imaginem, &  
Deiecta, & exiccata depereant gelu.  
Adnata radici tamen cernes alia.  
Aestate florem fert colore lacteo,  
Multum tenuem, variumq; valde, cauliculus.  
Ad quem sequitur semen penitus sic exiguum,  
Visum fere ut fallens, oculos quoq; effugiat.  
Odorem habet radix at inde acerrimum,  
Verò similem quàm maximè nasturtio.

Huc illud etiam accedit, quòd Galenus item loco citato, Hy-  
gieni Hipparchi auctoritate, Iberidem, et Lepidium idem esse testu-  
tur his verbis. Si coxendicum dolores levare est animus, herbam  
Iberidem, quam aliqui lepidium vocant, aut nasturtium sine  
stre colligito. Ex cuius certè sententiâ asserere non dubita-

uerim, Iberidem apud Græcos eandem esse cum Lepidio. Vnde perspicuum est, hoc Iberidis caput huiusce primi vo-  
luminis calci accreuisse ninia vel librariorum, vel medicorum curiositate. In quam sententiam cum antedictis ca-  
sis, ea ratio me potissimum deducit, quòd constet, huius primi voluminis calcem, non esse legitimum locum, in quo Ibe-  
ridis historia fuerit collocanda: quandoquidem eiusmodi herbas Dioscorides lib. II. ordinate disposuit, ac de eis dis-  
seruit, ubi priuatim lepidio, quod Damocrati Iberidem existimamus, propriam assignavit sedem. Idcirco rectè Paulus  
Aegineta Lepidium Iberida etiam appellari scribit, & ex tertio excelsarum ordine esse, ac nasturtio viribus pro-  
ximum. Et lib. III. in ischiadis curatione: In totum, inquit, ischiadicis restituit sanitati Iberidis herba usus, quæ  
lepidium quoq; appellant. Quare aperte hallucinari deprehenduntur monachi illi uenerandi, qui in Mesuem com-  
mentarios scripsere, cum expressè contra Galeni, & Pauli auctoritatem, & contra rationes, quas superius adduxi-  
mus, aliud à lepidio Iberidem esse contendunt. Quos tamen excusatos habeo, utpote qui fortasse maius studium rebus  
diuinis impenderint, quàm ut certam simplicium medicamentorum cognitionem assequi potuerint. Ceterum nos  
ignorandum est, Paulum præter Iberidem, de qua nunc agimus, alterius etiam meminisse ab illa longè diuersæ, præ-  
ter usum ad ischiadas commendasse. Quod eius verba demonstrant, quæ eodem loco ita sonant. Quæ uerò apud  
nos Iberis fruticosa nascitur similibus lauri folijs, & multo amplioribus, respondere multa experimenta testantur, sò  
folium in coxarum, sed in alijs quoque diuturnis affectibus. Huic planè adstipulatur Lepidium, quod Plinio lib. XI.  
capite VII. his paucis describitur. Exit lepidium in cubitalem altitudinem, folijs laurinis. Quibus sanè notis suis  
apparet, hoc secundum Iberidis genus, vel lepidij dicamus, quod lauri folia mittit, eam esse stirpem, quæ hodie passim  
in hortis frequens nascitur, à quibusdam Piperitis ob uehementem eius acrimoniam dicta. Itaque manifestè aberra-  
runt uiri alioqui clarissimi Barbarus, & Ruellius, cum lepidium illud esse putauerint, quod uulgus herbariorum Ra-  
phanum rusticorum appellant. Veruntamen folia, quæ huic Raphano insunt, uerbasco maiora, & helenium æqua-  
lia, manifestè declarant, his legitimum non innotuisse lepidium. nisi forsàn lepidium Raphani nomine acceperint.

† Quòd caput hoc de Iberide accreuerit in Dioscoride, eiq; adscriptum sit, illud maximè corroborat rationes in  
commentario allatas, quòd reperti sint uetustissimi Græci codices, in quibus hoc caput non legebatur.

# PETRI ANDREAE<sup>155</sup> MATTHIOLI MEDICI Senensis Commentarii,


IN LIB. SECVNDVM PEDACII DIOSCORIDIS  
ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA.

**I**N PRIMO, charissime Aree, libro, quem de medicinali materia condidimus, de aromatibus, oleis, vnguentis, arboribus, & nascentibus ex eis succis, lacrymis, seminibusque differuimus. In hoc autem secundo de animantibus, melle, lacte, adipe, frugibus, atque oleribus explicabimus, subnexus herbaceis, quæ acri prædita sunt facultate, utpote quæ cum ipsis cognatione iuncta sint: qualia allium, cepa, si-

api intelliguntur. Idque ideo, ne cognatorum vires disjunctis videamur,

Εἰς βαλάντιος. ECHINVS MARINVS. CAP. L

MARINVS Echinus stomacho, uentrique utilis est: vrinam cit. Huius testa cruda inassata commodè medicamentis admiscetur, quæ psoras abstergunt, Crematæ uerò cinis sordida ulcera expurgat, luxuriantem carnem reprimat.



**ECHINVS** marinus notissimus est, ijs præsertim, qui in Italia tam Tyrrheni, quam Adriatici litora accolunt. Ingentem Echinorum numerum uidimus nos, dum placidis mare ægeretur undis, in alueo magni portus Ciuitatis uetere in Romano litore, nigris horrentibus spinis. Alios uerò uidi ex Pirano Istriæ oppido allatos, his longè maiores, purpureo colore suffusos, quos Echinometras appellauerim, quod scripserit Aristoteles libro IIII. de historia animalum capite quinto, hos cæteros magnitudine excedere. Habentur circa Toronem Echini marini candidi testa, spinæ, & ouo: augeri forma productiore, quàm cæteri, soliti: spinis paruis, non rigidis, sed mollioribus. Genera (ut idē inquit) Echinorum plurima sunt. Primum, quod cibo idoneum est, in quo, quæ oua appellantur, magna, esculentaque consistunt, pariter in maiore corpore, & minore: nam nouelli adhuc, paruique pleniusculi illis constant. Secundum, ac tertium spatagi, ac brissi, quæ genera pelagia sunt, raraque inuentu. Ad hæc, quæ Echinometra appellatur (quasi matrem, aut matricem dixeris echinorum) quæ quidem omnes magnitudine excedit. Genus item aliud est minutum, spinis longis, prædurisque, gigni in alto gurgite solitum, quo nonnulli ad destillationes urinæ medicamento utuntur. Quo fit, Iouij error. Paulum Iouium planè aberrasse crediderim: quippe qui suo de Romanis piscibus libello, Echinometram Aristoteli destillationibus urinæ opitulari, non autem huiusce minuti genus, memoriæ prodiderit. Corpus Echinis clubani formæ insit, priore, atque nouissima parte spissum, & continens: cætera uerò non continuum, sed simile laterinæ, cui nō obducta membrana est. Omnium maximè à natura muniti sunt, utpote qui testa undique spinis circumuallata celentur, quibus utuntur perinde ac pedibus: ijs enim nitibundi mouentur, sedemque permutant. cuius rei argumentum est, quod semper algam spinis implexam gerant. Euenit autem, ut quod caput appellant, & os, echinis uersum in terram sit: quod uerò ad excrementi exitum deputatum est, id supra babeatur. quod idem omnibus turbinatis, patellisque euenit: patius enim de imis petatur necesse est. Vnde fit, ut os inuersum ad passum sit, excrementum uerò superius parte pro-

Echini marini consideratio.

tres hoc



Echinorū vi-  
res ex Gal.

tres hoc animal habeat: sunt enim omnes distincti, pleniq; uacatis materiæ, et ex uno stomacho dependent, in unum ostium excrementi finiunt. Caro echinis circa uentrem nulla, sicuti in uniuerso corpore. Sed quæ oua appellatur, numerosiora testæ adherent, membranulis singula obuoluta, & paribus distincta intervalis: nigra etiam quædam circum ab ore fusim sparguntur, nomine adhuc nullo appellata. Sed cum non unum, sed plura genera Echinoxiorum sint, omnium partes quidem eas omnes sortiuntur: sed oua appellata, nec omnes cibo idonea, & parum modum continent, exceptis ijs, qui uada incolunt. Tradunt scutiam maris Echinos præfagire, correptiq; periri lapillis, mobilitatem pondere stabiliētes. Quod ubi uidere nautici, statim pluribus anchoris nauigia infrenant. hæc ex Aristotele. Meminit utriusq; Echini Galenus, marini scilicet, & terrestris unico tantum capite libro xi. simplicium medicamentorum, sic inueniens. Erinacei utriusque tum marini, tum terrestris corpus totius usum cinerem efficit facultatis tum extergentis, tum digerentis, tum detrahentis. Itaque eo quidam & ad excruciantia, & ad sordida usi sunt ulcera.

HYSTRIX.

ECHINVS TERRESTRIS.



ΕΧΙΝΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΣ.

ECHINVS TERRESTRIS.

CAP. II.

TERRESTRIS erinacei corium combustum alopecij cum pice liquida aptissime illinitur. Assiccatum corpus, & cum aceto mulso potum renum uitij auxilio est: item aqua, quæ cutem subijit, conuulsionibus, elephantia, & malè habitis, quos cachectos uocant: uiscerum fluxiones excut. Eiusdem iecur fictili solibus excocto arefactum, ad eosdem usus utilissime reconditur.

Echini terre-  
stris conside-  
ratio.

TERRESTRIS Erinaceus uulgaris notitiæ animal in Italia est. Duplici constat genere, canino scilicet, ac suillo, quemadmodum & tassus. Differentia dignoscitur ex eorum rostro. Id nanque alij suillum, alij uerò caninum habent. Rarò ex cauernis exeunt, nisi noctu. quo fit, ut nocturno tempore à uenatoribus plerumque capiuntur. Maturescentibus uuis per æstatem, & autumnum uineas petunt, ubi ad uuas, quæ solum attingunt, accedentes, acinos pedibus diducunt. His confratis in terra, in orbem se conglomerant, & super eos se noliunt, itaque spinis affixos portant in specum. Eodemq; astu syluestrium arborum poma à uentis decussa, aut maturitate decidua, in cauas arbores gerunt. Inter quadrupedes solus Erinaceus uolatilium more testes renibus harentes habet: eaq; propter uelocissimè coit, non quidem aliorum quadrupedum more superueniens, sed erectus coniungitur propter spinas. Vbi præsensit uenantem, statim in globum se contrahit, ne quid comprehendere possit præter aculeos: itaque oblatrantes deludit canes. Affusa conglomerato aqua, illico soluitur is, & ingreditur. Frigidi temperamenti animal Echinus est, excrementis compluribus redundans, quibus aculei nutriuntur. Idcirco eius carnes in medicamentorum potius, quàm in ciborum usu sunt expetendæ: terrestres enim cum sint, egrè coneequantur, & minimum sanè præbent alimentum. Vires longè plures ijs Echino reddidit Rasis libro de sexaginta animalibus. Veruntamen quoniam illa, quæ ibi leguntur, potius apocrypha, quàm fide digna semper existimaui; ideo hic ea abecondenda non duxi. Ceterum qui sunt harum rerum cupidi, eo se conferre poterunt, ubi diffusius tractantur. Erinaceorum generi ascribitur HYSTRIX, quod forma sit illi non absimilis, quanquam corpore longè maior: quis & longioribus aculeis, firmis, tenuissimè uel mucronatis undequaque riget: in specubus moratur, & noctu magis, quàm interdiu ad pascua exit. Latet hoc animal hyeme in cauernis, ut ursus, totidemq; diebus fert utero foetum. Irata hystrix intendit cutem, & tunc suos iaculatur aculeos. Quo fit, ut non modo canes, sed quandoque uenatores feriat. Combusti cinis potus (ut Plinius est autor) partus conceptos continet.


Echini terre-  
stris facult.

Hystricis mē-  
tio.


ἵπποκαμπος. HIPPOCAMPVS. CAP. III.

HIPPOCAMPVS marinum animal est exiguum. Cuius cremati cinis exceptus cum liquida pice, aut axungia, seu amaracino vnguento illitus, alopecias replet.

HIPPOCAMPVS, LOCUSTAE GENVS.



HIPPOCAMPVS, EQVVLVS MARINVS.



QUANQVAM non desunt scriptores, tam inter ueteres, quam recentiores, qui in locustarum genere Hippocampum recenseant, quique ad multos in medicinis usus eum commendent; eorum tamen haecenus reperi neminem, qui peculiaribus notis eius historiā tradiderit, effigiemque exprompserit. Ceterum sunt, qui credant, Hippocampum id nominis sibi asciuisse ab erucis, quae in hortis olera; in campis uero herbas uniuersas, et arborum frondes depascuntur, quasque proprie Graeci ἵπποκαμπος uocant. quippe quod illis fortasse forma, ac facie sit persimilis. Ad haec non desunt, qui Dioscoridem mirentur, quod scripserit, Hippocampum exiguum animal esse, cum tamen nomen plerumque magnitudinem inuauat: ἵππο enim Graecis grande significat, ut hipposelinum, hippolapathum, hippomarathrum clarissime demonstrant. Veruntamen non ob id Dioscoridem impugnandum existimant, nec pariter alios, qui de eo idem scripserunt. Quoniam licet comparatum hoc animal marinis beluis, aliisque in aquatilium genere grandioribus, paruum uideatur; si tamen eo erucarum generi comparatur, quarum imaginem, formamque reddit, et a quibus nomen accepit, grande sane fuerit. Vnde inclinauit quandoque animus, eum esse Hippocampum, qui piscatoribus Aquileiensibus uulgo vocatur Faloppa. Corpus huic inest locustae modo in longitudinem protensum: capite, et ceruice oblongis: chelis minime bifidis, sed acutissimis solidisque; aculeis rigentibus: pedibus sexdenis, quorum decem, qui circum os habentur, scorpionum caudas extremitatibus referunt; ceteri uero ut in locustis spectantur. Cornua capite gerit sex, quorum postrema in latum funduntur. Dorso est flexuoso erucarum modo, adeo ut in sicco earum fere modo perambulet. Caudam gerit latam, alis pluribus se pandentem, rigentibus undique aculeis, maculis duabus purpureis naturae artificio insignitam: adeo ut his notis quasdam uillosas erucas referat in nigro rufescentes, quae pari forma sub terra degunt in hortis, et agris, olerum, et segetum radices erodentes. Has Tridentina rura uocant uulgo Cagne; Ananienses uero, quod uillosae sint, Orsolane. Quae appellatione plane uidetur uulgius illud secutum Columellam, qui has erucas uillosas nominat. Proueniunt haec in Tridentino agro frequentissime, exeuntque e terra plerumque imbrum tem-

Hippocampi  
opiniones.


Prima opin.

pore:

Opinio altera.

Hippocampi uires ex Gal.

pore: nam quæ prope herbarum radices in cauernulis se condunt, facile aquarum ingressu suffocantur. Quæ propter olitores ijs uenantur aduenientibus pluuijs, irrigantque hortos, ut postea exeuntibus mortem inferant. Quod fit, ut, si uera referunt, qui dicunt, Hippocampus esse locustarum genere esse (id enim uidetur inter antiquos scire Plinius libro trigesimo secundo capite secundo, & inter recentiores Marcellus Dioscoridis interpres) nullum aliud marinum animal sese offerat, quod illud magis referre ualeat, quam id, de quo diximus. Sunt & alij, qui pro certo uelint, Hippocampus esse pisciculum illum, uel potius marinum monstrum, qui quibusdam Dracunculus, alijs uero Equiculus marinus uocatur, cuius nullus in cibis usus, flexuosum equum Hippocampus ueritentes. Visita plerunque hic in piscarijs foris inter minutiores pisciculos, semidrantali longitudine: capite potius draconis, quam equi: rostro anteriori parte prominente, pectore anguato, gibboso dorso, duplici utrinque aculeorum processu, rectis lineis à capite ad caudam usque. Gerit & in capite spinas adeo sursum porrectas, ut cristæ speciem præbeant, nec disparibus aculeis torquis in modum collum præcingitur: è quibus alia oritur aculeorum series mediam interfecans pectus, duorum media, quæ utrinque latera transcurrunt. Cauda illi tenuis, & unci modo reflexa. Harum opinionem, sicut & aliorum, cui rationibus, aut auctoritatibus comprobem, cur item contra reprobem, scire non habeo, cum hætenus nusquam in probatissimorum autorum monumentis legerim, qui per notas ipsum delineauerit. Nam etsi Plinius libro xxxvi. cap. v. dum Praxitelis, & eius filij Cephisodori admiranda percurrit memora, uideri asserat in maxima dignatione Cn. Domitij delubro in circo Flaminio Neptunum, Thetis, atque Achillæ, Nereidasque supra delphinos, & hippocampus; cum tamen hæc poetica fabulosaque sint, nullam certe ijs adobediendum esse fidem existimauerim. Multa enim & pictorum, & sculptorum adhuc extant figmenta, ubi locis innamoris marini uisuntur equi piscium in morem natantes, quibus tantum equina sit facies, reliquum uero corporis partim numerosis squamis contextum, alisque perquam amplis ad natandum munitum piscium modo, partim uero serpentis instar, praelongum ac sinuosum, magna quidem, non parua corporis mole. Quod si fabulosa sequatur, hos facile Plinio Hippocampus esse probabimus. Quare potius dixerim ea, quorum historia ignoratur, omnes fuisse, & esse cognitu difficillima, cum alijs coniecturis tantum agatur. Hippocampi uires recensuit Galenus libro xi. simplicium medicamentorum, sic inueniens. Et Hippocampus animal illud marinum si totum uideris, alopecij prodesse proditum quibusdam est, ipsumque uidelicet desiccantis esse facultatis, & tenuium partium, aut certe cum cinerem, quem quidam unguento amaracino commiscet, quidam pici liquide, alij ueteri adipi fuillo.



Πορφύρα, Κήρυκες, Κίονια. PVRPVRA, BVCCINA, CIONIA.  
C A P. IIII

PVRPVRA uista exiccat, dentes abstergit, excrecentias in carne cohibet, ulcera purgat, & ad cicatricem perducit. Eadem præstant concremata Buccina, sed uehementius urunt. Si quis falis plena fictili crudo adurat, dentifricio conueniunt: ambustis utiliter illinuntur, quibus solui medicamentum non oportet: nam posteaquam uulnus cicatricem duxerit, ipsum in teste modum induratum, sponte sua decideret. Fit etiam calx è buccinis, ut in eius mentione demonstrabimus.

Cionia uocantur purpurarum, buccinorumque mediæ partes, circa quas testæ uolumen clauiculatim intorquetur. Cremata simili modo, maiorem purpuris, buccinisque facultatem urendi consequuntur, quoniam apprimendi naturam obtinent. Buccinorum carnes ori gratæ sunt, & stomacho utiles, sed aluum non molliunt.

Purpurarum consideratio.

SUNT & Purpuræ marini pisces, eius sanè generis, quæ testa integuntur. Hæ (ut autor est Plinius libro ix. capite xxxvi.) illum magni pretij florem retinent, purpureum propriè dictum, tingendis regum uestibus: cuius petiitum. Hunc in medijs faucibus gerunt, candida quidam uena conclusum, colore nigricantis rose pellucidum.

Vires ex

Time capere contendunt, quia cum uita sua succum illum euomunt. Latent circa canis ortum tricenis diebus. Congregantur ueruo tempore, mutuoque attritu lentorem eiusdem cere saluant. Lingua Purpure di-  
gna longitudine, qua pascitur perforando reliqua conchyliis: tanta duritia aculeo est. Capiuntur autem pur-  
pure paruis, rarisq; textu ueluti nasis, in alto iactis: Inest ijs esca, clusiles, mordacesq; conchae, quales mitulos  
interius. Has semineces, sed redditas mari auido biatu reuiuiscences, appetunt purpure, porrectisq; linguis infestant.  
At ille aculeo extimulata claudunt sese, comprimuntq; mordentia: ita pendentes auiditate sua purpure tolluntur.  
Aqua dulci necantur, & sicubi flumini immerguntur: alioqui captae diebus quinquagenis uiuunt salina sua. Anno  
magnitudinem implent, celerimeq; crescunt, quemadmodum & conchyliis omnia. Est in purpurarum genere &  
Buccinum ad similitudinem eius buccini, quo sonus editur: unde & causa nomini, & rotunditate oris in margine inci-  
sa. Sed maior est purpura, cuniculatum procurrente rostro, & cuniculi latere introrsus tubulato, qua proferatur  
lingua. Cui circian orbes aculeati, qui buccino non insunt, sed utrisq; orbes totidem, quot habent annos. Buccinum  
non nisi petris adhaeret, circaq; scopulos legitur. Purpure, buccinaq; simul, quemadmodum & reliqua conchylium  
genera longa sane narratione scriptis celebrata sunt ab Athenaeo. Ad eius igitur uolumina accedant ij, qui plura sci-  
re desiderant. Sed quoniam MARGARITAE, quae non modo ad mulierum, hominumq; decorem, sed etiam  
ad medicamenta maximo luxu expetuntur, a marinis & ipsae gignuntur conchis, hic inter pretiosa conchyliis eas re-  
censere non ab re fore duximus: praesertim quod neq; Dioscorides, neq; Galenus de his quicquam, quod legerim, po-  
suerit memorie prodiderunt. Nasci itaq; animalia, quae margaritas gignunt, in oceano Indico refert Plinius libro  
ix. capite xxxv. Fertilis admodum earum est Taprobane, & Torois item Perinula promontoriū Indiae, circa Ara-  
thum in Persico sinu maris rubri. Origo, atq; genitura conchae est haud multum ostrearum conchis differens, ut liquet  
do constat ex ijs, quas nostri uulgò Madriperle appellant, quae ad nos deferuntur. Has ubi genitalis anni stimulauerit  
bora, pendentes sese quadam oscitatione impleri roscido conceptu tradunt, grauidas factas postea eniti, partumq;  
concharum esse Margaritas, pro qualitate roris accepti. Nam si purus influxerit, candorem conspici: si uerò tur-  
bidus, & foetum sordescere. eundem pallere caelo minante conceptum. Et ex eo quippe constare, ceteriq; eis maiorem  
societatem esse, quam maris. Inde nubilum trahi colorem, aut pro claritate matutina serenum: si tempestiue satien-  
tur, grandescere & parui: si fulguref, comprimere conchas, & pro ieiunij modo minui. Si uerò & tonuerit, pau-  
das, ac repente compressas, quae uocant Phrysmata efficere speciem, uerum inani inflatam. sine corpore. Ceterò in  
aqua molles sunt Margaritae, at exemptae protinus durefcunt. Quidam tradunt, sicut apibus, ita concharum exami-  
nibus singulas magnitudinē, & uetustate praecipuas esse, ueluti ducēs, mirae ad cauendū solertiae. Quocirca has sum-  
mo studio petunt urinantes piscatores: siquidem capto rege facilius ceteras palantes retibus includunt. Concha ipsa  
cuius manu uidet captiosam, comprimit sese, operitq; opes suas gnara propter illas se peti, manumq; si praeniat,  
acie sua abscondit, nulla iustiore poena, et alijs munita supplicijs. Captae multo obruuntur sale in uasis fictilibus: nanq;  
crofa carne, uniones, siue margaritae purae, & expurgatae decidunt in ima uasis. Dos omnis in candore, magnitudi-  
ne, orbe, leuore, pondere; tametsi rarae admodum sint Margaritae, quae his omnibus dotibus praesent. Tradit Iuba  
Arabie concham esse similem pectini insecto, hirsutam echinorum modo, inesseq; illi Margaritam grandini similem.  
In conchis quaternos, aut ad summum quinos uniones reperiri Plinius scriptum reliquit. Verum Americus Vespu-  
tius, qui nostro aeo liburnicis omnem ferè australem oceanum explorauit, talem ibi concham se quandoq; habuisse tes-  
tatur, in qua uniones ultra centum, & triginta reperti sunt. Quod non modo confirmant ij, qui post ipsum ad occi-  
dentales Indias nauigarunt; sed etiam addunt numerosiores ibi uniones in una tantum concha nasci: praeterea alia  
plura de Margaritarum historia referunt, quae a Plinij sententia plurimum disident. Porro certum est & nasci, &  
capi margaritas in oceano occidentali Scoto, & Anglico sinu, sed eas quidem paruas, nec adeo pellucidas, ut orien-  
talibus comparari possunt, e quibus contextum thoracem asserunt, quem Dianae templo Iulius Caesar dicauit. Mar-  
garitae in medicum etiam usum ueniunt: quandoquidem scribunt Serapio, & Auicenna, eas ad cordis affectus praeci-  
pua opem ferre. Quinctiam collyrijs admixtas oculorum nubesulas detergere, & aquam eo defluentem absumere.

Buccinum.

Margaritarū,  
& earum con-  
chae historia.

Vniones pra-  
stantissimi.

Plinij error.

Vnionum ui-  
res.

MIXTES. MITVLI.

CAP. V.

MITVLI laudatissimi in Ponto. Cremati eundem buccinis effectum praebent. priuatim plu-  
bi more eloti, oculorum medicamentis cum melle utiles habentur: palpebrarum crassitudines  
absument, albugines purgant, & cetera, quae oculis caliginem offundunt. Carnes eorum ad can-  
nis morfus utiliter imponuntur.


TELLINAE.

CAP. VI.

RECENTES. Tellinae alio utiles, sed maxime ius earum. Salitae uruntur, tritaeque in cine-  
rem, & cum cedria infusillatae, auullos palpebrarum pilos renasci non patiuntur.

NON defunt, qui Mitulos, & Tellinas idem esse censeant: In quam sententiam potissimum uenisse comperio  
Paulum Iouium uirum apprime eruditum: quippe qui libello, quem de Romanis piscibus edidit, malit (etsi medicus  
esset) cum Athenaeo errare, quam cum Dioscoride recte sentire. Ex cuius scriptis satis aperte constat, aliud esse mi-  
tilos, aliud tellinas: nam praeterquam quod de his duobus diuersis capitibus ipse differuerit, differentes etiam utris-  
que reddit doctores, haud nescius illis inesse differentiam. Idem similiter sensit Galenus lib. xi. de simplicium medicamen-  
torum facultatibus, ubi de uuperis differens, eodem capite mitulorum etiam meminit; tellinarum uerò peculiari ca-

Mitulorū, &  
tellinarū con-  
sideratio.  
Iouij lapsus.




pite, singulis proprias, et diuersas reddens facultates. Non secus ac illi, sensit Paulus Aegineta, fidelis nempe utriusque sectator. Quonobrem dicendum putauerim, differentes nimirum esse mitulos, et tellinas. Notissime sicut in Italia Tellinae, praesertim Romae, ubi plurimae uenales circumferuntur, quod edendo sint, et ori admodum grate, si tamen ab arena optime repurgentur. Ceterum quales Mituli sint in Italia, qui hac nostra tempestate explicaueri, haecenus inueni neminem. Praeter unum Massarium Venetum, qui eos mitulos putat, quos Adriatici accole nado appellat Muscioli, quasi musculos dixerint. Cuius opinio nobis maxime probatur: quippe quod et forma, et nomine conchyliis ita uocata legitimos referant mitulos. Sunt enim tellinis paulo maiores, testa exterius lineis quibusdam scabra: intus uero pellucida, et tota pondere leuis.

## XIIII. CHAMAE.

## CAP. VII.

CHAMARVM, aliarumque conchularum in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet. id cum uino assumitur.



Chamaru consideratio.

QUANQVAM Chamae inter cetera conchyliorum genera longa descriptione ab Athenaeo referuntur; nihilominus tamen tot huiusmodi testaceorum habentur species, ut non facile sit, eas inter se distinguere. Ceterum praeter ceteras conchas, id sibi peculiare asciueri Chamae, quod plerumque in litore biantes inueniuntur. Idcirco eas recte Chamas dici posse putauerim, quae in marinis oris, pendentes sese leui testa contacte reperiuntur. Haru quon plurimas ipse uidi in Adriatici litore. Verum quoniam nulla alia facultate sunt praeditae, praeter eas, quibus et reliqua concharum genera commendantur; ideo non est, ut plura de his dicamus.

## OVI. VNGVIS ODORATVS.


## CAP. VIII.

VNGVIS, siue onyx conchylij tegumentum est, ei simile, quo purpura integitur: quod in Indiae nardiferis paludibus inuenitur, suauem ideo spirans odorem, quod conchyliis inibi nardi pabulo uescantur. Colligitur posteaquam stagnantes aquae aestiuis squaloribus inaruerunt. Laudatissimus qui à rubro mari deferitur, candicans, pinguis. Babylonicus nigrescit, atque minor conspicitur. Ambo odoris gratia suffiuntur, sed aliquatenus castoreum olent. Eidem suffitu excitant foeminas,



feminas vuluæ strangulatu oppressas, comitialesque: poti uentrem molliunt. Crematum conchylium eadem efficit, quæ purpura, & buccinum.

## VNGVES ODORATÆ



VNGVES odoratos seplasiæ Mauritanos secute Blattas bysantis appellant. At certè ij, quibus utuntur hæc etate myropole, potius odoris fœtore damnandi sunt, quàm aliqua odoris gratia commendandi. Quippe qui accensæ immundum sanè, ac putidum spirant odorem. Optimos quidem, sed raros odoratos ungues me uidisse recordor, qui frans impositi suauiter olebant. Quapropter diligenter aduertant seplasiarij, ne fœtidos in odoratorum locum, & usum admittant. Fuchsius in suis in Nicolaum Myrepsicum doctissimis annotationibus in compositione aureæ Alexandrinæ, ubi ipso uertente legitur, osis anterioris narium purpuræ, scribit id nil aliud Nicolao designare, quàm quod Actuarius, & alijs posterioribus Blattium byzantium, siue bysantis dicitur, quòd in quibusdam interpretationibus in Nicolaum legatur ΒΛΑΤΤΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΟΣ ΟΥ ΤΗΣ ΕΙΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ. Quin & differre inter se ait Blattium byzantium, et Dioscoridis onychem, quòd onyx conchylij sit tegumentum, blattium autem os anteriùs narium purpuræ. Quod etiam confirmauit libro primo de compositione medicamentorum, illud etiam addēs, officinis hodie hoc os, quod in ore, aut naribus purpuræ reperitur, Blattam bysantiam uocari. Sed longè quidem ab eo disidet opinio nostra. Primum quòd Serapioni, & Auicennæ, quorum uocabula medicamentaq; tam simplicia, quàm composita (ut ipsemet fatur Fuchsius) recentiores Græci sæpius usurpant, nil aliud designat Blattium byzantium, quàm Dioscoridi onyx, Latine unguis odoratus dictus, ac pariter conchula Indica. Huic alia accedit ratio, quòd cum hætenus non inuenerim, qui purpurarum os tam oris, quàm narium (ut Fuchsius placet) siue testa earum tegumentum odore aliquo commendauerit, quicq; inter odoramenta recensuerit, atque antidotis inseruerit; sed qui tantum scripserint, earum crematarum cinerem exicare, dentes abstergere, excrescentias in carne cohibere, ulcera purgare, & ad cicatricem perducere: contra uerò constat omnibus odoratos ungues à Mauritanis præferri, quòd aroma quoddam respiciant, & tenuium, atque adstringentium sint partium, ad uentriculi, iocineris, cordis, utriq; affectus, non modò Fuchsij, sed Nicolai quoque sententia (modò huius codex non sit deprauatus) inanis profectò, & planè refellenda uidetur. Quòd autem ad hos affectus odoratos ungues prætulerint Arabes, quibus recentiores Græci longè plura accepta referunt, testis est Serapio autoritate Mesembæ, cum inquit. Conchula Indica exalfacit, & siccatur ordine tertio: quin & adstrictionis, & tenuium partium est particeps: uentriculo, cordisq; palpitationi, iocineri, uuluaq; odoris fragrantia conferens. Quo fit, ut etiam facile crediderim, Actuarius nil aliud Blattium, siue blattium byzantium representare, quàm Indicam odoratam conchulam, non ut Fuchsius arbitratur, os in ore, uel naribus purpuræ inuentum. Misceatur itaq; Indica conchula, uel eam uoces odoratum unguem, non sine magna ratione, & auctoritate à posterioribus Græcis in aureæ Alexandrina, quòd ad cardiacos, & uiscerum morbos sit admodum utilis. Quin & in antidoto è margeris, quòd omnem uirium imbecillitatem firmet, animi defectum siue à corde, siue à uentriculo originem ducat, maxime uiuet: longo morbo deiectos, & imbecillitate languentes recreet, & uteri strangulatus in mulieribus auertat, ut Actuarius, & Nicolaus Myrepsicus testantur. Quæ omnia odorata conchula per se ferè præstare potest, si primium eius qualitates, demum uerò facultates per penderimus, quarum nullæ (quòd sciuerim) purpuræ assignantur. Quare non immeritò Nicolaum damnauerim (si tamen error illi ascribendus est) qui narium purpurarum ossa excogitauerit his antidotis esse admiscenda, cum purpuræ in uniuersum præter testam, qua conteguntur, ossibus careant. Illud præterea falsum esse deprehenditur, quòd officinis hæc excogitata purpurarum ossa blattæ byzantiæ uocentur, cum eam que leguntur in officinis habentur, propriè sint odorati ungues. Postremò quæquæ sint illæ in Nicolaum expofitiones, quibus maxime nititur Fuchsius, eas nostris rationibus, & auctoritatibus adductis haud quaquà obstare posse præteritum, cum fortasse incerti sint autoris, uel si certi, minime probandi, quòd is rationi, ac ueritati refragetur. Nisi quis dixerit, illum contra quàm Fuchsius intellexerit, Nicolai uerba interpretatum fuisse, et lectores admonuisse, nil aliud Nicolao designare ΟΣ ΟΥ ΤΗΣ ΕΙΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ, quàm ΒΛΑΤΤΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, id est, unguem odoratum. Superdum enim Nicolai uerba secundum Fuchsij interpretationem adeò per se clara sint, ut nulla indigeant explanatione, non erat opus, ut ille interpres ea aliter exponeret; sed potius, ut declararet, animaduersa deprauata Nicolai lectore, pro eo purpurarum ossa in Nicolaus antidotis Blattium byzantium, id est, Indicam conchulam admisceri debere.


Vnguiū odoratorum consideratio.

Fuchsij opinio reprobatæ.

Quod facile sciret, fabulosum esse purpuræ in naso uel ore gerere ossa. Quod etiam sensisse uidetur antiqui fragoratorum Nicolai interpres: quippe qui non purpurarum ossa in aurea Alexandrina, & dianargarito sit interpretatus, sed byzantium blattam, quam odoratum unguem esse, hactenus nos abunde demonstrasse existimamus.

Κοχλῆαι. COCHLEAE. *ἡ κοχλῆ* CAP. IX.

TERRESTRES cochleæ stomacho vtilis sunt, & non facile corrumpuntur. Optimæ Sardonicæ, Africanæ, Astypalæicæ, & quæ in Sicilia, ac Chio gignuntur, & quæ in Liguriæ alpebus pomatiæ, id est, operculares, cognominatæ. Marina stomacho idonea, & facile aluo excernitur. fluuiatilis virus olet. Quæ verò uepribus, frutetisque glutinata cohæret, quam uocant nonnulli sesilon, uentrem, & stomachum turbat, uomitiones excitat. Crematæ omnium testæ ex calfaciendi, & urendi naturam sortiuntur: purgant lepras, vitiligines, dentesque; emendant oculorum cicatrices, & uitia cutis in facie, albugines, ac visus hebetudines, si cum carne sua vitæ, triteque ex melle illinantur. Crudæ cum tegumentis impositæ, aquæ inter cutem tumores exugunt: sed non antè soluantur, quàm omnis hauriatur humor. podagricas inflammationes leniunt: impactos corpori aculeos illitæ euocant; menses tritæ, & admotæ ciunt. Carnes earum cum thure, & myrrha illitæ, cum vulnera alia, tum maximè quæ nerui acceperunt, conglutinant: tritæ in aceto, sanguine naribus erumpentem infranant. Viuæ corpus, & præsertim Africanæ, cum aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat. trita cum testa, vino, & myrrha, si exiguum inde bibatur, coli, uesicæque cruciatus sanat. Terrestris pilos incommodos replicat, si quis abrafo acu lentore eius, pilum attingat.



Cochlearum  
consideratio.

Cochleæ po-  
matiz.

Cochlearum  
uires ex Gal.


COCHLEAE uulgò notissimæ sunt. Hæ licet albæ, nigraeq; reperiantur, tum magnæ, tum parvæ, tum mediocres; omnes tamen eandem naturam in uniuersum obtinent. Si uerò aliquo pacto inter se differunt, id natalis soli causæ ascribitur: nam quæ in apricis admodum locis odoratis uisitant herbis, ijs sanè præstant, quæ in opacis degunt, & in palustribus. Id enim gustu facile deprehenditur, quod hæ uel inspidæ habeantur, uel palustrem respiciant limum; ille uerò sapidiore, esuiq; gratiores existant. Quandoquidem absinthium depastæ amaritudinem reddunt, sicuti quæ serpyllum, pulegium, calamintham, organum, aliasq; odoratas herbas assumunt, odoris gratia commendantur. In quarum numerum æquè referri possunt, quæ paulò lupinis maiores in agro Romano leguntur, ubi autumno quorundam carduorum caulibus acruatim cohærentes innumere uisuntur. Cochleas olim usque adeo cœnis expetitas memorat Plinius libro IX. capite LXI. ut ijs uiuaria à nonnullis fuerint instituta, distinctis quidem generibus earum, quod melius gulæ fieret satis, separatim ut essent albæ, quæ in Reatino agro nascuntur: separatim Illyricæ, quibus magnitudo præcipua: Africanæ, quibus fecunditas: Solitanæ, quibus nobilitas. Saginam quinetiam commentati sunt sapienter, & farre, alijsq; rebus, quæ eas alebant. Non me fugit, quas Dioscorides pomatiæ uocat, plurimas reperiri in montibus Tridentinis, uicinisq; alijs locis, & eas quidè præstantissimas. Eruuntur enim è terra hyeme in sepibus, & frutetis, uncis quibusdam ferreis, prope fruticū radices terra circumfossa. Concluduntur hæ contra frigoris iniuriā, quodam albo operimento, duro, gypsi speciem referente, sicq; contextæ terra se condunt. Fit enim ob hoc, ut in cibis ijs longè suauiores, gratioresq; habeantur, quæ uere, & æstate imbribus excitatæ hinc inde usantur. Quod autem sic hyeme recondantur, delitescantq; sub terra circum fruticum radices, Hetruria planè ignorat; cum tamen & ibi eodem modo ab his eruantur, qui alibi artem didicerunt. Cochleæ si totæ cum testis urantur (ut Galenus memorie prodidit libro XI. simplicium medicamentorum) admista galla omphacitide, simulq; pipere albo, mirificè profunt enterijs, in quibus ulcera nondum putredinosa sunt. Conuenit autem ut piperis sit pars una, gallæ uerò duæ, quæ cineris cochlearum. Hæc ubi ad unguem leuigatis, cibis inspergito, bibendumq; aut ex aqua, aut ex uino albo, & castoreo præbeto. Cæterum absq; gallæ mitione cinis cochlearum admodum resiccantis est facultatis, obtinens uicem

ex uestione calidum. Porro cochleæ, quæ uestionem non sunt expertæ, si tritæ unâ cum testis imponantur, & tota uentri aqua inter cutem laborantium, & in arthriticis articularum tumoribus, egrè quidem diuelli poterunt, ceteram impensè desiccant. Et omnino inherere ipsas sinere oportet, quoad sponte decidant. Idemq; faciendum in tumoribus ex ictu natis difficilè solubilibus, & ex contusione facta in auribus. Desiccant enim illos magnopere uniuersos, etiam si uiscosus, crassiusq; in alto humor contineatur. Idem libro citato, cum de diuersis carnibus uerba faceret, sic de cochlearum quoq; carne disseruit. At cochlearum caro prius in mortario contusa, ac postea ad leuorem redacta, omnium ualentissime desiccatur partes superfluo humore grauatas, adeo ut et hydericis conueniat. Ipsarum autem humor solus per se citra carnem sumptus (uocatur autem is à multis  $\mu\upsilon\kappa\alpha\ \kappa\omicron\chi\lambda\iota\ \omicron\upsilon$ , hoc est, mucus limacis) iburi misus, aut aloæ, aut myrrhæ, aut horum quibusdam, aut omnibus, quoad habeat cerati crassitiem, medicamentum fit glutinatorium, desiccaturq; pulchrè purulentos mucos aurium: sed & fronti impositum inheret, oculorum fluxiones resiccans. Quidam etiam ad palos excimendos utuntur totis unâ cum testis ad leuorem tritis: sed & quidam ad sistendos menses, Equidem ego aliquando in agro carnes ipsas solas in uulnus cum nerui uulneratione, & contusione factū tritis imposui, ipsumq; uulnus pulchrè glutinatum est, & neruus phlegmonem haud perpeffus. Erat autem homo durus, & agrestis: miscui tamē illis contritis pollinem farinæ acceptum à pariete molæ proximo. Scripsere autem maiores me nonnulli medici, ad eiusmodi usum miscendum ipsi thus, aut myrrham, Verian horum habebam tum neutrum, ut quā tunc ab urbe abessem in uilla. Possis autem & resinæ frictæ contritæ admiscere, si adsit, quippiam. Porro ubi multi muci cochlearum accipere uoles seorsum, stylo carnem earum pungito. Sed non ante multos dies uenatas esse expedit: alioqui enim tempore desiccantur. Nam recentes plurimum habent uiscosæ illius humiditatis, quam stylo compunctæ effundunt. Humiditas hæc pilorum in palpebris præter naturam gluten est. hæc Galenus. Cochleæ tum crudæ, tum coctæ cum testis suis, aut sine, contritæ emplastris concoquentibus, & saniem è uomicis fracta cute educuntibus utiliter immiscuntur. Marinæ in Italie mediterraneis perquam rarò in cibis ueniunt: quanquam ijs, qui maris litora inhabitant, frequentiori sint usui. Sunt & in cochlearum genere, quæ tegumento, uel testa carent, quæ nobis speciatim Limachæ uulgò appellantur, noctu potius, quàm interdiu ad pascua exeuntes. Degunt hæc non modò in campis, & hortis; sed in cellis uinarijs, & alijs subterraneis uliginosisq; adiu locis. Gerunt in capite lapidem (non tamen omnes) quem febris tertianis adalligatum uulgu prodesse existimat. At Plinius libro xxx. cap. xv. autor est, hunc lapidem adalligatum dentitionem facilem præstare. Expetuntur hæc mulieribus ad expoliendam faciem: namq; ex ijs in stillatorium uas coniectis, additis quibusdam alijs, aquam eliciunt, qua inde earum elota facies leuorem mentitur. Quin & his Africam abundare scriptum reliquit Plinius libro xxx. capite vii. & eas combustus dysentericis utilissimas esse, dariq; ex eo cinere cochlearia bina in uino myrtite, aut quolibet austero.

Cochleæ marinæ.  
Cochleæ sine testa.

$\kappa\alpha\epsilon\chi\lambda\iota\alpha$ . CANCRL *Græcis*  $\kappa\alpha\epsilon\chi\lambda\iota\alpha$  *der*  $\kappa\alpha\epsilon\chi\lambda\iota\alpha$  CAP. X.

CANCRORYM fluuiatilium exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, adiecto dimidio radicis gentianæ modo, triduo potus cum uino, magnopere prodest canis rabiosi moribus: rimas pedum sedisque, perniunculos, & carcinomata, cum decocto mellè lenit. Triti crudi, potique ex alinino lacte, auxiliantur contra serpentium phalangiorumque morsus, atque scorpionum ictus. Decocti autem, & cum iure esitati, ijs profunt, qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauserunt. Necant scorpiones triti, & cum ocimo admoti. Possunt eadem marini, uerum inefficacius omnia præstant.



HALLVCINANTVR, qui credūt Cancros à Dioscoride, & Galeno descriptos illos esse, quos uulgu Italiae Canbari nominat.  $\kappa\alpha\epsilon\chi\lambda\iota\alpha$  enim Græcè (ut hoc loco scribit Dioscorides) non cum significat cancerum peram uocatum, qui à  $\sigma\alpha\chi\omicron\varsigma$  appellatur à Græcis; sed qui rotundo corpore habetur, quem nos Hetrusci uulgari nomine

Cancrorum consideratio.

Multorum  
error.

mine dicimus Granchio. Is Venetijs, ubi marinorum numerus propè infinitus habetur, ubi crustam exuerit, à corpore mollitie uulgò uocatur Mollecca. E' quorū genere sunt etiam quæ appellantur Macinette: nam et hæc suo tempore crustam exuunt. Hoc ita esse testatum reliquit Aristoteles libro 1111. cap. 11. de historia animalium, ubi sic uerbat. ὁ δὲ καρκίνος μόνος τῶν τοιούτων ἀνθρώποις γινώσκων, καὶ τὸ σῶμα τὸ μὲν τῷ καρκίνῳ, καὶ καρκίνῳ πρόμακτος, τὸ δὲ τῶν καρκίνων στρογγύλον. hoc est. Cancer solus ex crustaceis non regitur cauda, et corpus eius quidem locustis, squillisq; longum sit, cancris uerò rotundum est. Porro astacos Oppiano speciatim dicitur *gammara* magnus ille marinus, quæ Romani, et Tyrrheni litora incolentes Leonem appellant. Veneti autem, quasi adhuc Græcum nomen retineant, eum uulgò Astase nominare consueuerunt. Idem dictus est *gammara* à Theodoro Arfione interpretè: quippe quòd uulgaris *gammari* faciem representet. Veruntamen (ni fallor) Aristoteli ἀστὰς aliud esse crediderim, quàm quod Venetis astase, Romanis uerò leo nuncupatur: quandoquidem is paulò inferius postquam de marinis, quæ crusta integuntur, animalibus differuisset, uidetur sanè uulgares fluuiatiles *gammara*s describere statim post fluuiatiles cæcros, cum inquit. ἔστι δὲ καὶ ἕτερον γένος μικρόν μὲν, ὥς περ οἱ καρκίνοι, τὸ δὲ ἄνθρωποις ὁμοίον τοῖς ἀστάκοις. hoc est. Genus item aliud est, quod quidem paruum est ueluti cancri, facie uerò astacis simile. Hæc, meo quidem iudicio, declarant, Græcis fluuiatilem *gammara* proprio carere nomine, utpote & paruorum cancrorum aliqua genera, ut ipse eodem loco testatur Aristoteles, cum inquit. Ceteri minutiores, & nullis penè nominibus annotati. Quo fit, ut putauerim ego *gammara*s Galeno appellari γαμμάριδες, mutuato, cum Romanum uenisset, à Latinis uocabulo, quòd eo carerent Græci. Namq; lib. 111. de alimentorum facultatibus: Ἀστὰς (inquit) καὶ γαμμάριδες, ὅσα τὰλλα λεπτὸν ἔχοντα τὸ πρὸς τὸν ὄσφρακτον. hoc est. Astaci, paguri, cancri, locustæ, carides, *gammarides*, & id genus alia tenui testa conclusæ. Magisq; hoc affirmare non dubitauerim, quòd nomen hoc à Galeno Græcum factum, nec apud Aristotelem, nec apud quemquam repererim unquam. Quibus etiam ex uerbis palàm certè est, inter *gammara*s, & cæcros manifestam esse differentiam. Quamobrem eos medicos hallucinari censemus, qui pro Cancris ad canum rabidorum morsus, itemq; ad tabidos, & marasmo laborantes *Gammara*s utuntur: quandoquidem cum Dioscoridem, tum Galenum non de *gammara*s quidem, sed de cancris intellexisse nobis compertum sit. De cancris Galenus libro 11. de simplicium medicamentorum, hæc fusius scripta reliquit. At fluuiatiliū cancrorum cinis, quanquam similiter prædictis exiccatorius est; substantiæ tamen proprietate mirificè contra rabiosorum morsum efficax est, isq; tum solus, tum cum gentiana, & thure multò præstantior. Thuris sanè partem unam esse oportet, quinque autem gentiane, porro cancrorum decem. Et rarò equidem aliter illis uestis nos sumus usi: ceterum ad eum modum plerumq; quo Aesclepiion empiricus ille utebatur medicamentorum peritissimus senex, conciuis, ac præceptor meus. Patella erat eris rubri, in quam impositos cancros uiuentes, hætenus urebat, dum facile ad leuiorem redigi possent. Hic Aesclepiion paratim; promptum semper in ædibus hoc habebat medicamen, urens cancros tempore æstiuo post ortum canis, quando solis leonem transisset, luna decima octaua. Porro bibendum hoc medicamen ijs, qui à cane rabido fuissent morfi, prædictè quotidie usq; ad diem quadragesimum, mensura cochlearij satis magni aquæ inspersum. At si non protinus ab initio, uerum aliquot post dies curam cœpisset demorsus, tunc quotidie duo cochlearia aquæ inspergebat. Ad ipsum uerò uentus emplasticum applicabat medicanētum, quod ex pice brutia, & opopanace, acetoq; conficitur, habens picis librā unā, unum aceti acerrimi sextarium Italicum, opopanacis uerò uncias tres. Hæc tametsi à præsentī instituto esset aliena, scribenda tamen censui, quia magnopere medicamento huic ipse considerem: nimirum cum nullus unquam eorum, qui illo, ut dictum est, fuerunt usi, sit mortuus. Ceterum seorsum alterum librum conscribam aliquando de his, quæ proprietate substantiæ totius quid agunt, è quorum numero sunt id genus omnia. Ignoscendum itaque tum hoc in loco scribendi importunitati, tum sicubi præterea id mihi hoc in opere contigit: nempe quia ex dictis summa præueniret utilitas, quam sanè posteris impertire uolebam, si forsā me prius, quàm quæ his deinceps sunt opera, percussissem, mors occupasset; propositum impediens. Ceterum Pelops doctor meus & ipse omnium eiusmodi causis redere uolens, non abs re inquit. Cancer cum animal sit aquaticum, prodest à cane rabido morsis, quibus uidelicet metus est ne corripiantur affectu siccissimo, nempe rabie: quamobrè sanè etiam aquam metuunt. Ac fluuiatiles, non marinos conuenire cancros dictabat, scilicet quòd animalia marina ob admistionem salis naturæ siccissimi hanc aquæ exactam tuerentur eam, quæ est aduersus rabiem, contrarietatem. Ac cum quidam subiecisset, cur non omnia, quæ in potabili aqua degunt animalia, perinde ut cancri, iuuare assolent? quia, inquit, similem cancris præparationem nos admittunt. Nam horum uestorum cinerem, exiccatorius cum sit, canum mordentium uenenum absumere, similisq; egerere professus est. Hæc igitur Pelops dicebat ambitione magna iactitans, omnium se talium nouisse causas. At ego nisi planè me scire quippiam prius persuasum habeam, alijs persuadere non tento. Itaq; nec Pelopis rationem, ut ueram accepi, ut quæ crebras habeat contradições: uerum cancros opinor ex proprietate totius substantiæ prodesse. Quoniam autem nullum eorum mortuum sciueram, qui fuerant illis usi, totis utiq; corporibus, hoc aperientem, recensendumq; à me existimaui, tametsi non esset huius instituti proprium: nam id non erat propositum. b. a. c. Galenus. Ceterum *gammara*rum faciem referunt locustæ, & squille; quanquam hæc chelis careant. Græci *gammara* eo tantum tempore, quo crustam exuunt, duos in capite lapillos albos, rotundosq; quibus utuntur medicè utiliter ad expellendos renum calculos: conterunt enim hos in puluerem, & ex uino potandos exhibent. Romanis autem cancris marinis similibus, quos Adriatici accolæ, maris & foeminae discrimine uulgò Granchi, & Macinette nuncupant, abundat maxime ubiq; suis in fluminibus, ac riuiis Hetruuria. nam quemadmodum Insulæ, Trusculæ salinarumq; regionum fluuij, ac lacus *gammara*s alunt; ita Hetruuria cancros, utpote & Græcia, ubi ab Aesclepiione, & Galeno à cane rabido demorsis ex eorum cinere saluberrima parabatur antidotus. Sed & illi non

Gammara  
lapilli.

Cancris fluuiatiles.

Quorundam  
error.


in errore uersentur, qui putant marinos minutiores (ut ita dicam) gammarulos, quos uulgò Gambarelli, & Gambari appellant, eos esse, quos tum Aristoteles, tum Galenus, tum Aelianus, tum Plinius cancellos nominant. quippe quòd hi gammaruli Aristoteli propriè squille parue dicantur. Siquidem ij, qui in hoc genere nunquam rufescunt, & cetis alijsq; quàm plurimis populis proprium adhuc Squille retinent nomen: uulgò enim Schille dicuntur; quancum in Hispania, præsertimq; in Cantabria omnes hi gammaruli Squille nulla differentia uocentur. His, ut diximus, disputatur Aristoteles lib. 1111. de partibus animalium cap. V111. cum inquit. Squille à cancerario genere differunt, eo quòd caudam habeant: à locustario uerò, quòd forcipe careant. Quibus sanè claret, canceris nullam inesse caudam. quapropter omne crustatorum genus, cui cauda desit, in cancerario genere fuerit recensendum. Cuiusmodi sunt maxè uulgò Granceuole, paguri uulgò Granciporri, marini ac fluuiatiles cancri uulgò Granchi appellati, & id genus plura. Nec aliam ob causam diximus, gammarulos paruas dici squillas, nisi ut omnibus notum sit, eas etiam habere longe maiores, ut memorie prodidit Aristoteles libro 1111. capite 11. de historia animalium, sic inquit. Squillarum enim genere continentur gibbe, crangones, & parue, quæ maiores nunquam effici possunt. Quibus liquet constare, uulgares gammarulos Aristoteli paruas facile esse Squillas, cum ij maiores nunquam euadant, quàm qui semper parui in piscarijs habentur uenales. Quinetiam id ipsam affirmare non dubitamus, quòd ijs cauda sit locustarum, & gammarorum modo, chela uerò, seu forcipes deficiant. Qui autem, qualèsue Cancelli sint, nomine ipso paruulos cancos designantes, scripsit Galenus libro tertio de alimentorum facultatibus: Cancelli, inquit, ariscula sunt perexiguus canceris similia, colore flauo. Afferuntur enim cancelli inter minutulos pisciculos duplici sanè genere, ut quarto tum libro, tum capite de animalium historia retulit Aristoteles his uerbis. Quem autem cancellum appellant, communis ferè socius crustatorum, & testatorum generum est. quippe qui natura locustis similis spectetur, nasciq; seorsum per se solitus sit. Verum quòd testam deinde petit, quàm ingressus uitam traducat, hinc similibus testa contectis animalibus est. quapropter is in ancipiti esse, genusq; sibi uendicare utrumque uidetur. Forma tamen (quod simplicius dixerim) similis araneis est; nisi quòd partem capiti, & pectori subditam ampliorem, quàm aranei habeat. Cornicula duo rufa, tenuia gerit, quibus oculi magni totidem subiacent, qui nunquam intro recedant, ut cancrorum, sed semper eminentes appareant. Os sub ijs est, quod uelut capillamentis quibusdam pluribus circumdatur. Iis pedes subiecti duo bifurces, quibus cibum ori admoueat: bini item utriq; adherent lateri, & tertius paruus. Thoracis pars inferior mollis tota est, disiectoq; sinu pallidum intus cernitur. Meatus ab ore ad uentrem pergit. foramen excrementi perspicuum nullum potest. Pedes, ac thorax duritiem præ se ferunt, sed minus, quàm cancri. Rex nullo testis adheret, purpurarum modo, & buccinarum, sed absolutus liberq; uagatur. Oblongior est, qui turbonem subit, quàm qui neritem (quem naticem interpretamur) genus enim diuersum est, quod in naticæ degit, cætera quidem non absimile: sed dextram bifurculatam pedem paruam habens, cum leuam grandiusculum habeat, & ingredi eodem ipso grandiore potissimum solet. hæc Aristoteles. Aelianus uerò lib. x111. cap. xix. de cancellis ita scribit. A conchis quidem inopes, & nudi primum cancelli nascuntur, deinde eas tanquam domicilia ad habitandum deligunt. Cum enim uacuas, & inanes offenderint conchulas purpureæ, aut turbinis, primò intra eas ingrediuntur: deinde cum in ampliorem magnitudinem excreuerunt, quàm ijs ut capi queant, in testam laxiorem tanquam domum alteram demigrant, neque modò in supradictorum conchas immigrant; sed & in permultas alias capaciores transeunt, & ampliores nasci, ea tanquam maiore domicilia gaudent: ac sepe de spolijs multo certamine inter se contendunt, uiribusque inferiore repulso, uictor exuias assequitur. hæc Aelianus. Cui in omnibus subscribit Plinius lib. ix. capite xxxi. & xlii. His igitur diligenter perspectis, omnibus, ut arbitror, palàm fiet; & cancos à gammaris, & cancellos à squillis differre.

Squillarum  
consideratio.

Cancellorum  
consideratio.

## Σcorpιος χερσαίος. SCORPIO TERRESTRIS. Scorpio CAP. XI.

TERRESTRIS Scorpio tritus crudus, & impositus, suæ plagæ remedium est. Quin etur assatus, ad eadem.



TERRESTRIS



Scorpionum  
consideratio.

Scorpionum  
genera.


Scorpiones  
aligeri.

Scorpionum  
facultates.

Olei ex scor-  
pionib. uires.

TERRESTRES Scorpiones animalia sunt uulgò nota, quòd in quacumq; domo, non modò in cubiculis, & cellis uinarijs; sed ubiq; passim reperiantur: adeò est hominum uitæ periculis obnoxia. Licet autem sint in Italia ueni uenenosi, minusq; nocui, quàm alijs in regionibus, quæ sub meridie sitæ sunt; ipse tamen complures uadi in Hæc-  
ria à Scorpionibus ictos, qui seuisimas perpeffi sunt exacerbationes, & quasi ad mortem redacti. Contrà in regio-  
bus frigidis minus nocui sunt. In agro Tridentino à Scorpionibus icti nihil noxæ percipiunt. Quod tamen cæcitate  
fermant gratia peculiari sibi à Deo impertita precibus diui Vigiliij episcopi, quem & patronum præcipuum habet,  
et aduocatum apud Deum. Hoc idem asserit Aristoteles libro VIII. cap. XXIX. de animalium historia, ubi sic uer-  
borum. Morsus beluarum ex locorum diuersitate plurimum differunt, ut in Phæro, locisq; alijs, scorpiones non lædunt. &  
in alijs locis, & præcipue in Scythia, multi & magni nocui sunt, & uel hominem, uel quàmuis bestiam percusserint,  
interimunt: nec sues euadere possunt, quanquam cæteros uirulentos ictus minime sentiunt. Plinius, Auicenna,  
Albertus, Aclianus, & aliorum pleriq; nouem Scorpionibus genera assignant, diuersis duntaxat coloribus diffrin-  
gunt nimirum quòd alij sint flauij, alij rufi, alij cinerei; alij ferruginei, uirides alij, alij lutei subatræq; cauda, alij umosi, alij  
bi, alij deniq; fuliginis colore. Præter nigros, & ferrugineos, uirides quàm plurimos me uidisse, legissq; recorder, in  
comitatu Arci non longè à Sarca flumine, quadam in syluula nouellis quercubus confita apud sacellum diui Pauli, ubi  
paruo admodum tempore, sirio ardente, ego, & eremita quidam, de his qui sub saxis latebant, plus quàm mille, &  
quingentos collegimus, crassos, & plurimum factos. Plures inter eos foeminas inuenimus, quæ suos nuper editos  
fetus albos, pediculi magnitudine, sub uentre secum ubiq; gerebant, singuli singulis cruribus adherentes. Quapropter non  
ab re prodidit Aristoteles libro V. capite XXVI. de historia animalium, quòd terrestres Scorpiones uermiculos om-  
nium speciei pariant complures, & incubent: mox ut prolem perfecerunt, pellantur ab ea ipsa, & interimuntur à suis  
liberis magno numero: sæpius enim undenos pariunt. Plinius autor est, Scorpionum ictum, multo magis feru-  
pernicialem esse, quàm uiris; præsertim uirginibus, quibus semper lethalem esse ait. Quibus septeni in cauda inter-  
dij numerantur, longè sæuiiores habentur, quàm ij, quibus tantum seni insunt. Nonnulli præterea literis mæde-  
runt, quibus subscribit Strabo lib. xv. suæ Geographiæ, Scorpiones quosdam habere alas, quibus per aëra uolantes  
de una in aliam regionem deferuntur. Hoc enim credere non uidetur absurdum, cum idem formicis similiter eueniat:  
quandoquidem & hæc isdem ferè coloribus distinguuntur. Tantòq; magis credendum est, quòd in Castella Hispania  
regione sæpius agricolæ aliquos terræ cespites aratro scindant; ubi formicarum more innumeri scorpiones gregatim  
byeme delitescunt. Citra Cynamoluos Aethiopas latè deserta regio est, à scorpionibus gente sublata, si Plinio cre-  
dimus. Qui præterea tradit, quòd, si decem cancri cum ocini manipulo adalligentur, omnes, qui ibi sunt scorpiones,  
ad eum locum coibunt. Quod tamen Dioscoridi manifestè refragari uidetur: nam superius in cancribus ita scrip-  
tū reliquit Dioscorides. Cancris scorpiones necant, si triti cum ocino admoueantur. Ferant à uestis, apibus, & cæte-  
ribus eos non icti, qui prius à scorpione percussu fuerint. Quinetiam narrat Plinius libro XXV. capite X. Scorpiones  
mortuos reuiuiscere, admocto albo ueratro. Quidam medici utuntur Scorpionum cinere, qui uiui sint exusti, ad ueni-  
ciendam, ijs præcipue, qui renum, aut uesticæ calculo obstruuntur. Quo fit; ut in hunc usum commendauerit Nestor  
oleum ex ijs præparatum, quod officinæ habent, renibus & pubi illitum. Hoc idem commendauit Auicenna ad acrium  
lores. Ego tamen illud usu exploratum habeo, quòd oleum per me factum, in quod sanè magnus scorpionum uir-  
ditur numerus, cordi duntaxat, & pulsantibus temporum, manuum, & pedum arterijs illitum, ab omnibus liberat ue-  
nenis, dummodo erodenti facultate uacent. Quin & eos sanat, qui tam à uiperis, quàm cæteris uenenosis animalibus  
uel icti, uel demorsi fuerint. Qua de re ij (absit tamen uerbis instantia) testimonium perhibere possunt, qui prius des-  
sancto à sacerdotibus illiti, nostro postmodum peruncti euasere incolumes. Præstat item maxime hoc oleum, cum  
homines pestilentia seuit: quippe quòd non modò peste infectos iuuat, sed & sanos præseruet. Præstat denique et  
omnes interaneorum uermes, omnesq; dolores mulcet ex flatu, uel ex frigore genitos. Eius parandi rationem tradi-  
mus (Deo concedente) libro sexto, ubi de uenenorum remedijs, siue antidotis latius differemus.

# SCORPIO MARINVS



# In Lib. secundum Dioscoridis. 167

Σcorpίος θαλάσσιος. SCORPIO MARINVS.

CAP. XII.

MARINI Scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, albugines, & hebetudines.


CREDIDERE quidam marinum Scorpionem, & Scorpenam uocatam, nihil inter se differre. Veruntamen, quod scorpēna sit marinus scorpīo, nemo non ibit inficiis, qui & Aristotelis, et Atheni auctoritate nitatur: uterq; enim ad inuicem distinxit illos. Porro Scorpēna in dorso spinam gerit uenenatam, qua imprudentes piscatores sepius igit: neq; iam desuerunt, qui eius ictu sint interempti. Proinde existimarunt nonnulli, ictuum similitudine falsi, inter scorpēnam, & marinum scorpionem nullum prorsus interesse discrimen: Ceterum Scorpīo, & Scorpēna (ut equidem arbitror) eiusdem ferē generis sunt, sed in specie & forma, inter se pluribus differunt. Siquidem Scorpīus ē pelagijs piscibus est, scorpēna longē maior; adeo ut octonas, nouenasq; quandoq; ponderet libras. Scorpēna uerō piscis est litoralis, scorpione multo minor, Scorpīus item uniuerso corpore rubet: cornua bina in capite gerit, sed mollia: & acutos in ore dentes, minutulos tamen: pinnis constat aculeatis, tam his, quæ per medium excurrunt dorsum; quam his, quas anteriore, & posteriore parte gerit, sed ijs tantum aculeis igit, qui dorso annectuntur: quorum tamen uis his, qui scorpēnae insunt, imbecillior est. Hunc sunt, qui uulgò uocent Pesce cappone, sed in Hetruria maritimis quibusdam locis uocatur Cerna. Scorpēna autem, quæ suum apud omnes retinet nomen, nec cornua habet, nec dentes adeo acutos: gerit tamen in dorso aculeos scorpīi modo; sed eminētiōres, ac duriores, nec usque adeo pinnatos: in ceteris uerō pinnis ijs omnino caret, præterquam circa branchias, ubi duos prælongos habet aculeos, & nonnullos circa caput: corpore est in nigro uirescente. Sunt tamen, qui indifferenter scorpium scorpēnam uocent, quod quadantenus sibi inuicem corresponsdeant non modò figura, sed & carnis bonitate.

Scorp. mari-  
ni, & scorpē-  
na: confid.

Δράκων θαλάσσιος. DRACO MARINVS.

CAP. XIII.

DRACO marinus dissectus, & apertus, impositusque ictus spinæ suæ, qua ferit, medela est.



VARIAT autorum sententia in marini Draconis historia. Quandoquidem Alberto marinus draco ingens est bestia, serpentis faciem referens, alis non amplioribus, quam quæ ad natandum sufficiant, sed ob uirum præstantiam omnium aqualitium uelocissimus censetur. quapropter breui admodum tempore ingentia metitur maria. Quin & uenenosum est illi animal, adeo ut quoscunq; pisces, uel alia quæcunq; animalia dente uulnerauerit, interimat. Piscatorum præterea artificio captus, statim ut in arenam sese protrahi cernit, mira celeritate scrobem in litore fodit, qua se condere possit. hæc Albertus. Qui etsi ex Aristotele, & Plinio (ut opinor) transcribat; plura tamen addere uidetur, quibus an multa sit adhibenda fides, quid statuam non habeo. Siquidem hoc animal Aristoteli tanta admiratione non præstat, nec draco appellatur, sed serpens, ut is posteritatis memoriæ commendauit lib. ix. cap. xxxvii. de historia animalium his uerbis. Serpens marina colore, & corpore congrua proxima est, sed obscurior, atque acrior. Hæc si capta dimittatur foris, in arenam rostro quam primum adacto terebrat, subitq; tota. Est ore acutiore hæc, quam terrestres. Et lib. ii. cap. xiiii. Sunt etiam (inquit) maris indigenæ serpentes terrestribus similes; nisi quod caput habeant congrui. Et quidem genera earum plura sunt, colore numeroque uarietatis. Nasci eas non in altissimis gurgitibus certum est. Plinius hoc animal non serpentem, sed draconem marinum pariter cum Alberto uocat lib. ix. cap. xxvii. sic inquit. Rursus draco marinus captus, atque immisus in arenam, cauernam sibi rostro mira celeritate excauat. At hic, mea quidem sententia, Draco marinus haudquaquam fuerit, de quo scribit Dioscorides, sed per se maris serpens. Quandoquidem Aristoteli libro viii. cap. xiiii. draco marinus piscis est litoralis, quemadmodum dentex, scarabeus, cernua, aurata, mugilis, mullus, turdus, pulcher, gobius, atque alij complures, & omne saxatile genus. Proinde dicebat Plinius lib. xxxii. cap. xiiii. Extra has sunt totius in oleario usu cochleæ, cucumis, cynopus, cantharus, cynosdemia, draco. quidam uolunt esse dracunculum. Est autem graculo similis: aculeos in branchijs habet ad caudam spectantes. Huic sane non parum correspondere uidetur is, quem Veneti piscatores, itemq; Aquileienses, & Tergestini Araneum uocant, & uulgò Pesce ragno. Quippe qui inter litorales aculeos circion branchias habeat, caudam uersus spectantes, & alios in dorso adeo uenentosos, ut ab eo icti, nisi curam admiserint, facile interimantur. Itaque & is uidetur Plinio fuisse draco, uel dracunculus,

Draconis ma-  
rini confid.

culus, quem libro IX. cap. XLVIII. ipse araneum quoque uocauit, cum inquit. Aequè pestiferum animal aranea, spine in dorso aculeo noxius. Praesertim cum libro XXXII. capite ultimo inter litorales, et maris magis pecu- res pisces non aliter araneum recensere uideatur, quàm draconem Aristoteles.

Σκολοπένδρα.

SCOLOPENDRA

CAP. XIII.

SCOLOPENDRA marina in oleo decocta si illinatur, auellit capillos: sed contactu prius facit.

Scolopendraz  
consideratio.


SCOLOPENDRA marina animal est exiguum: atque, ut prodidit Plinius libro IX. capite XLIII. est terrestri non dissimilis, quam etiam Hetruria centipedam appellat. Dicunt hanc (si tamen ijs autoribus est adhibenda fides) statim, deuorato hano, omnia interanea innocuè euomere, ac deinde, eo ab intestinis explicato, sua eadem resorbere uiscera. Quocirca mecum saepius cogitavi, non inuincendum fore, eius uiscerum speculari anatomem. Sed nec ipsam hactenus mihi uidere licuit.

Νάρκη.

TORPEDO. *ku hus Kopf*

CAP. XV.

MARINA Torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus uehementiam mulcet, eadem apposita euerfam sedem, prociduiamque coërcet.

Torpedinis  
consideratio.Torpedinis  
mira facultas.

TORPEDO in chartilagineorum, planorumque piscium genere ab autoribus recensetur, perinde ac raia, lei- raia, rhombus, solea, pastinaca, et alia id genus plura. Hæc dorso rubescit, maculis quinque, nigris (quod in eadē tē- tūm uisitur) interiectis, oculis similibus: supina uerò parte albicat. Tanta huic uis peculiaris inest, ut retibus capta, anteaquàm manu attingatur, et manus, et lacertos piscatoris stupore non modico afficiat: id quod etiam sit, si ca- piatur hano. Talis namque huius facultas per setas, et hastam insensibili quodam modo permeans, ad manum piscato- ris tandem transuecta, celeriter torporem inducit. Idcirco Galenus libro VI. de locis affectis: Ea (inquit) potentia torpedo prædita est, ut si fuscina attingatur à piscatore, transmissa qualitate per hastam ad manum, eam repenti ob- stupefacit. Idem postea retulit Plinius, libro XXXII. capite primo, sic inquit. Torpedo etiam procul, et elo- ginquo uel si hasta, uirgæue attingatur, quàmuis præualidos lacertos torpescere facit, et pedes quàm libet ad cursus ueloces alligat, et retinet. Et libro IX. capite XLII. ita scribit. Nouit torpedo uim suam: ipsa enim non torpet, mersaque in limo se occultat, pisces, qui securi adnatantes obtorpuere, corripiens. Quod ante ipsum prodiderat Ari- stoteles libro IX. capite XXXVII. de historia animalium. Ceterum proprietas hæc uiuis duntaxat inest: nam si es- dem in exanimatis persisteret, comestæ (ueniunt enim frequenter in cibis) uniuersum corpus stupidum redderent.

Torpedinis  
uires ex Gal.

Quonobrem Galenus libro XI. simplicium medicament. de ea ita scriptum reliquit. Sed et Torpedinem totum (dico autem animal marinum) capitis dolores sanare capiti admotam, sedemque euerfam coërcere, à quibusdam est proditum. Verum ego cum utrunque essem expertus, neutrum facere comperi. Eam igitur cum cogitarem, adhuc uim esse applicandam, cui caput doleret (posse enim fieri, ut hoc medicamen anodynū sit, hoc est, dolore liberet, similiter alijs, quæ sensum obtupefaciunt) ita habere comperi. Putoque eum, qui primus est usus, tali quapiam motum ratione uti aggressum. hæc Galenus. Venetijs piscis hic ab effectu, uulgo Tremolo appellatur: siquidem membro stupefacto, subinde tremorem incutit. Romani uerò (me quidem latet, unde id nomen traxere) eundem uulgari nomine Esti potta, et Fotterigia dicere consueuerunt.

Ἐχιδνα VIPERA: *Natrix* CAP. XVI

VIPERINAE carnes si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt: nervorum uitij auxiliantur: incrementum strumas reprimunt. Detracta autem cute, caput caudaque, quoniam carne uacant, amputari debent. quippe commentitium est quod præcipitur, certam utrinque mensuram præcidi oportere. Reliquum uerò corpus exemptis interaneis elotum, dissectumque discoquitur cum oleo, uino, salis exiguo, & anetho. Aiunt ijs, qui viperas esitent, pediculos procreari: quod plane à ueritate abhorret. Adjiciunt aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo uescuntur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. Viua autem vipera in fictile nouum demittitur: adjiciuntur salis, caricarumque tritarum, singulatim quinque sextarij, mellis cyathi sex, mox fictilis operculum luto oblinitur, & fornacibus inassatur, donec sal in carbones redigatur, qui postea tritus in pulueris faciem, reconditur. Plerumque, ut ori gravior fiat, immiscetur spica, aut folium nardi, aut malabathri momentum.



IAMPRIDEM ceptum est ueras Viperas nancisci in Italia. Earum enim partus eas indicarunt: quando quidem recentiorum medicorum quidam Viperas summo studio indagantes, ut Galeni more, hoc etiam euo legitimam possent parare theriacam, inito consilio cum his circumforaneis, qui serpentibus alendis questum faciunt, Viperas ipsas pregnantes sunt consecuti, que in capsulis conclusæ catulos peperere, quod proprium Viperarum sit animal edere, non quidem oua, ceterorum serpentium more. Nec tamen propterea illud uerum esse compertum est, quod nascentes Vipere uiscera abrodant, occisa parente, ut libro de theriaca ad Pisonem prodidit Galenus (si tamen is liber legitimus est) ex Nicandri autoritate, & Plinius libro x. capite lxi. Qui Aristotelis uerba perperam interpretari deprehenditur, à quo Vipere historiam ipsum accepisse liquido constat. Cuius sententiam non tantum explodit, quod experimento compertum est; sed & Aristoteles ipse: quandoquidem nusquam dixerit, uiperinos foetus parentis uiscera, aut iterum abrodere, sed quod qui tardius eduntur catuli (tardius enim ideo illi excluduntur, quod Vipera singulos singulis diebus parit) abrodunt membranam quandam, qua in matris utero obuoluuntur, ut citius prodeant in lucem. Qua in re, ut hoc omnibus palam sit, sic lib. v. de historia animalium capite ultimo, sonant Aristotelis uerba. τὸ δὲ ὄφειν οὐ μὲν ἔχει ἐξ ὡοτοκῆς, ἐν αὐτῷ πρῶτον ὡοτοκῆσας. τὸ δὲ ὄν, ὡς περ τῶν ἰχθύων, μορφοῦται, καὶ μαλακώδερμον. ὁ δὲ νεοτὸς ἀποθνήσκει, καὶ οὐ περιέχει φλοιὸς ὀσσεώδης, ὡς περ τῶν ἰχθύων. τί τε δὲ μικρὰ ἐχίδνα ἐν ὑμέσιν, οἱ περιέχοντες τριταῖοι. ἐν ὅτε δὲ καὶ ἐσωθεὶ διαφύονται αὐτὰ ἐξέρχεται. τί τε δὲ ἐν μίᾳ ἡμέρᾳ καὶ ἐν. τί τε δὲ πλεονῶντος. Id est. Vipera est serpentibus animal edit, ciam intra se primam oua pepererit. Ouum hoc unius coloris, & molli cute contextum, ut piscium est. Foetus supernè gignitur, nec duro cortice continetur, sicut nec piscium quidem. Parit paruas uiperulas membranis obuolutas, que tertia die rumpuntur. Euenit interdum, ut qui in utero sunt, abrosis membranis prorumpant. Singulos diebus singulis parit, pluresque parit, quam uiginti. hec Aristoteles. Cuius sententiam (ut dictum est) perueniens Plinius, ubi ei dicendum fuerat, quod ultimæ uiperulæ adhuc in matris utero degentes, sua abrodunt inuoluta, cūte aquam prorumpant, dixit ceteras tarditatis impatientes, percurrere latera, occisa parente. Porro hæc explosæ sententiæ etiam Philostratus refragatur, nam in uita Apollonij Tyanei narrat, Apollonium ipsum uisum, ac in coluмен uidiſſe Vipera, que suos catulos nouissimè exclusos lingebat. Marſi præterea, qui serpentium denotatores se prædicant, quiq; falsò ex diui Pauli profapia se originem duxisse gloriantur, Vipera Marſo uulgò appellari, utq; maiorem cum spectatoribus incant gratiam, sepiſſimè uiperinos dentes, longos, acuminatos, atq; moriferos ostentant, conditos (ut Plinius inquit libro xi. capite xxxvi.) gingiuis, atq; membranula quadam circumlectos, lethali ueneno refert. Quin & uiperarum nuper editos foetus ostendunt, quos Vipera suis alunt in capsulis, quibus

Viperarum consideratio.

Plinij lapsus.

Viperarum fa-  
cies, & sexus  
discrimen.

lis, quibus eas deferunt: nec tamen illi matris viscera scindunt. Ceterum quod Viperæ primum intra se ore per-  
mox animalia gignant, Theophrastus quoque autor est lib. VII. cap. XIII. contra eos, qui secus sentiunt. Viperæ (ut scribit Auicenna libro quarto, ubi de uenenis agit) caput habent pressum, latumq; ubi ceruici annectitur, que  
peculiariter illis tenuis est: nec corpore admodum sunt longo, utpote nec cauda. Ad hæc Galenus, cum scripsit de  
dere uellet, quibus notis mares Viperæ à feminis distent, eo libro, qui de theriaca ad Pisonem inscribitur, sic uer-  
Viperæ femine subtruse sunt, & perquam agiles, ceruice elata: oculis subrubentibus, inuerecundis, atque  
feri: ijs caput latius, quam mari, quem etiam excedunt uniuersa corporis mole, eorumq; excernens meatu  
propius caudam obtinet situm. Mari duo tantum insunt canini dentes; femine uero plures. Proinde igitur  
cander cecinit his uersibus:

Τὸν μὲν ὑπὲρ κυνὸς ὄντε δύο. καὶ τὰ κεφαλῶν αἰχμὰς, ἃς τοιοῦτον ἔχει, αἰχμὰς  
Ἰὼν ἔρευνόμενος, ὡς λέγουσιν οἱ τοιοῦτοι ἐχθροὶ.

Hoc est soluta oratione.

Plinij lapsus.

Masculi quidem supra canini dentes duo colore notantur, uenenum eructantes: at plures semper femine insunt. Il-  
lud insuper addiderim, Aristotelem memoriam mandasse libro VII. cap. XV. de historia animalium, quod licet hinc  
ceteri serpentes cauernas subeant terræ; uiperæ tamen sub saxis condantur. Ex quo palam est, Plinium hoc etiam lo-  
co non recte intellexisse Aristotelem: quippe quod tradiderit lib. VII. cap. XXXIX. Viperam solā terrā con-  
teras arborum, aut saxorum cauis. Illud item reticuit, Aristoteles, quod Plinius poetā secutus retulit, feminam solā  
cet in coitu mari caput abrodere uoluptatis dulcedine. Sed ut iam Viperis uires suas, ac facultates reddamus, hæc  
nunc referam, quæ de ijs lib. XI. simplicium medicament. tum libris de antidotis pluribus posteritatis memorie prodi-  
dit Galenus.

Viperinæ car-  
nis uires ex  
Galeo.

Viperarum igitur carnes palam uidere est excelsa facientes, & deficcantes, ubi conduuntur ceu angulae,  
nempe oleo, sale, anetho, porro, & aqua, seruato nimirum modo. Quod autem totum corpus per cutim purgetur,  
discere tibi liceat uel ex ijs, quæ ego iuuenis etiamnum in Asia nostra sum expertus: quæ singulatim deinceps nar-  
rabo. Homo quidam morbo, quem elephantia cognominant, laborans aliquousq; cum sodalibus conuersabatur, donec  
ex ipsius consuetudine conuersationeq; quidam nostrum morbi insiceretur contagione: ille iam graueolens erat, &  
deformis. Constructo igitur illi tugurio proxime uicium in iugo collis propter fontem; illic hominem collocant, tan-  
tum illi quotidie ciborum ferentes, quantum uictui suppeteret. Ceterum ad canis exortum, cum forte messoribus hæc  
procul inde metentibus uinum esset allatum in fictili sanè quam fragrans; is quidem, qui attulerat, deposito illo prope  
messores, abiit. Verum ubi eius bibendi aduenisset tempus, sublato fictili adolescens, ut pro more impleto citius,  
competentē aqua uinum temperaret, in cratera uinum effudit, & unā excidit uipera mortua. Quare attorin mes-  
sores, ueriti ne quod, si ebibissent, inde sibi malum eueniret, suam quidem sitim aquæ potione sedare maluerunt.  
Ceterum cum illinc discederent, quasi præ humanitate ac misericordia, homini illi elephantia obnoxio uinam largi-  
tur, rati expedire illi potius mori, quam uiuere in ea miseria. At ille, ubi ex hoc bibisset, admirabili quodam modo sa-  
nitati restitutus est. Nam tuberosum illud omne cutis totius non aliter, quam animalium à testis mollitie nuncupan-  
rum malacostracæ, tegmen decidit. Quantum autem reliquum erat, molle admodum apparuit, instar cutis canero-  
rum, & locustarum (carabos Græci uocant) ubi extrema testa exciderit. Alterum quoq; eiusmodi non dissimili es-  
su in Mysia Asiæ, non procul ab urbe nostra accidit. Vir quidam elephantia laborans profectus est ad aquarum cele-  
darum sponte nascentium usum, sperans inde nonnihil se commodi adepturum. Erat illi scortum ancilla, iuuenis  
la sanè formosa, compluribus amatoribus ambita. Profectus igitur illis, cum aquis uteretur, in edibus, quibus uicinus  
erat locus squalidus, & uiperarum plenus, fortè fortuna ex illis una in urceum uini incidit negligentius positum: ex-  
tinctaq; est. Ac scortum quidem in lucro id reputans, quod fors euenisset, hero id uini propinat. Ceterum ille, ubi  
ebibisset, ad eum modum, quo ille, qui debebat in tugurio, persanatus est. hæc Galenus. Qui etsi alia è uiperis expe-  
rimenta ibidem scripserit, unde similiter alij incolones euasere, ut eius firmior redderetur ratio, quod scilicet uipe-  
rarum esu elephantiaci sanentur; attamen breuitati consulentes; ea hoc loco silentio inuoluenda duximus. Verum  
enimvero nil mirum alicui fuerit, Viperas ambas, quarum meminit Galenus, se tam facile immersisse uino: siquidem  
illis natura comparatum est, ut uino summopere delectentur. Quamobrem narrat Aristoteles lib. VII. cap. IIII.  
de historia animalium, quod ideo uiperas aliqui uino cum fictilibus ad sepes disposito uenantur, quia uini incontinentes  
sunt: ebriæ enim capiuntur. Id quod etiam dixit Dioscorides in sexti libri præfatione de uenenis, uenenatissiq;  
agens. Quinetiam uiperæ (ut ad Pisonem scribit Galenus) buprestes, & cantharides deuorant. Item Aristoteli  
testimonio lib. VII. cap. XXIX. de historia animalium, scorpionum deuorari à uipera certum est: ob idq; (ut idem est  
autor) eorum uenenatorum morsus grauiores sunt, quæ alijs animalibus uenenatis uestiuntur: quod profectò fa-  
ciunt uiperæ. Hæc theriacen ingrediuntur: at non omnes, nec omni tempore capte probantur. Proinde Galenus lib.

Viperæ uino  
delectantur.

Viperarū ue-  
natio, & carū  
pastilli.

bro primo de antidotis rem hanc scitè & aperte declarauit, sic inquit. Viperas non ut aliqui faciunt, estate re-  
dia, neque statim, ubi cauernas egressæ fuerint, uenari conuenit: estate siquidem earum caro sitim excitat, statimq;  
ab egressu frigida est, sicca, & extenuata. Optimum itaque tempus est, quod ijs medium intercedit, quod & Andro-  
machus ipse significauit, quo tempore & qui Baccho sacra faciunt, uiperas dilacerare solent, uere quidem finitur,  
nondum tamen estate inchoata. Vel si uer ad magnam sui partem hyemale fuerit, circa principium æstatis, non tan-  
to tempore post pleiadum ortum. Viperas autem, quæ pregnantiores sunt, reijcere oportet: aliarum uero caput, &  
caudam abscondere. nam præterquam quod hæc particule uirulentiores esse uideantur, etiam duræ, & parum carnis  
habent. Sufficit autem in magnis uiperis, id, quod utrinque amputatur, quatuor digitos æquare. Totum uero reli-  
quum corpus, intestinis exemptis, pelleq; detracta, aquis primo abluendum, atque in uas fictile conijciendum est: de-  
inde aqua pura superinfusa, uariisq; anetho (tunc enim uiget) ollæ prunas, ut coquatur subijcere conuenit; uel æ-  
da ligat.




ligna, quæ, quod fiamum non emittant, ἀναρῶς uocant; uel quod melius adhuc est, uitium fermenta. Salis autem, si quidem suo tempore uiperas ceperis, tantillum inmittere oportet: sin æstate iam incipiente, nihil. Porro obseruandum est, ne ille capiatur, quæ in maritinis locis, quæue in aliqua salsa aquarum lacuna degunt: antidotus enim quæ ex huiusmodi uiperis confecta fuerit, sitim excitabit. Cùm igitur Viperæ probè coctæ fuerint, ac si quis comedere uellet, eas ex aqua eximere oportet, deinde carnes ita à spinis auellere, ut nihil ex spinis simul auferatur: atque his exquisitè contritis, panis ex purissima farina optimèq; confecti, qui præcipuè & benè fermentatus sit, & in furno, nō sub clibano coctus, modicum quiddam admiscere. Nonnulli tamen in commiscendo panem Viperis hanc mensuram seruandam præcipiunt, ut panis pondus uiperinarum carnum dimidio minus sit: alij ne tertiam partem excedat malunt. Ego uerò quandoq; quartam, quandoq; & quintam panis imposui. Ceterim nisi probè coctus fuerit, periculum est, ne aliquid aciditatis medicamentum contrahat. At satius est, panem hunc ita coctum per aliquot dies loco aliquo sicciori prius exicasse. Verim cùm uiperas, & panem coniunxeris, diligenterq; adeò subegeris, ut nulla uiperinæ carnis particula non confusa remanserit, pastillos ex ea massa conficito, qui tenues sint: nam crassi cùm difficulter siccescere soleant, & carnem putrere, & panem acescere sinunt. Quamobrem panem quoq; antè siccatum terere melius est, & non, quemadmodum ante nos qui Cæsari theriacam faciebant, uiperarum iure maceratum: id quod ipse quoq; diffici, sed mihi postea melius esse uisum est, panem antea contritum uiperarum carnibus exactè iam subactis admiscere: citius nanque pastilli siccantur, qui siccum panem, non madidum acceperint. Sit autem cella, in qua pastillos siccabis, in superiori domus parte, ad meridiem conuersa, uel saltem ad septentrionem non respiciat, ut solis radios tota penè die admittat. tali enim in loco commodè siccescunt. Statim ubi fuerint conformati, ea parte collocentur, qua solares radij peruenire non possint. Frequenter autem ipsos conuertere opus erit, ut æqualiter utraque ex parte siccant. quod facere si quis omiserit, superior quidem pars celeriter arefcet; inferior autem humida diutius permanebit, periculumq; erit ne marcescant. Postea uerò quàm exiccati fuerint, maneant adhuc aliquot diebus eadem in cella longius, quàm prius à solis radijs, sepeq; denuo conuertantur. Sufficient autem ad hæc omnia quindecim dies ad summum: post quod tempus donec theriacam conficere uolueris, recondi debent in uase stanneo, aut uitreo, aut etiam aureo. Vitrum siquidem, & aurum nullam fraudem admittit: stannum autem plūbi mistura adulteratur. quod uitare conueniet, non solum in hac, sed & in quibuscunq; alijs antidotis: quemadmodum & argentum, si purum non fuerit: uasa namq; ex eo fabricata celerrimè rubiginem contrahunt, purum autem argentū, Romani candidum uocant: Ceterim longè melius est, haud multo post, quàm pastillos confeceris, ipsis uti, quanquā non multū detrimenti capiunt, etiāsi peracto anno, atq; etiam multo post eis utaris. Rectè namq; à principio siccati, ad tertium, quartumq; annum integri perseverant, dummodo tamen aptè reponantur, & subinde puluisculus quidam, qui ipsis obnasci consuevit, mundis  
30 linteis interdum abstergetur. Is namq; si diutius inhereat, pastillos perforabit. Perspicuum est autem eos inutiles euadere, qui perforati fuerint. quemadmodum antequàm hoc ipsis accidat, etiamsi multum tempus intercesserit, utiles permanent. Hæc Galenus de conficiendi pastillos Vipereos ratione, quò optimi & præstantissimi habeantur. Ceterum illud Dioscoridi ridiculum uidetur, quòd qui uiperas esitent, pediculos procreent. Cui tamen reclamatione Galenus libro XI. simplicium medicamentorum, ubi id certò ijs euenire asserit, quibus plurimum mali succi in corpore exuberat. Narrat Plinius libro XXX. capite XII. quòd Antonius Musa Cæsaris Augusti medicus cùm incidisset insanabilia ulcera, uiperas edendas dabat, miraq; celeritate persanabat. In Aegypto Aegyptios ipsos uiperis, alijsq; serpentibus similiter, atq; anguillis uictitari prodidit Galenus libro tertio de alimentorum facultatibus. Quibus item eos uesci traditum est, qui occidentales, nouiterq; repertas Indias incolunt, perinde ac ij, qui orientales inhabitant, ut libro VII. auctor est Plinius.

Aegyptijs uiperæ cibis.

## Σενεκτα ὀφεις. SENECTA ANGVIVM. CAP. XVII.

SENECTVS anguium in vino decocta dolori aurium, infusus: & dentium, collutione auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed præcipuè uiperinam.



NULLIS non cognita anguium Senecta: quippe quæ sæpe in campestribus inter saxa, & stirpes inueniatur. Senectæ anguium cōfid.  
De hac cū differeret Aristoteles libro VIII. de historia animal. cap. XV. sic inquit. Serpentes senectam exuunt

tum uere, cum egrediuntur, tum etiam autumno. Vipera etiam exiit tam uere, quam autumno. Cum serpens com-  
incipit, ab oculis primum detrahi aiunt, ita ut obsecari uideatur ijs, qui rem non intelligunt. Tum caput exiit:  
glabrum enim hoc omnium antequam reliquum corpus, apparet: atq; una fere nocte, et die senectus tota exiit à  
capite orsa ad caudam: et cute altera intus subnascente, ipsa remouetur. Ut enim foetus in uolucro secundarum, quo  
contentus prodierit, exiit; sic ista senectute detracta renouantur. Porro de ea nil aliud memoria prodidit Ga-  
lenus libro xi. de simplicium medicamentorum facultatibus, quam quod in aceto decocta dentium dolori medetur.

Λαγῶς θαλάσσιος, καὶ χερσαῖος. LEPVS MAR. ET TER. CAP. XVIII

*Marinus*

LEPVS marinus loligini parua similis est: qui per sese tritus, aut cum urtica marina illi-  
tus capillos euellit. Terrestris leporis inassatum cerebrum manditur, iuuandis tremoribus, qui  
ualetudine contracti sunt: affricu, aut cibo faciem infantibus dentitionem praestat: exultum ca-  
put, & cum adipe ursino, aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Leporinum co-  
gulum post triduum à concubitu potum, conceptum adimere, partusque spem interciperi prodi-  
tur: uulua, & alui fluorem sistit: comitiales iuuat: contra uenena ex aceto bibitur, praesertim ad-  
uersus concretum lac, & uiperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur, uicia cutis in facie, u-  
tiliginem, lentiginesque sanat.

LEPVS TERRESTRIS. *hast*



Leporis mari-  
ni confid.

MARINVS Lepus (ut nonnulli memoriae prodidere) sic primum appellari coepit, quod terrestris leporis se-  
ciem referat. Quapropter haec de eo à Plinio produntur libro ix. capite xlviii. Lepus, inquit, qui in Indico mari  
nascitur, etiam tactu pestilens, uomitum, dissolutionemque stomachi protinus creat. In nostro ossa informis, colore ta-  
tion lepori similis: in Indis et magnitudine, et pilo duriore tantum. nec uiuus ibi capitur. haec Plinius. Ex quibus  
facile conijci potest, Dioscoridem potius de nostratium marium Lepore intellexisse, quam de ijs, qui in Indico innatant  
pelago, argumento quod parua loligini similem marinum leporem reddiderit. Albertus autor est, tertium Leporis  
marini genus reperiri, communi piscium magnitudine, sed capite lepori non absimili, dorso rufescente, esculentum:  
tamen si à nonnullis explodatur, ut pote quod et concoctu contumax sit, et elephantiasim gignat. Ceterum terre-  
stris Lepus notissimum animal est, et cursu uelocissimum. Solam hoc inter cetera terrae animalia, quae utrinque dentata  
sunt (ut scriptum reliquit Aristoteles lib. iii. de partibus animalium capite xv.) et quae unicum tantum coëment  
uentrem, coagulum habet. Sunt et Lepores albi, quales etiam Plinius lib. viii. cap. lv. refert in Alpibus inueniri.  
Hi hyberno tempore admodum albicantes in summis uallibus Ananiae montibus frequentes reperiuntur; eo praesertim  
tempore, quo ij niuibz altissimis uestiuntur: qui tamē adeo magni non sunt, nec ita in cibum parati cum palato inuac-  
gratia, ut qui in campestribus capiuntur. Ceterum candidi hyeme tantum conspiciuntur: nam liquecente niue subru-  
bescunt, quemadmodum et ceteri. Cuius rei indicio sunt illi, qui cum non perfecte priores pilos exuerint, partim candi-  
di, partim subrutili uisuntur. Lepores apertis oculis dormiunt, nec (quae sua maxima timiditas est) alio quam sese  
tutari sciunt. Huic soli pilos in bucca intus, et sub pedibus esse adnotauit Aristoteles lib. iii. de hist. animalium, cap.  
xii.

Leporis terre-  
stris confid.

Vana opinio.

Archelaus autor est, cui etiam sententiae plerique subscribunt, Leporibus utrumque sexum, et utraque gignendi  
uim inesse, et omnes lepores aequè gignere, ac si essent hermaphroditi. Quod ita facile posse pati naturam, nullo pa-  
cto crediderim: sed potius ridiculam hanc opinionem in hominum mentibus insitam putauerim, quod uiderint, Lepores,  
quanquam plurimi quotidie capiantur, etiam quodammodo fecundius procreare. Veruntamen id non euenit, quoniam  
mares ipsi pariant; sed quia (teste Aristotele libro vi. de historia animalium capite xxxiii.) superfectant. Nam et  
huc utero gerunt, similiterque statim à partu coëpiunt, ita quod singulis mensibus generant. Sed foetus edunt non uer-  
uerfos:


versos : interpositis enim diebus, quot res tulerit, peragunt partionem. Vnde tam innumera fecunditas : nam etsi foemina lac nuper natis praebeat ; nil tamen prohibet, quin eadem repetat coitum, & lactans, gerensq; utero, denovo concipiat factum. Mares ( ut loco citato idem prodidit Aristoteles ) aversi coeunt cum foeminis : retro enim ijs genitale membrum à natura datum est, ut apparet, dum urinam reddunt. Ex quo etiam multis persuasum est, mares foetum coeperere : siquidem cognitu perquam difficile est, an mares, an foeminae sint, ut etiam cuniculis contingit : qui cum fecundus etiam prolificet, quam lepores ; non ob id tamen mares unquam parere uisi sunt, quanuis quolibet mense foeminae pariant. Tradit Plinius libro XI. cap. XXXV. bina iecinora Leporibus inesse circa Briletum, & Thernem, & in Cherroneso ad Propontidem : at translatis aliò alterum statim absumi. Id quod ante ipsam memoriae prodiderat Aristoteles libro II. de historia animalium, capite XV. Item libro tertio de partibus animalium capite VII. ubi hoc leporum genus pluribus in locis reperiri testatur, speciatim uero in Sycino agro, circiter Bolbam lacum. In Ithacae insula ( ut idem tradidit libro VII. de historia animalium cap. XXV. Lepores si aliunde illati dimittantur, uiuere nequeunt : sed eodem reuersi, unde maris introierint insulam, moriuntur. Leporinae carnes in cibis esitate praeter id quod agere concoquuntur, crassum, atrabiliosumq; generant succum. Veruntamen ( ut inquit Rasis libro de IX. animalibus ) dysentericis conferunt, si affatae sumantur. Iecur uero arefactum, iecinorosis utiliter exhibetur potandum. Integer cum pelle Lepus, operculato fictili impositus, in clibanoq; igne succenso tandiu dimissus, ut penitus exuratur, urinae uitij mirifice opitulatur, adeo ut calculos eiciat, tam in renibus, quam in uesica genitos. Leporinum fel saccharo exceptum, oculorum argemas, nubeculasq; delet. Leporinum stercus ( ut aiunt ) mulieribus gestatum, conceptum impedit. Sed illud experientia compertum est, quod uuluis earum immissum, & mensium defluxiones cohibet, & huiusmodi exiccat uterum.

Leporis facultates.

Τρυγών θαλάσσια. PASTINACA MARINA.

CAP. XIX.

MARINAE Pastinae radius, qui eius cauda enatus aduersis squamis reflectitur, dentium dolorem mitigat; nam eos frangit, & euocat.




PASTINACA marina similiter atque raia, & alia id genus, in piscium planorum, & chartilagineorum genere collocatur. Hanc quidam uulgo uocant Pesce colombo. Gerit haec in cauda supernè radios duos praeduros, acutos, & utrinq; minutissimè dentatos, quorum ueneno ictu piscatores grauiter afficiuntur. Quam ob causam memorie prodidit Aëtius libro XIII. quod qui à marina pastinaca percussi sunt, his uulneris locus manifestè apparet. Sequitur autem dolor pertinax, & totius corporis stupor : acutum enim, & firmum habet aculeum, quo uehementissima ui in altum impulsio nerui sauciantur. Quapropter in aliquibus mors derepente totum conuellens corpus committitur. Idcirco non absq; forti ratione Plinius libro IX. cap. XLVIII. ita scriptum reliquit. Nullum usquam execrabilius uenenum, quam radius super caudam eminens trigonis, quam nostri Pastinacam appellant, quincunciali magnitudine, arbores infixus radici necat. Arma ut telum perforat & ferri, & ueneni malo. Latet piscis hic : & ut idem autor est libro citato, capite XLII. latrocinatur ex occulto, transeuntes radio figens. Marcellus Virgilius, nimis cupidus ineundi rationem, qua pastinae radio uti posset, dentium doloribus sedandis, quippe quod id silentio inuoluerit Dioscorides, fatetur, etsi diligenter, ut consentaneum est, inquisiuerit; nunquam tamen apud antiquos scriptores eam se consecutum fuisse. Quia in re aperte declarat, sibi cum Plinio parum intercessisse consuetudinis : quandoquidem Plinius libro XXXI. cap. VII. nos abunde docuerit modum, quo eo radio in dentium doloribus uti ualeamus, sic inquit. Pastinae quoque radio scarificare gingiuas, & in dentium dolore utilissimum. Conteritur is, & cum belleboro albo illitus, dentes sine uexatione extrahit. Quapropter mirari non licet, si quandoque in plateis circulatorum, dentium extractores cernimus, qui dentes absque ferreis instrumentis, nullo illato dolore extrahant. Idem radius equos persanat, qui subcutaneis uermibus exeduntur, si eo ulcera scarificentur, punganturq;. Pastinae iecur oleo incoctum non modo hominum scabiem sanat; sed etiam brutorum. Piscis tamen esculentus est, si abscessis in uisceribus cauda & capite, decoquatur.

Pastinae piscis confid.

Marcelli ignoratio.

Pastinae, & eius radij uires.

Σηπία. SEPIA. *Myriscopus* CAP. XX.

Sepiarum cōsideratio.

Polypi mira magnitudo.

Sepiarum facultates.

SEPIAE coctæ dum estur atramentum, ægrè concoquitur: aluum mollit. Collyrijs è testa factis conuenienter genarum scabritiæ perfricantur. Vltum in sua testa, donec id, quod crustosum est, abscedat, postea tritum, expurgat uirilignes, furfures, dentes, & tertia cutis in facie. elotum in medicamenta oculorum addi solet: contra albugines, oculis iumentorum efficaciter inspiratur: pterygia oculorum absumit, cum fale tritum, & iniectum.

SEPIAE in omnibus Italiæ piscarijs, proprium retinet nomen, uendensq; habentur, in ijs inquam, in quibus marini ueneunt pisces. Hæ polypis similes sunt, præterquam quod bi numeris pedibus excellunt, illæ uero maiore corporis mole. Est Sepijs in dorso os candidum, superiori parte durum, ac leue: inferiori autem fungosa quadam medulla repletum, quæ et leuiter aspera, et ligni modo frequentibus uenis distincta uisitur. Expectantur Sepie ossa aurifabris: facile enim in partem illam fungosam anulorum, ceterarumq; rerum formas imprimas, quæ metallis igne colliquis expleri solent. Sepiæ suo etiam astu non uacant: ubi enim piscantem sensere effuso atramento, quod pro sanguine his est, infusata aqua absconduntur. Id quod etiam faciunt aduenientibus uoracioribus piscibus. Pariunt (ut prodidit Plinius lib. ix. cap. li.) omnibus mensibus, plerumque autem interreno inter harundines, aut sicubi enata fuerit alga: neque bi bi matu longior est uita. Id quod de polypis retulit Aristoteles lib. ix. de historia animalium, capite xxxvii. Quæ in re dixerim, quod si historia, quam tradit Plinius lib. ix. cap. xxx. de illo tam ingenti Polypo, cuius caput Lucullo ostensum fuisse narrat

rat dolij magnitudine amphorarum quindecim capax; atque pedes, quos uix utroque brachio complecti esset, longitudine pedum triginta, uera perhibetur, nullum sequetur absurdum, quin polypi et denis, et bis denis annis uivere possint. Quod etiam tum sepis, tum loliginibus euenire posse non dubitauerim; præsertim cum eodem loco scripsit Plinius, sepias, loliginesq; eiusdem polypi magnitudine in Hispanico litore undis expulsas esse repertas. Sepie atramento tantam uim esse Anaxilaus est auctor, ut eo in lucernis accensis addito, ceteris ablatis luminibus, homines circumstantes Aethiopes uideantur. Sepiæ, polypi, loligines, et cetera id genus mollia difficillime concoquantur. quam ob causam antea cædi uerberibus solent, quam excoquantur. Quanquam Athenæus Sepias aqua eius uentriculo utiles existimauerit, dixeritq; eas sanguinem attenuare, atque hemorrhoidas ciere. Ceterum (ut Galenus placet libro tertio de alimentorum facultatibus) duræ sunt carnis, ægrè conficiuntur, et succi crudi plurimum egrediuntur. Attamen ijs, quibus probè concoquantur, non parum corpori præbent alimenti. Quin et eius testa exusta (ut lib. xi. simp. medicament. idem scriptum reliquit) ad utilignes, lentes, et scabiem usum utilem præstat: mixta præterea fossili sali, in oculis existentes unguis eliquat: et antequam uratur frictione dentibus splendorem affert, et unctione ulcera desiccant. Sepiæ oua in cibis sumpta urinam ciere Plinius commemorat, renuq; lentorem disijcere. Sepis nucibus, et allio paratis quidam uescuntur, ut salaciores in uenerem prorumpant.

Τριγλα. MULLVS PISCIS. *Varban* CAP. XXI.


MULLORVM assiduo cibo, aciem oculorum hebetari constat. Is marini draconis, aranei, ac scorpionis moribus medetur; si crudus, atque diffectus admoueat.

Mulli consideratio.

Mulli facultas ex Gal.

MULLVS piscis Latinis olim sic dictus, relicta muli appellatione, hodie Græcorum more Latine etiam Triglia et Italicè Triglia nominatur. Huic magnitudo non ampla, color subrufus, ueluti purpureus. Antiquis is magno ex petebatur pretio, præcipue ganeonibus: cum ex fide dignis constet monumentis, Mullos sæpenumero à priuatis etiam hominibus argenti libra singulos uenisse: tanta cum eorum iecore, et capite gratia intercesserat gula. Quamobrem Galenus libro tertio de aliment. facult. de eo hæc memorie prodidit. Mulli iecur à gulosis mirabilem in modum uoluptatis nomine commendatur. Quidam uero ipsum ne per se quidem solum edendum censent, sed gareleo, quod uocant, in uase preparato, cum pauxillo uini uiscus in eo tantisper disterunt, dum ex uniuerfa eius substantia, et preparato liquamine unus, ac similis succus, quantum sensu possis iudicare, factus esse uideatur, in quo intincta carne uescuntur. At mihi profecto nequaquam tantæ suauitatis uisum est, ut eum honorem mereatur, neque tam insignem corpori utilitatem conferre, uti nec ipsum caput: quanquam hoc quoque laudant ganeones, ac secundas potius

## MULLVS PISCIS.



<sup>20</sup> ietur ferre prædicant. Ceterum intelligere nequeo, cur permulti grandissimos mullos emptitent, cum nec adeo suavi sint carne, ut minores: nec concoctu facili, ut quæ dura admodum est. Itaque cum aliquando quendam ingenti pecunia: prægrandes mullos ementem interrogarem, cuius rei gratia illos tantopere expeteret, respondit se primum propter hepar illos tanti emisse: tum autem et propter caput. Idem loco citato, circa capitis initium ita scribit. Mullus omnium ferè aliorum durissimam habet carnem, impendioq; friabilem: quod perinde est, ac si dicas, nihil in eo esse lentoris, neque pinguedinis. Ea; ex parte cunctis alijs præstantius nutrit, dummodo probè concoquatur. hæc Galenus. Mulli, autore Plinio, ter anno sætificant: tantaq; ijs ingluviæ, ut etiam hominum cadaveribus uescantur. Li cæteris in cibis præstant, qui inferiori labro, utrinq; barbati habentur. Romani Neapolitanis, et Venetis longè præstant. Vinum, inquit Athenæus, in quo mullus uiuus immergitur, haustum, uenerem uiris mirum in modum inibet: fœminis uerò conceptum. Mulli, quod barbati sint, Venetis uulgò dicuntur Barboni, non autem Spari,

<sup>30</sup> ut aliàs diximus incertis, et infidis piscatorum nominibus falsi.

ἵπποπόταμος. HIPPOPOTAMVS. *ἵπποπόταμος* CAP. XXII.

HIPPOPOTAMI. testes exiccari, ac triti, contra serpentium morsus bibuntur.

HIPPOPOTAMVS est (ut Plinius narrat libro VIII. capite XXV. et XXVI.) belua, quæ in Nilo editur. Hippopotami altitudine maior: ungulis bifidis, quales bubus: dorso equi, et iuba, et hinnitu: rostro refimo, cauda torta, et dentibus aprorum aduncis, sed minus noxijs: tergoris adscuta, galeasq; impenetrabilis, præterquam si humore mædeat. At Aristoteles libro II. de historia animalium, capite VII. huic beluæ dentes exertos reddidit, non apri:

<sup>40</sup> sed caudam quidem apri eam habere prodidit, magnitudinem asini, hinnitum equi, et tergoris crassitudinem tantam, ut ex eo uenabula fiant: quin et interiora omnia equo, et asino similia. Segetes hoc animal astu magno depascitur destituta ante determinatas in diem: nempe ex agro ferentibus uestigijs, ne quæ reuertenti insidiæ comparentur. Pri-mus cum uiuam, et quinq; crocodilos, Romæ adilitatis suæ ludis M. Scaurus temporario euripo ostendit. Hippopotamus in quadam medendi parte etiam magister existit. Assidua namq; satietate obesus exit in litus, recentes harundinum castris perspeculatus, atq; ubi acutissimum uidet stipitem, imprimens corpus uenam quandam in crure vulnerat: atq; ita profluuio sanguinis morbidum aliàs corpus exonerat, et plagam limo rursus obducit. Huius co-ris cinis cum aqua illitus panos sanat. Adeps frigidas febres: item finus suffitu. Dentes e parte leua dolores dentiū, scarificatis ginguis. Pellis eius e sinistra parte frontis in inguina adalligata, uenerem inibet. Eiusdem cinis alopecias explet. Testiculi drachma ex aqua contra serpentes bibitur.

Hippopota-mi historia.

Hippopota-mi uires.

Κάσσιος. FIBER. *Κάσσιος* CAP. XXIII.


FIBER ancipitis uitæ animal, plerunque cum piscibus, & cancris ex aqua uictum capepsit. Huius testes serpentium uenenis aduersantur, sternutamenta mouet, & in uniuersum uarios obtinet usus. Siquidem menses, ac partus ciunt, duabus drachmis cum pulegio poti: partus, secundasque eijciunt: contra inflationes, tormina, singultus, venena, ixiamque ex aceto bibuntur: lethargicos, & utcunque ueterno obdormiscentes excitant infusi: cum aceto autem, & rosaceo olfactu, & odoris suffitu, idem faciunt: poti & illiti profunt tremulis, conuulsis, & omnibus neruorum uitijs. In summa calfactoriâ uim habent. Eligi debent testes, qui ex vno ortu connexi sunt (fieri enim non potest, ut gemini folliculi in vna membrana coniuncti reperiantur) liquore intus ueluti ceroso, odore



fo, odore graui, & uirus redolente, gustu acri, mordente, ac friabili, naturalibus tunicis circumdatus. Quem fraude aliqui corrumpunt, coniungentes in follem gummi, aut ammoniacum cum sanguine castorio subactum, & ita exiccantes. Vanum est, quod traditur, testes ab ipsis euelli, & a se abijci, cum uenatu urgentur: siquidem tangi nequeunt, ita, ut in sue, substricti. Operæ autem pretium est, diuisa pelle melleum liquorem cum euestiente tunica assumere, & siccatum in potui dare.

FIBER.

biver



Fibri confide-  
ratio.

Vana opinio.

Fibri testium  
adulteratio.

QVEMADMODVM in superiore spectatur Germania, ubi cumq; Rhenus influit: quoniam et in Austria, quæ Pannonia, ubi Danubius, in alijsq; finitimis provincijs, ubi Dravus, et Savius discurrent, Fiber sanè, quem Greci xasopa appellant, animal est (ut Dioscorides inquit) quod ex amphibio habetur genere: quippe quod et terra, et aquis uitam ducat: ibi namq; uidetur modo in fluminibus natare, modo in litore uagari, modo in propinquis sylvis spectari. Fiber lutræ ferè faciem refert, maior tamen. Pedes huic sunt posteriores anserinis similes, anteriores uero ita assus habet. Cauda est illi glabra, lata, piscium ferè modo squamosa. Estur hæc, quod gustatu piscium carnes placet, ijs etiam diebus, quibus nobis carne interdictum est à lege. In cæteris deniq; corporis partibus parum, cui ferè nihil à lutra disidet. Quo factum est, ut crediderint medicorum nonnulli easdem lutræ testibus inesse uires, quæ fibrorum testiculis insunt. Dentes Fibris anteriores ferocissimi, atq; acutissimi sunt, quibus arborum ramos, ut ferro, cedit, quos postea miro coaptat artificio, sibiq; domum construit pluribus tabulatis in riparum cauis, ubi iuxta flumen degit. Animal est horridi morsus: nam hominis parte comprehensa, non ante, quam fracta concrepuerint ossa, morsu resoluat. Vanum profecto est (ut etiam scribit Dioscorides, itemq; Seftius medicinæ diligentissimus) credere Fibras sibi testes dentibus amputare, cum uenatu urgentur, ob hoc se peti gnari. Quandoquidè id nunquam in his compertum sit, qui nostra ætate capiuntur. Plinius huius facti anceps id affirmavit libro VIII. capite XXX. quod tamen postea res gaudet libro XXXII. capite III. Ceterum diligenter animaduertere oportet, ne ab impostoribus adulterati Fibræ testes emanant: namq; pauci admodum habentur ex ijs, qui uenales Venetias importantur, qui quidem adulterio creant. Cuius manifesto est indicio nomia eorum magnitudo, cum legitimi parui admodum sint. Quinetiam præstantis indicium præbet conclusus liquor in recentibus mellis instar, in diutius uero asseruatis, ceræ modo concretus. Adulterantur contritis eiusdem animalis renibus, factis inde testium folliculis. At mihi quidè sæpius contingit et uidere, et habere ex Austria, Stiria, et Carniola Fibræ testes, qui omni prorsus adulterio uacant: quos magnitudine, colore, odore, gustu, atq; etiam uiribus longè ab ijs dissimiles esse comperimus, quibus officinarum utitur uulgus. Plinius libro XXXII. cap. III. eos Castoris testes efficacissimos putat, qui à Ponto asseruntur. Cui tanè refragatur Strabo lib. III. sue Geographiæ his uerbis. Producit capreas Hispania, equosq; sylvestres affatim. Quibusdam in locis lacus incrementa suscipiunt. Cygni, et eius generis aues plurimæ: similiter et otides aues. Flumini quidem ferunt Castores: sed Castoreum non eam, quam Ponticum, habet uim. Pontico enim proprium est, ut uenenosum sit, ut in alijs permulta. hæc Strabo. Ex quibus facillè constat plurima in Ponto uenenofo nasci. Id quod etiam in Bucolicis testatur Virgilius his uersibus.

Hæc herbas, atque hæc Ponto mihi lecta uenena

Ipse dedit Moeris: nascuntur plurima Ponto

Castorei uires  
ex Galen.

Horum meminuit Galenus lib. XI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Testiculos castoris nuncupant Castoreum, medicamentum et celebre, et multi usus, adeo ut Archigenes de Castorij usu totum conscripserit librum. Atq; et sanè particulares eius facultates exposuit, nos uero uelut in alijs medicamentis fecimus, ita et in hoc quoq; genere modo facultatem dicemus: ad quam si quis respiciat, ipse per se particulares inuenire poterit. Itaq; quod ex alia, manifestum est. nam si uoles ipsum ad unguem leuigatum oleo maceratum parti cuiuspiam illinire, et inspicere, præter illam incallescere percipies. Porro calfacientia omnia, ubi contacta substantiæ quippiam digerunt, continuo

non deficiant; nisi si quid natura fuerit humidum, seu oleum & aqua, atq; aduentitiam qualitatem calidam, non facultatem assumpserit: sicut certè hæc ipsa igni, & soli æstiuo admota. Itaque cum Castorii consistentia quoq; sit sicca, & calfaciendi potentiam habeat adiunctam, meritis deficiat. Atq; hoc illi cum multis alijs medicamentis commune exit. Porro quoniam impensè subtilium est partium; ob id plus ualet, quàm alia, quæ similiter ut ipsum & calfaciunt, & deficiant. Nam quæ tenuiù sunt partium medicamenta, ijs quæ sunt crassarum, plus sunt efficacia, etiam si parum sortita fuerint facultatem, nimirum quia penetrent, & in altum subeant ad motorum corporum, potissimum si ea densa fuerint, uelut neruacea. Palam igitur talia ob causam positâ magnificè iuuantur à castorio. Ceterum falluntur medicorum pleriq; in usu Castorii, cum id modò considerant, partem quampiâ aut tremere, aut conuelli, aut sensu motiue priuam, aut egre sentire: haud scièntes id genus symptomata ad dissimiles sequi corporis affectus. At tu ab Hippocrate doctus, ex plenitudine pariter, et inanitione conuulsionem fieri, ubi quidè quæ in neruis continentur præter naturam, euacuare consilium est, ibi & bibendum exhibe, & foris cuti castorium impone. Vbi uerò ex siccitate nimia obueniat conuulsio, scito hoc medicamen illic esse aduersissimum. Ad eundem modum, ijs qui præ plenitudine tremunt, utilissimum: aduersissimum uerò ijs, quibus huiusmodi affectus accidit ab inanitione. Ad portionem modò dictorum affectuum, ubi singultus euenerit stomachi, perscrutato prius, inuenitoq; illius affectu, ac discreto, si quidem à plenitudine ipsum egroti perpetiatur, ad castorii usum accedito. Sin autem à siccitate, & euacuatione, aut acrium humorum morsu prouenerit, medicamen hoc fugito. Sanè si odori, gustuiq; aduertat animum, suspicaberis humano corpori aduersissimam habere substantiam: tamen si in natura nihil efficere comperiat eorum, quæ talia facere assolent. Siqui dem alia stomachum uitiant, alia uentrem, alia caput, alia aliam quâuis partem ledunt. At hoc medicamen siue corpori humido applices resiccationem poscenti, siue frigido excalfactionem, siue humido simul frigidoq; excalfactionem pariter & resiccationem requirenti, magnam utiq; ostendit utilitatem: nec ullam parti cuiquam noxam imprimit, potissimum si febris uacet, aut non admodum calidam perpetiatur homo febrem, sed ut sic dicam tepidam, qualis accidit in cataphoris maximè, & lethargis. Ac multis sanè Castorium exhibuimus unâ cum pipere albo, utrunq; mensura cochlearij ex melicato bibendum præbentes: nec quisquam ullam sensit noxam. Sed & mensibus retentis, ubi per uenam, quæ in talo est, modicè euacuassent, oblato castorio unâ cum palegio, aut calamintha, semper medicamen hoc expertus sum purgationem ciere, absq; ut sceminam lederet. Præterea locos morantes eijcit. eaq; omnia ex melicato potum efficit. At quibus ita uenter flatu distenditur, ut egre curationem admittat, aut torminibus uexatur, atq; singultu, idq; ob frigidos, viscososq; humores, aut crassos, flatulentosq; spiritus, eos ex oxycrato potum adiuuat. Quæ porro iuuat in corpus intro sumptum, ijs prodest quoq; cuti impositum cum sicyonio, aut ueteri oleo. Quæ uerò ampliori caliditate indigent, ijs etiam per sese infricari debet. Iuuat etiam, si quis suffitum eius in prunis impositi inspiratione hauriat, maximè humidos, & frigidos affectus in pulmone, aut cerebro consistentes. Attamen lethargicos, & cataphoricos affectus, qui quidem adiunctam habent febrem, præstat non dictorum oleorum quopiam macerantes curare: sed potius ex rosaceo capiti, colloq; imponere. hætenus de castoreo Galenus. Ceterum, ut Plinius est actor libro xxxii. cap. iiii. Castoreum sumptum comitialibus auxiliatur. Medetur & dentibus ex oleo in aurem infusum, à cuius parte doleant. Aurium doloribus melius, si cum meconio infundatur. Vrina quoque Fibri resistit uenenis, & ob id in antidota additur. Afferuatur autem optimè in sua uestica, ut aliqui existimant.

† Ciam in impressis hoc loco legatur ποτίζειν, id est, potui dare: tamen in codice manu scripto, in quem Oribasius, (ut aliàs diximus) Dioscoridis uerba retulit, legitur ἀποτίθειν, id est, reponere. Quæ lectio ideo uerior esse uidetur, quod castorium (teste Dioscoride) non solum potui detur; sed etiam infundatur, & suffiatur.

Castorei uires ex Plin.

## Γαλή κατοικίδιος. MUSTELA VULGARIS. CAP. XXIIII.

MUSTELA, quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & inueterata sale, in umbra siccatur. Ea binis drachmis cum uino pota, aduersus omnia serpentium uenena præsentaneo est remedio: toxico, simili sumpta modo, resistit. Eius uenterculus coriandro factus, inueteratusque, percussis à serpente, & comitialibus potu auxiliatur. Cremata in fictili podagricis confert, cinere ex aceto illito. Sanguine peruncæ strumæ iuuantur; comitialibus etiam prodest.



MUSTELA uulgaris notitie in Italia, animal est miræ sagacitatis, & quanquam corpore paruum; animo tamen inuictò constat, atq; feroci. Mustelarum duo genera esse autor est Plinius lib. xxix. cap. iiii. Alterum syluestre, quod in agris, et uepribus uitam agit. Alterum domesticum, quod in domibus nostris oberrat. Vtræq; adeò cupidè catulos

Mustelæ consideratio.


Vana quorundam opinio.

Mustelæ natura, & vis.

de catulos suos diligunt, ut eos hinc aliò transferant, uerentes ne sibi ij surripiantur. Quo factum est, quem stercoris memorie prodidit Aristoteles lib. III. de generatione animalium, capite VI. ut cum iudissent quidam, Mustelas catulos suos, quos paruos admodum parit, ore susceptos transferre, falsò opinati sunt, eas ore parere. Quorum opinionibus adstipulatur Ouidius: cui tamen uenia danda est, cum poëta quælibet audendi amplissima sit potestas. Mustelæ serpentes acriter persequuntur, dimicantq; deuorata prius ruta. Basilisco mustelæ uirius exuto esse auctor est Plinius libro VIII. cap. XXI. adeò naturæ nihil placuit esse sine pari. Inijciunt enim eas cauernis facile cognatis, scilicet tabe. Necant illi simul odore, moriunturq; & naturæ pugnam conficiunt. Mustelæ etiam oculis punctis erant aiunt uisum reuerti, eademq; quæ in lacertis, & annulis faciunt. Mustelarum combustarum cinis aqua subacta illitu capitis dolores mulcet: oculis uerò injectis suffusiones emendat.

ΒΑΤΡΑΧΟΣ. RANÆ. Froste. CAP. XXV.

CONTRA omnium serpentium venena pro antidoto sunt Ranæ, si ex sale & oleo decoctæ edantur, iusque earum itidem sorbeatur: contra inueteratos tendinum rigores pollent. Illitus earum cinis, profluentis sanguinis impetus sistit: explendis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illinitur. Viridium ranarum cruor auulsos genis pilos renasci prohibet, in uestigia euulsoꝝum instillatus. decoctæ in aceto, & aqua, dentium dolores collutione leniunt.



Ranarum consideratio.

Ranarum paratus.

RANÆ Italis, præsertimq; Insulæ populis frequentissimæ. Genere sanè distant, quemadmodum magnitudine, colore, ac natura. Aliæ nanq; ex putredine gignuntur æstiuis imbribus puluere madefacto, quibus sic ortis breuis est uita, nullusq; earum usus. Aliæ uerò ritè, & secundum naturæ ordinem, proueniunt in mari, fluuijs, paludibus, & lacubus. Sunt & terrestres, quæ in frutetis, & rubetis plerumque uisitant, ob idq; Rubetæ Latinis dicuntur. Nec desunt in hoc genere, quæ etiam Calamitæ dicuntur, quòd in harundinetis uitam agant. Verum utraq; & uenæ, & lethales habentur. Ceterum illæ in fluuijs paludibus, & lacubus uersantur, & degunt, quarum nobis in cibis ualuit usus, colore uiridi, aut subrutilo, cinereoue: tametsi & inibi quandoq; ex his cernantur, quæ non tunc edipossunt. Pariunt Ranæ, ut Plinius tradit libro IX. cap. LI. & experientia quotidie comprobari potest, minimas carnes, nigras, quas gyrinos uocant, oculis tantum, & cauda insignes: mox pedes figurantur, cauda findente se in posteriores. Mirumq; semestri uita resoluantur in limum nullo cernente, & rursus uernis aquis renascuntur, quæ sunt nate, perinde occulta ratione, cum omnibus annis id eueniat. hæc Plinius. Cui tamen sententia prorsus refragat experientia: quippe quòd in paludibus maritimis, quæ glaciem nunquam hyeme contrahunt, quocumque annu tempore ranas conspiciere liceat. Quapropter dicendum fuerit, Plinium eas tantum quotannis in limum resoluæ existimasse, quæ ex ipsius aquæ, & terre putredine gignuntur.


Αἰλουρος. SILVRVS. CAP. XXVI.

SILVRVS recens in cibo nutrit, & facilem præbet aluum: sale uerò conditus, minimum supeditat alimentum. arteriam expurgat, & uocem expedit. Illita saliti caro, aculeos, & infixa corpori spicula extrahit. Muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si in defidentium foras adijciatur: fluxiones liquidem ad summa cutis elicit. ischiadicis infusa medetur.

Pauli Iouij opinio improbat.

EXISTIMAT Paulus Iouius in libello de Romanis piscibus, Silurum cum esse piscem, quem uulgo Sturionem appellat. Verum tamen si Aristoteli, & Plinio est adhibenda fides, liquidò constabit, aliud piscis genus esse Silurum, aliud Sturionem. Nanq; Aristoteles Siluro dentes assignat adeò firmos, atque acutos, ut ijs hamos etiam firmos frangere ualeat. Plinius item lib. IX. cap. XV. tradidit, Silurum ubicumq; sit, grassari, omniq; animal appetere: idcirco

## SILURUS.




30 innatantes equos saepe demergere, præcipue in Rheno Germaniæ amne prope Lisbouni, & in Danubio. At Sturiones etsi prægrandes sint, edentuli penitus habentur. Ad hæc Silurus Aristoteli, & Plinio fluuiatilis semper describitur piscis, cum tamen Sturio frequentius in mari, quàm in fluminibus reperiatur. Quo factum est, ut facile deductus, sit in sententiam clarissimi Manardi Ferrariensis: quippe quod pro certo crediderim, Silurum Italis haud quaquam esse cognitum. Quandoquidem inibi in fluminibus, quanquam ingentibus, nunquam (quod scierim) Silurus fuerit repertus. Pannoni Danubij accolæ Silurum uulgari sermone uocant Acchia: Rheni uerò litora inhabitantes Germanica lingua Bolich appellant: siquidem is maxime grassatur, morsuq; petit omne animal, quod sibi obuiam fit. Is effigie gobium refert capite magno, ore amplo, & dentibus ferocissimis. Hac in sententia me quoque Plinius confirmat: is enim Silurum & in Rheno, & in Danubio nasci autor est.

## Σμαρίδες. SMARIDES.

## CAP. XXVII.

SMARIDIS piscis saliti caput exustum, excrescentes ulcerum oras, puluillosque reprimit: nomas cohibet: thymos, clauosque absumit. Caro non secus atque falsamentum prodest à scorpione percussis, aut à cane demorsis.




## Μαρινίδες. MAENAE.

## CAP. XXVIII.

MAENARVM ex capitibus cinis, si illinatur, callosas fedis rimas abolet. Eius etiam garum: oris putrilagines collutione sedat.

ETSI studij, ac diligentiae plurimum impenderim, ut quinam piscis sit Smaris, certior fierem; nunquam tamen Smaridis consideratione. quod Aristotelem, nec Plinium, nec deniq; ueterum quenquam aliquid certi nactus sum, ita ut planè Smaridem cognoscere, ac describere possem. Illud tantum inueni, ijs Smaridem esse pisciculum, mænis facie similem. Ex quo facile adductus,




Mene.

ductus sum, ut eos non longè aberrare putauerim, qui Smarides eos pisciculos dixerit, quos uulgò Veneti appellant G-  
 roli: namq; hi præter id quod corpore minores sunt, menas notis omnibus representant. Ceterum cum Mene que  
 uulgò Menole dicuntur, sint uulgaris notitiæ, non est, cur plura de eis differam.

Κοβίος. GOBIUS. *Gobius ling. Vol si* CAP. XXIX. *v. clis vocant*

GOBIUS recens in suillum uentrem coniectus, si confuta rima in duodecim aquæ sextarijs,  
 donec duo super sint, decoquatur, excolatus & sub diuo refrigeratus potui detur, alius sine mole-  
 stia deijcitur. Illitus contra serpentium, canumque morsus auxilio est.



Gobiorū con-  
 sideratio.

Gobij facul-  
 tes ex Gal.


Gobij fluui-  
 tiles.

GOBII in Venetis ichthyopolijs frequentissimi conspiciuntur, quòd inibi in finitimis lacunis mirum in modū fa-  
 tificant, ac numerosi proueniunt. Quare non immeritò prodidit Aristoteles in marinis litoribus, ubi in profundum  
 non labatur aqua, summa cum uoluptate morari Gobios. Hos Veneti detractis posterioribus syllabis Go uulgò uo-  
 cant. Capite sunt amplo, gustuq; persuaues, quòd carnem habeant tum pinguem, tum etiam friabilem. Proinde de  
 his differens Galenus libro III. de aliment. facultatibus, sic inquit. Gobius litoralis est piscis, ex eorum numero, qui  
 parui perpetuò manent. Prestantissimus autem ad uoluptatem, coctionem, simul ac distributionem, & succi boni-  
 tatem est is, qui in arenosis litoribus, aut saxosis promontorijs uiuit. At qui in fluminum ostijs, aut stagnis, aut sta-  
 gnis marinis uersatur, non æquè suauis est, neque probi succi, neq; concoctu facilis. Ceterum sciendum est (ut etiam  
 annotauit Galenus) Gobios non in mari tantum reperiri; uerum etiam in fluminibus, & lacubus, quemadmodum  
 testantur ij, qui in Lario lacu, itemq; Verbano capiuntur, laudatissimi quidem, propterea quòd eorum iecur maxi-  
 mam cum palato ineat gratiam. In fluuijs uniuersim minores existunt, quanquam ex ijs etiam nonnullos inuenias, qui  
 duas, aut tres uncias pèdant. In agro Tridentino pauci admodum sunt fluuij, qui Gobios non alant: namq; & Attejis  
 et Nofius, et Lauisus, et Sarca ijs refertissimi sunt. Hos inibi quidam uulgò uocāt Capitoni, quidam uerò Marsoni: &  
 in Hetruria, ubi tamen rarissimi habentur, corrupto à Gobijs uocabulo, uulgò dicuntur Ghiozzi. Sunt hi pisciculi non  
 modò concoctu facillimi; sed et ori suauissimi, atq; gratissimi, præsertim cum ouis turgent; hæc enim in his & per-  
 guia, & copiosa sunt, gustui uerò suauissima. Quo fit, ut solertissimi piscatores horum fecturas, obseruantes, non  
 minus expiscandis ouis operam nauent, quàm piscibus ipsis.



Θίμνος. ΘΗΥΝΝΥΣ. ΙΧΘΥΣ ΤΟΥΤΟΥ. CAP. XXX.

CONDITANEI thunni caro, quam omotarichon uocant, sumpta ijs auxiliatur, quos uipera nomine prester momorderit: sed oportet uinum quàm plurimùm subinde cogantur haurire, ita ut uomitione reddatur. Contra acrimonias esitatorum maximè ualet; canum moribus utilissimè illinitur.



THUNNI pisces inter cetaceorum genera recensentur. In multitudine sua omnibus litoribus sunt noti, praesertimq; Tyrrheni accolis magis; quàm ijs, qui Adriatici litora inhabitant. In Euripis maxima eorum est captura. Irampunt maio mense, ac iunio in mare nostrum mediterraneum per Herculis columnas ab Atlantico oceano, cogentibus xiphijs, hoc est, spatibus piscibus, qui ense à rostris prominente instructi eos toto mari persequuntur: sunt enim xiphiae immanes beluae. Nam (ut Plinius inquit libro trigesimo secundo, capite secundo) mucronato rostro tam ualide naues perfodunt, ut in oceano mergantur, praesertim ad Mauritaniae locum, qui Cotta uocatur, nò procul à Lixio flumine. Thunni igitur cùm piscium simplicissimi, timidissimiq; sint, non aliter in fugam à xiphijs gregatim aguntur, quàm ouium greges à lupis. Quam ob causam uel inanibus terriculamentis acti, facile uadis, atque litoribus intruduntur. Porro si omnia spectantium uoluptate maio, et iunio mensibus Thunni à Gaditanis non longè ab Herculeo fretu capiuntur, ad quam piscationem uniuersus concurrunt populus, maximo clamore, tympanorum sonitu, ac bellis puluere, et igne concrepantibus terriculamentis. Haec enim eorum capturam faciliorem reddunt: quandoquidem stolidi cùm sint, uocibus, et strepitu territi, concitantur ad uada, quo in loco postea gregatim retibus capiuntur, maximoq; omnium plausu trahuntur in litus. Thunni diuersa sortiuntur nomina: namque primus thunnorum fetus ab ipso statim ouo Cordulla dicitur, qui mox in Limarias euadit: ex limarijs autem adolescentibus Pelamides sunt, sic à luto dictae: cùm uerò hae pedalem excessere mensuram, in Thunnos abeunt. Athenaeus hos diu uiuere ait, et in praegrandes euadere pisces. Sed huic opinioni uidetur aduersari Aristoteles, cùm asseueret, eos biennio uitam finire. Animal est paruum (ut scribit Plinius) scorpionis effigie. Hoc ardente sirio sub pinna affigit aculeo, tantoq; infestat dolore, ut in naues exilient: quo tempore, ut maximè noxij damnantur in cibis. Ceterum thunnorum uentres, quò in cibatu ori gratiores habentur, eò magis uentriculo nocent: contra eorum carnes, quae omni prorsus purguedine carent, etsi non tantam cum palato incant gratiam; minorem tamen uentriculo inferunt noxam. Quamquam huiusmodi pisces, qui in cetaceorum genere recensentur (ut Galenus est author lib. III. de alimentorum facultatibus) dura carne sunt praediti: quam ob causam et prauis sunt succi, et excrementitium praebent alimentum. Quapropter sale macerata plerumq; eduntur, quòd inde alimonia tenuior facta ex ipsis in corpus distribuitur: ob idq; sit coctioni, et sanguini faciendo accommodatior. Nam recens horum caro ni admodum probe concoquatur, magnam crudorum succorum copiam in uenis congerit.

Thunni consideratio.

Xiphia piscis.

Thunnorum captura, &amp; nomina.

Thunnorum in cibis facultas.

Γάρυον. GARVM. Saltz brin. CAP. XXXI.

GARVM omne, quod ex piscibus, carnibusque sale maceratis liquamen est, si ex eo fetus fiat, depascentia ulcera sistit. Morbis à cane medetur. dysentericis, atque ischiadicis infunditur: nonnullis, ut exulcerata adurat: alijs autem ad lacessenda, quae ulcera non senserunt.

Ζομὸς ἰχθύων. IUS PISCIVM. CAP. XXXII.

RECENTIVM piscium ius, modò per se, modò ex uino potum, aluum subducit. Priuatim ad hunc usum conficitur è phycidibus, & scorpionibus, & iulide, è percis, & recentibus alijs saxatilibus, nec uirus resipientibus, simpliciter cum aqua, oleo, & anetho.

Garum dictum esse à ueteribus tradidit Plinius libro xxxi. capite vii. quòd olim conficeretur ex pisce, quem Graeci Garon uocabant, intestinis illius sale maceratis, ac eliquatis. Quod item postea è scombri extis confici coepit. Fuit olim Garum complurium ciborum condimentum, adeo ut nullus ferè liquor, qui ad gule luxum magis presteret, ab antiquis fuerit excogitatus. Veruntamen de hoc non intellexit Dioscorides; sed generatim de omni piscium, et carnum mixtura, qua haec diutius asseruari solent. Ceterum de piscium iure non est cur pluribus agam, cum satis ab ipso autore de eo proditum sit.

Gari consideratio.

Κόρες κλινικοί. CIMICES LECTVLARII. CAP. XXXIII.

*Cimices*, qui in cubilibus enāscuntur, cauis fabarum inclusi, si ante febrium significatio-  
nes septeni deuorentur, quartanis auxilio sunt: & citra fabas sumpti, percussis ab aspide profunt:  
vuluarum examinationes olfactu reuocant. Poti cum uino aut aceto, adhaerentes sanguifugas ex-  
gunt: triti, & urinariz fistulæ impositi, urinæ angustias leuant.


Cimicum cō-  
sideratio.

INTER omnes nocturnos hostes, qui nobis dulcem somni quietem intercipiunt; nulli quidem nocentiores, inf-  
stioresq; habentur, quā Cimices: quippe qui non solum morsu dilacerent, quo & somnum interturbant, & sa-  
guinem nobis adimunt; sed etiam fetorem adeo detestabilem, abominandumq; nobis ex se relinquunt, ut eo longē  
gis sensus, spiritusq; ledantur, quā uniuersæ corporis partes, quæ ab ijs fuerint ictæ. Ceterum tametsi infestissimæ,  
foetidissimæq; sint animalia; noluit tamen eos genuisse natura omnium rerum parens, quin suum haberent in medica-  
usum. Utuntur ijs recentiores quidam ad ciendam urinam, uiuis in penis organum immisiss, non autem mortuis, et tri-  
tis, Dioscoridis modo. Quod mihi magis consentaneum esse uidetur: siquidem in meatum urinarium inditi, ingressa  
titillationem excitant, & urina uim expultricem proritant. Sunt & syluestres Cimices, qui ex herbis uictum, &  
locum habent, lectularijs maiores, colore uiridi, æquæ ac illi fetidi. Sed hi nullum, quod sciam, obtinent in me-  
cina usum.

Cimices syl-  
uestres.

Ονομα ΜΙΛΛΕΡΕΔΑΕ. CAP. XXXIII.

MILLEPEDAE, quæ sub aquario uase stabulantur; animalia sunt multis pedibus nitenti,  
quæ contacta manu cōtrahuntur in orbem. Hæ ex uino potæ difficili urinæ, & regio morbo am-  
liantur. Millepedæ cum melle anginis utiliter illinuntur. trita, & in cortice mali punici calfacta,  
doloribus aurium, addito rosaceo, conuenienter instillantur.

Millepedarū  
usus.

MILLEPEDAE, quas uulgò appellamus Porceletti, animalia sunt exigua, & omnibus uulgaria. Proinde  
non operæ pretium duxi, ut plura de eis in præsentia referam, quā tradiderit Dioscorides. Ceterum animalcula hæc  
Galeno commendata sunt libro II. de compositione medicament. secundum locos ad diuturnos capitis dolores, ubi sic  
inquit. Maxime etiam profunt sub aquario uase nascentes aselli, millepedæ appellati, si oleo incoquantur. Quamob-  
rem nesciuerim, cur dixerit Plinius libro XXIX. cap. ultimo, Millepedam animal esse e uermibus terræ pilosum, multi-  
tis pedibus, arcuatim repens.

Σίλφ. BLATTA. CAP. XXXV.

BLATTAE eius, quæ in pistrinis inuenitur, interanea trita, aut cum oleo decocta, aurium do-  
lores instillatu mitigant.

Blattarum cō-  
sideratio.

BLATTARVM plura esse genera, autor est Plinius lib. XXIX. cap. ultimo. Verum hæc, quarum in Hebræis  
aliquibus locis ingens est multitudo, & quæ uulgò uocantur Piattole, noctu magis, quā inter diu in cellis uicarijs ex-  
parent.

parentes circa latrinarum ora, in pistrinis, balneis, uliginosisq; adium partibus, foedissima quidem, nausiosaq; sicut animalia. Gryllos hæ, qui noctibus æstate strident, quadantenus referunt: planiores tamen, cruribus etiãnum tenuioribus araneorum modo: proinde fugæ citissime. Lux istis aduersissima, ita ut, si nocte lumen repente inferatur humen-  
tibus locis, in quibus degunt, celerrimo cursu refugiant. De his igitur, utpote quæ multum in pistrinis uersantur, intel-  
lexisse Dioscoridem credendum est: non autem de illis uermiculorum modo oblongis, quæ in apum aluearijs, & in car-  
nibus diu sale inueteratis enascuntur: quanquam & hæ Blattæ nomen sibi uendicauerint. Nobis hæ uocantur uulgò  
Botteggie, alijs uerò Carpe. Blattarum uires, quas pluribus Plinius conscripsit, silentio inuoluimus, rati gratiori-  
bus, salubrioribusq; remedijs morbos posse sanari, quàm ijs, qui à tam foetidis, atq; execrandis sumuntur animalibus.

Πνεύμων θαλάσσιος. PVLMO MARINVS. CAP. XXXVI.

PODAGRAS, pernionesque emendat pulmo marinus recens, tritus, & illitus.

PVLMONES marini animalium pulmonibus non abstimiles habentur. His (ut Plinius est autor libro ix. cap. Pulmonis ma-  
xlvii.) eadem quæ frutici inest natura, perinde ac spongijs, urticis, stellis, & olothrys. Conspiciuntur marini Pul-  
mones plerumq; undis supernatantes, futuram maris procellam presagientes. Mirum, quod si ijs uirgæ baculiq; pe-  
rtingantur, nocte facium accensarum modo lucem edunt.

Πνεύμονες. PVLMONES. CAP. XXXVII.

SVILLVS, & agnus, vrsinusque pulmo impositu, attritus à calceamentis contractos, ab in-  
flammatione tuetur. Vulpinus uerò si arefactus bibatur, suspiriosos adiuuat. Adeps quoque li-  
quefactus, infususque aurium dolores finit.




MULTA præterea sunt horum animalium membra, de pulmonibus quorum differit Dioscorides, quæ medicamen-  
ti uim possident, de quibus postea speciatim suis locis dicitur. Verùm cum hæc animalia nemini non sint cognita, non  
opus esse existimo, ut de ijs plura dicamus. Quanquam illud silentio non dissimulandum, quod scilicet Vrsarum par-  
tus non sit pluximis mēbris indiscretus, cruribus præsertim, et undiq; rudis, ac informis: nec quod parentis linctu for-  
mam tandem recipiat ursinam, ut nonnulli scriptis commendarunt, & credit uulgus. Quandoquidem in ualle Anania  
supra Tridentum uidimus nos prægrandem Vrsam prægnantem, ab ipsis uenatoribus exenteratam, cuius catuli adhuc  
in utero existentes, omnibus suis membris distinctis, ac formatis reperti sunt, non autem informes, ut pleriq; existimant,  
magis fortasse Aristotelis, & Plinij auctoritatibus freti, qui ita esse memoriæ prodiderunt, quàm sensibus, & ex-  
perientia.

Vana de ursæ  
partu opinio.

Ίατα. IOCINERA. CAP. XXXVIII.

ASINI IECUR inassatum esu comitalibus prodest: veruntamen ieiunis edendum præcipi-  
tur. Capræ uerò inassati decidua sanie, inungi lusciosos prodest: & dum coquitur, apertos ocu-  
los halitu eius uaporari. prodest in cibo tostum ad eadem. Tradunt hircini iocineris cibo co-  
mitiales deprehendi. Aprinum recens si arefactum teratur, ex uiuo potum, contra serpentium,  
t uolucrumque morsus auxilio est. Iecur canis, qui rabie exagitarur, tostū, & in cibo ab emorsis  
sumptum, netentetur metu aquæ tueri creditur. Vtuntur autem ad arcendos aquæ pauores dente  
eo, qui caninus dicitur. hunc à cane, qui momordit, exemptum, & folliculo inditum, pro amuleto  
brachio adnectunt. Inueteratum autem sale mergi iecur, ex hydromelite binis ligulis potum,  
secundas pellit.

## IOCINERA ANIMALIVM.



Iocineris lupi confid.

Canis rabidi.

Mergi iecur, & uenter.

**PRAETER** Asini, Caprae, Hirci, Apri, rabidi Canis, & Mergi iecur, est & Lupinum, quo utuntur medicorum nonnulli, qui primas tenent in uniuersa Italia. Siccant enim lupinum iecur, mox in puluerem conterunt, & tantquam precipuum medicamentum ijs exhibent, qui iocinerosis afficiuntur fluxionibus, ijsq; similiter, qui aqua intercutem laborant. Quanquam id probare non uideatur Galenus lib. xi. simp. medicament. sic inquit. Iecur lapinum sepe numero in medicamentum indidi hepaticum, quod ex eupatorio conficitur, nec tamen quod memoria dignum sit, amplius prestare comperi, ad illud uidelicet comparans, quod sine ipso componitur. Idem eodem loco Canis rabidi iecur non ijs prestare uiribus, quibus aliorum fert opinio, scriptum reliquit his uerbis. Iecur rabientis canis, si assium edatur, remedium existere ijs, qui ab ipso fuerint demorsi quibusdā memoriae est proditum. Ac scio certe quosdam, qui ipsum sumpsere, mansisse superstites, uerum non illo solo. Siquidem alijs praeterea remedijs usi sunt, quorum fecimus periculum in rabiosorum morsibus. Audiui uerò quosdam, cum illi soli fidem habuissent, postea mortuos. De iecore Mergi in aqua degentis, tamen si Galenus nihil literis mandauerit; Paulus tamen id renum calculos eiicere tradidit. Dioscorides uerò secundas, non autem calculos pellere protulit. Quo fit, ut Pauli codicem depreuatum esse crediderim. At uentris quidem Mergi meminit Galenus citato loco, eorum opinionem ut uanam explodens, qui uentriculo roborando ipsum exhibent. Eosq; item deridet medicos, qui ad idem usurpant internas uentriculorum gallinarum tunicas: siquidem ait, se utrumq; expertum fuisse, nec inde quicquam consecutus emolumenti. Quod tamen cum ignorent recentiorum quidam, cum seplastarijs, ad uentriculum roborandum aliquid praecipiant, non frequentius habent in ore, quam illud, Recipe stomachi gallinarum, longè magis uulgum, quam Galeni dogmata secuti: quanquam in hoc Galenus sua experientia fretus, aperte Dioscoridi refragetur.

† Sunt qui hoc loco non  $\pi\lambda\upsilon\sigma\epsilon\upsilon$ , quod est uolucrum, legant; sed  $\kappa\tau\alpha\upsilon\alpha\upsilon$ , id est, quadrupedum, priore tantum mutata litera. Certè facilis hic fuit librariorum lapsus: tamen quæ sit uera Dioscoridis scriptura, non facile intelligi potest, cum Plinio ues etiam dentate prodantur.

$\alpha\iota\delta\omicron\iota\omicron\upsilon\epsilon\iota\lambda\alpha\iota\phi\omicron\upsilon$ . GENITALE CERUI.

CAP. XXXIX.

GENITALE cerui tritum, & in uino potum, à uipera demorsis auxiliatur.

Genitalis cerui uires.

**RASIS** autor est, Genitale cerui, præter uim, quam sibi natura comparauit contra uiperarum morsus, ut etiam scribit Dioscorides, auxilio esse remorantibus urinis, ac coli cruciatibus affectis, si ubi aqua probe fuerit elotum, ipsa statim ablutionis bibatur aqua. Aiunt in puluerem tritum, & ijs medicamentis inditum, quæ uenerem excitant, et ualentiora efficere. Quin & dysentericis mederi magno successu à nonnullis expertum est.


$\omicron\upsilon\upsilon\chi\epsilon\iota\varsigma\ \delta\omicron\upsilon\upsilon\upsilon\ ,\ \kappa\epsilon\iota\ \alpha\iota\gamma\omicron\varsigma$ . VNGVLAE ASINI, ET CAPRAE.

C A P. X L. *Esulb hieb*

**VNGVLARVM** asini cinis per dies multos binis cochlearibus potus, proditur comitales adiuuare. eadem oleo subactæ strumas discutiunt: & illitæ pernionibus medentur. Caprarum cinere perunctæ ex aceto alopeciaz sanantur.

Vngularum uires.

**NON** solum Asini, & Caprarum ungulae in medicum ueniunt usian; sed & Vaccarum ex prioribus tantum pedibus exutæ, ut autor est Rasis libello de lx. animalibus. Siquidem harum combustarum cinerem potum, tantum




abus lactis copiam praeberere existimat, Mularum uero mulieres infecundas reddere. Quinetiam mures earum suffi-  
tu fugari, ipsis carbonibus impositis, & accensis.

Λιχηνες ἰσχυρῶν.

LICHENES EQVORVM.

CAP. XLI.

LICHENES sunt in equorum genibus, & super ungulas indurati calli. qui triti, & in aceto  
poti, comitialibus mederi traduntur.



DE CALLIS, qui equorum cruribus innascuntur, meminit Plinius libro xxviii. capite xi. & xv. ijsq;  
tritis, & per aurem cum oleo infusis, dentium dolorem mulceri scribit, diebusq; quadraginta ex uino aut mulso potis  
calculos expelli. Ceterum Galenus, cui etiam subscribit Paulus, addidit hos quibusdam usurpari ad quemlibet ani-  
malium morsum.

Callorū equi  
uires.

Alt. Lr. In.

Κατ'ἰσχύματα.

CORIA VETERAMENTARIA.

CAP. XLII.

VETERIS corij cremati illitus cinis ambusta igni, intertrigines, necnon calceamentorum  
attritus sanat.

CORIA uetera, quae uidelicet ueteramentorum sunt, usta (ut Galenus memoriae prodidit libro xi. de sim-  
plicium medicamentorum facultatibus) ad attritiones commodari calceamentorum scriptum à quibusdam est, tan-  
quam scilicet hoc faciant ex antipatheia quadam: Certè quae phlegmonie obsidentur, haud quaquam iuuantur: uerion-  
ibi sedata fuerit phlegmone, non iniuria iuuantur, nempe quia resiccantur. haec Galenus. Ceterum ueteramenta pru-  
tis accensa fumo naribus accepto, efficacissimum constat esse remedium ad iuluae strangulatus, ut mihi quoq; experien-  
tia comprobatum est: quandoquidem hoc tantum remedio ego deploratas in eo affectu mulieres incolumes pluries  
reddidi. Iis similiter accensis serpentes efficaciter fugari compertum est, neq; eos modo, qui in domibus nostris ober-  
rant; sed eos etiam, qui in hominum corpora ingrediuntur, dum homines per aestatem alto somno oppressi, ore aper-  
to in campestribus obdormiunt. Quod scriptus tradidit Marcus Gattinaria nostrae aetatis medicus non contemnendus,

Veteramento-  
rum uires ex  
Galeno.




Vipera ex ho-  
mine fugata.

accidisse suo tempore cuidam homini: cui cum frustra adhibita essent innumera medicamenta, ipsaq; alioquin ef-  
ficissima; illud tamen magnifice prestitit ueteramentorum sumus traiectorio in corpus haustus. Siquidem cum pro-  
ximis inanis feta (erat enim vipera non parua) fumi nidorem præsensit, uisa est à circumstantibus egredi per an-  
trum sine magna omnium admiratione.

Αλεξτοριδες, καὶ ἀλεκτρούρες. GALLINAE, ET GALLI.  
CAP. XLIII. *humer*

DISSECTAE gallinae, & adhuc calentes appositae, serpentium moribus auxiliantur: et  
identidem alias sufficere oportet. Earum cerebellum in vino bibendum datur contra serpen-  
tium morsus: sanguinem à cerebri membrana profluentem sistit. Quae interiore uentriculi gal-  
li sinu residet membrana, secti in laminas cornus specie similis (ea uero inter coquendum abijci  
solet) siccatur, tritaque in vino conuenientissimè stomachicis datur in potu. † Ius uetere gal-  
linaceo aluum deijcit. Abiectis itaque interaneis salem conijci oportet, & confuto uentre decoqui  
in uiginti sextarijs aquae, donec ad tres heminas redigantur: totum id refrigeratum sub dieo, da-  
tur. Aliqui incoquant olus marinum, mercurialem, enicum, aut filiculam. Crudos humores, cras-  
sosque, atram bilem, & strigmenta elicit: prodest longis febribus, suspirijs, articularijs morbis,  
& inflationibus stomachi.



Gallorum, &  
galinarum ui-  
res ex Gal. &  
alijs.


TAMETSI Gallinarum ius simplex (ut Galeno proditum est libro xi. simplicium medicamentorum) rei-  
nendi uim habeat; gallorum tamen ueterum cum sale diutius decoctorum, subducendi facultatem obtinet. Ad-  
scissis serpentium morsus tam gallinis, quam gallinaceis utuntur medici, non tantum ipsis dissectis, & apposis (ut docet Dio-  
scorides) sed uiuentibus adhuc plumas detrahunt ab ano, eumque demorsis partibus apponunt: attrahunt enim hec an-  
imalia cucurbitularum modo in se uenenum, quo mox interficiuntur. Quamobrem alios gallinaceos uiuos continuo q-  
ponere necesse est, donec iniectum urus penitus absorbatur. Utuntur praeterea gallinarum adolescentium iure, et e-  
quandos corporis humores, post februm discessum, cum saccharo, serapij modo. Ad haec gallorum cum gallinis uo-  
dum coeuntium testes, deperditas in morbis uires mirifice restituant: quam ob causam beaticis, & marasmo laboran-  
tibus; morborumque diuturnitate macrefactis utiliter exhibentur. Insuper gallinaceorum testes semen prolificum sup-  
peditant, & ueneras roborant uires. Plinius citra de gallinis differeret libro xxix. cap. iiii. haec inter ceteros  
moris prodidit. Non praeteribo (inquit) miraculum, quanquam ad medicinam non pertinet: si autem liquecenti gal-  
linarum membra misceantur, consumunt illud in se. Ita hoc uenenum auri est. At gallinaceis ipsis circulo e serpens  
addito collo non canunt. In quibus illud quoque sibi à natura datum, non est non summopere admirandum, quod uo-  
etis horas distinguant suo cantu: quia in re nunquam adeo somno capiuntur, quin stans horis cantent; etsi per annu-  
culum noctes modo breues, modo maxime fiant.

† Codices Graeci typis expressi hoc in loco habent. ὁ δὲ ξαμὸς τῶ νοσῶντος μάλιστα δίδουαι ἐπιταχέως  
χρῆσι φρυλατῶν, καὶ ἐπὶ τῶν εὐμαχῶν πυρρῶν λίτῶν σκευασθεῖς. hoc est ad sensum. ius gal-  
linaris maxime datur ad contemperandos humores uirosos, & in ardoribus stomachi simpliciter paratum. Verba  
illa Ruellius, cuius interpretationem alioquin sequimur, uel neglexit, uel illegitima iudicauit. Nos uero hac ex effo-  
renda duximus, non solum quod in uulgariis codicibus, ac antiquissimo (teste Marcello) legantur; sed quia eius in so-  
rapione referuntur. Quibus etiam subscribere uidetur uerborum series, & communis rei usus.

ὄν. OVVM. *Eyn* CAP. XLIII

OVVM molliculum plus alit forbili, & durum plus molli. Luteum oui contra oculorum do-  
lores

iores utile est: inassatum sedis inflammationibus prodest, cum croco, & rosaceo: & condylomatis, cum meliloto: cum uua autem fruticis eius, quem rhoa dicunt, aut galla in patinis frigitur, ut cibo aliuos sistat: per se etiam offerri solet. Candidum oui crudum refrigerat: spiramenta cutis occludit: inflammationes oculorum infusum lenit: ambusta, si statim eo perungantur, pustulas non sentiunt: faciem à solis adustione tuetur: fronti impositum cum thure fluxiones arcet, auertit que: inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo, melle, & vino mitigat: utiliter contra hæmorrhoidis serpentis morsus crudum sorbetur: summè tepidum prodest uelicæ rosionibus, renum exulcerationibus, gutturis scabritiz, reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis rheumatismis.



DE GALLINARVM tantum ouis hic locutum fuisse Dioscoridem, credendum est: quippe que sint ceteris Ouorum con-  
 præstantiora, eorumque sit tum in cibis, cum in medicinis præcipuus usus. Nam quemadmodum testatur Galenus lib. sideratio.  
 111. de facultatibus alimentorum, & Isach Arabicus in suis dietis, gallinarum oua gratioris sunt saporis, ori iucundiora, plusque afferunt alimenti, quam cetera. Alunt hæc, & breui reficiunt tempore, recreant, semen prolificum Ouorum par-  
 egent, & vires ad coitum suppeditant. Que omnia eo præstant efficacius, quò recentiora sunt, & à gallinis edita, tes, & coctura  
 30 que prius admissarios gallos susceperint: quandoquidem (ut Galenus inquit) recentia ueteribus plurimum præstāt: uaria.  
 quippe optima sunt recentissima, pessima autem uetustissima. Secundum locum sibi uendicant à perdicibus, & phasianis edita, quanquam gallinacea uiribus non excellant. Deteriora uerò sunt anatum, anserum, gruuum, & reliquarum Ouorum par-  
 aquatillum: æggrauant enim uentriculum, succum crassum gignunt, & egrè concoquuntur; tametsi plurimum præ- tes, & coctura  
 bebant alimenti, ubi à ualidis, robustisque uentriculis optimè conficiantur. Columbarum oua admodum calida sunt, po- uaria.  
 tius in medicamentorum, quam ciborum usum expetenda. Pauonum autem, ac struthionum pessima sunt, sa-  
 poris horrendi, concoctu contumacia, & humane temperaturæ inimica. In ouis luteum candido longè præstat:  
 nempe quòd illud temperatum constat, ori non ingratum, boni succi, & concoctu minimè contumax: hoc uerò frigidi-  
 dum est, putantam gignit, egrèque concoquitur. Oua uariis, & diuersis modis decoquuntur. quo fit, ut etiam diuersum  
 offerant nutrimentum, & ob id diuersos in corpore pariant succos. Probantur, quæ cum putamine decoquuntur, &  
 40 borum præ ceteris, quæ tremula uocant, quòd lactis semicoagulati instar tremant. Sorbilia, quæ ut uelocius hau-  
 riantur, breuiorem cocturam experiantur, minus sanè nutriunt. Que autem cum putamine longiore elixatione in-  
 durescunt, difficillimè concoquuntur, crassos generant succos, obstruunt, in uentriculo marcescunt: arenulas, & cal-  
 culos gignunt: & coli, & uentriculi excitant cruciatus. Porro ex ijs, quæ extra putamina coquuntur, ea ceteris  
 præstant, quæ integra in seruientem immerguntur aquam. hæc à nostris, quòd quasi dispergantur, uulgò Sperdute uo-  
 cantur. Veruntamen curandum, ne hæc quoque indurentur: siquidem ubi duritiem contraxerint, non secus atque alia  
 lentius cocta redduntur noxia. Quæ deinde ex oleo, aut butyro integra friguntur, uentriculum ledunt, ructus com-  
 mouent, egrè conficiuntur, consocium corrumpunt cibum, malum præbent alimentum, & putridas pariunt exhalationes.  
 Quæ demum super prunis torrentur, aut ignitis figulinis tegulis inassantur, aluum cobibent, difficilèque conco-  
 quantur. Et hæc sufficiant ad ouorum in alimentis facultates. Ceterum quibus, quantisque oua in medicamentis po-  
 50 teantur, retulit Galenus lib. x.1. de simp. medicament. facultatibus, sic inquit. Ouorum album & tenue illud, Ouorum ui-  
 quoniam ad ophthalmias utimur, ex numero est medicamentorum minimè mordicantium. Itaque utendum est oui albu- res ex Gal.  
 mine non tantum ad oculos; uerum etiam ad alia omnia, quæcunque medicamenta requirunt maxime expertia morda-  
 citate, ut sunt omnia sedis, ac pudendorum ulcera maligna. Miscetur quoque utiliter medicamentis profluuium san-  
 guinis ex cerebri membranis supprimentibus, quæ nimirum citra morsum illinuntur, atque adstringunt. Sed & ad ul-  
 ceris rebellantibus, & ijs, quæ absque morfu ea possunt desiccare: cuiusmodi est medicamen pompholyx elota, & me-  
 dicamentum quædam elota, de quibus priuatim supra differuimus. Porro & ipse uitellus adsimilis est nature, ac pro-  
 inde misceatur ceratis morsus expertibus, ouis uidelicet aut lixis, aut asis. Verum id tamen manifestum est inter hæc  
 lenientem existerè differentiam, quòd paulò plus desiccant quæ sunt assa: ac quantum huius accipiunt facultatis, tan-  
 tum deperdunt de nutriendi potentia. Miscetur, & cataplasmatibus phlegmonem arcenibus, ut ijs quæ ex meliloto con-  
 fiant, sed applicandis. Crudo uerò ouo toto utimur admissio rosaceo ad palpebrarum, aurium, mammarumque phleg-

monas, quæ scilicet aut istis illis, aut alio quouis modo euenierint, aut extiterint in neruosis corporibus, puta cibus, & digitorum tendonibus, aut articulis, idq; in pedibus pariter, & manibus. Porro in aceto coctum ouum si edatur, fluxiones uentris desiccatur. At si etiam quippiam eorum, quæ ad dysenteriam, aut cæliaciam affectum conueniunt, emiscueris, atq; in igne modico, sioniq; experte (qualis est qui ex prunis constat) in sartagine frixeris, edendum præbeas, non minime sanè laborantes adiuueris. Aptissima talem ad mixtionem sunt omphacium, rhus, tum ipse qui cibus adspersitur erythros nuncupatus, tum succus ipsius, galla, fidia, hoc est mali granati putamina, cinis coctæ integrarum ustarum. Aptæ quoque & unarum acini, & myrta, & mespila, & corna. Magis istis medicamentis sunt balaustum, hypocistis, cytini, siue mali punici flores. Sed & ad ambustiones protinus crudum impositum est utile, siue quis seorsum albumen duntaxat ipsum molli lana excipiat, siue etiam cum uitello totum commiscens applicet. Etenim mediocriter refrigerat, & citra morsum desiccatur. Nam medicamentis, quæ humiditates desiccant, aut leniunt, aut assum, aut in sartagine frictum miscetur: ijs uero, quæ crassa in pectore, pulmoneq; incidunt, sorbile quod uocant: id quod in aqua eo usque lixari debet, dum incaluerit. Eiusdem ipsius naturæ nomine & ad eos, quibus scæces aut ex uociferatione, aut ex humorum acrimonia exasperatæ sunt, assinitur: tum scilicet quod affectis partibus illinitur, atque cataplasmatibus modo inhaeret: tum quod substantiæ suæ lenitate eas mitigat, sanatque. Eadem ratione stomachi, uentris, intestinorum, ac uesicæ medetur asperitatibus. hæc Galenus. Ceterum oleum, quod è uitellis diu in sartagine frictis elicitur, illitum asperitatibus cutaneis mirifice prodest: serpigines, & uirilgines curat: rimas labiorum, manuum, sedisq; sanat. Quinetiam ulcerum dolores, & articularum cruciatus mulcet. Prodest & aurium doloribus, atque ulceribus: item ambustis utiliter illinitur: cerebri contusas membranas putrilagine affectas mirum in modum à partibus sanis segregat, ut nos compluries magno cum honore periculum fecimus. Ex oua præterea omnibus uolucris generatio euenit, quanquam & aquatilibus ferè omnibus, præterquam phocæ, delphino, & alijs nonnullis. Gignuntur item ex ijs & terrestribus quedam, ut crocodili, lacertæ, testudines, stelliones, & alia: & è reptilibus omnia, uipera excepta. Verum, ut Hippocrates autor est libro de natura pueri, seu fetus (nisi fortassis librariorum culpa eo in loco codex sit deprauatus) pullus ex uitello nascitur, informaturq; ex albumine uero alimentum, & augmentum capebat. Cui sanè sententiæ illud prorsus refragatur, quod de pullorum creatione longo satis sermone posteritatis memoriæ prodidit Aristoteles libro vi. cap. iiii. de historia animalium. Illud insuper eam refellit sententiæ, quod experientia sepe à mulierculis compertum est, quæ suis gallinis oua incubanda subiicunt. Quæ quidem exempto quandoq; fetu, die uno, atq; duobus ante tempus exclusionis, fractis pulli uisceribus magnam uicem partem inuenerunt in corpus assumptam. Testudinum oua, quanquam diutius elixantur; nunquam tamen coræ album concreuit, quanuis luteum admodum durecat. Præterea experimèto compertum habeo, testudines statim oua non edere cum testa obducuntur, quemadmodum uolucres, sed postquam omnia, quæ in corpore fuerint, testæ acie extraxerint putamen: namq; mihi quandoq; contigit dissecuisse testudinem, quæ utero septena gerebat oua, suo putamine obducta, quod & serpentibus euenire quidam existimant.

Oleum ex ouorum luteis.


Animalia ex ouis orta.

Oua testudinum.

TÉTIIYS. CICADAE. *hymenoptera*

CAP. XLV.

CICADAE, quæ in assatæ manduntur, vesicæ doloribus profunt.



Cicadarum consideratio.

CICADAE passim in Italia cognoscuntur, atq; adeo inibi uulgaris notitiæ sunt, ut sepe æstate assiduè canentes messores, agricolas, ac uiatores in campestribus obtundant. Ceterum, quemadmodum tradidit Aristoteles libro v. cap. xxx. de historia animalium, & Plinius libro xi. cap. xxvi. qui certè ea omnia Aristoteli accepta referre potest, Cicadarum duo sunt genera: aliæ enim minores, quæ primæ prodeunt, & nouissimæ pereunt. Aliæ maiores, quæ canunt, eademq; nouissimæ prodeunt, & primæ intereunt. Sunt quæ canunt præcinctu diuiduæ, siue minores, siue maiores sunt: quæ autem non canunt, indiuiduæ sunt. Pariunt in aruis cessantibus, excauantes fœturæ locū asperitate præcuncta, quam parte habent posteriore, quemadmodum et bruci. Quinetiam in harundinibus, quo adminiculo uites eriguntur, inueniuntur.

ter, nidam foeturae excauant. Proueniunt largi copia imbrum. Crescit primò in terra uermiculus, deinde fit ex eo, que tettigometra uocatur parentis nomine, quo tempore gustu suauissima sunt, antequàm cortex rumpatur. Postmodum circa solstitia noctu exeunt, statimq; rupto cortice prodeunt cicade ex matrice illa cicada, quam modò tettigometra dixi. Mares canunt in utroq; genere, foeminae uerò silent. Vnum hoc animal ex ijs, quae uiuunt, sine ore est. Pro eo quiddam aculeatum linguis simile habent, et hoc in pectore, quo rorem lambunt. Pectus ipsum fistulosum, unde illis redditur cantus. Oleas maxime amant, ut minus umbrosas, quanquam et ceteras non spernantur arbores: proinde ubi arbores desint, nasci non possunt. Loca praeterea frigidiora oderunt: quamobrem in umbrosis nemoribus esse nequeunt, nec in frigidis etiamnum regionibus. Quo factum est, ut crediderit Albertus cognomento magnus, gryllos, qui noctu strident, cicadas esse: quippe quòd in Germania, qua fuit oriundus, frigidissima regione ad articum spectante, tametsi frequentes habeantur grylli estate in campestribus, hyeme uerò ad hypocaustorum fornaces plerumq; stabulant; cicade tamen desunt. Parthi Cicadis uescuntur, quemadmodum et gentes ad orientem. Idcirco mirum non est, quòd dixerit Aristoteles, eas esse gustu suauissimas, antequàm tettigometra rumpatur cortex. Cicadarum uires descripsit Galenus libro xi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Sed et cicadis siccis quidam utuntur ad colicos affectus, cum paribus numero piperis granis, aut tres, aut quinq; aut septem, per intermissionem uidelicet, et ipsos etiam paroxismos. Porro alij assas edendas offerunt, quibus affecta uesica est.


Alberti lapsus.

Cicadarum uires ex Gal.

### Angides. LOCUSTAE.

### CAP. XLVI.

LOCUSTAE odoris suffitu urinae difficultates adiuuant, praesertim quae foeminas malè habent. earum carnes nullo sunt in usu. Est & quoddam genus locustae, quae asiracos, aut onos dicuntur, sine pennis, praelongis cruribus. Exiccata autem si ex uino bibatur, contra scorpionis morsus magnopere proderit. Hac abunde uescuntur Aphri, qui Leptin incolunt.



LOCUSTAE omnibus notae, uaria pro morum, et locorum diuersitate sortiuntur nomina. Verùm herbis, et segetibus infestissime, quòd saepius quibusdam in regionibus paucis admodum diebus uniuerſa terrae germina absument. Harum, quemadmodum tradidit Aristoteles libro v. cap. xxviii. de historia animalium, qui mares sunt, foeminis magnitudine cedunt. Pariunt in terra fixo cauliculo, quo mares uacant: ac uniuerſae, et loco eodem foetum deponunt, ita ut quasi fauus esse uideatur. Hinc uermiculi speciem ouis gerentes oriuntur, qui terra quadam praetenui tanquam membrula ambiuntur: qua dissecta emergunt locustae, ac euolant. Tam mollis foetura haec est, ut ad tactum leuissimum dilabatur, et pereat. Pariunt exitu ueris, et statim à partu moriuntur, uermiculis circa collum innascentibus tempore partus, qui eas strangulent. Mares quoq; eodem tempore obeunt. Locis montanis, aut tenuibus locustae non sunt, sed planis, rimosisq;: pariunt enim in rimis sua oua. Transeunt Locustae immensa maria, immensosq; tractus permeant (ut Plinius inquit) diraq; mensibus contegant nube, multa contactu adurentes, omnia uerò morsu erodentes. Italiam ex Africa maxime coorte infestant, tanta sanè multitudine, ut solem obumbrent sollicitè suspectantibus populis, ne stipes suas operiant terras. quòd non modò uniuerſas cum segetes, tum herbas deuorent ad radicem usq;: sed et radices ipsas regerminare prohibeant. Huius rei testimonio fuisse inaudita Locustarum agmina, quae nostro tempore uolente anno domini M.D.XLI. ex paludibus Maotidibus profectae, non solum uniuerſam Pannoniam, maximamq; Germaniae partem; sed totam etiam Italiam occuparunt, non sine magna omnium è terranascantium perniciè: siquidem omnem segetem, omnemq; uiuentem herbam radicitus deuorauerunt. Haec Parthis in cibo gratae. Quamobrem admittendum non est, si sacris literis mandatum sit, ut Leuitici xi. capite legitur, à Mose probatas esse in cibis. Nec mirum etiam, si uicini Ioannem Baptistam ijs ex syluestri melle uictitasse in deserto: tanetsi non desint interpretes, qui uelint pro locustis quasdam herbarum radices intelligi: alij uerò nonnullas arborum summitates. At mehercule in horum sententiam deuenire nunquam potui: quin potius certò crediderim ipsum nempe legis Mosaicæ sectatorem acerrimè, hisce

Locustarum consideratio.

Locustae in cibis.

hisce Locustis animalibus uictitasse, quemadmodum etiam sentit diuus Augustinus, expones diui Pauli epist. ad Romanos. In Cyrenaica regione (ut Plinius est autor) lex est ter anno debellandi Locustas, primò ouz obterendo, deinde scetum, postremò adultas, desertoris poena in eum, qui cessauerit. Et in Lemno insula certa mensura praefinita est, quia singuli enecatarum ad magistratus referant. Necare et in Syria militari imperio coguntur: tot orbis partibus agitur id malum. In India ternum pedum longitudinis esse traduntur, adeo ut foeminarum crura serrarum usum prebeant, ciam inaruerint.

ΦΙΛΙΣ. OSSIFRAGVS. *Smylax*

CAP. XLVII.

VENTER eius auis, quam Latini ossifragum appellant, particulatim potus; calculos cum lotio pelere proditur.

Ossifragi consideratio.




VARIA admodum est inter scriptores Ossifragi historia. Siquidem Aristoteli uolucris est aquila maior, colore cinereo, albicante. Probè hæc fecundat, et uiuit. Pia, et benigna est: non enim suos tantum nutrit pullos; sed et aquila. Cum autem illi suos in nido eiecerit, anteaquam adolecant, quod inter se cibi auiditate dimicet, hæc recipit eos, et educat. Parum Ossifragus oculis ualeat: nubecula enim oculos habet lesos. At Plinio lib. 2. cap. 111. Ossifragus in aquilarum genere annumeratur, hinc ab eo proditur ex haliæto, hoc est, aquila marina natus. Marinum hanc suum genus non habere, sed ex diuerso aquilarum coitu nasci, idem autor est. Alberto præterea Ossifragus aquatica est auis, cygno sanè maior, rostro oblongo, inferiore parte sacculi instar ampli, in quem plurimos recondit pisces, quos subinde surgulos deuorat. Veruntamen hæc in aquilarum genere non reconfertur. In Hetruria maritimis aues hæc uulgares omnibus sunt, præsertim his, qui circa Argentarium promontorium habitant: quæpe quod circa Herculis portum, et Vrbetelli stagnum frequenter reperiuntur. Vocant eas incolæ uulgò Agroti. Ceterum, qui Aristotelis, et Plinii Ossifragum mihi ostenderit, hæcenus reperi neminem. Porro marina illa clarissima Aquila uocata (ut Aristoteles inquit) oculorum acie maxime pollet, ac pullos adhuc implumes cogit aduersum intueri solem: tunc cuius oculi prius

Plinij lapsus. lacrymarint hunc occidit, reliquum educat. Quo fit, ut hæc in re Plinium hallucinatum esse crediderim. quippe cum marine aquilæ pulli acerrimi omnino sint uisus, nullam ipsorum Ossifrago cognationem habere uidentur, quod hic potius quadantenus cæcitate laboret.

Κορυδαλός. GALERITA. *Lurida*

CAP. XLVIII.

GALERITA auicula est parua, apicem in uertice, pauonis modo, gestans. Hæc assa, & in cibo sumpta, coeliacos adiuuat.






ALAUDARVM (ut memorie prodidit Aristoteles libro ix. capite xxv. de historia animalium) duo sunt genera. Alterum terrenum, cristatum, Galerita à crista appellatum. Alterum gregale, nec singulare, more alterius, aerum colore simile: quanquam magnitudine minus, et galero carens. Campestris ambæ sunt aues, uermiculis uictitantes, decidentibusque seminibus. Mares suauiter canunt, primæque sunt aues, quæ æstatem cantu pronunciant. Porro Alaudæ adeo ad aucupes aues expauescunt, ut sæpe, dum sentiunt se persequi, in hominum gremia confugiant, ne rapiantur. Mares in caueis diutius retenti, altero sæpius obcæcantur oculo.

Alaudarum  
historia.

ΧΕΛΙΔΩΝ. HIRVNDO. *Organ alby*

CAP. XLIX.

10 DISSECTIS crescente luna pullis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in uentre eorum lapillos offendes: è quibus duos, unum colore uarium, alterum purum eximes: ij priusquam terram attigerint, in iuuenæ corio, aut ceruina pelle brachio, aut collo adalligati, comitialibus proderunt, & sæpe proifus eos recreabunt. Hirundines, uti ficedulæ, in cibo, aciei uisus medicamentum præbent. Tam pullorum, quam matrum in fictili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert: anginæ eo commodè perunguntur: uæ & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ, & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuant, qui anginæ morbo conflictantur.



HIRVNDINVM tria habentur genera: unum nostra tecta subit: alterum uetustorum ædificiorum muros, cauernulas, et montium scopulos expetit: tertium uero nidificat in altis fluminum ripis. Hæ quotannis (ut Plinius auctor est) ex Africa maria transeunt, appetente uere ad nos aduolant, et martio plerunque mense nostras ingrediuntur: ac ibi, è luto, et quibusdam stramentis sibi construunt nidos, in quibus bis oua pariunt, et bis pullos excludunt, tantum humane fidunt benignitati: atque ubi ultimos educauerint partus, æquinoctij autumnalis tempore in suas remigrant regiones. Chelidonium herbam ab his inuentam tradunt, unde illi nomen est inditum. Hanc suis obcecatis pullis deferunt in nidum, hoc tantum medicamento ipsi uisum reddentes. Quinetiam experientia compertum est, quod si data opera pullorum hirundinum oculi acu perforentur, sanantur paucis diebus, allata a matre chelidonia herba. Hinc igitur edocti medici ad oculorum claritatem chelidonium adhibent. Hirundinum uero stercore oppositum præstat: excæcat enim, si calidum in oculos decingat. Quod etiam sacra testantur monumenta, in quibus, Tobiam hoc stercore excæcatum fuisse, legitur.

Hirundinum  
historia.

Chelidonia.


ΕΛΕΦΑΣ. E. B. V. R. *Elephas* CAP. L.

30 EBORIS scobe illito, paronychia sanantur. Vim adstringendi ebur obtinet.

OMNIBVS sanè perspicuum est, quàm aliud Ebur esse, quàm Elephantinorum dentium materies, multis apta operibus. Elephantorum meminit Plinius longa admodum historia initio libri octauii pluribus capitibus: tametsi non omnia, quæ scribit, probanda putauerim. Elephantos fert Africa ultra Syrticas solitudines, item Mauritania, et Aethiopia: sed maximos India mittit. Ii quanquam magnitudine cætera excedant quadrupeda, Aristotelis tamen testimonio adeo cicurantur, ut omnium ferarum mitissimi, et placidissimi euadant: quippe qui per multa officia et eruditi, et intelligent. Corio Elephanti integuntur bubalino simili, ut is uerum præbuit exemplum, quem Romanus uidit Leonis decimi Pont. Max. æuo, etsi rarissimis horreat pilis. Caput eis magnum, collum breue, aures uero utique duam palmorum amplitudine: nasum, quem peculiariter in Elephanto promuscidem appellant, longissimum habent, concuum, grandis tubæ instar: hic infra anteriores dentes ad terram ferme promittitur, quo pro manibus utuntur.

Elephantorum  
historia.

## ELEPHAS.



Error quorū  
dam.

utuntur. Os gerunt pectori proximum, ut quod cum suillo ineat similitudinem: e cuius superna parte dentes duo prominent præcipue magnitudinis (quales plurimi uenales conspiciuntur Venetijs in publico foro uulgo Mercatus est, ac in alijs Italiae emporijs) qui proni cuspidè deorsum uergunt. Pedibus nituntur rotundis, disci instar, laminae diuam, triumue palmorum, quos callosa materia obducit: ungulis quinque circum, rotundis, mediocriam conchæ magnitudine. Crura ijs magna, ac fortia, neque (ut quidam imperiti existimant) uino tantum osse consistit uel uisa, sed genua flectunt, utpote et cetera quadrupeda. Quamobrem Elephanti (ut refert Aloisius Cadamustus, qui classe in Aethiopiam, et ad Calicut nauigauit) ut eos, qui deferri uolunt, suscipiant, genua submittere, sese erigunt deinde. Elephantis cauda bubali, trium palmorum circiter longitudine, rarissimis setis referta. Quæ haud facile se tueri possent à muscarum iniuria, nisi aliam illis industriam natura tribuisset, qua ab ijs se uideant: quandoquidem ferientibus muscis, cutim, quam cancellatam obtinent, contrahunt. Quo fit, ut arida rugas repente cancellis, muscas comprehensas enecent. Homines non nisi laesiti nocent. Veruntamen inter homines promiscue comprehensos, adeo in sublime iaciunt, ut priusquam in terram decendant, suffocentur, et pereant. Ad hæc nullus hominum tantæ pernicietatis inuenitur, quem mox Elephas non comprehendat, etiam non currens, sed gradatim incedens. Id efficit uasta animalis moles: quandoquidem sui gressus longitudine, humilis etiam pernicietatem euincat. Victitant arborum tam frondibus, quam fructibus: neque ulla tam ingens est arbor, quam ijs promiscue non prosternant, frangant, ac dilaceret. Adolescunt ad sexdecim palmorum altitudinem. quapropter quæ consendere non assueuerunt, non secus fastidio afficiuntur, ac illi, qui nauibus non assueti maria sulcant. Effraus præ rea adeo natura Elephanti sunt, ut nullis habenis cohiberi possint. quo fit, ut liberi incedere dimittantur: uerum maxime gubernantibus suarum regionum hominibus pareant, et eorum sermonem intelligant, idcirco uerbis facile reguntur. Adeo conspectum ignem expauescunt, ut eo territi à fugâ reuocari non queant. Quæ re ab ijs non cogitur, qui eius Elephanti curam gerebant Romæ, in cuius dorso oppidulum construxerant, eo die, quo Iulianus Medici Patricius Max. frater uxorem à Gallia duxit, in magno sanè discrimine uersati sunt: nam ubi bellica tormenta ignem tantia conspexisset, magnumque, ac terrificum sonum sensisset, tantæ se fugæ dedit, ut nunquam cohiberi uoluerit, deinde una cum conclusis in oppidulo hominibus in Tyberim sese commiserit. Elephanti non coeunt, neque gignunt, nisi eum uigesimalium agant, ut auctor est Aristoteles lib. vi. cap. xxv. de hist. animalium. Quæ in re Plinius error notandus deprehenditur: quippe qui marem quinquennæ, foeminam decennem generare memorie prodiderit. Elephanti nulla nouere adulteria: nam unius tantum foemine coitu utuntur, eamque cum uterum gerentem uiderint, non tangunt. Quantum uero temporis unaqueque foemina utero gerat, haud quaquam sciri potest: quod Elephanti parere nunquam nisi in abdito coeant. Idcirco alij eis annum et sex menses statuerunt, alij biennium, alij denique triennium. Pariunt foemina cum dolore, quemadmodum et mulieres. Pullum editum ore lambunt, qui statim cum natus est, cernit, et ambulat. Viuere Elephantos (ut inquit Aristoteles) tradunt quidam annos ducentos: sed florere etate circa sexagesimum, uel septuagesimum narrant. Idem hyemis, ac frigoris impatientes sunt. Gaudent annis maxime, et casque fluuios uagantur, quos intrant libenter bubalorum more. Ceterum Elephanti ingenio, et intellectu hominibus proximi sunt: siquidem patrios sermones intelligunt, summam præstant obedientiam, prudentiam seruant, et regnum præ se ferunt: solem namque, ac lunam uenerantur. Cuius rei autores sunt Mauritani, in quorum regionibus Elephanti innumeri conspiciuntur: qui gregatim noua nitescente luna ad annes descendunt, ibique lauantur: mox peracti genibus flexis salutant fidus, et in sylvas reuertuntur. Sunt, qui tradunt tantæ intellectus sagacitate Elephantos polere, ut maria transituri ad alienas regiones, non antea naues conscendere uoluerint, quam ijs, qui eos ducunt, et rando de reditu promiserint. In sylvas ituri gregatim ferè semper ingrediuntur, quorum agmen ducit, nam cogit uero etate illi proximus. Produunt Elephantos à uenatoribus circumuentos, cum sciant prædam solam in domibus suis ab illis expeti, dentibus uehementer impingentes arboribus eos sibi euellere, prædique se redimere. Quod

Plinij lapsus.

crediderim uanum, ac fabulosum esse: quemadmodum esse falsum superius ostendimus, quod fiber uiso uenatore, sibi ipsi testes amputet. Elephanti omnes natura indomiti, sylvestresq; sunt: mitescunt autem arte, ut pleraq; alia fera animantia. Item si parui, & etate tenelli educantur: quanquam Plinius scribit, natu grandes domari fame, & uerberibus; presertim si alijs domitis, qui tumultuantem coërceant, admoventur. Porro non desunt in Elephantorum genere, qui natura feritate nunquam domari possint, quales in Senega (ut in suis nauigationibus scriptum reliquit Alosius Cadamustus) Aethiopie regno reperiuntur. Præstat Ebur ad albas mulierum fluxiones, si tamen in tenuissimum puluerem, lapide porphyreo redigatur, propineturq; ex lactucæ seminis cremore, aqua, in qua chalybs extinctus fuerit, prius macerato semine.

Eboris uires.

## Αἰσάγαλος ὄνος. SVILLVS TALVS. Οἶνος & οἶ CAP. LI.


SVILLVS talus comburitur, dum è nigro albescat: qui tritus, & potus inflationibus coli, longisque torminibus medetur.



TALVS in animalibus os illud ultimum pedis est, quod tibiæ cruris annectitur. Id Græcis αἰσάγαλος, uulgo autem os clauicula appellatur: de quo non operæ pretium est, ut plura dicamus.

## Εἰλαίου κέρασ. CERVINVM CORNV. Hirtz Jm CAP. LII.

CERVINI cornu cinis elotus, binis ligulis epotus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, celiacis, regio morbo, & vesicæ doloribus cum tragacantha: sceminis fluxione vuluæ laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu contusum, crudo fistili, luto circumlito, & in furnum inditò, vritur donec albescat. Id cadmiæ modo elotum, vlceribus oculorum, & defluxionibus salutare est: infriktum dentes expurgat. Crudi cornu suffiti nidore serpentes fugantur: seruefactum in aceto, si eo gingiuæ colluantur, maxillarum à dentitione dolorem adimit.



CERVI animalia sunt notissima. Sed quoniam eorum natura non omnibus cognita est, ut candido cuiq; lectori sit satis, ea de Ceruis hic referam, quæ Aristoteles tum VI. & IX. de historia animalium, tum IIII. de partibus co-

Ceruorum historia.

rundem posteritatis memorie prodidit. Cerui itaque sylvestrium animalium genere constant, magnitudine asinorum, cursu uelocissimi, et ingentibus armati cornibus. Si cum turgente iam uenere coitum appetunt, adeo rabie bibulae seuunt, ut insaniant, et maximo cum strepitu, et clamore uagentur in syluis. quo fit, ut conualles, et montium cœtates, eorum boatu resonent. Tanto impetu, tantaque rabie mares feruntur in coitum, ut sæpe inter coeundum scissæ declinent, atque prosternant in terram. Cuius autem maris genitale utpote durum, sustinere non possunt, scissæ cœtes, et currentes coeunt, et concipiunt. Mares non in eadem immorantur, sed mutant, et hircorum modo breuiter terposito tempore aliam, atque aliam supergrediuntur. Si forte fortuna in unam tantum scissam concurrant plures, imis cornuum adminiculis statim supra frontem enatis, acriter inter se pugnant ad mortem usque. Cuius maris deperuerint scissas, separantur per se ipsi, et propter libidinis graueolentiam quisque solitarius scrobes fodit. Fortia et hirci: facies quoque eorum nigrescit aspergine, ut hircorum. Degunt ita quousque, imber accedat, tum pascua repetunt. Hæc ideo ceruo accidunt, quia salax animal suapte natura est, atque etiam quia pingui abundat: pinguescunt enimestate supra modum. Quamobrem nec currere quidem possunt: sed secundo, aut tertio cursu capiuntur ab ijs, qui pedibus insectantur. Quo fit, ut ubi se præpingues sensere, latebras quærant, fatentes incommodum pondus. Cuius et ab arcturo, mense augusto, et septembri. Implentur ceruæ paucis diebus, et ab eodem multe. Vtrobique feruntur octo menses. Pariunt magna ex parte unum: sed nonnullis etiam geminos ceruam peperisse perspectum est. Ferantur quæ drupedium Cerua maxime prudentia præstare uidetur, tum quia circa semetas pariat, quod scilicet beluæ rapaces propter homines minus accedunt: tum etiam quia cum peperit, inuolucrum primum exedit, quod ad multa (ut nocendi asserunt) in medicamentis expetatur. Redeunt mox ad prolem, deuorata à partu sefeli herba. Anniculis maribus uero cornua nascuntur, nisi quoad indicij gratia sit initium quoddam prætuberans, quod breue, hirtumque est. Præterea cornua primum oriuntur simplicia, et recta ad subularum similitudinem: quamobrem Subulones per id temporis ea uocant. Trinis bifida exeunt. Quadrimis trifida, atque deinceps ad hunc modum (ut Aristoteles inquit) proceat numerus usque ad annum sextum. Ab hoc similia semper prodeunt, ita ne sit dignoscere etatem ramorum numero. Verum in Italia (sit tamen cum Aristotelis uenia dictum) usque ad undenarium numerum ramicant. quod et Albertus testatur se uidisse in Germania, quemadmodum et nos uidisse fatemur. Vanum est credere Ceruorum etiam annos dignosci posse ramorum numero, quod singulis annis unum superaddant: quippe cum longæui admodum sint, si quotannis ramorum numerus augetur, profecto ijs, qui ultra ceterum annos uiuissse narrant auctores, cornua quæcubus, et pinis maiora fuissent. Ceterum (ut Aristoteles scribit) duplici indicio senes cognoscimus, tum quod dentes aut nullos, aut paucos habeant: tum quod adminiculis careant, qui imis cornibus prominent ante frontem. Nam ijs in pugna utuntur iuniores, sed in senibus non renascuntur, cum prælijs omnino cesserint. Cerui (ut etiam Theophrastus inquit libro, et capite primo de historia plantarum) quotannis cornua amittunt: ideo sub ipsa die quam maxime inuia petunt. Latent amissis uelut inermes, sed et ipsi bono suo inuidentes. Fit hoc mense aprili, statuto tempore. Idque opacis faciunt locis, ut muscarum tædio uacent. Pascuntur per id tempus noctu quasi uerecundantes, donec recipiant cornua. Decidua amittunt difficilibus, et inaccessis locis, et qua inueniri nequeant. unde illud proverbium ortum. Qua cerui amittunt cornua. Quasi enim sua amiserint arma, cauent ne inermes reperiuntur. Cora sinistram compertum esse (inquit Aristoteles) à nemine adhuc fertur: oculum enim id tanquam quodam memento præditum: etsi Plinius, et Albertus oculi dextrum memorie prodiderint. A phalangio demorsus, uel à quouis generis eiusdem, cancos edunt: quod idem homini etiam prodesse putatur: sed non carent fastidio. Cerua sibi, et cantu uenantium, pastorumque fistulis capiuntur: mulcentur enim alliciunturque ea uoluptate, ita ut alter uenantium cantet palam, aut sibilet, alter clam feriat à tergo, ubi socius iam tempus esse significarit. Namque ex mal simplex ceruus est, et omnium rerum miraculo stupens, intantum ut equo, aut bucula accedente propius hominem iuxta uenantem non cernat, aut si cernat, arcum ipsum sagittasque miretur. Si ceruus erectis auribus teneat, acerrime sentit, nec latere insidie possunt: sin demissas, facile interimitur. Maria tranant gregatim cæcantes porrecto ordine, et capita imponentes præcedentium clunibus, uicibusque ad terga redeunt. Hoc mense notatur à Cilicia Cyprum traicientibus. Nec uident terras, sed in odore earum natant. Ceruorum forme cornua non habent: nec maribus nascuntur, si ciam per etatem nondum cornua gerunt, castrantur: sed si cornu testis exciduntur, non decidunt cornua, et magnitudine eadem seruantur. Vita Cerui (ut Plinius memoria prodidit libro VIII. cap. trigesimo secundo) in confesso longa: quandoquidem post centum annos quadam capta fuit cum torquibus aureis, quos Alexander magnus addiderat, ad optis iam cute in magna obesitate. Ceterum quod uita tam longa sint cerui, quanta eos esse ferunt, non uidetur approbasse Aristoteles libro VI. de historia animalium, ubi inquit. Vita esse quam longa hoc animal fertur. Sed nihil certi ex ijs, quæ narrantur, uidemus: nec gestatio, aut momentum huiusmodi ita euenit, quasi uita esset prælonga. hæc Aristoteles. Qui re uera nihil certi nancisci potuit ex his, qui centum annos post Alexandrum capti sunt cum torquibus aureis. Nec etiamnum ex Cesaris Augusti cerua, quæ similiter innumeris elapsis annis post eius imperium capta, nunquam iugulari potuit, prohibente torque argenteo temporis diuturnitate cute quasi contexto: in quo scripta legebantur uerba hæc. Noli me tangere, quia Cesaris sum.

Monte Asie Elapho nomine apud Arginufam, quo loco Alcibiades mortem obiit, ceruæ omnes scissa aure sunt: quæ nota uel alibi si loca mutauerint, dignoscuntur. Mirum quippe est dixisse Aristotelem libro VIII. cap. XXVIII. de historia animalium, Africam nec ceruos, nec apros gignere. Cui etiam subscribit Plinius libro VIII. capite XXXIII. Cuius tamen palam omnibus sit, et aprorum, et ceruorum greges in Africa haberi. Nisi forsitan posteriori uero alio de eo fuerint illati. Dictumum herbam extrahendis sagittis (ut Plinius auctor est libro VIII. cap. XXVII.) cerui monstrauere percussu eo telo, pastuque eius herbe eiectione. Quod tamen Dioscorides capris attribuit telo in Creta rebus.

Vulgaris opinio uana.

Aristotelis, & Plinij lapsus.

1. *Cervi manifestò fel in iecore non habent, quemadmodum equi, asini, muli, cameli, damæ: et in natatiliu genere delphinus, et pboæ: sed id in uenulis continent, quæ per intestina sparguntur: quo fit, ut eorum uiscera non modò in cibis minime recipiantur; sed nec à canibus quidem edatur, nisi præpinguia sint: anarescunt enim bile, qua suffunduntur. At ceruus Achænis cognomine, fel contineri in cauda creditur, autore Aristotele. Est quod ibi contineri aiunt, colore quidem simile felli, sed non ita ut fel humidum, leni simile parte interiore. Hoc degustantibus atrocissimum est uenenum, adeò ut breui temporis spatio hominem è medio tollat. Vermes cerui omnes continent in capite uiuos, qui nasci solent sub lingua in concauo circiter uerteram, qua ceruici innectitur caput, magnitudine haud minores ijs, quos maximos carnes putres ediderint. Gigni uniuerfi, atq; contigui solent numero adeò circiter uiginti. Ceruinus sanguis (ut Rasis inquit libro sexaginta animalibus dicato) clysteribus infusus intestinorum ulcera sanat, et diuturnas alia fluxiones cohibet: ex uino uerò sumptus, uenenatis sagittis resistit. Eius cerebrum neruorum, et compaginum collectiones mundat. Cornu ad candorem usq; exustum, ex melle haustum, alui tineas pellit. Iuuenum ceruorum tenerissima cornua, quæ adhuc lanuginosa cuticula operiuntur (autore Scribonio Largo) in taleolis concisa, et nouo fictili indita, ac inde operculo argilla circumlito, in clubanum imposita, donec adeò arefiant, ut in puluerem facile conteri possint, additis pipere, et myrrha, coli cruciatibus mirificè medètur. Os præterea, quod in ceruorum corde reperitur (tametsi Vesalius uir alioquin clarissimus libro, quem de humana fabrica edidit, nullum inibi os reperiri falsò contendit) omnibus cordis affectibus confert. Quin et contra omnia uenena mirificè præstat, antidotisq; admiscetur, quæ per silentie aduersantur. Sed cauendum est, ne huius loco seplasiarij bubulam tracheam arteriam accipiant in compositionibus, ut facere consueuerunt.*

Vermes in capite cerui.

Cerui usus in medicina.

## Κάμψαι. ERUCAE. *Ranunculus* CAP. LIII.

ERUCIS, quæ in oleribus gignuntur, cum oleo peruncti, à uenenatis bestiis feriri negantur.

ERUCAE, quibus olitores maximè inimicantur, animalcula sunt uulgaris notitiæ; sed hortis admodum noxia, quòd quandoq; adeò numerose proueniant, ut inuitis olitoribus olera cuncta una tantum deuorent nocte. Gignuntur (ut memoria prodidit Aristoteles libro v. cap. xix. de historia animalium) ex uirentibus herbarum folijs, maximeq; ex brassica. Primum minus quid milio consistit in folio: mox uermiculi inde contrahuntur, et augentur: tum intra tri-duum erucule afformantur. Hæ tempore senescentes motu cessant, suaq; forma immutantur, durioriq; cortice integuntur, cuius color auro fulget: ob idq; (ut Aristoteles producit, et ante ipsum Theophrastus lib. v. de causis plantarum) appellantur tantisper chrysalides, quasi aurelias dixeris. Dum eo putamine integuntur, ad tactum tantum mobiles sunt, et palpitantes, meatibus araneosis obductæ: non os, non aliud ex membris, quod conspicuum sit, possident. Longo post tempore putamine obrupto, euolant inde animalia pennigera, quos papiliones uocamus. Itaq; primum dum Erucæ sunt, cibo aluntur, atq; excrementum emittunt: at uerò cum in aurelias transferint, nihil uel gustant, uel excernunt. Harum dum adhuc puer essem, ingentem copiam quodam anno peperit Hetruria, adeò ut pueri omnes mirabili quadam ostentatione numerosas in plateis gestarent aurelias, ita aureo nitore fulgentes, ut ex puro auri metallo factus quisq; credidisset, nisi deprehensæ fuissent palpitantes. Fuit eo anno tanta Erucarum multitudo, ut uniuerfas eroserunt herbas. Quo postmodum factum est, ut ubiq; strypium folia, ac rami, edificiorumq; parietes, ijs ueluti uiuo ac palpitanti fulgerent auro. Facies eis quasi humana, capite bicorni, corpore infantuli modo fascia obducti: id quod silentio dissimulauit Aristoteles. Hæ querentibus quotannis sese offerunt circa urbium moenia, et edificiorum muros, circa eos præsertim, quibus adiacent horti, ac uiridaria: plerunq; enim in edificiorum cauis capite ad terram uerso reperiuntur appensæ. Ceterum etsi dixerit Aristoteles, Erucas ex herbarum, olerumq; præsertim folijs ex sese gigni, obq; animalis semine; usuntur tamen hoc æuo papiliones ex aurelijs exorti, auersis olerum folijs oua parere subalibida, milio minora, ex quibus erucæ tandem prodeunt, ut sericino Erucarum generi euenire comperimus. Vnde mihi quidem dubitandum uidetur, an rem hanc diligenter perpenderit, uel exquisitè tractauerit Aristoteles. Quanquam minime negauerim, quin et ex putri quodam humore per se Erucæ nasci possint, quemadmodum et mures, angues, uermes, aliq; còplura generantur. Plinius grana illa ex rore fieri putat, soleq; addensari. quod tamen natura speculatores non ita facile comprobant. Erucis olera non erodi auctor est Plinius, si palo imponentur in hortis ossa capitis ex equino genere foemina duntaxat. Aduersus quas et cancrum fluuiatilem in medio horto suspensum auxiliari narrat. Sunt etiam qui sanguineis uirgis tangunt ea, quæ nolunt his obnoxia esse. hæc Plinius. Columella præterea libro xi. de re rustica circa calcem, necandis prohibendisq; erucis hæc in medium protulit. Vbi uerò apricis regionibus post pluuias noxia incefferunt animalia, quæ à nobis appellantur Erucæ, Græcè autem κάμψαι nominantur, uel non colligi debent, uel matutinis temporibus frutices olerum concuti. Sic enim dum adhuc torpent nocturno frigore, si deciderint, non amplius superiorem partem prorèpunt. Id tamen superuacuum est facere, si ante sationem semina succo herbe sedimacerata sunt: nihil enim sic medicatis nocent erucæ. Sed Democritus in eo libro, qui Græcè inscribitur περὶ τῶν ἀφωρῶν, affirmat, has ipsas bestiolas enecari, si mulier, quæ in mensuris est, solutis crinibus, et nudo pede ubi uisum fuerit, aream ter circumueat: post hoc enim decidere omnes uermiculos, et ita emori. Sed postrema hæc, quæ à Columella referuntur, superstitiosis sunt relinquenda.

Erucarum historia.

Erucarum generatio.

Remedia contra erucas.

## Κανθαρίδες. CANTHARIDES. *Bryonia* CAP. LIIII.

EPYMENTIS congestæ Cantharides ad recondendum idoneæ sunt, quæ fictili uase non picato conduntur, & raro mundoque linteo obligato ore, & deorsum conuerso suspenduntur super




aceti feruentis quàm acerrimi halitum, donec æstu exanimetur: postea lino transfixæ reponitur. Potentissimæ omnes uariæ, luteis lineis, quas in pennis transfuersas habent, promissoque corpore, crassæ, ac blattarum modo perpingues: sed inertes, ac imbecillæ, quæ unius sunt coloris.

Βουτρίδες, ἢ τὸ πινυονόμα.

BUPRESTES, ET PINORVM ERVCAE.

C. A. P. L. V. Quolst.

**SIMILIA** modo reconduntur buprestes, genera quædam cantharidum, & pinorum erucæ: quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intostæ, reponuntur. Vis omnium communis erodere, ulcerare, calorem elicere: quæ de causâ admiscuntur medicamentis, quæ lepras, ferosque tachenas, & carcinomata sanant. menses ciunt pefsis emollientibus additæ. Aliqui cantharidas antidotis impositas, aquæ subter cutem auxiliari prodiderunt: argumento, quod urinam mouent. Alij pennas, pedesque contra potarum ueneficia, remedio esse tradiderunt.



Cantharidum  
consideratio.

Buprestes.

Pinorum erucæ.

Error multo  
rum.


Cantharidum  
uires ex Gal.

**CANTHARIDES** uulgata sunt animalia, nomine à Cantharo, qui Latine scarabeus est, deducto, ac si eis turris paruos scarabeos. Sunt in Italia frequentissime, calidioribus præsertim regionibus, ubi non modo in frumetis ueniuntur; sed in fraxinis quoque stabulantur. Præstant quæ solide, recentesque sunt: nam ueterescentes facili carum sentiunt, unde inutiles fiunt in medicamentis. Buprestes autem (ut Plinius inquit libro xxx. cap. iiii.) non potest in Italia sunt uulgares, et frequentes; sunt tamen scarabeis similes, quanquam minores. At pinorum erucæ rufæ sanè habentur in Tridentinis montibus, quod inibi pinorum perpetuo uireant syluæ, Ananensis præsertim arbor, ac Flenarum conuallibus. In extremis arborum ramis, et ijs plerumque, qui in earum cacumina attolluntur, innumerabiles Erucæ rufescentes, ac pilosæ miro artificio nidificant, quibusdam tenuissimis uelleribus inuolucris contextis. Latent in his hyeme, ita frigoris noxam euitantes. Nidi magnitudo adeo ampla est, ut nonnunquam concole uermiculi millenarium numerum excedant. Inuolucris materies, quæ concluduntur, tenuissima serici telamina proximè emulantur, tenuior tamen est. Hæc sanguinis manationibus aptissima est: quare imposita confectum fluorem sistit. Sed de his hætenus. Ceterum sunt medicorum quàm plurimi Mauritanos præcipue sequentes, qui quotiescunque Cantharidas medicamentis miscunt, præcipiunt capita, alas, et pedes abijci, tanquam partes cæteris nocentiores. Quod tamen Galeni sententiæ omnino repugnat. Quippe qui lib. xi. simpl. medicament. integras cantharidas medicamentis addendas præcipit, quemadmodum et ijs integras ipse perpetuo fuerat usus. Sed si responderint, illud nec eorum esse institutum, nec Mauritanorum, sed Hippocratis quarto de uictus ratione in morbis acutis, audiant quæ quibus uerbis eodem loco Hippocratis sententiam declarat Galenus, cum inquit. Quidam dictionis huius mentem bene quaquam intelligens audax medicus, prædictas partes à cantharidibus abiecit, deditque hydropi: cui cum à primo de abscessu in sura comparuisset, post tres alios dies sectus est, effusaque copiosa aqua, curatus esse uisus est: quod partumoris præter naturam plurimum statim ad moderationem redacta sit, ueruntamen non multis post diebus obijt. Quam ob causam medico quidam crimen ingessit, perperam data esse cantharidum corpora inquiens. Nempe propinquant, ablatis corporibus, tum caput, tum pedes, tum alas, idque esse quod in dictione enunciaretur. Quare non curabitur audax ille medicus, hydropi alteri ita propinauit: moxque facto similiter in femore abscessu, sectoque, multis post diebus hominem mori contigit. quanquam urinarum prouocatorio medicamento ex cantharidibus confecto, quædam acribitentium incommodum usi sint. hæc Galenus. Ex quibus facili cognoscitur, Arabes non rectè Hippocratem medicasse. Quamobrem dicendum esse existimauerim, quod ablatis cantharidum extremitatibus, exuantur antidoto, quæ natura sunt prædite in proprii ueneni remedium. Quod cum accuratè perpenderit Galenus, eas integras suis medicamentis semper admiscuit; ut facili attestantur quæ libro xi. de simp. medicament. facultatibus memorie prodidit, sic inquiens. Veruntamen sufficientem habemus de cantharidibus experientiam, quod in ungues psorodes cum uocis ceratis, aut emplastris impositæ, sic illos educunt, ut toti cadant. Miscuimus eas etiam facultatibus pforis, et lepro congruentibus.

congruentibus, necnon quibusdam septis, atq; interim etiam ijs quæ clauos, quos uocant, eijciunt. Porro præceptum meorum quidam earum paulum quiddam in medicamenta urinam cientia iniiciebat. At quidam solas alas, et pedes iniiciunt, quæ autem esse alexiteria ijs, qui corpora ipsorum bibissent. Alij contrâ. At nos totas indimus. Ceterum aptiores sunt ad ea, quæ expertum me dixi, eæ cantharidum, quæ inuenta in frumento, lutea transuersim in alis cingula obtinent, potissimum si iniiciantur in uas fictile nouum, deinde ori uasis linteum obductum sit rarum, et uas ita teneas inuersum, ut linteum, quod cantharidibus subest, uaporem ab aceto sursum elatum excipiat, donec emoriantur ipse cantharides. Et de buprestibus agens, ita subdit. Sic Buprestes quoq; reponere expedit. Sunt autem et ipsæ animalis quoddam genus cantharidibus tum specie, tum uiribus adsimile. Mox de pinorum crucis: Quin et cruce (inquît) quæ in pinis nascuntur, meritò nuncupatæ ptyocampæ, huius sunt facultatis.

## Σαλαμάνδρα. SALAMANDRA. Olm. CAP. LVI

**SALAMANDRA** lacertæ genus est, iners, uarium, quod frustra creditum est, ignibus non uri. Vim habet erodentem, calfactoriam, exulcerantem. Additur, ut cantharis, in medicamentis, quorum uis est exesse, & lepras abolere: similique modo reconditur. Liquefacta in oleo pilos euellit. Exenterata, detractis pedibus, & capite, in melle seruatur ad eundem usum.



**SALAMANDRAE** in agro Tridentino copiose inueniuntur, Ananienſi præſertim ualle, iuxta ſemitas, et in opacis, uliginosisq; locis. Incipiunt enim apparere uerno tempore, atq; etiam autumnò, cælo maxime pluuiò. Sed æſtate ob ſolis ſeruores; itemq; hyeme ob urgentiſſima frigora, ſuis è latebris non exeunt. Salamandra corporis magnitudine, formaq; lacerto ſimilis eſt; uerum capitis, ac uentris craſſitudine excellit, breuiore tamen conſtat cauda. Illa eſt altioribus nitatur cruribus; ad greſſum tamen ignauior eſt, hic uerò contrâ agilis, celerq; conſpicitur. Color illi niger, luteis non minimis infectus maculis, quadam læuitate pellucidus. Viſu Salamandræ horribiles, atque abominande ſunt, ita ut facile eorum aſpectus hominibus nauſeam pariat. De hac diſſerens Plinius libro x. cap. lxxvii. ſic inquit. Salamandra animal lacerti figura ſtellatum, nunquam niſi magnis imbribus prouenit, et ſerenitate deficit. Huic tantus rigor, ut ignem tactu extinguat, non alio modo, quàm glacies. Quod quidem facit prunis ſuperpoſita, non ſecus atque ceteræ animalium carnes, quæ prunis aſſandæ traduntur. Veruntamen in medium magni ignis, ubi flamma ualentius agit, uel in fornacem proiecta, ſtatim comburitur. Vanum eſt ergo credere (ut etiam Dioscorides inquit) igne eam minime abſumi poſſe, eoq; uictitare, ut chamæleon aëre: quandoquidem ſacto periculo igne exuſtam breuè Salamandram uidimus. Quo fit, ut ſcripſerit Galenus lib. iiii. de temperamentis, Salamandræ ad certum uſq; temporis ſpatium ab igne nihil pati: uri tamen, ſi ea longius igni ſit admota. Quod poſtea effecit, ut explicare neſciam, quo argumento, quæ ratione prodiderit Ariſtoteles lib. v. capite xix. de hiſtoria animalium, Salamandræ igne maxime comburi, ſed per illum inambulans flammæ, et prunas extingui: cum contrarium experientia facile probari poſſit. Illud præterea mihi dubium eſt, an idem eodem capite uera retulerit, cum aſſerit in Cypro inſula ætarijs fornacibus, ubi chalcites lapis ingeſtus compluribus diebus crematur, in medio igne exoriri pennatas beſtiolas, paulo muſcis grandibus maiores: quæ per ignem ſaliant, atque ambulent, anotoq; igne ſtatim emoriantur. Quippe eadè maxime id naturæ operis repugnet. Adde etiam quod ſi hæc uera eſſent, ea nunquam reticuiſſet Galenus, qui diuertiſſimè omnia Cypro metalla inueſtigauit, ac nouit, pariterq; metallorum fornaces, cum fuerit ipſe harum metallorum rerum accuratiſſimus indagator. Vidi ego in Germania æarias complures fornaces, à quibus utranque catinam, pompholygem, ſpodium, æris florem, et alia mecum retuli; ſed muſcas per ignem obambulantes mihi nunquam uidere licuit. Qua in re neſciuerim, quoniam pacto Ariſtoteles ſeruari poſſit. Niſi dixerimus, ipſum hoc in loco non ſuam, ſed aliorum hiſtoriam recensere. Sed de his hætenus. Ceterum Salamandræ nihil gignunt (ut Plinius tradit) neq; eſt in eis genus maſculinum, ſemineumue. Nascuntur enim ex putri quodam humore terre. Moſſu uenerunt inferunt, ſerpentium modo. Quinetiam fructus, et herbas quadam oris ſaliua ueneno inficiunt, maxima deguſtantium

Salamandræ conſideratio.

Vana opinio.


Ariſtot. vanæ opiniones.

Salamandra  
aquatica.

stantium iactura. quandoquidem non pauci reperti sunt, qui hoc ueneno interiere. Est & Salamandra aquatica genus Vtinentibus frequentissimum, capite terrestribus breuiore rotundiorq; cauda anguillarum modo, nigro dorso, uentre autem rufescente, luteis maculis resperso, horrendo aspectu, æque atque terrestre.

Αράχνη. ARANEVS. Spin. CAP. LVII.

ARANEVS, quem holcum, alij lycon, id est lupum vocant, subactus cum splenio, & lintillitus, prolatusque vtrisque temporibus, aut fronti, tertianos circuitus perfanat. Tela eius imposita sanguinem sistit: vulnera, quæ summam cutem occuparunt, ab inflammationis iniuria vincat. Est & alterum aranei genus, qui candidam, tenuem, densamque telam orditur. quem in alta ligatum, & lacerto appensum, quartanis circuitibus mederi narrant. Decoctus ex rosaceo, & infusus, aurium doloribus auxiliatur.



Araneorum,  
& phalangio-  
rum genera.

ARANEORVM, & phalangiorum (ut libro ix. cap. xxxix. de historia animalium scribit Aristoteles) phalangia sunt genera. Mordax, quod in duo distinguitur: alterum simile ijs, quæ lupos appellant, est paruum, uarium, praecax, salax, pulex nuncupatum. Alterum maius, coloris nigri, cruribus prioribus nigris, tardum, & lente actans, nec uiribus ualens, neq; saliens. Cetera, quæ medicamentarij proponunt, aut nullum, aut certe exilium inferunt. Genus secundum, quod lupi nomen accepit, partim exiguum est, quod non textit: partim maius, quod aspera, paruaq; telam apud terram, aut sepes orditur, bucculis intexere solitum promordijs intus positus obseruatur, tam aliquid in tela offendens commouerit, mox accurrit, ut capiat: partim uarium est, quod paucam uilemque telam sub arboribus facit. Tertium genus, quod sapientissimum, lautissimumq; omnium est, nostris edificijs latissimas coarctas telas. Huius, ut equidem arbitror, hic meminit Dioscorides. Plinius araneos, qui ictu, uel morfu uenenum inferret, phalangia nominat, quorum historiam libro xxix. cap. 1111. diffusius enarrauit his uerbis. Phalangium est uile ignotum, & plurium generum. Vnum simile formicæ, sed multo maius, rufo capite, reliqua parte corporis nigra, albis intercurrentibus respersum guttis. Acerbior huius, quam uestre ictus. Viuit maxime circa furnos, & mols. Aequè phalangion Græci uocant inter genera araneorum, sed distinguunt lupi nomine. Tertium genus est eodem phalangij nomine araneus, lanuginosus, grandissimo capite. Quo dissecto inueniri dicuntur intus uermiculi duo, quasi ceruina pelle conclusi, & mulieribus adalligati ante solis ortum, præstant, ne concipiant. Vocatur & rhagion, nigro similis, ore minimo sub aluo, pedibus breuissimis, tanquam imperfectis. Dolor à morfu eius, qualis à scorpiione. Urina similis araneis textis. Idem erat astertion, nisi distingueretur uirgulis albis. Huius morfu genua labefaciunt. Peior utroq; est ceruleus, lanugine nigra, caliginem concitans, & uomitus araneosus: etiānum deterior, ac atrore penna tantum differens. hic & ad maciem perducit. Myrmecion capite formicæ similis, aluo nigra, guttis albis digressuentibus. uestrum dolore torquet. Tetragnathij duo genera habent: peior medium caput distinguente linea alba, & transuersum altera. hic oris tumorem facit. At cinereus posteriori parte candicans, lentior. Minime autem noxius, eodē colore, qui telas muscis in parietibus latissime pandit. Hactenus de araneis, & phalangijs Plinius. Cui scribens Aëtius lib. xiii. cap. xviii. Phalangiorum genera, inquit, plura sunt. Quæ uero apud eos, qui de noxijs bestiis scripserunt, referuntur, ut plurimum sex numero existunt. Vnum quidem ex eis rhagium, alterum lupum, tertium formicarium, quartum cranocolaptes, quintum sclerocephalon, sextum scolecion appellatum. Ac primum quidem rhagium, id est acineum, figura rotundum est, colore uero nigrum, acini uix nigra similitudine, unde etiam appellationem accepit: & os quidem iuxta medium uentrem habet, pedes uero ex utraq; parte quā breuissimos. Alter uero lupus appellatus, muscas perdit, eisq; pascitur: ac corpus quidem habet latum, ac uolubile, partes uero circa ceruicem incisæ sunt: amplius autem, & os eius eminentias tres habet. Tertium autem myrmecium, hoc est, formicarium dictum, quod formicis maxime asomiletur, colore est fuliginosum: corpus uero eius uelut astris quibusdam insignitum, præsertim circa dorsum. Quartum deinde cranocolaptes, oblongum est, & uiride, stimulumq; iuxta collum ha-

Phalangiorum  
genera ex Aë-  
t. 10.

bet, atq; si in aliquem irruat, locos circa caput petit. Quintum sclerocephalum dictum, caput habet sexceum, & obdura-  
 tum: lineamenta uero per omne corpus similia animalibus illis, quæ lucernas noctu circumuolitant. Sextum postremo sco-  
 lectum, siue uermicarium appellatum, sublongum est, & submaculosum, maxime circa caput. Atq; hæc quidem spe-  
 cies phalangiorum enumerantur. Hæc de phalangijs Aëtius. Ego autem asserere non dubitauerim, omnia hæc pha-  
 langiorum genera haberi in Italia: quippe quæ à me sæpius sint uisa. quanquam scribat Plinius, phalangia in Italia  
 non oriri. Quin potius præter prædicta genera, inibi & alterum reperitur omnium perniciosissimum, quod à Ta-  
 ranto Apulie ciuitate, ubi immensa æstate tota uagantur in campis, Tarantulam appellant. Icti uero ab his uariè, ac  
 diuersè torquentur: siquidem alij perpetuò canūt, alij rident, alij plorant, alij clamitant, alij dormiunt, alij uigilijs af-  
 ficiuntur, pleriq; uomitionibus laborant, nonnulli saltant, sunt qui sudant, alij tremebundi fiunt, quidam paoribus in-  
 festantur, & alij alia patiuntur incōmoda, fiuntq; phreneticis, lymphaticis, ac maniacis similes. Quæ quidem sympto-  
 mata tam uaria, ac diuersa non aliunde provenire dicendum est, quàm aut ex uario horum animalium ueneno, aut ex  
 demorforum hominum temperamenti. Nam atra bile tentatis, pro eorū temperaturis omnia hæc accidisse conspexi-  
 mus: tamen si nō desint, qui putent Tarantule uenenum dictum, uel horatim immutari, fieriq; ob hoc, ut tam uarijs sym-  
 ptomatibus uexentur, qui ab ea iciuntur. Habentur Tarantule etiānum in maritimis nostris Senensibus Tyrreno-  
 liori adiacentibus, & Romano agro frequentes: ueruntamen non perinde ac in Apulia numeroe. Degunt hæc inter  
 segetes in quibusdam terræ cauernulis, è quibus interdū exeuntes, sæpe eos messores iciunt, qui huius infidie ignari,  
 cuncta ocreis non munierunt. Ictos uidi ego nonnunquam in plateis iacentes, & in xenodochijs, qui prædictis affecti-  
 bus torquebantur. Sed mirum certè, quàm facile huiusce ueneni uis musica mulceatur. Quandoquidem (ut equidem  
 attestari possum) auditis lyricis instrumentis, uel tibiæ sono, primo statim occursum isti à Tarantula à languoribus  
 cessant, & in medium tripudare, & saltare incipiunt, tanq; diu rem prosequuntur, ac si sani essent, & nullo unquam  
 tenerentur dolore. Quod si eueniat, ut tibicines tantillum conquiescant, ac interponant, non multo post tempore in  
 terram concidunt, & ad pristinos redeunt languores: nisi tandū indeficiente sonitu saliant, atq; tripudiant, donec ue-  
 neni uirus, partim insensibiliter per cutis meatus, partim per sudorem exeat, & discutiatur. Ob id igitur tibicines sti-  
 pendio conducuntur, alternatimq; mutantur, ut absq; ulla sonitus intermissione, tandū tripudiant demorfi, quousq; pe-  
 nitus curati quiescant: cū tamen, dum hæc aguntur, sint, qui antidotis eos corroborent, nimirum theriaca, mitri-  
 datico, ac alijs, quæ uenenosorum morsibus aduersantur.


Tarantule  
consideratio.Tarantule re-  
medium.

Σελυπα.

LACERTA.

CAP. LVIII.

LACERTAE caput intritum, & appositum, aculeos, & omnia corpori infixā extrahit: ua-  
 ros, formicantes uerrucas, & penfiles, quas acrochordonas uocant, tollit. Iecur exesis dentibus  
 coniectum dolores finit. Si diuulsa admoueat, ictis à scorpione leuamentum præstat.




Σελ. SEPS.

CAP. LIX.

SEPS, quam aliqui lacertam chalcidicam uocant, in uino pota, morfus suos sanat.

LACERTAE, quæ ubiq; uulgares oberrant, oua quemadmodum serpentes pariunt, & cochleis maxime  
 infidantur. In Arabia (ut Plinius est autor) cubitalē æquant mensuram: & in Mauritania, autore Strabone, bica-  
 biles reperuntur: in India uero Nisa monte, si Plinio credimus, ad xxiiii. pedum longitudinem lacerti reperim-  
 tur, colore fului, aut punicei, aut cerulei. Est & Insula Capraria lacertis maximis referta, ut referunt, qui ad for-  
 tunatas nauigarunt insulas. Ceterum, quæ Chalcidice uocantur, in Libya, & Cypro copiose provenientes, non  
 habentur in Italia. Morantur hæc plerumque in locis aridis, & inter saxa. Varia est harum hystoria apud autores:  
 nam quidam nostratibus lacertis similes ipsas fecere, quidam uero inter serpentium genera recensent. Nicander Dio-  
 scoridi

Lacertarum  
consideratio.Chalcidica-  
consideratio.




Terrantola.

scoridi subscribit : quippe qui in theriacis suis dicat . Vitabis et Sepem corpore humilibus lacertis similem . Verum tamen Aëtius lib. XIII. Sepem inter mortiferos recolit angues, sic inquit . Serpens, qui Seps appellatur, longitudinem quidem duorum cubitorum reperitur, ex crasso autem in tenuem abit : recta uero, ac tardè proserpit . Caput habet latum, os acutum, uniuersum autem corpus multis albis notis respersum . Caterum ij, qui ab eo percussi sunt, intra tres, aut quatuor dies pereunt . hæc Aëtius . Pausanias porro aliter sentire uidetur : inquit enim . Aegyptum Artaxia quondam regem in uenatione occupatum, et imprudentem Seps oppresit : Vipera similis est minime, cineris colore, maculis ex interuallo uariis, lato capite, angusta ceruice, aluo maiori, cauda breui, obliquo incessu, quasi cæcer, quod et cæcæ serpenti proprium est . Quamobrem credendum putauerim, aut fabulosam esse lacertæ Chalcidicæ historiam, aut pluribus hoc nomen conuenire serpentibus . Verum minime reticendum duximus, reperiri in Hebrutria, in Romano agro, ac etiam in Apulia quoddam lacertarium genus Terrantola uulgò dictum, quoniam sub terra delitescat . Que cum homines morsu perinat, fecit, ut metum quandoq; cogitauerim, an ea fortassis Nicandrus, et Dioscoridi Chalcidica esset lacerta : aut Stellio, quod stellis maculata, insignitaq; cernatur . Sed hæc libro sexto, et Deo, latius explicabimus, ubi de his, quæ morsu, uel ictu uenenum emittunt, sermonem faciemus .

Scincos. SCINCUS. Crocodil.

CAP. LX.

SCINCUS aut Aegypti, aut Indiæ, aut rubri maris alumnus, quanuis inueniatur in Lydia Mauritaniz . Est autem terrestris crocodilus, sui generis, sale inueteratus cum nasturtio . Auiunt carnes, quæ renes amplectantur, id sibi iurium uendicasse, ut si drachmæ pondere bibantur, uenerem accendant . Verum decocto lentis cum melle, aut semine lactucæ cum aqua potu, ueneris cupiditates inhihentur . additur in antidota,



Scinci consideratio.

TAMETSI scribat Dioscorides, Scincum esse terrestrem crocodilum, sui generis ; aquaticum tamen animal est . Quandoquidem qui Venetias importantur, in mari rubro, et in Aegypto Nilo flumine capiuntur . Hi quanuis feræ crocodilos referant ; magnitudinem tamen longè minorem habent : namque qui ad summum adoleuerunt, nostri atres lætas magnitudine non excedunt . Squamis uestiuntur subluteis, cæsa à capite ad caudam discurrente linea . At non



- celum crocodilis tunica*: quippe qui nigro natura sunt dorso. Pausanias in Libya bicubitales reperiri Scincos tradit: ueruntamen ij ad nos non deferuntur. Sunt in agro Vicentino lacus quidam, qui Scincos etiam gignunt, sed minutulos, ac nigricantes, quibus sepius utuntur seplasiarij deficientibus marinis, nō sine magno fortasse hominum discrimine. Reprōbat hos Fuchsius quoq; libro primo de compositione medicamentorum, sic inquit. Scincus animal est in aquis degens, lacerte magnę simile, sed uentricosius: cauda lata, ut anguilla, ad natandum apta. Quapropter quos officinę subijciunt, cum duabus caudis, ueri non sunt, sed ex Vicentino agro allati. hæc ille. Qui tamen dū eliorum errorem merito damnat, ipse (pace uiri alioquin clarissimi dixerim) in alterum non minorem mihi quidem incidisse uidetur, quod existimauerit, legitimum Scincum, cuius effigiem damus, regi lata cauda ad natandum, anguille modo. Quandoquidem Fuchsi Scincus, quo Foro iulienfis ager, et quę circum Vtinum ciuitatem stagnantes sunt aque, maxime scatent, et sui lacerte magnę corpus, tumidus uenter, ac maculis uariis, rotundum quadantenus caput, anguille cauda, nigraque dorsum est, Scincus uerus non est: sed potius animal salamandrę generi adscribendum, quod terrestrem salamandram non paucioribus referat notis, quā aquatiles testudines terrestres representant. ob id ita quę recte Vtinienses hoc animal Salamandram aquaticam uocant, abhorrentq; maxime, quod inter uenenata omnino reputent. Huic sanē cion Aegypto scinco nulla est cognatio: quippe Aegyptius capite constat longo, dorso quadantenus elato: uentre lacerta non maiore: corio squamis sublucis, numerosis, minimisq; in uniuersum referto: cauda lacerte modo tereti, breuiore tamen: caesiāq; à capite ad caudam discurrente lineā. Talis nimirū Scincus est, qui quotannis ab Alexandria Aegypti Venetias numerosus conuehitur. Scincorum meminit Plinius libro xxviii. capite viii. ubi ita scribit. Ex chamæleontis similitudine est Scincus, quem quidam terrestrem crocodilum esse dixerunt: candidiore autem, et tenuiore cute. Præcipua tamen differentia dignoscitur à crocodilo aquatico squamarum seta à cauda ad caput uersa. Maximus Indicus, deinde Arabicus. Afferuntur falsi. Rostrum eius, et pedes in uino albo positi, cupiditates ueneris accendunt. Vtiq; cum satyrio, et cruce semine singulis drachmis omnium, ac piperis duabus admixtis, ita ut pastilli singulorum drachmarum bibantur. Per se laterum carnes obolis binis cum myrrha, et pipere pari modo potę efficaciores ad idem creduntur. Prodest et contra sagittarium uenena, antē, posteaq; simptus. In antidota quoq; nobilia additur. hæc Plinius. Porro CROCODYLVS (ut refert Aristoteles in libris de historia, et partibus animalium) animal est magnum, ad quindecim usque cubita crescens: quanuis ad duodeviginti scripserit Plinius. Hic animal non parit, sed ouum asferini magnitudinem non excedens: idq; in terra, non autem in aquis. Parit cion plurimum sexaginta, iauitq; diu, maximūq; animal minima hac origine euadit: nanq; fœtus ex ouo exclusus proportionē respondet, lacertorum magnitudinem æquans. Linguam adeo indiscretam habet, ut omnino ea carere uideatur. Cuius rei causa est, quod idem et terrestris, et aquatilis quodammodo est. Ergo ut terrestris, locum obtinet lingue, ut uerō aquaticus elinguis. Pisces enim aut nullam habere linguam uidentur, nisi ualde resupinentur, aut inexplantati habent. Solus inter cetera superiorem mouet mandibulam, minimēq; inferiorem. causa est, quod pedes ad capiendum, retinendumq; inutiles habet. Oculi crocodilo suilli, dentes exerti, et unguis in pedibus acutissimi, coriumq; durissimum, telis, ac sagittis minimē cedens. Interdum plerumq; terram incolit, noctu uerō aquis se mergit, innatatq; fluuimine. Duo eius esse genera Plinius est autor loco citato. Vnum maius, de quo diximus: alterū minus illi simile, multum infra magnitudinem, in terra tantum, odoratissimisq; floribus uiuit. Ob id intestina eius diligenter exquiruntur, iucundo nidore fœta. Crocodileam uocant, oculorum utiq; utilissimam, cum porri succo inunctam, et contra suffusiones, uel caligines. Illi quoque ex oleo cyprino molestias in facie enascētes tollit. Ex aqua uerō morbos omnes, quorum natura serpit in facie, autoremq; reddit. Lentigines tollit, ac uaros, omnesq; maculas. Et contra comitiales morbos bibitur ex aceto mulso binis obolis. Felle inunctis oculis contra suffusiones nihil utilius prædicant. Maioris dentes è dextra maxilla adalligati dextro lacerto (si credimus) coitus stimulant. Corij utriusq; cinis, ex aceto illitus his partibus, quas secari opus sit, aut nidor cremati, sensum omnem scalpelli aufert. Sanguis utriusq; claritatem uisus iniectis donat, et cicatrices oculorum emendat. Cor annexum in lana ouis nigre, cui nullus alius color incurfauerit, et primo partu genitę, quartanas abigere dicitur. Corpus ipsum, excepto capite pedibusq;, elixum manditur ischiadicis. hæc Plinius. Veruntamen quę is alterius intestinis assignauit, ea Dioscoridem fimo tribuisse constat. Ceterum cion Scincus Chamæleontem, cuius formam refert, mihi in mentem reuocauerit, ueniatq; et ipse in medicum usum, non ab re fore duxi, eius tum historiam, tum etiam facultates enarrare. CHAMÆLEON igitur (ut Aristoteles memorię prodidit libro ii. cap. xi. de historia animalium) figura totius corporis lacertam planē representat. Latera deorsum ducta uentri iunguntur, ut piscibus: et spina modo piscium eminet. Rostrum simie porcarię simillimum: cauda prælonga in tenue desinens, et longis implicata in se orbibus. Elatior à terra est, quā lacerta. Pedes singuli bipartiti secantur, partesq; talem inter se habent situm, qualem pollex ad manus, reliquam partem obiectam. Sed ipse etiam reliquę partes paulotenus in digitos quosdam finduntur, aduncis unguiculis. Corpus asperum totum, ut crocodilo. Mutat suam colorem inflatus. Omnium ouiperorum tenuissimus est: quippe qui omnium maxime inopia sanguinis rigeat. Causa ad mores animę eius referenda est: præ nimio nanq; metu multiformis efficitur. Motus ei piger admodum, ut testudinis. pallescit cion moritur, defunctusq; colorem eundem seruat. Subit cauernas, et latitat more lacertarum. Caput eius, et guttur si quernis accendatur lignis, imbrum, et tonitruum concursus facere Democritus narrat. Item iecur in tegulis ustum. Dextro oculo, si uiuenti eruatur, albugines oculorum cum lacte caprino tollit. Lingua adalligata, pericula puerperij adimi. Linguam, si uiuenti exempta sit, ad iudiciorum euentus poltere dicunt. Item dextram maxillam ad formidines, pauoresq; corpore uerō illito detrahi pilos: et felle glaucomata, et suffusiones corrigi.

Scinci Vicentini.

Fuchsi error.

Crocodili historia.

Crocodili genera, &amp; uires.

Chamæleontis historia.

Chamæleontis uires.

## Γῆς ἔντερος... TERRENI VERMES. CAP. LXL

*Rhynchomys*

TERRENI vermes impositi, præcisos nervos glutinant: tertianas discutunt. Decocti cum anserino adipe, infusi, affectis auribus medentur: cum oleo autem decocti, si in contrariam rem instillentur, dentium doloribus præstant auxilium. Triti in potu ex passo urinam ciunt.

Terrenorum  
vermium, & eo-  
rum olei vires.

TERRENI vermes etiam in medicum usum veniunt. quandoquidem oleo incoquantur ad articulorum nervorumque cruciatus. Verum tamen aberrant plerumque myropole in olei conficiendi ratione. Imponunt enim vermiculos in æneum cacabum, et affuso inde oleo igni servesciunt: quo fit, ut parvo momento ipsi non modo inassentur, sed penitus comburantur, nullo in oleo humore relicto. Fit autem rectius, cum vase vitreo excipiuntur, et diutius calore balnei mariantur, oleo innatantes: namque hoc modo eorum succus elicitur, comburique nequeunt. Præstat hoc oleum ita paratum, præsertim si vermes rosaceo macerentur, ad podagricorum dolores, à calidis defluxionibus provenientes, inunctis prius locis dolentibus oleo, ac mox superpositis vermibus in eo elixis, tustis, admistisque cum æquali cerati pondere, quod tripharmacum vocant, ex argenti spuma, oleo, et aceto conflatum. Quibus etiam commendavit Plin. lib. xxx. cap. ix. psorum vermium cinerem cum melle triduo emplastri more impositum. Quin et ipsos vermes in oleo veteri elixos, et superpositos. Ad hæc terrestres vermes prius vino albo eloti, ac per se absque oleo vase vitreo excepti, operculato vase ore, ne quid expirare possit, in balneum calentis aque immerguntur, tandumque effervescentia permittuntur, donec in liquorem oleo similem vertantur. Præferunt quidam hoc, quod maxime præstet nervorum, et intestinorum vulneribus glutinandis. Quod longe efficacius efficit, si factitio balsamo, de quo libro primo diximus, fuerit admixtum: at oleo, quod vitreis organis è larigna, siue abiegna lacryma elicitur. Namque his additis universa corporis recens vulnera brevi tempore glutinat, ipsi exceptis, quæ capiti inferuntur. Dantur utiliter terreni vermiculi igne cremati, et in pulverem contriti felle suffusis, ex marrubij, vel absinthij decocto: addunturque in electuarijs ad idem peratis, ut Galenus docuit libro de theriaca ad Pisonem. Triti, ac rosaceo subacti (ut idem auctor est) podagricorum inflammationes extinguunt.

## Μυογᾶλα. MVS ARANEVS. CAP. LXII

MVS araneus dissectus, & impositus, sui morfus veneficia luit.



Aranei muris  
consideratio.


ARANEVS mus (ut Aëtius inquit) colore quidem mustela similis est, magnitudine autem muri. Os vero sublongum habet, et exiguum caudam. Dentes ei tenues, duplici ordine enati, in utraque maxilla: quo fit, ut quatuor dentium ordines habeat. Meminit huiusce in theriacis Nicander, dixitque perire in rotarum orbita, si progrediens in eam incidere rit. Quod tamen fabulosum, poeticonque censemus: tametsi non desint, qui terra è plaustrorum rotis excussa, transire succurrant morfibus. Scribit Plinius libro viii. hos ultra Apenninum non haberi, cum tamen hoc ævo in universa reperiantur Italia. In Ananienfibus montibus, Tridentino agro frequentes visuntur. Nihilominus incolæ inter venenata non habent: id quod fortassis et celi, et solis temperamento evenit. Siquidem nec scorpiones ibidem exortum venenum relinquunt, ut in eorum mentione superius diximus.

## Μύες. MVRES. CAP. LXIII

MVRES, qui in domibus oberrant, concisos scorpionum plagis utilissimè imponi, inconfesso est. Si inassatos infantes ederint, oris salivam exiccare promittunt.

Murium con-  
sideratio.

MVRES diuersorum sunt generum: siquidem domestici, sylvestres, ac montani reperiuntur: sunt etiam aquatiles marini. Verum primum de ijs differentes, qui nostris in domibus oberrant, quique etiam in agris in magnæ segetum perniciem morantur, Aristotelis verba referam, qui libro vi. de historia animalium cap. ultimo sic habet.



- 20 riam generatio mirabilis præter cætera animalia, maiorem in modum est, tum numero, tum celeritate. Iam enim formi-  
as prægnante in uase miliario aliquando occupata, paulò post reſerato uase, musculi numero uiginti et centum reper-  
ti ſunt. Mirum etiam percipimus ortum redundantis agrestis muriũ generis: Locis enim compluribus agri, tam inau-  
dito modo oriri ſolent, ut parum ex uniuerſo frumenti relinquatur: tam cito abſumitur, ut nonnulli mediocres agrico-  
le, cum pridie metendum ſtatuierint, poſtridie mane cum meſſoribus accedentes ad ſegetem, abſumptam inueniant to-  
tam. Interitus autem minime euenit ratione: paucis enim diebus omnino abolentur: quanquam ſuperiore tempore  
homines uincere, uel ſuffiendo, uel ſues, ut latibula effoderent, admittendo, non poſſent. Quinetiam uulpes eos uenatu-  
tur, & cati ſylueſtres in primis: ſed tamen ſuperare copiam, & celeritatem prouentus nequeunt. Nec aliud quicquã  
omnium uincit, niſi imbres: ijs enim quàm primum intereũt. Terra Perſicæ parte quadam mure ſcemina reſciſſa, ſœ-  
tus ſormini prægnantes comperiuntur. Sunt qui uehemẽter confirmant, Mures, ſi ſalem lambant, impleri ſine coitu.
- 30 Aegyptijs muribus prædurus, ſerè ut erinaceis, pilus eſt. . . Habentur in murium genere & Glires. Idcirco (ut Pli-  
nius auctor eſt lib. xxxvi. capite primo) apud Romanos cenſorie extabant leges, Glires in cœnis apponi uetantes. Gliriũ confi-  
deratio.  
Verum hoc æuo ganeonibus maxime expetuntur in cibis, non modicã palato iniuriam fieri putantes, ſi tam pingui pri-  
uetur alimento. Sed ij minime perpendunt, uel potius negligunt, quòd glires pinguedinis exuberantia uentriculi appe-  
tentiam deſtruant, lentum ac frigidum gignant ſuccum, concoctũque contumaces exiſtãt. Notatum non congregari gli-  
res, niſi populares eiſdem ſyluæ, & ſi miſceantur alienigenæ, amne, uel monte diſcreti, interire dimicando. Genitores  
ſuos ſeſſos ſeneſta alunt inſigni pietate. Seruam finitur hyberna quiete. Conditi enim & hi cubant, rursus æſtate iuue-  
neſcunt. Montibus Goritiensĩ agro conterminis, & in Carnioliæ, Carinthiæ, ac Stiriæ alpinis ſyluis maxima eſt horum  
quandoque ſortura. Quo fit, ut numeroſi à uenatoribus capiuntur, præſertim cum fagina glande abundat ſyluæ. Excũt  
ænum nocte, & arbores ſufficientes, in quibus ſtabulantur, ſic eos ſtupefactos innumeros capiunt, adeò ut ijs repletis
- 40 ſaccis domum plerumque redeant, quos poſtea excoriant, & impoſitos præ nimia copia cadis ſale, & muria aſſeruant,  
quemadmodum piſces. . . Horum caro ijs utiliter eſtur, qui canina laborant fame: nanque exuberante pinguedine ob-  
tunditur appetentia, & tollitur morbus. Diſcoquitur Glires caro detracta pelle, & in teſtibus exemptis melle in fictili  
nouo, addito nardo ad tertias, atque ita aſſeruat, quòd coſtet deplorata aurium uitia eo remedio ſanari. Porro mō-  
tani mures cuniculos magnitudine æquant, ac etiam nonnunquam ſuperant, cruribus non uſque adeò longis. Capite le-  
porem reſeruit: uerum tam breuibus auribus ſunt, ut uix ſupra pilos appareant. Pilo uestiuntur uario taſſi modo, ob-  
longo. Breuem habent caudam, & pedes acutis unguitibus armatos. Hyeme admodum pingueſcunt, et obeſi fiunt, ita ut  
aliquando monſtruosè intumeſcant. Hi Ananiensibus, Phœbeisq; montibus, in Tridentino agro frequentes habentur,  
uocaturq; uulgò corrupto uocabulo Marmontane, quaſi Mures montanos dixerint. Eriguntur ſæpius uſi modo, an-  
terioribus pedibus ueluti manibus, cibum ori miniſtrantes. Dentes anteriores quatuor habent leporis inſtar, ſed lon-  
giores, atque acutiores, quibus ſauiffime mordent. Sed mirum eſt (ego enim qui periculum feci, id certo teſtari poſſum)  
quòd ſi acutis ſorciſibus ſecentur, una tantum nocte renaſcuntur. Domi retenti ſi iuuenes ſint, exuta quadatenuſ ſeri-  
tate muſceſcunt, ſed uenſilibus damnum inferunt: quippe qui omnia, quibus obuiant, erodant, & deſtruant. Hyeme deli-  
teſcunt, ſeno ac paleis, in aceruum congeſtis plerumque ſe condentes. Dormiunt integris menſibus, quemadmodum &  
glires. In montibus uiuunt. Stramẽta in cauernas comportant, quibus à frigore ſe tueantur. Exterreſ facti acutiſſi-  
me uoſiferantur, ac ſibilant, & ad tumultus conſugunt. Horum carnes ſylueſtri, & graui quodam odore adeò ſpirant,  
ut quibusdam nauſeam moueant. Quo fit, ut ſale, & muria aſſeruat, tum odoris grauitatem, tum etiam exuperantem  
blanditiã ob pinguedinis copiam exuant: cum tamen tam recentes, quàm ſale conditi concoctu admodum contu-  
maces exiſtant, uentriculo laborem inferant, corpusq; uniuerſum excalfaciant. Horum pinguedo medicis expetitur,  
quòd contractos molliat & reſtituat neruos. Murium ſtercus (ut in libro de theriaca ad Piſorem legitur) aceto ſub-  
actum, capillis deſluentibus utiliter illinitur. Quinetiam per ſe potum, uſicæ lapidem conminuit.

Γάλα.

L A C.

M A T T H I O L I

C A P.

L X I I I.

**L A C** generatim omne boni succi est, corpus alit, aluum emollit: stomachum, & intestina: inflatione uexat. Venum tamen dilutius æstiuo habetur, & è uiridi pabulo aluum magis emollit. Probatum autem candidum, æquali crassitudine, quod ungui instillatum cogitur. Aluum minus tentat caprinum: quoniam pecus hoc adstringentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondibus, & terebintho magna ex parte uescitur: inde stomacho accommodatissimum reddi solet. Ouillum autem dulce, crassum, & præpingue: non autem usque adeo utile stomacho. Bubulum tamen, asininum, & equinum, uentri magis idonea: sed ipsum turbant. Quibus in locis pecora, scammoniam, ueratrum, clematidem, aut mercurialem pascuntur, lac omne uentrem, & stomachum subuertit: quale in Iustinis montibus esse, à nobis proditum est. Siquidem capræ, quibus candidum ueratrum pabulo fuerit, primo foliorum partu euomunt: & eorum lac haustum nauisam creæ, & stomachum in uomitiones effundit. Ventrem adstringit lac omne decoctum, præcipueque cædentibus calculis marinis exustum. Et in summa, omnibus auxiliatur internis exulcerationibus; præsertim faucium, pulmonis, interaneorum, uesicæ, & renum: foris uero contra pruritus cutis, eruptiones papularum, & uitiatos corporis succos, recens cum melle crudo, addito sale, datur æguæ aqua dilutum. Minus inflat quodcumque semel feruefactum. Decoctum cum calculis marinis ad dimidias, ulcerosas uentris fluxiones adiuuat. Lac quodcumque serum continet implicitum, quod ubi discessit à lacte, multo potentius ad purgationes redditur. Datur quibus sine acrimonia uolumus deiectionem moliri, ut melancholicis, comitialibus, lepris, elephantijs, & erumpentibus toto corpore papulis. Ex omni lacte fit, quod schiston, id est scissile, appellant. Lac autem scissile nouo feruet, ramoque ficulneo recenti mouetur, insparsis, postquam bis, aut ter effuerit, totidem acetis mulsi cyathis, quot sunt heminae lactis: ita enim ferescens liquidum ab eo diuiditur, quod in caseo concreuit. Sed cum feruet, ne superfundatur, conueniet spongia ex frigida continuo scissilis labrum detergere, sextariumque argenteum frigidæ aquæ plenum demittere. Bibitur heminis per interualla singulis, usque ad quinas, ita ut intercedentibus spatijs, potantes ambulent. Lac autem recens efficax est contra rosiones, uisionesque, ab exitiis medicamentis factas: uti à cantharidibus, aut salamandra, bupreste, aut pinorum eruca; hyoscyamo, dorycnio, aconito, aut ephemero: præsertim bubulum ad id eximie confert. gargarizatur autem exulceratis faucibus, tonsillisque. Asininum peculiariter collutos dentes, gingiuasque stabilis. Fluxiones alui, & ulcera sentiantur, tenesmosque, ouillum; bubulum, aut caprinum, cum marinis lapillis decoctum, sistit: per se autem, & cum hordeacea ptisana, aut halicaceo cremore infusum magnopere internorum rosiones mitigat: exulceratæ vuluæ immittitur. Humanum lac dulcissimum est, & maxime alit: mammis autem exuctum, prodest tibi, & stomachi rosionibus: contra haustum leporem marinum præsidio est: oculis cruore ex igne suffusis, cum thuris polline instillatur: podagricis utile est, cum meconio, & cerato illitum. Lac omne respuendum splenicis, hepaticis, comitialibus, vertiginosis, & neruorum uitio laborantibus, febriculosis, & capite dolentibus: nisi si quis interdum purgationis gratia, ut ostendimus, schistum præbeat. Primiparæ canis lacte peruncios narrant glabrescere: potum contra venena antidoti uicem obtinet: abortus mortuos expellit.

Τυρός.

C A S E V S.

M A T T H I O L I

C A P. L X V.

**C A S E V S** recens sine sale sumptus alit, stomacho uilis est, & facile in membra delegatur: carnem facit, aluum modice emollit: alius tamen alio præstantior, pro natura lactis, à quo conficitur. Decoctus autem, & expressus, deinde inassatus, aluum sistit. illitus, oculorum inflammationibus, & fignillatis prodest. Qui uero recens salitus est, minus alimenti præbet. carnem apte minuit, stomacho aduersatur, negotium ventri, interaneisque exhibet. Vetustiore sistitur aluus. Sero, quod à caseo manauit, quam optime canes aluntur. Quod hippacen uocant, caseus est equinus: ea uirus redolet, magnopere alit, bubuloque proportionem respondet. Nec desunt, qui hippacen, equinum coagulum appellarint.

Βούτυρον, καὶ αὐτοῦ λιγνός.

B U T Y R V M, E T E I V S F V L I G O.

C A P.

L X V I.

B u b u l u m

**E** L A C T E pinguisimo probatum fit butyrum, quale ouillum est. Fit & ex caprino, agitato in uasis lacte, donec pingue separetur. Butyrum natura oleosum est, & emolliens: unde largius epotum, uentrem, resoluit: prodest, ubi oleum non adfuerit, contra uenena. Cum melle si infroctur, dentitiones adiuuat: gingiuarum pruritus, & oris ulcera infantibus emendat. Illitum foris capaciore alimentorum facit corpora, & ab albidis pustulis per summa scatentibus asserit. Contra inflammationes, & duritias vuluæ, quod nec uirus respicit, nec uetustatem sentit butyrum efficax est: dysentericis, & coli exulcerationibus infunditur. In medicameta addi solet, quæ pus mouent: uile præsertim

praefertim cum nervi, aut cerebri membranae, vesicae ceruix, vulnera acceperit. Id autem purgat, repiet, carnem creat: ab aspidē percussis utilissimē imponitur. Recens obsonijs additum olei uicem pensat, & adipis uice fungitur in bellarijs. Colligendae ex eo fuliginis ratio haec est. Butyrum in lucernam novam ingestum accenditur, fictiliq̃ue operculato, quod supernē in siphunculi speciem desinat, & infima parte cuniculos clibani modo habeat, crematur, & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueris: pennae post deraditur ad usus. Eius effectus est in medicamentis oculorum, exiccare, & adstringere: fluxiones cohibet, & ulcera celeriter ad cicatricem perducit.



LAC est benigni alimenti superfluum in foeminarum manillis ex bina sanguinis coctione progenitum. Constat autem id tribus diuersis essentijs: nimirum caseosa, butyrosa, ac serosa, quae abinuicem separate uariam consequuntur temperiem. Sed à lacte primum rem exorsus, de eo tantum facultates differam, cuius hac tempestate tam in cibis, quam in medicamentis est usus. Tale autem est humanum, caprinum, ouillum, bubulum, bubaltrum, & asininum. Et quamvis ueteres usi fuerint tum camelino, tum etiam equino; cum tamen in Italia, ac in alijs conterminis regionibus, quod sciuerim, eorum nullus sit usus, haec tanquam superuacanea omnino reticenda censemus. Praeclit igitur humanum, quod temperatione sit in omnibus suis partibus. Hoc sequitur caprinum, etsi aliquantō siccius sit. His crassius est ouillum, minusq̃; serosum. Bubulum deinde, ac bubalinum, praeter id quod admodum sit crassum, ceteris longē pinguius habetur. Quamobrem libro x. simplicium medicamentorum dicebat Galenus. Miror autem quo pacto Dioscorides ex ouillo, et caprino butyrum confici referat. Ego namq̃; ex bubulo fieri noui, ac proinde nuncupatum esse butyrum existimo. haec Galenus. Porro asininum sicut lac omne feri exuberantia superat, sic ceteris pinguedine cedit. Probatur in uniuersum lac colore, odore, sapore, ac substantia. Ob id igitur praefertur quod colore perquam albo niscitur, pellucidum, ac clarum, non uiride, non luteū, non nigrum, nec aliquo luore suffusum: odore suauis, syncero, minus graui, aut uirido: sapore quidē dulci, non amaro, acri, acido, aut salso: substantia media inter crassum, et tenue, ita ut eius gutta ungui instillata non defluat, sed in sua sphaera permaneat. Quod autem tale fuerit, omnino sanē praefertendum erit, & in cibis optimum. Contra pestimum praebet alimentum, uentriculum, ac totum corpus subuertit: quod contrarias notas habuerit, quodq̃; ex morbois animalibus emulsum fuerit, uel etiamnum ab ijs, quae reprobatae, uenenosaeq̃; plantas depascuntur. Quocirca memoriae prodidit Galenus libro 111. de facultatibus alimentorum, quod si capre, aut alterius cuiuspiam animalis scammoniam, aut tithymalum depasti, lac cibi loco quis sumpserit, omnino aliui, uisum fuit. Optimum datur utiliter estate consistentibus, senibus non naturaliter frigidis, biliosis, & marasmo affectis, & deniq̃; ubi uentriculus excrementis uacet: Nocet lac potum contra febriliter, capitis dolore affectis, ophthalmicis, resolutis, comulsijs, fluxione tentatis, calculo oppressis, pituitosis, adolescentibus, obstructis, & ijs praefertim, qui lacte, & edulis lacte paratis, coenas & prandia claudunt, tantoq̃; maior inde sequitur noxa, quāto crassius lac assumptum extiterit. Ea q̃; propter citato loco inquit Galenus. Lac quod feri plurimum habet, etiamsi semper eo utamur, nullum prorsus periculum adfert. Quod uerō huiusmodi humiditatis exiguum habet, caseosae autem crassitudinis multum, omnibus qui ipso frequentius utuntur, est periculosum. Ceterum ut lac, quod bibendum est, prosit, haec praeterea adiuuare oportet, lac nimirum recens sit mulsum: aliquid mellis, sacchari, aut salis admixtum sit, ne in uentriculo concreseat: tantumq̃; ex eo sumatur, quantum concoquere ualeat uentriculus. A cibis etiam omnibus, & uino, postquam assumptum fuerit, abstinendum est, quousq̃; à uentriculo secesserit, minimeq̃; exercitio utendum est. At quomodo lac dentes usque (etsi Dioscorides contrarium de asuino scripserit) eo sitatum ebibito, uino, aut hydromelite os abluere oportet. Quod autem immixto coagulo concreuit, quanquam uetno, ac a fluo tempore, mensis frequentissime expectatur; tamen angustiam parit, uentriculum opprimat, caput uaporibus replet, egrē concoquitur, & crassum gignit succum. Quamobrem si quandoq̃; in cibum ueniat, primum omnium ingeratur: siquidem in illo loco sumptum (ut feri adsolet) aut si uinum putrefcit, aut subsidentem cibum secum ad ima incoctum trahit. Lac omne, humanum praefertim;

Lactis confectio.

Lactis probatio.

Lactis facultates.

Lactis bibendi ratio.

Lactis coagulatio.



Bugyri uires  
ex Galeno.

Caput lactis.

Casei confide-  
ratio, & facul-  
tates.

Recoda uir-  
res.

Seri uires ex  
Galeno.

Ex Mesue.

serum cerebri auget, corpus impinguat, siccum & asperum tussim lenit, uenerem roborat, urinae ordines sub-  
dissoluta corpora reficit, probi multiq; est alimenti, bonam facit aluum, facile in sanguinem uertitur & arteria-  
tus dilatat, & ceteris alimentis maius adfert nutrimentum. Quod autem lac primiparæ canis peractos gignit  
scere faciat, potius uero emortuos educat fetus, ut nonnullis proditum esse scribit Dioscorides, reprobat Galenus in  
simpl. medicam. Butyrum præterea (ut loco citato scribit Galenus) facultatis est concoquentis, paulum habet  
tiam digerendi potentie, in medijs nimirum corporibus secundum duritiam, ac mollitiem. Corporum etenim plane dur-  
rum tumores præter naturam hoc nequit medicamen digerere: at quæ in mollibus sunt phlegmone, eas et concoquit,  
& digerit persicilè. Non parotides, & bubones, & oris phlegmone, aliæq; partes cõplures illo prorsus solo cur-  
tur, nimirum in pueris, ac mulieribus. Sed & dentientium puerorum ginguius illitum, nihilo imbecillus melle gingiua  
extenuat, per quas exitus est dentibus; & alios omnes in ore affectus phlegmonosos, posteaquam fluxio resoluta, e-  
gerit pariter et cõcoquit. Proinde cataplasmatibus inditur, quæ extrinsecus imponuntur parotidibus, hypochondrijs,  
bubonibus. Sed & in uentrem deuoratum, & ex eo distributum, magnificè confert expuitionibus ex pulmone, ut in  
pleuriticis, et peripneumoniacis affectibus, cum hoc, quod eos etiã concoquat. Atq; si solum lingatur, magis quidem cõ-  
coquit, uerum minus educit: plus uero si cū melle, et amaris amygdalis, sed minus concoquit. Fit ex bubuli præse-  
tim lactis pinguedine id, quod uulgò Romæ, ac in uniuersa ferè Italia Capo di latte appellat, mensis plurimum expectat,  
quod gustui, ac palato maximè arrideat. Verum enim uero ob pinguedinis copiam, præterquam quod uentriculo res-  
xat, et cuncto supernatato cibo; nutrimentum ei eicit, anteaquam concoquatur, uapores in caput mittit, & crassum ge-  
rat succum. Caseus autem fit ex crassiore cuiuslibet lactis substantia, admixto coagululo, et expresso inde sero. Pre-  
fertur in cibis recens, quod noxam uentriculo non inferat, concoquaturq; facilius, quam qui diutius asseruatur. Naq;  
uetus, qui quod linguam parumper uellcet, quam plurimis gravior redditur, omnium pessimus est: quippe qui cetera  
magis adurat, sitim excitet, & difficiliter concoquatur. Quin & calculos in renibus gignit, iecur obstruit, aluum co-  
hibet, & in calefactis corporibus atram bilem gignit. Quo fit, ut plus damni ex eius succi prauitate, & serui quæ-  
tate inferat, quam quod humores crassos attenuando compensare possit. Fugiendus igitur istiusmodi caseus est, cum  
neq; ad concoctionem, neq; ad mouendam urinam, neq; ad ciendam deniq; aluum, quicquam boni conferat, quem admodum  
neq; ad succi probitatem. De hoc autem edisserens Galenus libro x. simplicium medicamentorum, sic inquit. Itaq; cum  
mibi olim caseus allatus esset bubulus, quem ex odore acré esse conieci, abiecti, & iam à famulis absumptam præse-  
bam: uerum illi talia seruare soliti, longo post tempore ex promptuario proferentes, quidam de illo fieri uiderant, præ-  
gant. Cum igitur edendo non esset propter acrimoniam, ludicrum nobis problema exstitit, proponentibus, cui ra-  
illum utiliter posset accommodare. Interea cum ad me arthriticus quissiam in curru conuectus esset, topbos, quos  
Græci τῶπος nuncupant, in articulis habens, subiit mihi crure suillo salso decocto caseum eo decocto macerari, &  
probe in mortario subigendo unitum, topbis imponere. Et sanè arthriticus ab hoc medicamine magnificè adiuu-  
nam rupta sponte sua cute, absq; incisione uidelicet, emergebant quotidie citra dolorem topborum particule. Vbi  
tem totus, qui apud me erat caseus, fuisset absumptus, talem sibi aluum comparans arthriticus in posterum seruare, &  
postea rursus usus est inueterato: atq; ubi tunc quoq; idem percepit commodum, sepius deinceps uti perseuerabat  
quosdam amicos similiter affectos docuit. Atq; id quidem nos excogitauimus: ceterum comprobauit, ac confirmat  
experientia, hæcenus Galenus. Ex quo palam fit, eiusmodi caseum esse omnino in cibis reprobandum. Quam-  
nec recens, nec uetustus fuerit, cum et ipse non sit expertus lesionis; minore tamen constat noxa. Præstat ceteris cas-  
lus. Verum sicuti Pergamenum caseum Galenus in laudem suæ patriæ præ ceteris commendauit libro 111. de alimen-  
tum facultatibus; ita nec mihi sanè uitio uertendum existinauerim, si Hetruscum ceteris Italicis præferam, eum præ-  
fertim, qui in nostro Senensi agro, ac etiamnum Florentino ex ouillo lacte cõficitur, qui uulgò appellatur Cascio Me-  
xolino, gustu dulcis atq; suauis, quod lac, ex quo paratur, coagululo non sit concretum, sed cinere floribus, qui pascuis  
uniuerse ferè Hetruriæ coaguli uicem præstant: quo fit, ut senescens nunquam acris euadat. Cui nec alter cetæ, qui  
in nostro agro præstantissimus fit ex caprarum lacte, mense septembri, recensq; esur. Hunc uulgò Rauagguolo ap-  
pellamus. Desertus is Romanus, quod à Præsulibus, alijsq; primatibus summopere expectatur. Quippe qui odoratis re-  
dolet herbis, quibus ubiq; nostrates referti sunt colles, ijq; præfertim, qui non longè distant ab urbe nostra. Bub-  
lus præterea caseus, etsi plus ceteris nutriet, pinguiorq; existat; est tamen reliquis concoctu difficilior. Caprius u-  
rò quancumq; ex temperationi lacte sit confectus; inueteratus tamen reliquis caseis est deterior, cum sit atrox, et  
& friabilis fiat. His accedit, quæ uulgò nobis Recotta dicitur. Fit hæc ex serosa lactis parte ad ignem decocta.  
Recens (si Auicennæ, Rasi, & Isach credimus) minus uentriculum uexat, quam caseus omnis recenter pressus. Con-  
fert calidis defluxionibus obnoxijis, sitim sedat, somnum conciliat: uerum tamen obest uentriculum frigidum habenti-  
bus, & nervorum morbis. Inueterata autem agrè concoquitur, sitim excitat, parum nutrit, aluum coarctat, & sit-  
tus procreat. Reliquum est Serum, quod lactis aquosa est substantia. Hoc (ut Galenus inquit libro de compo-  
sitione simplicium medicamentorum) extergendi potentiam possidet, sumitque subducendi uentris gratia, ac per clyste-  
res inijcitur, extergens, & abluens sine mordacitate intestinorum acrimoniam. Præterea si quis ulcers, quæ  
sanie infestantur acri, uice aquæ sero colluat, optimè sanè fecerit. Præterea quæcunque medicamenta digere  
solent ecchymomata, & atra, ea præstat sero, quam aqua diluere. Sic etiam eo utimur ad sugillata, &  
hyposthagmata, peculiaribus ad hæc medicamentis commiscentes. Prætulit Mesues serum, quod ex nigra-  
rum caprarum lacte elicitor, deinde quod ex ouillo, sic inquit. Aqua lactis macerationis materia est, & pot-  
quidem innocuum medicamentum. Præfertur, quæ fit ex lacte nigrarum caprarum, in laudatis pascuis matris, &  
recenterq; foetarum. Excalfacit hæc, atq; siccatur ordine primo completo, & usq; ad secundum. Quintiam autem  
abstulit.

alut, abstergit, & nitrosa quæ referta est facultate, aliam absq; aliqua mordacitate leniter subducit. Bilem tum fla-  
uam, tum atram ab exustis humoribus genitam deicit: quo fit, ut mirifice conseruat maniacis, & melancholicis. Pre-  
terea non ad uiscerum infarctus, & morbis inde provenientes optulatur: namurum aqua interente laborantibus, fel-  
le suffusis, & lienosis. Datur utiliter febricitantibus ex bile, & uiscerum, ac uasorum obstructionibus. Competit etiã  
menstruis in cute à bile, & perustis humoribus emergentibus. Quare licenibus, utiligibus, alphis, psoris, leprisq;  
conuenit. hæc Mesues.

Lactis faculta-  
tes ex Galen

Lactis autem facultates memorie prodidit Galenus loco nuper citato, ubi ita  
scribit. Lac ubi aliam quampiam exiccantem facultatem habuerit adiunctam, optimum est remedium dysenterie, &  
emulsum uentris acrium fluxionum. Eam accipit à lapidibus, qui præ decocto ipsi iniiciuntur igniti. Porro eos esse op-  
portet, quos uocant *μαχαλας*. Et lac eousq; decoqui debet, dum pleraq; serosi in eo humoris abstracta pars fue-  
rit. At nos iniectiones ferreis in ipsum cylindricis eandem, aut etiam meliorem facultatem efficiamus. Porro  
lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium collyriorum quopiam est utile: præterea ad hy-  
popos, & hypophagmata. Quinetiam palpebris extrinsecus, ubi qui ophthalmia laborant, somno sese dabit, impositum  
simul cum rosaceo, & oleo; phlegmonas eorum concoquit. Sed hoc esto lac mulieris recens, ex mamillis expressum.  
Infundimus ipsum & ueteri ulcerato tumi per se, & tam ijs medicamentis commiscentes, quibus miseri potest;  
ut, citra morsum curantibus, et ubi in sede ulcera malignius præ saniori acrimonia dolentia, aut phlegmonas, aut rui-  
as perpetentia. Sic & ad ulcera pudendorum uimur, & omnia quæ leniri postulant, siue ob inflammationem, siue ob  
erosum; siue ob malignitatem. Ea q; propter & catarrhos applicatur ulceribus; medicamentis autem anodynis, & emollientibus,  
quod sunt, quæ ex pompholyge constant. Et quid attinet commemorare, quod ore contentum collutum, & gargizatum;  
namq; uel maxime phlegmonas eas mitigat: Sed & consillas, & columellam, & antiadas phlegmonas affectas admodum  
mitigat, & proinde anginam. Atq; ut semel theam, medicamentum est leniens, totam quidem substantiam habens  
mordacitatis expertem: sed multo magis, ubi concoctione moderata potissima pars serosi humoris abstracta est. Sed  
ubi uidentur etiam medici ad uenenam, quæ erosione intermunt, lac dant fradere; uelut & lepus marinis intera-  
fiat, & cantharis. Sed & sunt, qui exhibent ijs, qui aconitum, & thapsiam sumpserint. Sed hæc ex ratione  
fiderunt.

¶ Illud hoc loco non prætereundum duxi, quod in Græco codice manu scripto non Quasit in ov. hoc est, inflatio-  
nem parientis, sed Quasit in ov. id est, naturale legatur. quod lac potius stomachum iuuat, quam inflatione uerget: id enim  
innuit uerbum naturale. Hanc lectionem secutus fuisse uidetur Serapio: quippe qui ex Dioscoride ita transcribat. Et  
lac conseruat stomacho. Quin & facilius potuit esse librariorum lapsus ob uocum similitudinem.



ΕΓΓΙΣ, ΧΑΙΟΣ, ΟΥΡΟΣ. LANAÆ, ET OESYPVS. *Mollm* CAP. LXVII.

SVCCIDAR lanæ molles è collo, feminibusque laudatissimæ habentur. Subueniunt inter iniq;  
ua vulneribus; percussis, desquamatis, liuidis; ossibus fractis; aceto, oleo, aut uino imbutæ: si-  
quidem facile succos combibunt, quibus immerguntur, & ob pecudum sordem (sic enim oesyp-  
pum vocant) emolliunt. capitis, stomachi, aliarumque partium doloribus; cum aceto, & ro-  
seo efficaciter imponuntur. Crematarum lanarum cinis crustas obducit, excrecentias in carne  
cohibet, & ulcera ad cicatricem perducit. Mundæ autem, & carptæ, in fictili crudo, ceterorum  
more, uruntur. Nec secus fimbriati marinarum purpurarum floeculi cremari solent. Aliqui cem-  
fordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemque modo vrunt. Alij in fictili: oris patuli; veru-  
cula inter se distantia componunt, & conceptas carminatasque lanas, oleo ita suffusas, ut ne stilla-  
re quidem possint, assulis tedæ subiectis, & eisdem, lanisque permutatim interstraxis, leuiter suc-  
cendunt, & uistas tollunt. Quod si è tedâ pix, pinguitudine uel profluxit, collecta reconditur. Lan-  
æ autem ad oculorum medicamenta. cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & confide-  
re patiuntur: idque sæpius, mutantes aquam, donec linguam adstringat, nec mordet. Oesypum  
vocat.

vocant Græci, succidarum lanarum pinguitudinem: cuius parandi ratio hæc est. Succidæ molles, radícula non curatæ, calida aqua lauantur, & quibuscunque sordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur, magnoque impetu ligula, vti respumet, agitur, aut lignea rade validiusculè conturbatur, quò largius sordida spuma colligi possit, deinde marina respergitur: & confidente pingui, quod supernatabat, collectoque in altero fictili uase, denuo aqua in labellum facta agitur: spuma iterum mari perfunditur, & demum eximitur. hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine, nihil prorsus spumæ extet. Collectum cespum manibus emollitur, & si qua infedit spurcicia, confestim demitur: exclusaque sensim omni aqua, recentique affusa, manibus misceatur, donec admotum linguæ cespum adstringat leuiter, nec mordeat, atque pingue, candidumque spectetur: tum in fictili uase conditur: verum omnia feruido sole fiant. Nonnulli et colatum pingue frigida aqua eluunt, & manibus, non secus atque ceratum mulieres, confricant: m enim candidius redditur. Alij elotis lanis, & sordibus quibuscunque exemptis, ac lento igni in æneo uase ex aqua decoctis, pingue, quod supernatat, collectum aqua, vt diximus, lauât: colatæque in fictilem patellam, quæ calidam aquam contineat, linteo operiunt, atque soli mandant, donec candidum fiat, & satis crassum. Alij bidui spatio aquam effundunt, nouamque adijciunt. Melius est læue, radícula non curatum, quod succidarum virus oleat, & si manu in concha fricetur cum aqua frigida, albescat, nihil in se duri, aut concreti habens: veluti quod cerato, aut adipe adulteratur. Oesypum excalfacit, explet ulcera, & emollit; præsertim sedis, ac vuluæ, cum meliloto, & butyro. In uellere appositum menses, & partus euocat: vlcera non aurium modò sanat, sed & genitalium cum anserino adipe: contra erosos angulos oculorum, scabiososque, genas quæ oculi luerunt, & ciliorum defluuia, efficax est. In testa noua torretur, donec redactum in cinerem pinguitudinem amittat. Ex eo etiam fuligo colligitur, uti demonstrauimus: quæ in oculorum medicamenta commodè addi solet.

*C. V. M. Lane succidæ, & earum sordida pinguitudo, quam Græci Oesypum appellant, & officinarum vulgè Isopum humidam vocat, plenissimè à Dioscoridè descripta sint, nihil nobis hic relictum est, quod declarandum, et adijciendum esse putemus.*

*Lippor Von Velsch hujus*  
Pitua. COAGVLVM.

CAP. LXVIII.

LEPORIS coagulum tribus oboliis ex uino, uenenatorum moribus, cœliacis, dysentericis, & foeminis fluxione vuluæ laborantibus, ac reiectionibus à pectore, auxiliatur. sanguinem in grumos concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum vuluæ cum butyro, præstat mulieribus, ut concipiant: potum uerò partus enecat, & à puerperio, pariendi spem adimit. Equi coagulum, quam hippacen aliqui vocant, priuatim cœliacis, dysentericisque conuenit. Hædi, agni, hinnuli, capræ laticornis, & dorci, apri, cerui, vituli, bubalique coagula, similes naturas fortuantur: contra aconiti potum in vino, & concretum lac in aceto conuenienter assumuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admotum, partus spem intercipit. Vituli marini, castorei vires repræsentat: comitialibus, strangulatis vuluis, potu conferre exultimatur. Sed si sit vituli marini, hoc experimentum est: aqua inspergitur, qua paulisper cum alterius animantis, tum præcipue agni coagulum, maduerit: nam si erit syncerum, statim liquefcit in aquam: sin minus, consimile permanet. Excipitur autem catulis, qui nondum natæ possunt. In summa, coagulum omne dissipata cogit, & coacta dissoluit.

Coaguli consideratio.

Coaguli facultates ex Galeno.

ANIMALIUM coagulum (ut Aristoteles memorie prodidit libro III. cap. XXI. de historia animalium) lætis substantia est: quippe quod in eorum uentriculo, quæ adhuc lactent, contineatur. Est ergo coagulum lac ignem habens intra sese, quod cum animalis tepore concoqueretur, caseum traxerit. Habent coagulum omnia rumantia, & inter dentata utrinque, lepus. Quò uetustius coagulum est, eo præstantius: tale enim profluuium alui meliori præcipue potest: atque etiam quod leporis est. Sed laudatissimum hinnuli. hæc Aristoteles: Quod autem leporis coagulum sanguinem reijcientibus conueniat, ut Dioscorides scribit, minime quidem probare uidetur Galeni lib. x. simplicium medicament. ubi sic inquit. Coagulum omne acris, ac digerentis potentie est, ac nimirum eius exiccatorie: nam necessariò id superiora comitatur. Ac leporis quidem coagulum comitalem morbum, si cum aceto ebibatur, præterea profluuium muliebrem sanare proditum est: sed & lac in uentre coagulatum dissolue: quod certe & nos experti sumus, non solum in leporino; sed etiam in aliorum animalium coagulo. Attamen leporinum omnium est præstantissimum. Sed & sanguinem in uentre concretum simili modo epotum dissoluit, ac efficacius fortasse ceteris leporinum: uerum non solum, quod quibusdam scriptum legitur, sed & hoc commune est omni coagulo. Quidam autem sanguinis ex thorace reiectiones leporinum coagulum epotum suppressere prodiderunt. ceterum nec diu quenquam eo usum noui, nec ipse sum ausus acris uti remedio ad affectum adstrictionem poscentem. Porro coagulum equinum ad dysentericos, et cœliacos accommodari scripserunt nonnulli. At pro hæc coagulum eximie aptum esse quidam prædicant, tanquam uires obtineat castorij. Verum quæcumque proditum est, quodque coagulum secundum effectum totius præstare proprietatem, non est nunc tempus exponere.

ADEPS anserinus, aut gallinaceus recens, & sine sale conditus, ad vuluæ uitia proficit. Sale in-  
 veteratus, & qui temporis spatio acrimoniam cōcepit, vuluæ inimicus est. Recens exemptis mem-  
 branis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere capaciore sit, quantus sit modus adipis, quæ  
 curare institueris, obstructo diligenter uase, flagrantissimo soli exponitur: eliquescent inde hu-  
 mor in fictile alterum excolatur, donec adeps omnis absumatur: mox loco uehementer frigidus  
 reconditur, & ad usus digeritur. Alij fictile fulciunt super aquam calidam, aut tenuem & elanguis-  
 sam prunam, quæ solis uicem penfet. Est & alia curandi ratio. Exemptis membranis teritur,  
 10 coniectusque in ollam eliquatur, adiecto minuti salis momento: mox lineo colo transfusus re-  
 ponitur. Vtiliter in medicamenta additur, quæ lassitudines, & fatigationes leuant. Suillus  
 adeps, & vrsinus hoc curantur modo. Recens, præpinguis, renibus potissimum detractus, in lar-  
 gior aqua cælesti, & quàm frigidissima, exemptis tunicis, diligentissimè manibus confricatur,  
 & exprimendo ferme siccatur, subindeque noua aqua abluitur: cæterum fictili capacitatis duplæ  
 inditus, in aquam demergitur, & subditis leuibus prunis spatha mouetur: eliquatusque, colo  
 transfunditur in aquam. Vbi uerò refrixit, & guttatim aquam omnem exclusit, in prælotum fi-  
 ctile demittitur, & infusa aqua leniter eliquari debet, & manu deprimi, quò facilius sæculentum  
 uirus pessum eat: postea in pilam spongia madefactam transfunditur. ubi coire cœpit, residens in  
 inno fordes eximitur. Tertiò citra aquam eliquatur, repurgatusque, fictili bene operculato, per-  
 20 quàm frigidis locis reponitur. Hircinum seuum, ouillum, ceruinumque ita curato. Elotum ex  
 his quodcunque tunicis (ut in suilli mentione dictum est) exemptis, pilæ emollicendum tradito,  
 ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentum uirus excernatur,  
 aut pingue aliquod innatet, sed nitida spectetur. Deinde in ollam fictilem conijcito, & adiecta a-  
 qua, ut superemineat, leui pruna liquefacito, & moueto, atque in aquam colato: cùmque refrixe-  
 rit, iterum in loto fictili eliquato, & quæ antè diximus, facito. Tertiò sine aqua liquefactum, in  
 perfusam liquore pilam colato, refrigeratumque, ut in suilli ratione diximus, recondito. Bubul-  
 um autem seuum, renibus maximè detractum, exemptis membranis, aqua marina ex alto petita  
 eluendum est: mox in pila tundendum diligenter, affusa maris aqua. Cùm uerò dissolutum fue-  
 rit, in fictilem ollam conijciendum, & marina aqua, quæ non minus dodrante superemineat, pro-  
 30 luendum. decoquendum, donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui Atticas minas, qua-  
 ternis Tyrrenicæ ceræ drachmis: excolatumque, detractis quæ pessum ierant sordibus, in nouo  
 fictili reponendum, opertumque soli interdium credendum, ut ad candorem reducat, & odoris ui-  
 rus euanescat. Priuatim taurorum pingue sic curari debet. Renibus euulsum pingue profluente  
 amnis aqua abluito, detractisque tunicis, fictili nouo, postquam exiguum salem insperferis, lique-  
 facito: dein in nitentem aquam excolato: & ubi concrefcere cœpit, manibus iterum confricando  
 uehementer lauato, aqua sæpius infusa, refusaque, donec quàm optimè elotum videatur. Rursus in  
 olla cum pari modo uini odorati decoquito, & cùm iterum efferbuerit, dempto ab igni vase, ibidè  
 finito pernoctare: postridie si grauiter adhuc olèat, noua olla repetitum, uino odorato perfunda-  
 tur. eadem quæ prius, fiant, dum omne uirus euanescat. Colliquatur & sine sale, præsertim affe-  
 40 ctionum earum causa, quibus sal aduersari solet: sed ita paratum non magnopere albescit. Eo-  
 dem modo pardorum, ac leonum pingua curari oportet. Taurinum autem, & vitulinum pin-  
 gue, necnon ceruinum, atque etiam huius animalis medulla, odoramentis imbuitur, hac ratione.  
 Pingue, quod odoratum reddi debet, demptis, quo diximus modo, membranis, elotum, & uino  
 quàm odoratissimo, nulla maris aqua diluto, feruefactum, pernoctare finitur: alterum id genus ui-  
 num eadem mensura infunditur, colliquatur, & exquisitè colatur: nouemque eius heminis, iunci  
 Arabici septem drachmæ adijciuntur. Quòd si ipsum odoris fragrantioris fieri uoles, quadraginta  
 floris eiusdem drachmæ, cum paribus palmæ, calami, & cassiæ modis adduntur: & xylobalsami,  
 aspalathi singulæ drachmæ: cinnamomi, cardamomi, & nardi, singulæ uncie. omnia exactius tun-  
 duntur, & affuso uino odorato, in vase operto, quod supra carbones firmiter collocatum sit, ter effer-  
 50 uescunt, & semoto ab igni uase inibi pernoctant: postridie uinū effunditur, aliudque generis eius-  
 dem adijcitur. Ter simili modo bene cōferuescat: deinde matutinis exēpto adipe uinū effundatur,  
 & abluto uase, si quid imo subsidens hæsit, detergatur. postremò eliquatum pingue, & excolatum,  
 ad usus reconditur. Hoc autem modo odoramentis imbuitur, quod antea curatum est. Verum an-  
 tè dicta prius inspissari solent, quò facilius sibi odoramentorum uires adsciscant. Itaque assumens  
 quodcunque horum uoles, cum uino feruefacito, impositis unà myrti ramulis, serpyllo, cypero,  
 ne aspalatho plenius tuso. Aliqui tamen ad hunc usum, uno duntaxat horum contenti sunt. Cùm  
 autem ter efferbuit, exemptum leniter, & linteo colatum, aromatis, uti expositum est, imbuitur.  
 Adipibus spissamenta sic fiunt (quencunque acceperis, oportet, ut recens tundatur.) Syncerus, &  
 sanguinis expers adeps, reliquas habens notas, quas sæpe retulimus, in ollam nouam demittitur, in-  
 fuso uino albo, uetere, odorato, quod semipedis altitudinem superet: lento igni feruescat, dum uer-

naclus odor aboleatur, planeque uinum redoleat. At ubi deposito uase refrigit, duæ adipis minæ in ollam mittuntur, & duo vini eiusdem sextarij, & seminis loti, eius inquam, cuius è ligno Indicæ tibiz facituntur, tusi minæ quatuor adijciuntur: lento igni subinde miscendo decoquantur: cumque odoris uirus euanuerit, excolatusque adeps refrigerit, vna contusi aspalathi mina, cum amaracini floris minis quatuor, & uetere uino subigitur. Nocte una hæc odorem rapiunt, combibunt: postridie in fictilem ollam tricongialem ea omnia cum adipe iniecta, additis sextarijs tribus uini, una feruescunt, quousque & uim, & odorem spissamentorum adeps ipse contraxerit: qui eliquescent colatur, & reponitur. Quod si maiorem odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo quam pinguisimæ myrrhæ uino maceratæ, quod multos in annos asseruatum est, misceto. Galinaceus, anserinusque sic odoribus imbui solent. Cuiusuis eorum percurati sextarij duo fictili olla excipiuntur: erylisceptri, xylobalsami, palmæ elatæ, & calami planè contusi, singulorum sesquencia admiscetur: vini Lesbij veteris cyathus vnus adijcitur: ea ter effervescent prunis, mox vase sublato ab igne, die, noctuque refrigerantur: postridie liquata per linteum crassum mundum in uas excolantur. vbi uerò adeps coierit, concha excipitur, fictilique nouo densius operto perfrigidis locis reponitur. Hyberno tempore id instituere oportet: æstate siquidem pingua non coguntur. Nec desunt qui Tyrrhenicæ ceræ momentum adijciant, quò facilius in unum corpus omnia coalescant. Eadem ratione suillus adeps, & vrsinus, cæteri que id genus, odoramentis imbuuntur.

Verum sampsuchi odorem adeps ipse representabit hoc modo. Curati quàm optimè adipis, prefertim taurini, mina vna, tempestiuque sampsuchi exquisitè confracti sesquimina miscentur, & insperso largiore vino digeruntur in offas, quæ in vase cooperto nocte quiescunt. Matutinis in fictili olla leuiusculo igni, affusa aqua leuiter coquuntur: dumque suum adeps odorem exuerit, defæcatus, ac bene opertus, nocte tota permanet. postero die deterfa sordè, quæ pessum ierat, sampsuchi, ut dictum est, contusi iterum sesquimina priori pastillo adijcitur, eodemque modo in offas cogitur: alijs quæ diximus peractis, decoquitur, & colatur, & si qua fundo hæsit spurcicia, deraditur, & frigido loco reconditur. Si quis tamen incuratum adipem anserinum, gallinaceum, aut vitulinum à putredine tueri velit, ita faciendum est. Quemuis adipem diligenter elotum, & siccum in umbra super cribrum, per linteum munda manibus uehementer exprimat, linoque confutum umbrato in loco suspèdat, & post multos dies noua charta inuolutum, frigido loco recondat. Pingua autem indito melle vindicantur à putredinis vitio. Vis omnium est excalfacere, mollire, rarefacere. Taurinus adeps, bubulus, & vitulinus aliquantum adstringunt. Earundem virium compos Leoninus: nam resistere eum aiunt ijs, qui insidias moluntur. Ceruino, elephantinoque perunctos, serpentes fugiunt. Adstringentior est caprinus: qua ex causa decoctus cum polenta, rhoë, & casco dysentericis datur, & cum ptisanæ succo infunditur. Ius decocti phthificis in sorbitionibus prodest. datur quoque utiliter ijs, qui cantharidum uenena hauserunt. Hircinus, ut qui validissimè discutiat, podagricis auxiliatur, cum fimo capræ, & croco impositus. huic proportionem respondet ouillus. Suillus uerò contra vuluæ, & sedis vitia idoneus est: ambustis igni medetur. E' sue ventosissimus quisque sale conditus excalfacit, & emollit: elotus uino pleuriticis prodest: cinere, aut calce exceptus, inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asininum tradunt cicatrices corpori concolores reddere. Anserinus, gallinaceusque cōueniunt muliebribus malis, & ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, & contra aurium dolores. Vrsinum constat raptos uitio: & lopecie capillos restituere, pernionibus subuenire. Vulpinus medetur aurium doloribus. Flumitilium piscium pingua perunctis oculis claritatem afferunt, si in sole liquecant, & melli admiscetur. Viperæ adeps contra oculorum hebetudines, suffusionemque efficax est, addita cedria, melle Attico, & pari oleo vetere: pilos alis euulsos perunctis radicibus recens, & per se illitus obliterat, atque renasci non patitur.

**T A M E T S I** de adipibus, seuis, & pinguibus, quæ in medicum usum ueniunt, copiose, & abundanter locutus sit Dioscorides: utpote qui non eorum modò facultates, & uires tradiderit; sed etiam rationem docuerit, quæ eurentur, spissa & odorata reddantur, & à putredine uindicentur. tamen cum de eorum natura, & facultate accuratius (meo quidem iudicio) copiosius etiam, & particularius differuerit Galenus, nec uanum, nec à nostro instituto alienum duximus, hic ea omnia referre, quæ ab ipso memorie prodita sunt libro xi. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. Pinguedo, & adeps & hæc quoque communissima sunt inter animalium partes. Nam omnia, quæ bene nutriuntur, aut pinguedinem, aut adipem obtinent. Quæ uerò macilentæ sunt, maleque nutriuntur, sæpe omnino ne habere quidem apparent, sæpe uerò adeò pauculum, idque siccum, ut ægre uti possis. Porro confert à pinguedine adeps crassitie: ac propterea animantibus totam naturam terrosiorem habentibus adeps prouincit, uelut humidioribus pinguedo. Proinde pinguedo celeriter ab igne liquefcit, nec facile ubi liquata fuerit, rursum crescit, cogitur. At adeps nec facile funditur, liquefcit, & fusus celerrimè coit, ac congelatur, multoque apparet pinguedine durior. Sus enim bene nutritus, pastusque multam habet pinguedinem, ob naturalem temperamenti humiditatem. At boues, & capræ, & quæcunq; id genus cornigera, ob siccitatem adipem plurimum generant. At si uoles, oleosam, & pinguem in animalibus substantiam omnem adipem appellato, ut plerique medici. Sed & pinguedinem

Pinguedinis  
uires ex Gal.



dicam appellare totum hoc genus tibi licet. Non tamen licet tibi citra mendacium adipem caprinum humidiorē esse dicere, quā suam. Nam hic omnium ferme aliorum est humidissimus, ac proinde actione sua uicinam oleo uim possidens, quanquam oleo magis tum emolliat, tum concoquat: ac proinde cataplasmatibus, quæ ad phlegmonas accommodantur, commisceri solet. Qui uero mordicationes perpetiuntur aut in recto intestino, aut in colo, huius potius caprinū adipem, quā suillum iniiciunt: non quod acrimonia plus obtundat (nam ex natura sua suillus obtundit magis, ac proinde miscetur medicamentis ulcera curantibus, cuiusmodi est, quod uocant parygrum) sed quod caprinus ob crassitatem citius concreascit, suillus autem instar olei destuat: proinde ipsum potius dysentericis, et tinctiosis iniiciunt, quando morsum eorum mitigare consilium est. Porro ob tenuitatem partium nonnulla acrimonia magis retundunt, ubi nimium in alto mordicatorum corporum, quod molestum est, hæserit. Nam quod crassarum est partium, minus;

10 magis autem quod subtilium partium est, tota corpora penetrat, et omnibus ipsum saniebus mordicantibus permiscetur. Hac ratione adeps anserinus, quæ in alto corporum mordicant, magis obtundit: sed et suillo calidior est. Horum tamen in medio est gallinaceorum adeps, ac gallinarum. Porro calidior semper, ac siccior est masculorum animalium, et horum ipsorum exectorum minus tum calidus, tum siccus. Quippe mas castratus eiusdem semper generis femine assimilatur. Hoc autem sermonis caput commune est, cuius meminisse oportet: Pro animalium temperatura semper existere differentias eius, quæ in illis est, pinguedinis, aut adipis, aut quocunque modo appellare libebit totum hoc genus corporis in animalibus oleosi, et pinguis. Igitur cum suis omnibus prope quadrupedibus animalibus in caliditate, ac siccitate inferior sit; proinde pinguedinem quoque minus habet calidam, magisque humidam. Omnis igitur pinguedinis facultas est humectatoria, et excalfactoria humanorum corporum. Huius enim meminisse perpetuo oportet in principiis huius operis dicti. At differentia, quæ sunt cuiusque singulatim, in maioris, minorisque, ratione sunt.

20 Nam pinguedo suis, ut ad nos quidem, largius humectare potest, sed non æquè excalfacere, ut oleum: utrum pinguedinis suum talis est caliditas, qualis spectatur in nobis. Porro taurorum adeps suillo multo calidior est, et siccior. Rursum id et hic memoria repetentibus nobis, marem formina esse tum calidiorē, tum sicciorē: marem autem castratum assimilari formine, uelut quicquid iuuenilis est ætatis. Et inter iuuenilia formina mare humidior est, et minus calida. Sic et adeps utulinus, taurino minus tum calidus est, tum siccus: et hædorum, quā caprarum: sed et caprarum minus, quā hircorum. Et rursum taurorum minus, quā leonum: nam eorum adeps omnium prope quadrupedum adipe potentius digerit. nam et ipsorum calidissimus est, et maxime tenuium partium. Itaque si ipsum medicamentis ad ulcera, et phlegmonas conuenientibus commisceas, non modo nihil adiueris; uerum etiam læseris, nimiam addita maiori, quā conueniat acrimonia. Inueteratis tamen tumoribus atque scirrhi in morem induratis, tum neruorum curuaturis (αγκύλας Græci uocant) et in summa quæcunque scirrhusa sunt, iis aptissimus est, in quibus sanie

30 inefficacissimus apparet suillus. Taurinus autem ab utroque ex æquo distat, ut quantò calidior, sicciorque, suillo est, tantò superetur à leonino. Itaque tanquam in medio consistens, merito utriusque medicamentorum miscetur generi, et iis scilicet, quæ scirrhis medentur, et iis, quæ phlegmonas concoquunt, cuiusmodi est tetrastapharmacum quod uocant, ex cera, resina, pice, et adipe constans. Nam siue in hoc taurinū, siue utulinum, siue hircinum, siue caprinū, siue suillum indideris, semper puri mouendo aptum, et concoctorium medicamen effeceris. Sed suillus si addatur in pueris, et feminis, et ut breuiter dicam, omnibus, quibus caro est mollior, competit. Sin taurinū adieceris, fossoribus, et misscoribus, et omnibus carnem duram habentibus, siue ob naturalem temperiem, siue ex ratione, ac forma uitæ, conueniens effeceris. Ceterum adeps omnis dum inueterat, se ipso et calidior, et tenuior efficitur, ac proinde quoque magis discussorius. Verum id omnibus ferè inueteratibus accidit, quæ quidem putrescere non anticipent. Nam uinum, mel, acetum, frumētum, butyrum, lana succida, oleum omne, siue lentiscinum, siue cicinum, siue raphaninum, siue ipsum quod ex oliuis conficitur,

40 uetustate et calidiora, et tenuioris essentia efficiuntur: ac proinde gustantibus apparent acriora, et ad induratos, et græque solubiles affectus omnes adhibentibus potentius digerentia. Atque ego sanè gustantibus acriora uideri dixi. At quidem quibus studium est nominum significatus corrumpere, non acria, sed adstringentia uocant id genus omnia, adque piper: tanquam intersit nihil, adstringens, an acre dixeris. Etsi denuo illos roges de galla, myrtis, mespilis, mali punici putaminibus, quæ sidia uocant, rhoë, et omphacio, et hæc dicunt adstringere: tamen si aduersissimum ex illis sensum percipiamus ei, qui in nobis fit à pipere, pyretbro, napy, euphorbio, cepa, allio, et adarce. Igitur si quemadmodum adstrictionis uocabulum de utroque affectu, quem gustu percipimus, communiter efferunt, sic ipsos quoque affectus unam habere naturam existimant, quiduis aliud potius habendi sunt, quā homines, ut qui soli proprios sensus obtineant. At si omphaca, rhoa, gallam, balaustrum, hypocistida contrahere, constringereque nostram fateantur substantiam: fecernere uero, mordicare, ac penetrare, piper, napy, pyrethrum, improprie adstringentia nuntiant;

50 cupant, quæ mordicant, et excalfaciunt: ceterum in cognoscendis ipsis medicamentis non peccant. Verum si oportet coniectantem dicere, an in uocabulis, aut in rebus hallucinentur, equidem in uocabulis potius falsos uiros illos dixerim, et maxime quibus Græca lingua insueta est, qualis est Dioscorides Anazarbensis. qui profecto multa bene dixit eorum, quæ de materia medica memoriæ prodidit, ceterum significata Græcarum uocum non satis pernoxit. Hic ergo cum ait magis esse adstrictorium adipem caprinum suillo: si quidem acriorē significare uelit, per magis adstrictorium accipimus sermonem ceu uerum. At si illud, talem habentem qualitatem, et facultatem, qualem rhus, rbeon, hypocistis, balaustrum, haud uerum esse sermonem dicemus. Porro quoniam uiperarum adipem, ubi radicitus pilos sub alis euulseris, prohibere illos recrescere illud referunt, uisum est mihi eius facere periculum esse satius: at ubi prouident, fecisse, mentitos comperi, sicut etiam quod in iila suffusionum sanet. Verum uisum adipem alopecias curare uerè scripserunt: cum tamen probatiora habeamus ad eum affectum remedia. Porro cum dicant tamen calpinum adipem dolores aurium sanare, absque ut explicant, quos aurium dolores dicant, ceu non noscentibus ipsis distinguere,

Pomaz pa-  
rada ratio, &  
vſus.

ſtinguere, quæ dicunt, attendendum non eſt. Alij piſcium adipem laudant, tanquam ad ſuffuſiones, aut quencurq; con-  
affectum nominare uelint, congruat. Alij non ſimpliciter piſcium, ſed addunt fluidatillum: alij uerò potius natura-  
rum, quò uidelicet aliquid plus ſcire uideantur, quàm uulguſ. hæc Galenus. Cæterum de Taſſi pinguedine, quæ (in  
experimento manifeſto conſtat) contractos neruos, & articulorum duritijs emollit, & diſcutit, nihil poſteritate me-  
morizæ prodiderunt Dioſcorides, Galenus, & Paulus. Nec præterea Galenus pinguedinis curandæ, ac parandæ ratio-  
nem ullam, quòd ſciam, tradidit: nec quibus odoramentis ueteres pinguedinem imbuerent, & in unguenti morem con-  
cerent. quemadmodum hæc noſtra ætate unguentarij illam parant, quam uulgò POMATA uocamus. Ea autem  
hoc modo paratur. Simunt ceruini adipis, aut hædi binas libras: ſuilli uerò recentis uncias ſex: deinde exemptis me-  
branis, uino albo lauant, exprimuntq; tandiu, donec uinum omne exeat. Poſt hæc elotam pinguedinem in ſiſtile no-  
uum, uitro, uel plumbo oblitum conijciunt, additis nardi Indici granis tribus, caryophyllorum ſemuncia, nucis my-  
riſticæ drachmis duabus, malis appianis, uel ſylueſtribus ſemicontuſis ſenis, uel ſeptenis. Hæc omnia in ſufficienti aque  
roſacæ quantitate macerant die una: deinde lento igne tandiu decoquunt uas operculo contegentes, & rudiculis ſe-  
pius miſcentes, quouſque uniuerſa ferè aqua euaneſcat. Percolant deinde linteolo ſpiſſiori ſubdito uafe mundo, aqua  
roſarum madente, dimittuntq; concreſcere. Quo factò in ſiſtile nouum iterum conijciunt, adiectis olei amygdali  
dulcis uncias ſex, ceræ albæ uncias quatuor, & ad ignem colliquant, ac poſtmodum linteolo percolant in nitidum  
catinum aqua roſarum affuſa: ſinuntq; concreſcere. Demum eadem aqua moſchum experta, aut alijs reſagratibus  
aquis, tandiu lauant rude miſcentes, donec unguentum illud ad ſummum albeſcat. Tunc enim extrahunt, & uero  
uafe recondunt, ſeruantq; in frigido loco, ne rancorem contrahat. Hoc in Italia frequentiffimum obtinet uſum ad le-  
biorum, manuum, & mamillarum rimas, tam à frigore, quàm ab acri ſucco factas. Utuntur eo præterea ad deſque-  
matam cutem, & ad cruſtoſas papulas, quæ pueris in capite enaſcuntur. Sunt qui ei corallia porphyreo lapide leui-  
gata admiſceant, ut melius, citiusq; rimæ occludantur. Alij uerò cinnabarin addunt, ut flammæam reſeruat colorem.  
Adipis in ci-  
bis facultas. Porro (ut libro tertio de facultate alimentorum ſcribit Galenus, & Iſach Arabicus in dietis) Adeps omnis in cibus  
ſumptus uentriculum effundit, appetentiam deiſcit, pituitam auget, parum nutrit, ſuccum illaudabilem gignit, di-  
fluxiones commouet, retentricem uentriculi facultatem imbecilem reddit: ſenſus, & intellectum bebet, ſomnolen-  
tiam inducit, & in uentriculis facile in bilem uertitur, & in uapores caput petentes. Quare adeps eſt potius in ci-  
borum condimentis, quàm in alimentis expetendus.

Mελλος. MEDULLA. *Wirk* CAP. LXX.

LAUDATISSIMA eſt ceruina, mox vitulina, poſt hanc taurina, dein caprina, & ouilla. Col-  
liguntur æſtatis exitu, cùm appetit autumnus: quippe cùm alijs anni temporibus concreta ſanguinis, & ueluti caro friabilis, in oſſibus inueniatur: nec facile cognofci poteſt, ni quis eam oſ-  
ſibus extrahat, & recondat. Omnes medullæ molliunt, calfaciunt, rarefaciunt, vlcera explent. Cer-  
uina perunctos uenenata fugiunt. Curantur recentes, adipis modo, aquæ reſperſu ſubactæ, ſele-  
ctisq; oſſibus tantisper elotæ, & in linteum expreſſæ, donec aqua ſyncera emanet: & deterſa ſor-  
de pinna, ſi qua innatet, liquatæ in duplicato uafe in pilam exprimuntur: & ubi coiere, omni factæ,  
quæ ad ima ſidit, deraſa, ſiſtili nouo reponuntur. Quòd ſi libet incuratas reponere, facito omnia,  
quæ de anſerum, & gallinarum adipe demonſtrauiſmus.

Medullæ ui-  
res ex Gal.

MEDULLA, ut ſcriptum reliquit Galenus libro xi. ſimplicium medicamentorum, uim habet indurata, &  
ſcirrhoſa corpora emolliendi, ſiue muſculis, ſiue tendonibus, ſiue ligamentis id accidat, ſiue etiam uiſceribus. Op-  
timam ſemper expertus ſum ceruinam: deinde ipſorum iuniorum bouum, quos uitulos etiam nominant, ac proinde me-  
dullam eorum uitulinam appellant. At hircorum, & taurorum tum acrior eſt, tum ſiccior. Itaq; durities ſcirrhoſa  
diſſoluere nequit, ſiqua etiam memoria manet eorum, quæ in quinto lib. de his ſunt prodita. Ex uitulina igitur, & cer-  
uina medulla peſſi componuntur uteros emollientes. Et extrinſecus uteris medicamenta imponuntur, quæ ex medulla  
preparantur, uim habentia emolliendi. Accipitur autem non ſolum medulla ex oſſibus, quæ ſane re uera eſt medulla;  
ſed & ex ſpina, quam & ipſam medullam nominant, ſpinalem uidelicet: quæ tum durior, tum ſiccior eſt, quàm illa.  
Illa enim mollior eſt & pinguior: ac proinde ego ſpinalem ſeorſum per ſeſe abſq; illa repono. Sed ea mihi utriusque  
medullæ cura eſt, ne aut putreſcant, aut ſitum colligant. Itaq; in hyeme primum eas capio, uelut & adipem, deinde  
in ædibus ſiccis, atq; editis, planè humoris expertibus, cum ſolijs lauri ſiccis repono. Nam quæ recentia ſunt & be-  
nigna, multum etiam qualitatis ſue illis impartiunt, ut acriores fiant medullæ. At ſi quando ambiente calido, & æ-  
ſtrino medullas, aut adipem uoles reponere, paratum ſit in hoc cubiculum neque calidum, qualiſ ferè ſunt quæ meri-  
diem ſpectant (putreſcunt enim in talibus) nec humo proximum, atque humidum (nam in talibus ſitum contrahunt)  
ſed ſupernum atque excelſum, & ad aquilonem obuertum, paruas habens fenestras apertas, ut tam nocturnam, quàm inter-  
diu ab Arcto ſpirantes uentos accipiat. hætenus Galenus. In uſu uerò ciborum ſpinalis medulla id nutrimenti cor-  
poribus exhibet, quod cerebrum. Idcirco pituiſſimam, ac craſſam generat ſuccum, egrè concoquitur, uentriculo con-  
cet, nauſeam concitat: robuſtis tamen uentriculis concocta, bonum præbet alimentum. Porro quæ ex oſſibus trahunt  
medulla, quanquam largius ſumpta uentriculi appetentiam deſtruat, pituitamq; gignat; ſi tamen probè conſiciatur,  
ualentiffimè nutrit, magisq; ori placet, quàm ſpinalis, quòd hæc ſapidior ſit in omnibus ſuis partibus.

Medullæ in ci-  
bis facultas.

FEL omne reponitur hoc modo. Recens præligato ore folliculi lino tandiu demissum in feruētem aquam, dum quis spatiū trium stadiorum percurset, mox exemptum siccatur umbrato loco, asperginē non redolente. Sed quoad oculorum medicamenta adijci solet, ligatum lino in vitreū vas, quod mel habeat, immittitur: circūuoluto ad os vasis lini principio, & operto vase recōditur.

Est autem omnis fellis uis acris, & excafaciens: intensis tamen, & remissis viribus differunt. Si quidē præstātius in effectu esse videtur fel marini scorpionis, & piscis qui callionymus appellatur, marinę testudinis, hyenęque: item perdicis, aquilę, gallinę candidę, & syluestris caprę. quod priuatim prodest contra suffusiones incipientes, & oculorum caligines, argemas, & genarum scabritias. Ouillo, suillo, hircino, atque vrsino, taurinum multo efficacius. Felle omni perfacilem, præsertim infantibus, deiectionem quis molietur, si intinctum eo tomentum, aut fimbriam sedi subijciat. Priuatim taurino anginę cum melle perunguntur: sedis vlcera sanat, & ad cicatricem vsque perducit. Idem auribus fractis, & purulentis cum muliebri lacte, aut caprino instillatum, medetur: & sibilo earundem ex porri succo. Admisceri insuevit vulnerarijs emplastris, & circumlinationibus, quę contra venenata parantur: phagedęnicis vlceribus, colis, & scroti doloribus ex melle prodest: lepras, furfures cum nitro, & terra cimolia quā optimē purgat. Ouillum, & vrsinum contra eadem pollent, verum inefficacius hæc præstant. Vrsinum eclegmate comitiales adiuuat. Fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis, prodest: naribus inditum comitiales erigit. Syluestrium caprarum felle peculiariter peruncti lusciosi sanantur. Hircinum idem obit munus: rhymia abolet, & luxuriantes elephantiorum extuberationes illitu reprimunt. Suillum autem contra aurium vlcera, reliquaque omnia magno usu assumitur.

QVANTVS de fellis reponendi ratione, atque etiam de eius viribus abunde scripserit Dioscorides; non tamen ob hoc prætermittenda existimauimus nonnulla, quę a Galeno libro 2. simplicium medicamentorum de fellis facultatibus scire memorie sunt commendata. Est igitur fel (autore Galeno) succorum, qui in quoque sunt animalium, calidissimum. Itaque sicuti sanguinem, & carnes dissimiliter temperata obtinent animalia, eadem ratione & fel. Quocirca calidissimum fel, aliorum quoque animalium fel excellere necesse est: & quę illis minus sunt calida, proportionem & hanc bonorem illis inesse minus calidam, quanto scilicet & in alijs sunt inferiora. Ceterum hæc differentiæ habentur non modo pro diuerso animalium genere, quod hæc magis, illa uero minus calida sint; uerum etiam pro diuerso eiusdem generis animalium temperamento, ac etiam irritamento. Quandoquidem fel tauri interfecti, qui funibus adalligatus, uolenterque diu tractus, & cursu, & canum latratu defatigatus, & sitim, famemque, & multum laborem perpassus fuerit, ab eius felle plurimum differre inuenietur tum substantia, tum colore, tum facultate, qui in pascuis lectus, liberque uitam desiderat, ac quietam duxerit. Nam defatigati, ac uexati animalis fel substantia crassius erit, colore nigrius, aut uiridius, aut magis ceruleum, magisque erugini simile: ob idque etiam longe calidius erit, quam alterius, qui in pace, & otio degerit. Ideoque fel animalium quanto tenuius est, ac colore constat dilutiore, tanto minus spissioribus & magis colore saturatis excafacit. Gignitur in bubulo felle lapis quidam nonnunquam omni magnitudine, crocei colore, facilique friabilis, cuius Dioscoridem, & Galenum meminisse non reperio. Hic (ut plerique perbibent auctores) potus, uesciæ calculos comminuit. Naribus inditus uisum mirifice acuit, & aquam in oculos fluentem inhibet. Trius lentis quantitate, & betę succo commixtus, & in erinis naribus attractus, comitialibus subuenit. Non desunt etiam quidam magno successu ex uino exhibeant potantium felle suffusis. Denique auratę, lupi piscis, perdicis, & galli gallinacę felle mirifice delectantur in coitu femine, si uiri penis eo perungatur.

Fellis uires ex Galeno.

Fellis bubuli lapis, & eius uires.

SANGVIS anseris, anatis, & hœdi, utilissimē in antidota miscentur. Palumbi autem, turturis, & columbę, necnon perdicis, oculis cruore suffusis, & recentibus eorum vulneribus, lusciosisque illinuntur. Peculiariter columbę sanguis, cruorem membranis cerebri erumpentem inhibet. Hirci, caprę, cerui, & leporis sanguis inassatus sartagine, dysenterias, & celiacorum proflusio sistit: in uino potus contra toxica efficax est. Leporinus sanguis ita ut tepet illitus, uitia cutis in facie, lentiginesque emaculat. Caninus commodē ab his bibitur, quos efferata in rabiem bestia momorderit: contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestris sanguinem epotum tradunt prodesse comitialibus. Marinę autem testudinis cum uino, & leporis coagulo, cuminoque contra serpentium morsus, & hausta rubetę uenena conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duritias discutit, emollitque. Sanguis equarum, quę admissuram expertę sunt, in medicamenta additur, quę erodunt, septica vocant. Sanguine chamæleonis genarum palpebras euelli creditum est. Hoc idem viridium ranarum sanguine præstat. Menstruus sanguis sceminarum, circumlito conceptum inhibere existimatur: aut si omnino mulier menstrua supergrediatur. leuat podagrę dolores, & ignem sacrum illitus.

Sanguinis cō-  
sideratio.

Vana sangui-  
nis experimen-  
ta.

DISSERENS de sanguine Galenus, statim initio libri x. de simplicium medicamentorum facultatibus, quoniam nimis est inficiis, quin animalium sanguini aliquid insit, quod medicamentorum usui recte competat, ut Dioscorides et plerique alij, qui de eius uariis scripserunt, liquido affirmant: declarat tamen, multa de sanguinis uariis à feris et uerbis esse prodita, quæ factio periculo fabulosa potius, et uana reperiuntur, quam uera. Siquidem, ut idem refert Galenus, falsum sane esse omnibus in confesso est, quod epotus nocturne sanguis difficulter spirantes sicut an refectus. Resperditionum uero perunctis uirginum mammis, eas extubescere non sinat: pilosque renasci inhibeat, ijs partibus tamen, unde recentior ipsi euulsi fuerint. Falsum similiter esse asserit, comitiales ebibito agni sanguine curari: pilosque et pedibus euulsos, renasci prohiberi uiridum rancorum cruore. Quibus facile conijcere possumus, hoc in loco Dioscoridi codicem librariorum fortasse culpa mendosum esse. Quippe quod ibi legitur, oculorum palpebras rancorum uiridum sanguine depilari, quoniam potius Galeni testimonio (et si sententiam hanc non approbet) euulsi in palpebris prius hauritis sanguine renasci prohibeatur. Quin et aliud huic capiti mendum subesse uidetur: quod hic ea, quæ de admissariis equorum sanguine prodidit Galenus, de equarum sanguine, quæ admissuram expertæ sunt, legantur. Nisi forte interpretum uitium sit, qui sexum in Dioscoride perperam mutarint. Præterea inquit Galenus. Tamen si non desint, et turturis, uel columbe sanguinem præferat in perforata caluaria, ubi rosaceo melius inuenire nihil possis: nonne et rosauribus extollant gallorum, gallinarumque sanguinem ad sanguinis fluorem et cerebri membranis: crocodili uero terrestres ad roborandam oculorum aciem: admissariorum equorum, quod septicus sit, ad exulcerandam ubi: canis domesticorumque murinum ad dēpoxōdōvaz Græcis uocatis; id tamen nunquam experiri uolui. Metuebam enim, inquit, ne curiosus, uel stolidus uiderer, si tantis tamque probatis remedijs semel præteritis considerem, sanguinem heri animalium, illis plus posse præstare. Quod si quis hæc experiri uolet, certo se lo, damnabit non modo, qui id adscripsit, sed et se delusum facto periculo reperiet. Taurinus autem sanguis epotus antea quam concresecat, inter delicta recensetur medicamenta, quod haurientem protinus strangulet, ut sexto uolumine diffusius dicitur.

### Αἰώματος. FIMVM. mist

### CAP. LXXIIL

ARMENTARIÆ bouis fimum, si recens admoventur, vulnerum inflammationes mitigat: folijs autem inuoluitur, & calfactum cinere feruenti superponitur, coxendicis cruciatus totu compescit: illitum ex aceto duritias, panos, & strumas discutit. Priuatim suffitu fimi, quod à masulo boue redditum est, procidentes vuluæ reprimuntur: accensi nidore culices abiguntur. Fimum aprarum, præsertim in montibus degentium, potum in uino, regium morbum emendat: menses cum odoramentis haustum, & partus euocat. Tritum in farinam, & impositum lanis cum thure, foeminarum profluvia sistit, ceterosque sanguinis imperus ex aceto cohibet. Medetur alopecij exustum, & cum aceto, aut oxymelite illitum: cum axungia uero impositum his, qui podagra trantur, auxilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur serpentium moribus, ulceribusque ferunt, igni sacro, & parotidibus. Utilem ischiadici uisionem hunc in modum accipiunt. In os interstitio, ubi pollex brachiali committitur, caua ueluti lacuna subsidet, in qua lana oleo imbuit subternitur, deinde sigillatim feruentes stercoreis caprini pillule imponuntur, dum vapor per brachium ad eorum sentiat peruenire, & coxendicis dolorem mitigare. Adustio id genus Arabica appellatur. Ouillum ex aceto illitum sanat epinyctidas, elauos, peniles verrucas, thymos, & ambusta igni, rosaceo cerato exceptum. Fimum suis syluestris aridum, in aqua, aut uino potum, rectiones sanguinis sistit: vetustum lateris dolorem mulcet: adrupta, & conuulsa ex aceto bibunt: luxatis cum cerato rosaceo medetur. Tam asinorum, quam equorum fimum, siue crudum, siue crematum, addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. Armentarij, qui herba pascitur, siccum fimum liquatum in uino, mox potum, contra scorpionum ictus magnopere auxiliatur. Columbinum uehementius & excalfacit, & urit: cum hordeacea farina mixtum, strumas ex aceto discunt: carbunculos emarginat, tritum cum melle, lini semine & oleo: ambustis igni medetur. Gallinæcum uero omnia eadem, sed inefficacius præstat: priuatim tamen contra uenena fungorum, & eoli cruciatus ex aceto, aut uino bibitur. Ciconiæ fimum, si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini fimi nidore partus excuti produntur. Murinum detritum cum aceto, & illitum, alopecij medetur: cum thure, & mulso calculos expellit: subditæ infantibus morderæ, alui deiectionem promouent. Caninum, quod flagrantissimo: canis sydere fuerit exceptum, cum uino, aut aqua potum, sistit aluum. Humanum stercus illitum, uulnera ab inflammatione vindicat, & obiter intumescere non patitur: sed ea statim glutinat. sicco ex melle angine perungi commodissime traduntur. Terrestris crocodili fimum, crocodileam uocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremque seruat. Optima est candidissima, & friabilis, amyli modo, minime ponderosa, in humore statim eliquescent: quæ cum teritur, fermenti acorem quadamtenus refert. Adulterant eam sturnorum fimo, quos captos oryza pascunt, ipsumque non dissimile vendunt. Alij amylium, aut cimoliam miscent, & adscito anchusæ colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, ut se contrahat in vermiculorum speciem: qui siccati pro crocodilea uaneunt. Inter omnes conuenire inuenio, humanum stercus, caninumque gutturi impositum, anginis auxiliari.

STERCUS, ut posteritatis memorie prodidit Galenus libro x. simplicium medicamentorum: uim habet uel ma-  
 xime digerentem. Verum humanum ob factorem abominandum est. At bubulum, caprinum, crocodilorum terre-  
 strum, et canum, ubi osibus duntaxat uescuntur, neque grauius olet, et multa experientia non tantum nobis; sed et  
 his medicis me natu maioribus comprobatum est. Siquidem Asclepiades, cui cognomen erat Pharmacean, et  
 alii contra composita medicamenta collegit, ut multos impletet libros, et stercore ad multos sepe affectus uiritur, non  
 modo medicamentis, quae foris imponuntur commiscens; sed ijs quoque, quae intro in os sumuntur. Ceterum humani  
 stercoreis hoc habeo experimentum. A siue quidam a phlegmonis ad fauces existentibus uexabatur, adeo uenementer,  
 ut suffocationis subiret periculum, et sane ob hoc periculum uenam secare coquebatur. In hunc cū forte quis incidis-  
 set, pollicens est se praebiturum medicamentum experimentum, et se uocari, si quando rursus aliqua in parte gutturis  
 10 canisset phlegmone, ante sanguinis missionem praecepit. Itaque uocatus, medicamento illito, statim hominem cura-  
 uit. Et autem iterum profecit, non in ipso tantum; sed et in alijs, qui similiter erant affecti, rogabat is, qui a siue  
 suffocari periclitabatur, data mercede, ut se medicamentum illud doceret. Erat enim ille et locuples, et in pecunie  
 sumptibus liberalis. Porro ubi conuentum esset de pretio, is qui uendebat scripturam: Hoc medicamentum, inquit, per  
 antipathean quandam utilitatem obtinet. Esse autem eam antipathean, ut qui curatur nesciat, unde conficiatur. Ius-  
 su itaque alium daret, qui pro ipso disceret, quique iur eiurando reciperet, sese nulli eius medicamenti facturam copiam,  
 praesquam ipse, qui dedisset, foret defunctus. Itaque a morte eius, qui indicat, non tantum ille qui didicerat, suam bo-  
 nam; sed et alios sanabat: et mihi ne petenti quidem medicamenti exemplum uolens ac libens obtulit. Erat autem  
 stercus pueri siccum, cum melle Attico ad leuorem tritum. Victuabat autem puer, cuius stercus accepturus erat, ut  
 ipse qui medicamentum dederat ostendit, lupinis, illis uidelicet, qui ex more edi solent cum pane bene cocto in cibano,  
 20 modicum sale, et fermentum habente. Praebebatur autem bibendum uinum uetus: atque haec omnia mediocri in quantita-  
 te, modo ut perfectae ea puer posset concoquere. Itaque cum primo die eo uictu esset usus, postero tamen die nondum  
 stercus capiebat, sed in eo quoque die rursum eodem alebat uictu, ac tertio demum excretum sumebat: ac postea arefactio  
 utebatur, similiter ut stercore canino, ut ante dictum est. Dicebat autem illum, qui docuerat, fugitantiem alios cibos ob  
 factorem, praetulisse lupinos: sese uero experimenti gratia, carnes gallinaceas, aut perdicum ex aqua, aut tenui iure be-  
 ne coctas per sepe exhibuisse, et medicamentum nibilo minus operatum. Atque ego sane haec tibi de humano stercore  
 narrare possum. haec Galenus. Ceterum fit ex humano stercore uitreis organis aqua, praesertimque ex eo, quod ho-  
 mo rursus excreuerit, quae cuniculosis, exedentibus, sinuosis, et contagiacibus ulceribus mirifice opem praestat. Delet  
 et oculorum argemas, ac nubeculas. Quinetiam carcinomata sanat exterius adhibita. Intus uero sumpta comitiales  
 rimat: lapidem in renibus, et uesica communuit: aqua intercute laborantibus prodest: item et ijs auxiliatur, qui non  
 30 modo a cano rabido demorsi sunt; sed etiam ab omnibus alijs animalibus icti, quae uenem emaculant. Porro oleum,  
 quod post eius stillatitiam aquam ab organo emanare solet, carcinomata, si quis, atque ulcera, quae Graeci cacothie di-  
 cuntur, etiam ualentius sanat. Bubulum deinde stercus: ut idem Galenus citato loco scriptum reliquit) exiccant-  
 is, aut siccis; et ipsum est facultatis, ut palam facit, dum apum uespertumque morsus iuuat. Atque haec ut a proprietate  
 re substantiae totius iuuentur, fieri potest. Ceterum humidum illud uere collectum, cum boues herbas depascuntur, im-  
 positum rusticorum phlegmonas discutit, et aqua intercute laborantes iuuat: Scire tamen oportet, omnia id genus me-  
 dicamenta duris agrestium hominum corporibus aptari, nempe fessorum, et mesorum, et qui opus obeunt adeo ualidis  
 dum. Quae et ad eorum scirrposos tumores aceto in cataplasmatibus formam composita illinuntur. Caprinum praes-  
 terea digerentis, et acris est facultatis, adeo ut in duratis scirrborum in modum tumoribus congruat, neque tantum lenis,  
 ad quos creberrime medici non pauci huiusmodi stercorea applicant; sed etiam aliarum partium: Siquidem ego (inquit  
 40 Galenus) eo usus sum ad genu tumorem habens inueteratum, et egre solubilem, iusso fieri cataplasmate ex farina hor-  
 deae per oxyratum, undique uidelicet hoc stercore, et mirifice homo ille fiat adiutus, Erat autem rusticus, in quo id  
 factum est. Et iam etiam alius rusticus, cum sic usus esset, non tantum in genu; sed etiam alijs in partibus ad tumores si-  
 miles, perinde adiutus est. Nam acrius est medicamentum, quam ut mulieres urbanas, aut pueros, aut omnino qui molli  
 sunt carne, sanare possit. Quin et ad aquam intercutem, et ad splenicos uariis caprino stercore utimur. Sed et uisus  
 tenuiorum quidem partium, uerum haud manifestum redditur acutus. Quamobrem sane ad alopecias congruat, et omnia  
 oleo quae extergentia medicamenta desiderant, ut lepras, psoras, lichenas, et hoc genus alia. Miscetur et digerentis-  
 bus cataplasmatibus, qualia sunt, quae accommodantur ad parotidas, et bubonas diuturniores. Est enim uis eius cuiusque  
 etiam usui, absterforia, et digerens, nec eam parum habet digerendi potentiam. Nam medicus quispiam ex ijs, qui in  
 agris, et uicis medicinam exercent, utebatur eo ex aceto ad uiperarum morsus, et multo sane etiam magis aliarum be-  
 50 stiarum, ac profectio ex ijs complures seruauit. Et hic ipse quoque medicus arquatis potandas ipsas et uiperarum, hoc est,  
 pilulas caprinas ex uino praebebat, et ad profluuium muliebrem cum thure apposuit. Quae omnia sane optimus medicus  
 ignorare non debet. Ceterum potiora eligere potissimum ad urbanos, et honoratos, alicuiusque existimationis uiros; in  
 quibus equidem ego tali nunquam sum usus, quia cum multo meliorum suppeteret copia. Attamen existit  
 nonnunquam talium usus, aut in uinere, aut in uenatione, aut rusticatione, cum scilicet meliorum nihil adsuerit, aut ho-  
 mo rusticus perinde fuerit carnes duras, ac asinus. Nam eiusmodi multos in agris reperias dignos, qui bibant spur-  
 ribus. Ceterum et canibus ossa comedentibus stercus, praeterquam quod ceteris tum praestantius, tum candidius ha-  
 beat, fistula gutturi insufflatum anginam curat: sicuti et dysenteriam ex lacte caprino haustum, in quo prius igniti  
 calculi fuerint extincti, aut ignitum ferrum, quod Graeci σόμαμα uocant, Quinetiam periodicas, circularesue fugat  
 febres, si cochlearis mensura in accessu ex uino praebatur bibendum infesto patiente. Prodest et malignis ulceribus  
 dispersum, uel emplastris ad id facientibus commixtum. Pollet etiam suis uribus Lupinum: idcirco id magnis lau-  
 dibus

Stercoris ui-  
res ex Gal.Humani ster-  
coris expen-  
dimentum.Aqua, & oleum  
ex humano  
stercore.Bubuli ster. ui-  
res ex Gal.Caprini ster.  
uircs ex Gal.Canini sterco-  
ris uires.Lupini ster. ui-  
res ex Gal.



dibus extulit Galenus citato loco, sic inquit. Lupinum stercus quidam colicis potandum dabit, non tantum in paroxysmis; sed etiam in interuallis, si quidem pblegmone uacarent. Quorum ego quosdam iudi non amplius hoc estu correptos, & correptos non amplius id grauiter passos, sed nec post paucum temporis. Accipiebat autem de eius potius luporum stercus, quale ubi ossa ederint, solent excernere. Verum illud etiam in eo mirabar, quod uti scilicet sum euidenter se penumero iuuisset. Itaque hic stercus capiebat, quod non decidisset in terram: id quod non erat tam difficile. Ea enim est luporum natura, quæ canum, ut suspensio altero posteriorum crurum, & melius, & cetera uolenti quopiam loco ex terra. Itaque in spinis sæpe estate stercus lupinū reperitur, & fruticibus, uerbis herbis præcioribus. Inuenitur porro in stercore illorum & nonnihil osium deuorati animalis, quod ut effugit commotionem, ita & concoctionem: quod & ipsum contundens, ac conterens, bibendum præbuit colicis: ac si homo esset putius amans, miscebat & salis quippiam, aut piperis, aut quippiam eiusmodi. Ut plurimum autem ex uino albo concoctiæ tenuis bibendum præbebat: interrim uero etiam ex aqua. Hoc ergo stercoris, quod patientibus ilibus applicatum esset, iubeat suspendi uinculo confecto ex lana non cuiuslibet ouis, uerum multo præstabat eam esse ouis à lupo letæ, unde quod ad hunc usum accommodaretur, esset conficiendum. Quod si talis non adesset lana, ex pelle certarum & lorum quod cingeret ilia, & in quo stercus contineretur, parari præcipiebat. At nos ollulam ad magnitudinem maximæ fabæ confecimus, quam experiundi gratia indito stercore quibusdam suspendimus, nec potius non miramini plurimos ipsorum uideremus adiutos: ceterum ad ollulam duas ceu aures affiximus, per quas lorum transsumi posset. Quod autem ciconiæ sumum comitales iuuat, planè refellit Galenus, asserens eos esse redarguendos, qui ita scripserunt. De ouillo, columbino, gallinaceo, murino, & crocodilino, cum satis superque differuerit Dioscorides, ut plura à Galeno, & alijs descripta repererim, quæ medicinæ magis competere possint, non est quid amplius addendum existimem. Veruntamen animaduertendum est, quod, quemadmodum etiam de animalium felibus diximus, stercus ipsa inter se plurimum differunt temperamenti, & uictus animalis ratione. Quippe quod alterum sit altero plus, minusue calidum, pro animalium diuersorum generum temperie, aut pro alimentorum temperamento in eisdem specie animalibus.

Ciconiæ ster-  
cus.

### VRINA. *Urina*. CAP. LXXIIII.

HUMANAM urinam suam cuique bibere, contra viperæ morsus, ac venena, incipientemque aquam inter cutem proderit: scorpionis, viperæ marinorum, draconisque morsus, ea conuenientissimè fouentur. Canina ad perfundendos canis morsus idonea est: pruritus, & lepras nitro addito expurgat. Sed uetera ulcera capitis manantia, furfures, psoras, & feruidas eruptiones, multo magis abstergit: nomas, & præcipuè genitalium, cohibet: auribus infusa manans pus supprimit: decocta que in calyce mali punici, earum vermiculos abigit. Pueri impubis resorpta urina, orthopnoicis auxiliatur: decocta in æreo uase cum melle emendat cicatrices, argema, caliginesque. etæ, & cupro idoneum auri ferrumen conficiunt. Quod in urina subsidit, illitu ignem sacrum mitigat: feruifacit cum cypriño, inditumque, vuluæ dolores mulcet, strangulatus leuat, genas deterget, oculorum cicatrices expurgat. Taurina si cum myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Apri viribus eisdem prædita est: priuatim comminuit vesicæ calculos, & potu expellit. Capriæ aquam quæ eutem subiit, cum nardi spica quotidie binis cyathis cum aqua bibitur, urinamque per alium extrahit: aurium doloribus instillata medetur. Asinina traditur renū vitijs mederi. Læcis urinam, quam lyncurium appellant, simulac excernitur, glaciari coireue in calculi duritiam, vulgo creditum est. quare quod de ea proditum est, vanum esse conuincitur. Est enim quod à nobis nullis vocatur succinum pterygophoron, ideo dictum, quod penhas ad se alliciat. Id potum etiam qua stomacho, aluoque fluxione laboranti conuenit.

Vrinæ facultates ex Gal.

Vrina apri.

Vrinæ medicinas cōtempnit Galenus.

Chrysocolle facta.

VRINÆ omnes quidem, ut scriptis tradidit Galenus lib. x. simplicium medicamentorum, facultate sunt ceteris: sed plus tamen animalium calidorum, minus autem frigidorum. At urina hominis omnium prope aliorum uerum est imbecillima, exceptis porcis domesticis, quibus exempti sunt testes. Nam illorum similis est totius corporis temperatura temperiei hominum, & urina similiter debilis. Verum montanorum aprorum ualida est, ut etiam ex ore apparet, qui utique acerrimus est. Hæc utuntur Hetrusci ad puerorum uermes, oleum suo in utriculo admiscentes, & in fumo tandiu suspendentes, donec crassescat ad mellis spissitudinem: deinde illud diligenter aspernit, eoque puerorum nares, tempora, & umbilicum inungunt magnò sanè successu: nam & ego sæpe periculum feci. Sed quauis Dioscorides complurium urinarum uires descripserit, ut quas uarijs, ac diuersis morbis utiles esse existimauerit; Galenus tamen urinarum medicamentis paruipendisse uidetur. Quippe qui crediderit (quem admodum & de sanguinibus differens inquit) cum parata reperiantur ualentiora medicamenta, ac experimento comprobata, præcipuè morbis congruentia, quibus urinam conferre nonnulli autumant, earum medicinas ad curiosos superstitionis spectare magis, quam ad peritos medicos, qui hæc nauseosa, incertaque remedia nunquam probatis, expertisque præponunt. Quod autem puerorum urina ægrè spirantibus conferat (ut Dioscorides autor est) minime probat Galenus, cum loco citato inquit. Vrinam pueri orthopnoæ uocata gratia ebibere necessarium non est, cum sint & alia medicamenta, quæ huic medeantur affectui. Quin cum bibisset quidam, affectu liberatus non est, ut non exitum quod ter alia possideat. Chrysocolle conficiendæ rationem, quam fieri ex puerorum urina prodidit Dioscorides, quæ sepiasarij, & aurifices uulgò Borrace nominant, duobus in locis scriptam reliquit Galenus libro ix. simplicium medicamentorum.

dicamentorum, ubi de ea speciatim egit, & lib. x. eorundem de urinis differens. Et quauis (ut libro quinto dicitur) legitima, probatq; chrysocolla fustia habeatur; sit tamen artificio ex pueri urina in ardentissimis solis caloribus aereo mortuario, atq; etiam pistillo arco tandiu circumacta, donec mellis spissitudinē assequatur. Præfertur, quæ hoc modo parata sit, ad contumacia ulcera sananda, exedentiaq; coercenda. Illud profectò uanum, ac fabulosum esse manifestè deprehenditur (ut hic Dioscorides scribit, & nos cum secuti superiori libro in succini mentione ostēdamus) quòd urina lyncis, simulac excernitur, duretur, coëctue in lapidem illum, quem Lyncurium uocant. Quippe quòd is inter succini genera ab omnibus fide dignis autoribus recensatur, quòd suæ proprietate naturæ pennas ad se trahat, quemadmodum & cætera succini genera paleas, festucas, ac leuissima quæq; alliciunt. Quantum uerò à legitimo lyncurio uigaris ille lapillus differat, qui officinis lapis lyncis appellatur, & cuius est usus apud seplasiarios, & medicos, qui simplicium medicamentorum scientiam negligunt, is djudicent, qui simplicium historias, & facultates optime norunt. Quæsi quidem is, quem pro fabuloso lapide lyncis uendunt impostores, lyncurium succini genus haudquaquam est, nec aliis quauis lapis ei uiribus respondens, nec si quidem urinam cieat, & renum, uel sicq; calculos comminuat, ut seplasiariorum, & medicorum uulgus opinatur: qui parum Dioscoridis, aliorumq; in re medica bonorum autorum famulatum curant. Sed hactenus de urinis, & lyncurio. Restat modò, ut etiam de Salina aliquid in medium afferamus. Itaq; cum eius non meminerit his libris Dioscorides, positiq; nonnullis humani corporis morbis opitulari, ea de eius uiribus, & facultatibus hic referam, quæ à Galeno libro decimo simplicium memorie produntur his uerbis.

Silon, siue sialon, siue ptyelon appellare libet, nihil interest. Verum id sciendum est, uim eius esse differentem, tum in animalium speciebus, tum in eorum unoquoq; sano, aut egroto, ieiuno, aut sitibundo, aut cibo, potuq; sumpto. Et enim in urina, & bilis, & sudor; sic etiam salina sumpto quidam cibo imbecilla est: ualida & acris eorum; qui ingenti aut media, aut siti premuntur. In medio utriusq; est eorum, qui probè cōcohere quidem, nondum tamen cibum potius inegerunt. Hac ergo salina nutrices puerorum lichenas curant, paruum uidelicet digitum rigantes, ac deinde cutē assectam confricantes. Idq; faciunt subinde, tanto scilicet intervallo, dum salina uires in lichene perdurent, ac nondum sint extinctæ. Sed & triticum mandentes rustici non pauci furunculis imponunt: Nam celeriter eos & digerit, & concoquit: cum si macerarent aqua, non eque prodesset. Ex quo liquet, salinam ipsam auxilij robur adferre. Atque corporibus mollibus, & puerorum, panem, non triticum imponunt ore commansum. Porro omnia sic commansa digerunt, & sugillata, ceteraq; ecchymomata, maxime ubi panis simul cum pauca radice fuerit commansus. Porro tota substantia uel maxime aduersa est salina bestiis hominibus interficientibus; ceterum alicubi etiam Nicander poeta refert. Pollicitis autem mihi quidam incantationem sese ostensuram, quæ scorpiones interficeret: ubi illa semel dixisset, in scorpionem expuit: inde rursum eam obmurmurans iterum scorpionem conspuuit: ac ubi tertio dixisset, atq; expuisset, mortuus est scorpion. At postea ego absq; incantatione à sola salina morientem uidi scorpionem, idq; celeriter passum à salina essentium, aut sitientium: tardè autem ab illis, qui cibo, potuq; fuerant impleti: in alijs autem proportionè.

Vana de lyncurio opinio.

Salina uires ex Galeno.

## MEL. MEL. Honig

## CAP. LXXV.

PRINCIPEM locum obtinet mel, quod Atticæ regionis est, præcipue ex Hymetto, mox Cydadibus insulis, & à Sicilia, cognomine hyblæum. Magis probatur dulcius & acre, odorati, subflauum, nec humectum, graue, & minimè fluxum, quod ob sequacem lentitiam non facile abrumpitur, tractumque resilit in digitos. Mel abstergendi vim habet: ora venarum aperit, humores euocat. qua ratione in fordida ulcera, sinusq; commodissime infunditur. Decoctum, atque impositum, abscedentem carnem glutinat: medetur imperigini coctum cum liquido alumine, & illitum: item aurium sonitui, & dolori cum fossili sale trito, tepidum instillatur: lentes, & scæda capitis animalia illitum necat: nudam glandem recutitis operit, præsertim quæ circuncisione aperta non est, si melle præputium à balneo triginta diebus emolliatur: oculorum caliginē discutit: faucibus, tonsillis, anginae collutum, gargarizatumue medetur: urinam cieat: auxiliatur tussi, & à serpente percussis: contra haustum meconium, cum rosaceo calidum assumitur: aduersus venena fungorū, & rabiosi canis morsus linctum, aut potum proficit. crudum tamen aluum inflat, tussim læcessit, & ea de re despumati vsus aptior est. Primatum tenet in mellis genere vernū, deinde æstiuum: hybernū uerò, utpote quod crassius constet, deterrimum reputatur, ceragini faciundæ idoneum. Quod in Sardinia gignitur mel, amarum est: quoniam apes inibi ablinthio vescantur.

quo vitia cutis in facie, & macula aptissime perunguntur. Heraclia in Ponto quibusdam anni temporibus, propria quorundam florum dote, mel conflatur: quod qui edere, mente abalienantur, ac sudore diffuunt. Remedio sunt elitata ruta, & balsamenta, aut epotum mulsū, resumpta, quoties vomitione reijciuntur. Acre autem est, & olfactu sternutamenta mouet. Quod cum costo illitum, seminatum cutem emendat, & cum sale sugillationes rapit. Est & aliud concreti mellis genus, quod saccharon nominatur. In India uerò, & felici Arabia in arundinibus inuenitur. salis modo coactum est, dentibus, ut sal, fragile: aluo idoneum, & stomacho utile, si aqua dilutum bibatur: vexatq; uescicæ, renibusq; auxiliatur. Illitum ea discutit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt.



Mellis confideratio.

Mel Hera-  
cleoticum.

Mellis genera  
non roscida.

Sacchari con-  
sideratio.

Manardi, &  
Fuch: opinio  
reprobata.

**MEL.** quod apes colligunt, omnibusq; uulgarissimum est (autore Galeno libro 111. de alimentorum facili-  
bus) oritur in plantarum folijs: carianq; neq; succus, neq; fructus, neq; pars, ullo pacto dici potest, sed eiusdem  
rore generis est: non tamen assidue, nec copiose, ut ille, prouenit: repertumq; est aliquando estate super arborum  
fruticum, herbarumq; folia mel quam plurimum, adeo ut agricolæ uelut ludentes canerent, Iupiter melle pluu. Cu  
subscribens Plinius libro 11. cap. 11. sic inquit. Mel ex aere uenit, & maxime siderum exortu, siq; præcipue  
silio splendente, nec omnino prius uergiliarum exortu sublucanis temporibus. Itaq; cum prima aurora arborum  
folia melle roscida inueniuntur. At si qui matutino sub dio fuere, unctas liquore uestes, capillumq; concretum sentit.  
Siue ille est cæli sudor, siue quedam siderum salua, siue purgantis se aëris succus, utinam esset & purus, ac liquidus  
& sue naturæ, qualis destituit primò. Nunc uero è tanta cadens altitudine, multumq; dum uenit sordescens, & ob  
terræ halitu infectus. Præterea à fronde, ac pabulis potus, & in uterculos congestus apum: ore enim hominum. At  
hæc succo florum corruptus, & alueis maceratus, totiesq; mutatus: magnam tamen cælestis naturæ uoluptatem  
fert. Ibi optimus semper, ubi optimorum doliolis florum conditur. Atticæ regionis hic, & Siculæ Hymetto, & Hy-  
bla ab locis, mox Calydna insula. Hactenus de melle Plinius citato loco. Verum enim uero (ut idem autor est libro  
XXI. cap. XIIII.) Mel, quod in Creta Carina monte colligitur, muscæ non attingunt, nec eo in monte eadem species  
reperiuntur. Porro uenenatum mel, quod in Heraclia Ponti prouenit, cuius hic meminit Dioscorides, Plinius quo-  
que recensuit libro antè citato, capite XII. Subiunxitq; & alterum eodem in Ponto gigni gente Sannorum, quod à  
insania, quam gignit, Mænomenon uocant. Id existimatur contrahi flore rhododendri, quo scatent syluæ. Hæc  
tur præterea & alia mellis genera, quæ roscida non sunt, sed ex plantis nascuntur, ut illud, quod ex anacardijs se-  
re Arabes scribunt, & inter Græcos Strabo Geographicorum decimoquinto ex arborum siliquis, quas arbores præ-  
ferunt, denorum digitorum longitudine, mellis plenas, quod qui ederint, non facile euadant. Quinetiam refert Pto-  
lemyus Mella tertio de situ orbis, tam pinguis alicubi, & tam feracis soli Indiam esse, ut in eo mella ex arborum fru-  
dibus defluant. Exprimatur etiãnum è uulgaribus siliquis, quæ Græcis νεμέτια dicuntur, quo tam Indi, quam  
Trogloditicæ Arabiam incolunt, gingiberis radices recentes uiridesq; asseruant, ac etiãnum myrobalani omni ge-  
nus. Quod facile coniicitur ex ijs, quæ ex Alexandria Aegypti Venetias quotannis comportantur. Ceterum  
desunt inter recentiores medicos, qui disputent, an Saccharum, quod sub mellis genere scripserunt ueteres, præter  
Dioscorides, & Galenus in India, & felici Arabia nasci, idem cum nostrate Saccharo dici possit. Et quamuis pen-  
reperiantur, qui dubio procul existiment, ac pro certo affirmant, communis usus saccharum, & quod ab antiquis  
scribitur, unum & idem esse, quod ex eadem proueniant planta; tamen Manardus Ferrariensis, & Leonardus  
chysius ipsam secutus, maximam inter ea ponunt differentiam, omnino opinantes in alio arundinum genere concretum  
antiquorum saccharum, de quo inter mellis genera scripsere Dioscorides, & Galenus: concresecq; adhuc  
usq; ex cælesti rore, quemadmodum & id, quod mannâ uocamus: non autem in ijs arundinibus, è quibus in aqua  
coctis huiusce ætatis saccharum in Medera, Sicilia, Creta, Rhodo, & Cypro insulis, ac etiam in Aegypto expro-  
tur. Quam in re eos uiros alioqui doctissimos, planè hallucinatos crediderim, quod nullo, ut puto, auctoris præ-  
torum testimonio ducti sibi persuasent, mannæ in modum ex rore concrecere antiquorum saccharum solis præter  
super arundinum folia tam in India, quam in felici Arabia. Quippe quod nusquam repererim scripsisse Dioscorides,  
Galenum, nec ueterum, uel recentiorum quenquam, concrecere saccharum in arundinum folijs ex rore solis præter  
concreto, siue potius exiccato, quemadmodum in quibusdam arborum frondibus mannâ per se concrecit. Quod  
mibi refellenda uideatur eorum sententia. Nam si uerum illud esset, ut ipsi imaginantur non modò non est credendum,  
sed ne cogitandum quidem, Dioscoridem, qui diligentissimè simpl. medicamentorum historiam literis, memoriæ  
dauit, silentio præterisse tam pulchrum, et admirabile, scituq; dignum naturæ opus in saccharo conficiendo. Ne-  
nus id reticuisse Galenus naturæ operum maximus indagator, quemadmodum nec reticuit libro tertio de alimentorum  
facultatibus, aërei mellis historiam, quod nos mannâ uocamus, quodq; sua ætate in monte Libano, alijsq; locis  
arborum frondes repertum scribit. Quamobrem magis ueritati consonum uidetur, ut dicamus, nil aliud ueteres  
saccharum

saccharum extitisse, quam nostratis sacchari arundinum lacryma, seu liquor, qui nimia succi copia aperto in latere calamo, perinde ac gummi, exterius concreuerit. Huic nostrae opinioni subscribit Plinius lib. xii. cap. viii. sic in-  
 quiens. Saccharon ex Arabia fert, sed laudatius India. Est autem mel in arundinibus collectum gummi modo can-  
 didum, dentibus fragile, amplissimum nucis auellanae magnitudine. haec Plinius. Ex quibus facile cognosci potest,  
 quod non ex rore, ut mannae euenit, coalesceret antiquorum saccharum super arundinum folia, sed quod fractis cala-  
 mis earum internodijs cohereret collacrymans, e quibus uulgare nostrum conficitur. Quandoquidem hoc modo re-  
 sine, gummiq; omnes scisso sui arboris cortice emanant. Alia praeterea hac accedit ratio, quae (ut equidem arbitror)  
 Manardi, ac Fuchsij sententiae prorsus aduersatur. Nam quemadmodum in Apulia, et Calabria manna a sole tacta  
 dum arborum inheret folijs, paruo temporis intervallo in auram euanescit (ut libro primo diximus in mannae men-  
 25 tionem) eadem sane ratione id saccharo euenisset, si ex rore (ut ipsi contendunt) concreveret. Siquidem a sole tactum,  
 rarefactumq; facile dissilisset in auram, nec gummi modo concreuisset. Eoq; magis, quod nusquam legerim in Dio-  
 scoride, nec Galeno, saccharum e folijs arundinum colligi, sed in ipsis calamis concretum reperiri. Quod etiam testa-  
 tur Strabo lib. xv. Geographiae, ubi aperte scribit, in India arundinem mel sine apibus gignere: non autem quod ex  
 rore in arundine fiat, ut quidam peruicax, ignarusque medicus mecum contendere, atque etiam, ut suam mordicus  
 teneret opinionem, Strabonis codicem corrumpere non est ueritus. Praeterea ciam memoriae prodiderint Diosco-  
 rides, Galenus, et Plinius, antiquorum saccharum durum esse, salis modo coactum, album, dentibus fragile; ex  
 his coniectare licet, e rore saccharum nequaquam fieri. Quippe quoniam manna, quae eodem modo e rore concre-  
 scit, sal minime refert, nec dentibus fragilibus deprehenditur, sed potius mandentibus tenax, et cere modo lentescens.  
 Quare crediderim antiquis saccharum fuisse tenuiorem, ac praestantioris illius partem in arundinum saccharife-  
 30 rarum medulla, quae per internodiorum fissuras exiens solis calore concreuerat, ut et saccharum nostrum calore  
 ignis arte concrescit, et addensatur. Quod cum accuratissime perpendissent homines, liquorisq; praestantiam agno-  
 uissent, a natura edocti hoc arte se facturos existimarunt. Neque id incassum attentasse uidentur, quandoquidem sac-  
 chari integros calamos assidentes, minutimq; incidentes, ignis calore tandiu decoxerunt, donec uniuersus liquor,  
 absumpta igni aqua, du effervescebat in saccharum salis modo in uasis fundo concreuerit. Verum etsi sacchari arte fa-  
 cti nihil meminerint Dioscorides, et Galenus; non desunt tamen qui dicant, hoc etiam ante eos factum esse. Solini au-  
 thoritate freti, qui in Indiae palustribus arundinem ita crassam progigni ait, ut fissis internodijs lembi uice uertit et na-  
 uigantes, e cuius radicibus dulcem etiam exprimunt humorem ad mellis suauitatem. At qui liquorem hunc, qui ex  
 40 harum cannarum radicibus elicatur, saccharum nostri usus fuisse existimant, procul dubio falluntur. quod Indi non  
 modo ex decoctis cannarum; sed aliarum quoque arborum radicibus sibi potus parent; cum illius caeli et soli cle-  
 mentia frequentissima sint plantarum radices, quae mellea dulcedine imbuuntur, ut Strabo testis est loco nuper citato,  
 ubi sic inquit. Nullus annus in India inuenitur utroque tempore sine pluuia. Quapropter contingit annum fera-  
 cem esse, cum semper terra sit foecunda: fructus autem arborescos multos gigni, arborumque radices, praesertim ma-  
 gnarum arundinum, et natura, et decoctione dulces esse, aqua a solibus tepesacta, tam caelesti, quam fluuiali. A-  
 deo quod ea, quae apud alios et fructuum, et succorum maturitas dicitur, apud illos concoctio est: quae tantum  
 ad dulcedinem operatur, quantum ea, quae per ignem fit. Sententiae nostrae Lucanus quoque suffragatur, illud ex-  
 plicans hoc carmine.

Antiquorum  
saccharum.

Facitij saccha-  
ri inuenio.

Aliquorum  
lapis.

Quae bibunt tenera dulces ab arundine succos.

Quin etiam Marcus Varro, qui eodem fere tempore claruit, his tribus uersibus attestatur, dum inquit.

Indica non magna nimis arbore crescit arundo;

40 Illius et lentis premitur radicibus huior;

Dulcia cui nequeant succo contendere mella

Ex ijs palam est, hos omnes de facitij Indorum potionibus, quae ijs uini loco sunt, fuisse locutos: non autem quod ex  
 illis cannarum radicibus saccharum aliquod pararetur. Quandoquidem et nos e glycyrrhizae radicibus, quin et  
 e decoctis, presijsq; siliquis, sicut et alij e dactylis, dulces elicimus succos ad uarij usus potationes. quemadmodum et  
 occidentales Indi e pluribus dulcibus arborum fructibus suos sibi parant potus. Sed non ob id dicendum hos liquores,  
 quod mellis dulcedinem praestent, esse mel, neq; saccharum. Nec mirum sane si Indiae arundines radicibus dulcissimum  
 prebeant succum non modo ille magnae; sed etiam quae ibi nascuntur nostris fortasse non multo grandiores: cum etiam  
 nostrates recentes mansae quadantenus ori dulces sentiantur. Quod autem minores arundines in India radicibus dul-  
 ces prebeant potus, superiore carmine explicauit abunde Lucanus: cui non magna nimis est arbor. In hoc tamen a  
 50 Solino dissentit: cui arundines, quarum meminit, uastissimae sunt proceritatis. Hinc ergo eorum sententia explodenda  
 uidetur, qui credunt ex illarum magnarum arundinum radicibus, saccharum nostro similis factitasse Indos, quod  
 non quidem saccharum, sed dulces inde potus uini loco sibi conficiant. Sed ut suam opinionem auctoritatibus fulci-  
 ret Manardus Ferrariensis, utq; lucidius comprobaret antiquorum saccharum, perinde ac mannā, ex rore fieri, libro  
 x. cap. v. Auicennam etiam admittit, quem tamē alijs ubiq; reiecit, ac reprobauit, asserens, quod ciam ipse huius suc-  
 ci sententiae, ultimo capite libri secundi antiquorum saccharum mannā uocauit, cum inquit. Zuccharum albusar est  
 manna cadens super albusar, et est sicut frusta salis. At nos, qui huic opinioni minime adstipulamur, dicimus Albusar,  
 seu Albasser (ut Bellunensis castigauit) nullo pacto Arabica lingua arundinem significare, sed aliam Aegypti, et  
 Arabiae arborem, sic ab eius loci indigenis appellatam: quandoquidem Arabes (ut testatur Serapio) arundinem Ca-  
 sab dicunt. Quod manifeste declarat zuccharum albasser apud Auicennam huiusce arboris esse mannā, uel gummi;  
 non autem Graecorum saccharum in calaminis concretum. Illud insuper nostram comprobat sententiam, quod eodem

Manardi ra-  
tio infirma.

loco addidit Auicenna, sic inquit. Et in zuccharo quidem albus est cum abstersione pauca, stipticis, & a-  
tudo. Siquidem austeritatis, & amaritudinis, quæ in antiquorum saccharo fuerint, nusquam meminere Dioscoride,  
& Galenus: nec item quod conferret id pulmone, & aque intercuti, ut paulo infra uoluit Auicenna. Qui cõ-  
rit deinde zuccharum hoc oculorum morbis, pariterq; renum, & uesicæ utriusq; auxiliari; non tamen ob hoc da-  
teft, zuccharum alhaffer esse antiquorum saccharum. Sed rectè quidem contra Manardi sententiam, Auicennæ to-  
monio (cùm & ipse hoc in loco Auicennæ auctoritate nitatur) probari potest, quod antiquorum saccharum gumi  
modo collactrymans in arundinibus concrefceret, non autem ex rore. Quippe quod is de zuccharo agens loco m-  
citato, ibiq; antiquorum saccharum recensens, inquit. Assumptum sicut gummi ab arundine abstergit oculum. Qu-  
bus palam fit, antiquorum saccharum, perinde ac gummi, ab interiori medulla exterius emanasse, ibiq; postmodum fe-  
lis ardoribus concreuisse. Verian enim uero quod alhaffer apud Arabes sui generis arbor sit, & ab arundine m-  
me differat, & quod eius zuccharum, quauis ab Auicenna manna dicatur, quod fortasse granulis concrefcat man-  
similibus, ex rore haud quaquam fiat, sed gummi modo ab arbore destillet, manifestè ostendit Serapio capite de sa-  
charo his uerbis. Alhaffer habet lata folia, & habet zuccharum, quod egreditur ab oculis ramorum suorum, & i  
locis foliorum eius, & colligunt de eo homines rem conuenientem, & in zuccharo eius est amaritudo, & egredietur  
ab hac planta mala quedam, sicut testiculi camelorum, è quibus liquor quidam emanat adurens, septicusq; facili-  
ad cauteria peridoneus. Et lignum quidem Alhaffer est leue, crassum, rectum, pulchrumq; & ideo a similitudine  
cantilenarij in cantilenis suis brachia, & crura dominarum ligno eius. hæc Serapio. Ex quibus facile et Manardi  
& Fuchsius, uiros alioqui doctissimos, hac in re hallucinatos putauerim. Ceterum Fuchsius, ut probaret anti-  
rum saccharum è roscido celi succo in calamis concrefceret, utq; illud à nostrate diuersum ostenderet, dicit, quod  
cùm nostri usus saccharum, perinde ac mel, calidum reperitur, sitimq; facile concitet, antiquorum saccharum e-  
non potest, eo quod Galenus sue ætatis saccharum id efficere non prodiderit. Cuius tamen sententia (pace sue-  
xerim) experimento minime respondet: à quo non discedens Galenus lib. vii. simpl. medic. de saccharo ita scribit.  
Sacchar, quod ex India, atq; felici Arabia conuehitur, in calamis, ut aiunt, concrefcat, et ipsum mellis est species: mi-  
nus certe nostrate dulce, sed ad similes ei uires obtinens, quod ad abstergendum, desiccandum, & digerendum aui-  
Porro quatenus nec inimicum stomacho est, ceu nostras, nec sitim asserens, eatenus ab illo substantia differt. Quæ  
Galenus uerbis clarum est, quod cùm saccharum melle minus sit dulce, minus etiam calidum sit necesse est. Eaq; pro-  
pter asserit Galenus, saccharum non perinde ac mel, sitim excitare: non tamen quod nulla ab eo sitis excitetur, ut  
Fuchsius interpretari uidetur. His igitur rationibus, & auctoritatibus adductus sum, ut certò crediderim, antiqui  
saccharum ab iisdem arundinibus emanare, à quibus uulgare nostrum exprimitur: sed hanc tantum inter se dif-  
ferentiam esse, quod à natura factum sit nostrate factitio longè tenuius. Ideoq; Auicenna: Zuccharum (inquit): ab-  
zed frigidius est, & subtilius. Hoc laudibus extulit Paulus, et post ipsum Auicenna Archigenis auctoritate Sal Indum  
ipsum appellans, ad lingue scabritiem, ariditatemq; in acutissimis febribus: tametsi eo hac ætate careamus, quod ap-  
pius non afferatur. Id autem non alia de causa euenire existimamus, quàm quod hodie paucum admodum proueniat.  
Siquidem Dioscoridis, & Galeni tempore, quo ad eos copiosum conuehebatur, cùm adhuc non innotuisset exprimi  
ratio, necesse quidem erat, ut arundines sacchari liquore prægnantes, cùm annis compluribus adoleuissent, & facta  
nunquam expertæ essent, per se liquorem exudarent, ueluti innumeris arboribus gummi, & resinæ emanant. Proinde  
non mirum, si eius à natura facti antiquis fuerit ubertas. Sed postquàm lucra dulcedo, fulgentisq; auris sitis docet ho-  
mines artem modumq; quo saccharum concisis, decoctis, pressisq; arundinibus copiosius elicerent, factum est, ut læt  
quotannis uniuersos inciderint calamos, ac iterum quotannis seuerint. Hinc igitur euenit, ut nullæ remanentibus, quæ  
saccharo plurium annorum ætate turgeant, naturæ impedita sit operatio, deperditumq; hac de causa sit antiquorum  
saccharum. Cuius uice eo recentiores utuntur, quod officinæ candidum cognominant, arte factum, pellucidum, sitis  
fositij modo, dentibusq; fragile, ut antiquorum saccharum undequaq; referat. Competit perinde ac illud, scabritie  
lingue, pectorisq; asperitatibus. Verum ad hæc id præstantius est, quod in fistilibus, ubi uiolaceum liliapum affec-  
tur, æstate concreuit, eo quod uiolarum diluti facultate humectet, leniatq; magis.

Alhaffer quid  
ex Serap.

Fuchsi opin.  
reprobata.

Sal Indum.

Sacchari can-  
didum.

Κηρός. CERA. *Μουρφο*

CAP. LXXVI.

CERA optima est subfulua, suppinguis, pura, odorata, & halitum quadantenus melleum refe-  
rens, natione Ponticæ, aut Creticæ. Secundum locum obtinet candicans, & suapte natura pinguis.

Candida fit hoc modo. Ex ea radunt album, syncerumq; atque transfundunt in uas, quod satis  
habeat marinæ ex alto petitz, insperfoque nitri momento, decoquunt: cùmque iterum, tertio in  
ferbuit, separatam uas refrigerant, ac ceræ pastillum eximunt, deterfâ sordē, si qua fortè adhæsit: tū  
denuo indita noua maris aqua feruet, uti retulimus: & uase dempto ex igne, fundum ollulæ noz  
aqua frigida madefactum, in ceram summam suspensâ manu intingunt, quod celerius concrefcat, &  
quàm minima portio extrahatur. Suscepto primo ceræ orbiculo, iterū uasis imum aqua refrigera-  
tum, tantisper in ceram immitti debet, dū tota excipiat. Orbiculi lino confuti, interuacante spa-  
tio suspenduntur, & interdiu continuò sub sole, noctu sub luna asperguntur, usq; dum perfectè al-  
bescant. Verum si eximius ille candor desideretur, eadem factitari, & identidem recoqui opere pre-  
tium est. Nec desunt, qui pro marina, in muria quàm acerrima semel, aut iterum excoquant: dein  
laguncula tenui, rotunda, ansam habente extrahunt: postea orbiculos substrato affatim cespite her-  
bofo, insolant, donec candorem summum contraxerint. Præcipiunt hoc obeundum munus uerè  
cū



cum soli remissa vehementia humorem pariat, ut non facile liquetur. Cera omnis molli, calfacit, modice explet corpora: datur in sorbitione dysentericis. ac milij magnitudine decem grana ceræ hausta, lac in nutritibus non patiuntur coagulari.

**CERA**, ut Galenus scriptis mandavit libro VII. simplicium medicamentorum, medio quodammodo tenet cal-  
 10 ficientium, refrigerantium, humectantium, & desiccantium. Habet uero quiddam etiam crassarium partium, atq; em-  
 plasticam. quamobrem non modo exicare, sed & per accidens humectare uideri fortassis poterit, per spirationes ui-  
 delicet prohibens. Quapropter aliorum medicamentorum tam ex calfacientium, tum refrigerantium materia est. Ip-  
 sa etiam per se ex genere fuerit debiliter concoquentium: nec tamen intro in corpus assumpta, sed foris imposita. Si-  
 quidem paulum quiddam digerentis, calideq; facultatis retinet, quæ plurima melli inerat.

Ceræ vires ex  
Galenio.

Propolis

PROPOLIS

Propolis

CAP. LXXVII.

**PROPOLIS** eligi debet flaua, odorata, styracem referens, in vehementi ac iditate mollis, & ma-  
 fliches more ductilis. Magnopere calfacit, & euocat: aculeos, & omnia infixæ corpori extrahit: in  
 veteretusi suffita proficit: impetigines admota tollit. Ea in alueariorum foribus, cerosæ naturæ  
 inuenitur.

**QUANTUM**, ut hic Dioscorides inquit, & Marcus Varro libro tertio de re rustica, Propolis ea est ceros-  
 20 sa materia, quæ in aluarijs præ foribus reperitur, seu ut apertius dicam, præ spiraculis, ubi intrandi, exeundiq; apibus  
 patet editus: tamen Plinius lib. XI. cap. VII. ita scriptum reliquit. Prima fundamenta comosin uocant periti, secunda  
 pissoceron; tertia propolis. Inter coria, cerasq; magni ad medicamina usus. Comosis crusta est prima, saporis amari.  
 Pissoceros super eam uenit picantium modo, seu dilutior. Cere initium, plerumq; emittit gumi. Propolis crusta  
 floris iam materia, additis floribus, nondum tamen cera, sed fauorū stabilimentum, quæ omnes frigoris, aut iniuriæ adi-  
 tus obstruantur: odore & ipsa etiamnum graui, ut quæ pleriq; pro galbano utantur. Huius etiam meminit Gale-  
 nus lib. VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Propolis extergentis, non ita ualentis est facultatis, cete-  
 riarum admodum ualenter attrahentis: est enim essentia tenui. Porro ex calfacit recessu secundo completo, aut certe ter-  
 tio incipiente. Et ut idem quoq; scribit libro III. de compositione medicamentorum secundum genera, Propolis ual-  
 lentius attrahit, quam cuiusvis generis resina. Quamobrem illi in nervorum uulneribus mederis propolin admiscet.

Propolis con-  
sideratio.

Ceteriam cion propolis, cera, & mel, de quibus hic differuit Dioscorides; medicamenta sint omnia mirò artificio ab  
 30 apibus conflata, non ab re his quoq; addendam fore duximus Apum historiam. Apes igitur (ut Plinius autor est) sunt  
 & rustice sylvestresque, horride aspectu, multo iracundiores, sed opere ac labore præstantes. Sunt & urbane, quæ  
 rum duo genera. Optime breues uariæq; & in rotunditatem compactiles. Deteriores longæ, & quibus similitudo  
 uesperum, etiamnum deterrime ex ijs pilosæ. Apes odere fædos odores, proculque fugiunt, sed & infectos. Ita-  
 que unguenta redolentes infestant. Icientes pereunt: relicto enim aculeo: interiora disrumpunt. Quin & morbos  
 suapte natura sentiunt. Index eorum tristitia torpens: & cum ante fores in teporem solis promotis alie cibos mini-  
 strant: cum defunctas progerunt, funerantiumq; more comitantur exequias. Reges habent, pluresq; inchoantur,  
 ne desint. Postea ex his soboles cum adulta esse cœpit, concordis suffragio deterrimos necant; ne distrabant agmina.

Propolis ui-  
res ex Gal.

Duo corum genera: melior rufus, quam niger, uariisq;. Omnibus forma semper egregia, & duplo quam cæteris  
 maior: penne breuior, crura recta, ingressus celsior: in fronte macula quodam diademate candicans. Multum et-  
 40 tiam nitore à uulgo differunt. Cion rex procedit, una est totum: exanem, circaq; eum conglobatur, cingit, protegit,  
 cerni non patitur. Reliquo tempore cion populus in labore est, ipse opera intus circuit, similis exhortanti, solus im-  
 munis. Circa eum satellites quidam, lictoresq; assidui custodes auctoritatis. Procedit foras non nisi migraturo exani-  
 me. Id multo intelligitur ante aliquot diebus murmurare intus strepente, apparatus indice diem tempestuum eligenti.  
 Si quis clam ei detruncet, non fugiet exanem: eum processere, se quæq; proximam illi cupit esse, & in officio con-  
 spici gaudet. Fessum humeris subleuant: ualidius fatigatum ex toto portant. Si quæ lassatus desicit, aut forte aberrat  
 me, odore prosequuntur. Ubicumq; ille consedit, ibi cunctarum castra sunt. Duce prehenso totum tenetur agmen:  
 casso dilabatur, migrantq; ad alios. Esse utiq; sine rege non possunt. Inuitæ autem interimunt eos, cion plures fue-  
 re, potiusq; nascenti domos diruunt. Rege consumpto, mæret plebs ignauo dolore: non cibos conuehiunt, non pro-  
 cedunt, sed tristi tantum murmure glomerantur circa corpus eius. Subtrahitur itaq; deducta multitudine: alias spe-

Apum confi-  
deratio.

Apum rex, &  
regimen.

50 cientes exanem luctum non minuunt. Tunc quoque ni subueniatur, fame moriuntur. Gaudent Apes æris plauis  
 suæ, ac tinnitu, amensumisq; locis, & fragrantibus herbis. Harum erga causa prope aluaria oportet ferere thymum,  
 apurum, rosam, uioletas, liliū, cyrtisum, fabam, eruliū, cunilam, papauer, conyzam, casiam, melilotum, melisso-  
 phylum (malum legere myriophyllum) cerunthe. Est autem cerinthe folio candido, incuruo, cubitali, capite concav-  
 o, mellis succum habente. Harum florum audissimæ sunt, atq; etiam synapis. quod miramur, cion oliuæ florem ab his  
 non attingi constet. Ideoq; hanc arborem procul esse melius est, cion aliquas quæ proxime feri conueniat: quæ &  
 euolantem exanem inuitent, nec longius abire patiantur. Cornum quoq; arborem cauere oportet: nam flore eius  
 destituta (etsi is nobis profluvia sistat) aluo concita moriuntur. Remedium sorba confusa e melle præbere ijs, uel  
 hominum, uel bouum, aut grana panici mali amineo uino confersa. Amant & genistæ circumscripti aluarijs,  
 & graminum. Mira apium prudentia, earumq; operis obseruatio, ut annotauit Aristomachus Solensis, quem  
 ababili admodum diligentia duodesexaginta annis, apium amore captum, nihil aliud egisse tradunt. Ratio autem

Apes quibus  
gaudeant.

Mira apum in  
opere suo in-  
dustria.

operis ita se habet. Interdum statio ad portas more castrorum; noctu quies in matutinum, donec una excitet omnes gemitu, aut triplici bombo, ut buccino aliquo. Tunc uniuersae prouolant, si dies mitis futurus est. Prædunt enim cunctos uentos, imbresq; & tunc se continent tectis. Itaq; temperie celi (hanc enim inter præscita habent) cum agmina ad opera processit, aliæ flores aggerunt pedibus, aliæ aquam ore, guttasq; lanugine totius corporis, quibus est. Quærum adolescentiores ad operam exeunt, & supradicta conuehunt: seniores intus operantur. Quæ flores comperant, prioribus pedibus femina onerant, propter id natura scabra, pedes priores rostro, totaq; onusta remeant: semina pandatæ. Excipiunt eas ternæ aut quaternæ, atq; exonerant. Sunt enim intus quoq; officia diuisa: aliæ struant, aliæ poliunt, aliæ suggerunt, aliæ cibum comparant ex eo, quod allatum est. Neq; enim separatim uescuntur, ne uel qualitas operis, & cibi fiat, & temporis. Struunt orsa ea concameratione aluei, texturq; uel usque ad summam tecta deducunt, limitibus binis circa singulos arcus, ut alijs intrent, alijs exeant. Fauæ superiore parte affixæ, & paululum etiam lateribus simul hærent, & pendent unæ. Alueum non contingunt, nunc obliqui, nunc rotundi, qualiter poscit alueus, aliquando & duorum generum, cum duo examina concordibus populis dissimiles habere uideant. Ruentes ceras fulciunt, pilarum intergerinis à solo fornicatis, ne desit aditus ad sarcendum. Primi fræ tres uersus inanes struuntur, ne promptum sit quod inuitet firantem. Nouissimi maxime implentur melle: ideoq; auerso dum fauæ eximuntur. Gerulæ secundos status captant. Si cooriatur procella, apprehensi pondusculo lapilli se libant. Quidam in humeros eam imponi tradunt, iuxta uero terram uolant in aduerso statu uepribus hebetato. Mira obseruatio operis. Cessantium inertiam notant, castigant, mox & puniunt morte. Mira munditia. Amolium omnia in medio, nullaq; inter opera spurcitie iacent. Quin & excrementa operantium intus, ne longius recedant, unum congesta in locum, turbidis diebus, & operis ocio egerunt. Cum aduersperascit in alueo strepunt minus, ac minus, donec una circumuolet, eodem quo excitauit bombo, seu quietem capere imperans: & hoc castrorum more. tunc repetite omnes conticescunt. Si forte fortuna apum uniuersum perderetur genus, facile reparari posset ex huius titulo, ut libro IIII. Georgicorum clare docuit Virgilius, ita canens.

Apum repara-  
tio ex Virgil.

Exiguus primium, atq; ipsos contractus ad usus  
Eligitur locus: hunc angustiq; inbrice tecti,  
Parietibusq; premunt arctis: & quatuor addunt  
Quatuor a uentis obliqua luce fenestras.  
Tum uitulæ bina curuans iam cornua fronte  
Queritur: huic geminae nares, & spiritus oris  
Multa reluctanti obstruitur: plagisq; perempto  
Tunsa per integram soluuntur uiscera pellem.  
Sic positum in clauso linguunt: & ranea costis  
Subijciunt fragmenta, thymum, castiasq; uirentes.  
Hoc geritur zephyris primium impellentibus undas.  
Ante nouis rubeant quam præta coloribus, ante  
Garrula quam tignis nidum suspendat hirundo.  
Interea teneris tepefactus in osibus humor  
Aestuat: & uiscenda modis animalia miris,  
Trunca pedum primò, mox & stridentia pinnis  
Miscuntur: tenuemq; magis, magis æra carpunt:  
Donec, ut æstiuis effusus nubibus imber,  
Erupte: aut ut neruo pulsante sagitte,  
Prima leues ineunt si quando prælia Parthi.

De reparatione Apum hætenus Virgilius. Ceterum etiam apes in medicina usum habent: siquidem sicce & in puluerem contrite, ijs admiste, quæ ad id faciant, ex oleo, & cera inunctis alopecij capillum restitunt.

Fugos. TRITICVM. *U. myb.*

CAP. LXXVIII

OPTIMA è tritici generibus ad secundæ valetudinis usus habentur, quæ recentia, & iam perfectè adulta, colorem luteum referunt. dein sequuntur trimestria, quæ nonnullis sitania nominantur. Itaque cruda in cibis teretes tineas gignunt: canum moribus prosunt, mansa & imposita. Confectus eorum similagine panis, plus alit, quàm cibarius: E' trimestrium farina panis, leuiorem cibum præbet, & qui faciliè in mēbra demandetur. Farina eorum cum hyoscyami succo illinitur aduersus neruorum fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant: item contra interaneorum inflammationes: lentigines ex aceto mulso tollit. Furfures autem in acri aceto decocti, turgentes mammas sedant: viperarum ictibus auxiliantur: & torminosi prosunt. Farinaceum fermentum calfaciendi, extrahendique vim habet: priuatim callos pedum, clauosque extenuat: & cætera tubercula furunculosque ex sale concoquit, & aperit. Sitaniorum farina, contra venenatos ictus cum aceto, aut vino commodissimè illinitur: eadem si decocta in glutini modum delingatur, cruentis excretionibus proderit: contra tussim, & exasperatas arterias, cum mentha & buryro decocta, efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsa, aut hydrelæo decoquatur, omnem discutit inflammationem. Panis & crudus, & coctus cum aqua mulsa inflammationes omnes illitu mulcet; cum emolliat, & quad-

## TRITICVM.



tenuis refrigeret: sed herbis, succisue huic rei accom-  
modatis admisceatur. Vetus panis aridus, adiectis co-  
nvenientibus, citam aluum cohibet. Recens muria ma-  
ceratus, illitu vetustas impetigines sanat. Glutinum  
ex similagine, & polline, quo chartæ glutinantur, fan-  
guinem excreantibus prodest, si liquidius, ac tepidum  
cochlearis mensura detur sorbendum.

TRITICI genera (ut Theophrastus autor est lib. VIII. cap. XIII. de plant. historia) plura notantur, cognomina ex lo-  
cis sortita, ut Africum, Ponticum, Thracium, Asyrium, Aegy-  
ptium, Siculum: quæ & colore, & magnitudine, & specie, &  
proprietas inter se differunt. Quædam uel aliunde cognomina  
sortiuntur pro suis uiribus tum alijs, tum uel maxime quæ ad ci-  
bum pertineant, ut cachrydian, stengys, alexandrinus. quorum  
omnium differentias in supradictis colligere licet: Nec uero ab-  
re fuerit, si illa quoque pro differentijs capies; & aliud præ-  
cox, aliud serum: et aliud auctu amplum multumque reddens, aliud  
icuum quoddam parumque ferens: & aliud spicam grandiorē  
effundens, aliud paruum: & aliud diu in folliculo manens; aliud  
aptum breui absolui, ut Africum: & aliud culmo tenui constans,  
aliud crasso, quod etiam ipsum Africo datum est: crasso tamen  
& cachrydian dictum consistit. Item aliud tunicis paucis; aliud  
multis uestitur, ut Thracium: & aliud unicalanum, aliud multi-  
calanum, & magis, minusque. Adde etiam si quid aliud his, aut  
predictis, ratione uirium proximum est: eiusmodi namque differē-  
tiæ naturaliores profecto appareant. Quibus & trimestrium  
annumerari genus par est, & bimestrium, & si quid intra paucio-  
res dies ualeat consumari, ut in Eubœa genus quoddam intra qua-  
draginta dies crasari, perficique posse affirmant: idemque firmum

Tritici gene-  
ra ex Theo-  
phrasto.

esse, ac ponderosum, nec trimestris modo leue. Quamobrem famulis id præberi inquit: etenim nec multum in hoc  
furfuris esse uolunt. Igitur genus id celerrimum quidem ad consumationem, sed inuentu rarissimum est. Et bimestria  
uero quædam habentur, quæ ex Sicilia et in Achaiam aduecta sunt: sed hæc paucum reddunt, parumque; fecunda ha-  
bentur: quanquam cibo facilia, & iucunda sunt. Nascuntur & alia quædam genera in Eubœa, & præcipue apud  
Corinthum. Trimestria uero permulta, & ubique habentur: leuia hæc, & parum fecunda, unicalana sunt, atque in totum  
informa. Leuissimum igitur triticum, quoad simplici ratione agere licet, Ponticum est: ponderosius ex ijs, quæ in  
Græciam aduehi solent, Siculum datur. Sed eo ponderosius, quod Boeotia fert. Indicum asserunt, quod athlete, qui  
Boeotie ternos semisextarios uix possint consumere, cum Athenis fuerint, facile quina consumunt. Leue satis &  
quod in Laconico agro conficitur. Horum igitur causa in terris cæloque intelligi debet. Nam & Asia ultra Bactra  
quodam in loco adeo grande frumentum fieri tradunt, ut nucleis oliuæ sua equiparent magnitudine grana singula. In  
Pissoris autem dictis adeo firmum nasci affirmant, ut si quis plus comederit, disrumpatur necesse sit. Hactenus de triti-  
ci generibus Theophrastus. Ceterum Plinius Italicum nostrum omnibus prætulit libro XVII. cap. VII. his uerbis.  
Tritici genera plura, quæ fecere gentes. Italico nullum equidem comparauerim candore, ac pondere, quo maxime de-  
cernitur. Montanis modò comparatur Italiae agris externum. Hæc fuisse sententia Alexandro magno regnante, cum  
clarissima fuit Græcia, atque in toto terrarum orbe potentissima: ita tamen, ut ante mortem eius anni sexcentum qua-  
draginta quinque Sophocles poëta in fabula Triptolemo frumentum Italicum ante cuncta laudauerit, ad uerbum  
translata sententia.

Triticum Ita-  
licum.

Et fortunatam Italiam frumento canere candido.

Que laus peculiaris hodie Italico est. Quo magis admiror posteros Græcorum, nullam mentionem huius fecisse fru-  
menti. hæc Plinius. Nec sanè mirum uideri debet, quod Græcus ille Sophocles Italicum frumentum ceteris prætu-  
lerit. Quandoquidem natura Italos adeo præ ceteris adamauit, & moribus, ac legibus, omni-  
que ornatu ad politicæ (ut  
ita dicam) uiuendam instituit, ut merito etiam frumentum omnium præstantissimum in eorum alimentum procrearet:  
quænammodum & alia multa, quibus Italia plerasque superat gentes. Triticum autem, ex quo omnium optimum  
se panis, eligi debet fractu contumax, densum, graue, colore aureum, lucidum, leue, trium mensium, maturum, mun-  
dum, pinguique terra ortum. Nam plerumque euenit (teste etiam Galeno libro primo de alimentorum facultatibus) ut  
quod foris flauum, densumque apparet triticum, intus rarum, laxum, albumque conspiciatur, quod utique plurimum  
furfuris habet. Quo fit, ut panes furfuracei inde confecti infirmum non modò præbeant alimentum; uerum etiam  
matriculum ipsam excrementis repleant. Farina porro ea ceteris præstat, quæ non ad suum molitum, non no-  
ua, non longi temporis, & crassi furfuris fuerit. Nam quæ superflue molitur, furfuraceos facit panes: & quæ re-  
centior est, adscititiam mole caliditatem retinet: quæ uero iandiu molita fuit, puluere, situ, carie, aut utroso ali-  
quo

Tritici ele-  
ctio, & panis  
optimi confi-  
ciendi ratio.

quo odore labefactatur. Hæc deinde, dum fit panis, optime est associanda aquæ, eaque subigenda, que fluere: laudatissimis fontibus, pellucida sit, non palustris, neque cœnum, aut limum redoleat. Quinetiam fermentum ascendens fuerat triticeum, non antiquum, mediocris quantitatis, ne inde ipsius abundantia panis acorem contrahat. Insciendum est & salis albi parum, ut panis sapidiior efficiatur. Post hæc farina ita subacta, optime manibus fitur: mox massa illa in panes mediocris magnitudinis digeritur, qui postquam abunde creuerint, & fermentum ferunt, in clibanum prius æqualiter calefactum, dein à cineribus, & prunis expurgatum decoquendi mittuntur. Sed furnus iustæ capacitatis sit oportet, ut quantitati panis proportionem respondeat. Quippe quæ in modico clibano panum quantitas in amplum clibanum missa exiccatur, ac comburitur: ita & magna in angusto sinu coquebatur, et decoqui nequit. Quamobrem panes (dicebat Galenus citato loco) ad concoctionem probatissimi sunt, qui peritum fermentati, & probe elaborati in clibano igne moderato percoquantur. Nam profusior ignis primo statim incursu adurens, exteriori superficiem in testæ modum indurat, crudis incoctisq; remanentibus interioribus panis. Unde accidit, panem hunc visu iniucundum fieri, & duplici nomine prauum. quod interne crudus sit, atq; illaboratus: externe uero siccus, & præassatus. Qui autem longiore spatio undiq; æqualiter præassatur, hic & probe in reticulo concoquitur, atq; ad actiones, quæ coctionem consequuntur, accommodatissimus redditur. Triticeus enim griseus facile degenerat in lolium: præsertim eum annus pluuuus, frigidusq; aduenerit, ut in lolij mentione latius dicetur.

Oleum è tritico.

Tritici uires ex Galeno.


Fit è tritici granis inter ferri laminas igne calefacti compressis oleum, quod ad ulcerum sinus commendatur. Scitandum, qui eo utantur ad pedum, & manuum rimas, quas frigus excitauerit: item ad asperam cutim leuigandam. Meminit tritici Galenus libro viii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Triticum ut medicamentum præpositum, primi est ordinis excalfacientium: non tamen nec resiccare, nec refrigerare manifestò potest: tamen uero etiam quiddam viscosum, & obstruens. Porro quod ex eo conficitur amyllum, eo tum frigidius est, tum siccat. Quod uero ex pane fit cataplasma, uim habet magis digerentem, quam quod ex tritico: nimirum cum & siccum, & fermentum panis adiuncta habeat: quippe cum fermentum uim habeat attrahendi, digerendiq; ea, quæ in se continent. Et primo de facultate alimentorum: in cibum assumptum (inquit) ægrè concoquitur, flatu excita, laborem uentriculo infert, & caput uaporibus tentat.

Hordeum.

HORDEVM.

CAP.

LXXIX.



Hordei consideratio.

HORDEVM est candidum, purumque. Id minus, quam triticum alit. Præfana tamen obcremorem in decoctione redditum, plus alimenti præbet, quam polenta ex hordeo facta. contra acrimonias, atque gutturis scabritias, exulcerationesque pollet: quibus etiam triticea præfana præsidio est: sed plus alit, magisque uim mouet. Lac abunde suppeditat, si cum feniculi semine decocta sorbeatur. Hordeum absterget, uim faciet, inflationem parit, stomacho aduersatur, tumores concoquit. Farina hordeacea decoquitur in melle, qua cum fisco, ut inflammationes, collectionesque discutiat: duritias cum refina, & fimo columbarum concoquit: cum meliloto autem, & papaueris calyce dolores finit, qui latus excruciat: aduersus intestinorum inflationes cum lini semine, fenogrecæ, & ruta illi iuuat: strumas cum pice liquida, cera, oleo, & impetis pueri urina, ad concoctionem perducit: & cum myrto, aut uino, aut malicorio, aut syluestribus pyris, aut rubo, alui profluvia sistit: podagricis inflammationibus cum coroneis, aut aceto prodest: decocta in aceto, modo quo hordeaceum cataplasma, & calida posita, lepris medetur. Cremor uero farinæ ex aceto, atque cum pice, & oleo decoctus, puri mouendo est: cum aceto subactus, itidem & cum pice contra articulorum fluxiones prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflammationesque mitigat.

Non minus Hordeum in Italia uulgaris notitie est, quam triticum. Est autem (ut Theophrastus libro viii. cap. lvi. de plantarum historia memorie prodidit) in hordei genere differentia: quippe quod aliud binis uersibus, aliud ternis quaternisq; cernit: plurimum senis: est enim uel eiusmodi quoddam genus. Quod uero pluribus constituitur uersibus, hoc semper ferè spissius, posituq; arctius constat. Magnam & indicium differentiam facit: quandoquidem rarius tum sit brachiarum, ut proposui. Et spicæ uero alijs grandiores, rariioresq; constant: alijs minores, frequentioresq; & alijs distantiores à folijs, alijs proximiores, ut Achilleis cognomine. Et hordeorum ipsorum aliud uarietas est.

maiusq; aliud oblongius, maiusq; atq; in spica rarius. Item aliud candidum, aliud accedens ad purpuram, quod et farinam reddere copiosius creditur: et contra byemem, et flatum, et in totum contra celi mutationes candido ualidius esse uidetur. haec Theophrastus. Oritur et in Gallia hordeum, quod cantherinum dici putauerim, quia solutio cistitum nascitur. Galli qui serunt, mundum uocant hordeum, quod sponte granum gluma concidat, in reliquo autem non nisi egre deglubitur. Hordeum magis, quam triticum, rubiginem sentit, minusq; tolerat imbrium impetus. Siquidem infestis imbris, aut uliginosis locis, aut longiore pluuiâ dilutis satum in lolium degenerare affirmant. Hordei meminit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. Hordeum prius est ordinis in exiccando, et refrigerando: habet etiam paucillum absterfionis. Paulo etiam plus desiccatur, quam farina fabacea, cui non insint cortices: cetera uero similia sunt foris utentibus. In cibo autem hoc fabis praestat, quod plantosam naturam exuat: fabis, quantumcunque coxeris, flatuosa natura remanet: sunt enim crassioris essentiae, quam hordeum. quamobrem eo plus etiam alunt. Porro quoniam utrunq; paulum a medio recessit, multo sunt usui. Nam talia medicamenta multis alijs miscentur, seu materiae quaedam: itaq; etiam cera, et oleum, non paucis medicamentis coniunguntur. Alphiton uero, hoc est polenta, multo plus hordeo desiccatur. Et primo de facult. alimentorum sic inquit. Hoc item semen in usu frequenti apud homines est, quod non eandem cum tritico habet facultatem. Siquidem illud palam calfacit, hoc uero non modo non calfacit (quo modo nonnulla, quae in medio sunt calefacientium, et refrigerantium, uti amyllum, et elotus panis) sed quoquo modo ipso utare, siue panes ex ipso feceris, siue ptisanam coxeris, siue polentam paraueris, uim quandam refrigerandi habere cernitur. Dissidet praeterea succi specie a tritici natura hordeum: nam ex succis, quos utrunq; semen gignere natum est, qui quidem e tritico in nobis prouenit crassus, et uiscosus est: qui ab hordeo tenuis, ac nonnihil deterforius. Nulla igitur apparandi ratione hordeum unquam calfacit: sed uarie pro modo praeparationis humectatur, ac desiccatur. Etenim manifeste cernimus, polentam ex tosto hordeo factam siccari: ptisanam contra humectare, si quidem ut decet fuerit parata, hoc est, cum in coctione quam plurimum intumuerit, postea igne lento per multam otium in chylum fuerit redacta. haec Galenus. Ceterum cum recentiores medici Galeni ptisanam non rite, et ad unguem parare nouerint, eius uice integrum deglubitum hordeum accipiunt, et tantisper decoquunt, dum pultis speciem referat: tunduntq; deinde, et tenui incerniculo percolant, modo saccharum, modo dulcium amygdalarum, modo melopeponum, ac papauerum seminis cremorem, pro morborum ratione addentes. Manardus uero Ferrariensis aetate nostra acutis morbis minime competere antiquorum ptisanam, minusq; recentiorum existimat: quod, ut ipse asserit, Itali huic cibo a teneris non assueuerint, quodq; nostri usus hordeum antiquorum hordeo facultate sit longe infirmius. Cuius tamen sententiae non uulgari ratione ducti medici Hippocraticam, Galenicamq; doctrinam sequentes, minime adstipulantur. Porro hordeaceus panis praeter id, quod uentriculo laborem inferat, frigidos, lentosq; succos generet, parum nutrit, flatuq; gignit: quanquam asserunt nonnulli podagricis hordeaceum panem peridoneum esse. Sed cum polenta speciatim ex hordei farina fiat, interponaturq; sepius a Dioscoride simplicibus medicamentis, ut omnibus palam sit, quidnam extiterit polenta apud antiquos, non aliam duximus hic de ea differere. Polentam ueteres pluribus modis faciebant, ut Plinius est auctor lib. XV. cap. VII. Graeci enim persusum aqua hordeum nocte una siccabant, ac postero die frangebant: deinde molis frangebant. Erant et qui uehementius tostum rursus exigua aqua aspergerent, siccarentq; prius quam molirent. Alij uero uirentibus spicis decussum hordeum recens purgabant, madidumq; tundeant in pila, atq; in corbibus eluebant: sic castantq; in sole rursus tundeant, et purgatum molebant. Quocunq; autem genere praeparato uicenis hordei libris, ternis seminis lini, et coriandri scabras, salisq; acetabulo, torrentes ante omnia miscebant in mola. Itali uero sine persusione hordeum tostum in subtilem formam molebant, iisdem additis, atq; etiam milio. haec ex Plinio. Ceterum aliam rationem parandi polentam prodidit Galenus libro primo de alimentorum facultatibus. Vbi non ex alijs seminibus admixtis, ut Plinius tradit, sed ex hordeo tantum recenti, ac nouo mediotriter tosto laudatissimam fieri polentam scribit. Quare crediderim, ijs medicamentis, quae in Dioscoridis, et Galeni scriptis polentam expetere inueniuntur, eam legitime imponendam esse, quae ex recenti, et uiridi adhuc hordeo modice tosto, et in farinam redacto parari debeat: quod de hac utrunq; intellexisse non dubitem.

Hordci facultates ex Gal.

Ptisane consideratio.

Manardi opinio.

Panis hordeaceus.

Polentae consideratio.

## Zythum. CAP. LXXX.

Ex hordeo potus fit, cui Zytho nomen est. Is urinam citius, renes, et neruos tentat: membranis praesertim cerebri uentibus, officit. Inflationem parit, vitiosum succum creat, elephantinum gignit. Persusum zytho ebur, obsequiosum, et operi tractabile redditur.

## Kourmil. CAP. LXXXI.

Fit et ex hordeo potus, quem Curmi nominant. eoq; saepe potu pro uino utuntur: uerum dolore capitis mouet, malum succum gignit, neruis nocet. Consimilia etiam potus generat ex tritico fieri solent, in Iberia, quae occidentem spectat, et Britannia.

Zythum, quod ex Dioscoride colligi potest, potus sane fuerit ex macerato hordeo, uel tritico paratus, illi maxime similis, qui aquilonaribus regionibus Ceruisia appellatur. Siquidem huius rei testis est Plinius libro XXI. capite ultimo, ubi sic inquit. Et frugum quidem haec sunt in usu medico. Ex iisdem sunt et potus: zythum in Aegyptu, celia, et ceria in Hispania: ceruisia, et plura genera in Gallia, alijsq; prouincijs. haec Plinius. A zytho parum differt Curmi, quod et ipsum paratur e frugibus, nimirum hordeo, triticoq; in aqua maceratis, bibaturq; uini loco.

Zythi, et curmitis consideratio.




loco. Quamobrem credendum est, nil aliud zythum, et curmi fuisse antiquis, quam Ceruissa, quam loco uini bibi hoc  
 etuo uniuersa regio septentrionalis: nempe Germania, Bohemia, Polonia, Cimbrica, Gallia, et alie argentes Europe re-  
 giones. Nec aliam inter zythum, et curmi crediderim esse differentiam, quam in conficiendi ratione, cum eorum utrius-  
 que fiat ex eadem fruge. Siquidem conficiendi ratio uno, uel altero modo adhibita, rerum facultates et auget, et mi-  
 nuat, cum plus, uel minus cocturae adhibent artifices, quemadmodum etiam hac tempestate in Germania euenit. Nam  
 etsi omnes illi potus ex hordeo, uel tritico parentur; diuersa tamen est apparandi ratio, cum saporibus inter se dif-  
 rant. Alie namque dulces, grateque gustui sunt: alie uero amarae, austeræque habentur. quinetiam alie turbide, de-  
 claræ pellucideque cernuntur. In Bauaria antequam potus suos conficiant, hordeum, et triticum macerant lupulorum  
 decocto. Quo fit, ut non leui plectatur poena, qui lupulos secuerit, uel deperderit. Serunt enim Bauari lupulos, cu-  
 luntque hanc ob causam, ut nos uites, demetuntque eorum flores, et fructus statutis temporibus: quadoquidem corum  
 decocto macerate fruges, non modo fermentantur; sed et uini speciem induunt. Quapropter potus inde confectus  
 gustatu grator euadit. Inebriat is largius sumptus, quemadmodum et uinum, perduratque eius temulentia longi di-  
 tias, quod crassior, concoctusque difficilior sit, quam uinum.

Zea. ZEA. *Speltz*

## CAP. LXXXII.

Zea confide-  
ratio.



Zea uires ex  
Galenio.

Zea uniuersa sua facultate quodammodo in medio est tritici, et hordei. Itaque ex illis cognoscatur.

Κρινον. CRIMNON. *Συμφ*

## CAP. LXXXIII.

CRIMNON crassior est ex zea, triticoque farina, ex qua pultem faciunt. Abundè alit, sed  
 ægrè conficitur: aluum vehementius adstringit, si zea, ex qua fit, prius torreatur.

Crimni confi-  
deratio.

CRIMNVN crassior zea, aut tritici farina extitit apud antiquos, qua ad pultem conficiendam utebantur:  
 quaque loco panis diutius uictitabant, ut Plinius est autor libro xviii. capite viii.

† Neque Ruellium, neque communem, uulgatamque Græcam lectionem hic secuti sumus: sed Marcellum, qui probis-  
 timi codicis testimonio non ἐννατέργαζον, quod facile conficiatur; sed ἀνατέργαζον, quod ægrè concoquatur,  
 legendum putat.

## Ὀλῦρα. OLYRA.

## CAP. LXXXIII.

EIDEM zea generi et olyra adscribitur, sed minus aliquantò nutrit. In panes, ut zea, conficitur.  
 Fit quoque ex olyra crassior farina, quam Græci crimnon vocitant.

OLYRAM zeæ esse speciem, Dioscoridis testimonio, ambigit nemo; tamen si hac ætate non seratur in Italia. Idem Galenus ipsam Olyram pollere facultatibus ait, quibus et zeæ: is enim utraq; inter triticum, et hordeum medium tenere temperamentum asseruit. Adducitur autem Marcellus, ut ferè credat, olyram à Secale uulgò uocato, è quo rustici alium cultores panem conficiunt, minime differre. Quia in re Plinium sibi aliqui familiarum oscitanter legisse demonstrat, cum non animaduertit seorsum, ac differenter scripsisse Plinium de olyra, et secale, quod speciatim farraginem appellauit lib. xviii. Nam capite x. ex arinca, quam Græci olyram uocant, fieri dulcissimum panem scribit. At xvi. ex secale deterrimum, et tantum ad arcendam fanem utilem. In eodem uersatur errore Otto Brunfelsius eo compendio, in quo sibi omnia Dioscoridis simplicia medicamenta declarasse, nobis autem confudisse uidetur. Siquidem is inter alias ineptias asserit olyram omnino esse secale. Ad hæc non possum non admirari Hermolaum, Manardum, et Ruellium alioqui doctissimos uiros: quippe qui uno ore fateantur, olyram Plinio siliginem nuncupari, cum is speciatim de siligine, et olyra, tanquam de rebus inuicem discrepantibus scripserit lib. xviii. capite octauo, nono, et decimo. Quandoquidem is pro Siligine intelligit quoddam præstantissimi frumenti genus, ex cuius farina ueteres panem candidissimum, leuissimumq; conficiebant: pro Olyra autem aliam frugis speciem, ex qua dulcis fiebat panis, uocatq; hanc Arincam; sicuti etiam libro xxii. capite uigesimo quinto, non (ut ij quidem asserunt) Siliginem. Horum sententiam refellit etiam Galenus libro primo de alimentorum facultatibus, ubi de pane agens, inquit. Panis quidem sincerissimus cum à Romanis, tum ab omnibus ferè, qui illorum subiacent imperio, siliginis uocatur. Nam silignis, quæ Latina inflexione siligo dicitur, Græca uox non est, nec apud illos alia habetur. Quod minime dixisset Galenus, si olyra, et siligo idem fuissent: cum olyra Græca planè sit uox. Ex quibus colligi potest, quòd si olyra, et siligo idem extitissent, nequaquam affirmasset Galenus, siliginem apud Græcos carere nomine. Hallucinantur itaq; non solum qui putant ueterum siliginem, et olyram esse idem; sed et qui existimant olyram esse secale, quam Plinius farraginem, nos uerò uulgò Segala appellamus. Siquidem præter rationes, et auctoritates à nobis adductas, id etiam experimento falsum esse manifestè deprehenditur, quòd panis siliginis Galeno purissimus, candidissimus, et omnium ad alendum aptissimus reddatur. Apud nos uerò impurissimus sit, nigerrimus, et ad alendum inbecillimus, qui ex secale, uel farragine conficitur.

† Ne quis frustra querat Siliginis caput, lectorem admonitum uolumus, hic nos minime secutos esse Ruellium, qui ὀλυρα siliginem uertit: sed Græcam uocem retinuisse, quòd olyram à siligine planè differre censeamus, ut in commentario ostendimus.

Olyra consideratio.

Marcelli, & multorum opinio reprobata.

Siligo Ruybr

Αθήρα. ATHERA. *Γινδρῶραβ.* CAP. LXXXV.

ATHERA ex zeæ fit tenuissimè molita. Est autem sorbitio, quasi liquida pultrix, infantibus conueniens, & cataplasmatis efficax.

Cum Dioscorides, satis superq; declarauerit, quid sit Athera, necessarium quidem non duximus de ea plura scribere. Veruntamen illud ignorandum non est, quòd nonnulli autores sunt, qui Atheram etiam fieri asserant ex tritico, olyra, et amylo. Hæc Germanis uulgò Mofa nuncupatur: utunturq; ea plurimum non modò in infantulorum lactetum cibis, quemadmodum nos pane in aqua decocto; sed et quotidianis mensis, quam ex farina, lacte, et butyro parant, ut ij quidem norunt, qui diu in Germania uersati sunt.

Atheræ consideratio.

Τράγος. TRAGOS. *Βορξή* CAP. LXXXVI.

TRAGOS quandam halicæ frugis figuram gerit. Multò minus, quàm zeæ nutrit, quòd multum acris habeat: quare ægrius conficitur, aluumq; magis emollit.

TRAGOS, quem aliqui halicam, nonnulli uerò far notis referre asserunt, hac ætate, quòd sciuerim, non prouenit in Italia. At quoniam (ut Plinius inquit libro xviii. capite x.) ex oriente peregrinus nobis inuectus erat, unde nostro etiam æuo innumera deferuntur plantæ; mirum quidem non est, si tam longo temporis tractu, relicto Italico cultu, in proprium redierit solum, ex quo primum ad nos aduehi cœpit, ut in alijs. quam plurimis euenisse comperimus.

Tragi consideratio.

Βρώμος. AVENA. *habr* CAP. LXXXVII.

AVENA genicula quædam habet: folio, & stipula triticum imitatur: & in cacuminibus dependentes paruulas veluti locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur, utile ad cataplasmata, ut hordeum. Pulve huius aluus sistitur. prodest tussientibus in sorbitione succus.

TAMETSI Avena, uulgaris notitiæ seges, edita sit à natura in equorum potius, quàm hominum alimentum; in Germania tamen ab acerbis repurgata, et iure pinguium carniū elixa, frequenter in cibis sumitur, quemadmodum in Hetruria far, et oryza. Quoniam et pultriculam Germani ex ea parant eadem ratione, quam in Athera paulò superius retulimus. Bromos, id est, Avena (ut Galenus memoriæ prodidit libro vi. simplicium medicamentorum) unum est ex leguminibus: uerum ut medicamentum similem hordeo uinum obtinet. Nam illud desiccatur, et digeritur mediocriter, et sine morfu. Temperiem autem habet paulò frigidiorem. Nonnihil etiam adstrictionis obtinet, ut uentris profusio iuuat. Et primo de aliment. facultatibus: Hoc semen (inquit) in Asia perfrequens est, et potissimum in Mysia, quæ est supra Pergamum, ubi et typha, et olyra uberrimus est prouentus. Lumentorum autem est alimentum.

Auenæ consideratio.

Auenæ facultas ex Gal.


A V E N A .



Oryzæ facultas ex Gal.

O R Y Z A .

Halice confideratio .



est alimentum, non hominum: nisi utique aliquando extrinsecus, me, ad panes ex eo quoque semine conficiendos compelluntur. Contra sanem autem coctum, ex aqua estur cum uino dulci, aut sapida, aut mulso. Ceterum Auenæ farina (ut Plinius adnotat libro xxii. capite xxv.) decocta in aceto neuos tollit.

Oρυζα. O R Y Z A . CAP. LXXXVIII

O R Y Z A frugum generis est, in palustribus, nigresque nascens. Mediocriter alit: sed aluum suppressit.

O R Y Z A adeo omnibus in cibis familiaris, frequensque est, ut nulla prorsus explanatione in ea describenda sit opus: Omnia de eius uiribus nil aliud explicandum relinquitur, quam quod literis mandauit Galenus, qui libro viii. de simplicium medicamentorum facultate, sic de ea paucis scribit. Oryza habet adstringentium quippiam: quare mediocriter uentrem sistit. Et lib. primo de alimentorum facultatibus: Semine hoc, inquit, omnes infestenda aluo utuntur, ipsum eodem modo, quo halicam decoquentes. Difficilius tamen quam halica conficitur, et minus alit, cuius utique et in edendi suauitate ab ea quam plurimum deficit.

Χόλδος. H A L I C A . CAP. LXXXIX


H A L I C A fit ex zea, quam dicoccon appellamus. Plus alit, quam oryza: aluum magis cohibet: stomacho longè utilior. Decocta in aceto, illitaque lepras tollit: vnguium scabritias extricat: incipientibus ægylopijs medetur. Decoctum dysentericis, quos excruciat dolor, infusum, idoneum est.

H A L I C A antiquitus parabant ex zea, cretam, et gypsum admiscentes. Huius rei autor est Plinius libro xviii. cap. xi. sic inquit: Halica fit ex zea, quam semen appellamus. Tunditur granum: eius in pila lignea: nam lapidis duritia conteritur. Nobilior, ut notum est, pilo minorum penali opera. Primori inest pyxis ferrea, excusis inde tunicis. Iterum istam armentis nudata conciditur medulla. Ita sunt halicæ tri genera, minimum, ac secundarium, grandissimum uero ægyptiacæ appellant. Nondum habet candorem suum, quo precellunt, lætamen Alexandrinæ præferuntur. Postea, mirum dictu, admiscetur creta, quæ trāsīt in corpus, coloremque, et ténérítatem efficit. Inuenitur hæc inter Puteolos, et Neapolim in colle Leucogeno appellato. Halica adulterina fit maxime ex zea, quæ in Africa degenerat. Latiores eius spicæ, nigrioresque, et breui stipula, præsertim cum harena, et sic quoque difficulter deterunt utriculos. Postquam gypsi pars quarta inspergitur, atque ut cohescit, farina tribro subcernunt. hæceniùs Plinius. Ex quo non satis admirari possum, quod ueteres et cretam, et gypsum in cibis simul cum Halica citra noxam esitassent, cum procul dubio compertum sit, gypsum in corpus assumptum adeo spiritibus incatus obstruere, ut faciliè homines strangulet. Nisi fortasse dixerimus, quod quam aliqui cretam, alij uero gypsum halicæ commiscerent, et cæcidior, et mollior euaderet: ablutionibus tamen prius eam expurgabant, quam decoquendam traderent. Nam et hoc tempore gingiberis radices fabrilis rubrica inficiunt, ut illas à cori, et teredine uindicerent: quæ tamen et abluuntur, et decedunt, et cribro excutitur, cum in ciborum condimentis, uel medicamentorum misturis ea expetitur. Hoc enim mihi usus est inuasis Galenus libro primo de alimentorum facultatibus, cum ait. Ceterum

rim diligentissime, dum ex halica elota sorbitiones parantur, animaduertere oportet. Quippe ciam Halicam ad sorbitiones parandis elui præcipiat, id sanè facere uidetur, ut repurgetur à creta, et gypso, quibus inficiebatur. Quòd autem in cibum nõ siceretur Halica, quæ ab omni mangonio non esset purgata, ostendit idem Galenus loco nuper citato, cum inquit. Halica ex genere est tritici, quæ ualèter nutrit, succumq; lentum habet, siue in aqua duntaxat coctam cum mulso, aut dulci uino, aut etiam adstringente sionas, siue ex oleo, salc; conditam. Qui autem per sanitatem ob neuentrem uentris mordicationem, siue à biliosi humoris copia, siue aliunde profectam, sorbitione egent, ijs halicam assatam coctam, quoad teneram flacciditatem adepta colliquefeat, deinde conditam, et colatam, ut ptisanæ colato cremori persimilis sit, sorbendam exhibeto. Hæc Galenus. qui certè tot laudibus hac in re Halicam non commendasset, si creta, uel gypso admixtam assumpsissent in cibum. Fiebat antiquitus Halica non modò ex zea, quæ dicoccos dicitur; sed etiam ex tritico, et alijs frumentaceis, ut ex Galeno, Paulo, Aëtio, et alijs intelligi facile potest. Fuit et hoc tempore in uniuersa Italia, quanuis eam non Halicam, sed Far falsò appellitent. Nanque far ab halica longè diuersum putamus. Quòd autem Far à chondro, siue halica differat, sitq; per se frumenti, uel tritici proprium genus, antiquis Adoram uocatum, è quo Far ipsum paratur, id sanè ex plurium probatissimorum autorum scriptis apertissime constat. Si quidem id primò declarat Plinius lib. xviii. cap. viii. sic inquit. Frumenti genera non eadè ubiq; neq; ubi eadem, sunt ijsdem nominibus. Vulgarissimum far, quod Adoreum ueteres appellauere. Quin et eodem capite, ut fortasse palàm faceret, aliud esse zeam, è qua fit halica; aliud uerò far: Qui zea utuntur, inquit, non habent far. Item cap. viii. eiusdem libri: Populum Romanum, ait, farre tantum è frumèto trecentis annis usum Verrius tradidit. Quo tempore Romanis nullus fuit halicæ usus, ut ipse testatur Plinius lib. xxi. cap. xxv. cum inquit. Halica res Romana est, et non pridem excogitata, neq; arbitror Pompei magni etate in usu fuisse. His accedit Asclepiadis, et Galeni auctoritas libro vii. de compositione medicamentorum secundum locos in quodam eclegmate ad cruenta sputa, ubi sic habet. Farris Clusini appellati sextarij dimidium, decocti marrubij uiridis sextarium unum. Hæc in uas uitreum coniecta per diem, et noctem macerari sinito. Sequenti die pharmacum mollito, quemadmodum halicam maceramus. Hæc Galenus. Quibus palàm est à farre differre halicam. Galeno deinde subscribit Aëtius lib. ix. capite xlv. ubi ex Archigene hæc habet. Quod uerò Latine in regionibus Romæ uicinis far appellant, hoc modo paratur. Frumentum modico tempore aqua madesacito: indeq; extractum, ac in pilam coniectum, ueluti ptisanam, à cortice repurgato. Vbi uerò corticem exuerit tollito, atq; in sole siccato: deinde manibus tritum, donec penitus à cortice fuerit mundatum, crassissime molito, ita ut granum unum in quatuor, aut quinq; partes redigatur, et siccum asseruato. Vbi autem tempore halicæ modo coquitur, et à sanis in cibo sumitur. Pro agris uerò uariè apparatur, et epithematis quoque admiscetur. Quidam spicas frumenti adhuc uirides tollunt, ex ipsisq; far concinnant, quo modo et suauius, et iucundius redditur. hæc Aëtius. Ex cuius, et supradictorum testimonio, illud planè omnibus patere arbitror, quòd far ab halica disideat. quæ de re etiam plura, duce Deo, dicemus in epistolis nostris.

Halicæ vires ex Gal.

Farris, & halicæ differen.



Κέχυρος. MILIUM. hirsutum. CAP. XC.

MILIUM in panes coactum, minus cæteris frugibus alit: sistit pulte sua aluum, vrinam cit: Torretur milium, feruensque in sacco ponitur, vt torminibus, reliquisque doloribus, si foueatur, auxilio sit.

MILIUM, ut libro vii. simplicium medicamentorum prodidit Galenus, primo ordine refrigerat, exiccat uerò tertio exoluto, aut certè secundo intenso. paululum etiam habet tenuitatis. Ex hac tum consistentia, tum temperatura instar quidem edulij comestum, planè inter omnia frumentacea edulia minimum confert nutrimenti: sed et uentrem desiccatur. Porro foris impositum in sacculis idoneum est fomentum ijs, quæ citra morsum exiccare possunt: et cataplasmatibus modo illitum exiccare potest. attamen admodum friabile est, proinde difficilis est eius in cataplasmatibus usus. Quibus omnibus ea prorsus astipulantur, quæ idem de Milio tradidit libro primo de alimentorum facultatibus, cum inquit. Milio item in pane nonnunquam utuntur, urgente frugum penuria. Panis tamen ex eo exigui est alimenti, et refrigerans. Constat insuper præaridum, et instar arene, aut cineris friabilem esse: nihil enim in se habet pinguitudinis, et lætoris. Iure ergo aluum humentem desiccatur. Agricola huius farina cocta, admisto adipe suillo, et oleo, uescuntur.


Milij vires ex Galeno.

PANICVM frumentaceis seminibus annumeratur milio simile, eodemque modo in panes subigitur. Eodem habet usus; minus tamen & nutrit, & stringit.

Panici vires  
ex Gal.

Ruel. lapsus.

Melicae confi-  
deratio.



SESAMVM.



Sesami confi-  
deratio.

PANICVM, ut scriptum reliquit Galenus lib. vi. sup. medicamentorum, ex leguminum genere est, milio specie simile, sicut certe pauci nutrimenti, & exiccatoria. Siftit quoque nihil ventris fluxus, seu ipsum etiam milium. Si uero fors illatur, exiccat, atque refrigerat. hęc Galenus. Ceterum scribit Ruellius secundo de natura stirpium uoluntine, Panicum in Italia Melicam appellari. Quae in re aperte hallucinatur: namque melica, quae apud Insuabres uulgo Melega nominatur, illud genus frugis est, quam nostrum uulgo in Hetruria Saggina uocat. Alij uero in Italia populi Sorgo appellant. Nec usquam (quod scierim) in Italia panicum melica uocatur. MELICA autem (ut uterque nomine) frugis est genus tam forma, quam proceritate arundinem referens, adeo ut campi, in quibus ad maturitatem usque adoleuerit, arundinetæ representare uideantur. Eius tamen calamus non ut uulgarium arundinum, inanis est, sed sacchariferarum arundinum modo, alba factus medulla. Paniculae, quae ad Cybelis pomorum magnitudinem summis proferunt culmis, quaedam cum maturitatem senserint, in nigro rufescunt: quaedam uero nigredinem in uersum contrahunt, granis compluribus onuste. Deperitur granum a rusticis, moliturque in farinam, & inde in agrestem coquitur panem: est in Hetruria potius ad columbarum gallinarumque seratur saginam, quam ad hominum alimentum. Hoc Plinio lib. xviii. cap. v. i. milium est Indicum: quod tamen non animaduertit Ruellius alioqui maximus Plinii sectator. Plinius enim sic habet. Milium intra hos decem annos ex India in Italiam inuectum est, nigrum colore, amplum grano, arundineum culmo. Adolevit ad pedes altitudine septem, pregrandibus culmis, lobas uocat, et nium frugum fertilissimum. *Lin. Sotter*

Σίσσαμον.

SESAMVM.

CAP. XCII.

SESAMVM stomacho inutilis cibus. halitus grauitatem facit, quoties inter mandendum, committitur dentium inhæsit: neruorum crassitiem illitu discuit: medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerastæ moribus: capitis dolor, qui æstuatione concitantur, ex rosaceo lenit. Eadem efficit herba decocta in uino: præsertim inflammationibus oculorum, doloribusque prodest. Ex ea froleum, quo Aegyptij vtuntur.


THAMETIS Sesami semen, à quo copiosum exprimitur oleum, officinis notissimum sit: pauci tamen reperiuntur septem, qui Sesami plantas uiderint unquam, cum nullum, uel rarissimum, quod agros steriles reddat, feratur in Italia. Siquidem quod in Myropolijs habetur, ex Grecia, & Peloponneso ad nos conuehitur. Prouenit (ut Theophrastus est autor) caule nullo foliis, crassiore tamen, ac altiore: folijs rubentibus: flore uiridi, herbaceo: semine uasculis incluso, papaueris modo. Sesamum, testatur Plinio, ab Indis primum aduectum est. Ibi enim copiosissimum feritur, cum oleum inde maximo prouentu conficiant, non modo ad lucernarum usum: sed ad ciborum condimentum, quem nos ex oliuis. Non temere scripsisse uidetur Ruellius, nihil nec Sesamum, emacrare solum, utpote, cui crassior, & multiplicior arundo sit, quam milio, & radix quoque uenerosior. Siquidem id legimus



# In Lib. secundum Dioscoridis. 231

legimus Theophrasto proditum esse lib. VIII. cap. IX. de plantarum historia, ubi sic inquit. Omnium, quæ æstiuæ se-  
mentibus ager recipit, Sesama terre molestissima esse, plurimumq; posse extenuare putatur, utpote quæ multipliciori  
crassiori; calamo, & numerosiore constet radice, quam milium. Sesami meminit Galenus libro VIII. simplicium  
medicamentorum ita scribens. Sesamon non parum in se continet uiscosum, & pingue: quare emplasticum est, & ex  
molliens, ac modicè calidum. Eiusdem facultatis est, quod ex eo conficitur oleum: & herbe quoq; decoctum similem  
sibi obtinet. Et lib. primo de alimentorum facultatibus: Sesami semen, inquit, pingue est, ideoq; repositum celerrimè  
fit oleosum: quamobrem & eos, qui ipso uescuntur, celeriter implet, & stomachum subuertit, tardè concoquitur, &  
pingue corpori præbet alimentum. Liqueat ergo quod uentris partibus uigorem, ac robur addere nequit, quemadmo-  
dum neq; aliud quoduis pingue. Est autem crassi succi, ideoq; non celeriter peruat. Sesami uires  
ex Gal.

## Αἰσά. LOLIVM. Vult. CAP. XCIII.



LOLIUM, quod inter segetes nascitur, molitum,  
nomas, putrescentia vlcera, gangrenasq; compescit  
cū raphanis, & sale illitum: & ex aceto, & sulphure vi-  
uo feròs lichénas, & lepras sanat: strumas quoque di-  
scutit, cum simio columbino, & lini semine decoctum  
in vinò: rumpit, quæ ægrius ad coctionem perducun-  
tur. Decoctum ex aqua mulsa vtilissimè ischiadicis  
illinitur: si cum polenta, thure, myrrha, aut croco suf-  
fiatur, conceptionem adiuuat.

LOLIUM omnibus notissimum est. Nascitur in arvis è  
tritico, & hordeo corruptis uligine seminibus, aut per hyemem  
imbre nimio madidis, ut superius quoq; in tritici, & hordei com-  
mentatione dictum est. Verum etsi non desint, qui Lolium ue-  
re tantum exoriri putent: prouenit tamen (ut Theophrastus  
memorie prodidit libro VIII. capite VII. de plantarum histo-  
ria) hyeme ineunte, folio angusto, piloso, & pingui, eiusq; pe-  
culiare pinguitudo notatur. Credidit Leonardus Fuchsius (ut  
declaraui in suis clarissimis de stirpium historia commentarijs)  
Pseudomelanthium, quod inter segetes frequens nascitur, legiti-  
mum esse Lolium. Id quod (pace sua dixerim) non modò com-  
muni doctissimorum uirorum, qui in stirpium doctrina diu uersa-  
ti sunt, sententiæ refragatur; sed & ueterum scriptis, qui Lolium  
in spica, non calyce, non capitulis melanthij, uel papaueris modo  
inclusum, semen proferre tradiderunt. Et quauis Theophrasti  
auctoritate nitatur, ut sui Lolij effigiem representet, plura ta-  
men ex eo reddidisse uidetur, quam ipse usquam in Theophrasto  
legerim. Qua in re mihi quandoque iocandi fuit occasio, ut  
dixerim Fuchsum ideo in lolio tan manifestè lapsus fuisse, quod

Lolij conside-  
ratio.

Fuchsi error.

fortè eo tempore, quo hæc scribebat, contigerit ei lolium in pane comedisse. Quod autem id legitimum sit Lolium,  
quod rei barbarie peritis, agricolis etiam, & omnibus ferè uulgo cognitum est, testis est Dioscorides lib. III. cap. de  
phœnice, ubi phœnicem spicam lolio similem proferre prodidit. Ex quo palàm fit, lolium in spica, non autem in capi-  
tulis pseudomelanthij, & papaueris modo semen ferre. Ex uulgata quoq; Lolij facultate Fuchsi error deprebendi  
potest. Siquidem panis, in quo lolium fuerit, stupiditatem quandam, & ueluti temulentiam est artibus parit cum in-  
expugnabili ferè somno. Quamobrem ubiq; locorum incerniculis à tritico, alijsq; cerealibus ipsam separant, qui eius  
noxam sensere. Lolium, ut scriptum reliquit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, deficcet, & excalfacit  
efficaciter, ut propinquum sit acribus, magis quàm Iris: sed non est perinde ut illa subtilis essentia, uerum multum in  
hoc deficit. Secundum hoc ponat ipsum quistiam in principio tertij ordinis excalfacientium, secundi uerò extremo  
exiccantium.

Lolij uires ex  
Gal.

## Αμύλον. AMYLUM. Vult. CAP. CXIII.

AMYLUM ex eo appellatum est, quod sine mola fiat. Optimum ex trimestri, natione Creti-  
cum, aut Aegyptium. Ratio faciundi amyli hæc est. Purgatum trimestre triticum madescit quin-  
que die, & si fieri potest, nocte: cum emollitum fuerit, effunditur sensim sine agitatione aqua, quò  
minus cremor uilis vnà excludatur. vbi mollissimum esse uidetur, mutata aqua, pedibus calcari o-  
portet: rursus infusa, teri: tum demum enatantes ibi furfures incerniculo eximendi. reliquumq;  
quallo sportisque siccatum tegulis nouis confestim totreatur flagrantissimo in sole: nanque si  
paulisper vdim maneat, acorem concipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, cauaq; vlcera  
efficax est: sanguinis reiectiones potu cohibet, exasperatas fauces lenit. laçi, atque obsonijs admi-  
scetur.

scetur. Fit etiam amyllum ex zea, quæ maceratur, ac eluitur vno, aut altero die, & subactæ farinæ modo manibus subigitur: pressaque feruentissimo in sole, ut antè retulimus, exiccatur. Nullus in medicina vsus, ad alia tamen conueniens.

Amyli consi-  
deratio.

Amyli vires  
ex Gal.

AMYLLUM, quod vulgò Amidum officinis uocatur, omnibus quidem notum est. Probatum autem autore Plinio lib. xviii. cap. vii. leuitate, ac leuore, atque ut recens sit, & candidum. Ceterum etsi prætelcrit Dioscorides Amyllum, quod è Creta aduehitur; Plinius tamen longè magis Chium, cui insulæ (ut ipse scribit) Amyli inuentio debetur, præstare asscrit. Amyllum, ut memoriæ prodidit Galenus lib. primo de alimentorum facultatibus, ex tritico conficitur, leuigandi exasperatas partes vim obtinens: quæ communis est omnibus substantijs consistentia siccis, quæ neque adstrictionem, neque acrimoniam, neque aliam quâuis facultatem habent insignem. quas substantias iure ætiosius, id est, qualitatis, quæ sensu deprehendi queat, expertes appellant: qualis inter humiditas substantias est aqua. Ceterum amyllum similem lotis panibus habet facultatem: nam, ut illi, minus quàm panes non loti, corpori præbet alimentum, & non calfacit, cùm ceteri panes calfaciant. Quod uerò ad triticum in aqua elixum attinet, cum ea amyllum ne conferendum quidem est, cùm palam id tum calfaciat, tum ualenter nutriat, si coctum fuerit: id quod factum (ut diximus) est difficile. Porro Amylon (ut Plinius tradit libro xxii. cap. xxv.) hebetat oculos, & gulæ inutile, contrà quàm creditur. Item sistit aluum, epiphoras oculorum inhibet, & ulcera sanat. Item pustulas, & fluxiones sanguinis. genus duræ emollit. Datur cum ouo his, qui sanguinem reiecerint: in uesciæ uerò dolore semuncia amyli cum ouo, & pæsis tribus, sufferuesfacta à balneo.

Talis. FOENVM GRÆCVM. *Foeniculum* CAP. XCV.



Fœni Græci  
vires ex Gal.

FOENI Græci farina vim habet emolliendi, discutendi quæ: in aqua mulsâ decocta aduersus tam internas, quàm externas inflammationes, efficaciter illinitur: lienem cum aceto, & nitro trita extenuat. Succus decocti eius foeminarum malis subuenit: & siue tumor, siue præclusio sit vuluæ, fouentur, & insident. Fœni græci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manantia capitis vlcera purgat: locos dilatat, & emollit, si cum anserino adipe pessi vice subijciatur. Viride cum aceto vtilissimum imbecillibus locis, & vlcera sentientibus. Decoctum eius prodest aduersus tenefmos, foetidam quæ; dysentericorum proluuiem. Oleum, quod ex eo exprimitur, & myrto, capillos, & genitalium cicatrices absterget.

FOENI Græci semen profert planta trifolio similis, corniculis quibusdam inclusum: unde illi Buceras nomen imposuit Theophrastus. Huius meminit Galenus libro viii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Fœnum Græcum calidum est secundum ordinem, desiccatur primo: proinde feruentes phlegmonas irritat, acerbatur quæ; uerò minus sunt calidæ, & magis duræ, eas digerendo curat.


Λίνον. LINVM. *Flax* CAP. XCVI.

LINVM vulgò notum est. cuius semen eadem, quas fœnum græcum vires habet. Discutit, & emollit omnem intus, foris quæ inflammationem, cum melle,

oleo, exigua quæ aqua decoctum, aut melle cocto exceptum: vitia cutis in facie, varos quæ crudum tollit: illitum cum nitro, & ficulneo cinere, parotidas, duritias quæ discutit: vlcera, quæ serpunt, fauos quæ cum vino decoctum expurgat: vngues scabros eximit, cum pari modo nasturtij, & mellis: vitia pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatis vicem substituat: rufsim lenit: venerem stimulat, si farina piperis, & melle exceptum, pro placenta largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum, vuluæ quæ erosionibus immittitur, alui excrementa euocat, ad vuluæ inflammationes in defensionibus perquam vtile.

CVM Linum, & eius semen sint non modò medicis omnibus; sed etiam cæteris, & præsertim agricolis, vulgò notissima, superuacaneum quidem foret, pluribus eorum historiam persequi; etsi seminis usus, & vires minime silentio fini præ-

L I N V M.



C I C E R.

sint prætereunda. Exprimitur ex semine oleum, quod non so-  
lum medicis, & seplasiarijs expetitur; sed etiam pictoribus, lapi-  
cidis, lignarijs, cementarijs, ac ferrarijs fabris. Præstat & ad  
lucernarum usum, quod diutius igni resistat, quam quod ex oliuis  
exprimitur. In medico autem usu nervorum convulsionibus per-  
idoneum est. Quinetiam ad corium emolliendas duritias, & ad os-  
suum compagines explicandas mirifice prodest. Perutile est om-  
nibus sedis affectibus, nempe hæmorrhoidibus, condylomatibus, ri-  
mis, ac doloribus: sceminarum induratos locos mollit. Nymphææ,  
aut rosarum stillatitia aqua ablution, ambustis auxiliatur. Sunt  
& qui hoc bibendum magno successu ijs exhibeant, qui laterali  
dolore uexantur. verum recens sit oportet: quandoquidem inue-  
teratum, contracto rancore non modo excofacit, plus quam par  
sit; sed & nauseam commouet. Cæterum quoniam (ut Pli-  
nius inquit. libro xix. capite primo) *xyli*, siue Gossipium,  
quod nos vulgari sermone Bāmbagia, alij Cotone appellant, inter  
lini genera nonnulli annumerant, cum eius, quod sciam, nusquam  
meminerint Dioscorides, & Galenus, non dissimulandum duxi,  
quod Xyli semen, quod tamen rancorem non senserit, tussi, & pe-  
ctoris utriusque opitulatur. quinetiam excofacit, & emollit, &  
semen auget. Candidissima uero eius lanugo sanguinem e uulneri-  
bus manantem sistit, præsertim si prius paululum exuratur.  
Lini seminis facultates memorie prodidit Galenus lib. v. i.  
simplicium medicamentorum, sic scribens. Lini semen esum fla-  
tiosum est, etiam si frigatur: adeo sanè excrementitia humiditate  
plenum est. Est uero etiam in primo ordine quodammodo calidum,  
ac humiditatis, & siccitatis quodammodo in medio est situm.

Olei ex lini se-  
mine uires.

Xyli confide-  
ratio.

Lini uires ex  
Galeo.

IN Egebdos. C I C E R.

CAP. XCVII.

Infusum rubrum



C I C E R.

Infusum rubrum. Cicer fatium aluo idoneum est, vrinam ciet,  
inflationem parit, colorem commendat, menses ac par-  
tus expellit, lac auget. Cum eruo decoctum illinitur  
ad inflammationes testium, verrucosas informicatio-  
nes: ad scabiem, vlcera capitis manantia, impetiginès-  
que; item contra carcinomata, & vlcera, quæ cacæthe  
vocantur, cum melle, & hordeo prodest. Alterum  
genus arietinum nominatur. Vtrunque cit urinas, da-  
to cum rore marino hydropicis, aut regio morbo labo-  
rantibus, eorum decocto. Lædunt ea exulceratam ue-  
sicam, & renes. In verrucarum formicantium, pen-  
siliūque genere; prima luna singulis granis flagulas  
rangunt, eaque grana linteolo deligata abijci post se  
præcipiunt, ita decidere eas arbitrantur. Syluestre ci-  
cer, folijs fatiuo simile est, odore acri, sed semine di-  
screpat. Idem quod fatium præstat.

IN CICERYM genere habetur candidum, quod & Co-  
lumbinum uocatur. Est & rubrum Venerium dictum, quod ad  
excitandam uenerem mirifice præstat. Habetur item & nigrum  
ceteris minus, quod Arietinum appellant. Horum meminit Ga-  
lenus primo de aliment. facultatibus, sic inquitens. Cicer non mi-  
nus quam faba inflationes excitat, sed ualentius nutrit. Venerem  
stimulat, creditumque est etiam simul semen generare: cuius gra-  
tia admissarijs equis quidam ipsum exhibent. Inest præterea Ci-  
ceribus facultas abstergendi maior, quam fabis: adeo ut quedam  
ex ipsis contractos in renibus calculos euidenter frangant, atque  
comminuant. Nigra autem sunt ea, & exigua in Bithynia præci-  
puè nascentia, Arietinaque uocata. Huius ex aqua decoctum po-


Ciceris con-  
sideratio, & ui-  
res ex Gal.

tare præstiterit. Vescuntur & uirentibus adhuc ciceribus homines ante adeptam maturitatem, quemadmodum & fabis. hæcenus Galenus. Nigram uocari Arietinum tradidit Plinius, quod arietum capita sua imagine representent.

Ciceris uires  
ex Aëno.

Theophrasto quoque Cicerem plures sunt differentie libro VII. cap. V. de historia plantarum, ubi sic habet. Cicer & magnitudine, & sapore, & odore, & forma, plerisque differentias ostendit, ut arietinum, & columbarum. Cicer da inter omnia dulcedine præstant. Ciceris facultates recensuit etiam Aëtius, sic inquit. Cicer flatusque legumen, ac alimentosum, uentri accommodatum, urinam, ac menses euocat, & lac, & sperma copiose generat. Huius decoctum, præsertimque nigri, calculos renum frangit. Alterum uero genus, quod Orobiezum uocatur, attrahit, discutit, incidit, & abstergit. Iecur, lienem, & renes expurgat: scabiem, & impetigines exterit: parotidas, ac testiculorum durities discutit: affertque ad ulcera maligna præsidium non pernitendum. hæcenus Aëtius. Ceterum sit uestre omnibus ferè notum est. & si Plinio fides est adhibenda, uentrem subducit: sed flatum, & intestinorum dolores res gignit.

Κύαμος. F A B A. bonum CAP. XXVIII



Fabarum con-  
sideratio, & ui-  
res ex Gal.

Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, in exiccando, & refrigerando secundum utrumque ad medium temperamentum propinquissime accedunt. Caro Fabæ paulum quid abstergentis facultatis continet, sicut cortex ex-nihil adstringentis. Idcirco medicorum nonnulli totam fabam cum oxycrato decoctam dysentericis, cæliacis, & uomentibus, quos ἐμμητρικὸν nominant, exhibuerunt. Porro ut edulium, flatulenta est, ac coctu difficilis, si quæ diu: excretionibus ex thorace, & pulmone idonea. Vt medicamentum uero foris imposita, sine molestia desiccat. In podagricis ea sæpenumero usi sumus ex aqua decocta, & deinde adipi suillo admixta. Ad neruorum tum confusionem, tum uulnerationes, farinam eius cum oxymelite imposuimus. Ad eos, quos ex ictu iam phlegmone occupauerat, cum polenta. Sed & testium, & mammarum aptum est cataplasma. Nam hæ partes cum phlegmone tenentur, modeste refrigerari amant, maxime cum manna ex lacte ipsis concreto phlegmonem patiantur. Quin lac quoque ab eo cataplasmate extinguitur, sicut puerorum pubes farina fabacea illita plurimo tempore glabra permanet. Et libro primo de aliment. facultatibus, sic inquit. Inflatur is cibus quocunque modo apparetur: nec per quamuis longam decoctionem id uiri potest amittere. quod ptisanæ minime negatum est: deponit enim per illam quicquid habet flatulentum. Qui porro affectus singulos cibos sequi natos, animaduertere, & mente consequi uolet, quandam totius corporis confusionem, quasi à flatulento spiritu persentiscet, maximeque qui ad huiusmodi esculentum non fuerit assuesfactus, ac ipsam minus rectè coctam assumpsit. Habent autem fabæ non densam, nec grauem, sed fungosam, leuemque substantiam: quæ tamen ipsa nonnihil abstersorie possidet facultatis, similiter ptisanæ. Etenim manifestè fabacea farina cæcis sordes detergere conspicitur. Quod intelligentes mangones, ac mulercule, in balneis quotidie hac utuntur, uel diu nitro, atque aphronitro, & in uniuersum iis, quæ abstergent. Illunt præterea & faciem hac, quemadmodum ptisanæ:


perfecta: nam quæ in summa cute eminent lentes, exterit, & maculas uelut ex sole contractas. Huius ergo facultas nomine ne in alui quidem transitu diu cunctatur, sicut quæ glutinosa, & crassi succi sunt sine ulla abstergendi facultate, qualia balicum, tragum, similaginem, & amyllum esse perhibuimus. Cum porro ferculum ex fresa faba paratur, quod etiam Græci nuncupant, flatibus non careat, multo amplius integræ fabæ inflabit cibum. quanquam fricta (nam hoc modo aliquando pro bellarijs sumunt) flatum deponit, sed tum concoctu perdifficilis, tardoque descensu incommodior redditur, & crassi succi alimentum in corpus diffundit. Quod si uiridis, immatura, nondumque arefacta clatur, commune omnium fructuum, quos ante perfectam maturitatem ingerimus, rationem obtinens, corpori humidorem alimoniam exhibebit, ac proinde maiorem excrementorum uim non tantum in uis intestinorum; sed etiam per uisum corporis habitum producet. Merito igitur minus quoque nutrit, sed promptius deijcietur. Plerique autem bonum non crudas solas fabas comedentes, unâ eas cum suilla carne decoquunt, ueluti olera consueuerunt: rurius etiam cum caprina, & ouilla. Alij fabas inflare sentientes, cepas admiscunt, cum in ollis pulmentum ex illis feruat. Sunt qui non simul elixatas, sed cum pulmento cepas ingerant crudas. In omnibus nanque dapibus quicquid flatosum continetur, per calfacientia, & extenuantia corrigi comparatum est.

Κύκνος αἰγυπτίος.

FABA AEGYPTIA.

CAP. XCIX.

*Egyptische Bohne*



AEGYPTIA Faba, quam aliqui Ponticam vocant, in Aegypto plurima prouenit, in Asia etiam, Ciliciæque lacubus inuenitur. Folia habet ampla, et etiam si ad arborum frondes comparentur: caulem cubitalem, digiti crassitudine: florem roseum, dupla papaueris amplitudine: & ubi flore exiit, fert folliculos uesparum fauis similes, in quibus faba supra operculum, bullantis ampullæ modo, prominet. Ciborion, aut Cibotion, id est arculam, ideo nominant, quoniam feratur ipsa, humenti glebæ mandata, & ita in aquam demissa. Radice firmatur harundine crassiore, quæ cruda coctæque estur. ej Colocasie nomen est. Faba uirens manditur, & exiccata nigrescit: vulgarem magnitudine superat. Adstringendi facultatem obtinet, & stomacho utilem: dysentericis, celiacisque prodest, insparso polentæ uice, lomento: datur quoque in pulte. Cortices in vino mulso decocti, si terni inde cyathi bibantur, magis proficiunt. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio uiride spectatur, gustu amarum, si tritum, & cum rosaceo coctum instilletur.

SUNT qui Aegyptiam fabam suæ radicis appellatione Colocasiam nuncupent. Hæc tanetsi, Dioscoridis testimo-  
nio in Aegypto plurima nascatur, quin et in Asia, & Cilicia palustribus locis inueniatur; habetur tamen hoc euo-  
in quibusdam etiam Italiae uiridarijs. Meminit huius Theophrastus lib. III. cap. x. de plantarum historia, ubi ita  
scribit. Faba Aegyptia in paludibus, stagnisque exit. Caulis eius, qui longissimus, quaterna cubita perficit: crassitudo  
digiti est, similis calamo molli, non geniculato. Rimas intrinsecus habet tendentes per totum, lilij modo. Caput in  
cascamine orbiculatum, uesparum fauo non absimile. In quo singulis cellis, singule fabæ continentur, paulo super id emi-  
nentes, multitudine plurimum terdenæ. Flos papauere duplo maior, colore roseus in plenum caput. Super aquam so-  
la ad singulas fabas amplexa exeunt. Fabam quoque coterenti amarum illud, ex quo pilula fit, inflexum patefecit. Fru-  
tus ita se habet. Radix illi crassissima, harundine plenior, rimas similiter atque caulis habens: manditur & cruda, &  
cocta, & assa: eoque cibo, qui incolunt paludes, utuntur. Nascitur itaque sponte uel plurima, ceterum & seritur in limo  
pæcis largè admixtis, ut descendat, incorruptaque maneat: sicque fabeta faciunt. Si autem semel apprehenderit, perpe-  
tuo manet. Radix enim ualida est, nec procul harundinum stirpibus, uerum spinis subhorrens. Quamobrem eam  
crocodilus refugit, ne occurrens oculo offendatur, quoniam acute non uidet. Nascitur hæc etiam in Syria, Ciliciæque.  
hæc Theophrastus. Hanc amplissima emittere folia tradidit Plinius libro XXI. cap. xv. ubi sic inquit. In Aegypto nobilissima est Colocasia, quam cyamon uocant aliqui. Hanc à Nilo metunt: caule cum coctus est araneoso in-  
mucendo: thyrsus autem, qui inter folia emicat, spectabilis: folijs latissimis, etiam si ad arbores comparentur, ad simi-  
litudinem eorum, quæ personata in nostris annibus uocamus. Adeoque Nili sui dotibus gaudent; ut implexis Colocasie  
filijs in artem speciem uasorum potare gratissimum habeant. Seritur iam hæc in Italia. hæc Plinius. Aegyptia scilicet  
ut Galenus auctor est libro primo de alimentis) sicuti nostratam magnitudine longè præcellit, ita & naturam hu-  
midiorum, magisque excrementitiam sortita est.

Aegyptiæ fa-  
bæ confid.

Colocasia ex  
Plinio.

† Græci codices hoc loco habent αἰγυπτίαν, id est, instar galeri. Quæ autem horum loco affert Ruellius ex Plinio scriptis loco citato. Vbi uerbis, quæ illa sequuntur, rectius forte hunc Dioscoridis locum interpretari uidetur.

φάνος.





Lénium uires  
ex Galeno.


quibus lac in grumos coijt, & præ nimia sui copia profunditur, cocta in aqua maris, & illita auxiliatur.

**LENES**, quemadmodum libro VIII. simplicium medicamentorum scriptum reliquit Galenus, ualenter stringunt: in caliditate uerò, & frigidityte medium tenent; desiccant tamen in secundo ordine. Ipsum itaque eorum corpus desiccatur, & sistit uentrem: ceterum decoctum prouocat: proinde etiam prior aqua abijcitur, ubi retentionis causa adhibentur. hætenus loco citato Galenus. Ceterum asserenti Dioscoridi Lentis aluum cohibere, si detrahitur antea cortice discoquantur accurate, primæque aqua inter coquendum effundatur, omnino refragatur Galenus, qui libro primo de alimentorum facultatibus sic scribit. Ne ex lente quidem panem quis tentauerit: præ arida enim sine perguis, & friabilis est. Cortex eius uehementer adstringit, carnea substantia tenuiter, quæ & crassi succi, & terrestris est. Succus porro lentis, sicut antè retulimus, adstringenti est contrarius. Quocirca si elixæ in aqua iusculum salegero, oleoque conditum bibatur, aluum deiciet. At quod ex his decocta lente ad eum modum, quem retulimus, serculum apparatur, contrariam succo uim obtinet. Nam quæ uentri obueniunt, fluxiones desiccant, os uentriculi, intestina, & totum denique uentrem corroborans. Quamobrem coeliacis, & dysentericis accommodatus est cibus. Lens uerò decoctata, ut illam adstringendi uehementiam, cumque hac alia uidelicet omnia, quæ consequuntur, amittit: ita albidior, quam integra illa efficitur, crassum, paruumque succu gignens, tardè commeans: alui tamè fluores haud desiccant, uita quæ cortice non est spoliata. Iure igitur qui modum in hoc edulio non seruant, elephantiasim quam uocant, & cancerum incurrunt. Siquidem crassa, siccaque cibaria facile in melancholicos humores uertuntur. Quare ijs duntaxat, quas uitiosa est habitudo ob aquam in carne diffusam, lens cibo utiliter præbetur: ceu aridis, & squalentibus admodum deminose. Eandem ob causam uisum integrum, et inculpatum hebetat, immoderate exiccans. Ei uerò, qui contrario modo se habet, humidiori uidelicet, opitulatur. Menstruis purgationibus inepta est: crassum enim, & tardifluxum sanguinem facit. At muliebri appellato profluuio conuenientissima. Cuius porro lens, & ptisana contrariæ inter se sunt facultatis, ex amborum commistione præstantissimum edulium componitur, quod nos in Asia pbacoptisanam nuncupamus. Verum non æqua utriusque portio esse debet: minus enim ptisanæ adijciendum, ut quæ per decoctionem in cremorem late diffunditur, & in magnam attollitur molem: lens autem cocta exiguum quandam tumorem aspicit. Sed cum huius edulij eadem ac ptisanæ est cōfectio, præterquam quod saturicia, & pulegio adiectis, iucundius & paratius concoctioni efficitur: cum ptisana illis minime gaudeat, sed solo anetho, porroque sit contenta. Deterrima est lentis contritio, quam diuitem coci sapa inficiunt: minime enim in crassantia sibi uult admisceri, sed liquida potius, & crassum incidentia. Cui uerò sapa commiscetur, jecoris obstructions gignere nata est, & ipsius uisceris, atque una lienis inflammationes in augere, nisi addito melle corrigatur. Illud præterea non arbutor, obscurum, durefcentes uisceris utriusque affici.

etiam, quos scirbos uocant, hoc epulo exacerbari. Quod si suillam simul libeat incoquere, ptisanæ recentem, lenti  
 sse asserunt congruere deprehendes: ceu utiq; quæ inter has media est, quam  $\nu\epsilon\alpha\lambda\alpha$ , id est, recenter salutam appella-  
 tur, phacoptisanæ percommode et ad suauitatem, et concoctionem immittitur. Magis tamen lens cum salis carnibus  
 et assis humores augebit. Nam hæ quoq; sanguinem crassiores, et melancholicum magis generant. Quapro-  
 pter neq; istis affatus, sæpeq; uti expediet, præsertim cui corpus melancholico præcrasso, et omnino prauo humori  
 obnoxium est. Hæc eadem et de regionibus, anni temporibus, et aëris constitutionibus in unoquoq; edulio intelligere  
 oportet. Ac autumno quidem melancholicis, ac siccantibus cibis abstinendum: hyeme uerò eis utendum: uti sanè in  
 æstate hiementibus, et refrigerantibus: in uere medijs temperamenti, mediæq; facultatis epulas offerendum. Est por-  
 to mediorum non una, nec simplex species: quædam enim huiusmodi sunt, quoniam cum extremis nihil habent commu-  
 ne: quædam ex duorum contrariorum æquo interuallo à medio distantium mixtione sunt mediocritatem adeptæ: ut si  
 quis uicta id, quod paulò antè dixi, ptisanam lenti commisceat. Sic et teutlophacen, quæ ex beta, et lente nomen apud  
 Grecos inuenit, Heracides Tarentinus non sanis modò, uerùm etiam laborantibus exhibebat. Est enim et hoc ex pu-  
 gnatibus compositum edulium: quamobrem etiam tardius, quàm beta; citius uerò, quàm lens per aluum descendit.  
 Est et illud perspicuum, huius succum in corpus dispartitum, ex amborum uirtute, lentis uidelicet, ac beta, esse permis-  
 tum, bastenus Galenus. Ex cuius uerbis facillè colligi potest, Lentem in frequenti ciborum usu minimè esse recipien-  
 tes; præterquàm ab ijs, quibus morbi alicuius ratione, ut medicamenta potius, quàm ut cibus conueniant.

φασιόλοι. PHASIOLI. *Curculionum* CAP. CL

PHASIOLI infant, spiritus cient, ægrè coquantur, Virides cibo aluum emolliunt: ad vo-  
 mitiones idonei.



PHASEOLI sunt in Italia uulgares, et in hortis, ac arujs frequentes. Diuersa eorum habentur genera, uar-  
 ijs coloribus distincta: nam et candidi, et rubescentes, et melini, ac diuersis respersi maculis reperiuntur. Quos  
 superiori quoque ætati cognitos fuisse putauerim, etsi nonnulli eos nuper in Italia uenisse existiment. Candidi,  
 quibus gratum ceteris minus est, cæterorum leguminum more, in arujs feruntur. At rubescentes, melini, ac ua-  
 riæ seminantur in hortis alijsue locis, ubi umbra æstiuæ fuerit opus. Siquidem præterquàm quòd fructum suo tem-  
 pore demerendum proferunt, suis etiam inuolucris, ac sequaci foliorum, clauicularumq; reptatu, testudines, atte-  
 gis, mæspalia, tuguria, cameras, pergulas, scenas, ac tabernacula è lignis cancellatim fabricata opacant, ac ue-  
 luti copioso opere contextunt: solaresq; radios inibent, non secus quàm uitis, lupus salictarius, bryonia, colocyn-  
 this, elematis, perichlymenum, et stirpium id genus, quæ arbores, et sepes scandunt, perreptant, implicant, ac con-  
 uolunt. Quo fit, ut crediderim ego, illos à ueritate haudquam desciscere, qui dixerint, hoc Phaseolorum genus hor-  
 tensis esse simlacem, hoc etiam libro à Dioscoride descriptum: quippe quòd illi maxime correspondeat, ut in sequen-  
 tibus dicitur. Quamobrem longè aberrasse uidetur Marcellus in carpendo Hermolao tantopere audius, cùm dixerit  
 se per uerisimile uideri ad eam altitudinem, et foliorum copiam posse legumen aliquod augeri, ut scenas, et ta-  
 bernacula uestiens inumbret. Quandoquidem non modò huic refragatur Dioscorides; sed et ipsius simlacis numero-  
 sa plantarum prouentus, quæ in quàm plurimis hortis, ac uiridarijs longissimos scandunt palos, et cancellata testa  
 circumstant. Ceterum nec eos quidem hallucinari putauerim, qui pro certo asseruerint, Phasiolos supradictis co-  
 loribus infectos, quos equidem nihil ab hortensi simlace differre existimo, Dolichos esse, quorum meminit Theophras-  
 tes libro V. capite III. de plantarum historia: et Galenus libro primo de facultate alimentorum: et ipsum se-  
 cundum Paulum. Quippe quoniam dolichi (ut adiuvante Deo infra in simlacis hortensis mentione dicemus) non sunt il-  
 lius formæ genus, quod Ausonij uulgò dicitur Rouiglione, Tridentinis uerò Arabia, ut Manardo Ferrariensi pla-  
 ceat. Quandoquidem hanc sub Ochri nomine, tam Galenus, quàm Paulus descripsere, ut eo, quem modo citauimus, lo-  
 co patetbit.

Phascolorum  
 consideratio.

Simlacem infra 272  
 Marcelli er-  
 ror.

Manardus no-  
 tatur.

co patebit. Porro in hoc presenti capite Dioscorides de candidis tantum, ac uulgaribus psafiolis diffinit, non de erui-  
lia Arabia uulgò uocata: in sequentibus uerò capite de bortenfi simlaxe, eorum mentionem fecit, qui uel ruberæ,  
uel lutei, uel uersicolores enascuntur.

Ὠροβος. ERVVM. *Eruium* CAP. CII.



Erui confide-  
ratio.  
Orobus  
Nisum

Brasauoli, &  
Fuch. lapsus.

Erui uires ex  
Galen.

ERVVM paruus frutex omnibus cognitus, angu-  
sto folio, tenuis, semina in ualuulis habens: è quibus  
farina fit, nomine eruina, ad medendi usus còueniens.

Eruum capiti onerosum est: aluum est turbat: san-  
guinem per vrinam extrahit: elixo boues faginantur.

Parandæ farinæ ratio hæc est. Vberiora grana can-  
didaque deliguntur, permiscendoque aqua respergun-  
tur, donec sufficienter combibant: postea torrentur,  
usque dum hians cortex disrumpatur: molitaque, fa-  
rinario cribro incernuntur: postremò farina recondi-  
tur. Hæc aluo utilis est: vrinam ciet: meliorem colo-  
rem efficit: sanguinem per uescicam, aut alui cum tor-  
minibus elicit, si largius in cibo, aut potu assumatur:  
ulcera cum melle purgat: lentigines, & uixæ cutis in  
facie, & maculas; totumque corpus emendat: nomas,  
gangrænas, duritiasque, serpere non patitur: mam-  
marum duritias emollit: atra ulcera, quæ theriomata  
uocant, fauosque emarginat: carbunculos rumpit: cū  
uino subacta illitu moribus viperarum, canum, ho-  
minumque medetur: vrinæ difficultates, tenesmosque  
ex aceto mitigat. Eruum tabidis, qui alimentum non  
sentiunt, tostum, & ad nucis magnitudinem melle ex-  
ceptum, sumptumque conuenit. Eius cremor pernio-  
nes, & pruritus in toto corpore, sanat fouendo.

ERVVM officina, Græcorum more; Orobum appellant.  
Ceterum quod ex Alexandria, Syriaque Venetias conuehitur, &  
liud nimirum semen representare censemus, quam Erui, quod  
frequentissimum in Hetruria nascitur, ac seritur. Folis  
Eruum, quod uulgò Mocho uocamus, lathyri, uel cicercule uulgò uocatæ emula: florem pisorum modo, aluum  
rufescentem: siliquis forma teretes, & oblongas, in quibus semen, colore in aliquibus pallido, in nonnullis candido,  
quibusdam uerò rufescente. Porro cum hoc ignoraret Brasauolus, credidit Eruiam, quæ Theophrasto, Galeno,  
ac Paulo ocbros appellatur, legitimum esse Eruum, nominis uicinitate fortasse deceptus. Qua in re Fuchsius quoque  
hallucinatus deprehenditur, quod suo de plantarum historia uoluntine Cicerculam uulgò uocatam, satium Eruum  
esse existimauerit: etsi cicerculam omnes rei herbariæ periti Galeno lathyrum appellari non dubitauerint. In cicercula  
enim, ut periculum facientibus clarissimum est, haudquaquam ex reperiuntur facultates, quibus pollere Eruum tra-  
didit Dioscorides. Quandoquidem præter id, quod omni prorsus amaritudine uacat, largius esit a nunquam sangui-  
nem per uescicam, & aluum cum torminibus elicit, ut de orobo fatentur Dioscorides, & Galenus. Ex quo plane ces-  
stat tam Brasauolum, quam Fuchsium, utriusque pace, hac in re deceptos esse. Sed ignorandum non est, quid est  
Eruum ab agricolis seratur; habetur tamen & inter sponte nascentia: nanque & per se inter segetes frequens ori-  
tur. Verum cum à paucis cognoscatur, illud inter uiciæ species annumerant. Animaduertendum præterea est,  
quod quanquam ad Eruinam farinam conficiendam eligit Dioscorides candidius Erui semen: Galenus tamen lib. primo  
de facultate alimentorum, candidum pallido, ac rufescente, longè minus præstare scribit. Quapropter Brasauo-  
lus Galeni rationem minime habuisse uidetur, cum sibi ex Dioscoridis tantum sententia persuaserit, album erui semen  
in medicamentorum usu tam rufum, quam pallidum uiribus antecellere. Erui uires prodidit Galenus libro viii.  
simplicium medicament. ita inquit. Orobis deficcatur quidem excessu secundo intenso, calcacit uerò primo. Porro  
quatenus amaritudinis est particeps, eatenus incidit, extergit, atque obstructions expedit. Ceterum si sumatur copiose,  
sanguinem per urinas euocat. Et lib. primo de alimentorum facultatibus ait. Boues apud nos, ut apud alias plerumque  
gentes, Erui in aqua edulcato pascuntur. Hominum cibis prorsus hoc semen damnatur. est enim & insuauissimum,  
& prauis succi. Ceterum in magna fame nonnunquam, sicut Hippocrates quoque scripsit, necessitate coacti ho-  
mines ad id etiam confugiant. Nos erui instar lupini præparato ex melle utimur, ut medicameto crassos pulmonis pho-  
racisq; humores expurgante. Candidum minus est medicamentosum, quam id, quod ad stercum, aut pallidum coactum  
tendit. Eruum bis elixum, & in aqua identidem condulcescendum, insuauitatem certe deponit, sed una cum eo &  
stergerendi, & incidendi uim, ut sola in eo relinquatur terrestris substantia. Itaque citra amaritudinis inellectum  
deficcans fit esculentum.



Lupinorum  
consideratio.


Lupinorum  
facult. ex Gal.

ex enim ac deinde in aqua dulci, donec omnem sibi ingentiam exuat insinuatatem, commadefactus, ita editur eū garo,  
 ac oxyporo, uel sine his etiam, sale modico conditus: non uelut hordeum, ex alia multifariam instructa. Lupini dura,  
 ac terreftris substantia est. Quocirca necesserio concoctioni repugnat, et crassum gignit succum: ex quo non probe  
 in uenis confectio, crudus proprie appellatus succus aceruatur. Et libro v l. simplicium medicamentorum, sic inquit.  
 Lapius editur coctus, malis ante diebus in maceratione in aqua amaritudinem deponens: sitq; tunc nutrimentum  
 facti crassi. Ceterum ut medicamentum ita preparatus ex genere est emplasticorum. At qui naturam amaritudinem  
 habet, is etiam extergendi, digerendiq; uim obtinet. Interficat lumbricos tum illitus, tum addito melle linctus, tum ex  
 posca potius. Quia et decoctum eius lumbricos eicere potest. Tum etiam foris identidem persusum, uiliginis, achor-  
 is, pustulas, exanthemata Greci uocant, psoras, gangrenas, ulcera maligna, quæ cacoethe uocant, iuuat, partim ex-  
 tingendo, partim citra mordacitatem digerendo, siccandoq;. Expurgat iecur, et lienem cum ruta, et pipere suauis-  
 sis gratis assumptum. Elicit menses, ac foetum cum myrrha, et melle inpositum. Porro Lupinorum farina sine  
 maceratione digerit: nec enim liuida tantum, sed et chceradas, et dura phymata curat: sed tunc in aceto, aut oxy-  
 melire, aut posca coquatur oportet, idq; pro laborantium temperamento, et affectus diuersitate, quod ex usu est eli-  
 gendo. Sed nō est præsentis instituti tali distinguere: Digerit item quæ liuida sunt. Et quæcunq; modo diximus præ-  
 scribere posse decoctum, eadem omnia efficit et farina. Sunt uerō etiam qui eam ischiadicis cataplasmatibus modo illinunt.  
 Lapius agrestis anterior est, et ad omnia ualentior domestico, eiusdem genere cum ipso facultatis.

DECOCTA. Rapi radix alit, inflationem parit, humentem ac fluxam carnem creat, venerem  
 simulat. Decocto podagræ, perniones quæ fouentur: contrito quæ rapo, atque impositæ iuuantur.  
 Succuare radici rosaceum, ceratum adigatur, & feruenti cinere eliquescat, exulceratis pernioni-  
 bus proficiet. Cymæ eius decoctæ manduntur, & vrinam ciunt. Semen antidotis, & theriacis,  
 præterit quæ sensum doloris auferunt, anodyna vocant, idoneum est: potum contra venena salu-  
 tare est: venerem concitat. Rapum muria conditum, minus alimenti sufficit: sed multò magis ap-  
 petentiam recreat. Syluestre rapum in aruis nascitur. † Frutex est in cubiti altitudinem assur-  
 gens, ramus læuis in cacumine. Folia fert læuia, digitali latitudine, aut maiora: & fructum in si-  
 liquis calyculatis: cum quæ eorum inuolucra aperiuntur, alia intus siliqua spectatur, quæ quandam  
 capitis

## RAPVM.

Rapi confi-  
deratio.



Fuchsij lapsus

Rapi vires ex  
Galeo.

## NAPVS.



capitis speciem præbet. in qua semina paruula concipiuntur, foris nigra, intus alba. Additur in medicamentis, quibus ad detergendam cutem in facie, totoque corpore, vtimur: præsertim quæ ex lupini, aut erui, tritici, aut lolij farina, fieri solent.

RAPVM in Italia vulgò notissimum est, præsertim apud Insabres, ubi statim post messem æstate, iunio, ac iulio mensibus, in aruis secundo feritur: deinde mense octobri, cum radix ad summum extuberauerit, e terra eruitur. Satiuum in triplici recensetur genere, sessile, longum, & rotundum: tametsi literis mandauerit Plinius libro *xxviii. capite xliii.* longum erraticum esse.

Non omittendum nature miraculum, ex tam paruo semine tribus penè mēsis gignitur tam magna radix, ut ea aliquibus in locis plus quàm centenas libras pendat. At librarum triginta pondere nos sæpius innumera rapa uidimus in Ananiensi agro, longæ, & colore purpureæ. Rapum, & radix (ut Theophrastus est autor lib. *vii. capite liii.* de plantarum historia) gaudent frigoribus: & sic ea dulcescere putant, simulq; incrementum in radicem, non in folia uerti. Austrinis, atq; serenis temporibus celeriter caulescunt. Nursinis Plinio palma, quod eo fortasse solam magnitudine, & dulcedine cæteris præstent. Alpinis, quibus terra seges; rapa utilia admodum, ac necessaria habentur, tam in hominum alimentum, quàm iumentorum pabulum. Quæ æstate feruntur, vindicantur ab erucarum iniuria, quæ plerumq; tenella folia in uniuersum erodit, commixta sationis tempore semini fuligine: aut maioris sedi succo per noctem macerato semine. Siquidem Columella rem hanc sibi experientia comprobata afferit. Syuestribus rapis scatet ubiq; Hetruria, nullis reclinantibus nois.

Quare in hoc cogor Fuchsij sententiæ refragari, qui manifeste errore, in suis de stirpium historia doctissimis commentarijs, præ Rapum sylvestre esse Rapunculum: vulgò dictum: quippe quod illi minime respondeat. Rapi vires recensuit Galenus libro *vi. simplicium medicamentorum*, ita inuens. Rapi scæta uenter excitat, utpote spiritum flatuosum procreans. Sic & radix concoctu difficilis est, inflatq; & semen generat. Et libro secundo de alimentorum facultatibus, inquit. Rapum siue *γούρνον* *Αἰδᾶ*, siue *Βουτιά* appellare uelis, quod eius extra terram est, oleraceum censetur. Radix, quæ terra continetur, ante elixationem & dura est, & cibo aliena: in aqua autem decocta, mirum si aliqua ex congeneribus plantis minus nutriat. Hanc quoq; ipsam multifariam homines parant: nam & in muria, & in aceto reponunt, quò in totum annum usui esse possit. Succus ex ea in corpus digestus, temperato crassior est: ideoq; si quis ultra modum effuerit, et maxime si perfecte conficere eam nequeat, crudum suum in uenis congeret. Ad alui deiectionem nec conferre quicquam, nec officere dixeris, potissimum quado benè fuerit percocta, ut quæ longam elixationem requirat, optimaq; sit bis decoctionem perfecta, ad eum modum uidelicet, quæ antea in hac præparandiratione docuimus. Sin crudior ingeratur, concoctu est difficilior, ac flatulenta, stomachoq; noxia: nonnunquam autem et uentrem mordicat.

† Quod in Græco hic legitur *Γούρνον*, Ruellius uertit fruticosum. Quæ uox est potius ab eo ex Plin. lib. *xx. cap. lxx.* reposita, quod etiam alias sæpenumero facit, quàm Græce Latine reddita. Nos fruticem uertimus, licet hac, ut alijs plerisq; uocibus, Dioscoridem improprie usum fuisse existimemus.

ΒΟΥΤΙΑΣ NAPVS. CAP. CV.

Cocra Napi radix inflat, modicum alit. Semen illius potum venenorum vires hebetat: antidotis admiscetur. Conditur sale radix.



NAPUS in raporum genere recensentur. Plura Theophrasto, et Plinio produntur genera: quanquam hæc tem-  
perata et temperata repererim, nempe album, et flavum. Flavi tamen albos crassitudine superent, magisq; colore  
facti; sunt tamen insipidiore, et gustui ob id minus grati. In Aegypto frequentius feruntur, quod mihi ex cor-  
poris copiosum exprimant oleum.

## Paſſavis. RAPHANVS. *Raphanus* CAP. CVI.



RADIX, quæ Græcis raphanus dicitur, excalfacit, flatus gignit, ori suavis est: sed stomacho aduersatur, ructus ciēt, vrinam pellit, aluo aptior: summo tamen cibo sumi debet, quod magis eius distributionem adiuvet: cum autem præsumitur, cibum suspendit: quare uomituris commodissimè datur ante cibum: sensuum aciem excitat. Decocta contra ueterè tussim, & pituita crassitiem in pectore, efficax est. Cortex ex aceto mulso, celerius uomitiones mouet: hydropicis comodissimè illinitur: lienosis utilis: sugillata cum melle rapit, & nomas amolitur: contra uiperarum ictus auxiliatur: alopecias ad pilum reducit: lentigines cum loliacea farina emendat: his qui fungis strangulantur, tam cibo, quàm potu salutaris est. Semen, uomitiones facit, vrinam mouet, menses ciēt, lienem extenuat: cum aceto illitum gangrænas ualidissimè emarginat: coctum cū aceto mulso, anginis perquam vtiliter gargarizatur: contra cerastis morsus, potum ex uino, auxilio est. Syluestris raphani, quam Romani armoraciam uocant, folia fariuo similia, sed magis lampsanam imitantur: radix gracilis, tenera, subacris. Tam folium, quàm radix in olera recipitur: sed hæc excalfacit, vrinam concitat, æstuosa est.

*Raphanus syluestris merrettii*

RAPHANVS Græcis dictus, Latinis Radix appellatur. In Hetruria, quod Latinum nomen imitentur, Radice vulgò uocant: quemadmodum et Romani suam antiquam Raphani syluestris appellationem retinent, qui ipsum primæ literæ metathesi Ramoraciam appellant. Ceterum, cum syluestris, satius longè dixerim, acerrimus, quibus utitur uniuersa Germania, et Pannonia ad carniū intinctus. Qua in re eū, alioquin perueni, facile hallucinatum crediderim, acerrimo fortasse illius plantæ sapore fretum. Quod si is uel Romanam inquam profectus esset, uel ceteras notas accuratius perpenderit, nunquam (ut arbitror) in eam errorem incidisset.

Raphani consideratio.

Raphani Theophrasto libro VII. cap. IIII. de historia plantarum plura sunt genera: nempe corinthium, cleon, liothalaſium, borotum. Adolescit amplissimè Corinthium, quod uel radice constat detecta. Hoc enim sursum, uersus protrudunt, non ut cetera in terram amphari solutum est. Liothalaſium, quod Thracium uocant, ualidissimum datis frigora traditur. Borotum dulcissimum est, et figura rotundum, nec ut Cleoneum prælongum. Quibus folia, dulciora, suuioraq; sunt: quibus autem scabra, acriora. Genus præterea redditur, quod folijs cruce similitudinis. Raphanus (ut libro VIII. simp. medicamentorum scribit Galenus) excalfacit quidem excessu tertio, læuè uerò secundo: agrestis autem in utroque efficacior est. Quin et semen ipsum planta efficacius est. Facultas: acrio digerendi. Itaq; ad sugillata, et alia id genus luda ob talem facultatem accommodata exsunt. Meminit item

Fuch. error.

Raphani libro I. de alimentorum facultatibus, sic inueniens. Radicula solam, crudamq; urbani hominum pharmacia prima mensa ex garo siumunt, alia ducendæ gratia; pauci autem acetum admiscunt. Rustici uerò præterea cum pane estant, non secus ac alia, quæ nobis natura non ars parauit obsonia: in quibus est origanum uis, et alium, thymum, satوريا, pulegium, serpyllum, mentha, calamintha, pyrethrum, cruce. Quippe hæc omnia, eduliorum sunt obsonia, una cum illis siempta, suntq; berbacei generis plantæ. Radicula caulis quoq; et præ nonnunquam eduntur, sed necessitate magis, quàm sponte. Radix in eorum numero est, quibus obsonij potest, quæ nutrimenti nomine assidue uestitur. Vni extenuatoriam gerit, cum qua conspicue una calfacit: acris est, quæ quædam exciperat. Verno tempore caulem in altum assurgentem producere solet, ceu alia, quæ nata sunt, excrescere. Hic elixus estur ex oleo, garo, et aceto, ut rapæ caulis, sinapiq; et listuce: nutritiq; magis caulis, et cruda radica, ut qui acrimoniam in aqua deponat: quanquam minime sanè et ipse alendi potestatem habet.


Raphani uires ex Gal.

*habere. Quidam non solum caulem; sed unà ipsas radículas elixantes comedunt, raparum modo. Ceterum cian me-  
ces, tum idiotas illos mirari subit, qui à cœna crudas eas edunt, concoctionis iuvande gratia. Ipsi quidem id se expe-  
rientia abunde compertum habere dicunt; nullus tamen eos citra damnum potuit imitari.*

SISER.

*Silingal morm*

SISER ALTERVM.



Σισαρον.

SISER.

CAP. CVII.

SISER vulgò cognitum. Cuius radix decocta ori grata est, & stomacho utilis: vrinam ciet,  
& appetentiam inuitat,

Siferis confi-  
deratio.

NON desunt, qui crediderint, album quoddam Carotarum uocatarum genus, quæ naporum modo carniam in-  
ri incoquuntur, legitimum esse Sifer. Ceterum eos hallucinari putauerim, Plinij testimonio ductus, qui libro XIX.  
cap. V. hæc habet. Inest Siferibus longitudine neruus, qui decoctis extrahitur, amaritudinis tamen magna parte re-  
sta. Id quod in hisce Carotarum radicibus haud quaquam reperire licet: quippe quæ nec neruum concludant, nec  
gustui amaritudinem relinquunt: sed dulcedinem potius quandam præ se ferant. Quod præterea Sifer sapore sit sub-  
amaro, facillè ex Galeni sententia comprobari potest libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi sic scribit. Siferi  
radix cocta stomacho grata est, & urinam mouet, secundo ordine excalfaciens, adiectam habens amaritudinem quæ-  
dam, cian leuicula adstrictione. hæc Galenus. Ex quibus facillè colligi potest, Sifera ab hisce carotis plurimum rec-  
dere. Sciendum igitur est, quod Sifer in Italia non feritur: tametsi in Germania, Rheni præsertim fluminis accole,  
suis in hortis sifera frequentissima habeant, quæ & ferunt, & colunt. Ideoq; Maguntie uenalia abunde reperiuntur,  
à Tineao agro illuc allata. Sifer folio est olusatrici, caule, & umbella pastinacæ simili, radicibus dodrant altibus, neruo-  
sam intus matricem continentibus, subamaris, & colore subcroceo, & quæ gustatu gratiam cum palato non modicam  
ineant. Quarum in cibis præstantia alleetus Tiberius Cæsar (ut citato loco tradit Plinius) omnibus annis à Ger-  
mania aduehi sifera curauit ex Gelduba castello Rheno imposito, ubi generositas præcipua.

Siferi uires ex  
Galeno.

Siferis forma.

Λάπαθον.

LAPATHVM, SIVE RVMEX.

CAP. CVIII.

EX GENERIBVS rumicis, oxylapathum uocant, quod in acutum tendit, dura habens ex-  
trema, in palustribus nascens. Alius est satiuus, † illi dissimilis. Tertium genus syluestre, parum  
plantagini proximum, humile, & molle. Quartum est, quod alij oxalida, alij anaxyrida, aut lap-  
thon uocant. Folia eius syluestri, ac exiguo rumici similia: caule non magno: semine subacuto,  
rubente,

OXYLAPATHVM.



OXALIS. *Simpfor*



HIPPOLAPATHVM.



rubente, acri, in caule, & agnatis appendicibus, emicante. Omnium decocto, olere alius emollitur. Crudi illitu, melicerides, rosaceo, aut croco adiecto, discutuntur. Sylvestris, & oxylapathi, & eius, quam oxalida nominant, semen ex aqua, aut uino utiliter bibitur, contra dysenterias, & coeliacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. Quod si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto coctæ, aut illitæ crudæ, lepras, impetigines, & scabrosos ungues persanant: sed antea locus aceto, & nitro in sole perfricandus est. Pruritus corporis, decoctum earum sedat, si fouetur, aut in folijs balnearum confricetur. Coctæ in uino, & instillatæ, aurium, dentiumque dolorem mulcent: strumas, parotidasque discutunt: lienem cum aceto extenuant. Aliqui amolientis strumis radicum gestamine utuntur, eas collo appendentes. Tritæ, & admotæ sceminarum profluvia sistunt: cum uino autem potæ regio morbo medentur, calculos uesicæ comminuunt, menses cient, scorpionum ictibus auxiliantur. Hippolapathon olus est magnum, in paludibus nascens. Easdem habet uires, quas supradicta rumicis genera.

TAMETSI Rumex, qui et Lapathum, nomine a Grecis mutuato, appellatur, hodie in hortis non seratur; in ijs tamen sponte frequentissimus nascitur, nullis deficientibus notis, quibus satius delineatur. Lapathum, quod in paludibus nascitur, Dioscoridi Oxylapathum uocatur, non quidem quod gustu acutum, seu acidum sentiat, ut oxalis, quam uulgus officinarum *Acetosam* appellat, Rumicis consideratio. Oxylapathū.

Oxalid. e con  
sideratio.

Hippolapa-  
thum.

Lapathi uires  
ex Gal.

appellat, sed quod filijs proueniat in acutum desinentibus. Siquidem οξύ Græcorum appellatione, modo significat acutum saporis respectu, modo mucronatum respectu formæ. Ad quod non aduertentes Auicenna, peritæq; Serapion Lapathum omne nullo discrimine Acetosam nominant, perperam id ad saporem referentes, quod ad foliorum figuram retulit Dioscorides in primo lapathi genere. Plinius lib. xx. cap. xx. Oxylapathon non nisi in palustribus nascens, satius similis esse scribit, cum tamen alterum alteri dissimile faciat Dioscorides. Illud uero, quod ab acido succo cæcis Græcis dicitur (etsi id silentio inuoluat Dioscorides) duorum est generum, maius nimirum, et minus. Illi sunt hortensi similia: huic uero sagittarum figura, mollia, læuia, quibusdam ueluti capillamentis subrubentibus inter-  
sa, succosa, folijsq; maioris acidiora. Semen utriq; idem, præterquam quod maiori maius, minori uero minus. Hippolapathum porro non solum in palustribus prouenire uidemus; sed etiam in montibus, ijs præsertim in locis, ubi pecudes diutius stabulari solent, et ubi eorum fimo pinguescit solum, illi plantæ omnino correspondens, quæ sub Rha-  
barbari nomenclatura, passim hodie in hortis, ac uiridarijs plantatur. Lapathi meminit Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Lapathum moderate digerentem sortitum facultatem est, at oxylapathum ma-  
stam: nam simul cum eo quod digerit, nonnihil quoq; repercutit. Semen eorum manifestam quandam etiam adstric-  
tionem obtinet, adeo ut et dysenterias, et diarrhoeas, siue profluvia sanet, et maxime oxylapathi. Porro hippolapa-  
thum, quod in totum in paludibus prouenit, easdem dictis facultates obtinet, sed imbecilliores. Et libro secundo de  
alimentorum facultatibus: Rumicem, ait, uti antè diximus, syluestrem betam possit quis appellare, cum non gustu so-  
lion; uerum etiam facultate hortensi betæ persimilis sit. Quoniam autem betæ aliquando iucundior est rumice, ideo  
eo ea magis homines uestuntur. Quare nec nos quoque prolixius hic de rumice scribere oportet, cum in betæ omnia  
ad rem faciëntia exposuerimus.

† Nihil fortasse Plinius à Dioscoride dissentiet, si in hoc loco sequamur lectionem Oribasij lib. xi. simplicium: qui habet οὐκ ἄρα τὸν οὐμὸν τῶν πρώτων id est, non prorsus simile primo. Nam ex hac patere arbitror, non tan-  
tum priora lapathi genera inter se differre, quantum uulgata lectio innuere uidetur.

### Λάψανα. — LAMPSANA. *Wick hysl.* CAP. CIX.

LAMPSANA syluestre olus est. Plus alit, quàm rumex, & stomacho utilius. Cuius folia, caulesque coquuntur in cibo.

Lampsanæ cō  
sideratio.

QV ANVIS hic inter olera, quæ in alimentorum usum uenere, Lampsana recenseatur à Dioscoride; nullus tamen notis ab ipso describitur, quod fortasse suis in regionibus notissima haberetur. Id quod nobis Italis non euenit. Quamobrem dixerim unā cum Plinio lib. xx. cap. ix. inter syluestres brassicas lampsanam esse, pedalis altitudinis;

#### BLITVM.

Lampsanæ ui-  
res ex Gal.



Bliti confide-  
ratio.

hirsutis folijs, napi simillimis, nisi candidior esset flore. Nascitur hæc frequentissima in Hetruria, Apulia, ac plerisque Italiæ locis, ijs præsertim campis, qui atrum eo anno minime sensere: tametsi nobis hac tempestate non fuerit, nisi forsitan urgente annonæ penuria, in alimentorum usum recepta. Meminit huius Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, his paucis uerbis. Lampsana esæ succos prauos procreat. Ceterum illi abster-  
gendi nonnullam, digerendiq; facultatem possidet.

### BLITVM. CAP. CX.

BLITVM estur oleris modo, alio uile est: nu-  
lius in medicina usus.


BLITVM duorum est generum, rubrum nimirum, et al-  
bum. Vtrunq; notum, in hortis, et campis nascens. Rubro cau-  
lis, et folia adeo rubescunt, ut coccineo colore infecta uideantur,  
etsi temporis tractu tandem purpurecant. Folia amarantus  
referunt, sicut etiam caulis. Quin et radix sanguineo succo ma-  
det. Album prouenit iisdem folijs, latioribus tamen, et colore  
subalbidis. Flores et semen racematim coherentes, tenuibus in-  
sident ramusculis, ex alarum cauis prodeuntibus, panicularum  
effigie; syluestris panici modo. Hoc olus Tridentina rura Bido-  
ne uulgo appellant, recipiturq; nonnullis in cibum. Id namq; aqua  
prius decoquunt, demum affuso oleo, uel butyro in sartagine frigunt,  
additis allio, et omphacio, uel aceto. Veruntamen cibis nonnunquam  
(ut ego ex usu testari possum) uomitiones mouet, uentriculi et  
intestinarum tormina facit, et alui fluxiones cit, excitata bile. Ea-  
q; propter Plinius libro xx. cap. xxii. de eo scriptum reliquit. Blitum uers uidetur, ac sine sapore,

etiam illa. Vnde conuitium feminis apud Menandrum faciunt mariti. Stomacho inutile est. Ventrem adeo tur-  
bat, ut cholera faciat aliquibus. Dicitur tamen aduersus scorpiones potum, è vino prodesse, et clavis pedum illini.  
Item lentibus, et temporum dolori ex oleo. Hippocrates menstrua sisti eo cibo putat. haftenus Plinius. Bliti memi-  
ni Galenus libro v. simplicium medicamentorum, his uerbis. Blitum olus est esculentum, humidum, frigidaque tempe-  
raturae secundo maxime excessu à temperatis. Item secundo de alimentorum facultatibus: Qui porro, inquit, attri-  
phis, bliti-que gustabilem qualitatem intelligit, brassicæque saporis commemorat, lactucam in brassicæ, ac horum olerum  
mixto esse non diffitebitur: siquidem illa egregie desiccatur, hæc contra planè humida, aquosaque sunt. Quapropter non  
ex solo oleo, garo-que, sed addito aceto sæpius, meliusque assumuntur: alias namque stomacho infesta sunt. Diximus au-  
tem ipsiusmodi olera nonnihil ad leuigandam aluum momenti asferre, maxime si cum humiditate glutinosam lubricita-  
tem sortita sint. hæc Galenus. Quo fit, ut mirari liceat, si Plinij, et Galeni scripta perpendamus, quod dixerit Dio-  
scorides, Blitum aluo utile esse, et nullius in medicina usus.

Bliti uires ex  
Galenio.

MALVA. *fappria*

CAP. CXI.



MALVA fatiua esui longè aptior syluestri. sto-  
macho aduersatur: aluum iuuat, sed multò magis cau-  
les: interaneis, & vesicæ utilis. Cruda folia cum salis  
exiguo manducata, ægilopas ex melle sanant: verum  
cum cicatricem trahere cœperint, ea demum citra salē  
utendum est. Contra aculeatos apium, vesparumque  
ictus, illita efficax est: eadem cruda cum oleo trita per-  
uncti non feriuntur: vlcera manantia in capite, fursu-  
resque cū vrina sanat. Sacris ignibus, & ambustis de-  
cocta folia, tritaque, vtilissimè ex oleo imponuntur.  
Eius decoctum vuluas infestatione mollit: prodest  
erosionibus vesicæ, & intestinorum, vuluæ, sedisque,  
clystere infusum. Ius decoctæ cum radice sua contra  
omnia venena auxiliatur, si continuò à bibentibus re-  
uomatur. contra phalangiorum morsus remedio est:  
lac euocat. Semen in vino potum, addito loti sylue-  
stris semine, vesicæ cruciatus lenit.

MALVA vulgaris adeò notitiæ est, ut nulli ferè reperi-  
tur, qui eam non nouerint. Plura eius genera: sed ea, quæ ali-  
quibus locis in Italia arborefcit, nil aliud est, quam satia cultu-  
rum mangonio in tantam magnitudinem assurgens, ut libro pri-  
mo de plantarum historia cap. v. prodidit Theophrastus, cum in-  
quit. Quædam etiam comperta sunt ob culturam diuersa effici,  
atque à sua natura discedere, ut Malua in altum se attollens, atque in  
arborem transiens. Quippe ita fit neque tempore longo, sed men-  
sibus senis, aut septenis, ita ut longitudine, crassitudineque instar  
bastæ possit grandescere: quapropter commodè ad usum baculi  
uenit. Tempore uerò longiore exacto, pro ratione magis quoque

Maluæ confi-  
deratio.

incrementa capefit. haftenus Theophrastus. Plinio libro xix. capite iiii. præter eam, quæ in Arabia septimo  
mense arborefcit, et baculorum usum præbet extemplo, est et Malua arbor in Mauritania Lixi oppidi æstuario, ubi  
hesperidum horti fuisse produntur. Ipsa altitudinis pedum uiginti, crassitudinis quam circumplecti nemo possit. In  
suis genere habetur et canabis. Maluan, quæ in arborem degenerauerat, uidi ego primum Grignani ad Benacri-  
tæ quodam monachorum coenobio, ubi eorum otio, et cultu tantam sibi ascuerat amplitudinem. Est et ea inter  
maluæ genera recensenda, quæ in hortis ac uiridarijs folio exit magno, rotundo: caule tricubitali: floribus rosarum  
specie rubentibus, candidis, uel subrubeis, nullo tamen odore fragrantibus. Nam si ut rosæ nares conciliarent, quemad-  
modum oculis hilari forma, ac coloris uiuacitate alliciunt, nulli dubium est; quin de præstantia, ac pulchritudine cum  
ipsis rosis certare potuissent. Maluæ meminit Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Mal-  
ua gressis quædam digerentis paululum, et emollientis leuiter est facultatis. Hortensis uerò quanto plus habet aqueæ  
humiditatis, tanto facultate imbecillior est. Fructus eius tanto ualidior est, quanto et sicciior. Porro huius generis est  
et ea, quæ anaderomachæ nuncupatur, sed efficacissima comprehensarum in digerendo. Appellatur etiam althea.  
Et lib. ii. de alimentorum facultatibus: Est, inquit, ab hac hortensi alia quædam syluestris malua, ceu à lactuca est  
Sylvestris, id est lactuca syluestris. Inter uerò has congeneres plantas id est discriminis, nempe quod sicciiora sint syl-  
uestres, satia humidiora. Permissum quoque est maluæ succo aliquid glutinosum, quo lactuca caret. A refrigerandi  
facultate manifestè abest, ut etiam ante sumptionem cernere licet, si ex ambobus uicissim oleribus cataplasma ad calidi-  
tatem effectum, quale est erysipelas, componas: id quod satitare homines consueuerunt, molliuscula folia perquam  
et uenter tundentes, donec ad leuorem exactissimum redacta sint. Tum namque cognosces lactucam manifestò refrige-  
rare.

Maluæ uires  
ex Galenio.



rare: malum uerò modicum, & quasi tepidum quandam calorem obtinere. Facile hoc olus deorsum labitur, non tantum quia humidum est; sed etiam quia glutinosum, præcipue cum oleum, garumq; affatim una haerit. Ad concoctionem mediocriter se habet. Si horum trium olerum, succos inter se compares, tenuis & absterforius betæ, malæ crassior glutinosiorq;, lactucæ in utriusq; medio statuetur.

ATRIPLEX SATIVA. *Matthioli* ATRIPLEX SYLVESTRIS.



Ατρίπλεξ. ATRIPLEX.

CAP. CXII.

ATRIPLEX aliqui chrysolachanon vocant, cognitum olus est. Duo eius genera, sylvestre, & sativum. Coctum estur, ut olus; aluum mollit. Panos discutit, siue crudum, siue coctum ilinatur. Semen cum aqua mulsa potum, regium morbum sanat.

Atriplicis consideratio.

Recentiorum quorundam opinio reprobata.

Spinacia


Atriplicis uires ex Gal.

ET SI in Hetruriae hortis rara admodum sit Atriplex; frequentissima tamen apud Insubres feritur, quod ex præsertim rura sibi quoddam placentæ genus conficiant hoc modo. Incidunt enim acutissimo cultello Atriplicis folia, et caseo in scobem attrito, butyro, ac ouis commiscent, & in sartaginibus foliosa pasta substrata, decoquunt, comeduntq; abunde, perunctis undiq; labijs. Hæc inter olera ocysimè assurgit: nam & feritur, & manditur decimo quinto æstu die. Folia promittit caule tenus lata, in mucronem tamen desinentia, sagittarum instar, pingua, succosa, colore ex uiridi in luteum languescere. Caulis, qui illi rubet, multis undiq; adnatis, ad quatuor cubitorum mensuram adolescit: semine pressis, tenuibusq; folliculis concluso. Præstat Atriplex in cibus uere tantum: siquidem ut ocysimè crescat, ita & uelocissimè senescit, & deperditur. Credidere recentiorum quidam Atriplicem, & Spinaciam uulgo dictam, eiusdem esse generis. Verum ij, meo quidem iudicio, falluntur apertissimè. quippe præter id, quod Spinacia nouum in Italia olus est, & foliorum, & caulis, & seminis forma, atq; colore ab atriplice maxime differt, sicuti et sapore. Namque suspicatur Manardus Ferrariensis, nescio tamen quâ ratione ductus, Atriplicem, & Spinaciam chrysolachani speciem esse. Sed eius sententiam minime probandam censeo: chrysolachanon enim Latinis aureum olus significat, quod tametsi Atriplici competere possit; non tamen ob id Spinaciæ conuenire uidetur, quæ folijs, caule, flore, ac semine perpetuo uirescit. Atriplex, ut memoriæ prodidit Galenus libro 1. simplicium medicamentorum, humida, & frigida temperie est, humida quidem secundi ordinis à medijs, frigida uerò primi, quam utiq; tepidam esse caliditatem possumus, cuiusmodi rosis inest: nō tamen adstrictionis est particeps, sed aquea est, & minimum terrena, similiter malæ. Quam et uentrem celeriter permeat, ut illa, ob lubricitatem. Porro paululum omnino eius est, quod digerendi obtinet potestatem. Hortenses autem atriplex, & malua, quam agrestes tum humidiores sunt, tum frigidiores. Proinde phlegmonis, & phygetiblis incipientibus, gliscentibusq; & mollibus etiamnum, ac uelut feruentibus hortenses: uigentibus autem, & decli-

et declinantibus, ac indurescentibus commodiores sunt agrestes. Semen eius abstergendi uim habet: itaq; ad morbum regum ex pinatæ (rectius fortè hepatis legendum) infarctu prognatam utile est. hæc Galenus. Scribit Serapio Regini uidisse hominem quendam, qui ex Atriplicis semine duarum drachmarum pondere sumpto, crebris tum uomitionibus, tum alui deiectionibus uexatus fuit, adeo ut ad extremam uirium imbecillitatem deuenerit. Quod mihi quidem mirum non est: quandoquidem noui ego pharmacopolam quendam, qui ad rusticos purgandos Atriplicis tantum semen exhibebat: quod ijs non sine molestia magna aluum abunde ciebat, atque etiam simul crebros prouocabat uomitus. Que tamen facultas paucis, ut puto, hætenus innotuit.

BRASSICA CRISPA. *Κρίβη*

BRASSICA CAPITATA.



*Κρίβη*

BRASSICA.

CAP. CXIIL

4<sup>a</sup> BRASSICA satiuæ aluo idonea est, si modò leuiter feruescens edatur. nam percocta aluum fistit, sed multò magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur: stomachum autem malè habet. acrior est æstiuæ. In Aegypto propter amaritudinem non estur. Cæcutientibus, & tremulis esse prodest. Summo cibo sumpta crapulam discutit, & vini noxam restinguit. Melior stomacho cyma, sed acrior, & ad ciendum urinam validior. ea condita stomacho inimica est: aluum conturbat. Crudus succus cum nitro, & iri deuoratus, aluum emollit: cum uino quoque epotus, viperarum morsibus auxiliatur: cum fœni græci farina, podagris, & articulorum vitij illinitur: prodest & sordidis vlceribus, & uetustis illitis: caput purgat naribus infusus: menses extrahit, cum loliacea farina inditus. Folia per sese illita, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumoribusque: epinyctidas, ignem sacrum, leprasque sanant. carbunculos ex sale rumpunt: fluentes capillos retinent. Cocta addito melle aduersus depascentia vlcera, gangrænasque valent. Lienosisque ex aceto cruda profunt. Mansa, deuorato succo, retusam vocem instaurant. Decoctum eius potu, aluum, & menses ciet. Flos post conceptionem in pello subditus, partum abortu vitiatur. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto nascitur, potum tineas repellit. In antidota theriaca additur: facit cutem, lentiginesque expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci uetusto excepti, diuturnos laterum dolores mitigant.


*Κρίβη ἀγρία*

BRASSICA SYLVESTRIS.

CAP. CXIIII.

SYLVESTRIS Brassica, maritimis præruptisque locis, magna ex parte gignitur: satiuæ similis, sed candidior, hirsutiorque, amara. Cuius cyma in lixiuio cocta, ori non insuauis. Folia illita vulnera conglutinant, & inflammationes, tumoresque discutiunt.

*Κρίβη*

Brassicæ sati-  
uæ genera.

MARINA Brassica à sativa prorsus abhorret, quod folia ferat rotundæ aristolochiæ, longa, tenuia: singula à ramulis rubentibus exeunt, singulari, ut hederæ, pediculo. Albo succo prædita est, sed pauco, falso gustu, & aliquantum amaro, pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris: vehementissimè alium ciet in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniam cum pingui carne.

SATIVA Brassica, Theophrasto, & Plinio autoribus, in multiplex recensetur genere. Id quod & horti in Italia attestatur: nam in ijs multiplex, & varia crescit Brassica. Cato brassicæ tria fecit fastigia. Vnam grandibus, latiq; folijs, caule magno, consili cimarum luxuria. Alteram crispo folio, quam ab apij similitudine apianam uocant. Tertiam propriè uocatam crambem, minutis caulibus, tenerioribus folijs, leuem, teneram, tenui succo, acerrimam quidem omnium, & magis medicamentosam. Verum Plinius libro XIX. cap. VIII. Brassicæ (ut diximus) complures enumerauit species. Inter quas eam Sabellicam appellari tradidit, quæ crispis admodum folijs, lactuce modo in se concluditur, intus albicans, tenera, subdulcis, & quæ hac ætate omnium præstantissima habetur. Ait enim, Sabellicæ usque in admirationem crispæ sunt folia, quorum crassitudo caulem extenuat, sed dulcissima perhibetur ex omnibus. Est & capitata conglomerata undique in orbem folijs, Plinio lacuturris appellata, qui loco citato sic inquit.

Nuper subiere lacuturres ex conualle Aricina, ubi quondam fuit lacus turrisq; quæ remanet, & apud prægrandes, folio innumeri. Alij in orbem porrecti, alij in latitudinem torosi. Nec plus capitis ullis post trinitatem, cui pedale aliquando conspicitur: & cima nullis serior. Quæ omnia nostratibus brassicis capitatis, quæ uulgò Capucci dicuntur, pulchrè correspondent. Est insuper ex ijs, quæ nostris Italiæ hortis proueniunt, alia quædam cæcis caulibus rapi in morem extuberat, manditurq; subinde medulla, pingui iure incocta raporum modo. Huius non reperio meminisse Plinium, nec coactiores alios, qui de hortorum sationibus scripsere: sicuti nec illius, quæ folijs ætatem per ambitum laciniatis, minutimq; intercisissis assurgit. Pernicialia porrò Brassicis omnibus cum uitis odia sentantur. Vitemq; uiuam oleris huius odore fugari Theophrastus, & Plinius affirmant: asitamq; ad olus diffugere Varro tradidit. Quo argumento usus Androcides, Brassicam contra temulentiam pollere credidit. Sed cur crapulam sola, id causæ reddidit in problematibus Aristoteles, quod scilicet dulcem nimirum succum, abstergentemq; contineat.

Brassicæ syl-  
uestris cōsid.Brassicæ vires  
ex Galeno.

Syluestris in maritimis nostris Senensibus Argentario promontorio, alijsq; tum Tyrrheni, tum Adriatici litoribus frequens nascitur. Hanc nō longè à Terracina urbe, uia qua itur Neapolim, plurimam uidimus, folijs domesticæ similibus, sed hyoscyami modo hirsutis, amaro ac insuauis gustu. Ex semine Brassicæ ueteris (ut Plinius est autor lib. XIX. cap. X.) rapæ sunt, atq; inuicem. Brassica sativa, & esculenta, ut memoriæ prodidit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, desiccandi uim habet tum esatam foris imposita, non tamen etiam admodum acrem. Alioquin & uiscera glutinat, & maligna ulcera sanat: præterea phlegmonas iam induratas, ac ægrè solubiles, & id genus quoque erysipelata. Eadem facultate epiphyctidas, & herpes sanat. Habet quiddam etiam in se absterforium, quo lepra curatur. Porro semen eius potum lumbricos interficit, maxime brassicæ Aegyptiæ, quantum ea scilicet temperatura siccior est. Sanè amaræ qualitatis particeps semen est, sicut uidelicet omnia alia medicamenta, quæ ad lumbricos idonea sunt. Secundum eandem facultatem ephelidas, & lentes, & quæcumq; alia modicam absterfionem postulant, adiuuat. Cakes brassicæ combusti, cineres efficiunt admodum desiccantes, ut uidelicet iam adurentem uim participent. Hac ratione ueterem adipem commiscentes, ad inueteratos laterum dolores, & si quid eius fuerit generis, adhibent. Nam ualentia digerens medicamentum efficitur. Brassica uerò agrestis quodammodo calidior, sicciorq; domestica est, cui alie prope modum omnia agrestia sui generis, domesticis secundum utraq; hanc facultatem ualentiora sunt. Quamobrem neque intra corpus citra noxam sumitur, ut quæ longius ab humana recesserit temperatura. Eadem de causa et gustibus amarior est, quam domestica: quanquam domestica quoq; subamarum quiddam, & acre contineat: sed utraq; habet agrestis ualidam. quare etiam extergit, & digerit quam domestica ualentius. Marina autem brassica supra quam quod uentrem deiciat, utpote subsalsa, & subamara gustu, fuerit sanè etiā ad externos corporis usus, & ad omnia ea, ad quæ tales qualitates accommodantur, idonea. Et lib. II. de aliment. facultate: Brassica quoq; inquit, à multis ut obsonium estur: medici autem, ut desiccante medicamento, ea utuntur. Diximus de hac quædam cum de facultatibus medicamentorum ageremus, tum etiam in libro superiore: quæ nunc summam perstringemus. Ergo Brassicæ succus purgandi uim quandam obtinet: contra solidum eius corpus siccitatis ratione cohibere magis, quam incitare deiectionem potest. Proinde cum expellere alui excrementa propositum erit, abeno, in quo elixa uia cum aqua facta, proprius

propterea adnoto, ipsam eximere confestim, uasculoque in quo paratur, oleum cum garo injicere oportebit: si saltem pro  
 greo, nihil refert. At humentem alium siccare uolentes, cum mediocriter bullisse videbitur, priore aqua effu-  
 sa repetere, aliam calentem injicimus: ac ita rursus in ea discoquimus, usque dum tenebrae flaccidaque euaserit. quod non  
 facimus, cum uentris subducendi gratia sumitur. haecenus Galenus. Ceterum licet Dioscorides prodiderit marinam  
 brassicam folia ferre rotunda aristolochiae, longa, ac tenuia; ea tamen non ab re ab omnibus esse censetur, quam uulgo  
 officinarum Soldanellam appellat. Quippe quae in maritimis nascatur, folijs lactico succo madeat, ramulis constet  
 ramentibus, e quibus prodeunt ipsa folia, hederæ modo, quae gustu salsa, et amara, et quadantenus acris sentiuntur.

Brassicae ma-  
 rinæ confid.

Quamobrem Dioscoridis codicem hoc in loco, sicut et in alijs permultis, mendis suspicione non uacare putamus. Fa-  
 ctum enim euersisse crediderim librariorum incuria, ut folia *maxima*, id est, longa, pro *maxima*, id est, parua, hoc loco  
 successerint: et certe facilis fuit unius literæ lapsus. Siquidem Soldanella uocata omnibus notis marinam brassicam  
 representat, exceptis folijs, quae sunt aristolochiae rotundae minora. Ruellius uir doctissimus, etsi in hoc nobiscum  
 ceterisque consentiat, quod marina brassica haec sit herba, quae uulgò Soldana, et Soldanella dicitur, nulla etiam (ut in-  
 quit) reclamante nota; in eo tamen manifestè aberrasse deprehenditur, quod Soldanae folia aristolochiae longae, atque  
 praelongae reddiderit. Errat praeterea in hac planta Matthaeus Siluaticus pandectarum autor, quod crediderit  
 hanc Chachile Soldanellam esse. Cuius error apertè cōuincitur ipsius Serapionis testimonio: quippe qui Chachile  
 fœne et simile fecerit, folioque non aristolochiam, sed nasturtium imitari tradiderit. Marinam brassicam in litori-  
 bus Venetijs, Aqualienibus, ac Tergestinis, ubi copiosa nascitur, nos saepius uidimus, ac legimus.

Locus Diosc.  
 suspectus.

Ruellij error.

Siluatici er-  
 ror.

BETA NIGRA. *Mangolt*

BETA CANDIDA.



ΒΕΤΑ

BETA

CAP.

CXVI.

BETA duorum generum est. E quibus nigra coquitur cum lenticula, ut ventrem sistat: quod  
 magis radice eius praestatur. Candida aluo utilis est. Vtraque tamen propter nitrosum humorem,  
 quem habet in se, noxij succi est. Vnde succus earum, cum melle naribus inditus, caput purgat: au-  
 rum doloribus auxiliatur. Decoctum radice, & foliorum, furfures, lendesque deterget: pernicio-  
 sas formitigat. Crudis folijs vitiliginis, nitro antea perfrictas: alopeciarum inanitates, scalpello  
 prius exasperatas: atque depascetia vlcera, illini prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro, am-  
 bulisque cocta medetur.

BETA tam candida, quam nigra in Italia hortis frequentissima nascitur. In Germania tamen habetur et rufa,  
 et modo folijs; sed etiam radice, quae illi raporum oblongorum magnitudine extuberat: colore adeo rufescente, ut eius  
 succus

Beta: conside-  
 ratio. Nota.

Betae facultates ex Gal.

Betae sylvestris Plinio.

succus uinum sanguinem referat. Hanc Germani hyeme cineribus calentibus obrutam coquant, subinde cortice exuunt, & in acetarijs asperso pipere concinnant ad esum, carotæ uulgò uocatæ modo. Sed & illis dulcior est, & gustui gratior. Betae facultates adnotauit Galenus lib. v. simplicium medicamentorum, sic inquit. Beta nigrae facultatis particeps est, quia tum digerit, tum extergit, & per nares purgat. Ceterum cocta nitrositatem omnem exat, siq; facultatis phlegmonis aduersæ, leuiter digerentis. Porro ad detergendum, digerendumq; ualidior est Beta alba. Nam nigra adiunctum habet adstrictionis quippiam, & magis in radice, quam alijs partibus. Et libro 11. de alimentorum facultatibus inquit. Betae absterforius melle succus conspicitur, adeo ut aluum ad excretionem extimulet, & nonnunquam stomachum demordeat, præsertim ijs, quibus natura sensu exaltiore præditus est: ob idq; largius commansa, stomachum infestat. Huius, cum aliorum olerum, exigua est almonia. Iecoris obstructionibus, quam maxime aptius accommodatur: magis autem ubi cum sinapi estur, aut aceto. Lienosos item similiter manducata mirifice curat. Iure enim quis ipsam medicamentum potius, quam alimentum dixerit, ubi hoc modo manditur. hætenus Galenus. Inueniri sylvestrem Betam tradidit Plinius libro xx. capite v. eamq; uocari Limonium, quod describitur à Dioscoride libro quarto, à Galeno uerò libro v. simplicium medicamentorum. Cuius sententiæ refragatur Galenus libro 11. de alimentorum facultatibus, cum inquit. Equidem non satiuam solium maluam; sed agrestem quandam etiam esse perhibuimus, quemadmodum et lactucam. At agrestis Beta nulla est, nisi utiq; quis lapathum ita nominare uelut. Cædida beta, Plinio loco nuper citato autore, cocta, & cum allio crudo sumpta, alui tinea enecat. Succus à fecibus expurgatus (ut ipse sæpius periculum feci) chysteribus infusus, ad indurata alui euocanda excrementa mirum in modum pollet, præsertimq; ubi lenientia clysmata nihil profecerint.

Ανδρῶν.

PORTULACA. *Burgul*

CAP. CXVII



Portulacæ genera.

Portulacæ uires ex Gal.

PORTULACAE vis adstringit. Capitis doloribus, inflammationibus oculorum, cæterisque, cum polenta imponitur: ardoribus stomachi, sacro igni, vesicæ doloribus, auxiliò est: commanducata dentium stupores sedat: stomachi, & intestinorum æstuationem, fluxionesque mulcet: renes, & uesicam adiuuat, etiam si erosionem sentiant: veneris impetus exoluit. Succus epotus simili effectu prodest, in febribus ualens. Contra teretes uentris tinea, cruentam excreationem, dysenteriam, hæmorrhoidas, & profluuia sanguinis, percocta efficax est: item contra sepiis morsus. Oculis medicamentis utilissimè commiscetur: interneis fluxione laborantibus, atque vuluarum erosionibus, infunditur: contra dolores, quos æstus excitant, caput ex rosaceo, & oleo fouetur: eruptiones papularum in capite, cum uino emendat: vulneribus, quæ ad syderationem spectant, ex polenta illinitur.

PORTULACA omnibus uulgarissima est. Duo eius habentur genera. Vnum satiuum, cui folia insunt latiora, & crispior in altum se attollens. Alterum uerò sylvestre, humile, minoribus, tenuioribus, ac crebrioribus folijs. Portulacæ meminit Galenus libro v. simplicium medicamentorum, ubi ita scribit. Portulaca frigida, & aquea temperamento est, particeps cuiusdam austeritatis. Proinde fluxiones repellit, & maxime biliosas, & calidas, cum eo, quod eas metet, & in qualitate alteret, magnopere refrigerans. Et fuerit sanè in refrigerandi quidem facultate tertij excessus à temperatis, ac medijs: in humectandi uerò secundi. Hac ratione & æstuant, ut si quid

aliud, adiuuat tum uentris osculo imposita, tum totis hypochondrijs, potissimum in febribus hecticis. Præterea dentium stuporem sanat, nempe quæ ab acidorum succorum contactu, asperè exccata fuerant, leniens, atque repletus, utpote cum uiscosam habeat humiditatem. Similiter uerò & succus eius. Itaq; non foris modo impositus; sed epotas quoq; refrigerat. Hoc sanè & toti herbe comese accidit. Quoniam autem subastringit, utiliter dysentericis cæter, & muliebri profluio, & sanguinis reiectionibus. Sed ad hæc quidem multò est, quam herba, succus ipsius efficax.

Et lib. 11. de alimentorum facultatibus: Portulaca (inquit) quidam ut cibo utuntur: sed inbecillum præbet alimentum, eamq; humidam, frigidam, & glutinosam. Vt medicamentum autem, dentium stupori medetur ob lenorem suum morsus expertem. de ea diffusius in opere de facili parabilibus sumus locuti. Hæc ipsa, ut tradidit Plinius lib. & cap. xx. emplastri modo imponitur umbilico prociduo. Sanat & mammariam, & podagræ inflammationes, & melle, aut cinolia creta. Prodest in uniuersum omnibus calidis affectibus.



Ἀσπράγος. ASPARAGVS. *Asparagus* CAP. CXVIII.



**CORRYDA**, siue syluestris asparagus, vulgaris est notitiæ. Huius cauliculi in cibo cocti, ventrem emolliunt, urinam cient. Radicis decoctum contra urinæ difficultatem, regium morbum, renum uitia, & coxendicum cruciatus, in potu proficit: cum uino autē, phalangiorum moribus auxiliatur. Si decocti succus super dente contineatur, eius dolori medetur. Semen potum ad eadem ualet. Canes, ut aiunt, si decoctum bibant, emoriuntur. Asparagum etiam nasci prodiderunt, arietis cornibus contulis, atque defossis. quod, quantum equidem sentio, planè à ueritate abhorret.

† Altilis autem asparagus, multis ramis fruticat, folijs fœniculi, longis, numerosis; radice rotunda, grandi, spongiam habente. Huius teneri cauliculi triti in uino albo, renum dolores sedant. Assus autem, coctusue, urinæ stillicidium, difficultatemque, ac dysenterias mitigat. Radix cum uino, aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta cum ficis, aut ciceribus, sumpta, regium morbum sanat: coxendicis cruciatus, stranguariamque leuat. Alligata radix, aut haustum eius decoctum, conceptum adimit, & sterilitatem adfert.

ASPARAGI tam satiui, quàm sponte nascentes, in Italia notissimi sunt. Meminit horum Galenus libro vi. simplicium medicament. sic inquit. Asparagus petraeus, aut myacanthinus abstergendi uini habet, idq; citra manifestam aut caliditatem, aut frigiditatem. Hinc renes, ac iecur infarctu liberat, & maxime herbe ipsius radices, & semen. Quin & dentium dolores sanat siccitatis nomine, quam uel maxime dentes requirunt.

Asparagorū  
uires ex Gal.

Et lib. ii. de alimentorum facultatibus: Insuper (inquit) asparagorum alius regius in hortis nascens, alius ἐλαος, id est, syluestris appellatur, ceu alius ab ijs, qui à bryonia oritur. Omnes autem stomacho utiles sunt, urinam cient, & parum prebent nutrimenti. Si tamen ij probè concoquantur, olerum asparagis magis alunt, nimirum quanto illis sunt sicciores. hec Galenus. Asparagi in cibo sumpti, ut scribit Plinius libro xx. capite x. oculis claritatem afferunt: pectoris, & spinæ doloribus prosunt. Venerem stimulant, & ventrem leniter molliunt. Asparago trito cum oleo perunctos, pungi ab apibus negant. haftenus Plinius. Ceterum, ut memorie prodidit Auicenna Fen ultimi libri quarti, Asparagi in cibis suauis odore corpus totum commendant: uerum urinam fetidam trahunt.

Ex Plinio, &  
Auicenna.

† Licet in Grecis non planè constet, hic altilis, uel satiui asparagi mentionem fieri: tamen non uideo, quomodo hec ad syluestrem quoq; referri possint, ut aliqui referenda censent. Cum enim hunc notum esse antea dixisset Dioscorides, non aliam, ut solet, eius subiiecisset descriptionem. Quo fit, ut hæc potius ad satiuum referenda putemus, uel saltem mendum subesse suspicemur.


Ἀργύλαων. PLANTAGO. *Plantago* CAP. CXIX. *Brnjt*

**DVO** Plantaginis genera. Minor folia habet angustiora, minora, molliora, læuiora, & tenuiora: cauliculo anguloso, in terram inclinato: floribus pallidis: semine summis caulibus emicante.

Altera maior, lætior, uirentiorque, latis constans folijs, oleracei generis: cuius caulis cubiti altitudinem petit, angulosus, subruber, à medio ad uerticem tenui semine circumdatus: radicibus nitentur teneris, hirsutis, candidis, digitorum crassitudine æquantibus. Nascitur in lacunosis, sepibus, & locis humidis. Multò utilior magna est. Vim habent folia exiccatoria, constringentem. quare omnibus malignis ulceribus, & fluxioni opportunis, atque elephantice, sordidisque illita profunt: profluvia sanguinis, vlcera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, nomasque cohibet: vetera ulcera, & inæqualia cicatrice obducunt: chironia sanant: sinus conglutinant: moribus canis, ambustis igni, inflammationibus, panis, parotidibus, strumis, ægilopijs, illita cum sale prosunt. Coctum cum aceto & sale olus, dysentericis, coeliacisque, sumptum subuenit. Datur & in locum bezæ cum lenticula coctum. & ad aquam intercutem, cui leucophlegmatix nomen est, datur & herba decocta post aridas epulas, sic ut media antecedit. comitialibus, & suspiriosis data proficit.

Foliorum succus, colluta subinde oris ulcera, purgat: cum cimolia, aut cerusa igni sacro medetur: fistulis infusus prodest: lippitudinibus, & aurium doloribus idem succus instillatur. additur quoque in oculorum collyria. gingiuis cruore suffusus, & sanguinis reiectionibus, poru confert: clystere

## PLANTAGO MAIOR. PLANTAGO MINOR.



clystere dysentericis infunditur: contra tabem datur in potu: aduersus strangulationes vulu, in uellere subijcitur, etiam si vulua fluxione laboret. Semen ex uino potum alui fluxiones, & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix, & manducatu, & collutione, dentium dolores sedat: eadem cum folijs, vlceribus renum, & uesicæ in passo datur. Ferunt tres radices, cum tribus uini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis. Sunt qui radicis gestamine, discutientis strumis videntur.


Plantaginis  
consideratio.

Plantaginis  
vires ex Gal.

QUANQVAM à Dioscoride, Plinio, Apuleio, alijsq; omnibus antiquis authoribus, duo tantum Plantaginis genera recensentur, maius nimirum, & minus: eam tamen, quam uulgo, quod lanceæ cuspidis formam refert, Læceolam appellat, esse tertiam quandam Plantaginis speciem, nemo est qui ambigat. Hetruscis plantago Centumria uulgò uocatur, corrupto à Quinqueneruia uocabulo. Maior, eo quod eius folia, quæ latiora sunt, fibræ septem, quam neruis distinguuntur, Septineruia appellatur. Media, quoniam in eius folijs quinque apparent costæ, Quinqueneruia dicitur. Minima uerò, quod eius folia, quæ leuiter hirsuta sunt, tres tantum habeant neruos, Trineruia dici potest. Plantago (ut scriptum reliquit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum) mista est temperaturæ: habet enim quiddam aqueum frigidum: habet uerò & austerum quiddam, id quod terreum est, siccum, frigidum. Itaq; refrigerat simul, & desiccatur, & in utroque secundi excessus à medijs est. Porro medicamenta, quæ cum hoc quod refrigerant, unâ etiam sicca sunt, ea & ad ulcera rebellia omnia, & ad fluxiones, & putredines conueniunt, ac prout de & ad dysenterias: nam & sanguinis profluvia sistunt, & si quid aduratur, refrigerant: tum sinus quoque purgant, & alia ulcera recentia simul & uetera. In omnibus ferè id genus medicamentis primas tenet, aut certe nâsse secunda est plantago, idq; temperaturæ symmetria, & conuenientia. Nam siccitatem obtinet morsus expertem, & frigiditatem, quæ nondum obtupefaciat. Semen eius, & radix similis sunt facultatis, nisi quod siccioris, & minus frigide. Sed semen etiam subtilium est partium: radices uerò crassiorum. Ipsa autem herbe folia exiccata tenuiora, & minus frigide facultatis sunt: nempe diffuso ex eo, ac digesto excremento aqueo. Hac ratione & radicibus uicinis ad dentium dolores tum mandentes, tum collutionibus ipsorum incoquentes. Præterea ad iecinoris, & renum obstructions, non has tantum adhibent; sed folia quoque, & multo magis semina. Hæc enim quandam in se abstergeris facultatem obtinent: quam & in herba uiridi inesse satis conijci potest, uerim ab humiditatis copia uinci.

ΣΙΩΝ. SIVM, SEV LAVER. *Wassmeyer p. 18* CAP. CXX.

SION in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, folijs latis, olusatro similibus, sed minoribus, & odoratis. Quæ cruda, cocta quæ esu, calculos rumpunt, atque excernunt: urinas cient: menses, & partus extrahunt: dysentericis in cibo auxiliantur. De sio Crateuas tradit, herbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora quam menthæ, nigra, & ad erucam accedentia.



SIVM in scaturientium fontium riuus, quorum aquæ hyeme calent, æstate uerò frigescunt, plerumq; nascitur. Ceterum saluantur apertissime, qui pro Sio herbam Crescione uulgò uocatam, tam scilicet dulcem lactucæ similem, quam acrem, ac subamarâ, cui nasturtij sapor, & erucæ folia insunt, in medicamentis usurpant. Quippe quod ea non alia sit planta, quam sisymbrium aquaticum sequenti capite à Dioscoride descriptum, non legitimum Sium, quod nostratibus Senensibus uulgò uocatur Gorgolestro. Hoc enim à Dioscoridis Sio nullis prorsus dissidet notis: quandoquidem pinguis est planta, caule recto: folijs latis, in ambitum serratis, olusatro similibus, sed minoribus, & odoratis: floribus candidis: semine corniculis incluso. Rari admodum sunt fontium riuuli, quibus aquaticum sisymbrium innatet, qui Sium etiam non habeant. Plinius libro, & cap. xxii. Sium cum aquatico sisymbrio confudisse uidetur: quod Sio sisymbrij aquatici uires assignauerit, nominis fortasse communitate decèptus. Nam Dioscoridis testimonio, sisymbrium hoc, quod aliqui cardaminam uocant, nonnulli etiam sium appellant. Vnde quod fortè existima uerit Plinius Sium, & cardaminam unam, & eandem plantam esse, uni tantum Sio utriusque facultates reddidit: etsi prius lib.

Sij consideratio.

Plinij lapsus.

xx. cap. xxii. speciatim de syluestri sisymbrio in riguis proueniente differuerit. Serapio Sium Senacion uocat: Verum senecio Dioscoridi alia est planta, ut libro quarto in eius mentione explicabitur. Sij meminit Galenus lib. viii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Sium quantum gustu odoratum est, tantum etiam excalfacientis facultatis est particeps. Digerit autem, & urinam mouet, & calculos renum frangit, & menses euocat.

Sij uires ex Galeno.

ΣΙΣΥΜΒΡΙΟΝ. SISYMBRIVM. *Wassmeyer p. 18* CAP. CXXI.

SISYMBRIVM (alij serpyllum syluestre vocant) in solo inculto nascitur, menthæ hortensis similitudine, odoratius, latiore folio. Inseritur coronis. Calfaciendi vim habet. contra stillicidia urinae, calculosque, semen ex vino bibitur: tormina, & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti, aut temporibus illinuntur: item contra vesparum, apumque ictus. Vomitiones potu cohibet. Alterum sisymbrij genus, aliqui cardaminam, alij sion appellant. Ea herba riguis gaudet, & eisdem in locis, quibus sion, prouenit: quæ ideo nonnullis cardamina nominatur, quod gustu cardami, id est nasturtium repræsentet. Folia primùm rotunda prodeunt, adulta erucæ modo fiunt. Id excalfacit, urinas mouet. crudum estur. Purgat lentigines, cutisque vitia in facie, nobis impositum, matutinisque detractum.

TAKETSI prodiderit Dioscorides Sisymbrium in solo inculto nasci, Theophrastus tamen lib. vi. cap. vii. de plantarum historia, & lib. v. cap. viii. de earum causis, satium etiamnum Sisymbrium in hortis reperiri postea memorie commendauit. Quod sanè eam herbam esse crediderim, quæ hodie in omnibus ferè hortis prouenit, quam nostrates officina Balsamitan, uulgus uerò mentham Romanam, uel crispam appellat. Quippe quod hæc prostrata folia circinata, & uulgaris menthæ latiora, crispata tamen: caulem quadrangulum, rubentem, uirentemq;: & odore, gustuq; mentha longè acrior sentiat. Cuius rei illud etiam, præter assignatas notas, manifestum indicium facit, quod Balsamita hæc facile in mentham degeneret, nisi diligens admodum adhibeatur cultura. Quod libro de plantarum causis paulò ante citato, apertè testatur Theophrastus his uerbis. Sisymbrij mutatio in mentham, uelut prædictis opposita scilicet est, cum ex neglectu eueniat. Fit enim cum quis non excolit, neq; curam solitam adhibet, ut radices amplius deducantur, quam in partem ut tota conuersa, debiliior pars superna consistit, odorisq; sui uehementiam emittit, quasi ex ambobus illis, germine, atq; odore similitudo proueniat. Quippe acritudine exolecente, reliquus odor, qui molis quadam, remissusq; est, proxime ad mentham accedit. Quamobrem transferre se penumero iubent, ne istud eueniat. Hæc Sisymbrij causa est. hæc tamen Theophrastus. Sed equidem non putauim Dioscoridis Sisymbrium sponte in cultis nascens, cum Theophrasti Sisymbria conuenire: quin potius alterum ab altero longè dissidere crediderim.

Sisymbrij consideratio.


Sisymbrij in mentham mutatio.

SISYMBRIUM HORTENSE.

SISYMBRIUM AQUATICUM



SISYMBR. AQ. V. ALTERVM.



Brafuoli error.

Sisymbrium  
aquaticum.

Sylvestre enim in Ananienſi agro in incultis natum compluribus locis uidimus, ac legimus, nullis deficientibus notis illi à Dioscoride tributis. quod mihi quidem ſatiuo effigie planè reclamare uisum est. Huc alia accedit ratio, qua facile probari poteſt, ſylveſtre Sisymbrium à ſatiuo plurimum diſferre. Quandoquidem ſi idem eſſent, cùm Sisymbrium culturæ negligentia in mentham degeneret, fieri quidem non poſſet, ut ſylveſtre aliter uſquam inueniretur, quàm in mentham permutatum, cùm nulla hominum cultura naſcatur. Quo poſtmodum fieret, ut locus, in quo Sisymbrium primo aleuiffet, breui temporis tractu ubiq; mentha ſcateret; quod tamen nuſquam haſtenus factum reperi. Ceterum Braſauolus, cùm hoc forte non perpendiſſet, credidit Baſamitam, quam ipſe Florantinam mentham appellat, tam ſatiuum, quàm ſylveſtre Sisymbrium indifferenter explere poſſe. Qui præterea ſatetur ſe uidiſſe (quod potius eum oculos ſeſeſiſſe putauerim) Baſamitam deſciſſe in calamintham Plinium quidem, non Theophrastum ſecutus. Siquidem Theophrastus in mentham, non in calamintham Sisymbrium deſciſcere prodidit. Plinij uerò codices nonnulli libro xix. cap. x. ſcriptum quidem habent, quòd Sisymbrium in calamintham degenerat, quam lectionem accepit Braſauolus: ſed ea leſtio deprauata cenſetur. Idcirco factum eſt, ut ij, qui Plinium caſtigarunt, eam reſtituerint, quòd compertum habuerint Plinium ex Theophrasto hiftoriam ſumpſiſſe. Itaq; iam eius loci uera, & legitima leſtio eſt, ut in caſtigatis codicibus legitur, quòd Sisymbrium in mentham deſciſcat, non in calamintham. Sisymbrium uerò, quod (ut Dioscorides inquit) aliqui Cardaminam, alij Sium appellant, ea nomen herba eſt, quam uulgò noſtri Creſcione appellant, acri ſapore prædita, de qua etiam diximus in præcedenti capite, de Sio diſſerentes. Siquidem ea in fontium riuus diſcurrentibus comite Sio naſcitur, ſilijs


primo exortu rotundis: cum uero adoleuerint, erucæ modo dissectis: odore, ac sapore satiuo nasturtio proxima. Memine huius Plinius libro xx. cap. xxii. quauis libro xix. capite v. alud Sisymbrij genus commemorari his uerbis. Sisymbrium simili modo feritur. Letissimum nascitur in puteorum parietibus, & circa piscinas, & stagna. Puteum quidam existimant, Plinium de uulgaris menthastrum, quod in aquosis passim prouenit, disseruisse. Sisymbrium utriusque mentionem fecit Galenus lib. viii. de simplicium medicamentorum facultate, sic inquit. Sisymbrium partium digerentis, excoficientis, & exiccantis facultatis est, & temperaturæ in tertio ordine. Sed & semina tenuium partium est, & calidum. Quocirca ipsum quidam cum uino exhibent singultientibus, & tormina partibus. Sisymbrium uero, quod quidam Cardaminem uocant, quandoquidem cardamo, hoc est, nasturtio simile quoddam gustu præfert, cum siccum est, tertij est ordinis excoficientium, & desiccantium: cum humidum, & urina de secundi.

Sisymbrij  
utriusque ui-  
res ex Gal.

Κριθμῶν.

CRITHMUM.

CAP. CXXII.



CRITHMUM, seu, ut aliqui, Crithamon, fruticosum, & undique foliosa herbula est, cubiti altitudinem fere petens. Nascitur in maritimis, & petrosis: folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, veluti portulacæ, latioribus, & longioribus, falso gustu: flores candidi sunt: & semen, ceu rosmarini, odoratum, molle, rotundum, quod siccatum rumpitur: habet intus tritici modo nucleum: radices digiti crassitudine, tres, aut quatuor, grati odoris, & iucundi. Radix, semen, & folia in cocta uino, potu urinae difficultati, & regio morbo auxiliantur: menses cient. Estur crudum, coctum uero in oleo. Seruatur etiam in muria.

NASCITUR Crithmum non modo in omnibus Tyrrheni promontorijs, scopulis, ac rupibus, præsertim Argentario monte in maritimis nostris Senensibus, & uniuerso circum Italiani litoris: sed etiam in Adriatico sinu, ubi scopulosa, & prærupta superstant litora. Crithmum Romæ, & in uniuersa fere Hetruria Foeniculum marinum dicitur: est in alijs quam plurimis Italiae locis, ubi à maritimis in hortis, ac uiridarijs translatus utrefcit, herbam sancti Petri appellitet uulgius. Quo nominis argumento non desunt, qui existiment, plantam hanc legitimum esse Empetron, libro iiii. à Dioscoride descriptum inter simplicia medicamenta, quæ deiectoria polient facultate. Inter hos inuenio Pandulphum Collinatum in defensionibus Plinij contra Leoniceum, qui Empetron corrupto uocabulo Sancti Petri herbam uocari putat, nulla habita facultatis, notarumque ratione. Cuius sententia

Crithmi cō-  
sideratio.

Quorundam  
lapis.

maxime refragatur experientia, quod Crithmum, quanquam abunde, copioseque ingestum, nec pituitam, nec bilem, nec aquam intercutem trahit, quemadmodum empetro reddidit Dioscoridis: qui propterea illud inter ea, quæ aluum deiciunt, medicamenta locauit. Quomodo autem Empetron quis idem cum herba sancti Petri recte dixerit, si empetron nullis alijs à Dioscoride representatur notis, quam quod nascatur in montibus, & maritimis, falso, & amaro sapore? Verum tamen non modo putandum; sed etiam pro certo, meo quidem iudicio affirmandum erit, herbam hanc Crithmum esse. Quippe quod ea notis omnibus, quæ radicibus, folijs caulibus, ac seminibus, & uniuersæ denique plantæ tribuit Dioscorides, Crithmum planè referat. Crithmi uires recensuit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum; his uerbis. Crithmum gustantibus salsum quodammodo est, cum paucula amaritate quamobrem uis eius est exiccator, & abstersoria. Vtraque tamen imbecillior in eo est, quam in amaris.

Crithmi vi-  
res ex Gal.

Κορωνόπος.

CORONOPUS.

CAP. CXXIII.

CORONOPUS oblonga herbula est, per terram strata, fisis folijs. Coquitur in oleo. Radicem habet tenuem, adstringentem; quæ in cibo coeliacis facit. Prouenit in aggeribus, & locis incultis, & secus uias.

VARIAS, ac diuersas reperio eorum fuisse sententias, qui non parum laboris, ac studij impenderunt, ut plantæ historiam à mendis omnibus expurgatam pristina, ac propriæ redderent integritati, in inuestigando, quanam inter tot plantas legitime Coronopus dici possit. Quorum unus extitit Nicolaus Leoniceus, uir quidem ingenio, & doctrina præclarus, qui longa uerborum serie hac de re scripsit, conclusitque tandem, Coronopum eam herbam esse, quam ipse uernacula sua lingua Capriola, nos uero nostra Sanguinella appellamus, quod eam pueri æstate naribus indant, ut in de sanguinem eliciant. Verum cum eius sententiam minime probandam existinauerit Manardus Ferrariensis, hac in re

Coronopi cō-  
sideratio.



## CORONOPVS.

Quorundam  
opinio dam-  
nata.


Leonice-  
nii opinio repro-  
bata.

Gramen acu-  
leatum Plinij.

Leonice-  
nii opinio repro-  
bata.

Coronopi  
sylvestris me-  
tio, & uires.

Coronopi ui-  
res ex Gal.




magis Dioscoridi addictus, quam Plinij, ac Theophrasti placitum, qui Coronopum inter aculeata recensent, his magis adhibendum esse iudicauit, qui uolunt Coronopum Dioscoridi eam esse herbam, quæ uulgo dicitur Herba stella, omnibus Italiae hortis uulgaris, ac admodum frequens, quod in acetarijs passim usurpetur, quam ipsi, qui Capriolam, siue Sanguineam dictam Coronopum esse censent. Quandoquidem hæc nusquam, quod sciam, in cibis sumitur, sed in brutorum tantum uenit pabulum. Nec desunt præterea, qui firmiter asseuerent, quod quæ inter plantas uulgo nonnullis Pes coruinus uocatur, aliquibus uero Pes gallinæ, quæ utitur nonnunquam medici ad exulcerandas corporis particulas, ubi id expostulet necessitas. Legitimus sit Coronopus. Inter quos non modo deprehensi sunt commentatores Auicennæ, quos nullam rei herbarie peritiā habuisse constat, sed et recentiorum quidam, præsertim ex eorum numero, qui de stirpium historia, et facultatibus scripsere commentarios. Namq. Otto ille Germanus cognomine Brunfelsius, tametsi non ignoraret, eos à probatissimis uiris refelli, qui in hanc uenerunt sententiā: tamen (quæ multorum est pertinacia) maluit cum rei herbarie imperitis errare, quam cum doctis, et peritis recte sentire. Quippe Pes coruinus uulgo uocatus (ut in sequentibus suo loco differemus) Coronopus non est, sed procul dubio ranunculus, qui Græcis Βατραχίων appellatur, cuius uariæ Dioscoridi produntur species, inter quas uulgaris Pes coruinus suam retinet sedem. Quod autem Leoniceam Capriolam Coronopus sit Dioscoridis, ego quidem cum Maraldo naquam affirmauerim. Nam et si gerat hæc herba in sui culmi fastigio quinque, ueluti graciles spicas, quæ cum manibus dilatantur, cornicis, uel alterius uolucris formam pedis representant; cum tamen (ut etiam Maraldus inquit) in hominum cibum non expectatur, folio exeat nullis incisuris dissecto, non seratur in hortis, et arida

tanquam fenum assurgat, nullo pacto asserendum censeo Capriolam esse Coronopum. Ceterum si modo quis in eo Plinium sequi uelit, quod dixerit lib. xx. i. cap. xv. i. (quod tamen ex Theophrasto sumpsit) aculeatarum caules aliquam per terram serpere, ut eius, quam Coronopum uocant; frustra meo quidem iudicio, probare contendat, Sanguineam, siue Capriolam esse Coronopum. quod eius caulis culmi modo geniculis intersectus, humi minime repat, sed rectus in altum assurgat, et culmorum in morem spicas ferat. Verum eos non aberrare putauerim, qui dixerint Capriolam hanc aculeatam esse gramen, cuius meminit Plinius libro xx. i. i. i. cap. xix. his uerbis. Sunt quæ aculeatum gramen uocant trium generum, cum in cacumine aculei sunt plurimum quinti, dactylon uocant. Hos conuolutes naribus inferunt, extrahuntq; sanguinis ciendi gratia. Neq; usquam, quod equidẽ legerim, expressit Plinius (ut Ruelius testari uidetur) gramen hoc aculeatum esse coronopum. Illud præterea animaduertere oportet, quod Dioscorides non scribit Coronopum aculeatam plantam esse, neq; eum inter aculeatas libro tertio recensuit, sed hic inter olea, quæ in ciborum usum ueniunt. Quauis contrarium fecerit Theophrastus, quod fortasse ad foliorum formam distulserit, qui laciniarum tenuitate coronopo aculeata uidentur; cum tamen pungere non ualeant, ut cum acanthidis pariter lusit Dioscorides. Quare facile adducor, ut credam, Coronopum tam Theophrasto, quam Dioscoridi idem esse. Ideoq; Plinius libro xx. i. Theophrastum secutus Coronopum aculeatum facit: libro uero xx. i. i. Dioscoridem fortasse imitatus aculeorum haud quaquam meminit. Sed et illud silendum non duximus, quod ex illo graminis genere, quo pueri ludentes sanguinem e naribus eliciunt, Sclaui Carniolæ incolæ, item Goritienfes semen colligunt, deglubuntq; in pilis, et milij, uel panici modo carniū iure decoquunt, granulis oblongiusculis panico minoribus, gustui non ingratis, adeo ut Germani hmelddau uocent, hoc est, celestem mannam. Huius plantam Sclauī cornicis pedem appellant. Quo fit, ut quasi certò crediderim, quod Leoniceus ab ipsis fortasse doctus, putauerit hanc plantam esse Dioscoridis Coronopum. Qui cum Coronopum scribat spinis nullis rigere, seriūq; in hortis in ciborum usum, eos nihil falli existimauerim, qui nobiscum senserint eam plantam legitimum esse Coronopum, quæ uulgo nobis Herba stella uocatur. Necne nullam hactenus plantam uidi, quæ perinde ac illa admodum Coronopum reserat. Inuenitur hæc etiam sponte nascens diluto extenuatoq; solo in comitatu Goritienfi, non longè à Sontij fluminis ripis, et in loco, qui dicitur in comibus. Eam inibi uulgo Serpentinam appellant, quod eius radix in uino pota uiperariam, aliorumq; uenenosorum et malium moribus maxime aduersetur, sitq; præcipuum remedium, ita ut ipsa sola (quod equidem experientia comprobatum habeo) liberet demorsos. Coronopi uires paucis perstrinxit Galenus libro v. i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Coronopodis radix cœliacis prodesse creditur manducata.

SONCHVS ASPERVVS. ENDIVIA

SONCHVS LAEVIS.

*Sonchus asperus hirsutus*Σόνχος. SONCHVS. *Sonchus asperus* CAP. CXXIIII.

SONCHI duo genera. Sylvestrior quidam est, & magis spinis horret. Alter teneritate quadam mollescit, cibus expetitus. Caule constat anguloso, † inani, interdum rubente: folijs in ambitu per intervalla dissectis. Vtriusque uis refrigerat, modicè adstringit. vnde æstuanti stomacho, & inflammationibus illiti profunt. Succus eorum stomachi rosiones forbitione mitigat: lacelicit. in uellere appositus, sedis, ac vuluæ collectionibus opitulatur. Tam herba, quàm radix illita, uibratis à scorpione ictibus subuenit. Alter sonchus tenerior, arboris instar est, latis constans folijs: caulem in ramos exeuntem folia distinguunt. sed ad eadem pollet.

SONCHVS in Hetruria, ubi Latinum nomen adhuc perdurat, Cicerbita, uulgo uocatur. Visuntur in hortis, Sonchi confideratio. campis, & uineis sonchi uniuersa genera. Soncho nostri utuntur hyeme in acetarijs, præsertimq; eius radicibus, quæ cum tenera sint, mansuè dulces, frequenter mensis expetuntur. Sonchi uires nobis descripsit Galenus libro VIII. Sonchi uires ex Gal. simplicium medicamentorum, his uerbis. Sonchus ubi adoleuerit, ex spinosis plantis est. Cæterum uiridis etiànum, & tener estur, perinde ut cætera olera sylvestria. Temperamentum eius quodammodo mistum est: constat enim ex æque, terreâq; essentia, utraq; leuiter frigida. Nam & adstrictionis cuiusdam est particeps: & siue cataplasmatibus in morem illinatur, siue edatur, manifestè refrigerat: postea uerò quàm planè resiccatus fuerit, terrestre eius temperamentum redditur, modicam habens caliditatem.

† Hæc dictio νερός, quæ uacuum, & inanem significat, hic non legitur in uulgatis Græcis. Sed tamen eam habent ætiosi codices, quibus etià adstipulatur Oribasius. Ergo non erit, ut aliqui putant, ex Plinio duntaxat reposita.

Σέρης. SERIS; SIVE INTYBVS. *Sonchus oleraceus* CAP. CXXV.

SERIS datum generum est. Altera sylvestris, quæ picris, & cichorion uocatur. Altera satia, latioribus folijs constat, stomacho quàm hortensis utilior. Quæ iterum in duas species digeritur. una folio latiore prodit, lactucarum simillima: altera angustiore est folio, & gustu amara. Vtraq; refrigerat, & adstringit, stomacho utilissima: aluum sistit cocta, si cum aceto adsumatur. Sylvestris stomacho meliores: quandoquidem æstuantem ipsum, & quem imbecillitas uexet, cibo leniunt. Cardiacis per se, aut cum polenta, utiliter illinuntur: podagris, & oculorum inflammationibus auxilio sunt. Herba cum radice illita, percussis à scorpione subuenit: igni sacro cum polenta medetur. Succus cum cerusa, & aceto, ualet ad illitus eorum, quæ refrigerationem desiderant.


INTYBUS HORTENSIS.



INTYBUS HORT. ALTER.



INTYBUS SYL. SIVE CICHORIUM.



CICHORIUM SATIVUM.



QVONIAM in Græcis vulgatis codicibus initium istius capituli & in uerbis nonnullis, & in Seridis generibus  
 1. & confusum legitur; ideo ex libro Oribasij simplicibus dicato, atque etiam ex antiqui-  
 2. is codicibus manuscriptis, illud legitime, & ordinate legendum putamus, hoc modo. Σέρεις ἄγρ' α, καὶ κηπεύ-  
 3. τας. καὶ ἐν σκουρῶτα τῆς κηπεύτης. τῆς δὲ κηπεύτης δὲ τὸν ἔδος. ἢ μὲν γὰρ ἐστὶ ἐρίδα καὶ δέσ' α, καὶ  
 4. λατ' αλλος. ἢ δὲ σεόφυλλος, καὶ ἔμωκος. id est. Seris sylvestris, & bortenensis. Sylvestris quidem du-  
 5. plex: dicta picris, quæ & cichorion uocatur: altera sativa latioribus folijs, & ori gravior, quàm bortenensis. Hor-  
 6. tensis uerò duplex genus: una folio latiore, lactuca similior: altera folio angustiore, & gustu amara. Huic lectio-  
 7. nis uarietate adstipulatur Serapio. quippe qui ex Dioscoride tot habeat sylvestris Seridis species, quot domesticæ. Id  
 8. quod etiam ex usu clarissime patet, cùm tam sativa, quàm sua sponte nascens Seris quotidie sit præ manibus, et sicut  
 9. in cibis. Sativa quidem ubiq; ferè in Italia in hortis colitur, folio erraticæ ampliore, leuioreq; ab hortenfi angustio-  
 10. ris Seride non longè dissimilis: quin & ori erraticæ gravior. Ea uerò, quæ sponte prouenit, passim ferme uirescit,  
 11. filijs in ambitu longè magis laciniatis, angustioribus, asperioribus, & amarioribus. Sunt qui pro certo habeant, Scar-  
 12. iolam domesticam latifolia Seride nihil differre, quòd ita esse comprobet Serapionis scriptura. Alij Scariolam uocant  
 13. alteram domesticæ speciem, quæ angustiore est folio, & gustu amarior. Sed animaduertendum est, Scariolam in Ser-  
 14. apione, Serapionis non esse, sed interpretis, cui nulla, mea quidem sententia, in hoc fuerit adhibenda fides. Quippe cùm  
 15. fuerit is Scariolam corrupta à barbaris uoce, nil aliud significare, quàm Seriolā, Serimq; nō aliud esse Græcis, quàm  
 16. Leinis Intybum, huius genus latifolium (perperam tamen) Scariolam appellauit. Qua in re eorum equidem senten-  
 17. tia magis laudauimus, qui angustifoliam Serim, quòd latifolia sit minor, Scariolam, seu potius Seriolam, ac si peruam  
 18. 19. Serim dixeris, uocant: tamen si in syluestrium quoq; genere, ea etiam Seriola dici possit, quæ passim in hortis colitur,  
 20. quòd domesticæ Seriolæ non longè sit absimilis. Omnes itaq; in Italia uulgaris sunt notitiæ, quòd nostratibus mensis  
 21. frequentissime in acetarijs apponantur. Quamobrem olitores has hyeme terra, & sabulo in hortis obruunt, quoniam  
 22. hoc artificio mirum in modum albescent, & tenerissime euadunt, & in totam asseruantur hyemem, artem hanc à natu-  
 23. ra docti, quòd uiderint sepius in campestribus Cichorium aquarum inundationibus terra, uel arena obrutum, et tener-  
 24. rum, & candidissimum reddi, exuta omni ex parte amaritudine. Verum quauis asserat Dioscorides syluestrem  
 25. Intybum, quemadmodum & satiuum duorum tantum esse generum; Chondrillam tamen, cuius historiam ipse sub du-  
 26.plici specie sequenti capite describit, inter Cichorij genera esse reponendam, nemo est qui ambigat. Quemadmodum et  
 27. tertium illam, quæ Theophrasto libro V. cap. XI. de plantarum historia Aphaca uocatur, Hæc enim illi ingustabi-  
 28. lis, & amara est: festinanter hæc floret, sed celeriter flos senescit, atq; in pappos euanesceat. Tum alius iterum proue-  
 29. nit, atq; iterum alius, idq; tota hyeme, uereq; toto usq; æstatem facitatur. Flos melini speciem gerit. hæc ille. Huic  
 30. per omnia in uniuersum respondet, quæ nonnullis Dens leonis, alijs Dens caninus, quibusdam Caput monachi, aliqui-  
 31. bus Rostrum porcinum, plerisq; uerò Ambubeia uocatur. Tamen si Plinio Cichorium ipsum propriè Ambugia, uel  
 32. Ambubeia dicatur. Sed profectò maxima est seplasiariorum multorum negligentia, atq; ignauia, qui cùm in hortis  
 33. numerosissimum, præstantissimumq; habeant Intybum, & in campestribus Cichorium ubiq; frequentissimum, harum  
 34. plantarum loco modò hieracium, modò syluestrem lactucam suo lacte refertam subijciunt, atq; ex ijs aquam, quam no-  
 35. men de Endiua mentiri faciunt, suis plumbeis eliciunt organis. Quod maxime detestandum est: nam etsi hieracio,  
 36. syluestriq; lactucæ uis frigida insit; tamen præterquam quòd nullam cum iocinore habeant conuenientiam, lac, quo eo  
 37. potissimum tempore turgent, quibusdam suis partibus calorificum adeò est, ut linguam exurat, ac uellicet: quibusdam  
 38. uerò adeò somnificum, ut non desint, teste infra Dioscoride, qui illud meconio permisceant. Sunt præterea qui Intyba-  
 39. 40. ceo generi herbam adscribant, quæ à flore cyanco Cyanus Plinio dicitur, aliquibus uerò uulgò Battifecula, uel Batti-  
 41. suocere, nobis autem fior Campefe, quòd in campis inter segetes, maio, & iunio mensibus numerosus proueniat. Expe-  
 42. ctatur hic maxime rusticanis puellis, suis contendendis coronis, quibus per æstatem caput & tempora cingunt. Sed qui-  
 43. bus notis quibusue rationibus inter Intybacea annumerari possit, quid dicam non habeo. Huiusce uires nullus antiquo-  
 44. rum, quod scierim, scriptis mandauit. quanquam Placentinus, quòd affirmauerint aliqui Cyanum pestilentibus mor-  
 45. bis propria dote aduersari, suo de Cichorea serapio, quòd ad pestilentes febres maxime commendauit, Cyanum etiam  
 46. inferuit. Intybi, & Cichorij uires recensuit Galenus lib. V. simplicium medicamentorum, sic inquit. Intybus  
 47. 48. est subamarum, & magis quòd agreste est, quòd ob id ipsum picrida, hoc est amarum, quidam nuncupant, qui-  
 49. dam uerò Cichorium appellant. Est autem ea sicca; frigidaq; temperaturæ, utrunque secundo excessu. Porro do-  
 50. mestica magis etiam quàm agrestis refrigerat. Sed & humiditatis multæ admistio siccitatem extinguit: uerum utraq;  
 51. 52. elingentis qualitatibus est particeps, uelut & chondrilla: nam & ipsa est seridis, seu intybi species. Et lib. V. de  
 53. compositione medicamentorum secundum locos: Cichorium, inquit, et Seris cibarij generis existunt: apud nos nā  
 54. que rurales ambo hæc edunt & cruda, & cocta. Facultas horum olerum subfrigida est, & subamara, ac moderatè  
 55. elingens: & propter has qualitates, optima pharmaca calidis intemperaturis ipsius hepatis existunt. Vltra hoc  
 56. quòd moderatè refrigerant, amplius et robur uisceri addunt per adstrictoriam facultatem: insuperq; commissus  
 57. 58. uisculorum uenarum in sima uisceris parte ad eas, quæ in gibba sunt, extergēt. Neq; uerò frigidas intemperies ma-  
 59. gis ledunt, quemadmodum quæ frigidam humiditatem absq; adstrictione, aut amaritudine possident, facere solent.  
 60. Hæc etiam uiscus talium olerum substantia potest, etiam si citra serosorum, aut aliorum humorum uitiationem intem-  
 61. peries fiat per se, & cum humiditatis cuiuscunq; complexu: ex mistura enim mellis humiditatem per urinam educunt.  
 62. Quapropter etiam si siccata tusa, quis potioni inspergat, itidem iuuant. Quin & decoctorum decoctum potatum mul-  
 63. 64. tam commodè affert. Si uerò non calida aliqua intemperies infuset, aut si obturatio quædam sit circa uiscus, magisope-  
 65. re auxiliari

Seridis, sue  
Intybi consi-  
deratio.

Endiua

dens leonis  
Caput monachi 360  
Seplasiariorū  
negligentia.  
Rostrum porcinum. I.  
Canis

Ficaria 360  
Endiua

Cyani men-  
tio.

Intybi & Ci-  
chorij vires  
ex Galeno. 360

re auxiliantur ex uino albo tenui potata cum his, quæ urinam ciunt. Vtilis autem non solum succus ipsorum est, tum recens, tum exiccatus; sed et ipsa olera exiccata, tusaq; ac trita potui inpersa, et eorum decoctum in potu acceptum, auxiliantur.

CHONDRILLA PRIMA. *Ἰνδιάνη*

CHONDRILLA ALTERA.

Χονδρίλλα. *Ἰνδιάνη*  
CHONDRILLA

CAP. CXXXVI.

CHONDRILLA, quam aliqui cichorion, alij serin appellant, caulem, flores, & folia habet cichorio similia. qua ex causa nonnulli sylvestris intybi speciem esse pronunciarunt, verum tenuior tota est. In cuius ramulis, gummi mastiches simillimum, magnitudine fabæ inueniri solet: quod cum myrrha tritum, & linteo appositum, instar oliuæ, feminarum menses trahit. Tusa cum radicibus herba, adiecto melle, diuiditur in pastillos: qui nitro admisti vitilignes emaculant. Gummi inordinatos pilos replicat. Quod item tenera radix efficit, si intincta succo acus, pilis admoventur: contra viperas in vino pota proficit. Succus decoctæ, in vino, aut per fese potus, aluum sistit.

Aliud habetur chondrillæ genus, folium ferens oblongum, circumrosu, humi sparsum: caulem succo madentem lacteo: radice tenui, rotunda, leui, vegeta, flauescente, succosa. Cuius & caulis, & folia concoquendi vim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit. Nascitur in lætis, & cultis.

Chondrillæ  
vtriusq; cō-  
sideratio.

NIMIRVM sylvestris cichorij species Chondrilla est: gracilioribus tamen folijs, caule, floribus, ac semine. Frequentissima hæc non modò in Hetruria; sed etiam in uniuersa Italia in cultis locis, scrobium aggeribus, & secus vias uirescere, ac suo tempore florescere conficitur: nec minus etiam, quàm cichorium, in acetarijs recipitur, quauis amarior sit. Vñitur et alterum genus huic non longè dissimile, folijs tamen non ita in ambitum laciniatis, nec adeò in mucronem desinentibus. Hæc à lactis ubertate, quò in omni parte, præsertimq; radice redundat, à nostris uulgò Lactaiuola uocatur. Rura eam suis acetarijs pro cichorio indifferenter admiscunt. Chondrillæ uires scripsit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi simul de intybo, & cichorio differuit, nihilq; ei peculiare reddidit, præterquàm quòd intybi sit species. Veruntamen libro secundo de facultatibus alimentorum non sanè intybo, nec cichorio, sed lactucæ Chondrillam similem fecit.



Κολοκύνθα.

CUCURBITA.

CAP.

CXXVII.

CUCURBITA esui apta. Cruda, trita illitu tumores, & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam syriasin vocant, in sincipite illinuntur: oculorum inflammationes, podagrāsque refrigerant. Succus ē ramētis tulsis per se, aut cum rosaceo infusus aurium doloribus auxiliatur: adustiones cutis in ardenti febre illitū adiuuat. Totius feruefactæ, & expressæ succus, cum melle exiguo, & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinū in cucurbitam recentem excauatam, infusum, si mistum sub diuo teneatur, potum aluum leuigabit.

CUCURBITA sativa, quæ per æstatem in cibum frequentissime uario sumitur apparatu, in triplici censetur genere, nempe longa, rotunda, & sessilis. Sed quoniam Cucurbitæ inter se forma dissimiles habeantur, non tamen propterea uiribus, & natura sibi inuicem repugnant. Siquidem (ut Columella tradit, & Plinius refert libro. xix, cap. v.) forma uaria in cucurbitis arte, & mangonio fieri facile potest. Nam semina, quæ proxima collo fuerint, proceras pariunt: item ab imis, sed non comparandas supradictis: quæ in medio, rotundas: quæ in lateribus, crassas, breuiore, ac sessiles, aptissimas quidem ad recipiendum tum uinum, tum oleum, tum alios quoslibet liquores, urcerum, et cadorū uice. Si uerò cordi sit, ut fiant corpore uastiores, de media cucurbita parte semē inuerso seratur cacumine. Sed diligenter custodiendum est, ne eò mulieres accedant: namq; eorum contactu facile elanguescunt incrementa uirentium. tātoq; magis, si eis fluxerint menses: tunc enim solò oculorum intuitu tenellos enecant foetus. Quæ autem ad semina seruantur, ē pri-

Cucurbitæ consideratio.



mo scilicet prouentu, pendeantq; in sua uite ad hyemem usq;: deinde sublata insolentur, aut ponantur in fumo, donec penitus siccificent: aliter facile earum semina, ascita putredine, depereunt. Amant Cucurbita mirum in modum aquas: nam si propē in patens uasculum aqua subijciatur, à quinq; uel sex digitorum intervallo, ante posterum diem atrepentes cognoscuntur descendisse. Sine semine nascuntur, si per triduum antea, spargenda semina oleo sesamino uacrentur. Sunt & alia Cucurbitarum uaria genera Italie peregrina, quæ diu per hyemem recētes asseruari possunt. Ferunt has ab occidentalibus Indijs in Italiam uenisse: unde Indica à pluribus uocitantur. Sapor ijs subdulcis, ut nostratibus usque adeo insipidus: uerum gustui insuaues sunt, nisi præcipuis condimentis saturantur. Cucurbitæ facultates scriptas reliquit Galenus lib. vii. simplicium medicamentorum his uerbis. Cucurbita humida, frigida;

Cucurbitæ facultates ex Galeno.

44 deq; temperata est, utraq; qualitate secundi ordinis. Quocirca ramentorum eius succus ad aurium dolores cum phlegmone iunctos, cum rosaceo utentibus utilis est. Sic tota quoq; illita calidas phlegmonas mediocrater refrigerat. Comesta autem humidum est, & sitim propellens. Et libro ii. de aliment. facultatibus: Cucurbita, inquit, cruda cibo infusus est, stomacho perniciofa, & concoctu planè inexpugnabilis: adeo ut si quis alterius cibi inopia ingerere eam compellatur, ceu quidam iam ausus est, pondus cum algore uentriculo incumbere sit sensurus, stomachumq; euerteret, & ad uomitum concitabit, quo solo ab urgentibus symptomatibus poterit uindicari. Hanc igitur, aliāq; ex fugacibus cæplura, aut mox quàm elixata est, aut frictam in sartagine, aut assam omnes homines esse consueuerunt. Cucurbita uero de qua dicere coepimus, elixa nullam euidentem saporis qualitatem habet: nisi quis eum quoq; saporem nominare uis: quæ neq; acris, neq; salis est, nec acerbis, nec amarus, nec id genus quippiam manifestè representat, ueluti nec ipsa aqua. At huiusmodi cuncta communi nomine omnes ἀσπαστα, id est, qualitatis expertia uocitare solent (Latini factas, seu insipidas dicunt) quo modo nos quoq; clarioris doctrine gratia appellabimus. Talis ergo cion sit cucurbita, nō interuō uarios apparandi modos admittit, utpote quæ in medio omnis excessus constituta est, ob idq; ad quemuis excessum ex æquo duci potest. Proinde cucurbita, quantum in se est, humidum, frigidumq; corpori alimentum præbet, et ipsam ea de causa exiguum: sed facile per aluum subit, cum ob suæ substantiæ lubricitatem, tum ob communem omnium humorum ciborum rationē, qui scilicet citra adstrictionem tales sunt. Nec sanè infeliciter cōcoquitur, modo non eueuertat corruptio. Nam ea illi solet nonnunquam accidere, cum aut uitiose fuerit præparata, aut prauos humores in uentriculo acruatos offenderit. Est aliquando ob nimiam in eo moram: quod alijs quoq; omnibus fugacibus, quæ humido sunt temperamento, euenire solet. Nam in uentriculo corrumpuntur & ipsi, ni ceteri descensu id maxime egerint. Quam admodum ergo cucurbita pura, & ut in se ipsa est, succum in totum corpus alendi gratia digestum, experiri qualitatē gustabilis obtinet: ita cum alicui uehementem habenti facultatem fuerit iuncta, facile illi adsimilatur: ut si cum sinapi sinatur, succus ex utroq; in membra diffusus acris efficitur cum manifesta caliditate. Eadem ratione,

ratione, si cum salso quopiam efficitur, cum nonnulli in patinis cum salsamento instruunt, salsum in corpore humorum generabit. Est porro sic apparatus cibis longè suauissimus, si salsamentum ex ponticis illis fuerit, quæ uix illa appellantur. Quod si cum malis cotoneis elixa decenterq; condita fuerit, succum austerum in distributione habebit præparatam. Assa autem, uel in sartagine fricta, ut propriè permultum humiditatis deponit; ita reliqua eius pars ualenti sibi ualentem uim adsciscit, uti nec cùm in iure simplici paratur. Ceterum ob aqueam qualitatem sibi innatam non tam merito origano iungi gaudet. Quæcunq; enim talia sunt, acris, aut acidis, austerisue, aut salsis permisceri saponis postulant, si quis & cum uoluptate ea sumere, & nauseam cupiat euitare.

CUCUMERES. *Cucumers*

## MELONES.



## Σίκυος ἡμερος. CUCUMER SATIIVS.

## CAP. CXXVIII

**SATIIVS** Cucumis aluo, & stomacho perquam utilis habetur: refrigerat, qui corruptionem non sentit: vesicæ prodest: olfactu reuocat, quos animus liquerit. Semen modicè urinam mouet: cum lacte, aut passo, vesicæ exulcerationibus subuenit. Illita cum uino folia, morsus canum sanant: & epinyctidas, cum melle. Peponis caro in cibis, urinam cit: inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius contra adustionem infantium, quam syriasin vocant, sincipiti imponuntur: fronti admotæ oculorum fluxiones auertunt. Succus cum semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciem repurgant, & nitorem afferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota, drachmæ pondere, vomitionem mouet. Si quisquam moderatè secundum cœnam vomere cupiat, geminis obolis sit contentus. Sanat quoque illita cum melle, vlcera concreta in modum faui, quæ ceria vocant.

Cucumeris  
consideratio.

**QUANQVAM** Græci (ut Galenus est autor libro 11. de alimentorum facultatibus) omnia tam Cucumerum, quam Melopeponū genera Pepona nominant: tamen Σίκυος nomine, quo præsens caput inscribitur à Dioscoride, tantum omnes ferè comprehendere uolunt, quod Latinis cucumis appellatur. Verum non ob id planè decerni potest, ut hic reddat Dioscorides nostratis Hetrusci Cucumeris uires, qui alijs Italiæ populis Anguria uulgò nuncupantur, & alterius, qui propriè Insubribus, & Venetis Cucumis dicitur, Hetruscis uerò Citrus, omnibus notissimus. Siquidem non ex Dioscoride modo, sed nec ex alijs ueteribus hactenus quenuquam reperi, qui Cucumis Græcis propriè Σίκυος appellatus, notis ullis repræsentet. Sed quòd Græci Σίκυος uocabulo nostratam Citrulum, & Insubrium Cucumem significat,





Peponum vi-  
res ex Gal.

Melopeponū  
facultates ex  
Galeno.

modum pepones, cient, sed minus quàm illi, quòd ipsorum substantia minus est humida: ideoq; non facile, ut illi, in uen-  
triculo corrumpuntur. Ergo quibus cucumeres bene concoquere datum est, dum in hoc fusi, intrepide, affatimq; usque  
expleant, longi temporis tractu, gelidum, & utcumq; crassum humorem in uenis accruari contingit, qui per eas qua  
uene funguntur concoctionem, haud facile in probum sanguinem potest conuerti. Proinde omnibus prauis succis citi-  
lijis, quantumvis probe à nonnullis conficiantur, abstinere in totum consulerim. Clam enim sensimq; post longum tem-  
pus prauus in uenis succus ex ipsis suggeritur, atque accumulatur: qui uel leuicula putredinis arrepta occasione, fe-  
bres sauisimas, & mirè contumaces excitabit. Et paulò antea de Peponibus scribens: Vniuersa (inquit) peponum  
natura frigidior cum larga humiditate existit: habent & quandam abstergerendi uim: ideoq; urinam cient, & deorsum  
expeditius, quàm cucurbita, & melopepones rapiuntur. Quòd porrò abstergeant, discere licet sordidam cutem de-  
fricando. Quamobrem etiam maculas calore solis factas, & lentes faciem occupantes, atq; in superficie albos exor-  
gere possunt. Sed semen, quod in eorum ueluti carne continetur, ad hoc efficacius, adeò ut renibus etiam calculo infe-  
statis sit accommodatum. Signit pepo in corpore uisiosum humorem, potissimum quando non probe concoctum fue-  
rit. Tum uerò morbum etiam, qui cholera dicitur, inducere consueuit. Etenim priusquam ad corruptionem peruenit,  
uomitioni quoq; idoneus est: largiusq; ingestus, nisi quis aliquid eorum, quæ prohi sunt succi, supermandat, omnino no-  
mitum concitabit. Et de Melopeponibus agens: Melopepones (ait) & minus humidi quàm pepones sunt, nec adeò  
prauis succi: minus item urinam prouocant, tardiusq; deorsum descendunt. Ad uomitum uerò excitandum non eandem  
uim peponibus obtinent, sicut nec celeriter adeò ut illi in uentriculo corrumpuntur, cum prauus humor in eo collectus  
fuerit, aut alia quæpiam corruptionis causa ipsum prehenderit. Ceterum tanetsi in iuuando stomacho autummalibus  
fructibus longè sunt inferiores, haud quaquam tamen ei, ut pepones, officiant.

### LACTUCA CRISPA. *Dalapt Lactif* LACTUCA FLORIDA.



*Esda* LACTUCA. *Cap. CXXIX.*

LACTUCAE satiuæ, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho gratæ habentur, somnum co-  
ciliant, aluum emolliunt, lac euocant: verum decoctæ magis alunt. Stomachicis illotas esse pro-  
dest. Epotum semen, assiduas libidinum imaginationes in somno compescit, & veneri refragatur.  
Ipsæ verò frequentiores in cibo, claritati oculorum officiant: inflammationibus, & ignibus facis  
opitulantur. Muria condiuntur. Cum in caulem exierunt, vim quandam nanciscuntur succo, aut  
lacti syluestris lactuce similem.

Εἰς δὲ τὴν γῆν.

LACTUCA SYLVESTRIS.

CAP. CXXX.



**SYLVESTRIS** Lactuca sativæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora. Amaro gustu est, & viribus aliquantum papaveri similis: unde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluū elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos: argema, caliginemque repurgat: contra adustiones efficaciter illinitur, cum lacte mulierum. In summa somnum allicit, doloris leuamentum præstat, menses trahit: contra scorpionum, & phalangiorum ictus bibitur. Semen non aliter quam sativæ libidinum imaginationes in somno amolitur, ac venierem arceat. Succus ad eadem valet, sed viribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, antea, ut in alijs liquaminibus moris est, insolatum.

**LACTUCA** sativa herbarum ferè omnium uirgò notissima est. Cuius etsi plura, ac diuersa in Italia reperiantur genera, ut in hortis, & olitorijs foris æstatè tota conspici potest, non ob id tamen existimandum est, quod ea uiribus, & facultatibus inter se differant: quanquam non negauerim ego, alteram alteri in cibis præstare. Eam siquidem, quæ conglobatis in orbem folijs crispis, teneraq; inuenitur, quis neget maiorem cum palato inire gratiam, quam quæ dura, patula, ac lactescens habetur? Sylvestris in campestribus nascens, facile dignoscitur, quod caule, floribus, semine, & folio sativam iam flores, & semina proferentem æmuletur: uerùm gustu amara est, & lacte copiosiore referta. Meminit huius Theophrastus libro V. cap. VI. de plantarum historia, sic inquit. Sylvestris lactuca folio breuior, quam sativa est, idq; consummatum aculeatur, & caule simili modo breuiore per-

Lactuce consideratio.

Lactuca sylvestris.

Lactuce uires ex Gal.

ficatur: succum acre m, ac medicatum habet. Nasctur in aruis. Lac eius extrahunt per messem tritici, & purgare aqua intercutem dicunt, & caliginem arcere ab oculis, & argemam auferre, cum lacte mulieris. Satiua (ut memoris scriptum rel iquit Galenus lib. V. simplicium medicamentorum) humidum est, frigidumq; olus, non tamen ex treme (siquidem ei len do non foret) uerim maxime secundum aqua, ut sic dicam, fontane frigiditatem: proinde ad cæcæ phlegmonis accommodum est, & ad parua, & leuia erysipelata: non tamen maioribus satisfacere idonea est. Est etiam edulium siti m arcens. At semen potu genituræ profluuium cohibet: quamobrem etiam ijs, qui libidinosi fomijis uexantur, datur. Sic & agrestis lactuce semen. Cuius quoq; colligitur succus, argema, & caliginem expurgans: ad adustiones etiam cum lacte mulierum inungitur. Et libro II. de alimentorum facultatibus: Pleriq; medicorum (inquit) reli quis omnibus hoc olus, ceu ficus autumnalibus fructibus, prætulerunt. Nam inter ipsa aliud meboris succi non inuenias. Quod porro nonnulli uitio uerterunt, id in præcipuam ei laudem cedit: et si ita se re uera haberet, nõ modò nulli cilerum; sed ne optimi quidem succi, ac maximi nutrimenti edulij esset secundum. nempe sanguinem eunt lactucam generare. Quidam non simpliciter sanguinem dicunt, sed multum addunt, multum sanguinem lactucam generare affirmant: 5. Verum ij tametsi prudentius obijciant, longius tamen alijs à uero absunt. quanquam hoc ipsum, puta multum sanguinem procreare, non est quod merito quis damnet. Constat enim huiusmodi edulium laudatissimi succi censendam esse, quod plurimum quidem sanguinis, aliorum uerò succorum nullum producere sit comparatum. A uero, quia permultum è lactuca sanguinis congeratur, idcirco damnandam eam censeant, facillimè huic malo occurrere potest: quippe cum uestentibus, & liberalius exerceri, & ea parcius uti integrum est. Hec ergo aduersus eos, qui olus hoc non rectè utuperant, dixisse sufficiat. Illud porro nouisse conuenit, omnibus alijs oleribus paucissimum sanguinem, & uatiosum generantibus, ex sola lactuca non multum quidem, nec uitiosum, haud tamen omni ex parte laudabilem gigni. Vt plurimum quidem cruda ipsa uestuntur. Aestate autem, cum in semen iam proruptura est, in aqua lactu præcoquentes, cum oleo, garo, & aceto assument, aut cum aliquo ex condimentis, obsonijsue, præsertim ijs, quæ esco constant. Pleriq; etiam antequam excaulescat, in aqua elixa utuntur: uti ego iam facio, ex quo dentes mihi detiores esse coeperunt. Nam amicus quidam meus, cum olere hoc à longo tempore me ut familiari cibo usum fuisse sciret, uideretq; post mendi à me citra magnam molestiam non posse, cocturæ rationem indicauit. Etenim in iuuentute, quoriam assiduò os uentriculi bile efferuescebat, æstus moderandi gratia lactucis utebar. Cion autem ad prouectam ætatem peruenisset, olus hoc contra quam in iuuentute, somnum iam studio, & industria accersenti mihi, auxilio fuit. Quippe qui etiamnum iuuenis lucubrandi gratia uigilijs dedita opera me assuefeceram, declinante iam ætate, ipsa ex se ipsa, gratis hoc incommodo molestabar. Aduersus quod unicum mihi præsentissimum remedium lactuca uestpere commendata semper fuit.



ΓΥΓΙΔΙΟΥ. GINGIDIVM *Γυγιδίου* CAP. CXXXI.

GINGIDIVM, aliqui lepidion, in Syria, & Cilicia plurimum nascitur. Herbula est stir-  
stri pastinacæ similis, tenuior, & amarior: radice parua, candicante, subamara. Olus hoc crudum,  
coctum, conditumve estur, magna stomachi vtilitate: vrinam cit. Decoctum ex vino potum ve-  
licæ prodest.

Gingidij cō-  
deratio,  
Cherēsolum  
fœdus

Gingidij vi-  
res ex Gal.

HUIUSCE sententiæ esse comperiuntur Ruellius, et Fuchsius viri clarissimi (licet ille non plane adstipuletur)  
necnon etiam recentiorum alij, qui stirpium cognitionem profitentur, in hoc consentiunt, quod Gingidium ea sit herba,  
quam nos vulgò Cerofolio vocamus, illi uerò Cherēsolum. Veruntamen cum hæc radice rutatur, quæ nihil amara sen-  
titur, sed potius acris, et odorata, quemadmodum et folia; idcirco eorum opinionem non equidem (ut dicam quod  
sentio) probandam putauerim. Quinimo crediderim uel Gingidium hætenus in Italia non esse repertum, uel imba-  
cile non oriri: præsertim cum Dioscorides, et Plinius asserere uideantur, peculiare olus esse Gingidium tam Syriæ,  
quàm Ciliciæ hortis. Meminit Gingidij Galenus libro vi. simplicium medicamentorum his uerbis. Gingidium sic  
gustū amaritudinem, et adstrictionem præfert, sic temperamento quoque ipso caliditatem, et frigiditatem. Secundum  
uerò utranque qualitatem desiccatorium est. Sed enim stomacho amicum est, utpote non paruum obtinens adstrictionem.  
Quamobrem non admodum conspicuam caliditatem possidet: secundo autem recessu desiccatur. Et lib. ii. de alimen-  
torum facultatibus, sic inquit, Plurimum in Syria Gingidium nascitur: estque similiter ac scandix apud nos. Sto-  
macho mirè utile siue crudum, siue elixum libeat sumere: longioris autem decoctionis impatiens est. Nonnulli ipsam  
cum oleo, et garo mandunt. Alij uinum etiam, aut acetum adijciunt, ac multo magis ita stomachum iuuat. Cum aceto  
sumptum fastidiosos ad cibum inuitat. Perspicuum uerò est, quod hæc herba medicamentum potius est, quàm ali-  
mentum. Quippe quæ adstrictionis, et amaritudinis non obscuræ; nec exigue particeps est. hæc Galenus. Ex qui-  
bus facillè comprobari potest, Cherēsolum non esse Gingidium, quod in ipso esse amaroris, et adstrictionis qualitates  
gustū haud manifestè deprehendantur.

ΣΚΑΝΔΙΞ. SCANDIX, *Σκάνδις* CAP. CXXXII.

SCANDIX, syluestre olus est, amarum, subacre: quod crudum, coctumve manditur: stoma-  
cho, & vtri vtile. Decoctum in potu, vesicæ, renibus, & iecinori confert.

Scandicis con-  
sideratio,

Scandicis ui-  
res ex Gal.

QUANQVAM Scandix antiquis rei herbariæ scriptoribus stirps fuit notissima, ut quæ ab ijs in frequenti  
borum usu haberetur alijs admixta oleribus: cum tamen hætenus eorum repererim neminem, cui fides sit adhibenda,  
qui Scandicem notis aliquibus, uel lineamentis descripserit, nesciuerim profectò quoniam pacto, quæue ratione affirmari  
possit et in Italia Scandicem nasci, et pariter dignosci à compluribus. Ceterum scribit Hermolaus uir doctissimus  
in stirpium historia omnium suæ ætatis facillè primus, se uidisse Scandicem in exemplari Græco Dioscoridis appictam  
folijs feniculo proximis, floribus luteis, siue albis, corniculis caule summo emergentibus. Hanc ipsam nos quoque se-  
pius uidimus maio, et iunio mensibus inter segetes, præsertimque in agrorum marginibus. Sed quauis tradiderit Her-  
molaus eam feniculi folijs assurgere; mihi tamen magis sumariam, et quadantenus anthemidem referre uidetur, quam  
feniculum. Flores gerit hæc cherēsolio proximis, albicantesque, è quibus tandem prodeunt cornicula tenuia, longius-  
cula, recta, acuminata, acubus, quæ in geranio emicant, non dissimilia, quemadmodum et in cherēsolio insuntur, licet  
huic longè tenuiora, et fragiliora innascantur. Quo fit, ut rectè intuentibus specie tantum, non autem genere differre  
hæc plantæ haud dubiè appareant: id quod etiam indicat eorum sapor. Quamobrem qui cherēsolum scripserunt esse  
gingidium, id non sine ratione fecerunt. Cum enim certò crederent, hanc, de qua in præsentia differimus, plantam le-  
gitimam esse Scandicem, facillè etiam hinc persuaderi potuerunt, ut assererent cherēsolum esse gingidium. Quoniam Dio-  
scorides consuevit stirpes per cognationes describere. Quapropter in eorum sanè irem sententiam, si hæc, quæ Scandicem  
putant, tantum acrimoniæ, et amaroris gustantibus relinqueret, quantum in Scandice ueteres inueniri prodele-  
runt. Verum cum eas non obscuras quidem qualitates, quas ueteres ueræ Scandici assignant, in hac, ut ita dicam, non  
Scandice nunquam ego repererim, sicuti nec in cherēsolio, quæ ueteribus gingidio tribuuntur, cogor omnino eorum  
sententiæ refragari, et ab ipsis dissentire. Quapropter nisi regionis, et climatis ratione, et locorum mutatione con-  
uiat, ut hæc stirpes omnem tum acrimoniam, tum amarorem exuerint, non facillè quidem adduci poterò, ut credam hæ-  
rum alteram gingidium, alteram uerò scandicem esse. Neque ab hac mea me deterret opinione Hermolaus, quod uide-  
rit is Scandicem hanc in Græco Dioscoridis codice appictam: quippe cum inter omnes rei herbariæ scriptores nullus,  
quod equidem sciam, reperiat, qui per notas aliquas Scandicem descripserit, nesciuerim ego quoniam historia, et ra-  
tione fretus aliquis unquam illam pictura expresserit, nisi fortasse Dioscorides ipse manu propria eo in libro ipsam  
appinxerit. Plinius Scandicem anthriscò similem reddidit. Sed cum ignotum per ignotius descripserit, nihil nobis im-  
minis his in tenebris affert. Scandicem commemorat Galenus lib. vii. simp. medicamentorum his uerbis. Scandix  
ex agrestium olerum genere est, subacre, et amarum, adeo ut in siccando, et excalsaciendo secundi sit ordinis intensi-  
Vrinam ualenter citet, et uiscera obstructione liberat, ex dictis qualitatibus constans, hæc Galenus. Ex quibus etiam  
manifestè colligi potest, plantam, quam pro Scandice accepit Hermolaus, quamque pro eadem plerique recentium herbo-  
riorum hodie ostendunt, nullo pacto legitimam esse Scandicem. Quandoquidem ea non tantam acrimoniam, nec ama-  
ritudinem gustui representat, ut dici possit primum caliditatis, et siccitatis gradum excedere. Ceterum si ulla est plan-  
ta, cui

## CAVCALIS.

ta, cui hæc comparari possit, eam admodum mihi quidem referre videtur, quam Plinius lib. xxiii. cap. xix. a pectin: in similitudine, Veneris pecten appellat. Siquidem hæc radice nititur candida, cauliculis semipede maioribus: folijs sylvestris pastinacæ, vel ferè anthemidis, exilibus: floribus albis, tenuibus, emicantibus summatim ab eodem capitello cōpluribus acuminatis rostellis, inter se disjunctis, quæ pectines planè referunt, quibus linum mulieres concinnant. Quæ tertè omnia reperiuntur in hac vulgari Scandice.

## Κανκαλίσ. CAVCALIS. CAP. CXXXIII.


*Uulgo petroselin*

CAVCALIS, quam alij sylvestre daucum vocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhirsuto: folijs apio similibus, fœniculi modo per extrema multifidis, hispidsque: candida in cacumine umbella, suauiter olente. Crudum, coctumve olerum modo estur: urinam mouet.

VISITUR Caucalis in Hetruria, campestribus, inculto præsertim solo, ut in Ananiensi tractu in Tridentino agro, nullis reclamantibus notis. Rura nostra hanc Petrosello saluatico uulgo appellant. Quippe quod folia, quæ per ima prope radicem exeunt, apium quadantenus effigie referant, quod uulgo Petrosello dicunt. Et si quæ superiore parte prædeunt, per ambitum sint fœniculi modo capillamentis diuisa. Caulem mittit pastinacæ: in cuius cacumine umbellam gerit floribus candidantem, odorantem, dauco non absimilem. Quapropter Galenus lib. vii. simplicium medicamentorum, ita de ea scriptum reliquit. Caucalidem quidam daucum sylvestrem nuncupant: est enim ei adsimilis gustu simul ac uiribus. Nam excalscit ut ille, & desiccatur, urinam citè, & muria ad repositionem conditur.

Caucalidis cōsideratio.

Caucalidis vires ex Gal.

ERVCA SATIVA. *Grass*ERVCA SYLVESTRIS. *Grass*


Εὐζωρον. ERUCA. CAP. CXXXIII.

CRUDA ERUCA venerem largiore cibo concitat, Semen eius idem præstat, vrinam cit. Concoctioni prodest, aluo perquam accommodata. Semine ad condimenta vtuntur: quod, vi in longum tempus asseruetur, adiecto lacte, aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum syluestris eruca, maximè in Iberia, quæ occidentem spectat, Cuius semine pro sinapi incolæ vtuntur, Vrinam vehementius pellit, & multò satius acrior.


Eruce confi-  
deratio, & ui-  
res.

VULGARIS admodum planta est Eruca tam satius, quàm sponte nascens, quòd frequentissimè in coenæ ac-  
tarijs inseratur. Excalfacit olus hoc ( ut testatur Galenus libro 11. de alimentorum facultatibus ) perquam maxi-  
festè, adeò ut non facile solum absque iunctis lactucæ folijs edatur: nam ita immodico calori par frigus admistum ex-  
cessum temperat. Quinetiam genitale semen augere creditur, & in uenerem stimulos addere. Caput etiam magis do-  
lore afficiet, si solum edatur. Semen ( ut scribunt antiquorum nonnulli ) muris aranei moribus medetur. Ventris ti-  
neas enecat, lienemq; extenuat. Tritum, & cum felle bubulo mistum, nigras ulcerum cicatrices ad candorem reda-  
cit. Cum melle uerò perunctum, uitia cutis in facie emendat, & lentigines emaculat.

OCIMUM MAGNUM. Basilic.



OCIMUM PARVUM.



Οκίμρον. OCIMUM. CAP. CXXXV.

OCIMUM vulgò cognitum. Id copiosiore cibo oculorum aciem hebetat, aluum mollit, spi-  
ritum mouet, vrinam pellit, lac euocat: ægrè tamen conficitur. Illitum cum polline polentæ, ac-  
to, & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est. Draconis marini, & scorpionis icibus  
per se prodest: & cum vino Chio, oculorum doloribus. Succus visus caliginem abstergit: destilla-  
tiones exiccat. Semen potum conuenit atram bilem gignentibus, difficili vrinæ, inflatisque: nari-  
bus haustum, subinde mouet sternutamenta. quod idem herba efficit. Sed oculos premi necessum  
est, cum sternutamentum urget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant: quadoquidem manduca-  
tum, & in sole positum vermiculos creat. Aphri autem adijciunt, si feriantur à scorpione, qui oc-  
imum ederint, nullo confictari dolore.

Ocimi confi-  
deratio.

OCIMUM quemadmodum odoratissimum, ita & omnibus notissimum est. Namq; perrare sunt ubiq; edunt  
fenestræ, perrareque coenacula, ac uiridaria, quæ Ocimo non redoleant, utpote quod frequens seratur, & fructu-  
tur in

in singulis uasis. In Italia hoc ocimi tria habentur genera. Quorum primum folijs assurgit amarantho longè  
 cernitur. Latius longis, ac crassius, citrea malo similibus, à quorum effigie ipsam facile uocarunt Arabes Ocimum citra-  
 tum, quo modo ipsum Mesues nominat. Secundum folijs exit, ac ramulis, dicto longè minoribus. Tertium, quod folijs  
 capite minutis atq; angustis, sitq; ceteris odore fragrantius, Italis uulgò appellatur Basilico gentile. Horum omnium  
 Serapio uocantq; mediū hic à Dioscoride descriptum, Ocimum non garyophyllum: garyophyllum uerò,  
 quod ceteris tum minutius, tum odoratius habetur. Demum illud Citratum à foliorum similitudine nuncupauit, quod  
 ceteri folijs emulū esse diximus, ut facile omnibus perspicuum esse potest, qui Serapionis monumenta perlegerint de  
 Ocimo differentis. Idcirco uideant quæso patres illi reuerendi, qui in Mesuem commentarios scripsere, quo iure,  
 quæ ratione in electuario de gemmis se iactent Ocimum garyophyllum hac tempestate primos adinuenisse, cion hoc  
 Serapionis folijs exeat paruis, et caule quadrangulati: monachis uerò folijs melissophyllo maioribus, per ambitum  
 ferratis, et caule minime anguloso. Quia in re eos, pace sua, apertè hallucinatos putauerim. Nec equidem credendum  
 auctoror, quod de alio ocimi genere intellexerit Mesues, quàm de tertio illo genere in delicijs habito, de quo diximus.  
 Nam cion ceteris odoris fragrantia longè præstet, nulli dubium est, quin in roborandis cordis ipsius uiribus ceteris sit  
 Egeptius, atq; etiam præstantius, ut quod in electuarium de gemmis addatur ad cordis affectus. Scribit Brasauolus  
 de simplicium examine Romæ. præmum excuso libro, tantam de ocimi uiribus inter Plinium, et Dioscoridem esse  
 controuersiam, ut alterum ipsorum errasse dicendum sit. Quippe ex Aphris tradit Dioscorides, quod si à scorpione  
 foras sit, qui ocimum ederint, nullo dolore afficiuntur. Contrà uerò Plinius, qui libro xii. cap. xx. si eo die, inquit,  
 fruiatur quissiam à scorpione, quo ederit ocimum, seruari non posse. Quia in re lectionis impatiens deprehenditur  
 Brasauolus: quandoquidem si eo loco Plinium de Ocimo differentem, patienter perlegisset, cognouisset utiq; quàm re-  
 sè Plinius ipse hanc dirimat controuersiam, hysq; respondeat, qui ocimum accusant, cum inquit. Ocimum quoq; Cbry-  
 sippus acriter increpiat, inutile esse dicens stomacho, urinae, et oculorum claritati. Præterea insaniam facere, et le-  
 thargos, et ictericis uitiis. Ideoq; capras id aspernari, hominibus quoq; fugiendum censet. Adijciunt quidam tritum  
 si operiatur lapide, scorpionem gignere: Commanducatum, et in sole positū uermes asferre. Aphri uerò, si eo die fe-  
 riatur quissiam à scorpione, quo ederit ocimum, seruari non posse. Secuta etas alacriter ocimum defendit: nam id esse  
 se capras, nec minus, quàm mentham, et rutam scorpionum terrestrium ictibus, marinorumq; uenenis mederi ex ui-  
 no, addito aceto exiguo. Vsu quoq; compertum, deficientibus ex aceto odoratu salutare esse. Item lethargicis, et  
 inflammatis refrigerationi. Illud capitis doloribus cum rosaceo, aut myrteo, aut aceto. Item oculorum epiphoris,  
 impositum ex uino: stomacho quoq; esse utile. hæc Plinius. Ex quibus clarissimè patet, Plinium eorum placitis refra-  
 geri, qui tam acriter ocimum damnarunt. Degenerat quandoque Ocimum in serpyllum, ut auctor est Theophrastus  
 libro v. cap. viii. de plantarum causis, ubi sic inquit. Ocimum autem, quod loco soli exposito situm est, transit in ser-  
 pyllum, quia uehementer siccatur. Folio namq; minus, odoreq; uehementius redditur. Quippe cum alimenti quoq; mi-  
 nus habeant, que siccata sunt. Sed huiusmodi mutationes ita euenire putandum, ut aliquid similitudinis faciant, non ut  
 omnino speciem expriment alienam. hæc Theophrastus. Ceterum Auicenna libro de uiribus cordis à Diosco-  
 ride differre uidetur. Nam ocimum, scribit; sanguinem turbidum, et melancholicum generat, quoniam superflua  
 humiditas, que est in ipso, parit inflationem in uenis: Nec aliter uidetur sensisse Galenus, qui libro viii. simpli-  
 cium medicamentorum de ocimo ita scriptum reliquit. Ocimum ex secundo est ordine calfacientium: habet autem re-  
 crementum humiditatem: proinde nec commodum est, quod in corpus sumatur. Ceterum foris illud, ad digerend-  
 um, et concoquendum utile est. Item libro ii. de alimentorum facultatibus, cum inquit. Ocimo etiam plerique ut  
 obsonio utuntur, ex oleo, et garo esitantes. Vitiosi autem est succi. Admentiuuntur ob hoc quidam dicentes, si tritum  
 fictili nouo inditum operiatur, celerrimè intra paucos dies scorpiones gignere, præsertim ubi quis quotidie ollam ad  
 solem calsecerit. Sed hoc sanè à uero abest. Id porro uerè de eo dixeris, olus esse prauis succi, stomacho noxium, et  
 concoctu difficile. Sed illud in Ocimo non ignorandum puto, quod ocimum per y ab ocimo per i maxime differre de-  
 prehenditur probatissimorum auctorum testimonio. Siquidem apud antiquos Ocimum erat pabuli genus dictum uel  
 quod citò proueniret: uel primum inter cetera pabuli genera è terra erumperet: uel quod iumentis citaret aluum, sic  
 appellatum ab ovis Græca uoce, que Latinis ualet citò. Ocimum uerò herba est illa odorata, de qua supra dispu-  
 tauimus, sic nominatum ab oxi uerbo Græco, quod redolere significat. Vnde rectius fortè per x, quàm per c scri-  
 bendum esset. Ceterum ocimum antiquis quibusdam bouum pabulum erat ex sexta uiridi segete, priusquàm induresce-  
 rent culmi: uel ex seminibus pluribus simul in agro satis. Nempe è fabarum modijs decem, uicia duobus, et erui-  
 lae una in iugero satis, et ante maturitatem recisis. Catoni tamen è uicia, sereno græco, faba, eruoq; in unum,  
 mixtis, et exinde satis ocimum est. Quo fit, ut putauerim ocimum antiquis, non modò herbaceam, uiridemq; fuisse  
 segetem, et pluribus seminibus unà in agro satis in primum iumentorum pabulum; sed etiam ex uno tantum cerealium  
 genere, nempe hordeo, auena, uicia, eruo, alijsq; his cognatis, quod eiusmodi pabulo uerno tempore, non modò alantur  
 boves, ac etiam equi; sed etiam repurgentur. Id quod nostra quoq; etate fit pluribus in locis in Italia, præsertim cum  
 hordeo, eruo, et uicia. Nec placet eorum sententia, qui sibi nulla, ut arbitror, ratione, nec auctoritate persuadent,  
 Ocimum plantam esse sui proprii generis. quod è ueteribus nullū hæcenus inuenerim (quantum equidem uidi, et legi)  
 quod ocymi herbe historia literis memoriæq; mandauerit: sed comperi quidem, quod uocabulū hoc non magis uni, quàm  
 alium conueniat. quandoquidem unicuiq; pabuli generi, quod primo statim uere citò proueniat, accommodari potest.  
 Quære planè explodenda uidetur Adami Loniceri opinio, quod non sine errore ridendo frumentum Turcicum, siue,  
 quod hys placet, Saracenicum, quod Tridentina rura uulgò appellant Formentone, et Foroiulensia à pullo seminis co-  
 lore Saracino, ocimum esse firmiter existimet. Quinetiam is turpiter aberrasse deprehenditur, quod huic plantæ, quæ  
 suum

Basilicum

Monachorū  
iactantia.

Brasauoli ap-  
sus.


Ocimi dege-  
neratio.

Ocimi uires  
ex Gal.

Ocymi ab oci-  
mo differentia.

Adami opi-  
nio uana.

## OROBANCHE.

Orobanchae  
consideratio.

suū Ocymum est, omnes odorati ocimi facultates reddiderit. Nec alia ratione motus frumentum Saracenicum ocymum esse censeat, quam quod satium tertia à satū die erumpat. Verum ocymum non ea de causa nomen hoc (mea quidem sententia) sibi comparavit, sed quod citius ceteris pabulorum generibus vere primo adolescat: nam innumera essent ocymi genera, si id omne, quod statim ferè à satū oritur, ocymum uocari debeat.


Οροβάνχη. OROBANCHE.

CAP. CXXXVI.

OROBANCHE cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subrubus, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, aut in luteum uergente: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit cauliculus, fistulosa. Hanc inter quædam legumina nasci constat, & ea strangulare: unde orobanche sibi cognomen usurpauit. Estur, ut olus, cruda, & in patinis, asparagi modo, decocta. Legumentis addita, concoctionem accelerare creditur.

OROBANCHE, que omnibus notis legitime Dioscoridis respondet, uidentur primum in Ananiensi agro supra Tridentum, ac deinde ubiq; ferè in Italia nasci comperimus, in campis non modo inter omnia leguminum genera, sed et inter segetes, cannabim, linum, & in uis secus agrorum sepes. Ceterum eusscriptis mandauerit Theophrastus lib. VIII. de historia, & de causis plantarum, Orobanchem erui necare amplexu, complexuq; suo, ea tamen, que hic à Dioscoride representatur, & à Plinio lib. XXII. cap. ultimo, nullo sane complexu, sed sua tantum presentia, legumina, segetes, cannabim, & linum interim, que prope ipsam oriuntur. Quam ob causam Ananienses, quod uicinas strangulet, ac deuoret plantas, Herba lupa uulgo orobanchem appellant. Proflit hæc (ut inquit Dioscorides) nullis inquam folijs, sed uno tantum assurgit cauliculo, asparagi instar, colore subrubro, hirsuto, molli, pinguiq;, & qui sesquipedalem non excedat longitudinem. Flos è quibusdam patefcit globulis in cacumine congestis, subalbidus. Radix digitali uisitur crassitudine, fungosa, ac fragilis. Hæc planta nonnullis etiam uulgo Coladi leone appellatur, alijs uero Herba tora uocatur, quod uisce ea degustata (ut pastores facto periculo testantur) statim tarum adeant. Sunt & qui (ut loco citato scribit Plinius) cynomorion eam appellent à similitudine canini genitalis. Ex quibus omnibus non temerè dicendum existimauerim, uel Theophrastum (pace sua) hæc in re deceptum esse, uel aliam à Dioscoride, & Plinio orobanchem concepiisse. Orobanche, ut Galeus est autem libro VIII. de facultate simplicium medicamentorum, est fæca, frigideq; temperaturæ in primo ordine.

## BARBVLA HIRCI.

Barbvlae hirci  
consideratio.

Ταρύον όγρον. BARBVLA HIRCI.

CAP. CXXXVII.

BARBVLA hirci, quæ ab alijs come uocatur, breui est caule: folijs croci: radice longa; dulci: magno super caulem calyce: è cuius summo semen nigrum dependet, unde nomen inditum est. Herba esui apta est.


HIRCI barbula, quam Hetruria uulgo appellat Sassefrica, uulgaris admodum est notitie. Radix, quod gustu dulcis, in cundaq; sit, estur: hyeme frequenter in acetarijs. Folijs ex herbis croci.



maioribus tamen, ac longioribus: flore aureo, rostro porcino uocato non ab simili, maiore tamen, qui calyce  
 . Is sereno celo satiscit, nubiloso uero contrahitur, occluditurq; calyce, quemadmodum & ch. an. eleonis  
 . E. concluso calycis uertice barba dependet incana, proluxa. Vnde nomen accepit, ut Theophrastus pro  
 . E. capite VII. de plantarum historia. Sed certe nesciuerim ego, qua ratione ductus negauerit Hermo  
 . hanc Theophrasto, & Dioscoridi legittimam Hirci barbulam esse, cum illa pulchre huius notis respondeat.  
 . hanc recentia uulnera, si foliorum succus, uel eius stillatua aqua splenijs, & attritis linteolis superpo  
 .

## Ορνιθόγαλον. ORNITHOGALVM.

## CAP. CXXXVIII.



ORNITHOGALVM cauliculus est tener, candi  
 cans, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacu  
 mine mollibus agnatis: à quibus flores prodeunt foris  
 herbacei, & cum hiantes se pandunt, lactei uisuntur:  
 inter quos dissectum, cachryos modo, capitulum emi  
 cat. Coquitur cum pane, ut melanthium. Radix bul  
 bosa, cruda, & cocta manditur.

ORNITHOGALVM adeo inter segetes frequens oris  
 tur, ut si maio mense in aruis requiratur, perperis prius notis  
 illi à Dioscoride attributis, facile ab omnibus inueniatur. Ruell  
 ius in Gallia ornithogalum copiosum nasci scribit, pueris nō in  
 cognitum, qui propter astantes, cum ab agricolis aratro terra  
 proscinditur, aut in latiores porcas sulcatur, ornithogali radice  
 ces uomere trutas colligunt: & cum sint castaneis suauiores, ijs  
 & crudis, & in cineribus incoctis uescuntur, odore iucundissi  
 mo, os mirum in modum commendante. Radices in orbem fere  
 collecte sunt: cortice pullo & candidissima intus carne, perquam  
 odorata: uere, uel æstate cum fronde uirent, hyeme uel autumnō  
 cum exarantur agri, radicitus uelluntur. Diu seruari possunt,  
 & ubi annonæ premit inopia, plebis rustice famem, & ieiunia  
 castanearum more satiant. Mirè suis expetuntur, qui rostro  
 serobiculos excauant, & harum capiti dulcedine, gregatim ad  
 has eliciendas, radicitusq; uellendas aduolant. Ceterum cum  
 ornithogali radices suauitatis suæ præstantia, in mentem mihi  
 reuocauerint illas, quæ in agro Veronensi, ubi tantum, neq; ali  
 bi, quod sciam, nascuntur in Italia, uulgo uocantur TRASI, Traforū men  
 saporis dulcedine castaneis proximè accedentes, recentioribusq;  
 quibusdam in medicamentis eadem expetantur, eas hic recensere

Ornithogali  
 consideratio.

Traforū men  
 tio, & vires.

non de re fore diximus. Sunt igitur Trasi radice figura, ac forma persimiles sericinis crucis, quæ feruenti bal  
 neo elixæ contrahuntur, dum serica stamina inde mulieres conglomerant. Harum cremore pectoris, & laterum ui  
 na expurgantur. quofit, ut tuſcentibus opem non modicam præsent: tunduntur enim, maceranturq; carnuum iure,  
 deinde per linteolum exprimitur cremor. quem etiam ueneris potionibus miscent recentiorum nonnulli. Sunt ra  
 dices hæ, ut experientia compertum est, & ex dulcedine conijci potest, in calefacientium, & humectantium genere,  
 sed flauis quodammodo gignunt. Planta germinat uere, & æstate folijs farragini similibus, cuius radicitus Trasi co  
 herent. Hæ uero satis representare uidentur radices illæ, quas Doronicos uulgi officinarum nominat. Quas, qui  
 dem in primis commendauerunt Arabes, & præsertim Auicenna ad cordis affectus, contra uenena, & deleteria medi  
 camenta. Planton, cuius hæ sunt radices, hactenus non uidimus: quanquam asserit Ruellius folijs esse fere acuti ru  
 tæ. Alij uero ea leucoio similia esse uolunt. Doronicus Actuarius carnabadium dicitur. Affertur ex Alexandria  
 Egypti, & ex Gorgano Apuliæ, sed uiribus longè infirmior.


Doronicis co  
 sideratio.

## Τύβηρα. TYBERA. CAP. CXXXIX.

TYBERA rotundæ radices sunt, sine caule, sine folijs, flauescences: uere fodiuntur. Cruda,  
 & cocta eduntur. IXD . . .

TYBERA, quæ occulta quadam facultate terra in se parit, & conglobat, numerosa in Hetruria à rusticis  
 effoduntur, quod magnatibus maxime expetuntur in cænis. Duo eorū in Romano agro habentur genera. Quo  
 rum alter candida, pulla uero alteri pulpa subest. Rimosis utrisque cortex, ac niger. Est & tertium genus in An  
 tæ, & Trilentino tractu proveniens leni cortice, colore subrufo, cæteris longè minus, insipidum, & gustu ini  
 uisum. Tuberum meminit Plinius lib. XIX. cap. 11. sic inquit. Et quoniam à miraculis rerum cæponus, sequemur  
 eorum

Tuberum co  
 sideratio.



eorum ordinem, in quibus uel maximum est aliquid nasci, aut uiuere sine ulla radice. Tuberum uocantur hæc, quod in terra circumdata, nullisq; fibris nixa, aut saltem capillamentis, nec utique extuberante loco, in quo gignuntur, aut rursus urgente, neq; ipsa terra cohererent. Cortice etiam includuntur, ut planè nec terram esse possumus dicere, neque aliud, quam terra callum. Siccis hæc ferè, & sabulosis locis, frutetosisque nascuntur. Excedunt sæpe magnitudinem mali con-  
tonci, etiam libræ pondere. Duo eorum genera arenosa, dentibus inimica, & altera sincera. Distinguntur & colore rufo, nigroq; & intus candido. Laudatissima quæ Aphricæ crescunt. An ne uitium id terræ? neq; enim aliud in-  
telligi potest: malum ne id ea protinus globetur magnitudine, quæ futurum est, & uiuat ne, aut non, haud facillè ar-  
bitror intelligi posse. Putrescendi enim ratio communis est ijs cum ligno. Lartio Licinio prætorio uiro inter reddendum  
Hispania Carthaginæ paucis his annis scimus accidisse, mordenti tuber, ut deprehensus intus denarius primos dentes  
inflecteret. Quo manifestum erit terræ naturam in se globari. Quod certum est ex ijs, quæ nascuntur, & feri non  
possunt. Et libro eodem capite tertio: De tuberibus (inquit) hæc traduntur peculiariter. Cum fuerint imbræ a-

## SMILAX HORTENSIS.

Wortelschoten Turfbo bonum.

Tuberum vi-  
res ex Galen.

Ex Auicenna.



tumnales, ac tonitrua crebra, tunc nasci, & maxime è tonitribus,  
nec ultra annum durare, tenerrima autem uerno esse. Quibus  
locis acceptantur riguis, & seruntur, sicuti Mytilenis. Negat  
nasci, nisi exundatione fluminum inuecto semine ab Tiaris. Est æ-  
tem is locus, in quo plurima nascuntur. Sunt & in fungorum ge-  
nere à Grecis dicti periceæ, qui sine radice, aut pediculo nascuntur.  
Hactenus de tuberibus Plinius. Tuberum (ut memorie prodit  
Galenus libro 11. de alimentorum facultate) radicibus, aut bulbis  
sunt annueranda, ut quæ nullam euentem habent qualitatem.  
Qui ergo his utuntur, ad excipienda condimenta tanquam ma-  
teriam habent, seu alia qualitatis expertia, et innoxia, gustusque ap-  
posita sunt. Quibus omnibus commune est, ut alimentum nullam  
facultate constans, corpori præbeant, sed frigidiusculum diutè,  
crassitudine tale, quale id ipsum est, quod ingestum fuerit; ex-  
tuberibus quidem crassius, ex cucurbita liquidius et tenuius. In alijs  
eadem est proportio. Sed longè aliter de his scripsit Auicenna,  
cum inquit: Tuberum terrena magis, quam aquea sunt, omniq; pro-  
fus sapore expertia. Atrabiliaris, & crassos gignunt humores,  
magis, quam cetera ciborum genera. Quo fit, ut frequenter de-  
uorati apoplexiam, & paralytism concitent. Ad hæc concoctum co-  
tumacia sunt, & uentriculum aggrauant.

## Σμύλαξ ἡρτενσίς. SMILAX HORTENSIS.

CAP. CXL.

HORTENSIS. Smilax frutex est, cuius semen à  
nonnullis lobia vocatur. Folia habet hederæ, molliora  
tamè: tenues caules, & capreolos vicinis fruticibus cir-  
cumuolutos; qui tantum adolefcunt, ut topiarias scens  
repræsentare videantur: siliquas sceni græci profert, lo-  
giora,

# In Lib. secundum Dioscoridis. 273

iores, & torosiores: in quibus semina renum similia, sed inæquali colore, recluduntur: quæ quædam ex parte fuluescunt. Siliqua cocta, cum semine in oleribus asparagi modo estur. Vrinam det, & tumultuosa somnia facit.

HORTENSIS Smilax ( ut supra nobis dictum est in Phaseolis, sub quorum appellatione falso credidit Manardus de erulia scripsisse Dioscoridem ) nil aliud, mea quidem sententia, esse potest, quam ea Phaseolorum genera, quæ coloribus depicta, quæ uulgo Italici dicuntur Fagioli Turcheschi. Siquidem præter id, quod rubentes, uersicolores, et ( ut Dioscorides inquit ) reni figura cernantur, folijs exeunt hederaceis, caule tenui, quo capreoli prodeunt, cæterum reptatu non modò palos, & arbores scandunt, ac uinciunt; sed in hortis attegias, pergulas, testudines, scædas, & tentoria inumbrant, & opacant. Hos Galenus lib. primo de alimentorum facultatibus, ex auctoritate Theophrasti dolichos appellat, sic inquit. Dolichus adacto longo palo confurgit, & fructum gerit: sin hoc adminiculo cæteris, iustus fit, & rubigine tentatur. Quod quotidie uisitur in hoc phaseolorum genere. quippe quod nullo sustento in altum euecti, humi repunt, & contracto tractu temporis humore, situ, ac rubigine depereunt. At ubi longè ubi eferint pedamento breui temporis spacio, ad culmen usq; illi se circumuoluunt. Quo fit, ut longè aberrasse Manardum existimem, quod asserat libro primo epistola 111. Dolichos nil aliud esse Galeno, quam Eruiam, quæ Italorum nonnullis uulgo appellatur Rouiglione, alijs uero Arabeia, cum tamen Galenus, itemq; Paulus Eruiam appellent Ochrum. Nec nobis obstat, quod Erulia ( ut ipse asserit ) rubiginem contrahat, cum adminiculis caret, quibus à terra subuectur, quodq; huiusce tantum leguminis siliquæ unà cum semine comedantur, ut Galenus libri 11. de aliment. tract. præfatione, & Paulus Dolichos mandi testantur. Nam etsi aliquando Erulie secti arborum rami apponantur, ut eos implicent; nunquam tamen longissimi adfiguntur pali, quod ea minime illos scandere ualeat, uersicolorum phaseolorum modo. Ad hæc Erulia, quæ humi serpat, rubigine minime depertit, ut Tridentinus ager ubiq; testari potest. Quippe quod ibi frequentissima feratur, dimittaturq; nullo prope fixo pedamento humi accumbere. Nec obstat præterea ( ut ipse Manardus scribit ) quod sola Erulia inter legumina cum siliquis comedatur. Nam quanuis decocta cum siliquis mensis apponatur: nunquam tamen aliquem me uidisse fateri possum, qui siliquis simul cum granis deuorauerit. Sed equidem omnes, quod uiderim, Eruiam mandentes, semina dentibus extrahunt, & membranosas, coactasq; siliquis dentium attritui prorsus repugnantes, in patinis subius relinquunt. Secus autem cum huiusmodi phaseolorum corniculis euenit: quandoquidem cum tenella adolesciunt, antequam consenscant, aqua prius elixa, non modo in acetarijs integra, nullisq; abiectionibus putaminibus, assumuntur in cibum, sed butyro, uel oleo fixa addito gingiberis, & omphacio iucundissime deuorantur. Hinc itaq; fit, ut certò potius credam, hoc phaseolorum genus dolichos esse, quam eruiam Manardo uocatam. Illud insuper hac in re sentit Manardus, quod Dioscorides phaseolorum appellatione, de quibus supra mentionem fecit, non quidem communes, ac triuales, sed Eruiam significauerit: Smilacis uero hortensis nomine, de qua hic sermo, uulgares illos phaseolos representauerit. Qui ( ut suam tueatur sententiam ) consensum minime uideri inquit, quod duobus diuersis capitibus eodem libro de phaseolis scripserit Dioscorides. Sed tunc quæquam à ratione, et ueritate cum alienum existimarem, qui responderit, primam tractasse Dioscoridem de uulgatibus, & candidis phaseolis, qui passim in campis aliorum leguminum more seminantur, ubi de omni segete, & legumibus disseruit. Deinde uero de uersicoloribus, qui in hortis, & uiridarijs ad opera topiaria explenda seruntur, inter ea, quæ in hortis, & uiridarijs coluntur. Quamobrem ut hortenses à campestribus secerneret, inquit: Hortensis Smilax frutex est, &c. Quod manifestè declarat, eum hic de hortensibus, illic uero de ijs, quæ in campis proueniunt, intellexisse, atq; eos ita seunxisse. Quæ in re non potui non quandoq; admirari Manardum medicum alioquin ingenio, & doctrina insignem, quod tam facile adductus esset, ut asseueraret dolichos esse eruiam, cum cum legisse existimandum sit, Galeno, & Paulo eruiam ochrum uocari.

Smilacis hortensis conside ratio.

Manardi error.



Nota supra 237 Turcis bonum

## MEDICA. MEDICA. 111. d. 11. CAP. CXLI.

MEDICA, cum recenter prodijt, folijs, & caule trifolio pratensi similis est: procedens uero folia contrahit, caules edens trifolij, & siliquas corniculorum modo intortas, in quibus semen lentis magnitudine dependet. Id siccatum, iucundi saporis gratia, conditaneo sali admiscetur. Viride, quibus refrigeratione opus est, illitu suffragatur, Herba tota pro gramine vtuntur, qui pecora alunt.

MEDICAM inde nominationem inuenisse certum est, quod primam, Plinio libro xviii. cap. xvi. autore, ex Italia in Italiam aduecta fuerit. Verum etsi hæc quondam in uniuersa Italia sereretur ad pecorum pabulum, & omnibus ferè cognosceretur; nunc tamen pauci sanè reperiuntur, qui Medicam uiderint, ne dum serant: quanquam non desint, qui eam se cōsecutos existiment. Sed cum ab amicis hoc anno semen accepissem, illudq; magna cum diligentia terræ mendassem, accidit, solo forsitan repugnante, ut nulla exorta sit planta; unde quid de ea iudicem nō habeo. Hæc ( ut Plinius tradit loco citato, & antiquorum plerique testantur ) uno tantum satu plus tricenis annis perdurat. Eadem ( ut quædam referunt ) abundat Hispania, ubi magna admodum cura colitur ad umentorum, & pecudum pabulum: & Alfalfa uocant, nomine ab Arabicis corruptè mutato. Nam ( ut lib. 11. capite de Cot inquit Auicenna ) uocatur minimum Aphris Alfafasat. Nascitur & in Gallia, si Ruellio credimus, ibiq; maius trifolium appellatur.

Medicæ consideratio.

APHACA. *soyale vicia* VICIA.

ΑΨΑ. APHACA.

CAP. CXLII.

ΑΡΗΑΣΑ in arvis nascitur, altior lente, tenuibus folijs: siliquas lenticula maiores fert, in quibus terna, quaternave semina nigra, lente minora, continentur. Quæ adstringendi vim habent, quare torrefacta, stomachi, aluique fluxiones sistunt, si fresa lentis more decoquantur.

Aphacæ con-  
sideratio.

Quorundam  
lapsus.

Aphaca inty-  
bi genus.

NON solum in uniuersis Italiz locis Aphaca sponte nascitur, sed & à multis in campis seritur legionum, & erui modo ad columbarum saginam. Folio germinat uicia maiori, crassiori, quadranguli caule, flore subrubro, siliquis inde dependentibus pisorum instar, breuioribus tamen, sed lenticulæ maioribus, in quibus includitur semen, uicæ quadantenus maius. Goritienfi agro frequentissima nascitur inter segetes, & prope sepes. Quo fit, ut maxime errarent, qui censent Aphacam nihil à uicia differre, quæ inter segetes ubiq; copiose prouenit. Quippe quod hæc minor sit folio, tenuiori caule, flore in purpuram rubescente, siliquis longioribus, gracilioribus, ac rotundioribus. Eæ propter de Aphaca, & Vicia differens Galenus libro primo de alimentorum facultatibus, ita scribit. Aphacæ, & uiciæ seminum figura non rotunda est, ueluti fabarum, sed aliquantò latiuscula, similiter lenti. Hæc quoq; cum sit planta, & ualuulis integra rustici reponunt, ut brutis pecudibus pabulo sint. Per famem tamen quosdam nota, qui hæc quoq; comederint, potissimum uere, cum etià mium uirent, quemadmodum fabas, & cicera esitare consueverunt. Semina autem hæc non solum insuauia sunt, sed concoctu etiam difficilia, & alium retinentia. Perspicuum ergo est, etiam huiusmodi naturam obtineant, alimoniam quoque, quæ ex ipsis in corpus permanat, improbi, crassius, succi esse idoneam ad humoris melancholici generationem. hæc Galenus. Ceterum illud animaduertendum est, quod Theophrastus libro VII. cap. VII. & XI. de plantarum historia Aphacam inter intybaea, uel cichorij generi connumerat. Quare mirandum non est, si etiam in alijs quibusdam à Dioscoride discrepet, quemadmodum in coronopo, orobanche, ac alijs nonnullis ostendimus. Nec mirum etiam Plinium hac in historia uariasse: nam lib. XXVII. capite V. Dioscoridis Aphacam ad uerbum retulit: libro uero XXI. Theophrastum secutus, eam inter cichoræa reposuit.

Πορρὺ καὶ ἀκτὼν.

PORRVM CAPITATVM.

CAP. CXLIII.

CAPITATVM porrum inflationem facit, noxiū

succum creat, tumultuosum somnium parit, vrinam ciet, aluo accommodatur, extenuat, oculorum aciem hebetat, menses pellit: sed lædit exulceratam vesicam, renesque, cum ptisana verò coctum, esu pectoris vitia extrahit. Coma eius in aqua maris, & aceto cocta, in defensionibus ad præclusiones vuluæ, & duritias, vtilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit, & multò minus inflat. Semen acrius est, & quandam adstrictoriam vim habet. quare succus cum aceto, addito thure, aut manna, sanguinis profluuiā sistit, maximè si naribus erumpat. Venerem stimulat: cōtra omnia thoracis vitia, tabemque, pro delinctu efficax est; arteriam esu purgat: sed si assidue estur, visus obscuritatem inducit: stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est. Ipsum quoque cū aceto aut thuris polline, lacte aut rosaceo, vtiliter aurium doloribus, & sonitui instillatur. Varos tollūt folia illita cum rhoë, qua ad obsonia vtuntur: epinyctidi medentur: crustas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent, seminis drachmæ binæ, cum æquali baccharum myrti pondere potæ.

PORRVM, quod copiosum quadragesimalis nostri ieiunij tempore plerumq; in foris olitorijs unā cum oleribus uenale reperitur, omnibus notissimum est. Ceterum etsi magnopere laborant hortorum cultores, ut eorum porri, lungi, crassi, candidi, ac teneri euadant; nesciunt tamen eos capitatos efficere, ceparum

Porri consideratio.

ista: quanuis ij apud ueteres in frequentissimo usu fuissent, quod longis, qui propriè sectiui appellantur, sapidiore, gustuq; gratiore haberentur. De his igitur tanquam præstantioribus scripsit Dioscorides, non tamen quod à sectiuis genere differrent, quibus māgonio capitati sunt, tegula in transplantatione supposita, incisus prius ante medullā folijs, et adolendi facultas in sublimē feratur, nec ad radices, sed in ipsa capite cōsideat: uel sarculo conuelluntur radices, ut deluminate alant neq; distrahant, ut scriptum reliquit Plinius lib. xix. cap. vi. Porri facultates recensuit Galenus lib. 11. de alimentorum facultatibus, ubi simul etiam de allio, & cepis, agens, sic inquit. Harum plantarum radicibus percrebro uescuntur homines, rarius caule, folijsq; acri admodum facultate præditis pro radicū portione. Corpus excoalfacit, & crassos in eo humores extenuat, glutinososq; incidunt. Bis tamen, aut ter in aqua decocta, acrimonia soluitur: quanquam ne sic quidem uim perdunt extenuandi. Verian facultatem quandam obscurissimā, alēdi corporis exinde acquirunt, cuius antea, quā decoquerentur, nihil prorsus obtinebant. Ceterum allium non modò ut obsonium, uerum etiam ut medicamentum sanitati accommodum, quod obstructa soluere, & discutere possit, usurpatur. Aliquantisper elixum, usq; dum acritudinem abiciat, uiribus quidem suis imbecillius fit, sed succi prauitatem non amittit, quemadmodum nec porri, nec cepæ, cū bis fuerint decocta.

Porri facultates ex Gal.

Ἀμπελόπρασον.

AMPELOPRASVM.

CAP. CXLIIII.


AMPELOPRASVM stomacho magis, quā porrum aduersatur: plus autem excoalfacit: vrinam, & menses vehementius ciet. Id contra serpentium morsus esse conuenit.

PROVENIT agreste porrum plerumq; in uineis, unde à natalibus ἀμπελόπρασον, quasi uineale porrum, Grecis appellatur. Nascitur hoc in uniuersa Hetruria non solum in uinetis; sed etiam frequēs admodum in agrorum marginibus, et in anconis collium locis. Rura nostra ipsum uulgari sermone appellant Porrandello. Estur à rusticis, & agricolis in acetarijs crudum, recentis allij uice: quanquam mansu durius sit, gustu acrius, & concoctu difficilius. Est præterea Ampeloprasum (ut lib. v. simplicium medicamentorum prodidit Galenus) acrius, & sticcus domesticis, sicut agrestia omnia reliqua domesticis: ac proinde stomacho, quā illud nocentius: sed & crassos, ac lentos humores potentius incidit, ualentiusq; infarcta organa obstructione liberat. Hac quoq; ratione urinas, et menses sepe praecocant, ubi à crassis, & lentis retinebantur humoribus. Adeo uerò est calidum, ut illitum cataplasmati modo excoalfaciat. Dictum est autem antè, quod quæ cum in modum sunt calida, extremi sint ordinis. hæc tamen Galenus. Ceterum illud silentio haud dissimulandum puto, quod Galenus minus fortasse rectè id tribuerit Ampelopraso, quod nominis significationi


Agrestis porri consideratio.



## AMPELOPRASVM.



CEPA.



Ceparum historia ex Theophrasto.

significationem reclamation, & potius scorodopraso competere videtur, cum loco citato inquit. Si inter allium, & porrum medium quiddam concipias, facultatem ampeloprasii inuenies. Quod quidem scorodoprasium, teste infra Dioscoride, ut allij, & porri uires; ita & nomen sibi uendicauit: ampeloprasium uero dictum est, quod in uinetis nascatur. Id quod ipsemet Galenus confirmat libro VIII. simp. medicamentorum his uerbis. Scorodoprasium sicut gustu, & odore median allij, & porri qualitatem posidet, ita & uires. Et libro II. de alimentorum facultatibus: Ampeloprasii (inquit) à porro tanta est differentia, quanta in alijs congeneribus plantis inter sylvestria, & satia inuenitur. Sunt qui hoc in totum sequentem annum reponant, aceto condientes, haud aliter quam cepas, easque ex parte cibo commodius, & praenominus succo obnoxium efficitur.

Κεράρυον. CEPA. CAP. CXLV.

CEPA longa acrior est, quam rotunda, item flaua quam candida; & sicca quam viridis, & cruda quam cocta, aut sale condita. Omnes tamen mordent, flatu gignunt, appetentiam inuitant, sitim mouent, & extenuant, fastidium pariunt, & expurgant: alio uiles sunt. Ex detractis purgantibus in oleum coniectæ, hemorrhoidas, reliquosque excretionum exitus referant, subditæ pro balanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemidis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur: anginae eodem perunguntur: suppressos menses pellit: caput purgat, naribus infusus: canis moribus cum aceto, ruta, & melle illinitur: cum aceto autem perunctas in sole vitiliginis sanat: & cum pari spodio, scabras lippitudines sedat: varos cum sale reprimat: contra calceamentorum attritus, cum gallinaceo adipe utilis est: citæ alio prodest: in auribus sonitum, ac grauitatem emendat: ad purulentas aures, & eliciendam earundem aquam, ualeat: alopecie earum succo perfricantur, qui celerius quam alcyonii pilos euocat. Largiore cibo cepa capitis dolores, ciet, cocta quoque uehementius urinam pellit: eos lethargicos efficit, qui ualitudinibus aduersis, ea etiam cocta, plus æquo uescantur: elixa, & cum passis uuis, & fico illita, tubercula concoquit, & celerrime rumpit.

CEPARVM plura Theophrasto notantur genera libro VII. cap. III. de plantarum historia, ubi sic habet. Differunt & cepa, et allia genere. Sed Ceparum genera plura, ut que à locis nomina acceperunt: gardiæ, cnidiæ, samothraciæ: item setaniæ, & fisiles, & ascaloniæ. Ex his Setaniæ minime, sed longe dulces. Fisiles uero, & ascaloniæ, tum cultu, tum natura inter se differunt. Fisilem etenim hyeme suam comam, inertem relinquunt, uere externa folia detrahunt, & reliqua colunt: detractis his folijs, altero germinant, simulque inferius finditur, unde fisiles appellatæ sunt. Quidam uel omnibus detrahenda folia censent, ut uim suam imo contineant, neque effuse seminescant. Ascaloniæ peculiaris quedam natura notata est: etenim sole fisiles, et quasi steriles, ab radice consistunt, nec ea parte crescere, ac proficere possunt. Quamobrem non eas deponunt, sed semine serunt: deinde circa uer, cum germinatum sit, transferunt. Perficiuntur autem deo celeriter, ut cum cæteris, aut etiam prius euelli possint. Plurimum temporis dimisse in terra, putrescunt. Plantatæ cadem edunt, semenque tantummodo fundunt: tum exinaniuntur, atque in-

est. Harum igitur talis natura est. Differunt & colore nonnullæ: etenim apud Isum cætera quidem candidis st-  
ant constant, sed colore candidæ admodum proueniunt, Sardinisq; similiter ferre affirmant. Cretensium peculiaris  
nature natura notatur, sed Ascalonijs quodammodo proxima, ni forte uel eadem dici debeat. Est enim in Creta ge-  
ras quoddam, quod semine quidem satum in radice crassatur: depositum uero, in caulem, semenq; totum funditur:  
capite, saporeq; dulce est. Id enim quasi è contrario cæteris habet: omnes nanque depositæ melius, celeriusq;  
prospiciunt. Omnes post æstivum proueniunt, tepido adhuc solo, ut depositas imbres occupent. Seruntur & toto  
capite, & circunciso, sed germinationes haud similes fieri solent. Parte nanque inferiore cepæ nascuntur, superiore  
bota: antem erumpit: sectæ uero in rectum, germinare omnino nequeunt. Gethyum dictum sine capite est, et quasi  
longe ceruice consistens: ob id germinatio tota in fronde, sæpiusq; retondetur, ut porrum. qua de causa semine seri-  
tur ad nec deponitur. Cepas hisce ferè differentijs discernere licet. hactenus Theophrastus. Nascuntur Cepæ in uni-  
uersa Italia frequentissime, quæ etiam in ubi multiplici signantur genere, ut refert Plinius lib. XIX. cap. VI. & ut nos  
uideamus. Quandoquidem forma aliæ maiores, aliæ minores, quedam longæ, quedam rotundæ, quedam ue-  
ro seclites proueniunt. Sicut colore rubentes, & subrubentes aliæ, quedam uirides, & candidæ nonnullæ. Quin &  
sapore uel acerrimæ, uel mediocri acrimonia præditæ sunt, aut nihil penitus acres inueniuntur. Omnium maximæ  
sunt, quæ Caieta Roman importantur. Hæ tametsi ad summum rubescant, ac crassioribus tunicis compactæ sint; le-  
uisscula tamen acrimonia pollêt, mansuq; tenerimæ comperiuntur: ob idq; in cibis cæteras antecellunt. In Hetruria  
et minus acres notantur, quæ magis rubent. Contrà uero albæ, quippe quæ omnium ibi acerrimæ proueniant. Quam  
ob causam ad medicamenta potius, quàm ad cibos seruantur: quanquam secus fortasse in Græcia eueniat, quod flauas  
cæteras aciores esse memoret Dioscorides. Connumerantur etiãnum inter ceparum genera (ut locis suprâ ci-  
ta Theophrastus, & Plinius testantur) quæ Ascaloniæ ab Ascalone Iudææ oppido appellantur, & quæ his simi-  
les sunt Theophrasto sectiles nominatæ, nobis uero in Hetruria uulgò Cipollæ maligie. Cepa (ut memorie prod-  
it Galenus libro VII. simplicium medicamentorum) ex quarto est ordine excalfacientium: essentia autem eius po-  
tis crassarum est partium. Vnde etiam hæmorrhoidas aperit tum apposita, tum cum aceto inuncta. In sole albos  
elstergit, tum alopecijs attrita pilos alcyonio citius restituit. Porro si succum eius exprimas, quod reliquum est, ad-  
modum terre substantie est, eiusq; calidæ: at succus aqueæ, æreæq; caliditatis. Hic igitur ijs, qui suffusi sunt, aut  
aciem oculorum obtusam præ crassitudine humorum obtinent, inunctus prodest. Ex huius temperatura tota cepa fla-  
uosa est manducata. Itaq; quæ temperatura sunt sicciore, minus flatuum generant. hæc Galenus. Quod autem Cæ-  
pe corporibus prebeant alimentum, suprâ in porri mentione retulimus ex ipso Galeno, qui de ijs simul disseruit li-  
bro III. de alimentorum facultatibus.

Ceparum ui-  
res ex Gal.

Σκόροδον. ALLIUM. & nobiliss.

CAP. CXLVI.



ALLIUM quoddam satium, atque hortenfe ha-  
betur. quod in Aegypto, singulari ut porrum, capite  
constat, dulce, in purpureum uergens, paruum: reli-  
qua uero magna & candida, ex pluribus coagmentan-  
tur nucleis, quos aglithas, id est spicas, Græci nomi-  
nant. Aliud est syluestre, quod ophioscorodon, id  
est anguinum, uocant. Vis allij acris est: excalfacit,  
mordet, excernit, aluum turbat, inflationes facit, sto-  
machum exiccat, sitim gignit, flatum permouet, sum-  
mam corporis cutem exulcerat: aciem oculorum esu  
hebetat. Eosdem effectus præbet anguinum, quod &  
elaphoscorodon dicitur: latas uentris tineas in cibo  
sumptum abigit, urinas detrahit: contra uiperarum  
ictus, & priuatim hæmorrhoi, prodest, ita ut nō aliud  
magis, si cum uino iugiter assumatur, aut tritum in eo  
dem ebibatur: contra rabioforum morsus, & illitū,  
& cibo ualet. Magnæ & allio utilitates contra aqua-  
rum mutationes: vocem clarificat: veterem tussim  
crudum, coctum uel lenit: potum autem cum origani  
decocto, pediculos, & lendes enecat: cremati cinis il-  
litus fugillationibus cum melle, & alopecijs cum nar-  
dino unguine, medetur: eruptiones papularum cum  
oleo, & sale sanat: vitilignes, lichenas, lentigines, ul-  
cera capitis manantia, lepras, & furfures, cum melle  
eximit: cum thure, & teda decoctum, dentium dolo-  
rem leuat, si in ore contineatur: cōtra uenenatos mu-  
ris aranei morsus, cum ficulneis frondibus, & cumi-  
no illinitur. Feruefactæ comæ ius, foeminarum defes-  
sionibus additum, menses, & secundos partus extra-  
hit.

hic. Allium eiusdem gratia sufficitur. Factum ex eo, & nigra oliua intritum, quod myttoton uocant, esu cit urinam, ora uenarum patefacit, hydropicis utile.

Allij confideratio.

ALLIUM uulgaris est notitie. Ceterum quanquam scribit Dioscorides Allium, quod non coherentibus nucleis, siue spicis, sed singulari, & solido capite constat, in Aegypto nasci; eiusmodi tamen & in Hetruria, & in compluribus alijs Italiae locis provenit, ibiq; Allium mas appellatur. Allij meminit Theophrastus lib. v. 11. cap. 1111. de plantarum historia, sic inquit. Allium ante solstitia, aut paulo post solstitia seritur nucleatum diuisum. Discrimen eorum, quod aliud praeceox, aliud serotinum: est enim genus quoddam eiusmodi, ut sexaginta diebus perfici possit. Differunt praeterea magnitudine singulari. Cyprium uocatum maxime tale est, quod non decoquunt, sed in myttoton tuntur: & cum tunditur, mirum quam spuma increseat. Quin & illud differentiam facit, quod quaedam non ex nucleis coagmentantur. Dulcedo autem, & odor, & crassitudo, eorumq; causa, tempore, cultuq; penitus uidentur contingere, ut etiam aliorum. Perfici etiam semine potest, sed tarde: primo etenim anno caput accipit porri, sequens discerni in nucleos incipit, tertio redditur perfectum, nec quicquam deterius, sed etiam quidam uel deposito nucleis existimant. Radicis autem allij, aut cepae haud similis ortus fieri solet: allij namque cum nucleis extimuerit, tota torquetur: et hinc aucta in nucleos rursus discernitur, atq; ex uno plura efficiuntur, dum caput consumatur. Cepae continuo ab radice aliud, atque aliud obducit, ut & bulbosus, & scylla, & eiusmodi omnia. Etenim alia, & cepae, si non euellantur, plura indies fiunt. Super fistula quoq; & allium capitari posse, & cepae affirmari. haec Theophrastus de alio domestico.

Allium syluestre.


Syluestre uero, quod Graeci οφιοσκορδον, id est, anguinum allium uocant, ubique, in montibus praesertim, & collibus nascitur, nullis diuisum nucleis, satiuo longe minus, sed odore, & sapore illi persimile: folijs angustioribus, gracili caule: in cuius cacumine flos emicat, ex rubeo purpurascens, a quo nigrum gignitur semen. Hoc, cum aliquando in montibus legerem una cum alijs herbarijs, nobis occasione praebuit loquendi de errore detestando, in quo turpiter uersati sunt Arabes, et eos secuti: quod pro scorodii herba, quae triisaginem folijs emulatur, de qua Andromachus, & Galenus intellexerunt, allium syluestre in pastillos theriacos addiderint, & in illius locum suffecerint, non minus uocabulorum uicinitate, quam imperitia decepti, ut sequenti libro in scorodii mentione (Deo fauente) latius explicabimus. Porro illud hic silentio non dissimulandum duxi, ne forte seplasiarjs imponat, quod Brasauolus aperte falli deprehenditur libro suo de simplicium examine Romae prius excuso, ubi Syluestre allium ampeloprason, siue scorodoprason a rei medicae autoribus appellari scribit. Qua in re non uno tantum, meo quidem iudicio, sed duplici, pace eius dixerim, notatur errore. Primum quod existimauerit, allium syluestre scorodoprasum, uel ampeloprasum esse. Deinde quod certo crediderit, ampeloprasum, & scorodoprasum unum & eandem plantam esse.

Arabulapfus.

De scorodii errore.

Brasauoli error.

### SCORODOPRASVM.



Scorodoprasii confideratio.

Marcel. opin. improbara.

Hi Brasauoli errores manifeste redarguuntur Dioscoridis auctoritate. Siquidem is non solum eas plantas nominibus, sed etiam capitibus, & facultatibus distinxit, quem etiam secutus est Galenus, licet, ut in ampelopraso diximus, huic tribuerit, quod scorodopraso tribuendum erat. In his igitur palam sit, allium syluestre ophioscorodum appellari: syluestre porrum, quod in uicinis proveniat, ampeloprason: tertium uero, quod promiscuum allij, & porri facultates obtineat, scorodoprasum. Quare mirari subit Brasauolum uirum alioqui doctissimum, quomodo is, qui simplicium medicamentorum examen conscripsit, haec in Dioscoride, & Galeno non uiderit, uel non animaduertit.

Σκορδοπρασον. SCORODOPRASVM.

CAP. CXLVII.

SCORODOPRASVM magnitudine porrum aequat, qualitatibus porri, & allij particeps. Vnde promiscuas sibi uires ex utroque uendicauit, effectus allij, & porri praebens: inefficacius tamen. Coctum, porri modo, dulcescit, & in olerum uicem transit.

QUONIAM antiquorum nullus, praeter Dioscoridem, Galenum, & Paulum, Scorodoprasii meminit, propterea existimat Marcellus arte, & cultorum mangonio ex allio, & porro in unum sub terra colligatis, non autem natura, scorodoprasum provenire. Sed hac in re Marcellum, pace sua, caecum esse illud manifestum indicio est, quod coeptum sit, legitimam Scorodoprasum naturam, non mangonio factum, in compluribus Italiae locis sponte sua nasci: ac inde postea translatum, in hortis, & uiridarijs depositum uirescere, ita ut intuentibus legitimum se ostendat, & Marcelli errorem prodatur. Crescit id porraceis folijs, quae digitis atrita ita allium, & porrum simul respiciunt, ut illorum etiam effectus praebent, quemadmodum recte prodidit Dioscorides, & Galenus attestatur lib. v. 11. simpl. medicamentorum.

Σκιν.

SINAPI PRIMVM.

*Crust*

SINAPI SECVNDVM.



SINAPI TERTIVM.



*Σινάπι.* SINAPI. CAP. CXLVIII.

SINAPI hortense, aliqui napi vocant. Eligi debet adultum, ualde rufum, nō magnopere siccum, sed quod fractum interne virescat, & ueluti quodam succo madeat, cæsum colore: siquidem recens id genus, tempestiuum habetur. Ad calfaciendum, extenuandum, extrahendum, efficax est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur: contra præduros tonsillarum tumores, ac ueterem, callosamque arteriæ scabritiem, succus ex aqua, & melle conuenienter gargarizatur: sternutamenta ciet, tritum, & naribus admotum: comitialibus quoque auxiliatur: foeminas vuluæ strangulatu oppressas excitat: lethargicis, derafo capite, illinitur. Cum ficis admistum, donec rubescat locus, & ad coxendicum cruciatus impositum, ad lienes, & omne genus dolores confert, cum permutandæ ualerudinis causa ex alto uitia extrahenda sunt: alopecijis illitum medetur: faciem purgat: sugillata cum melle, adipe, aut cerato rapit: feræ impetigines, & lepræ, eo cum aceto perunguntur: cōtra febrium circuitus aridum bibitur, aut potui, polentæ modo inspargitur: extrahentibus emplastris, scabiemque extenuantibus, utiliter admisceri solet: tritum grauitati aurium, & sonitui cum fico impositum, prodest. Succus ad hebetudines oculorum, & genarum scabritias magna utilitate illinitur. Expressus recenti semine succus in sole siccatur.

SINAPI, Plinio libro XIX. cap. VIII. autore, trium Sinapi consideratio.

## NASTURTIVM.

Sinapi vires  
Gal.

pitiam frondem exprimit: tertium cruce folio laciniatur. Hec omnia Sinapis genera obseruantur in Italia: illud siquidem, quod tum folio, tum etiam semine tenui nascitur, erraticum est. Quod uero rapi fronde constat, ceteris maius, bortenense est, eiusque in officinis usus. Tertium deinde et ipsum satiuum est, semine albo, minusque acri. Tritum hoc, mustoque recenti commixtum, diutius eius dulcedinem tuetur, atque eam deficere prohibet, quod ebullitionem reprimat. Eaque propter qui ex Tridentino agro in Germaniam mustum comportant, hoc Sinapis genere cadis inposito, dulcedinem musti conseruant. Sinapis temperamentum tantummodo expressit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inueniens. Sinapi calfacit, et desiccatur quarto ordine.

Καρόδαμον. NASTURTIVM. *Byz. Kreysser*  
CAP. CXLIX.

NASTURTIVM optimum constat esse Babylonicum. Omnium semen est acre: excalfacit, stomacho aduersatur, aluum turbat, tineas excutit, lienem immittit, partus exanimat, menses cit, uenerem stimulat, sinapis, & cruce simile intelligitur: lepras, & impetigines absterget. Illitum cum melle lienem extenuat, fauos expurgat: pulmonum uitia extrahit, sorbitionibus incoctum, serpentium uenenis potum resistit, atque eas suffitu fugat: capillorum defluuia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit: coxendicibus cum polenta commodè ex aceto illinitur: tumores, collectionesque discutit: emittit furunculos illitum cum muria. Herbae ad omnia eadem effectus, licet minor.

THLASPI. siue bursa pastoris. *Cephalanthus*

Nasturtij consideratio.

Nasturtij vires ex Gal.



NASTURTIVM hortis familiaris, et frequens herba est, tenuis: folijs paruis, laciniatis: caule tenui, sesquipedali: flore albo: semine in rubrum nigricante, folliculis rotundis, ac pressis contento, thlaspi modo. Plinius auctor est lib. XX. cap. XIII. album, et nigrum reperiri. Verum cum Nasturtium uentrem inhibere scribit, uel codicem eo in loco deprauatum, uel Plinium ipsum Nasturtij naturam non rectè nouisse, et ideo in hoc deceptum esse crediderim, quod experimento, et Dioscoridi repugnet. Nasturtij semen (ut libro VII. de simplicium medicam. facultate memorie prodidit Galenus) adurentis facultatis particeps est, sicut sinapi. Proinde coxendicis, et capitis dolores, atque adeo quodcumque aliud rubrificationem postulat, eo permixtum atque sinapi excalfaciunt. Miscetur quoque remedijs, que exhibentur asthmaticis, tanquam scilicet id, quod crassos succos ualenter incidere ualeat, uelut et sinapi. Nam omnia ei simile est. Porro et herba arefacta similem semini uim possidet. Humida uero alba, et uiridis propter aqueae humiditatis admixtionem, multo semine inferior est: adeoque sic mordacitas eius moderata est, ut cum pane ea uti liceat, ceu obsonio.

Θλασπι. THLASPI. CAP. CL.

THLASPI herbula est angustis folijs, digitali longitudine, in terram uersis, suppinguibus: binum drantum cauliculo, tenui, non sine adnascensibus ramis: fructu circa ipsum totum, ab extremo in latius se pandente: semine nasturtij, inclusio uasis in cacumine diuisis, lentisculae effigie, nisi quod infringitur: unde nomen accepit. flos albicat. Nascitur in semitis, et sepibus, fossisque. Semen asperi gustus, excalfaciens: bilingua



lata vring; extrahit; potum acetabuli mensura: prodest ischiadicis infusum: sanguine potu educit, internas suppurationes rumpit: menses ciet, sed partus enecat. Alterum thlaspi tradit Crateuas, quod aliqui Pericon sinapi uocant, latis folijs, radicibus magnis: utile ischiadicorum infusioni.

**THLASPI** non desint, qui existimauerint, Thlaspi, & Bursam pastoris uulgo dictam unam, & eandem esse plantam; cum tamen huiusce Bursae pastoris folia, quae per ambitum sinuatum laciniata uisuntur, semenq; bis, quae de Thlaspi memoriae prodidere Dioscorides, & Galenus, minime conueniant, eorum sententia prorsus explodenda uidetur. Ceterum legitimum reperiri in Italia certum est: siquidem eo maxime abundat & Goritienfis ager, & Gradi-  
 11: Scythia, alijsq; circumstantibus locis, semine perquam acri, in folliculis incluso, in cacumine diuisis, lenticulae effigie, sperna parte pressis, ut Dioscorides inquit. Meminit Thlaspi Galenus libro v. simplicium medicamentorum, sic in-  
 22: canis. Thlaspi semen habet & ipsum facultatem acrem, adeo ut internos abscessus potum distrumpat. Menses ciet, et partus enecat. Per sedem infusum sanguinolenta euacuans, ischiadibus prodest. Est enim alioqui tum supernae, tum inferae bilis humorum euacuatorum, acetabuli mensura potum. Et libro primo de antidotis: Utuntur Thlaspi (inquit) quod e Creta affertur, quodq; ubiq; nascitur, colore inter luteum, & flauum medium, figura rotundum, exigens adeo, ut multoties grano milij cedat. Melius est autem e Cappadocia comportatum thlaspi imponamus. Hoc ad ingreditur inclinatur: figuram non exacte rotundam habet, et ante dictum magnitudine permultum superat, atq; ab uno latere parum quandam, ueluti compressionem praese fert, unde & nomen obtinuit. Prouenit autem ut hoc, ita & illud in Cappadocia quam plurimum. Ideoq; non absolute quod inde asportatur, optimum censendum est, sed quod pecu-  
 33: liare in Sairo nascitur, nec Cretico, nec passim nascenti simile. Haec de thlaspi Galenus. Ex quibus satis constat, laicum thlaspi illi, quod Cappadocia profert, non esse uiribus comparandum. Porro illud animaduertendum esse du-  
 44: ximus, quod hoc in loco legitur in Dioscoride: Θλάσπι βοτάνιον ἐστὶ σενὸν τοῖς φύλλοις, ὡς δακτύλου μή-  
 55: λος, πτωχόν ἐπὶ τὰς γὰς, ἀκροσχιδῆσιν, ὑπολίσσεται. id est. Thlaspi herbula est angustis folijs, digitali longitudine, in terram uersis, in cacumine diuisis, suppinguibus. Atqui diuisurae ea in nostrati non uisuntur in folijs, sed in folliculorum cacumine. Quo fit, ut plane suspicer hoc loco Dioscoridis codici mendum ac uitium subesse, ut in alijs compluribus: & quod fortasse nota haec, quae propria folliculorum est, librariorū incuria in folia transierit, praesertim quod in ceteris notis nostrum. Dioscoridis, & Galeni descriptioni prorsus adstipulatur, Hac igitur ratione locus, nobis uisus est, qui restituatur, & legatur, quemadmodum nunc in textu legi potest. Reliquum est, ut de  
 66: BURSA PASTORIS, cuius superius meminimus aliquid in medium afferamus. Sed cum ueteres nihil de hac  
 77: posteritatis memoriae mandauerint, ea tantum recensebo, quae a recentioribus de eius uiribus adnotata inuenio, cum

Thlaspi confi-  
deratio.

Thlaspi uires  
ex Galeno.

Dioscoridis  
locus restitu-  
tus.

## ARABIS.

planta ipsa omnibus uulgo notissima sit. Est igitur Bursa pasto-  
 88: ris ex refrigerantium, exiccantium, & adstringentium genere.

Bursae pasto-  
ris uires.  
Thlaspi confusio

Quapropter prodest attrita, et emplastri more imposita inflam-  
 99: mationibus, & sacris ignibus. Decoquitur pluuiali aqua cum  
 110: plantagine, et Armenio luto, bibiturq; eius decoctum ad intestino-  
 121: rum difficultatem, & ad cruentas excreationes. Herbae succus  
 132: recentia uulnera glutinat, et auribus purulentis infusus medetur.  
 143: Sistit mensuram abundantiam, si eius, & persicariae decoctio insti-  
 154: deant mulieres. Esturq; ad idem, & contra deniq; omnes sangui-  
 165: nis fluxiones efficax est tenui pulicula circumlita, & in oleo fixa.  
 176: Additur in emplastris, quae ad capitis uulnera componuntur,  
 187: & in unguentis compluribus.

Hoc loco Ruellius legisse uidetur Φακοειδής, quod uerte-  
 198: rit lenticulae effigie: nec temere, quod Thlaspi semen illi pulchre  
 209: respondeat. Verum uulgati Graeci codices habent Διονοειδής,  
 220: hoc est, disci figura.

## ARABIS, SIVE DRABA. CAP. CL.

**DRABA** herba ad cubiti altitudinem assurgit, te-  
 231: nues spargens ramos, & ex utroque latere folia, ceu le-  
 242: pidij, sed molliora, & candidiora. In cacumine uero  
 253: sambuci umbellam gerit, candidos flores habentem.  
 264: Herba haec cum ptisana coquitur, in Cappadocia ma-  
 275: xime. Semen aridum pro pipere obsonijs admisce-  
 286: tur.

**NASCITUR** in Ananienfi agro, praesertimq; in campe-  
 297: stribus, & agrorum marginibus, cubitalis planta, folijs lepidio  
 308: non dissimilibus, & umbella fere sambuci, Drabam adamusim re-

Draba confi-  
deratio.



ferens. quemadmodum et in Gallijs nasci Ruellius testatur in noualibus, & sep: cultis. Ceterum quoniam Serapionem nasturtij mentione, de Draba etiam disserit, eamq; Nasturtium orientale nominat, quod insign: eius acrimonia indicum est: & quoniam in nostrate ieuuiscula sentitur acrimonia, idcirco an hæc, quæ in Italia nascitur, Serapionis sit Draba, ego profecto affirmare non ausim: nisi forte id Drabæ accidat pro regionum diuersitate, quemadmodum Ario euenire inferius dicitur ex Galeni auctoritate.

*Ἐρύσιμον*

Ερύσιμον.

IRIO. *Ἰρίον*

CAP. CLII.



Erysimi, seu  
Iriionis consi-  
deratio.

**ERYSIMON**, Latini Iriionem vocant, iuxta vrbes, rudera, hortosq; nascitur: folijs erucæ syluestris: cauliculis in lori modum lentis, & obsequiosis: floribus luteis: siliquis in cacumine gracilibus, ut sæno græco, corniculatis: semine nasturtij, exiguo, vrétis gustus. Contra thoracis fluxiones efficax est, & si purulenta extulsuntur: regio morbo, & coxendicibus prodest: contra venena in delinctu cū melle datur. Illinitur ex aqua, aut melle vtiliter cæcis carcinomatibus, parotidibus, duritijs mammarum, & testium inflammationibus. In totum extenuat, & excalfacit. Mitius multò ad cysteres fiet, si aqua madescat, atque torreatur, vel linteo illigatum, purifata farina oblitum perassetur.

**QUANQVAM** Theophrastus, & antiquorum alij Erysimum inter cerealia commemorant, & sesamo simile faciunt: quod tamen à Dioscoride representatur, folijs erucæ emulic, tanquam ab illo admodum dissimile, hic inter acerrimas plantas, non inter frumentacea, ubi de sesamo disseruit, ab eo repositum est. Eaq; propter facile dici potest, Erysimum aliud designare Theophrasto, aliud uerò Dioscoridi. Ideoq; Plinius utrisq; in Erysimi historia ad stipulæri uidetur. Namq; libro XVIII. cap. VII. ac X. Theophrastum secutus, ipsum frugibus adscribit, sesamooq; simile facit. Et libro XXII. cap. XXV. Dioscoridem imitatus, folijs erucæ paulo angustioribus, & semine nasturtij Erysimum esse prodidit. Hoc idè palam est fecisse Galenum: quippe qui libro VI. simplicium medicamentorum, Erysimum plantis comparauit, quæ acrimonia præmita sunt, uti nasturtium, & sinapi. Et libro primo de alimentorum facultatibus ipsum inter fruges retulit, quæ in cibum ueniunt, iuxta com-

sesamo, sic inquit. Vt porrò milio panicum ad simile est quodammodo, sed ad omnia deterius, ita & sesamo Erysimum corporis substantia nonnihil affine: sed mansum insuauius est, & tenuioris alimenti, adeò quòd in omnibus illo deterius existit. Ceterum Ruellius, quòd dixerit Plinius Erysimum, & sesamum rubentibus prouenire folijs, item ipsi utriusq; nullum animal uesci, illud frugis genus autumat Erysimum esse, quod uulgò Tridentina rura appellant Formentone, Foroiulenses uerò, quòd pullo sit colore, nominant Saracino. Verum hæc in re Ruellius deceptus deprehenditur, quòd nullis notis respondeat hoc Erysimo, quòd Theophrasto, & Plinio describitur: quandoquidem, quod uulgò appellatur Formentone, caule tantum rubet, non folijs, à nulloq; pecude respuitur, sed ab omnibus audisimè depascitur, nec ulla ex parte sesamum emulatur. Porro sciendum est, Dioscoridis Erysimum non esse syluestrem erucæ, quam nos nobilem appellamus, ut credit Hermolaus, itemq; Ruellius ipsum secutus, sed stirpem esse, quæ pascim in præteis, edificiorum areis, & rudetibus, et secus uis oritur, folijs erucæ, floribus luteis, paruis: è quibus cornicula prodeunt, tenuia, acuminatq;: semine nasturtij, minore tamen, & acri-

Ruell. lapsus.

*Πείπερον*

Πείπερον.

PIPER.

*Πείπερον*

CAP. CLIII.

**PIPER** in India nasci, breui arbore traditur: quæ inter initia, prælongum fructum, veluti siliquam, promit, quod longum piper est: habet intus aliquid tenui milio simile, quod eadem in perfectum piper euadit. Id autem suis temporibus dehiscens, pandensque sese, racemos emittit, grana ferentes qualia uidemus. Ea acerba candidum piper faciunt, aptum ocularibus remedijs, antidotis, & medicaminibus, quæ contra venenata parantur, theriaca vocant. Longum uerò uehementius mordet: & quoniam priusquam ematurescat, decerptum est, subamarum relinquitur, antidotis, & theriacis medicaminibus expetitur. Nigrum uerò, utpote quod tempestiua maturitate collectum sit, odoratum esse constat, candido suauius, acrius, & ori gratius, necnon ad condimenta uilius. sed candidum, & adhuc in acerbum vergens, antè dictis infirmius est. Eligi oportet grauissimum, plenum, nigrum, sine multis rugis, recens, ac minimè fursurosum. Inueniuntur enamp in genere nigri semina nutrimento defecta, cassa, inania, minimi que ponderis, quod uocant brast-

Vis omnium

Vis omnium excalfacit, urinam ciet, concoquit, extrahit, discutit, absterget caliginem, quæ oculis obuersatur. Piper febrium horroribus circuitu repetentibus, siue potu, siue illitu subuenit: serpentium moribus auxiliatur: partus extrahit: conceptum adimere creditur, statim à concubitu suppositum: rufsi, omnibusque pectoris vitijs, siue eclegmate, siue potu succurrit: anginae eo, & nelle conuenienter perunguntur: potum cum recentibus lauri folijs, tormina discutit: cum rã passa manducatum pituitam à capite elicit: valetudinem tuetur, dolores finit, appetentiam mouet, concoctionem adiuuat, ad intinctus esculentorum additum: strumas cum pice discutit: uirilignes ex nitro emaculat. Fictili nouo, † vt aiunt, motum torretur. Non est huius arboris radix ginger, vt aliqui existimauere, sicuti paulò post ostendemus. Nanque piperis radix costo similis est, ora gustantium accendit, saluam ciet. Hæc lienem reprimat, cum aceto illita, aut pota: caput etiam purgat, manducata cum semine pedicularis herbæ, quam staphidem ænam vocant.

LVSITANI navigationibus suis hoc æuo confectis per oceanum Atlanticum uersus austrum primò, & hinc deinde in orientem ad Calecut, Taprobanam, aliasq; Indici pelagi insulas: item Hispani liburnicis uecti ad occidentales Indus, Peru, atq; alias complures regiones, quæ antiquos Geographos penitus latuerunt, non modò Pipere, et huiusmodi odoratis simplicitibus uniuersam repleuerunt Europam, sed et stirpium historias à quibus oriuntur, posteritas memorie prodiderunt. Quod postea fecit, ut nobis planè ignorasse uideantur Theophrastus, Dioscorides, & Plinius, aut ob regionum distantiam (indigena potius in hoc fidem secuti, quàm quòd fortè ea uiderint, quæ de pipere scriptis tradiderunt) aut ob aliam quàmuis causam, plantæ illius formam, ac notas, quæ piper in India gignit, ac quoniam modo piperis plantæ suum edat fructum, an scilicet racematim, an corymborum modo, an in siliquis inclusum, an baccharum arborum more. Siquidem Plinius libro xii. cap. vii. ita scribit. Arbores quæ passim piper gignunt, iuxta piperis nostris sunt similes. Quamquam in fronte Caucasi solibus opposita gigni tantum eas aliqui tradidere. Semina uero distans paruis siliquis, quales in phasiolis uidemus. Hæc priusquam debiscant, decerpit, tostæq; sole, faciant, quod uocatur piper longum. paulatim uerò debiscentes per maturitatem, ostendunt candidum piper, quod deinde tostum solibus colore, rugisq; mutatur. hæc Plinius. Quibus à Dioscoride non longè disidere uideretur, nisi piperis plantam similem in ipso reddidisset: namq; Dioscorides nullis eam notis representauit, neq; alicui similem fecit. Theophrastus præterea quàmquam scriptum reliquit lib. ix. cap. xxi. de plantarum historia, Piperis duo esse genera, unum rotundum, alterum oblongum; eius tamen arboris effigiem silentio præterijt. At hi, qui suis liburnicis imensa traiecerunt maria, propriasq; perlustrarunt regiones, ubi piperis utriusq; plantæ innumera uirescunt, nigra, & rotundum gigni narrant à quibusdam infirmis uiticulis uicinas arbores altiore complexu scandentibus, acutè clematis non dissimilibus, folio tamen malum Assyrium emulantibus. Quin et racematim proferri uuarum labruscæ modo, confertius tamen, deinde mense octobri per maturitatem decerpi, et sub feruenti sole tegetibus palmeis expansam torredi, quousq; nigrescat, et rugosum euadat: quod tridui spatio plerumq; fit. Longum autem, ut ipse testatur, hæc ferunt arbores, estq; uelut nucamentum quoddam, exilibus granulis squamatim compactum, quod uelut iulus in portica nuce, cui pulchre adstipulatur, uermiculosa facie dependet, piperato gustu: nunquam tamen in album, uel agrum piper coalescit. Galenus in ægenæ fidem, et Dioscoridem secutus, eandem plantam tam rotundum, quàm longum piper edere credidit. Piperis fruticem uidimus nos Neapoli, qui Lusitanorum descriptioni maxime respondere uisus est, quod uiticuloso caule esset, clematidis acutæ modo. Sed et aliam arbusculam piper racematim proferentem uidi Venetijs, quæ prorsus illius plantæ faciem exprimit, quam uulgus Ribem appellat. Viret hæc in horto clarissimi medici Maphei à Mapheo, in quo plurima simplicia notatu digna uisuntur. Quo fit, ut mirum non sit, si in piperis historia uariant auctores. Quandoquidem cum uarie in Italia piperisferæ habeantur arbusculæ, facile credendum est, uarietatis longè maioris eas in India reperiri. Piperis meminit Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Piperis radix uires costo similes potissimum obtinet. Porro fructus eius nuper quidem admodum germinans, longum piper est: quare etiam maturo humidus est. humiditatis eius indicium est, quòd faciliè repositum perficitur, ac non protinus mordicet, sed post paulò incipiat, uerum plusculum duret. Porro fructus, qui uelut omphax est, piper album est, nigro quidem acrius. Nam illud iam quasi superassatum est, et superexiccatum. Verum utraq; ualenter tum excalfacit, tum desiccatur. Ceterum quoniam Dioscorides inter simplicia de CARYOPHYLLIS, quæ mihi piper in mentem redegit, nihil posteritatis memorie mandauit, cum ea ex eisdem afferantur regionibus, siq; in præcipuo medicorum usu adeò præstantissimum, odoratissimumq; medicamentum, silentio non dissimulanda dicit. Prouenit igitur Caryophyllorum arbor in orientali plaga, quibusdam Indici pelagi insulis, non longè à Babel. Huius caudex buxo similis est, eademq; materies. Folia uerò cinnami instar habet, sed rotundiora. Fructus est parus, ex atro rufescente, in clauum modum capitato, exsertis in aduersum quatuor denticulis, sese stellatim decussantibus, prominulo apice, quadrati alueoli sinu medio umbilicatum produncute. Cultores harundinibus flagellant arborem, consensu prius circumquaq; tegetibus palmeis solo. Caryophylli meminit Plinius libro xii. capite vii. his uerbis. Est caryophyllon in India piperis granum simile, quod uocant Caryophyllon, grandius, fragiliusq;. Tradunt in Indico luco id gigni. Aduciatur odoris gratia. Horum nusquam inuenio mentionem fecisse Galenum: tametsi Serapio ex Galeni ueritate plura de Caryophyllis tradiderit suo de simplicium medicamentorum uolumine. Quamobrem crediderim aut Galeni librum, in quo de Caryophyllis disseruit, perijisse, aut Pauli potius, quàm Galeni testimonio de his scripsisse Serapionem. Nam de Caryophyllis prius Paulus ipse, quibus postea Serapio, uerbis tractauit, libro vii. ubi hæc habet.

Piperis, & plã  
te eius històr.

Plinij lapsus.

Piperis plãtæ  
in Italia.

Piperis vires  
ex Galeno.

Caryophyl-  
lorum històr.  
Ebrò Aristophyl

bet. Caryophyllum, quasi dicas nucifolium, non eam habet substantiam, quæ nomine prædicitur, sed ex India uenit res cuiusdam arboris festuacaci, et nigri sunt, longitudine ferè digituli, odorati, acres, subamari, et alidi, et siccæ in terra propemodum ordine: qui multiplicis usus sunt, tum ad obsonia, tum ad alia multa medicamenta. Caryophylli serapio, iocini, stomacho, et cordi auxiliantur. Concoctionem adiuuant, et alia fluxiones cohibent. Quædam eorum puluis quatuor drachmarum pondere cum lacte sumptus, uenereas uires adauget. Exacuunt præterea, et cenna autore, oculorum uisum, et eorum nubeculas, argemasque exterrunt.

† Ex Græcis uulgatis codicibus aliqui hoc in loco scriptum habent ὁς φασιν, quod sonat, ut dicunt: alij uerò φασιν, id est, ut lenticula. Vnde etiam ex interpretibus alij hanc, alij illam secuti sunt lectionem. Oribasius uero nec hoc, nec illud legit: qui præterea alia multa et hic, et alibi non describit, quæ fortasse non temere quis illegitime iudicare possit.

### Ziyyßeg. GINGIBER. *Jambur* CAP. CLIII.

GINGIBER sui generis planta est, in Troglodytica Arabia magna ex parte nascens. Quæ currens ad multa, perinde atque nos ruta, vtuntur, & primis potibus, & edulijis admiscunt. Huius radices, cyperi modo, parue sunt, candicantes, & odoratæ, atque piper sapore imitantur. Eligi debent, quæ teredines non nouerunt. A multis tamen ob id condiuntur, quod celeriter cariem sentiant: & fictilibus in Italiam asportantur. Gingiber cibo conueniens est, & cum condimento assumitur. Excalfactoriam uim, & excoquentem habet: aluum leniter emollit: stomacho utilis est: efficax aduersus ea, quæ oculis caliginem offundunt. in antidota addi solet. In summa, piperis uiribus respondet.

Gingiberis historia.

GINGIBER (ut referunt Lusitani, qui plurimum se uidisse fatentur in India) radix est, quæ geniculatim repit internodijs, folijs harundinaceis, quæ bis, terue in anno reuiuiscunt, ac reuiuiscunt, sed quæ in cacumine sistuntur graminis amplitudinem non excedere aiunt, nec quicquam in ea regione frequentius inueniri. Subdunt nonnulli subesse discriminis in sapore cùm præcox eruitur. Opportunum demetendi tempus, cùm folia inaruerint, alioquin teredini obnoxium est, et carie tentatur. Eruiturque nonnunquam eius radix libræ pondo. sed non omnibus eadem amplitudo. Plus in profundum non agitur, quam ad ternos, quaternosue palmos. Cùm eruitur, radicis internodij in scrobe fossiores relinquunt, terramque illi aggerunt, ceu eius radicis semen, proximo anno eruturi fructum, id est, regminatas radices. Aduchitur gingiber in Italiam copiosum ex Calecut magno Indiæ emporio, ac ex Troglodytica Arabia non solum tractu temporis exiccatum, sed et saccharo recentissimum asseruatum, uel quodam mellis genere, quod quibusdam è siliquis exprimunt. Id sanè longè magis Veneto præstat: cùm hoc officinarum mangonio ex aridis radicibus, longo temporis tractu modò acerrimo lixiui, calce, quernoque cinere parato; modò muria; modò dulci aqua maceratis, et edomitis, quibus non modò odor deperditur, ac euanesceat; sed et sapor, et acrimonia subtrahatur. Illud uerò cùm statim è terra effossam nulla ferè maceratione conditur, uires et facultates non exiit, sed eas seruat.

Brauaoli error.

Quamquam Brauaolus non rectè, meo quidem iudicio, uelle uideatur, quod Venetijs mangonzatum Gingiber præstantibus plus acrimoniæ relinquat, quam illud, quod recentissimum in India siliquarum melle, aut saccharo conditum asseruatur, et cum alijs aromatum generibus ad nos conuehitur. Quod quantum à ueritate, et ratione dissonet, uel dicare poterunt, qui diu in myropolijs uersati, rem omnino exploratam habent. Gingiberis uires memorie proditi Galenus lib. v. simplicium medicamentorum, sic inquit. Gingiberis radix utilis est, quam utique ex Barbaria ad nos conuehunt. Excalfacit potenter, sed non primo statim occursum, uelut piper: unde sanè et minus esse subtilium partium, quam piper, existimandum. siquidem in tenues solueretur partes, et celerrimè actu ut illud fieret calidum. Apparet enim illaborata, et crassior adhuc quædam ei inesse substantia, nec ea sicca, et terrestris, sed humidior potius aquea. Quo fit, ut facile perforetur, cùm scilicet recrementitia insit humiditas. Neque enim quicquam eorum, quæ æ planè sicca sunt, aut humida, sed elaborata, et familiarem continentia humiditatem, huic uirio obnoxia sunt. Nam usu uenit piperi longo. Atque hinc est, quod diutius perseverat, quæ proficiscitur à gingibere, aut pipere longo caliditas, quam quæ ab albo, aut nigro. Nam sicut ab aridis calamis flamma simul celerrimè accenditur, et unde quæque dispersitur: eundem in modum, quæ à siccis potestate medicamenti editur caliditas. At quæ prodit ab humidioribus, ceu ligna sunt uiridia, et tardius accenditur, et durat diutius. Ex quo fit, ut utriusque medicamenti diuersus sit usus. Siquidem ubi totum corpus celeriter excalfacere consilium est, ea tunc exhibenda sunt, quæ et celeriter à caloris nostri contactu incaldefcant, et celeriter quocumque ferantur. Verum ubi partem quamuis refrigeratam recalscere sinimus, contra agendum, nimirum quæ tardè calefcentia plurimo tempore perdurent, ea offeruntur. Ceterum licet gingiber, et piper album hac ratione à nigro pipere differant; non magna tamen est differentia. At nascuntur et thapsia, et agrestium columbarum stercus maiori tempore perfecte accenduntur, et plurimo tempore perdurant.

Zedoaria historia. et uires.


hæcenus Galenus. Faciem gingiberis representat radix illa, quam Mauritani, et officinæ Zedoariam appellant. odoratior tamen, amariuscule, neque adeo ut gingiber acris. Huius nusquam, quod sciam, meminere ueteres Græci, et recentiores ab Arabicis edocti, nempe Aëtius, et Actuarius eam suis medicamentorum compositionibus admiscere. Zedoaria (ut cap. clxxxii. testis est Serapio) conuehitur è Sinarum regione ultra extremas Indiæ oras. Excalfacit siccitate ordine secundo. Flatu discutit, et pinguedinem auget propria quadam facultate, non quidem elementari. Post sumptam graue uirus animum, quod allium, cepa, uel uinum excitauit, abigit. uenenosorum animalium moribus oporatur: alia fluxiones sistit, uteri abscessus resoluit, uomitiones reprimit, et coli cruciatus tollit, itemque uentriculi.

Arabo, & Zurumbet hioria. Non desunt, qui crediderint, quod Arnabo, de quo scribit Paulus, & Mauritanorum zedoaria unum, & Zurumbet hioria. Verum Serapionis testimonio cap. CCLXXI. Arnabo apud Græcos nihil aliud designat, quam Zurumbet apud Arabes: quippe quod hoc loco de zurumbet eadem scribat Serapio, quæ de arnabo ante ipsum dicitur Paulus. Est autem Arnabo, ut ex Serapionis auctoritate memoriæ prodidit Isach, arbor procera, in oriente proveniens: folijs longis, colore viridi, in luteum languescente, salicis modo, sicuti et ramorum cortex. Infrugifera est, carum odorem spirans. Quibus facile patet, arnabo non modo zedoariam non esse, sed nec in Europam ad nos transire. Quo fit, ut Cordus aberrasse deprehendatur: quippe qui zurumbet zedoariæ genus existimet. Hallucinatur hic in re Brunfelsius: quod is scripserit suo de medicis vocabulis onomastico, quod arnabo unguentum est odoriferum. Verum eius lapsus non aliam causam fuisse arbitror, quam quod oscitanter Paulum legerit: nam Paulus, expressè asserit, Arnabo unguentis expeti, quod suaviter oleat, non autem unguentum esse, ut Brunfelsius somnasset.

Arnabo, & Zurumbet hioria.

Cordi, & Brunfelsij error.

## Υδροπiper. HYDROPIPER. Persicaria CAP. CLV. *Hydropiper*



HYDROPIPER apud aquas nascitur, quæ stagnant, aut pigro lapsu repunt. Caulem edit geniculatum, solidum, multis alis concavum: folia menthæ, maiora, molliora, candidiora quæ, gustu piperis, acri, citra tamen ullam odoris gratiam: fructum acrem, in furculis parvis, prope folia racematim coherentem. Folia cum semine illita tumores, veteresque duritias discutiunt, sugillata delent: quæ postquam inaruerunt, tusa pro pipere in obsonijs admiscuntur. Radix parva, nullius in medicina usus.

TAMETSI pro virili parte contendat Ruellius, ut non minus doctis, quam elegantissimis verbis comprobet, eam non aspernendam stirpem, quam vulgus officinarum Eupatorium appellat, legitimum esse Hydropiper, is tamen hac in re aperte hallucinari deprehenditur, quanvis alioqui fuerit non modo in medica materia peritus, sed & Latinis, et Græcis literis apprime doctus. Siquidem Dioscoridi Hydropiper folia edit menthæ maiora, molliora, candidiora quæ, gustu piperis, acri, citra tamen ullam odoris gratiam: non autem amaro sapore, ut Ruellius ait, Dioscoridis verba pervertens, quod facilius suam astruat sententiam. Vulgare uero Eupatorium folijs crescit cannabinis, duris, bisutis, amaro gustu, non quidem acri, ut piperis: quin etiam adeo odoratis, ut hac de causa herbam esse viribus insignem, quanvis ab antiquis silentio prætermittam, semper existimaverim, cum tamen odoris fragrantiam in hydropipere reperiri neget Dioscorides. Præterea hydropiperi caulis inest geniculatus, solidus, a foliorum, & adnatorum exortu alis plurimis concavum: semine etiamnum acri, in ramusculis prope folia racematim coherentem.

Hydropiperis confid.

Ruel. lapsus.

fol. 455

Pseudoeupatorium uero caulis est procerus, minime geniculatus, in cuius ramis nullum apud frondes racematim coherentem semen: sed in cacumine flores gerit subrubentes, qui diuisi muscarij facie, sylvestris origani modo, per maturitatem in pappos evanescent: è quibus semen prodit amarum totius plantæ sapore; quanquam esse hoc acrimonia præterea non rectè Ruellius asseueret. Qui quoniam vulgare Eupatorium plerumque in aquosis ortis conspexerit, id omnino legitimum esse Hydropiper pro certo asserere non dubitavit, nulla prorsus habita ratione, an aliæ inter se responderet notæ. Quamobrem, ut ex dictis rationibus clarissime patet, Ruellius hac in re non ita maturè mihi videtur sensisse, ut eius clara doctrina, ingenijque præstantia exposcere uidebatur. Quandoquidem cum vulgare hoc Eupatorium primo statim occurssu gustui amarorem relinquat haud quaquam obscurum, facile hinc indicium consequi potuisset hoc non esse hydropiper, quo una cum sale in ciborum condimentis piperis uice prisca ætas utebatur: nam quæ a natura sunt, præterquam quod piperis vicem explere minime valent in cibis addita, ab omnibus respiciuntur tanquam amara et munda. Ceterum si in Italia Hydropiper nascitur, illa meo quidem iudicio est persicariæ (ut uocant) species, quæ in alterius discrimen, cui folia insunt pullo colore emaculata, nullis similibus inficitur notis, sed folio tantum mutato lesit. Quippe quæ folijs proveniat oblongis, menthæ maioribus, mollioribus, ac candidioribus: caule admodum geniculato, duroque, alis concavo: è cuius adnatis rufum semen racematim prodit, acri admodum gustu, ita ut lingua uehementer uellicet. Illud insuper hanc opinionem corroborat, quod prope stagnantes aquas hæc planta ferax arefcat, ubi eam Dioscorides nasci testatur. Meminit Hydropiperis Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Hydropiper à locis, in quibus nascitur, & à similitudine, quæ illi cum pipere in gustu est, nomen

Persicaria *Hydropiper*

Hydropiperis uires ex-Gal.




est, nomen sortitum est. Ceterum calidum est, sed non tantum, ut piper. Attamen herba ipsa etiamnum viride esse semine, cataplasmati in modum imposita, sugillata, et tumores induratos digerit.

Πταρμική. PTARMICA, *Urtica* CAP. CLVI.

Ptarmice historia.

Ptarmice vires ex Gal.



PTARMICA exiguus frutex est, surculos habens paruos, multos, & rotundos, abrotono non dissimiles: & circa eos folia olea, longa, multa: & in cacumine capitulum, vti anthemidis, paruum, rotundum. quod suo acri odore sternutamentum excitat: unde nomen accepit. Folia cum floribus illita, sugillationes rapiunt. Flores sternutamenta efficacissime mouent. Nascitur in montibus, & petrosis.

PTARMICA in Hetruria frequentissima provenit. Nascitur et in Tridético agro, praesertim Ananienfi tractu, siccis frequentibus, parvis, rotundis, abrotono non dissimilibus: e quibus plurima prodeunt folia incana, olea modo oblonga: unde et Oliuella à multis vulgò nominatur. Gerit in surculorum cacuminibus capitulum, chamameli deflorentis modo: cui quædammodum et herba, vis quædam adeo acris inest, ut olfactu statim sternutamenta excitet. Rura nostra ex Ptarmica scopas, quibus paxine trahuntur, conficiunt, nec in alium colligunt usum. Huiusce meminit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, his verbis. Ptarmica flores ciende sternutationis vim obtinent: et enim temperies eius calida, et sicca, viridis etiamnum ordine secundo, siccata tertio.

Στρουθίων. RADICULA, SEU LANARIA HERBA. CAP. CLVII.

*Struthion*

STRUTHION herba vulgò nota: qua purgandis lanis utuntur, qui eas eluunt. Huius radix est acris, urinam ciet: prodest tussi, iocinerosis, orthopnoea et melle sumpta, cochlearis mensura: aluum soluit. Eadem cum panace, & capparis radice, calculos frangit, & cum vrina exturbat: duritiam lienis absumit: menses imposita trahit: partus efficaciter enecat. Cum polenta autem, & aceto illita, lepras tollit: tubercula discutit, cum farina hordeacea, & vino decocta. Miscetur & malagmatis, & ocularibus collyrijs, claritatis causa. Sternutamenta mouet: per os purgat, trita cum melle, & naribus infusa.

Struthij consideratio.

STRUTHION, seu Radicula, adeo olim vulgaris notitia fuit, quod purgandis lanis ea uterentur, ut Dioscorides eam notis ulla representare superuacuum duxerit. Sed cum tractu temporis huius exoluerit usus, eius quoque notitia simul abolita uidetur. Quo fit, ut arduum sit nobis nunc diiudicare, quænam planta Italis Struthion interea possit. Mauritanis, et officinis Condisi ea nominatur, quam illi frequenter medicamentis admiscunt, quibus naribus editis sternutamenta cident. Nec propterea usquam in officinis reperitur, quauis medicorum compositionibus sepe inseratur. Quamobrem asserere non audeo, an Struthion nascatur in Italia: quippe quod hactenus ipsum non uiderim, sed neminem, qui illud cognosceret, et ostenderet, adinuenerim. Theophrastus inter folio aculeatas struthium habet lib. VI. cap. III. de plantarum historia. Plinius uero libro XIX. capite III. his uerbis struthium describit. At quæ uocatur Radicula, lauandis demum lanis succum habet: mirum quantum conferens candori, mollitiq. Aequè nascitur satiuæ ubiq; sed sponte præcipua in Asia, Syriaq; saxosis, et asperis locis. Trans Euphratem tamen laudatissima, caule ferulaceo, tenui, et ipso cibus indigenarum expetito, et tingenti quicquid sit, cum quo decoquitur: folio oleæ, struthion Græci uocant. Floret æstate, grata aspectu, uerum sine odore, spinosa, et caule lanuginoso. Semen ei nullum. radix magna, quæ conciditur ad quem dictum est usum. Struthij vires adnotauit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Struthij radice potissimum utimur, utpote gustu acri, et calida, siccaq; temperamento, ex quarto quodammodo ordine. Sed et abstergit, et irritat: prouide quoque sternutationem prouocat, cetera omnia, quæ calida sunt temperie, et gustu acria. Ex his omnibus palam fit Eufysium uero alioqui doctissimum, in hoc errasse, quod in suis de stirpium historia clarissimis commentarijs, plantam vulgò Saponariam uocatam legitimam Struthium esse censeat, eamq; pro Struthio depingat. Hæc enim folio plantaginis exit, non oleæ; leui, non aculeato: caule geniculato, non lanuginoso: gustu potius insipido est, quam adeo acri, ut quædam excalfaciendum ordinem attingat.

Struthij vires ex Galeno.

Fuch. lapsus.

*Er. app. n.*  
*Κυκλάμινος.*  
*Gymnobot.*

## CYCLAMINVS. CAP. CLVIII.

CYCLAMINVS folia habet hederæ, purpurea, varia, in quibus supra infraque albicant maculæ: caule nudo, quaternos digitos æquante: floribus in eo purpureis, rosarum effigie: radice nigra, & aliquantum lata, vt rapum videri possit. Quæ cum hydromelite pota, pituitam, aquamque detrahit: menses potu, appositue ciet. Tradunt, si prægnans radicem transgrediatur, abortum fieri. partum appensa accelerat: contra venena, præsertim leporis marini, ex vino bibitur: illita contra serpētium ictus remedio est: immista vino inebriat: regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passo, aut diluto mulso. Sed oportet eū qui ebibit, multis vestibus contextum, loco calido, & à perfrictionibus tuto, recumbere, quò facilius exudet: eiectioni autem sudores fellei colore inteniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur: ad deijcienda quoque alui excrementa, in vellere sedi subijcitur: illito umbilico, & imo ventre coxarum tenuis, aluum emollit, & abortum efficit: suffusionibus, & retusæ oculorum aciei, oblitus cū melle succus prodest. medicamentis abortum inferētibus admiscetur. Succus cum aceto illitus, prociduum sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat, eruptiones papularum reprimat: vulneribus ex aceto per se, aut cū melle medetur, lienem absumit, vitia cutis in facie, & alopecias emendat. Eius decocto luxata, podagras, & capitis vlcuscula, pernionesque foueri congruum est: ipsaque in oleo vetere feruefacta, illito oleo vlcera ad cicatricem perducit. Cauata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdum Tyrhenicæ ceræ momento, vt strigmenti crassitudinem vnguentum contrahat, cum primis vitæ pernionibus. Radix, scillæ modo, concisa reponitur. Narrant, ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. Nascitur in vmbrosis, maximè sub arboribus.

Εἰς τὴν κυκλάμινον. ALTERA CYCLAMINVS. CAP. CLIX. *Γραική*

EST altera cyclaminus, quam cissanthemon, aut cissophyllon vocant: folijs hederæ, sed minoribus: geniculatis caulibus, crassisque, circa vicinas arbores, capreolorum modo se voluentibus: flore candido, odorato: acinis hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice superuacua. Nascitur in asperis. Huius acini, drachmæ vnus pondere poti, cum vini albi cyathis duobus, quadraginta diebus, lienem per vrinam, & aluum absumunt: ad orthopnoeam bibitur: reliquias à partu purgat.

TAMETSÍ Cyclaminus prima, quæ vulgò *Panis porcini* dicitur, planta sit vulgaris notitiæ; secundam tamē buxifolij mihi uidere non licuit in Italia: quanquam asserit Ruellius, hanc illam esse stirpem, quam herbariorum, & officinarum vulgus *Sigillum sanctæ Mariæ* vocat. Et cum plures sint herbe, quæ ab imperitis eo nomine appellantur, polygonatum scilicet, Serapionis secacul, & tertia, quæ hydropiperi similis est; harum Ruellius nullam esse Cyclaminum putat, sed aliam ab his longè diuersam, cuius facies, ut ipse delineat, nil aliud representare videtur, quam radicem nigram à Dioscoride libro quarto descriptam, quam nos in Hetruria vulgò uocamus *Tamaro*. Hanc scribit ipsi sigilli sanctæ Mariæ nomen sibi assignasse, quòd eam Mauritanii Bothomariem nominent. Quia in re Ruellius, eius præsertim, aperte fallitur: quandoquidem tota Mauritanorum familia primum tantum genus, non autem alteram Cyclaminum Bothomariem nuncupat. Cyclamini primi generis duæ (ut Mesues autor est) reperiuntur species, maior, & minor. Hæc radice prouenit parua, nucis auellane, cicerumque magnitudine. Illa uerò magna constat radice, in rapi modum extuberante, pullo colore: quæ (ut diximus) vulgaris admodum est, & passim in syluis, & montosis nascens. Minorem uidi ego in agro solium Tridentino in uallis Ananiæ montibus, ubi copiosa nascitur.

Cyclaminus (ut idem Mesues memoriæ prodidit) tam hausta, quam clystere infusa pituitam uiscosam mirificè detrahunt. Coli cruciatus tollit à pituita progenitos, aut ab induratis excrementis. Succus in erinis additur ad expurganda cerebrum, quòd diuturnos finiat capitis dolores, frigidisque conueniat bemicranij. Item resolutis opitulatur, ac morbos cerebri, & neruorum affectibus à frigiditate prouenientibus. Cyclamini meminit Galenus lib. V. II. similitudinum medicamentorum, ubi ita scribit. Cyclaminus uarias vires obtinet: nam & abstergit, & incidit, & ora uenarum aperit, & attrahit, & digerit. Clarum uerò id est ex particularibus operibus. Adeo uehemens eius facultas est, ut abdomine illito, uentrem subducatur, & foetum interimat.

Cyclamini  
 consideratio.  
*Gymnobot.*  
 Ruell. lapsus.

Cyclamini  
 genera, & vires  
 ex Mes.

Cyclamini vires  
 ex Gal.

Δρακοντίδα μεγάλη. DRACUNCVLVS MAIOR. CAP. CLX.



DRACUNCVLVS maior in vmbrosis circum sep-  
ta gignitur. Caulem habet rectum, leuem, duum cubi-  
torum, baculi crassitudine, versicoloribus draconum  
maculis, purpureis tamen euinentibus: folia rumicis,  
sibi inuicem implicita. Fructum summo caule facit, ra-  
cemosum, coloris primùm cineracei, mox per maturita-  
tem in crocum, & purpuram vergentis: radicem prægi-  
dem, rotundam, candidam, cortice tenui vestitam. Colli-  
gitur, dum maturefcit, & succus exprimitur, siccaturq;  
in vmbra. Radix quoque melsibus effoditur, elotaque  
particulatim conciditur, & funiculo transfixa ficitur in  
vmbra. Vis ei calfaciendi cum diluta vini portione.  
Crudam, coctamve cum melle delingi prodest contra  
orthopnceas, rupta, conuulsa, tussim, & destillatio-  
nes. pota cum vino venerem stimulat: vlcera, quæ ca-  
coëthe vocantur, atque phagedenica expurgat, præse-  
tim cum vite alba. ex ea, & melle collyria ad fistulas, &  
partus euocandos componuntur. ad vitilignes cum mel-  
le, efficaciter illinitur: polypus, & carcinomata absumit.  
Succus ad oculorum medicamenta, item contra nube-  
culas, caliginem, albuginesq; effectum præbet. Herba,  
radicisque odor teneros conceptus abortu vitiat. item  
si triginta grana eius in posca bibantur. Sunt, qui eius  
succum cum oleo, aurium doloribus infudere: quineria  
folia, vtpote quæ adstringant, vulneribus recentibus  
imposuere, & cocta in vino pernionibus. Qui folia ma-  
nibus affricauerit, aut radicem exemerit, posse à viperis  
feriri inficiantur.

Δρακοντίδα μικρά. DRACUNCVLVS MINOR. CAP. CLXI.



DRACUNCVLVS minor folio constat hederaceo,  
magno, candidis notis insigni: caule recto, bicubitali,  
versicolore, maculis respergo purpureis, ita ut angustis  
planè referat, baculi crassitudine: fructus summo caule  
racematim cohæret, colore primùm herbaceo; & cum  
ematuruit, crocæo, gustu feruens, mordaxque: radice  
aliquantulum rotunda, bulbosa, arò non abfimili, te-  
nuì obducta cortice. Nascitur in sepibus vmbrosis.  
Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem  
mitigat: naribus etiam ex lana impositus, polypum  
absumit: carcinomata illitu sistit: triginta eius grana,  
si in posca bibantur, abortus inferunt. Odorem autem,  
postea quàm flaccidi flores emarcuerunt, cōceptus ad-  
huc teneros: enecare. Radix ex calfacit: orthopnceis,  
ruptis, vulsis, tussi, destillationibus auxiliatur: humo-  
res pectoris excreatu faciles reddit, siue cocta, tostaq; cum  
melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle de-  
lingatur: vrinam pellit, venerem excitat, cum vino po-  
ta: phagedænas vlcerū, & quæ cacoëthe vocantur, trita  
cum melle, & bryonia alba expurgat, & ad cicatricem  
perducit: collyria ex ipsa ad fistulas, & eiiciendos par-  
tus fieri solent. qui radice sua manus perficuerunt, à  
viperis feriri negantur: illita ex aceto vitilignes ema-  
culat. Folia recentibus vulneribus linamentorum vi-  
ce, conuenienter imponuntur: decocta in vino pernio-  
nibus apposuisse prodest. Caseus folijs inuolutus, à  
putredine defenditur. Succus radicis ad nubeculas,  
albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix co-  
cta, crudave, ad sanorum vsus, pro olere recipitur. In  
Gymnesijs

Gymnæi insulis, quæ Baleares vocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiuijs placaturum loco offerunt. Radix menses effoditur, lotaque frustatim conciditur, & lino traicta, ficatur in umbra, & ita reconditur.

LICET in uetustis quibusdam Dioscoridis codicibus maioris, minorisq; Dracunculi historia speciatim diuisa reperitur: attamen cum altera ab altera parum disidere uideatur, cumq; etiam Galenus, Paulus, & Serapio, qui in simplicium materia Dioscoridem ad unguem secuti sunt, eiusq; dicta bona fide retulerunt, unius tantum Dracunculi meminerint, non ab re credere recentiorum nonnulli, horum alterum ex alterius auctoris officina profectum, & alicuius curiositate hic historie Dioscoridis accreuisse. Quamobrem ego quoq; cogor eisdem adductis rationibus, aliquatenus in eorum ire sententiam. quanquam ingenue sateri possum, me utrunq; Dracunculum Tridenti ac Venetijs uidisse. Alterum quidem, qui maior est, ari, siue rumicis folijs, sibi inuicem implicitis: caude bicubitali, baculi crassitudine, uersicolore, maculis in purpureo nigricantibus resperso, adeo ut angui similis uideatur. Alterum uero, qui minor, & omnibus uulgaris est, folijs rhederaceis, albis, quibusdam maculis conspersis: caule, ac fructu maiori folijs. Quippe quod longam ex se uaginam emittat externa parte herbaceam, interna uero nigricanti purpura intus, cuius medio cormiculum profilit purpurascens, à quo denique racemosum oritur semen (ut Dioscorides inquit) cinereo primis colore, per maturitatem uero aureo uirescente. Quinetiam in cæteris totius plantæ notis, à maiore Dracunculi historia nihil ferè differre cõspicitur. Quapropter etsi prædictæ recentiorum sententiæ, non ausim refragari, quod rationibus satis euidentijs nitatur, & doctissimorum consensu confirmetur; cum tamen sæpius maiorem, & minorem Dracunculum uiderim, non prorsus alienum esse mecum quandoq; cogitavi, si quis suspicetur duo ut sunt Dracunculi genera, à Dioscoride fuisse duplici etiam historia representata. Hanc quoq; illi suspicionem augere poterit Plinius, qui non tantum duas, sed quatuor enumerat Dracunculi species lib. xx. cap. xvi. sic inquit. Id autem, quod Greci Draconthon uocant, triplici effigie mihi demonstratum est, folijs betæ, non sine thyrsos, flore purpureo. hoc autem simile aro. Alij radice longa, ueluti signata, articulosaq; monstrare, tribus omnino cauliculis. Tertia demonstratio fuit folio maiore, quam cornus, radice harundinacea, totidem (ut affirmabant) geniculata nodis, quot haberet annos, totidemq; esse folia. Quarti uero generis meminit ipse in sequentibus lib. xxv. cap. 11. cum inquit. Eadem Lusitanie provincia cognouit in agro hospitis nuper ibi repertum dracunculum appellatum, caule pollicari crassitudine, uersicolore uaperearum maculis, quem ferebāt contra omnium morsus esse remedium. Alij sunt, quos in priori uolumine eisdem nominis diximus: sed huic alia figura. Aliudq; miraculum exeuntis è terra ad primas serpentium uernantes bipedali ferè altitudine, rursumq; cum iisdem in terram se condentis: nec omnino occultato eo apparet serpens. hæc Plinius. Huc etiam accedat Theophrasti auctoritas, qui libro vi. cap. xi. de plantarum historia secundum Dracunculi genus inter ari genera constituit; his uerbis. Dracunculi autem radix (sunt enim qui genus quoddam ari Dracunculum appellant, quod eius caulis uarietatem habeat quandam) cibo inepta penitus est, & medicis tantum cõsola. Ex his igitur, & Plinij uerbis perspicuum omnibus fieri puto, plura esse Dracontij, siue Dracunculi genera, quam Venetijs oculata fide comprobari potest in horto clarissimi medici Maphei à Mapheo, ubi præter Arum duo artem effate Dracunculi genera. Dracunculus, ut Galenus testatum reliquit lib. vi. simplicium medicamentorum, eundem Aro persimile obtinet, tum folijs, tum radice. ceterum illo tum acrius est, tum amarius: ac proinde calfasto- rum magis, & tenuioribus partibus. Habet etiam leuem quandam adstrictionem, quæ quandoquidem cum prædictis caulis qualitatibus, acris scilicet, & amara, coniuncta est, medicamentum factum est utiq; maxime efficax. Nam ræ ex uiscera omnia expurgat, crassos potissimum, & lentos succos extenuans: optimumq; remedium est contumacium alcerum, quæ uaxocidæ nuncupant. hæc Galenus. Ceterum de Dracunculo differens Mesues inter cætera simplicia uelut ætæna, quæ diæctoria ut pollent, scripsit, eo hausto deijci è corpore pituitam. Quia in re à Marardo acriter reprehenditur: quippe quod ubi dixerit Galenus, ac etiam Paulus ipsum secutus, Dracunculum omnia corporis uiscera expurgare, non quod deijciat, id agere intelligunt, sed quod obstructions aperiat, crassam pituitam attenuet, & uasa deurgat. Ab omnibus his forma maxime differt HORTENSIS Dracunculus, quo in ætarijs uescimur, utiq; ad uiscus acerrimo gustu, folio oblongo, radicibus humi repentibus, graminis modo. Sunt qui asserant hanc plantam cultorum mangonio factitiam esse, & non sui natura prouenire: eam siquidem nasci putat lini semine excan- te cepis imposito, ac deinde terra recondito. Sed hos falli crediderim, quod facto periculo, operam quidam perdidert. Hæc nec Greci, nec etiam Mauritanij, quod sciam, meminere. Verum perperisa eius acrimonia, quæ maxime linguam ætæna, eorum esse medicamentorum, quæ ualentissime excalfaciunt, facile conijci potest. Habetur præterea & lingua serpentina, quom inter Dracunculi species, quidam recensent, quod LINGUA Serpentina nonnullis dicatur, etsi nō esse, qui Lucciolam, & Argentinam ipsam appellent. Nascitur hæc in pratis, sed ocysime deperditur. Profilit enim mense maio, sed cion tenerrima sit, paucis post tempore euanida flaccescit, ac subinde nusquam apparet. Mittit tantum folium, pingue, plantagini aquaticæ uocatæ haud dissimile, è cuius inferiore sinu cauliculus exit, palli- dum serpentis hylæ in eadem gerens: unde Græcorum uoce Ophioglossi nomen inuenit. Præstat hæc maxime ad recentia uulnera glutinanda. Quo fit, ut eam quidam mirifice extollant ad enterocelas. Maccatur in oleo, quo utun- tur chirurgi ad prædicta felici (ut aiunt) successu.

Dracunculo-  
rum conside-  
ratio.

Dracunculi  
species ex Pli-  
nio.

Dracunculi  
uires ex Gal.

Dracunculus  
hortensis.

Lingua serpē-  
tina, siue O-  
phioglosson.

ΑΡΕΒ. ΑΡΥΜ. *Plinius in lib.* CAP. CLXII.

ARON, apud Syros lupha vocitatum, folia emittit dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis: caulem suppurpureum, dodrantalem, pistilli specie, à quo croceum semen exit: radice dracunculi alba. quæ decocta estur, utpote cum minus acris sit. Folia ad esum condiuntur, &


bb arida

A R V M. *affarm pnt*

arida per se, decocta manduntur. Radix, semen, & folia dracunculi vires habent. Priuatim radix ex fimo bubulo podagris illinitur. et dracunculi more reponitur. In totum, ob mitiorem eius acrimoniam, incibum expetitur.

Ari conficera  
tio.


Ari vires ex  
Galeno.



A R V M in Hetruria frequentissimum prouenit, in campis, in uineis, in scrobium marginibus, & passim in fœcis propter sepes, praesertimq; in maritimis nostris Senensibus, ubi uulgò ipsum uocant Gigaro ad larum alludentes: quo modo officinis Arum corrupto uocabulo appellari solet. Nostrates uero: 1. *lieres ex Ari radicibus Stillatitias aquas ad fucum parant, quas ad faciem crugandam, illustrandamq; magnis laudibus offerunt. Id quod etiam efficaciter praestat insolatus radicum succus, cerussae speciem referens, quem Gersa uulgò nominant: is siquidem mirum in modum carni splendorem, & candorem conciliat. Ari vires memoriae prodidit Galenus lib. v. 1. simp. med. ubi ita scribit. Ari terrena essentia constat, sed calida: proinde extergendi uim possidet, uerum non ualentem, sicut dracontium. Est itaq; in exiccando, & calefaciendo primi ordinis. Radices eius maxime sunt utiles: siquidem comese crassitiem humorum mediocriter incidunt, adeo ut et excreationibus ex pectore idoneae sint: sed magis tamè aptum est dracontium. Et lib. 11. de aliment. facult. sic inquit. Ari radix rapi modo manditur. In quibusdam autem regionibus acrior quodammodo nascitur, ut dracontio sepe similis sit. Dum rectè parare uoles, prioris decoctionis aqua effusa, repenti in alteram calidam inijcere conuenit: Cyrenis contra, quam in nostra regione Arum se habet: nam illic minimum medicamentosi, minimumq; acrimoniae possidet, adeo ut uel rapis sit utilius. Ideo radicem quoq; in Italiam comportant, ut quae absq; ut putrescat, aut regerminet, longo tempore perdurare possit.*

ARISARVM.

ARISARVM ALTERVM.



Arisarum





## Βολβός ἐδωδιμος. BVLBVS ESCULENTVS. CAP. CLXV.

ESCVLENTVS bulbus vulgò cognitus, à nobis estur. Stomacho, & aluo utilis rufus, & qui ex Aphrica defertur. Amarum uerò, & scillinus, stomacho aptior est, & concoctionem adiuuat.

Bulbi omnes acrimoniam habent, excalfaciunt, venerem stimulant, linguam, tonsillasque exasperant, multum alimenti præbent, carnes creant, inflationem pariunt. luxatis, fractis, articulorum doloribus efficaciter illinuntur: spicula extrahunt: gangrænas, & podagras ex melle, aut per se hydropicorum tumores, & canum morsus cum melle, & piperis polline illiti cohibent: sudores compescunt: stomachi dolores mitigant: furfures, & vlcera, quæ in capite manant, cum tosto nitro abstergunt. fugillata, varosque per se, aut ex oui luteo, & lentigines cum melle, vel aceto, emendant: fractis auriculis, vnguibusque, ex polenta medentur. Idem calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus: item cum cinere è mænarum capitibus, impositi. Cremati uerò, & cum alcyonio misti, vitia cutis in facie, atrasque cicatrices, in sole illiti emaculant. faciunt ad rupta, si cum aceto cocti cedantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam nervos tentant.

## Βολβός ἐμετικός. BVLBVS VOMITORIVS. CAP. CLXVI.

BVLBVS, quem vomitorium vocant, folia habet lentiora multò, & longiora, quam bulbus esculentus: radicem similem, cortice nigro. Ea radix mansa, aut decoctum eius potum, vesicæ malis medetur: vomitiones mouet.

Bulborum cōsideratio.

BVLBORVM genera, esculentum, & uomitorium, antiquis uulgò notissima fuisse ex eo maxime constat, quod eorum faciem non representauerit Dioscorides. Nobis uerò Bulbi eam ob causam, uel quòd iandiu exoleuerint, hodie omnibus tum medicis, tum herbarijs adeò incogniti sunt, ut neminem hactenus inuenerim, qui eos legitime demonstraret. Veteribus autem fuerunt in frequentissimo ciborum usu; his præsertim admixti, quæ ueneris conciliandæ gratia parabantur, utpote qui uenerem stimulent. Quòd autem ad id expetiti, & commendati fuerint, Martialis aperte testatus est in Xenij suis, dum cecinit.

Cum sit anus coniunx, cum sint tibi mortua membra,

Nil aliud bulbis quam satur esse potes.

Multorum error.

Cæterum non desuere, qui crediderint Bulbum esculentum esse Ascalonium cepe, aut fissile illud ceparum genus, quod Hetruscis uulgò uocatur Cipolla maligia. Sed horum error manifestè deprehenditur ex Theophrasto, qui Ascalonium, fissileque cepe inter ceparum genera libro VII. cap. IIII. de plantarum historia recensuit, non autem inter Bulbos, de quibus speciatim differuit libro VII. cap. XIII.

Bulborum vires ex Gal.

Bulborum meminit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic scribens. Bulbus esculentus frigidior, & crassior est, lentumque succum procreat. Nam & coctum difficilis est, & flatuosus, & uenerem prouocans. Attamen illius ob amaritatem, simul & adstrictionem, abstergit, simul & glutinat, & nimirum etiam exiccat. Est enim ostensum, amaritudinem in extergentibus esse substantijs, & adstrictionem uerò in glutinantibus. At siccitas utranque consequitur. Bulbus autem uomitorius multò est calidioris temperaturæ, quam prædictus bulbus. Et libro II. de alimentorum facultatibus, sic de bulbis scribit. Bulbi genere cum prædictis conueniunt. Nam horum quoque radix directis folijs manditur: in uere interdum ipse etiam coliculus. Amarum, austerumque uim euidenter bulbi in se habent: quamobrem elanguescentis stomachi aliquatenus exuant iuiditatem. At uerò neque ijs aduersantur, quibus è thorace, atque pulmone pus conuenit expuere: quanquam crassiores, ac glutinosiores sunt corporis substantia. Etenim amaritudo crassitudini reluctatur, lenta, crassaque nata incidere, quemadmodum in commentarijs de medicamentis prodidimus. Quapropter bis elixi uberius quidem alent, sed ex creare uolentibus aduersabuntur, utpote omni amaritudine exuti. Tum uerò ex aceto, oleo, garoque mistis, estur satius fuerit: nam ita magis profectò oblectabunt, ac nutrient, minusque inflabunt, ac facilius concoquantur.

## Σκίλλα. SCILLA. CAP. CLXVII.

SCILLA vim acrem, atque feruentem habet. assatam ad multa utiliore esse constat. Polline ad crustam subactò, aut luto oblita, in clibanum conijcitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficienter intosta fuerit: qua exempta, si non emollescat, altero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem, quæ prius, fiunt: nam quæ ita non assatur, interaneis maxime noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quæ in furnum demittatur. Sumi etiam solet quod maxime est medium, directis uiuòtenus tunicis, quod frustatim confectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinem, nec acrimoniam habeat: traiectaque lino frusta siccantur in vmbræ, ita ut ne vlla quidem parte se contingant. His scillæ segminibus ad oleum, uinum, aut acetum scillinum utimur. Ad rimas pedum, interna pars crudæ scillæ in oleo seruata, aut cum resina liquefacta, imponitur. decocta in aceto demorsis à vipera, cataplasma est. Ad singulas assæ partes adiectis octonis rosti salis, cochlear vnum, aut alterum damus ieiunijs, ad emolliendam aluui: in potu autem, & odoratis medicaminibus, & quibus urinam ciere volumus, hydropicisque, & stomachicis, quibus innatat cibus, regio morbo, torminibus, in tussi vetere, suspiriosis, & ore reijcientibus,

infra 580.

cientibus; tres obolos in delinctu ex melle sumptis  
satis est. Coquitur cum melle, & estur corundem gra-  
tia, maxime vt concoctionem adiuuet: strigmenta per  
aluam extrahit. Cocta, & simili sumpta modo, eodẽ  
præbet effectus: sed cauendus scillæ vsus his, qui inte-  
stinum sentiunt ulcus, ad peniles verrucas, & pernio-  
nes, tosta efficaciter illinitur. Tritum semen, & in ca-  
rica, aut melle deuoratum, aluum emolliat. Scilla tota  
in limine ianuæ suspensa, mali medicamenti noxam  
arceat.

Πανκράτιον.

PANCRATIVM.

CAP. CLXVIII.

*Scilla virens*

PANCRATIVM, quod aliqui scillam appellant,  
radice est magni bulbi, subrufo colore, aut suppurpu-  
reo, gustu amaro, ac feruente: folijs lilij, sed longiori-  
bus. Scillæ vires, & præparationem habet, eodemque  
pondere in morbis efficaciter assumitur: cui tamẽ mi-  
rior, quàm scillæ facultas inest. Radicis succus cum  
crui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis, sple-  
nicisque cum hydromelite, commodissimè dantur.

SCILLA, quam vulgus officinarum Squillam uocat, om-  
nibus vulgaris notitiæ est, atq; utilissima, medicamentis expe-  
dita, ut pote sine qua legitima theriaca confici non possit. Pancra-  
tium, quod aliquibus pusilla scilla uocatur, quoniam hodie in me-  
dicamentorum usum non recipitur, ideo medicis, & seplassarijs  
neglectum est. Vnde etiam pauci fortasse sunt, qui uel ipsum no-  
uerint, uel animaduertant: cum tamen uarijs in Italia locis gi-  
gatur, præsertim in Apulia, ubi magnus est Scillarum prouentus. Verum etsi id in officinis non habeatur; nihil tamẽ  
ut in medicina fieri puto, quod eius uicem maior scilla ualentius etiam præstet. Scillæ duo notantur generâ, unũ  
album, alterum uerò nigrum. Hinc nonnulli (ut Ruellius inquit) album mas, nigrum autẽ feminam faciunt: quan-  
tum magis rationi consentaneum uideatur, ut contrarium existimari, & esse debeat. Quidam ætatis nostræ medici  
in cerebri, & neruorum frigidis affectibus, Scillam crudam ab inuolucris repurgatam minutim secant, & cum melle.  
pleno in uas uitreum coniiciunt, insolantq; per æstatem, ardente præsertim siccio. Denum percolato melle utun-  
tur ad comitiales, & alias cerebri ægritudines, à frigiditate excitatas. Sed alia longè diuersa fuit Galeni ad hos usus  
scillæ parandæ ratio. Quippe qui concisam Scillam nunquam melle commixtam exposuit insolendam: sed ut ab ea  
succum sole colligatum in diebus canicularibus eximeret, in fistile, uel uitreum uas, in quo primum mel fuisset, dis-  
sectam scillam immutebat: deinde tantisper insolabat, donec solaribus radijs ipsa liquesceret. Ex quo palam fit, quod  
plerique à Galeni instituto prorsus aberrant, ut qui scillinum mel conficiant scillæ liquoris uicẽ. Scilla (ut memo-  
ne scriptum reliquit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum) admodum incidentem facultatem obtinet,  
non tamen admodum calidam. Sed secundum hoc eam quispiam secundi ordinis censet excoalscentium. Præstat qu-  
cum aut assam, aut elixam sianere: sic enim uirium eius uehementia exoluitur.

Scillæ, & pan-  
cratij confid.

Scillæ præpa-  
ratio.

Scillæ vires  
ex Galeno.

Κάππαρις.

CAPPARIS.

*Capparis*

CAP. CLXIX.

CAPPARIS aculeatus frutex est, qui in terra stratus magis in orbem euagatur. Spinas, vt ru-  
bus, habet in hami modum aduncas: folia mali cotoneæ, rotunda: fructum oleæ similem; qui  
cum dehiscens panditur, florem candidum promit: quo excusso, nonnihil glandis oblongæ figu-  
ra inuenitur, quod apertum grana acinis puniceorum similia ostendit, parua, rubicunda: radices li-  
guosas spargit, grandes, numerosasque. Tenui plerunque solo, asperisque locis, in insulis, & ru-  
ra rudera nascitur. Caulis, & fructus, cibi gratia condiuntur. aluum turbat, stomacho aduer-  
satur, sitim gignit: cocta tamen stomacho, quàm cruda utilior est. Fructus drachmis duabus in  
vino potus, quadraginta diebus, lienem absorbit, & urinam, cruentumque excrementum emit-  
tit: bibitur utilissimè in coxarum doloribus, & neruorum resolutione, item ruptis, & conuulsis:  
mensis ciet, caput purgat. Dentium dolorem sedat semen ex aceto decoctum, colluto inde ore.  
Andus radicis cortex ad eadem proficit: vlcera omnia vetera, & sordida, & quæ occalluerunt, ex-  
purgat: lienosis cum farina hordei illinitur: dente demorsa, dolori eius auxiliatur: cum aceto tri-  
ta, uulnigines albas absterget. Radix, foliaque intrita, strumas, ac duritias discutiunt. Aurium uer-  
miculos

## CAPPARIS.

Capparū con-  
sideratio.Capparum fa-  
ctio.Capparis vi-  
res ex Gal.

miculos infusus succus enecat, Aphrica, & præ-  
sertim Marmarica capparīs, vehementer inflat. Apula  
vomitus facit. & quæ à Libyco, & quæ Rubro mari,  
deferitur, mirum in modum acris est; siquidem in ore  
pustulas excitat, gingiuasque osse tenus exest, quam  
in cibis non ab re damnatur,

CAPPARIS frutex est in Italia vulgaris satis notitie.  
Floribus enim, & fructibus muria asseruatis frequentissime in ci-  
bis utimur. Ex ijs suauiores, & qui cum palato maiorem inueni-  
gratiam, sunt recentes acerrimo asseruati aceto, quod pleriq; fa-  
ciunt in Hetruria. Præstantissimæ cappares ex Alexandria Aeg-  
ypti Venetias aduehuntur. Est et in Apulia capparum procer-  
tus, unde etiam plurimæ deferuntur, uerum longe deteriores his,  
quæ ex Aegypto importantur. Vomitiones cappares haud qua-  
quam cient, ut Dioscorides inquit: nisi fortasse hac facultate sint  
prædite, dum recentes, ac uirides comeduntur, antequam mu-  
riam experiantur, & inde elixentur. Proueniunt etiam Roma  
in collapsis edificiorum parietibus, ruderibusq; præsertim cir-  
ca Pacis templum, itemq; Senis, quæ quidem Apulis saporis præ-  
stantia minime cedunt. In cultis nasci cappares negat Theophras-  
tus libro v. cap. v. de plantarum historia. Seruntur tamen hac  
etate, colunturq; perinde ac segetes, & legumina, quemadmodum  
& Plinij tempore. quæ ferendi rationem lib. xix. cap. viii. his  
uerbis explicauit. Quippe cum capparīs quoq; seratur, sicis  
maximè, area in defossu cauata, ripisq; undiq; circumstructis la-  
pide, aliàs euagatur per agros, & cogit solum sterile scire. Flo-  
ret æstate. uiret usq; ad Vergiliarum occasum. Sabulosis fami-  
liarissimum. Capparis uires reddidit Galenus lib. vi. simp. me-  
dic. sic inquit. Capparis radicis cortex uincemem habet quæ

litatem amarā, proximā acrem, deinde acerbā. Ex quo liquet, quod diuersis, pugnantibusq; constet facultatibus.  
quippe abstergere, purgare, incidere potest amaritudine: excalfacere, incidere, digerere acrimonia: porro cōtrahere,  
densare, constringere acerbitate. Idcirco lienes induratos, si quid aliud, hoc medicamentum iuuare ualet, tū foris et  
neis illinendis remedijs admistum, tum intro in corpus assumptum; siue decoctum in aceto, aut oxymelite, & id genus  
siue aridum contusum, illisq; permistum. Quippe cum apertè crassos, lentosq; humores hoc pacto sumpti euacuet, nec  
eos tantum per urinas; sed & per uentrem: sæpe etiam sanguinolentos defert, unde & lienes aduerti sunt, & coxarum  
dolores. Quinetiā menses promouet, & ex capite purgat, detrahitiq; auxiliaturq; ruptis, atq; cōuulsis. Ceterum cui-  
nam ipsum potioni in quoq; affectuū misceri conueniat, non est præsentis instituti persequi. Porro radicis eius cortex  
ulceribus malignis cataplasmatibus modo impositus, non malum est remedium, ut qui illa extergere ualeat, nec segner  
desiccare. Præterea dentium labores prædictarum qualitatium ratione adiuuat, interim cum aceto coctus, interius cum  
uino, sæpe etiam solus dentibus mansus, ac morsus. Ex dictis ergo clarum est, incidendi quandam et facultatem esse,  
itemq; extergendi, digerendi, contrahendi. Vitilignes siquidem cum aceto detrahiti, & chœradas, et duros tumores e-  
gerit, idoneis ad ea medicamentis mistus. Radicis cortici, fructus proportionem uirium respondet, nisi quod ad omnia sit  
imbecillior. Imò et folia, et caules eius, similem uim obtinent. meminiq; me folijs quandoq; paucis diebus duritiem chæ-  
radis naturam referentem discussisse. Sed admiscemus scilicet illis quippiam, quod eorum uirium obtundat uebecan-  
tiam. Nec mirum est, quod aurum uermes succus amaritate occidat sua. Porro capparīs, quæ in admodum seruen-  
tibus regionibus prouenit, ut quam fert Arabia, multo est nostrate acrior, adeo ut plurimū etiam habeat facultatis eue-  
rentis. Et libro xi. de aliment. facultatibus, sic de Cappare scribit. In Cypro Capparis plurima prouenit. Facul-  
tas eius tenuium admodum est partium: proinde minimum alimenti in corpus eorum, qui ipsa uescuntur, distribui.  
quemadmodum & alia omnia, quæ tenuibus constant partibus. Utimur autem fructu huius planta magis, ut medicame-  
nto, quam ut alimento. Importatur ad nos etiam sale conspersus, quia solus asseruatus putrescit. Clarum ergo  
est, quod capparīs adhuc uiridis, antequam sale condidatur, plus habet nutrimenti: nam ex salitura permultum con-  
emittit, niq; sal abluatur, prorsus haud quicquam nutrit: alium tamen subducet. Verum ablutus, & demaceratus,  
donec omnem salis naturam exuat, ut minimi sanè alimenti cibus est, ita obsonium, & medicamentum, cum ad exci-  
dum prostratum appetitum, tum ad deradendam, deiiciendamq; pituitam uentri adhaerescens accommodatum erit,  
ac deniq; ad lienis, iccorisq; amolendas obstructions. Verum in hos usus cum oxymelite, aut oxaleo ante alius co-  
cines dapes sumi oportet. Tenellis porro capparīs germinibus homines, ut terebinthi turionibus, uescuntur: cūq; ab  
huc iarent, in oxalme, & aceto, non secus atq; bos, reponunt.

LEPIDIVM DIOSC. *Pfeffer-Kraut* LEPIDIVM PAVLI, ET PLIN.

Λεπίδιον. LEPIDIVM.

CAP. CLXX.

LEPIDIVM, aliqui gingidium vocant, herbula vulgò nota, muria cum lacte feruatur. Vis foliorum acris, & exulcerans. quapropter ischiadicis trita, præsentissimum est auxilium, si cum helenij radice, quarta parte horæ, illinatur: lienosis simili modo prodest: lepras eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur.

CUM satis superq; à nobis ostensum sit, in primi libri calce, in Iberidis commentatione, Iberidem nihil à Lepi-  
 40 deo differre, superuacaneum esset, hic ea repetere, quæ ad Lepidij historiam explicandam loco citato diffusius adduxi-  
 mus. Siquidem eo quisq; facile accedere potest, qui ea, quæ ibi diximus, scire desiderat. Veruntamen illud silentio non  
 inuoluendum duxi, quòd Plinius in Lepidij historia prorsus à Dioscoride dissentire deprehenditur. Quippe qui scri-  
 pserit lib. XIX. cap. VIII. Lepidium cubitali longitudine assurgere, folijs laurinis, non autem nasturtij, ut Dioscori-  
 des inquit. Quod sane nobis insinuare uidetur. Plinij Lepidium eam esse Iberidis speciem, quam scribit Paulus lib. III.  
 de coxendicium dolore agens, folia lauri proferre. Hæc enim ( ut libro superiore diximus ) ea facile fuerit, quam uul-  
 45 gus herbariorum ideo *Piperitum* nominat, quòd acerrimo gustu linguam mirum in modum uellicet. Ceterum non pos-  
 sum non admirari, quòd tam facile crediderint Hermolaus, Manardus, ac Ruellius illos secutus, Lepidium eam plan-  
 tam esse, quæ uulgò in Italia appellatur Raphano. Nam cum hæc folijs sit helenio paulò minoribus, et uerbascoma-  
 50 ioribus, nullo pacto Dioscoridis Lepidium referre potest, ut quod tenuis admodum sit herba. Nec item Plinio adsti-  
 puli uidentur, qui Lepidium prodidit laurinis folijs exire in cubitalem altitudinem: nisi fortasse ij clarissimi uiri no-  
 strum *Piperitum*, quæ proculdubio Plinianum refert Lepidium, Raphanum uocauerint.


Lepidij consi-  
deratio. *Supra* 153Lepidium Pli-  
nij.*Piperitis*  
Lapsus Her-  
molai, Manar-  
di, & Ruellij.Βαρυχλον. RANUNCVLVS. *Ranunculus* CAP. CLXXI.

COMPLURA Ranunculi genera. vis tamen omnibus una, acris, & uehementer exulcerans. Nam unum coriandri folijs constar, latioribus, subalbidis, pinguib; flore luteo, interdum purpureo: caule gracili, cubitum alto: radice alba, exigua, amaraque, multis capillamentis, hellebori modo, fibrata. nascitur in limitibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, plurimum in Sardinia proueniens, quàm acerrimū, quod syluestre apium appellant. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo.

Folia,




RANUNCVLVS PRIMVS.



RANUNCVLVS SECVNDVS.



RANUNCVLVS TERTIVS.




RANUNCVLVS QVARTVS.



RANUNCULVS QVINTVS.

Folia, flores, & cauliculi recentes, illitu exulcerant, & crustas non sine dolore gignunt. quare ungues scabros extricant, scabiem eximunt, stigmata delent: formicantes uerrucas, & penfiles, alopeciasque paulisper illita tollunt. Tepente decocto pernioles fouentur. Sicca radix, tritaque sternutamenta ciet, naribus admota: dentium dolorem appensa leuat, ipsos tamen frangit.



RANUNCVLVM, qui Græcis Βατράχιον dicitur, uulgo herbariorum in Italia, & alibi etiam Pedem corui, & Pedem galli, quauis perperam, uocant, ut superius quoque in coronopi mentione diximus. Planta est uulgo nota, pluribus tamen, & diuersis generibus distincta. Et quauis quatuor tantum generum meminerit Dioscorides; nos tamen & quintum, & sextum genus sepius uidimus. Ex his, quorum particulatim non fecit mentionem Dioscorides, unum genus est, quod nobis quinto loco assignabitur, quod quidem folijs primo proximis prouenit, sed cui inter complures, quibus nititur, radices, tuberosa quædam pendeat radix nucis iuglandis magnitudine, rapi modo albicans, acris tamen, & exulcerans, qua per hyemem, arescentibus iam folijs, utuntur quidam, ubi exulcerandi sit opus. Illud porro genus lanuginosius, uel, ut Plinius ait, foliosius copiosissimum in Sardinia nascens pluribus foliorum incisuris, altiore caule, acerrimo gustu, plerique ideo Apium risus nominant, quod quibusdam memorie proditum sit, eos tanquam præ lætitia ridentes interire, qui ipsum comederint. Sed res se aliter habere crediderim, & alijs potius adstipulandum esse. Siquidem Pausanias autor est herbam hanc, si edulio fuerit, uescentibus nervos contrahere, rictuque ora diducere, ita ut qui mortem oppetunt, uelut ridendum facie inter-

Ranunculo sideratio.

Pes corui

Apium risus.

Quorundam error. Ranunculi vires ex Gal.

reant. Quod & Salustius confirmat, qui huius uenenatæ herbe meminit, sic inquit. In Sardinia quædam herba nascitur, quæ Sardos dicitur, agresti apio similis. Hæc ora hominum, & rictus dolore contrahit, et quasi ridentes interimit. Ideoque Dioscorides libro v. 1. Sardoniæ ranunculi genus esse testatur, quæ uescentibus mentem adimat, & quædam nervorum distentione dehiscere in rictus ora cogat, ita ut imaginem ridentium præbeat. Ob id Sardoniæ risus in elegiam cecit. Ceterum quam magno in errore uersentur, qui existimant Ranunculum esse Coronopum, superius in Coronopi commentatione latius explicauimus. Ranunculi meminit Galenus lib. v. 1. simplicium medicament. ubi inscriptum reliquit. Batrachium, id est, Ranunculus, quatuor habet speciatim differentias. Omnia uero uehementer acrim facultatem possident, adeo ut cum dolore exulcerent. Hæc itaque ratione, si moderate utare, psoras, & lepras excoriant, & ungues leprosos diuellunt, & stigmata discutiunt, & acrochordonas, & myrmecias detrahunt. Quin & alopecias iuuant, pauco tempore admota. Nam si diutius inhereant, non excoriatur solum ipsa cutis; sed & in crustam uritur. Atque igitur hæc omnia caulibus, & foliorum sunt opera, si imponas uirentia. Porro radix arefacta sternutatorium est medicamentum similiter alijs omnibus, quæ ualenter desiccant. Sed & dentium dolores iuuat, ut & frangat eos ualenti scilicet exiccatione. & ut semel dicam, calida, & sicca ualde est tum radix, tum uniuersa cætera herba.

ΑΝΕΜΟΝΗ. ANEMONE.

CAP. CLXXII.



*Anemone pulchra*

Duo Anemones genera, unum syluestre, alterum in cultis nascens. Cuius multæ species: una pheniceum florem profert: altera candidatam, aut lacteum, aut purpureum. Harum folia coriandri similia, cæterum scissa tenuius in terram inclinantur: caules lanuginosi, tenues, in quibus flores, ut papaueris, & in medio capitula nigra, aut cærulea: radix oleæ magnitudine, aut amplius paulo grandescit, ac ueluti geniculis quibusdam cingitur. Syluestri amplitudo prorsus maior, latiorque folia, & duriora: oblongius caput: flore puniceo: tenuibus, & multis radicum capillamentis. Acrore est, quæ nigra habet folia. Vis utriusque acris. ea de causa succus naribus infusus purgat caput. Commanducata radix pituitam trahit. decocta in passo, & illita, medetur oculorum inflammationibus: cicatrices eorundem, & hebetudines emendat: sordida vlcera abstergit. Folia, & caules, si cum pituita decocti edantur, copiam lactis præbent: menstrua ciunt, vellere apposita: illita quoque lepras eximunt. Sunt qui errore ducti argemonem nominari eupatorium putent: quoniam à syluestri Anemone, argemonem, & papauer, quod rhœada appellant (de quo inter papaueris genera referemus) propter colorum cognationem in floribus distinguere non possunt. Verum papauer, & argemone colore minus saturato spectantur, & utraque tardius floret. Quinetiam argemone

argemone croceum succum, gustu admodum acrem, reddit: rhœas verò candidiorem, & acrem. Insuper anemonæ, & rhœadi capitula sylvestris papaueris similia insunt, sed in anemone suprema crassiusculum, in rhœade subangustius. Anemones genera succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. In aruis illa sæpius enascuntur.

ANEMONE.

ANEMONE ALTERA



Anemonæ  
consideratio.

Brasavoli la-  
psum.

Fuch. lapsus.

Pulsatillæ hi-  
storia.

Ruell. lapsus.

NON DESUNT profectò, qui credant, Anemonem, & sylvestre papauer idem esse: sin minus, sicut  
eiusdem esse generis. Sed ij meæ sententia falluntur, & prorsus aberrant à Dioscoridis proposito. Quo-  
doquidem si hoc idem sensisset Dioscorides, alterum ab altero diuersis capitibus non distinxisset, neque, ut legitur a  
huius capitulis calce, differre Anemonem à sylvestri papauere tradidisset. Tametsi existimet Brasavolus, Dios-  
coridis Anemonem id omnino esse sylvestris papaueris genus, quod flore prodiit ceteris rubentior: minime  
uertens, quòd si huius cauliculi frangantur, statim lac ipsum distillant. Quin nec illud quidem animaduertisse  
tur, quòd hoc longa constet radice, non autem oliuæ modo rotunda: capitulumq; ferat papaueris, non as-  
paragi cacuminibus simile. Fuchsius præterea in eo libello, in quo tantum stirpium imagines expressit, Anemo-  
nes purpureæ loco, illam depingit herbam, quæ plerisq; Pulsatilla cognominatur, etsi nullam, quantum equidem  
tio, habeat cum Anemone cognationem. Illa namq; cum primum erumpit, folia mittit admodum hirsuta, minutè  
ciliata, quæ sapore sunt perquam acri, adeò ut non minus exulcerent, quàm ranunculus, et flammula vulgò dicta. Flus,  
qui in stelle modum, similiter hirsutus, ineunte uere dehiscit, antequàm folia erumpant, nigricanti splendet purpura:  
e cuius medio quidam aurei flosculi emicant eos admodum emulantes, qui rosas innascuntur: in quorum umbilico flo-  
cus quidam purpureus uisitur, sericinum referens opus. Exteriori uerò parte in ipsius caulis cacumine circa flos  
basim uillosus alter circumquaq; se pandit floccus, colore cinereo, sericino stamini mollitia, ac leuore minime cetis.  
Semen capilloso, incanoq; capitulo, iuglâdis fere magnitudine, continetur. Radix illi subest pedali longitudine, exas-  
pata chameleonis modo: cui sapor quidem subdulcis, non autè acris, ueluti folijs, & caulibus. Sunt qui hanc mris la-  
dibus offerant contra pestilentiam, & ad hausta uenena, itemq; contra omnium uenenosorum tum morsus, tum lani-  
ationes: quamobrem in antidotis additur. Ceterum legitimam utriusq; generis Anemonem legimus nos in Anemone  
quæ, ut arbitror, Dioscoridis descriptioni nihil prorsus reclamant. Eas item postea uidi Venetijs, in hortis clari-  
medici Mappei à Mapheo. Scribit Ruellius Anemonem in Gallia copiosam nasci, eamq; esse plantam, quam herba  
Herbam uenti uocant. Verùm si herba uenti belxine fuerit, uel solidago minor, ut Simon Ianuensis interpretatur, de-  
rassè Ruellius manifestè deprehenditur: sin aliter, quid dicam nescio, cum me omnino lateat, quid Ruellius per her-  
uenti intelligere uoluerit. Meminit Anemones Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, ubi ita scribit.  
Anemone omnes acrem, extergendi, attrahendi, & ora uasorum referandi facultatem obtinent. Itaq; radix com-  
sa pini

sepius emucuat: & succus ex naribus purgat, & oculorum cicatrices extenuat. Insuper sordida ulcerum anemones expurgant, & lepras detrahunt, mensesq; appositæ eliciunt, & lac trahunt.

## Αργεμόνη. ARGEMONE. CAP. CLXXIII.

ARGEMONE in totum sylvestri papaueri similis est. Folia habet anemones, diuisa: florem puniceum: caput in cauliculo papaueris rhœadis, oblongius, & summis partibus latum: radicem rotundam: succum croci colore, acrem dimittit. Argema, & nubeculas expurgat. Folia illitu inflammationes compescunt.

13 EXTANT nonnulli Dioscoridis codices, in quibus duo Argemones genera diuersis capitibus leguntur, nonnulli vero hoc tantum habent, quod nos legitimum esse credimus, non dissentientes à compluribus doctissimis uiris, qui alterum hoc illegitimè accessisse censent: præsertim cum Galenus, & Paulus illius nusquam meminerint. Verum tamen, ut scissetur omnibus sit, alterius quoque Argemones historiam hic adijciendam duximus, quæ sic habet. Argemone diuersa sylvis sylvestri papaueri similis est. Vis ei inest, si recens trita imponatur, intercisiones sanare, & oculorum inflammationes mitigare. Pota cum aqua dysentericis auxiliatur, uulnera conglutinat, & inflammationibus utilis est. Conuulsis, & uellicatibus imposita medetur: contra serpentium morsus utiliter cum uino bibitur. Plinius libro XIV. cap. VIII. Argemones tria fieri genera memorat, idq; demum probari, cuius radix thus redoleat. Prouenit argemone frequentissima in Hetruria, præsertim in agro nostro Senensi: sicut & in quibusdam locis uallis Ananiz Triestini tractus, quæ nullis, quantum equidem iudico, notis Dioscoridis descriptioni refragatur. Quamobrem in mæ-  
13 tæno errore fuisse deprehenduntur ueteres nostri tum medici, tum seplasiarij, quod Eupatorium Argemones uice acceperunt, suo Agrimoniz nomine, de qua libro quarto suo loco, Deo duce, latius differemus. Argemones uires sanæ præcis perstrinxit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Et huius herbe facultas expectoratoria est, & digerens.


Argemones consideratio.

Caput Argemones adulterinum.

Veterum nostrorum error. Argemones uires ex Gal.

## Αναγallis MAS. ANAGALLIS MAS.

## Αναγallis FOEMINA. ANAGALLIS FOEMINA.



## Αναγallis. ANAGALLIS.

## CAP. CLXXIII.

Duo sunt Anagallidis genera, quæ tantum flore distant. nam quæ cæruleo flore est, foemina dicitur: mas quæ phæniceo. Frutices sunt parui, in terra iacentes: folijs in quadrangulo caule pufillis, subrotundis, ad helixinæ folia accedentibus: semine rotundo. Vtraque mitigandi vim habet, inflammationem arcet, adactos corpori aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus earum gargarizatus,

tus, capitis pituitam purgat: & naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersam narem in-  
ciatur: argema cum melle Attico emendat: retusæ oculorum aciei auxiliatur: contra viperam  
morsus, iecinoris, & renum uitia, si ex uino bibatur prodest. Tradunt eam, quæ ceruleum eductu-  
rem, prociduum sedem reprimere: quæ uerò phœniceum, illitu euocare.

Anagallidis  
consideratio.

Anagallidum  
uires ex Gal.

Albiss

Morsus dia-  
boli.


Opinio super-  
stitiosa.

ANAGALLIS tam mas, quam femina, quæ officinis uulgò Morsus gallinæ dicitur, notissima est. Ceterum  
planè, meo quidem iudicio, hallucinantur, qui Anagallidem eam esse plantam putant, quæ in Hetruria uernaculo ro-  
ne Centone uocatur, Insubribus uerò Pauarina. Nam hæc florem fert candidum, & caulem rotundum; Anaga-  
lidum uerò alteri flos est ceruleus, alteri puniceus, & quadrangulus utrisque caulis. Anagallidum uires rectè  
Galenus libro v. simplicium medicamentorum, sic inquit: Anagallis utraque tam ea, quæ ceruleum habet flore,  
quam ea, quæ purpureum, admodum extergentis sunt facultatis. Habent uerò quendam etiam calorem attractiuum, ut  
& infixos corpori aculeos extrahant. Succus earum ex naribus purgat eadem de causa. In summa autem defici-  
di uim habent citra mordicationem: quamobrem & uulnera glutinant, & putrida adiuvant. hæc Galenus. Verum  
cum Morsus gallinæ eam stirpem in mentem mihi reuocauerit, quam uulgus herbariorum Morsum diaboli appella-  
t, cumque putem me, quam plurimis fortasse rem gratam facturum, si his nostris commentariis ipsam quoque inferre, &  
locus uisus est, ubi commodè de ea aliquid dicam. Morsus igitur diaboli herba est locis incultis proueniens, salinis, &  
etiam interdum pratis, & dumetis. Folij constat plantagini, quam uulgò lanceolam uocant, similibus, leuioribus  
men, & quæ circa caules, qui ad binum cubitorum longitudinem assurgunt, exeant breuiores, angustiores, leniterque  
ambitum laciniata. Floret æstate, scabiosæ uocatæ modo. Multifidas habet radices, nigricantes, succisæ, & circos-  
rosas: unde superstitiosum nomen inuenit. Siquidem scripserunt nonnulli superstitionibus dediti, quos credulum uul-  
gus sequitur, cacodæmonia ob tæte efficacie radicem inuidere hominibus, atque hanc de causa, ubi succreuerit, statim  
undiquaque dentibus succidere, & circumrodere: tanta est hominum superstitio. Herba hæc si uiridis cruda, trita  
carbunculis pestiferis imponatur, presentaneo remedio (ut aiunt) eos sanat, aut si uinum, in quo decocta fuerit, bibi-  
tur. Radix per se estur, aut eius decocti uinum utiliter bibitur, non modò ad uteri dolores; sed etiam ad pestilentem  
auram arceant. Gustu admodum amara est: ex quo perspicuum esse potest, eam esse calidæ, & sicce facultatis. Sic-  
catæ puluerem præbent plerique ad alui tineas necandas, ac eadem sugillata illitu emendant.

HEDERA HELIX. *Epheso.*



HEDERA ARBOREA.



Kiosos. HEDERA.

CAP. CLXXV.

HEDERA differentias multas in specie sortitur, summas autem genere tres. Nam quædam cili-  
da est.



est, alba nigra, tertia helix. Candida fructum fert candidum: nigra nigrum, aut croci æmulum quam vulgus Dionysiam vocat. Helix fructum non gignit, sed tenues habet viticulas, & folia parua, angulosa, & rubra. Hedera omnis acris est, & adstringens. neruos tentat. Flos trium dierum carptu, facit ad dysentericos, in vino bis die potus: ambustis cum cerato tritus illinitur. Recentia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum, & corymborum succus, cum irino vnguento, melle, aut nitro, naribus infunditur: & contra veteres capitis dolores, sicut eo cum aceto, & rosaceo perfundi vtile est: purulentis auribus, aut dolentibus, cum oleo mēdetur. Nigræ hederæ succus, aut epoti corymbi, corpus infirmant, mentemque turbant largiùs sumpti. Acini quinque triti, calfactique in punici mali cortice cum rosaceo, si instillantur à contraria aure, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillum illiti corymbi. Folia in vino decocta sanantur omnium vicerum generi, etiam si cacoethe sint. vitia cutis in facie, & ambusta sanant, vti antea diximus, decocta. Mouent mēses triti, & subditi corymbi: ijdem poti, post purgationes fœminarum, drachmæ pondere, concipiendi spem adimunt. Pediculus foliorum melle irrigatus, ac vuluæ inditus, mēstrua, & partus extrahit. Instillatus succus putrida tædia narium, graueolentiamque emendat, & sanitati restituit. Lacryma hederæ psilothrum est: illitu pediculos enecat. Succus radicum in aceto potus, contra phalangia prodest.

HEDERA, cuius hic tria tantum summa genera fecit Dioscorides, etsi plures eius in specie differentias esse testatur, planta est vulgaris notitie. Verum si quis Hederæ plura genera nosse desiderat, non fortasse Plinio contentus, licet de ipsis abunde differuerit lib. xvi. cap. xxxiii. legat Theophrastum libro iii. cap. xviii. de plantarum historia, ubi hederæ sigillatim species diligentissime persequitur, & de ijs copiosissime pertractat: uel potius ipsum auctorem, nam hæc, quæ sequuntur, ipsi ad uerbum accepta referimus, qui loco citato sic habet. Hedera quoque multigena est: quedam enim humi repens, quedam se in excelsum attollens: & excelsarum genera plura, sed tria summa prænotant, candida, nigra, tertiaque; helix, id est clauicula. Horum item species plures: quippe alia fructu tantum candida, alia etiam folijs: rursus fructum tantum candidum ferentium, alia maiusculum, densum, & uelut in globum circumactum fructum profert, quam corymbiam quidam uocant, Athenienses acharnicam rigam eam appellant: alia minorem, feraciorēque, modo nigræ. Habet nigra differentias, sed non hunc in modum conspicuas. Sed helix differentijs maximis discernitur: etenim folijs plurimum distat, cum paruitate, tum quod angulata, concinnioraque; sint: cion hedera rotundiora, simplicioraque; habeat. Distant etiam internodiorum longitudine, atque etiam sterilitate, quoniam fructum quædam non ferant: quod non in hederam transfigurentur, ut quidam uolunt: at uerò si omnes hederescant, ut alijs placet, etatis certè, dispositionisque, non generis erit discrimen, quemadmodum pyri ad pyræstrum. Tamen eius quoque folia multum ab hederæ distat, uerum id rarum, & in paucis euenit, ut uetustate permutetur, cœu in populo alba, & crœuæ. Ergo helicis plura genera, sed quæ conspectiora, summaque; occurrant, tria sunt. Herbacea, quæ plurima est: secunda candida: tertia uersicolor, quam Thraciam quidam appellant. Et harum quæque; distare uidetur, quippe herbaceæ quedam folio tenuiori, oblongiori, atque etiam densiori: quedam minus hæc omnia habens. Et in uersicoloris genere, alia folio ampliori, alia minori, macularumque; habitu diuersa: pari modo & magnitudine, coloreque; distant. Auctu persicilis herbacea, inque; plurimum uenit. Manifestam esse quæ hederescat, affirmant, non tantum folijs, quæ maiora, latioraque; habet, uerum etiam germinibus: protinus enim erecta gerit, non inflexa gracilitate, & longitudine. Herbacea uerò crassiora, breuioraque;. Ac hederæ, ut semen proferre incipit, germen sublime, rectumque; edit. Est quidem uniuersa hedera radice numerosa, densa, flexuosa, surculosa, crassa, nec nimis alta, sed præcipue nigra, & inter candida, quæ asperiora, imminutissimaque; habetur. quæ nobrem eius amplexus arbores omnes infestat, omnes enim necat, & enecat, ablato alimento. Crassatur hæc maiorem in modum, atque arborefcit intantum, ut per se ipsa hedera arbor fiat. Attamen ex maiore parte semper super aliud uitam degere solet, atque (ut ita dixerim) amplexu aulis est, ita pro sua natura, uel quiddam eiusmodi illico gerit. Nam è germinibus radículas assidue inter folia mittit, quibus arboribus, uerisque; obrepit, quasi de industria à natura exhibitis: atque ita humorem auferens, exhauriensque; arefacit. Et si inferius facilius subito minus uiuere, durareque; potest. Habet uel aliud discrimen non mediocre in fructu: nam alius dulcis, alius uehementer amarus, tam in candida, quam in nigra. Indicium, quod alium aues mandunt, alium minime attrahunt. Hedera ita se habet. Hactenus Theophrastus de hederæ generibus. Hedera (ut auctor est Galenus libro vii. de medicamentorum) ex contrarijs composita est facultatibus: habet enim quiddam adstringentis substantiam, & quæ terrenam, & frigidam esse ostendimus: habetque; etiam nonnihil acris, quam calidam esse uel gustus comprobabit. Nec deest tertia: aquæ am namque; substantiam quandam tepidam obtinet, certè si uiridis sit. Siquidem dum arefcit, hæc prima exhalet necesse est, manetque; quæ terrea est, & frigida, adstringens, & ea quæ calida, & acris.

Hederæ consideratio, & genera.

Hederæ facultates ex Gal.

Non ab re quidem suffragandum est (ut doctissime adnotauit Marcellus) huic loco in Dioscoride mendum subesse, & quod non è prædicto, hoc est, rubra, ut habent uulgati codices, legendum sit, sed è ὑδρὸς τερα, id est, concinniora. Non præter alias rationes, huic lectioni adspulatur Theophrastus, qui lib. iii. cap. xviii. de plantarum historia nomine hederæ helicis folia depingit, & ait, rubra non habet.

Χελιδόνιον μέγα. CHELIDONIVM MAIVS. *Signo albo* CAP. CLXXVI. *Signo*



Chelidoni  
maioris confi  
deratio.

Vanitas chy  
mistarum.

CHELIDONIVM MINVS.



Aquilina.  
Aquiliniam

Chelidoni  
maior. uires.

CHELIDONIVM maius, caule est gracili, cubi-  
tali, aut altiore, agnatis foliosis: folijs ranunculi, mol-  
lioribus tamen, & colore caesijs: flore violæ albæ, se-  
cundum singula folia prodeunte. In eo succus croci,  
mordax; acris; & aliquantulum subamarus, grauius  
olens. Radix supernè singularis, infernè in multa cro-  
cea capillamenta fibratur. Siliqua, cœu corniculati pa-  
paueris, tenuis, in metæ figuram longa: in qua semina  
papaueris manus recluditur. Succus in æreo vase, cum  
melle prunis decoctus, oculis claritatem adfert. Folijs  
caule; radice, succus exprimitur ineunte æstate, & sic  
catus in umbra digeritur in pastillos. Radix cum ani-  
so, & vino albo pota, medetur regio morbo, & viceri-  
bus quæ serpunt: imposita cum vino, aut manduca-  
dentium dolorem sedat. Hoc nomen sibi videtur ven-  
dicasse, quod aduentu hirundinum exoritur, & di-  
fessu emarescat. Sunt qui narant, hirundines mares  
ex æcatis pullis, admota herba, visum restituere.

CHELIDONIVM, quod maius cognominatur, vulgo  
in Hetruria Celidonia dicitur. At imperiti, præsertim chymis-  
te, quæ multorum stultitia est, quod Greci nominis uim igno-  
rent, non Chelidonium, quod Latine nil aliud, quam brundia-  
riam significat, sed Celi domum appellat. Quæ postea falsa no-  
minis præstantia freti, ex hac herba, quandam quintan effra-  
tiam fieri prædicant, non modo suis uanis alchymicis imaginari-  
bus accommodatissimam; sed ad tuendam etiam hominum san-  
tatem, morbosq; quæ plurimos profligandos utilem. Prouenit  
Chelidonium ubiq; in Italia propter sepes, in scrobium ripis, se-  
cus uis, inter rudera, & in edificiorum ruinis, seu perietinis.  
Sunt, qui Chelidoniū maius uocent herbam, quæ aliqui *AQUIL-  
INAM*, alij Aquilegiam nominant: folijs ferè chelidonijs me-  
ioris, paulò tamen rotundioribus, ac mollioribus: caule cubiti  
recto, tenuiq; in cuius cacumine flos emicat purpureus, & quo  
quatuor exeunt cornicula, reflexa, ac intus undiq; concava: se-  
mine atro, in capitulis recluso, melanthij modo. Sed quibus hæc  
uiribus prædita sit, hætenus neq; mea, neq; aliorum experientia  
comperit habeo. Chelidonijs maioris meminit Galeus libro  
VIII. simplicium medicamentorum, ubi hæc scribit. Chelidonijs  
maius extergentis admodum, & calide facultatis est. Sed & suc-  
cus eius ad acutendum visum commodus est, utiq; in quibus crassum  
quiddam in pupilla colligitur, digestionem, atq; discutionem indiget.  
Vbi sunt, quidam radice eius ad morbum regium & iecoris obstru-  
ctionem proficiscentem, in uino albo eam potui exhibentes cura-  
niso. Pari modo mansa dentium doloribus confert.

Χελιδόνιον μικρόν. CHELIDONIVM MINVS. *Signo* CAP. CLXXVII. *Signo*

CHELIDONIVM minus, quod triticum sylue-  
stre aliqui nuncuparunt, herbula pediculis ab radice  
pendens, sine caule: folijs hederæ, multò rotundiori-  
bus, & minoribus, teneris, & suppinguibus. radices ha-  
bet ex eodem callo complures, pusillas, in granorum  
tritici modum acuatim congestas: quarum tres, aut  
quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas, & lacus  
nascitur. Vis ei acris, & anemones modo summam cutem  
exulcerat. psoras, & scabros vngues eximit. Succus ra-  
dicibus expressus ad purgandum caput, naribus in-  
funditur.

funditur. Decoctum eius cum melle gargarizatum, magnificè id præstat: & omnia pectoris vi-  
tia extrahit.

PLANTA, quam omnes ferè rei herbarie periti Chelidonium minus appellant, omnibus Italie locis, uerno  
detrahet tempore, frequens gignitur, uliginoso præsertim solo, & in serobium, fissarumq; marginibus: folijs hede-  
re minoribus, rotundioribus, ac suppinguibus, sine caule: flore luteo, etsi eius non meminerit Dioscorides, tenui pe-  
diculo appenso. Radicibus nititur compluribus, ex eodem callo prodeuntibus, pusillis, in granorum tritici modum  
æctum congestis, quarum nonnullæ tantum in longitudinem progrediuntur. Herba hæc breui deperditur: quippe  
que uere & nascatur, & arescat. Sunt qui hanc Scrophulariam minorem appellent, à radicum similitudine, ut que  
11 uilis gr. morum tritici granulis, ueluti strumis, quæ Græca imitatione scrophulæ uocantur, coaluisse uideantur.  
quæquam alij ex hoc potius sic dictam putant, quod strumis, siue scrophulis (ut quidam asserunt) inposita medeatur.  
Nos ita eam in Hetruria uulgo uocari Fauoscello putauerim, quod fabarum modo folia suppinguia proferat. Nec ea  
alibi sibi Chelidoni nomen uedicasse existimatur, autore Theophrasto libro VII. cap. XIII. de plant. histria, quàm  
quod horundinum aduentu florem excitet, quemadmodum & chelidonium maius. Verùm an hæc sit Chelidonium mi-  
nus, cuius meminere Dioscorides, & Galenus, non parua uidetur esse dubitatio: quod nullam prorsus nec folijs, nec  
radicibus præ se ferat acrimoniā, cū tamen acerrima, & mordax esse deberet, longeq; magis, quàm chelidonium  
maius: quandoquidem, Galeno teste, Chelidonium minus cutem exulcerat, & excalfacit ordine quarto. Id quod sa-  
tis manifestè ostendere posset, hanc non esse Chelidonium minus: nisi quis in hoc illud dixerit, quod de Aro scriptum  
reliquat Galenus lib. II. de alimentorum facultatibus. Nam facile contingere potest, quod quemadmodum arum Cy-  
20 renis minimum medicamentosi, minimumq; acrimoniæ possidet, adeo ut in cibus uel rapis utilius habeatur; in Italia  
aræ, ac minori Asia contra adeo acre, ut medicamentis duntaxat expetatur: ita et Chelidonium minus, quod in Italia  
nascitur, minimum acrimoniæ sortiatur; quod uero in Græcia prouenit, acre admodum sentiat. Siquidem excepta  
acrimonia tantum, nostri nihil præterea deesse uidetur, quin legitimum Chelidonium minus dici queat. Ex quo fa-  
cile adductus sum, ut credam, quod quanuis in Italico desideretur acrimonia; non tamen id esse Chelidonium minus  
difficilium est: tametsi inficias ire non liceat, nostrum Chelidonium minus, quod omnino acrimoniæ sit expers, ijs mor-  
bis hanc quaquam conuenire posse, quibus illud conferre, quod in Græcia gignitur, tradiderunt Dioscorides, & Gale-  
nus. Nam hac deficiente qualitate, necesse quidem est, ut & uires, quæ illam consequuntur, deficient, & pereant.  
Minoris chelidoni uires memoriæ prodidit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Che-  
lidonium minus, cū acius sit maiore, celeriter illitum cutem exulcerat, unguisq; scabros eijcit. Succus eius per na-  
30 ris purgat, utpote admodum acer. Itaq; hæc herba quarti ordinis fuerit absoluti iam, idq; tum in calfaciendo, tum  
in siccando, CHLIDONII MINUS

Chelidoni  
minoris con-  
sideratio.

Chelidoni  
minoris uires  
ex Galeno.

## ΟΘΩΝΑ. OTHONNA.

## CAP. CLXXVIII.

OTHONNAM aliqui maioris chelidoniæ succum esse aiunt: quidam glaucij: alij succum flo-  
ribus corniculati papaueris expressum. Alij permistos cæruleæ anagallidis, hyoscyami, & papau-  
ris succos esse contendunt. Alij Troglodyticæ cuiusdam herbæ succum, quæ othonna uocatur;  
nascique eam in eo Arabiæ tractu, qui ad Aegyptum spectat. Othonna folijs erucæ, perforatis  
cribri modo, & veluti à tinea derosis, squalore obsitis, paucis: flore croci, latifolio: quare quidam  
40 anemones speciem esse putauerunt. Extractus succus oculorum medicamentis adijcitur, ubi ex-  
purgare est opus: mordet enim, & absterget omnem caliginem, quæ oculis offunditur. Tradunt  
humorem quendam ex herba emanare, qui elotus, semotis calculis, in pastillos ad eadem digerit-  
tur. Aliqui tamen affirmant, lapidem esse Aegyptium, in Thebaide nascentem, exigua magnitu-  
dine, æreo colore, gustu cum feruore quodam, & adstrictione, mordaci.

OTHONNAM Dioscoridi fuisse incognitam, illud nobis manifesto argumento esse potest, quod nihil ex se  
de eæ certiscribat, sed omnia alijs accepta referat, ex quorum tantum opinione fama; hæc de Othonna memoriæ pro-  
cedit. Quare mirari non licet, si nostra quoq; ætate Othonna minimè cognosatur. Hanc cum admisceat Paulus suis  
medicamentis, asserit quibusdam in locis maioris chelidoni succum esse, eorum fortasse opinionem secutus, qui ita scri-  
50 bant, ut refert Dioscorides.

Othonnam  
consideratio.

Auriculæ mu-  
ris confid.Auricula mu-  
ris facultates  
ex Gal.

MVRIS auricula, quam myosotida vocant, herba est caulibus pluribus ab vna radice, aliquatenus ab imo rubentibus, & concavis: folijs angustis, oblongis, dorso acuto, elato, nigricantibus, per interualla assidue geminatis, atque in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus: flosculo, et anagallidis, cæruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. Radix illita ægilopia sanat. Sunt qui alfinem, muris auriculam vocitant.

REPERIUNTUR quidam Dioscoridis codices, qui hoc loco Alfinem habent, quæ libro quarto post helxinem describitur, quod et ipsa nonnullis Muris auricula appelletur. Quæ forsitan nominis cognatione adducti, posteriorum quidam, ex quarto Dioscoridis volumine in hunc locum ipsam transtulere, ubi sui generis, uel potius nominis alteram representauit Dioscorides. Sed quoniam ipsa Dioscoridis scribendi series clarissime demonstrat, Alfinem statim post helxinem sequi debere, quod ei adeo similis sit, ut tradat Dioscorides eandem fuisse cum helxine, nisi humilior esset; idcirco libro quarto de ea nobis dicendum erit, quod inibi eius legitiman sedem esse existimemus. Ceterum hæc, de qua hic mentio est, passim mense maio floribus ornata uisitur, nimirum in pratis, in campis, in hortis, secus uias, et ubique ferè locorum. Huiusce uires paucis perstrinxit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Auricula muris desiccata ordine secundo: ceterum nullam euidentem caliditatem possidet.

ISATIS SATIVA. Ἰσάτις



ISATIS SYLVESTRIS



Isatis. GLASTVM. *Uind Isatis*

CAP. CLXXX.

SATIVVM Glastum, quo infectores lanarum vtuntur, folium habet plantagini simile, verum pinguius, nigriusque: cuius caulis duum cubitorum altitudinem excedit. Illita folia tumores omnes discutunt, cruenta vulnera glutinant, sanguinis profluvia sistunt: ignem sacrum, phagedenas, putrescentia vlcera, & quæ serpunt, sanant. Sylvestre glastum satiuo simile est. Folia tert maiora, lactucaceis proxima: caules tenuiores, multifidos, quadamtenus rubentes: in quorum cacumine folliculi multi dependent, quandam linguarum effigiem referentes, in quibus semen: flore tenui, luteo. Eadem, quæ & supra dicta, præstat: potu, & illitu lienosis auxiliatur.

ISATIS satia, quam in Hetruria vulgò Guado appellamus, tingendis lanis fullonibus, & infectoribus maxime expetitur, quod lanarum infectus, quibus cum admiscetur, firmet, & nunquam deperdi patiatur. Huiusce maxime habetur proventus in Vmbria circa Noceram, ubi oppidum est Guadum ideo appellatum, quod ibi Isatis frequenter feratur. Glastum sylvestre Plinio inter sylvestres lactucas recensetur libro xx. capite VII. quippe quod illi non sit absimile. Fit ex Isatide cæruleus ille color pictoribus expetitus, quem Indicum uocant, de quo diffusius libro quinto suo loco differemus. Meminit utriusque Isatidis Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Isatis satia, qua utuntur tinctores, facultatis est ualenter exiccantis, nondum tamen mordentis: est enim simul amara, atque adstringens. At Isatis sylvestris manifestè iam acre quiddam tum gustu, tum actione præfert: Proinde quam satia ualentius desiccans, ualentius etiam humidis putredinibus obfistit.

Isatidis, seu Glasti hist.

r. fol. 602

Isatidum uires ex Gal.

ΤΗΛΕΦΙΟΥ. TELEPHIVM.

CAP. CLXXXI.

TELEPHIVM herba portulacæ similis, & caule, & folijs: alas binas in singulis foliorum geniculis annectit: ramuli à radice seni, septenive prodeunt, folijs referti cæruleis, crassis, lètis, carnosis: flore luteo, aut candido. Nascitur in cultis, & maximè inter vites tempore verno. Folia senis horis illita albam vitiliginem sanant: sed postea hordeacea farina illini debet. perunctam ex aceto etiam in sole vitiliginem tollunt: sed vbi inaruerunt, absterguntur.

QUANQVAM non desunt rei herbariæ periti, qui existiment, Telephium eam esse stirpem, quam quidam Fabariam, alij Faban pinguem, quidam uerò Fabam inuersam appellant; cum tamen nulla reperiatur qualitate prædita, qua absterforiæ, siccantisq; facultatis particeps dici possit, ut Galenus Telephium esse testatur, foliaq; prostrat portulacæ longè maiora, eorum sanè sententiæ planè adstipulari non ausim: tamen ea compluribus notis Telephium referre uideatur. Telephij uires memoriæ prodidit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, ubi ita scribit. Telephium exiccandi, & detergendi facultas: non te est, non tamen insigniter calida: uerum in hoc forsàn quispiam ipsum primi esse ordinis censeat. Desiccatur tamen secundo ordine intenso, aut certè principio tertij: proinde ad putrida ulcera conuenit, & leucas, & alphos cum aceto sanat.

Telephij consideratio.

Fabaria. fol. 492

Telephij uires ex Gal.

LIBRI SECUNDI FINIS.



# PETRI ANDREAE MATTHIOLI MEDICI Senensis Commentarii,

IN LIB. TERTIVM PEDACII DIOSCORIDIS  
ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA.




**SUPERIORIBVS**, charissime Aree, commentarijs, tradidimus de aromatibus, vnguentis, oleis, arboribus, earum fructibus, & lacrymis: item de animalibus, cerealibus, oleraceis, & herbis acrimonia præditis. In hoc autem tertio radices, succos, semina, herbas, & quæ vernacula, & inter se cognata censentur, quæq; pluribus scatent remedijs, prosequemur.

Ἀγρίκον. AGARICVM.

CAP. I.

*Gammus Sennar*



**AGARICVM** radix fertur lae serpentij similis, sed facie summâ solutior; & rariore, fungosoque tota contextu. Duo eius genera: scemina, quæ præfertur, rectis intus venarum discursibus constat: mas rotundus est, & undique compactior. Vtrique gustus in initio dulcis, mox ex distributione in amaritudinem transit. Gignitur in Sarmatiæ regione, quæ Agaria dicitur. Sunt qui radicem esse plantæ affirmant: alij vt fungos nasci in arborum caudicibus; quadam putredine. Gignitur in Galatia Asiæ, & Cilicia in cedris, sed friabile, & infirmum. Adstringendi, calfaciendique naturam habet. efficax est contra tormina, cruditates, & rupta: prodest itidem contusis, & ab alto deuolutis. Datur duobus obolis in vino mulso febrim non sentientibus: febriculosis vero in aqua mulsa: arq; uis quoque, suspensorios, iocineris, renumque vitio laborantibus, dysentericis. Item si urina ægrè reddatur, si vuluæ strangulatus virgeat, si pallor membra decoloret, drachma una dari solet: si tabes infestat, ex passo: si lien negotium exhibet, ex aceto mulso: si dissolutio stomachi est, ita vt cibi tenax non sit, manditur, & sine ulla humoris fortibitione deuoratur: simili modo acida ructantibus propinatur. sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis in aqua sumptum. Facit ad coxendicum, & articularum dolores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur: menses ciet: sceminis, quas inflatio vuluæ uexat, utiliter æquali modo datur: horrores soluit, datum ante febrium accessiones: aluum purgat, drachma una, aut altera, si cum aqua mulsa bibatur.

tur: venenorum antidotum est denarij instar, cum diluta portione sumptum: si serpentes icum vibrarunt, morsumque subfixerunt, tribus obolis ex vino potum, miræ auxiliatur. In summa, internis omnibus uitijs conuenit, pro uiribus, & ætate datum, nunc ex aqua, nunc ex vino: ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

Agarici consideratio.

**AGARICVM** fungus est in arboribus nascens. Plura de eo diximus libro primo in laricis arboris historia. Præstantissimum habetur in Tridentinis montibus, ubi sæpius proprijs manibus illud diuulsimus, adacta securula. Ceterum tametsi Plinius libro xvi. cap. viii. omnes glandiferas arbores Agaricum ferre tradat: in Tridentinis tamen syluis, ac etiam in reliquis Italia locis, quod equidem uiderim, soli tantum larici innascitur. In cetero Agaricum gigni, tum in Asiæ Galatia, tum in Cilicia scribit Dioscorides, nulla eius mentione facta, quod in larice ipsi

ipsa, ac glandiferis ( ut Plinius inquit ) arboribus proxenit. Agarici meminit Galenus sub quodam radicis genere in vi. de simplicium medicamentorum facultate, ubi sic inquit. Agarici radix, hoc est, quæ trunco innascitur, primum quidem gustu dulcis, sed paulò post sub amara apparet: et acrimoniae quandam speciem temporis spatio inducit, iocundèq; adstrictionis. est et consistentia laxa. Ex quibus omnibus manifestum est, si quidem quæ superioribus commentariis dicta sunt, meminere, quòd medicamentum hoc compositum est ex substantia aërea, et terrea à caliditate extenuata: porro minimum habet substantiæ aqueæ. Hac ratione et digerendi, et calfaciendi vim habet, et crassitudinem incidendi, tum insarctus viscerum expurgandi. Proinde regio morbo laborantes sanat, eos utiq; qui sic ab insarctu iccoris laborant. Iuuat et morbo comitiali obnoxios eadem facultate, tum rigores per circuitum recurrentes ex crassis, aut viscosis humoribus natos sanat. Iuuat et morfos à bestiis frigore ledentibus, aut compunctos, tum foris in affecta parte impositum, tum intro in corpus sumptum pondere drachmæ unius cum uino diluto. Est et purgatorium. hæc Galenus. De uiribus Agarici Mesues quoq; scripsit, sic inquit. Agaricum deijcit utraq; bilem, ac crassam puritatem ipsam: crassos, lentos, putrescentesq; humores expellit. Eius propria facultas est cerebrum, omniumq; sensuum organa, ac musculos expurgare: excrementa, quæ spinali medulla pariter et nervis inhererint, educere: pulmonem, ac pectus à lentis, ac putrescentibus humoribus detergere: ac deinde uentriculum, iecur, lienem, renes, et in mulieribus uterum mundare. Præter hæc soluit Agaricum compaginem omnium contumacem materiam. Quapropter non mirum uidetur, uocasse Democritum agaricum familiarem medicinam, cum ad omnes corporis partes conformitatem habeat. Nam non imbecilles possidet vires ad plerumq; tum capitis, tum cerebri, tum eiusdem membranarum morbos: nempe diuturnum dolorem, comitalem morbum, apoplexiam, uertigines, maniam, atram bilem, et cerebri inflammationes. Est etiam morborum omnium, quorum causa fuit obstructio, medicina admodum singularis. quo fit, ut regio morbo affectis, aqua inter cute laborantibus, ac liene uexatis leuamentum præstet. Vrinam quoq; pellit, ac mensis commodè ciet. Coloris nitorem Agarici usus toti corpori commendat. Ventris tineas tum necat, tum deijcit. Coarctationum doloribus conuenit, et diuturnas febres discutit.

Agarici vires ex Galeno.

Ex Mesue.

## ΡΗΑΠΟΝΤΙΚΟΝ. CAP. II.

RHA, aliqui rheum, Latini rhaponticum vocant, prouenit in ijs, quæ supra Bosphorum sunt, regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, cetaurio magno similis, sed minor, & rufior, fungosa, aliquantum læuis, sine odore. Optimum habetur, quod teredines non sensit, si gustatu cum remissa adstrictione lentescat, manducatumque colorem reddat pallidum, aut ad crocum inclinatem. Id eorum facit ad inflationes, stomachi imbecillitatem, & omne genus dolores, ad conuulsam, ruptam, lienosos, hepaticos, tormina, & renum, vesicæ, & pectoris vitia, aduersus intenta præcordia, & vuluæ mala, coxendicum dolores, sanguinis excreationes, suspiria, singultus, dyfenterias, & cæliacorum affectus, contra febrium circuitus, & venenatorum morsus. Datur in singulis valetudinibus eodem, quo agaricum pondere, & cum eisdem liquoribus: si febris careant in mulso: si aliter ex aqua mulsa: si tabem experiuntur, ex passo: si lienis exercet, in aceto mulso: si dissolutio est stomachi, id est, cum cibi tenax non est, manditur, & sine sorbitione vlla deuoratur. Liuentia, lichenasq; tollit, cum aceto illitum. Inflammationes omnes veteres ex aqua oblitum dissipat. Summa eius vis adstringens, cum aliquanto calore.

RHAPONTICVM officinæ Rheuponticum uocant. Quod nomen sibi asciuisse uidetur à Rha fluuio regione nam quandam Ponto conterminam præterluente, in cuius fluminis ripis numerosam nascitur. Cuius rei testis est Ammianus Marcellinus lib. xlii. suarum historiarum, ubi sic scribit. Tanais, quæ inter Caucasias oriens rupes per sinuosos labitur circumflexus; Asiæq; ab Europa determinans, in stagnis Mæoticis delitescit. Huic Rha vicinus est amnis, in cuius supercilijs uergetabilis quædam eiusdem nominis gignitur radix, ad multiplices medelarum usus proficiens. hæc Ammianus. Legitimum paucis abhinc annis ad nos aduehi cœpit. Nam multo antea tempore Rhapontici uice maioris centaury radice in medicinæ usum irrepserat. Quæ etiam nostra ætate non desunt, qui Rhapontici loco utantur, recensentur inueta respuentes, cum hætenus legitimum Rhaponticum neq; nouerint, neq; uiderint: tanta est quorundam peruerbia. Credidere ad hæc peritissimorum medicorum quidam, præterito nuper æuo, Rhabarbarum à Rhapontico Dioscoridis nullo discrimine differre: Quippe quoniam eorum temporis curriculo legitimum Rhaponticum Italia non uenerat. Quod cum paucos post annos ad nos esset allatum, non desuere qui priorum reuocauerint sententiam. Id quod maxime palam facit Manardus Ferrariensis in suis epistolis. Quandoquidem in libro vi. epistola xi. firma hac, et simili ducebatur opinione, uulgare nostri usus Rhabarbarum, et Dioscoridis Rhaponticum et idem esse, et nihil se cognatione differre. Verum tamen cum postea legitimum cõspexisset Rhaponticum è Moschouia allatum, quod Dioscoridis historiam notis omnibus referret, nouam statim induit opinionem, et priorem, quam habuit, reuocauit, ultimum quanti libri epistola ad Leonicenum scribens. Rhaponticum primum uidi ego Venetijs in officina ad medici insignem è Constantinopoli allatum, ac deinde alijs pluribus in locis etiam ex Alexandria conuectum. quod nullis reclamationibus notis, uerum antiquorum Rhaponticum refert. Inuehitur Auerroes lib. v. suarum collectanearum tum in Galenum, tum in reliquos, qui dixerunt Rhabarbarum facultate tantum adstringenti pollere, quod purgatoria, quæ inuesti, facultatem minime compererint: cum tanquam Auerroes ipse sit maximopere carpendus, cum neq; Galenus, neque ceteri seniores Rhabarbari nostri usus usquam meminerint, nec quicquam de eo posteritatis memoriæ prodiderint, tametsi de Rhapontico à Dioscoride descripto plura tradiderint; inter cuius facultates nulla penitus, quæ purgand

Rhapontici consideratio.

Quorundam error.

Vana Auerrois calumnia contra Gal.

Rhabarbarum

Rhapontici,  
& rhabarbari  
discrimen.

Ruellij, & ali-  
quorum er-  
ror.

Rhapontici ui-  
res ex Gal.

gando sit, inueniri potest. Rhapontici meminere, sub Rhabarbari tamen titulo, nisi interpretis (ut fere sufficit) lapsus, cum Serapio, tum etiam Auicenna. quandoquidem non plures suo Rhabarbaro assignauere facultates, quæ qui eos præcesserunt, Rhapontico assignauerint. Quippe quod eorum neuter scripserit, suum Rhabarbarum de-  
teriori facultate pollere. Id quod uerum indicium præbet, scripsisse hos de Rhapontico, non autem de Rhabarbaro. Quo fit, ut non ab re putandum sit, id euenisse interpretum ignorantia Rhaponticum in Rhabarbarum permutatum. Cognouit tamen legitimum (si fallor) ætatis nostræ Rhabarbarum Paulus Aegineta, cum ipsius meminerit lib. v. 11. cap. x. i. in quibusdam medicamentis aduersus podagras, quorum cognomina sunt diacorallion, compositio Agapæ, & compositio atactos. Verum non propterea credidit ipse, Rhaponticum à Rhabarbaro differre. Cuius rei autoris fidem manifestam facit libro primo cap. x. l. i. i. ubi scribit, quod deuorata terebinthina resina oliuæ quantitate dormi-  
turis aluum leniter mollit, & quod id præstatur efficacius, si Rheipontici momentum admisceatur. Ex quibus patet fit, per Rhaponticum Paulo Rhabarbarum designari, quod fortasse inter hæc existimauerit nullam intercedere cog-  
nitionis differentiam. quemadmodum credere recentiorum quidam, de quibus paulo ante diximus. Paulo enim si Rhei-  
pontici, et Rheibarbari aliqua intercessisset differentia, ubi peculiariter de simplicibus medicamentis agit, de utroque que facultate speciatim scripsisset. Sed cum ibi tantum Pontici meminerit, indicium haud dubium est, illi Barbari, & Pontici nullam fuisse differentiam. Ceterum Ruellius eos acriter reprehendit, qui inter Rhaponticum, & Rha-  
barbarum nostrum discrimen faciunt, cum sua ferat opinio, alterum ab altero minime disidere: atque si qua differ-  
entia reperitur, eam non aliunde prouenire, quam regionum, ubi gignitur, diuersitate, clementia, uel inclementia celi. Neque alia ratione asserit, Ponticum nullo odore commendari, quam aquilonarium regionum, in quibus oritur, ma-  
nu frigidityte: cum tamen Pontica regio non usque adeo sit frigida, ut Ruellij sententia admitti debeat, sed ut potius tanquam inanis reprobanda uideatur. Quandoquidem sequeretur, quod cetera stirpium genera, quæ tam in oriente, quam in meridie odoris fragrantia commendantur, in aquilonari plaga: & in ipsa Ponti regione penitus inodora re-  
perirentur. Quod tamen falsum esse semper crediderim: nam quauis stirpes omnes, quæ in aquilonaribus regionibus oriuntur (de his, quæ natura odoratiores habentur, intelligo) ex climatum, & aeris algore, sint odore, ac cete-  
ris qualitatibus imbecilliores; non ob id tamen harum qualitatū adeo expertes deprehenduntur, ut discerni nequeant: quin & in quemlibet usum, ubi scilicet conferant, non recipiantur suis in regionibus. Quippe si ob frigoris, ac regio-  
num inclementiam suas innatas qualitates penitus exuerent, adeo ut sola tantum forma remaneret, propriam omnino peruerterent speciem. Quod tamen nulla ratione, nec auctoritate probatur. Siquidem compertum iam pridem apud nos est, quod quanquam Celtica nardus, quæ à quibusdam Carinthiæ, & Stirie alpinis nobis offertur, à quibus peni-  
quatuor, uel quinque totius anni mensibus, nix colligata labitur; itemque acori radix, quæ nostro ævo ex Sarmatis Europæ glaciæ, & niuibz maiore anni parte semper obducta; aduehitur in calami odorati usum, odore tam uulgo, naresque feriente fragrare non deprehenduntur, quemadmodum Celtica illa nardus, quæ ex Liguria, & Lætia defer-  
tur, & acorum, quod ex Ponto, Syria, & Aegypto petitur; non tamen ob hoc euenit unquam, quam suis propriis ac naturalibus fragrent odoribus. Quo fit, ut infirma admodum, quantum equidem conicio, sit Ruellij sententia. Quæ re hinc nobis concludere liceat, Rhaponticum odoris expertum non esse, aeris, soli, & regionis algore, sed quod dicitur Rhabarbarico, uel Indico sit planta. Declarant præter hæc, Rhabarbarum à Rhapontico plurimum distare par-  
gatoria uis, quam natura ipsa Rhabarbaro largita est, odor nares feriens, compacta simul substantia, aureus color, ariditas, amaritudo, quæ gustu percipitur, & ponderis grauitas. Quandoquidem Rhaponticum nullo odore comen-  
datur, minime deiectionem molitur, cum potius adstringat; non est anarum, sed subacre; non aridum, sed lentum; nec compactum, sed rarum; non pondeosum, sed admodum leue. Quibus rationibus fretus non temere asserendum pæ-  
uerim, Ruellium hac in re magnopere hallucinatum fuisse, præsertimque cum dicat, nullo alio discrimine Rhabarbarum à Rhapontico differre, quam odore tantum. Vanum quippe uidetur argumentari, Rhabarbarum, & Rhaponticum unam & eandem esse radicem, quod forma, colore, ac specie nihil inter se distat oculorum sensibus apparent, cæ-  
tam in facultatibus, quam qualitatibus, maxime inter se differant. In simili errore uersantur etiam ij (sunt enim qui ita sentiant) qui sibi falso persuadent, abietis lacrymam à larigna nihil disidere, ac unam & eandem lacrymam esse, eo quod in colore, in substantia, ac in cæteris notis, in quibus perpendendis oculi tantum iudices sunt, adeo perspicue uideantur, ut uisibili facultate altera ab altera discerni non possit. Verum si quis rem cæteris sensibus experiri eggre-  
diatur, discriminis certior fiet: namque olfactu odoris fragrantiam haud insuauem, gustu uero amarorem in abietis lacryma comperiet, quibus larigna caret. Et quisnam uisiperi resinam à lentiscina secerneret, nisi rei ipsius incor-  
ptus iudex fuerit gustus? Quis à strobolina resina, & à quibusdam gummi globulis thus ipsum agnosceret, nisi adulterium tum igne, tum gustu deprehenderetur? Tanta præterea intercedit similitudo inter pistacum, & uirgineam glandem, ut nisi hæc amaritudinem gustui relinqueret; illud uero dulcedinem, difficillimum sane fuerit altera ab altera distinguere. Quid porro inter se similis reperitur, quam cassia, & cinnamomum, etsi hæc omnino specie non conueniant? Hinc facile adductus sum, ut nullius momenti eorum argumenta semper existimarem, qui res secundum quasdam tantum qualitates dijudicant, quibus etiam sæpe decipiuntur, ut ij, qui hac leui ratione ducti, Rha-  
barbarum, & Rhaponticum idem esse contendunt. Meminit Rhapontici Galenus libro v. 11. simplicium me-  
dicamentorum, ubi de eius uiribus ita scriptum reliquit. Rheum, quidam ipsum Rha nuncupant: mystam habet cum res peraturam, tum facultatem. Habet enim quiddam terrestre frigidum, ceu indicio est adstrictio, & adiuncta est quædam illi caliditas: siquidem si plusculum mandatur, subacre conspicitur. Quinetiam æreæ cuiusdam substantiæ subtilis est particeps, quod indicat tum laxitas, tum leuitas: uerum non minime & opera. Ob id enim licet adstringens, tamen non tantum conuulsis, sed & ruptis, & orthopnæ prodest. Sic quoque liuentia, & lichenas sanat cum ac-  
ciderit.

Porro quod adstrictionis opera haud instrenua sunt, hinc discere liceat, quod sanguinem expuentibus, cœli-  
ca, & dysentericis conferat: nec enim reluctatur terrestri frigido tenue aëreum, imò eo quod deducat, & in altum  
periculis, ualentioris effectus causa existit. Et in libro de antidotis primo: In Rheo, inquit, quoque fraus committit-  
ur: nam quibus in locis nascitur, simul atq; euulsus est, ipsum elixant, quò succum remittant, ac tam succum, ut sym-  
ptoma, & aque impermixtum, quam Rheum exiccatum, ut non elixum ad nos postea mittunt. Idcirco scire oportet  
distinguerem discernere. quod facillimè ab his deprehenditur, qui Rheum sua sponte nascens uiderunt. haftenus Ga-  
lenus. Ceterum adulterum, quod in Rheo fieri prodidit Galenus, id (ut paulò post dicturi sumus) de Rhabarbaro  
trahit Mesues. Cui tria Rhei constituuntur genera, nempe Turcicum, Barbarum, & Indicum, quod & Sceniticum  
uocatur, omnia à regionibus, à quibus conuehuntur, cognominata, uel in quibus proueniunt. Quippe Turcicum nil aliud  
designatur, quam Ponticum, uel quod è Ponto ad Turcas uicinos deferatur, uel quod ab ijs saltuosus conuallibus, in  
cauis ultra Tanain fluiuium priores Turcae, Pomponij Melæ, & Plinij testimonio, uenationibus ferè uixere tantum,  
imò in Pontum fuerit delatum. Siquidem ab his non longè distat Rba fluiuius, circa quem Rba, quod Ponticum  
poseri uocare, probatissimorum autorum testimonio, oriri certò scimus, fluminis illius nomine pariter appellatum.  
Quos, ut hac in re non dubitauerim errasse etiam Mesuem. quippe qui inter Rhei genera alium ducentia Ponticum  
designauit, à ceteris tum specie, tum facultate diuersum, quanuis fortasse rectius id Turcicum appellauerit, quam  
Ponticum. Porro Indicum ab India dictum, ubi frequentissimum prouenit, nemo est qui ambigat. Sed quanam ratio-  
ne Sceniticum, & Indicum idem esse dixerit Mesues, haftenus compertum non habeo: nisi fortasse Sinicum rectius le-  
gendum fuerit, quod à Sinis extremæ Indiæ populis (ut arbitror) deferatur, cum plura quoque aromatum genera ea  
regio mittat. Id quod manifestè idem declarat Mesues: quippe qui Sceniticum, uel Sceniticum Indum esse affirmat. Sce-  
nitæ enim (ut infra dicemus) Indiæ populi non sunt, sed potius Sini, à quibus Sinicum, non Scenicum, ut uulgata ha-  
bet lectio, mea quidem sententia, uocari debet. Sunt tamen qui uelint Scenicum, nec Indicum esse, nec à Sinarum regio-  
re oriundum, quod à Mauritanis non Sinicum, sed Scenicum dicatur. Quamobrem eorum quidam, ut Adonius Lo-  
uierus, in Arabia hoc nasci censet, & à Scenitis illius regionis populis Scenicum, siue Sceniticum uocari putat. Fu-  
chsius uerò Mesuis opinionem secutus, nullam inter Indicum, & Scenicum facit differentiam. quippe qui scripserit  
libro primo de compositione medicamentorum, Rheum Indicum esse uocatum, quod ex India, aut locis Indiæ proxi-  
mis, nempe à Scenitis populis, ut autor est Stephanus de urbibus Persidis, deferatur. Verum cum Scenitæ desertæ  
Arabie populi omni aromatum genere sint destituti, cumq; asserat Mesues Sceniticum rheum, & Indicum idem esse,  
cadit, peritq; Loniceri opinio. Velim tamen si possem Fuchsij sententiam probare. Verum cum Scenitæ etiam Stra-  
boni populi sint è Parthorum collegio Aræ, & Martyanæ montes incolentes, distentq; ab Indiæ sinibus milliaribus  
plusquam mille et quingentis, nescio profectò, quoniam modo Indicum rheum à Scenitis Parthorum populis Sceniticum  
ita posuit. quo fit, ut etiam Fuchsij opinionem longius sustinere nequeam. Ad hæc de Barbarici nomenclatura ua-  
ria simodum est recentiorum medicorum sententia. Quandoquidem sunt qui uelint sic dictum à Barbaria Africæ  
promontoria, sic uulgariter appellata, ubi olim Carthago clarissima habuit sedem. Horum opinionem sequitur Fuchsius,  
quod scripserit libro primo de compositione medicamentorum, id uerum fuisse Rhabarbaricum, quod superioribus an-  
tis secum adduxere milites, qui cum Carolo Imperatore Tunetem expugnauere. Alij Barbaricum uocari credunt,  
quod à Barbari Indiæ ciuitate, quæ intra Indij fluiui fauces est sita, deuehi censent, rati Indicum, & Barbaricum idem  
esse. Alij autem à Barbaria Erythræi pelagi insula, sic appellatum existimant, quod Indiæ naues, ac liburnicæ aro-  
mata deferentes magnam sue mercis ibi iam pridem habuerint emporium, à quo per Arabicum sinum, traiecto prius  
angusto mari de Mecha, aromatum omne genus in Aegyptum per alias deferbatur nationes. Sed aliter se habet opi-  
nio nostra: quippe quod semper existimauerim, Rhabarbarum ex Troglodytica Aethiopiæ regione ad nos deferri, et  
in eam oriri, quod ea regio Barbarica antiquis fuerit appellata. Siquidem inuenio Galenum scripsisse tum lib. vi.  
de simplicium medicamentorum facultate, tum lib. iiii. cap. vi. de tuenda sanitate, gingiber ex Barbaria ad nos con-  
uehi: quod tamen Dioscorides superiore libro, & Plinius lib. xii. cap. vii. à Troglodytis deferri, & in eorum re-  
gione nasci trahunt. Quinetiam reperio, glandem unguentariam, quam Galenus ex Barbarica regione adferri scri-  
bit, Dioscoridem libro sequenti in Aethiopia, ubi est Troglodytica regio, & Plinium lib. xii. cap. xxi. Troglodytis  
nasci posteritatis memorie prodidisse. Ex quibus sanè liquido constare puto, Troglodyticam regionem, & Barba-  
ricam antiquis unam & eandem fuisse. Huc præterea accedit alia Plinij auctoritas, qui libro iam bis citato, cap. xix.  
de raritatibus cinnamomi causam reddit, id accidisse scribit, incensis syluis Barbarorum ira. Nam cum ipso inibi teste,  
cinnamomum in Aethiopia Troglodytis connubio permixta, non alias utiq; gentes Barbaras appellasse credi-  
mus, quam Troglodytas. Quamobrem & myrrham Troglodyticam appellauit Barbaram cap. xvi. eiusdem uolu-  
mus. Nec ab re quidem Galeno, & Plinio Troglodytæ Barbari speciatim dicuntur, cum scripserit Pomponius Me-  
la grauius autor libro primo de situ orbis, eos magis stridere, quam loqui, specus tantum subire, & ali serpentium  
caribus. Quæ sanè omnia ita in mea me firmannt opinione, ut certò credam, Rheum illud uerè esse Barbaricum, quod  
ex Troglodytica asseratur regione. Sententiam nostram magis adhuc confirmare uidetur Strabo, quod libro xv. suæ  
Geographiæ aperte testetur, ea omnia in aromatum, & plantarum genere oriri in Arabia, & Aethiopia, quæ in In-  
diæ castris proueniunt, quod hæc regiones sole persimiles sint. Non placet igitur, ut dicam libere quod sentio, Fuchsij  
opinio, quoniam apud nullum usquam legerim ex ea Africæ parte, quæ uulgò dicitur Barbaria, Rba aliquod asferri,  
quod ibi prouenerit. Quin nec aliorum sententias comprobauerim, quoniam nec illud, quod à Barbari Indiæ ciuitate  
uocatur illud, quod à Barbaria Erythræi pelagi insula aduehitur, rectè Barbarum dici potest, cum ex India utrunq; pe-  
tat, & quod nullus extet autor, qui à Barbari ciuitate Rhabarbarum scribat suam duxisse originem. Quare illud  
legitimum

Rhei Turcici  
nomenclatio.

Rhei Indici  
nominatio.

Rhei Barbari  
ci nomencla-  
tura.

*Rhabarbarum*Rhabarbari  
vires ex Mef.

legitimum esse Rhabarbarum mea demum firma sententia est, quod ex Troglodytica Aethiopie regione fuerit *elatum*. Quod facile fortasse Veneti, qui quotannis in Alexandriam nauigant, seligere possent ab Indico: quod certi sciuerim, multa aromatum genera praefer Indica eo ex Aethiopia, & itlici Arabia per carouanas (ut vocant) comportari. Ceterum, antequam de Rhabarbari viribus agamus, illud in primis ignorandum non est, quod falsa, ac tana sit uulgarium, & aliorum quorumlibet opinio, qui sibi firmiter persuadent, Rhabarbarum uolentium admodum esse medicamentum, & quod propterea a medicis non exhibeatur, nisi in deploratis fere morborum affectibus. Sed quidem (ut inferius clarysimè patebit) illud haud dubie tuto & pueris, & utero gerentibus mulieribus omni tempore, & etate exhiberi potest. Atqui in eiusmodi hominum mentibus inualuit haec inanis opinio: quoniam elapsis temporibus tanta Barbarica huius radice extitit penuria (aquali enim cum auro pondere uendebatur) ut ad pretii magnitudinem euitandam, eam tunc non dedissent medici, nisi ubi morbos uel mortis periculo, uel diuturnis languoribus non uacare, certis signis coniecissent. Quo factum fuit, ut passim hac reprobanda opinione ducerentur homines ad credendum, quod in morbis curandis ualentissimum, imò uiolentissimum omnium medicamentorum esset Rhabarbarum. Huius vires ceteris diligentius, latiusq; descripsit Mesues, sic inquit. Rhabarbarum innocens, claceas, & excellens est medicamentum, multas dotes medicamento purgante maximè expetitas complexum. Praecellit in omni genere Indicum, quod recens sit, colore subnigro rufescente, ponderosum, quanuis sua substantia raram, & quod cum frangitur, rufo, & glauco colore alternante spectatur: item quod mansum croceo inficit colore. Adulteratum autem, quod omnino te animaduertere cautius oportet, hoc modo. Accipiunt impostores Rhabarbari multum, tumq; aqua macerant quinq; diebus, exemptum deinde siccant, subtractaq; ui, & quasi anima uendunt. Aquam uero, qua maduit, igne, uel sole similiter siccant, & in pastillos conformant ad regales usus. Fraus cognoscitur, quod syncerum non uehementer adstringat, substantia rarius sit, & colore croceo inficiat. Adulteratum uero contrarium habet, coloris interni uarietatem amisit, & subnigricat. Calefacit, ac siccac secundo ordine, etsi nonnulli primo tantum dicant. Constat tum aqueis, tum terreis qualitatibus, quae adstringentem ei facultatem tribuunt, & eius substantiam conseruant. Est & aëreis raritatem substantiae conferentibus particeps. Nec igneis quidem expers est, à quibus amaritudinem, concorrentibus etiam terreis qualitatibus, acquirit. Ac ipsa terrestris qualitas in uno deuscat: ignea uero in sublime fertur. quo fit, ut eius diuidantur qualitates cum aqua, aut uino perfunditur. Operatur autem in obstructionum affectibus igneis tantum facultatibus: terreis uero, ubi adstrictione sit opus. Omni penitus noxiu cat, daturq; omni tempore, & etate, adeo ut pueris etate tenellis, & praegnantibus facile exhiberi possit. Auge Rhabarbari vires caprinum serum, uel si maceretur intubi, uel apij, aut plantaginis decocto. Nulli memoria exeat, quin semper Indicæ nardi tantillum ipsi commisceatur, cum maximopere conferat. Addendum etiam semper crui ni albi odorati modicum, praesertimq; ubi ad obstructions referandas paratur. Illud praeterea memorie retinendum est, quod scilicet in adulterato nulla deiectionaria reperitur facultas. Synceri macerati expressio probè conuenit, ubi tantum abstersione, deiectione, ac infarctus liberatione sit opus. Quod si post hasce functiones, uiscera adstrictione roborante egerint, ipsum quidem in puluerem contritum exhibendum fuerit. At illud, quod igne torrescit, uehementius operatur, ac uehementius quod comburitur. Purum, selectum, ac substantia cōpactum, absq; iactura in terram puluerem conteri potest. Rarum uero, ac laxum minime, quoniam ex uehementi; ac longiori contritione facile exarscit, ac deperditur. Resoluitur item eius uis, cum aqua, uel uino decoquitur. Deijcit Rhabarbarum non modè bilis, sed etiam pituitam ipsam. Eiq; propria facultas inest cum abstergerendi, tum etiam roborandi tam uentriculum, quam iecur, & eorum compunctiones amouendi. Clarificat Rhabarbarum sanguinem, obstructions aperit, ac omnes praeter affectus sanat, quos generant obstructions: nempe aquam intercationem, regium morbum, lienis & asinum, & diuturnas febres. Sanguinem reijcientibus, ac eius à qualibet parte manationibus qualitate, ac facultate substantie prodest. Datur etiam ab alto deuolutis, ruptis, & tam interne, quam externe fractis maximo iuuamento, praesertim si uino austero drachmæ pondere commisceatur, addito synceræ mumiæ momento, ac etiam erythrodani radice tantundem. Singultientibus opitulatur, dysenteriam cohibet, praesertim quod igne sit torrefactum, addito tamen adstringente uino, & plantaginis succo. Vindicatur à carie, & teredine annis tribus, uel quatuor. Verum si cetera oblectur, uel in melle reponatur, uel psyllij semine, uel milio sepeliatur, diutius integrum, & syncerum seruari potest.

In Italia quoq; Rhabarbarum quoddam in hortis, & uiridarijs passim reperitur, à peregrino non absimile, quod etiam (ut à medicis fide dignis mihi relatum est) bilem deijcit, quanuis peregrino sit longè infirmius.

PERTINAX. GENTIANA. *Gentiana* CAP. III.

GENTIANAE inuentio prima assignatur Gentio Illyriorum regi, à quo cognomen tum habuit. Folijs partim proximè radicem, iuglandi, plantaginive similibus, subrubris: partim à medio caule, & praesertim iuxta cacumen, paulum dissectis. caule cauo, & læui, digiti crassitudine, geniculato, & ex interuallis maioribus foliato, binum cubitorum altitudine. semine in calycibus lato, leui, glumoso, satis ad sphondilij semen accedente. radice longæ aristolochiae, longa, crassa, amara. Nasceitur in sublimibus montium iugis, umbrosis locis, aquosisque. Vis radice excitatoria, & adstringens: contra morsus serpentium, duabus drachmis, cum pipere, ruta, & uino pota auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi deturbatis, ruptis, & conuulsis prodest: hepaticis, & stomachicis, pota cum aqua subuenit. Radix collyrij modo subdita, partus eijcit: imposita, ut lycium, vulneraria est, & ulcerum cuniculatim depascentem

medicam



## GENTIANA.

medela. Succus præcipue eodem effectû prodest: oculis inflammatione laborantibus illinitur: pro mecomio collyrijs acribus immiscetur: Radix vitiliginem absterget. Succus extrahendi ratio hæc est. Contusa radix quinque diebus aqua maceratur: postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices: & ubi refrixit aqua, linteo excolatur: mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat, fistilique reconditur.

**GENTIANA** planta est vulgaris notitie. Frequentissima excelsis Tridentinis montibus provenit, præsertimque in Ananijs, in quorum cacuminibus sæpius eius effodi radices brachiali crassitudine, & bicubitali longitudine. Hanc à Gentio Illyriorum rege inuentam, unde illi nomen, non modò Dioscorides, sed aliorum etiam ueterum monumenta testantur. Plinio libro xxv. cap. vii. ea est omnium præstantissima, quæ in Illyrico nascitur, ubi fortasse primum inuenta est. Gentiane uires paucis admodum perstrinxit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Herbe Gentiane radix ualde efficax est, ubi extenuatione, purgatione, abstersione, obstructionis liberatione opus sit. Nec mirum, si hæc possit, cum impense sit amara. Hæc (ut Auicenna ait) excalfacit ordine tertio, siccatur secundo. Urinam, & menses ciens, & aduersus scorpionum ictus ceteris antidotis præstat. Eius aqua, præsertim quæ uase duplici balnei uapores uitreis organis elicitur, febres (ut ego sæpius expertus sum) ab infarctu tum uiscerum, tum uasorum excitatas mirifice pellit. Alui tinea necat, maculasque in facie qualescunque detergit, si ea frequentius macule abluantur. Est præterea quedam vulgaris etiam planta, aliquibus Cruciatæ dicta, quæ non paruum cum Gentiana cognationem habere uidetur:

Gentiane consideratio.

Gentiane uires.

Cruciatæ consideratio.



quandoquidem & notis, & facultatibus illi plurimum respondeat. Vnde eos, non longè aberrare crediderim, qui hæc Gentianam minorem appellauerint. Hæc in incultis præcipue locis nascitur, caule rotundo, dodrantali, ac etiam maiore, in cacumine rufescente, paribus frere interuallis ab imo ad summum geniculis intersecto: è quorum singulis alis bina prodeunt folia suppingua, longa, uulgaris dictæ Saponariæ æmula, & Gentiane foliis in summate erumpentibus similia. Flores, qui purpureo colore nitent, in summo circum caulem in orbem exeunt. Radix illi alba, longa, amarisimo gustu, locis pluribus ab utroque latere crucis instar perforata: unde illi Cruciatæ nomen indiderunt. Sunt etiam in hoc genere duæ aliæ plantæ: sed longè minores, tenuibus radicibus, & caule admodum paruo. Harum, & prædictæ radices recentioribus magnis laudibus efferruntur contra pestilentiam, & menosorum animalium ictus. Ceterum ego quidem illud experientia compertum habeo, quod radice tusa, & uenæ in emplastri modo imposita, uermes, qui in intestinis fuerint, procul dubio necantur: & ulcerate strumæ sanantur; sijs eodem modo contusa, quæ nuper effosa sit, uel sicca, & in puluerem contrita adhibeatur. In summa non desunt, qui asserant, his ea omnia præstare posse, quæ Gentiana. quod ex prædictis facile probari potest. Ananiensis rura Cruciatam uulgò uocant Pettimborsa. Ex quo quis conijciat, si lubet, hanc illis indigenis, corrupta Italica uoce Metaborsa, ideo Pettimborsa nominari, quod tot uiribus commendetur, ut perinde ac gemma, crumenis asseruari mereatur: aut quod tantum uiribus excellat, ut medici ea utentes ingentem argenti, & auri copiam crumenis sint reposituri.

Cruciatæ uires.  
Pettimborsa  
Gentiane


## ARISTOLOCHIA.

## CAP. III.

**ARISTOLOCHIA** nomen ex eo sibi adoptauit, quod existimetur optimè puerperis opitulanti. Tria eius genera traduntur. Rotunda, quæ scemina vocatur, folijs hederaceis, præstanti odore cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab una radice germinibus, prelongisque palmitibus: floribus candidis, pilei similitudine, in quibus quod rubrum est, grauiter olet. Longa mascula appellatur, nonnullis dactylitis: longiore quàm rotunda folio: tenuibus ramulis, dodrantibus: flore purpureo, grauiter olente, qui marcescens in pyri similitudinem turbinatur. Radix rotundæ in orbem conglobata, rapi modo: longæ uerò digiti crassitudinem, & dodrantis longitudinem implet, nonnunquam paulò maiorem. Ambæ colore intus buxæo, gustu amaro, & graui. Est etiamnum tertia longa, quæ clematidis vocatur, ramulos habens tenues, referios folijs subrotundis, minori semper uiuo similibus: flores rutæ: radices longiores, tenues, crasso cortice, odoratoque vestitas, priuatim vnguentorum spissamentis conuenientes. Rotunda cæteris venenis resistit. Longa uerò aduersus angues, & venena, drachmæ pondere ex vino bibitur, & illinitur. Potà cū pipere,

pipere, & myrrha menses, partus, & omnia vuluarum onera eijcit: eadem efficit subdita in pectore. Rotunda ad eadem pollet: insuper singultibus, suspirijs, horribus, lieni, conuulsis, laterum doloribus, pota cum aqua, singulariter auxiliatur. Aculeos, & spicula extrahit: ossium squamas illitu adimit: vlcera putrida exest, & sordida expurgat: caua cum iri, & melle explet: gingiuas, & ceteras extergit. Clematidis ad eadem pollere creditur: viribus tamen inferior est.

ARISTOLOCHIA ROTUNDA. *Ambracij* ARISTOLOCHIA LONGA.



Aristolochiae  
consideratio.

Plinij, & Leo-  
nicensi lapsus.

Opinio quo-  
runda repro-  
bata.

ARISTOLOCHIAE, quam officina Aristologiam vocant, tria statuuntur genera, nempe rotunda, longa, et clematidis. Haec rara admodum, & paucis nota: illa vero omnibus fere rei herbariae studiosis notissima. Quae rotunda vocatur, etsi non ubique in Italia proveniat; in agro tamen Goritensi plurima, pulcherrimaeque nascitur, praefertim odore. Vtraque flores edit, & fructus: qui in longa pyri imaginem referunt, suntque iuglandibus longe maiores: in rotunda vero rotundiores, pauloque minores spectantur. Quam in re non potui non maxime Plinium adiuvari, quod Plinius contigerit, Aristolochiae utriusque fructus vidisse, priusquam ad summum adoleuissent. Sed certe is eodem in loco censari, meo iudicio, non potest, quin manifeste hallucinatus, & Graeci sermonis non admodum peritus deprehensus, cum Aristolochiae nomen dedisse grauidas tradat. Quandoquidem non ab utero gerentibus mulieribus, sed a pueris Aristolochia (ut Dioscorides scribit) id nominis sibi comparauit. Cuius rei non modum indicium praebet nomen ipsum ἀριστολόχια, quod nil aliud denotat, quam optima puerperis, non (ut Plinius inquit) grauidis; sed etiam ipsas facultas, quae ad remorantes a partu secundas, mensesque ciendos magnopere commendatur. Quapropter fuerit haec praegnantibus procul dubio exitiale potius, quam salubre medicamentum, cum ea sane omnia, quae secundas, & menses educunt, fortiter etiam trahant, & quandoque interficiant, praesertim cum fuerint amara Aristolochiae modo. Nam minus praeterea Leonicensium uirum alioqui nostrae aetatis doctissimum, satis admirari possum, quod dum nimio studio se aliorum errata corrigendi studio, vel auiditate ductus, de cyclamino, & aristolochijs Plinium accusat, in eadem, in qua Plinius, foueam ceciderit, asserens cum Plinio Aristolochiam a praegnantibus sibi nomen adinuenuisse. Quod ut sine autore pronuntiassent uideretur, Dioscoridem quidem adducit, sed eius historiam, quantum equidem sentio, corripit, ac peruertit. Sunt et recentioribus Cordus, Adamus Lonicerus, & monachi illi, qui in Mesuem commentum edidit, qui sibi certo persuadent, eam esse Dioscoridi Aristolochiam clematitim, quae officinis omnibus passim longa cognominatur, argumento quod haec radices proferat admodum longas, & sarmentorum modo praetenuis. Quibus ut suam tueantur, ac magis roborent sententiam, hoc in loco Dioscoridis codicem omnino deprauatum esse contendit: & ubi uulgata lectio habet, κλωνία ἔχουσα λεπτή, φύλλοις ὑποσπογγύλοις, αἰχάνων μικρῶν ἐπὶ τῇ

hoc est ad uerbam, ramulos habens tenues, folijs subrotundis, semper uiuo paruo similibus, non ἀλζων μιν πόν, sed ἀλζων μιν πόν, quod asaro paruo similia sint folia, legendum esse censent. Horum sanè sententiam nunquam probare posui, neq; probandam arbitror, pluribus cùm rationibus, tum auctoritatibus adductus. quandoquidem Oribasij icter aliter non habet, quàm communis hæc Dioscoridis, nec aliter legunt Serapio, & Aiacenna. Id quod manifestè ostendit, hoc in loco Dioscoridi nullam subesse mendam. Adde, quod cùm unum tantum Dioscoridi sit asarum, nec minus asari is usquam, quod extet, meminerit, absurdum sanè uideretur, quod minori asaro Aristolochiam clematitim comparasset. Accedit & alia ratio, quod cùm uulgaris Aristolochia longa rutæ flores non edat, clematidis esse non potest. Præterea si Dioscoridis lectionem accuratius perpendamus, nil aliud esse uidetur longa officinarum, quàm longa Dioscoridis. Quippe quod proferat hæc folia longiora, latioraq; quàm rotunda: ramulos dodrantes: florem græuiter olentem, qui fructum edat pyri modo turbinatum. Nam quod fructum ferat clematidis, non scribit Dioscorides: nec folia longa, lataq; ut uulgaris habet Aristolochia, sed subrotunda, & minori semper uiuo similia. At si contra exerceamus quædam, longam uulgarem Dioscoridis longam non esse, quoniam flos illi purpureus non sit, sed melius, et radix non palmari, nec digiti crassitudine, sed longior admodum, & longè tenuior. Huic facile responderi poterit, id locorum regionumq; uarietate euenire posse, & quod natura cum florum coloribus in quàm plurimis ludat: quodq; uelut etiam nos Aristolochiæ longæ plantam à Calabris allatam, radice (ut in theriacis scribit Nicander) cubitali longitudine, pollicari crassitudine: cui folia erant, quæ à nostrate longa nullo discrimine differebant. Ad hæc Clematidis radix Dioscoridi, & Plinio crasso contegitur cortice: quod tamen in longa officinarum, nostratèq; non uisitat, cùm tenui cortice perpetuo uestiatur, odore potius graui, quàm odorato. Quamobrem inclinare nunquam potui opinus, ut crederem, Aristolochiam longam, cuius hic effigiem appinximus, esse clematitim. Sed potius eò deducimus sum, ut suspicerem hanc fortasse esse Pystolochiam sic Plinio uocatam, quod & ipsa puerperis commendetur. Nam præterquam quod hæc illi quarto Aristolochiæ generi assignetur, tenuior est, quàm clematidis, densis radicis capillamentis, uinci plenioris crassitudine. Illud mihi suspicionem auxit, quod uiderim etiam præter hanc aliam, quæ radice palmari, & crassitudine digitali constabat: sed in omnibus alijs partibus alteri adeo perfimilis, ut nullam inter eas intercedere differentiam compererim. Veruntamen Fuchsius medicus clarissimus, suis de plantarum historia commentarijs, aliam plantam Pystolochiam putat: quæ tamen (eius pace dixerim) à Plinij Pystolochia prorsus abhorret. Est enim Pystolochia Fuchsi mollis in uniuersum planta, quæ uere primo unà cum chelidonio exoritur, & maio, uel ad summum iunio contabescit. Crescit hæc tenellis, subalbidisq; folijs, coriandro, uel ranunculo primi generis proximis: radice tuberosa, inferiori parte sessili, superiori uerò monticuli instar elata, intus ubiq; concava, nigro exterius cortice, buxæ interius pulpa, odore aristolochiæ, & gustu amara. Quapropter Germanis hæc, quod uera Aristolochia rotunda sint desituti, eius uicem infelicitèr explet. Non tamen ob id censendum est hanc esse Pystolochiam, quæ à Plinio describitur. Siquidem hæc illi tuberosa, & inani radice non constat: sed clematide tenuior est, densis (ut dictum est) radicis capillamentis, uinci plenioris crassitudine. Sed rectius, ueriusq; quantum equidem sentio, dici posset, hanc plantam esse Plinio fumariæ alterum genus, quod ab eo libro xxv. cap. xii. ijs depingitur uerbis. Alia est Capnos fruticosa, prætenera, folijs coriandri, cineracei coloris, flore purpureo. Nascitur in hortis, & segetibus. De hac etiam Aëtium locutum fuisse existimaui libro x. cap. 11. in curatione obstructi iocinoris, ubi chelidonijs Capnos meminit, eo quod (ut diximus) unà cum chelidonio primum erumpat hirundinum aduentu, ut libro quarto latius differemus, ubi consulto fumariæ historia tractabitur. Aristolochiæ genera memoriæ prodidit Galenus lib. v. simp. medicamentorum, ubi eorum uires explicauit ijs uerbis. Aristolochiæ radix ad medicationes utilissima est, amara, & subacris. Sed ex illis omnium subtilissima est rotunda, ad omnia efficacior. Aliarum uerò duarum, quæ Clematidis appellatur, fragrantior est. Itaq; ea ad unguenta utuntur unguentarij: sed ad sanationes infirmior. At longa minus quidem tenuitatis obtinet, quàm rotunda, sed nec ipsa inefficax est: uerum abstergendi, atq; exalfaciendi potentiam possidet, minus quidem quàm rotunda abstergit, ac digerit, sed non minus calefacit, imò forsan plus quoq;. Itaq; in quibus usus est modicæ absterfionis, commodior est longa, puta in carniū exulcerationibus, & fomentationibus utari. At in quibus crassum humorem ualidius extenuare oportet, illic usus est rotundæ. Proinde dolores ab infarctu, aut crassitie crudorum flatuum natos magis curat rotunda, & spicula extrahit, & putredines sanat, & foras ulcera repurgat, ac dentes, gingiuasq; candidas efficit. Auxilio est & asthmaticis, singultientibus, comitialibus, podagricis, si cum aqua bibatur: tum ruptis, & conuulsis, ut si quod aliud medicamentum, idonea est. Aristolochiæ uim purgatoriam inesse (quod tamen silentio præterierunt Dioscorides, & Galenus) autor est Mesues, qui ita scribit. Aristolochiæ radix purgat os per inferna ducit humores, atq; etiam, ut nonnulli asserunt, biliosos. Pulmonem, ac pectoris particulas ab humorum lentore, ac putredine efficaciter mundat. cuius rei indicium est, quod asthmaticis maximum adferat iuuamentum.

Pistolochia.

Fuch. opinio reiecta.

Aristolochiæ uires ex Gal.

ΓΛΥΚΥΡΡΙΖΑ. DULCIS RADIX.

CAP. V.

*Glycyrrhiza*


DULCIS radix plurima gignitur in Cappadocia, & Ponto. Fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudine assurgentibus: folijs lentis, densis, pinguibus, tactuque gummosis: flore hyacinthi: fructu pilularum platani magnitudinis, asperiore, qui filiquas lentium modo habet rufas, & paruas: radicibus longis, ut gentianæ, coloris buxæ, subacerbis, & dulcibus: quæ densantur in succum, lycij exemplo. Is in arteriæ scabritia efficax habetur: verum oportet, ut linguæ subditus eliqueat: æstuantī stomacho, thoraci, ac iocinori conuenit: sanat vesicæ scabiem, & renū do-

dd lores,

## GLYCYRRHIZA.

Dulcis radi-  
cis consider.

Plinij lapsus.



Glycyrrhizæ  
vires ex Gal.

lores, cum passo potus: idem eliquatus fitim sciz: vulneribus illitus accommodatur: commanducum stomacho prodest. Recentis radice decoctum ad eadem conuenit. Eiusdem farina pterygijs commodissime inspargitur.

**D**ULCIS radix, quam Græci Glycyrrhizā, & officina Græcum nomen corrumpentes; uel potius Barbaros scize Liquiritiam uocant, et Hetrusci uulgò Regolitia, planta est pacis non cognita. Abundat hac Apulia, præsertim Gargano monte, unde quotannis succus in pastillos condensatus ad nos committitur, & radicum quàm plurimum. Visitur etiamnum in uarijs pluribus locis in Italia, non modò ad spectaculum satas, sed & ad medicamentorum usum. Siquidem radix recenter effusa, sicca longè magis præstat, & ori gratior in medicamentis habetur. Sed non possum non ualde admirari Plinium, quod Glycyrrhizā inter aculeatas numerauerit plantas lib. xxi. cap. ix. sic inquit: Glycyrrhiza sine dubio inter aculeatas est, folijs echinatis; pinguibus, tactuq; gummosis. Et libro xli. cap. xv. dum catalogo quodam aculeatas commemorat stirpes: spinosarum, inquit, multæ species. In totum spinosa est asparagus, scorpius, nullum enim foliū habet. Quædam spinosa foliata, ut carduus, eryngion, glycyrrhiza, & urtica. Iis enim omnibus folijs inest aculeata mordacitas. hæc ille. Quo fit, ut sine controversia dici possit; Plinium Glycyrrhizā minime nouisse, cū certi nusquam gentium, quod equidem sciam, aculeatis folijs proeueat, sed (ut Dioscorides scribit) lentisci emulis, densis, pinguibus, tactuq; gummosis. Cuius erroris causa illud facile esse potui, quod sui potius Græci codicis fidem secutus fuerit, quàm rari-  
tatem, in quo fortasse facili, lubricoq; librariorum non idcirco

tium lapsu ex  $\sigma\chi\iota\varsigma$  pro  $\sigma\chi\iota\varsigma$  scriptum legebatur: uel quod Græcæ linguæ nō exactè peritus uocabulorum, uocumq; similitudine deceptus (ut alibi quandoq; demonstrauius) Plinius in hoc errauerit. Nam huiusmodi opinio adeo firmiter ueritati coheret, ut facile ij quoq; deprehendi possint à ueritate desciscere, qui credunt Glycyrrhizā olim spinis fuisse præditā, sed mangonio longi cultus edomito rigore spinarum aculeos amisisse, & tandem mitigatā esse: cū ea etiam quæ hoc æuo sponte per se nascitur, nullibi aculeata spectetur. Dulcis hæc radix à Theophrasto lib. vi. cap. xiii. Scythica appellatur, eo quod Scythæ hac contenti absq; alio alimentorum præsidio decem, duodecimq; dies degant. Nam (ut idem testatur) circa Meotim paludem plurima nascitur. Glycyrrhizæ meminit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Huius fruticis radicum succus in primis utilis est, similiter ut eius radix dulcis, cum leui quadam adstrictione. Proinde asperitates lenire potest, nec modò in arteria; uerim etiam uescis, scabra, idq; temperaturæ mediocritate. Quocirca fuerit sanè natura eius familiaris nostræ temperaturæ: nam id monstratum est esse id quod dulce est. Sed cū adstrictio quædam adiuncta sit, uniuersum eius temperamentum, quantum ex caliditate, & adstrictione est, tepidæ potissimum caliditatis fuerit, quàm proximè accedens ad symmetricam, siue temperatam. Porro quoniam temperie quoq; humidum est, quod modicè dulce est, iure sanè etiam fitim extrinsecus medicamentum est, nimirum modicè humidum, simul et humana natura frigidius. Refert Dioscorides, radicem suam ad leuorem redactam, pterygiorum illitu idoneam esse remedium.

## Κενταύριον μέγα. CENTAURIUM MAGNUM.

## CAP. VI

**C**ENTAURIUM magnum folia habet iuglandis, oblonga, uiridi brasicarum colore, serrata in ambitu: caulem, ceu rumicis, binum, aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu papauerum, in rotunditate oblonga. Flos cæruleus: semen cnico simile, ceu laneis floccis quibusdam inuolutum. Radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnans, cum adstrictione aliqua, & dulcedine acris, & rubescens. Amat solum pingue, & apricum, ac syluas, & colles. Copiosissima est in Lycia, & Peloponneso, in Arcadia, Helide, & Messenia, pluribusque locis circa Pholoën, Lyciam, & Smyrnā. Radix conuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, ueteri rufi: sanguinem expuentibus, drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua; cæteris in uino: item ad tormina, & vuluæ dolores. Ramenta eius in collyrij formam vuluæ subditæ, menses, atque partus extrahunt. Succus eadem præstat. Vulneribus prodest: nam recens rufa, aut arida antè madefacta, ea glutinat, & coniungit. Carnes coalescunt, si rufa simul decoquantur. In Lycia succum exprimunt, quo pro lycio utuntur.

## CENTAURIVM MAGNUM.

CENTAURIVM magnum ( ut in Rhapontico superius diximus ) nil aliud, mea quidem sententia, est, quam illa insignis admodum radix, quam praterita nuper etas Rhaponticum esse credidit: quamq; etiam hoc tempore eodem nomine quidam appellant, qui cum imperitis superioris etatis errare malant, quam cum peritis recentioribus uera cognoscere simplicia medicamenta. Ceterum contendat licet Musa Ferrariensis medicus clarissimus, radicem, qua Rhapontici loco plerumq; officinae utuntur, Centaurij magni radicem non esse; is tamen hac in re decipi ( pace eius dixerim ) manifeste deprehenditur, cum ea radix, qua uulgaribus Rhapontici uicem explet, omnibus sane notis Centaurium magnum representet. Quippe quod crassa sit, grauis, compacta, tripedalis, &amp; rubeo succo pregnans, qui gustui non modo quadantenus sit acris; sed etiam cum aliqua adstrictione dulcis. Adde quod &amp; folia, caulis, capitula, flores, &amp; semina illi prorsus sint eadem, quibus constare Centaurium magnū Dioscorides, &amp; Galenus memorie prodidere. Ea, quae hodie ad nos conuehitur, Gargano praclarissimo Apuliae monte numerosa nascitur: quin &amp; in alijs Italiae locis, nepe in Veronensi agro Baldo monte, quem Benaci alluit unda, sed infirma radice, si ad Apuliam compares. Non desunt praeterea hac tempestate rei herbariae ignari nebulones, qui bonis quibusdam seplasiarijs persuadere conentur, eam plantam esse Centaurium magnum, quae in aquosis prouenit, caule quadrato, bicubitali: folijs salicis modo longis: flore rubenti, spicato, quam quidam pro lystemachia accipiunt. Neq; alio, quod sciam, argumento nituntur, quam quod haec planta flore sit rubro, &amp; caule quadrangulati, quemadmodum &amp; Centaurium minus. Sed quantum isti hallucinantur, quantaq; in erroris caligine uersentur, ij quidem iudicant, qui in stirpium historia multum studij, &amp; temporis consumperunt. Porro utriusque Centaurij uno tantum capite mentionem facit Mesues: sed adeo alterum cum altero miscet, ac confundit, ut mirandum non sit, si a nonnullis etatis nostrae diligentissimis rei herbariae inquisitoribus acriter fuerit accusatus: quemadmodum &amp; Auicenna, qui cum illo pariter errat, &amp; cum utrisq; Serapio. Siquidem is scripsit ex auctoritate Aben-Mesuai, Centaurij magni radicem lentam trahere pituitam, simul &amp; bilem, &amp; coxens, eam doloribus opitulari. Quae tamen facultates Centaurij maioris non sunt, sed minoris, ut sequenti capite explicabimus. Ceterum neq; Plinius ab errore tueri potest, qui tanetsi in Centaurij magni historia lib. xxv. capite vi. in omnibus fere Dioscoridi subscribat; in facultatibus tamen errasse uidetur, quod Centaurio maiori amaritudinem quam quadam dulcedine tribuerit, cum amaritudo non in maiori, sed in minori tantum deprehendatur. Centaurij magni meminit Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, de eius uiribus ijs differens uerbis. Centaurij magni relictus sicut gustu contrarias qualitates, ita in usu contrarios effectus demonstrat. Gustu itaque acris simul, adstringensq; apparet cum leuicula quadam dulcedine. At in actionibus acrimonia quidem caliditatis opera ostentat, menses promouens, &amp; scetum mortuum euellens, uiuumq; corrumpens, atq; eiiciens. Adstrictio uero, opera crasse, terreae, frigida, cum uulnera glutinet, &amp; sanguinem reicientibus proffit. Exhibentur autem eius drachmae duae, febrientibus quidem cum aqua, febris uero liberis cum uino. Porro secundum omnium simul qualitatum actionem, ritum, conuulsis, dyspnoeae, siue spirandi difficultati, tum inueteratae tussi conuenit. Nec enim in talibus euacuare solum quod praeter naturam est oportet; sed partem quoque euacuatae roborare, ac confirmare. Vacuationi itaq; accommodata est acrimonia, utiq; cum non sola sit, ac pura, sed aut dulcedini iuncta, aut certe non prorsum amaritudini: siquidem uehementiam tunc, atque uolentiam, mista illi temperata quadam substantia, cuiusmodi est dulcis, non obtinebit. Porro ad ea, quae euacuata sunt, roboranda, contrahendaq; adstrictione est opus. Eadem quae radix, &amp; succus

Centaurij magni confid.

Brafanoli lapsus.

Quorundam hallucinatio.

Arabum lapsus.

Plinij error.

Centaurij magni vires ex Galeno.

ΚΕΝΤΑΥΡΙΟΝ ΜΙΚΡΟΝ.

CENTAURIVM MINVS.

CAP. VII.

CENTAURIVM minus, limnethion aliqui uocauerunt, quoniam rigua amet loca. Herba origano, aut hyperico similis, caule anguloso, palmū excedente: flore lychnidis, è puniceo in purpuram uergente: folijs rutae, praelongis, & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, laui, & superflua, quae gustanti amaritudinem adfert. Herba recens tusa suo illitu vulnera conglutinat: vetera ulcera purgat, & cicatrice obducit. Bilem, crassosque humores per aluum exigit, si decocta decoquatur. Ius decocti ischiadicis conuenientissimè infunditur: trahit enim sanguinem, & dolorem leuat. Succus oculorum medicamentis perquam utilis: siquidem cum melle caliginem oculorum expurgat. in uellere appositus, menses, & partus extrahit: epotus peculiariter neruorum vi-



## CENTAURIUM MINUS.



Centaurij mi-  
noris conside-  
ratio.

Centaurij mi-  
noris vires ex  
Galeno.

tij succurrit. Succi extrahendi ratio. Legitur haec femine pragnans, & diebus quinque madefacta, dequitur, donec superemineat aquae: mox ubi refrixit, linteolo exprimitur, & eiecta herba, iterum decoquitur, usque dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recentem, gravidamque contundunt, atque fuscum fictili non picato exprimunt, & in sole, lignea inde assidue mouentes, inspissant. quod si quid concretum faucibus uasis adhærescat, deradunt, reliquoque humori permiscunt, noctu diligenter operiunt: nam, ros nocturnus liquores coalescere non sinit. Quæ autem siccis radicibus, aut herbis, liquamenta exprimitur, decocta (ut in gentianæ mentione retulimus) preparantur. Sed quæ ex corticibus humidis, aut confectis herbis factitantur, in sole, uti antè dictum est, coguntur. Sic è thapsia, sic è mandragora, reliquisque similibus succus: sic ex acerbis uvis melligo elicitur. Lycium tamen, & absynthium, hypocistis, & confimilia, decocta, eo quo diximus modo, coguntur.

CENTAURIUM minus nullis ferè non cognitum, in Hetruria uulgo Biondella nuncupatur: quoniam abstergendis de albandisq; mulierum capillis ex lixiuo plurimum præstat. Quod passim in officinis habetur, uerum, & legitimum Centaurium minus esse, omnibus, ut arbitror, exploratum est, quam ut à nobis ostendi debeat. Quippe quod nullis in uniuersum notis Centaurij minoris historie refragetur. Galenus ob ingentes, mirasque facultates, de ipsius uiribus integrum librum conscripsit, Papius dicitur. Detrahit hoc bilem, & pituita, quæ sanè facultate Centaurium maius planè carere deprehenditur. Quo fit, ut non pe-

rum aberrauerint inter Mauritanos Mesues, Auicenna, & Serapio, quod Centaurij minoris vires cum maiori temper ter confuderint. Galenus præter ea, quæ de Centaurio minori ad Papiam scripsit, eius quoque meminit libro vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Centaurij minoris radix prorsus inefficax est. Sed ramuli eius, & ptiſimum folia, quæ illi inhzrent, & flores, utilissima sunt. Vincit in eis qualitas amara, paululum habens & astringentis, atq; ob eiusmodi temperamentum admodum exiccatorium est medicamen, expers mordacitatis. Porro quod omnia talia utiliora sint, supra commonui, & nunc nihilo secius tamen nos repetere tempestiuum est, omnes eas particulatim actiones memorantes. Vulnere itaque magna herbe ipsius recentis illitu glutinantur: & uetusta, quæ ægre ad cicatricem perducunt quæcunt ulcera, cicatrice eodem modo utentibus obducuntur. Arefacta uerò granatorij, & desiccatorij miscetur facultatibus, ijs uidelicet, quæ sinus, & fistulas sanare sunt natæ, ueterisq; duritias emollire, tum ulcerum maligna, quæ cacoethe uocantur, sanare. Miscetur etiam ijs, quæ rheumatismis affectibus medentur: in quibus ea medicamenta optima sunt, quæ uehementer desiccantia, cum quadam adstringente malam habent mordacitatem. Decoctum herbe quidam ischiadicks infundunt, ceu biliosa, & crassa ducens: hæc talia purgat. quanquam cum adeo uehementer operabitur, ut cruenta euacuet, tunc plus proderit. Succus potius eius, cum adsimilis sit facultatis, hoc est, exiccatorie, & absterforie, & cetera iam dicta pulchrè efficere potest: & cum melle oculis illinitur, mensesq; & foetum appositus euocat. Sunt qui ipsum præbeant & ijs, quibus nervi defecti sunt, ut qui euacuet, & desiccet innoxie quæ impleta sunt. Quippe cum iocinoris quoque obstructions opæ expediat, bonumq; sit lieni indurato remedium, foris impositum, nec secius, si quis bibere sustineat.

## ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ ΛΕΥΚΟΣ. CHAMAELÉON ALBUS.

CAP. VIII.



ἡνιφῆς ὁ βῆρ μῆρ τῆς

CHAMAELÉON albus, ixia ideo aliquibus uocatur, quod quibusdam in locis uiscum circa radices eius inueniatur: quo pro mastiche utuntur mulieres. Folia habet silybo, aut scolymosimilia, asperiora, acutiora, nigroque chamæleone ualidiora. Caulem non promit, uerum ex medio spinas, echini marini, aut cinaræ modo, erigit. Flores purpureos, ueluti papporum lanugines emittit: semen cnico simile: radicem in lætis collibus crassam, in montosis uerò graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, graui odore, dulcem. Quæ pota acetabuli mensura, latus interaneorum tineas pellit: bibitur autem in uino austero cum origani feruesfacti succo. Hydropicis commodissime drachma in uino datur: etenim eos extenuat. Contra difficultatem urinae decoctum propinatur. Hausta in uino, serpentium uenenis resistit: occidit canes, & fures: mures item necat, subacta cum polenta, aut aqua, & oleo madefacta.

ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ

## CHAMAELEON ALBUS.

## CHAMAELEON NIGER.



## Χαμῆλιον μέλας. CHAMAELEON NIGER.

## CAP. IX.

CHAMAELEON niger folijs scolymo-similis esset, nisi minora, tenuioraque, ac rubro distincta uiderentur. Caulem emittit dodrantalem, crassitudine digitali, subrubrum: & in umbella flores spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, uersicolores: radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ dissecta flauescit, & commanducata mordet. Prouenit in campestribus, siccis, & cliuosis tractibus, & maritimis. Radix trita, addito atramenti sutorij exiguo, cedrino oleo, & axungia, scabiem abigit: eadem, cum sibi sulphur, & bitumen asciuit, & cocta in aceto illinitur, impetigines absterget. Decoctum collutione, dentium dolorem mitigat. Cum pari pipere, & cera oblita radix, dolentienti auxiliatur. Radice concisa, & in aceto decocta, dentes fouentur: eos quoque frangit, si scriptorio stylo feruens admoueat: vitia cutis in facie, uiriliginisque cum sulphure emendat, erodentibus medicamentis admiscetur: phagedænas, terraque vlcera illitu sanat. Quare chamæleon uocetur, à uarietate foliorum euenit: mutant enim cum terra colorem: hinc uiridia, illic albicantia, alicubi cœrulea, nonnusquam rubra inueniuntur.

CHAMAELEON albus tam ab Hetruscis, quam cæteris fere Italiæ incolis uulgò Carlina uocatur. quod creta uulgus (ut facile solet) herbam hanc magno olim Carolo regi ad fugandam sui exercitus pestem ab angelo demonstratam fuisse, tanquam antidotum omnium præstantissimum. Quo argumento freti uulgares quàm plurimi, ad arcendam pestilentiam huiusce plantæ radices miris, magnisque laudibus commendant. Nec quidem ab re: quando enim potaretur (ut Dioscorides, & Galenus testantur) latus inter ancorarum tuncas interimat, et serpentium uenenis resistat, nec uirgæ non fuerit, quod eadem in pestilentia opem ferre ualeat. Falluntur nimirum, qui putant, stirpem illam pernici non ab similem (nostri eam Carciofo uulgò appellant) aculeis horrentem, cuius flore coagulæ uice Hetruria uicari, albam esse Chamæleonem. Nam eorum error ex eo maxime diluitur, quod hæc contra Chamæleontis albi defensionem, in longo admodum caule echinatos suos proferat fructus. Porro Chamæleonem album nunquam Fuchsius (pace utriusque alioqui crudelitissimi dixerim) uidisse existimauerim: quod libro suo de plantarum historia primum scribit, nullum hunc edere caulem, subinde huius fortè oblitus, eodem in loco eundem procerum satis caule depingit. Quæ nec nigram idem nouisse uidetur, cum depictus ab eo, quem tamen planè non probat, nullis notis legitimo, meo quidem iudicio, respondeat. Nascitur niger in Tridentino agro, Anagninensibus admodum frequens tum montibus, tum collibus, nullis recte uocantibus notis. Quæ in re hallucinantur monachi reuerendi, qui Mesum commentati sunt, cum

Chamæleontis utriusque consider.

Quorundam error.

Fuch. lapsus.

Monachorum opi-explosi.

Quorundam  
opinio repro-  
bata.

cum certò sibi persuadeant, Carlinam ( ut eorum utar distinctione ) caulem proferentem, quam leguminem Chamæleonem nigrum Dioscoridis semper existimauimus, eiusdem esse spinam albam, quam Graeci ἀνθήκη καὶ λευκή λέγουσι, Maurum uero Bedeguar: item Carlinam alteram caule uiduam esse spinam Arabicam ab Afris Suchas uocant. Quippe cum spina alba ( ut Dioscorides est author ) bicubitali sit caule, ipsoq; albicante, unde fortasse nomen traxit, et inani, flore uero purpureo niteat; Carlinam uero hæc caule sit dodrante paulò maiore; pleno, non inani; saturo, non albicante, floribus hyacinthi æmulis, nulla ratione dici posse putauerim, Carlinam hanc esse spinam albam, sed potius rufam. Cum nec similiter monachi unquam probare possint, Carlinam alteram caule uacantem Arabicam esse spinam: quòd nusquam Dioscoridem scripsisse inuenerim, spinam Arabicam caule uacare, sed spinam albam potius esse persimilem. Ex quo rectè ( ut arbitror ) concludi potest, quòd cum spina alba procul dubio caulem edat, eadem quoq; Arabica promat. Sunt etiam qui uelint, Carlinam caulem gerentem nihil differre ab altera, quæ canem non fert, nisi sexu, nempe quòd altera mas, altera uero femina fortasse fuerit: negantq; omnino has plantas esse Chamæleones, illamq; præsertim nigrum Chamæleonem esse nolunt, quæ caulem rufum gerit. Hocq; argumento nituntur, quòd scripserit Galenus lib. v. i. i. simplicium medicamentorum, Chamæleontis nigri radicem lethale quiddam obtinere; eamq; ob causam in extrinsecis tantum uenire medicamentis. Sed cum raphani uice à compluribus copiose cum ceterijs edatur nullo penitus incommodo, nec esse hanc nigrum Chamæleonem, nec eius speciem probant. Quibus facile respondere potest, quòd fortasse hæc in re ( sit tamen cum uenia tanti medici dictum ) errauerit Galenus, cum omnibus in confesso sit, quòd si in altero duorum aliqua deleteria uis insit, ea potius in albo, quam in nigro esse posita. Quòd quidem non modò scribit Dioscorides Ixiæ lethale medicamentum in albo tantum Chamæleonte nasci; sed quòd et radix canes, et sues, ac mures necet, si ab eis deuoretur. Quæ sanè euident argumentum faciunt, quòd potius albam, quam nigrum lethale quiddam obtineat: præsertim cum nigro nullam lethalem uim assignauerit Dioscorides. Verè enim numero, ne cui temeritatis nomine suspectus sim, quòd à Galeno audeam dissentire, concedamus, non præter rationem id scripsisse Galenum, quòd Ixiæ etiamnum oriatur in nigri radice, ut Cretenses affirmant, qui ex utriusq; Chamæleontis radicibus Ixiæ colligunt ad pennas sagittis conglutinandas, quòdq; scriptum reliquerit Theophrastus, Chamæleontis nigri radice canes pariter necari. Alia nobis sese offert ratio, qua rectius, ut puto, illis respondere possimus. Siquidem facile fieri potest, quòd in Græcia, fortasse in Ponto, alijsq; conterminis regionibus Chamæleontis nigri radix sit uenenosæ, et in Italia salubris, exuta ob celi huius elementiam lethali facultate, quemadmodum et Persæ tametsi Persis semper fuerit lethifera; Aegyptijs tamen innocua facta est, soli et celi bonitate. In Ponto enim nò modo mel uenenosum est, sed et plantæ quàm plurimæ lethiferae sunt. Imò et animalium partes ( quòd scribat Strabo Ponticum castoreum uenenosum esse ) quæ tamen nobis salubria sunt. Arum præterea Cyrenis adeò uis est, ut repi modo in ciborum usum ueniat, cum tamen in Græcia, et Italia adeò acerrimum sit, ut nec coctum, nec crudum edere possit. Quin et scorpiones in compluribus terrarum orbis partibus istos interficiunt, in aliquibus uero, ut in Tridentino tractu, nullum istu uenenum relinquunt, quo etiam in loco nigrum ueratræ nulla deiectione in potum. Ceterum illud præter dicta me maxime ad credendum inducit, Carlinam caulem fundentem esse Chamæleonem nigrum, quòd hæc planta omnibus in uniuersum notis nigrum Chamæleonem referat. Quandoquidem folijs confectis scilicet minoribus, tenuioribusq; subrubra per medium excurrente costa: caule item dodranti, crassitudine digitali, subrubro: floribus in umbellæ spinosis, uersicoloribus: radice crassa, exterius nigra, densa, et aliquando coriacea, quæ etiam intus flauescit. In qua certè delineatione hæc plantæ ita ad amissum conueniunt, ut nemo xij. sensibus et uirgino cunctus fuerit, Carlinam, quæ caulem mittit, Chamæleonem nigrum esse non uideat, et perspicue intelligat. Ad quòd eadem certior ob diligentiore inquisitionem factus, hoc tempore asserere non dubitauit, licet alijs aliter senserint. Hæc in sententia permanere decreui, donec aliquis rei herbariæ diligentissimus æquè et doctissimus indagator alios à Carlinis Chamæleones ostendat in Italia, qui rectius suis notis Dioscoridis historiam repræsentent: tunc enim in hoc xij. alijs quoq; non grauior mutare sententiam. Explodendi sunt Arabice factionis scriptores, ut qui nò sine decepto errore, Græcorum uocabulorum uicinitate decepti, Chamæleonem, quam sua lingua Mezzerion appellant, cum Chamæleone confundant. Nam Auicenna de Mezzerio differens libro et tractatu 2. cap. 464. circa finem, suam errorem prodidit ijs uerbis. Mezzerion bibitur cum uino ad morsum uermium uenenosorum, et est proprie nigrum, uenenum mortiferum. Et quando miscetur cum sauiæ, et coniungitur cum aqua, et oleo, interficit mures, et canes, et porcos. hæc ille. In quibus duplici notatur errore: primò quòd Mezzerio eas tribuerit uitres, quas albo Chamæleoni reddidit Dioscorides: deinde quòd nigrum, non utique album ea præstare crediderit contra Dioscoridis sententiam.

Arabum tur-  
pis error.

Meminit utriusq; Chamæleontis Theophrastus libro 1x. cap. x. i. de plantarum historia, ubi sic habet. Chamæleonum, unus candidus, alter niger. Vires autem radicum inter se distant, et ipsæ etiam radices specie differunt. Candida enim candida est, et dulcis, et crassa, et grauius olens. Vtilis traditur ad fluxiones, cum confecta orbiculatim modo raphani decocta est, iunco transfixa in seriem. Valet et ad interaneorum animalia lata, cum passula uina cetera acetabuli mensura è uino bibitur austero. Occidit et canes, et sues: canes in farina hordeacea subacta cum aqua, et oleo: sues cum brassica. Et si hominem egrescentem experiri uolueris, an uiuere possit, lauandum ea radice triduo bent. Hoc enim si tolerauerit, moriturum nequaquam existimant. Nascitur æquè omnibus locis, folio scolymis simile, uerum ampliori, et terra proximo: capite magno, acano simili: unde quidam acanum eum uocant. Niger suo cõstat adsimili, præter quàm quòd minori, leuiorq;. Tota autem herba umbraculi speciem repræsentat: radice crassa, et nigra extrinsecus, substaua intrinsecus nititur. Loca gelida, humidatq; amat. Lepram, et uirilginem abolet cum aceto, et ramentis illita: necnon et canes occidere potest. hæc Theophrastus. Illud insuper non ignotandum est, uiscum scilicet, quòd Ixiæ appellant, in Chamæleontis albi radice nascens, uenenum esse mortiferum, cum

modica tamen quantitate sumptum somnolentos uigilantes reddat. Quamobrem Cretenses mulieres suarum lubricationum gratia, ne somnum incant in opere, ex eo tantillum, aut modicum à coena nullo incommodo assument. Nam pietusque locis meminit Plinius, & de eo nusquam non intellexit, ubi contra sumptum uiscum aliquod remedium protulit.

## Κροκόδειλον. CROCODILIVM. Walt Distal

CAP. X.

CROCODILION chamæleontis nigri figuram habet. Nascitur in syluosis, radice longa, leui, aliquantulum lata, odore, ut nasturtij, acuto. Feruefacta in aqua, & pota radix, sanguinem copiosum per nares pellit. datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen ei rotundum inest, duplex unscutum: quod suapte ui urinam ciet.

SYNT qui uelint, Carlinam uulgo uocatam, eam inquam, quæ caulem profert, legitimum esse Crocodilium. Sed eorum opinio mihi quidem nullo modo satisfacere potest. Siquidem (ut præcedenti capite retulimus) Carlina, quæ eadem emittit, adeo omnibus in uniuersum notis chamæleontem nigrum representat, ut uix nunquam persuaderi possit, eam esse Crocodilium: præsertim cum facto periculo ijs sanè uiribus careat, quibus Crocodilium præstare scribitur. nempe quòd radice decoctum potu sanguinem per nares copiosum trahat. Adde quòd Crocodilio radix sit longa, leui, aliquantulum lata, & odore, ut nasturtij, acuto. Illi uerò Carlinæ generi crassa, nigra, densa, exesaq: non eadem lata, nec leuis, nec nasturtij odorem spirans. Non desunt alij, qui Eryngium marinum Crocodilium existimēt. Verum cum illud in litoribus maris nascatur, chamæleoni nigro sit absimile, nec sanguinem è naribus eliciat; Crocodilium uerò proveniat in syluosis, compluribus alijs reclamantibus notis, ijs etiam haud quaquam adstipulari possum. O quam magis facerent medici Crocodiliū, si in Italia nasceretur, ubi tamen hætenus ipsum uidere non licuit, cum eius radice decoctum tāta sit facultate præditum, ut potu tantum sanguinem copiosum per nares pellat. Crocodilij meminit Plinius libro xxviii. cap. viii. non tamen plura tradidit, quàm Dioscorides, à quo illa omnia accepisse uidetur: quanquam in hoc ab eo dissentit, quòd Crocodilium in sabuletis nasci prodiderit, cum tamen in syluosis nasci scribat Dioscorides. Huius facultates libro vii. simplicium medicamentorum memorie prodidit Galenus, sic inquit, Crocodilij semen acre est, atq; odoratum, urinam, mensesq; ciens. Itaq; facultatem habuerit calidam, digerentem, & excrementis. Succus tum è caulibus, tum seminibus, ut quæ similis sint facultatis, nephriticos adiuuant. Radix pectoris excretionibus ualenter conducit, minus quidem quàm semen acris, non tamen minus amara. Trahit uerò etiam per nares sanguinem.

Crocodilij opinio explorata.

Alia opinio reprobat.

Crocodilij uires ex Gal.

## Δίψακος. DIPSACVS, SIVE LABRVM VENERIS. CAP. XI.



DIPSACVS aculeatarum generis est. Caulem habet altum, spinis horridum: folijs lactuca, spinosis, binis, genicula singula complectentibus, prælongis, cæu quasdam bullas intus, & extra aculeatas, in dorsi medio habentibus, concavo alarum sinu, in quo imber, aut ros asseruetur: unde dipsaci, quasi sitientis, nomen trahit. In cacumine caulis, singula furculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis: quæ arefacta, candida spectantur, dissecta que medulla tenuis, vermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis, fistulasque, si rufa, & decocta in vino radix, usq; dum sit crassitudo cæta, immittatur. Medicamentū zrea pyxide recondendum. Aiunt fornicationibus, uerrucis que pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo alligati collo, aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

DIPSACVS, quem Latini Labrum Veneris uocant, in Italia vulgaris est planta; ijs præcipue locis, ubi lanificia exercentur. Siquidem echinato eius capitulo mangones rudem adhuc pannū pectunt, expoliunt, detrahisq; floccis concinnant. In Hætruria Dipsacū uulgo appellant Cardo da cardare. Foroiulenses uerò Garzo. Seritur is hodie in compluribus Italiæ locis, præsertimq; in agro Bononiensi, singulari à cultoribus adhibita diligentia. Sed & syluestris quoq; sponte in campis, in agrorū, & scrobium aggeribus, in uijs iuxta sepes frequentissimus nascitur, nullis prorsus repugnantibus notis, quas illi reddidit Dioscorides. Inuenitur autumni tempore (ut experientia quenque docere potest) in eius capitulo iam exarefacto, medullitusq; dissecto

Dipsaci confectio.

Virga pasto-  
ris capulex.


Silustici hallu-  
cinano.

Dipsaci vires  
ex Galeno.

sesto uermiculus ille, quem collo adalligatum quartanis febribus remedio esse produnt, piscatoribus hanc affigunt maxime expetitus: etsi Marcellus Dioscoridis interpres, & commentator, uermiculum hunc nunquam sibi conper-  
tum fuisse scribat. Dipsacus officinis, & herbariorum uulgo Virga pastoris maior nominatur. Quippe minoris  
tiam illius amulam ostendunt: quanquam non adeo striato caule, ac spinis horrido constet, folijs item uermiculis,  
& capribus multo minoribus, ut quæ oliuæ magnitudinem non excedant. Sunt autem huius capitula tenuibus capi-  
lis referta, ita ut sericis uiridi colore infectis floccis similia uideantur. Ceterum animaduertendum est, neutrum Di-  
psaci genus, quod tum Serapioni, tum Auicennæ describitur, esse Virgam pastoris. Quandoquidem ijs, quæ ex  
eorum scriptis colligere potui, Pastoris uirgam nil aliud esse putauimus, quam polygonum, cuius tam formæ, quæ  
maris historiam lib. quarto tradidit Dioscorides. Quapropter illud mihi semper persuasum uelam, quod non à Ma-  
ritanis Dipsaco Virgæ pastoris nomen inditum sit, sed à seplasiarijs ijs, qui suis potius pandectis, quam cæteris  
gatissimis, & probatissimis scriptorum monumentis, fidem præstare consueverunt. Namq; Matthæus ille Silustici  
pandectarum autor, Dipsacum Virgam pastoris appellat: qui deinde in grauiorem errorem lapsus, Dipsacum  
sum cum polygono turpiter confundit, utpote qui illud assequi non potuerit, quod Arabum Pastoris uirga, est Di-  
oscoridis polygonum, non autem Dipsacus, qui quidem tantum à polygono differt, quantum lepores ab ursis. Di-  
psaci meminit Galenus libro v. simplicium medicamentorum his paucis. Dipsaci spinæ radix secundo ordine ex-  
icatoria est, habetq; nonnihil absterforium.

Αγκυρα λευκη. SPINA ALBA.  
Frustrum S. Mariæ Dipsaci

CAP. XII.



Spinæ albæ  
consideratio.

SPINA alba nascitur in montibus, & syluosis. Folia fert albi-chamæleonis, angustiora, candidiora, aliquantum hispida, & aculeata: caulem supra bina cubita altum, pollicari, aut ampliore crassitudine, al-  
bicantem, intus cauum: in cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & ob-  
longum: flores purpurei, in quibus semen, cœci-  
cum, sed rotundius. Huius radix pota, cœliacis, sto-  
machicis, & ijs, qui cruenta extulsiunt, efficax est: vi-  
nam est: tumoribus illinitur. Decocto eius dentes in  
dolore collui prodest. Epotum semen conuulsis in-  
fantibus, & à serpente demorsis auxiliatur. Gelta-  
tum pro amuleto serpentes abigere traditur.

SPINAM albam seplasiarij Arabas (ut plerumq; solem)  
imitati, Bedeguar appellant. Sed non parua inter hos, & medi-  
cos oritur contentio, quænam in aculeatarum genere, quæ plu-  
rimis genuit natura, Spina alba legitime, notis omnibus adspice-  
lantibus, appellari possit. Verum, etsi tantam litem transigere  
nequeant, interim tamen pro Spina alba alij alias herbas opta-  
tant, & quisq; suam ueram existimat. Quandoquidem simi-  
rum complures, qui sibi certo persuadent, Spinam albam eam  
culeatam herbam esse, quam aliqui Carduum benedictum necesse  
alij uerò uulgo herbæ Turcæ. Sunt alij, qui Carlinam uocant,  
id est album chamæleontem, Spinam albam esse contendunt. Ut-  
ter quos inuenio monachos, qui in Mesuem scripserunt quorundam  
sententiam, superius in chamæleontis utriusq; mentione, uisita-  
sam reprobauimus. Sunt præterea, qui Spinam albam esse uolunt  
echinatam illam, ac spinis rigentem herbam, quæ Hetruscis in

lacte cogendo coaguli uicem explet. Non desunt insuper qui unam, uel alteram syluestrem, ac spinis horrentem plan-  
tam, pro Spina alba nullo discrimine accipiant. Quo fit, ut omnes in nullo ueritatis lumine ducti, in huiusmodi reser-  
bris oberrent. Errat, meo quidem iudicio, hac in re Leonardus Fuchsius ætatis nostræ medicus aliqui clariorum  
quippe qui ultimo suorum paradoxorum capite, Spinam albam eam aculeatam herbam appellat, quæ omnium in unam  
fion aculeatarum plantarum generum amplissimis constat folijs, late humi se spargentibus, ac crebris, albisq; scle-  
theis tota confersa maculis. Vnde apud quosdam Lactariæ herbæ nomen aduenit, etsi à quàm plurimis, præsertim  
mulierculis, Carduus diuæ Mariæ dicatur. Hallucinatur inquam, pace eius dixerim, eo quod non animaduertit,  
hanc folijs albi chamæleonis triplo, quadruploq; maioribus in campestri planitie nasci, ut nostra testatur Hetruria,  
ubi passim ferè frequens nascitur, non autem in montibus, ac syluis, ubi Spina alba Dioscoridis testimonio prouenit.  
Ego uerò, qui à Dioscoride ne latum quidem unguem recedere soleo, in syluosis montium iugis spinam albam legitime  
oriri, mihiq; inibi compertam fuisse existimo, folijs albi chamæleonis similibus, angustioribus tamen, ac candidioribus,  
subhirsutis, spinis rigentibus: caule uerò bicubitali, pollicari, uel ampliore crassitudine, sub albo, & inani: in cuius ca-  
cumine echinus subalbidus insidet, sed minor, & oblongior, purpureis intus floribus, et semine cnico simili. Hanc plan-  
tæ descri-

Fuch. lapsus.

Carduus S. Mariæ



ne descriptioni, quæ etiam Dioscoridis est, adstipulantur frequentissimæ plantæ, quæ suis echinis, ac spinis rigentes, in excelsioribus Ananise uallibus montibus Lariceis, abiegnis, & piceis syluis refertis Iulio mense uisuntur. Quapropter, et quæ ad eos pertinent, recte agant seplasiarij, uideant, sciantq; non in planitie, & conuallibus Spinam albam proserere, sed in montibus, quorum si quandoq; tum cacumina, tum syluas adire non grauantur, procul aubio non magis etiam labore ipsam nanciscuntur, quemadmodum et ego inibi eam sepius reperi. Hæc enim non modò seplasiarijs maxime conducet, ut legitimam Spinam albam suis compositis medicamentis immisceant; uerum et eorum errorem deprehendunt (in hoc etiam Ruellius uersatur) qui sibi persuadent, Spinam albam illud esse cardui genus, quod à Tursis, eo quòd (ut paulò antè diximus) coaguli uicem præstet, uulgò uocatur Presura. Error autem ijs facile deprehenditur, si illud adnotare uoluerint, quòd aculeata hæc planta in hortis passim seratur, folijs albo chamæleonti longe maioribus, & capitula ferat, quæ marinum echinum nò parum excedant. Commiscuit Mesues spinam albam, ac etiam Arabicam, quarum alteram suo idiomate Bedeguar, alteram uerò Suchaa appellauit, syrupo de eupatorio uocato, quem miris laudibus extulit ad diuturnas febres finiendas, ad eas præsertim, quibus naturalia uiscera, nempe sentriculus, & iecur imbecillia sint reddita; & ubi à sua naturali temperie recefferint. Cuius tamen sententiæ non parum refragatur Musa Ferrariensis: quippe qui longo sermone contendat, nec Arabicam, nec albam spinam huic syrupo admiscendam esse, quòd utraq; adstrictoria ui polleat, quæ (ut ipse ait) syrups huius intentionibus admodum repugnat, cum ad diuturnas obstructions tantum referandas, semper huius apud medicos fuerit usus. Quæ in re non solum ostendit Musa auctoris mentem non percepisse, sed nec etiam in hoc (pace utrius alioqui clarissimi dixerim) exacta carentorum morborum ratione calluisse. Nam cum Mesues syrupum hunc cõposuisset ad illas curandas febres, quibus naturalia uiscera imbecilla sunt reddita, optima componendi methodo tam Spinam albam, quàm Arabicam illi inferuit, ut utraq; adstrictoria ui, qua polleat, languida illa, ac infirma membra, plurimum roborarent. quibus incommodis solent perire, ac docti medici ijs medicamentis occurrere, quæ odore fragrantia adstrictoria facultate commendantur. Hinc itaq; facile intelligi posse crediderim, quàm absurda, explodendaq; sit hæc Musæ sententia. Quin nec illud consistam eius seplasiarijs accipiendum putauerim, quòd spinæ albæ, et Arabicæ loco, filicule radicæ, ac sabine folia huic syrupo substituere possint, & debeant, ut magis, atq; magis tum uasa, tum uiscera laxet. Quippe quòd si tantum laxandi, ac referandi facultate hoc medicamentum debuisset esse præditum, non modò harum spinarum radicibus carere debebat; sed etiã rosæ, lentiscina resina, Indica nardo, et malabatro expoliari: cum tamen hæc omnia maturè, diligenterq; examinata, non sine methodo, ut quæ robur his uisceribus allaturæ sint, ab ipso Mesue huic syrupo fuerint admixta, ne scilicet natura diuturna febre imbecillis facta, & à relaxantibus, ac admodum referantibus medicamentis uexata, totam humorum molem alui profluuio ob contentricis facultatis amissum robur, tanquam uiribus omnibus destituta ad mortem usq; demitteret. Meminit Spinæ albæ Galenus libro v. simplicium medicamentorum, sic inquit. Spinæ albæ radix deficcatoria est, & modicè adstringens. Quamobrem & coeliacos, & stomachicos uiuat, & sanguinis reiectiones cohibet, & edemata illita contrahit, ac dentibus dolentibus prodest, si decocto eius colluantur. Semen tenuis essentie, & calide facultatis est. Itaque potum ijs, qui conuelluntur, conuenit.

Quorundam error.

Brauaoli calumnia cõtra Mesuem.

Spinæ albæ, uires ex Gal.

### Αραβία αραβική. SPINA ARABICA. *Egyptia* CAP. XIII.

ARABICAM spinam natura albæ spinæ similem esse constat. Ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, cæterasque fluxiones radix etiãnum ualeat. Prouenit in asperis.

ERRASSE eos nimirum crediderim, qui sibi persuaserunt, Arabicam spinam, cuius hic meminit Dioscorides, eam aculeatam Arabiæ esse arborem, quam Acaciam uocant. Cuius erroris illud in primis indicium est, quòd nusquam consueuerit Dioscorides alicuius stirpis historiam diuersis capitibus repetere, nec etiam arbores herbis commiscere. Nam cum longa historia Acaciam arborem, quæ etiam Aegyptia spina uocatur, primo libro inter arbores descripserit, absurdum quidem uideretur, si eandem præter morem hic inter aculeatas herbas repeteret. Ad hoc indicium et illa ratio accedit, quòd si seorsum harum plantarum historiam tradidit Dioscorides, diuersas quoq; plantas esse necessè est. Quamobrem non parum Ruellius hallucinatus deprehenditur, quòd non animaduertit, in sua huiusce Arabicæ spinæ mentione, Dioscoridem hoc loco aculeatam quandam Arabicam herbam albæ spinæ in uniuersum emulam intellexisse, non autem (ut ipse putat) acaciã nuncupatam. Quæ in re non satis uirum hunc admirari possum. quippe qui non modò Græcis, & Latinis literis sit habitus peritissimus, ac inter eos, qui hac nostra ætate de stirpium historia scripsere, facile princeps; sed qui etiam Plinij historie fuerit studiosissimus: quem tamen si accuratius perlegisset, ac sequi uoluisset, nunquam arbitror in eum errorem incidisset. Quandoquidem Plinius lib. xxiiii. cap. xii. alteram ab altera separauit. Et primò huius, de qua agimus, mentionem faciens, sic inquit. Spinæ Arabicæ laudes in eodem loco diximus: & ipsa strissat, stringitq; distillationes omnes, & sanguinis excreationes, mensiumq; abundantiam, etiamnum radice ualentior. Quæ à Dioscoride uerbotenens transulisse perspicuum est. Mox meminit Arabicæ ceteris spinæ, quæ in arborem assurgit, his uerbis. Est & Acaciæ spina. Fit in Aegypto alba, nigraq; arbore, item uires, sed longe melior est prioribus. Eiusdem meminit etiam libro xiii. cap. ix. postquàm Perseæ arboris materiem miris laudibus commendauit, ubi hæc habet. Nec minus Aegyptia spina celebratur in eadem gète, dumtaxat nigra, quoniam incorrupta etiam in aquis durat: candida uerò facile putrescit. Quibus ex locis palam est, non credidisse Plinium tantum Arabicam, uel Aegyptiam esse spinam, quanuis Ruellius non ita rem acceperit. Qui item Galeni sententiam hac in re non animaduertisse uidetur: siquidem Galenus lib. v. simp. med. ita scribit. Spinæ Arabicæ radix profluuium

Spinæ Arabicæ confid.

Ruellij hallucinatio.

profusum muliebre iuuat, et alia quæcunq; quibus auxilio est quæ apud nos nascitur spina: sed efficacius tamen omnia iuuant tum radix, tum fructus ipsius. Hic uero et columellæ prodest, et ijs, quæ in sede inflata sunt: tum, uelera et catarricem ducit, mediocrem habens, et non molestant adstrictionem. hæc Galenus. Qui ut has plantas diuersas habuit; ita etiam seorsum de earum uiribus disseruit.

Οὐρανίου

Στάχυος. CARDVVS. Artichaut CAP. XIII.

CARDVVS, Græci scolymon uocant, folia chamæleonis habet, & albæ spinæ, nigriora, & crassiora: caulem longum edit, foliosum, capite spinoso: radice nigra, & crassa. Quæ illata grauelentiam alarum, totiusq; corporis emendat: item si decocta in vino bibatur. copiosam autem uinam, foetidamque expellit. Herba cum recens tenerescit, in olera, asparagi modo, transit.

Carduorum  
consideratio,  
& genera.

ET SI unius tantum Cardui breuiter etiam hoc loco meminerit Dioscorides; Theophrasto tamen, Plinio, et alijs probatis autoribus, plura Cardui genera traduntur. Verum ut primum de his, qui natura cultrice sponte proueniunt, sermo fiat, scire sanè conuenit, quod eorum diuersa sunt genera, quorum tamen nomina propria, quod scilicet, non habentur. Atqui Plinio libro XX. cap. XXXIII. duo tantum eorum genera produuntur: unum fruticosum sicuti est terra: alterum uero unicaule, et crassius. Satiuorum autem, qui tum in hortis, tum in agris seruntur, multiplex est genus. Horum principem locum tenent, qui Hetruscis uulgò uocantur Cardoni. Namque ij diligenti cultura etiam teneri, fragiles, albique euadunt, ut magno quidem apparatu, secundis coenis pro bellarijs cum sale, et peper expetantur. Quo argumento ductus, equidem putauerim de his uerba fecisse Theophrastum libro VI. cap. IIII. de plantarum historia, cum ita scribit. Quæ autem Cactus nuncupata est, in Sicilia tantum nascitur, Græci nuscum habetur. Sui generis planta: hæc enim statim ab radice caules repentes in terram mittit, folio lato, atq; spinoso. Cæles hos cactos appellant. desquamati cibo idonei sunt, paulò amaricantes: et reseruare eos aqua salsa condicos consueuerunt. hæc Theophrastus. Nostrates, quibus ubiq; nunc Hetruria scatet, eò ex Neapoli allati fuerunt: Neapolim uero (ut audio) ex Sicilia. Quapropter nostri cum hoc Theophrasti genere maxime conuenire uidentur, quod scripserit, Cactum Siciliæ peculiarem esse plantam. Continentur præterea in Carduorum genere etiam ij, quos in Italia Hetruscum uulgus appellat Carciofi, alijs uero inibi Archichiochi dicuntur. quorum item meminit Theophrastus eodem loco, cum subdit. Alium uero caulem erectum producit, quem pternicem uocant. Is quoq; cibus aptus: excrecit, sed reseruari non patitur. Fructus, in quo semen, echinata specie est. Verum exemptis lanuginosis seminibus, is quoq; uescendus relinquitur, et cerebro palmæ similis est. hæc Theophrastus. Qui pro palmæ cerebro illud, quantum equidem reor, intelligit, quod Galenus encephalon pluribus in locis appellari tradidit, et quod nunc corrupta uoce Neapolitanis, et Siculis uulgò uocatur Cefaglione, de quo libro primo in Bdelij mentione abunde disserimus. Carduorum autem, quos uulgò Carciofi uocari diximus, nobis plura sunt genera, uariis capitis formis distincta. Siquidem proferunt omnes echinata capitula, sed aliqui spinis sursum respicientibus constant, alij uero ad terram uersis, nonnulli etiam aculeis uacant. Sunt præterea in hoc postremo genere, quibus echini in longum fissi, et extuberant, quibus uero in globum extuberant, debiscentibus in altero squamatis specie, in altero iisdem squamis, uelut cornu unguibus in unum compactis, et coagmentatis, nucis pineæ instar. Ex quo facile in eam sententiam deductus sum, et crediderim, hanc Cardui speciem postremam nucis pineæ emulam, esse Carduum pineam Theophrasto uocatum, quod in loco antè citato ita de ea scribat. Est Carduus pinea ab radice foligera: qua de media seminalis acanthis, uelut malum, extuberat. hæc ille. Ceterum Cardui aculeati genus et illud est, cuius echinati capitis floribus Hetrusci coaguli uice utuntur, etsi Cardui satui omne genus idem suis floribus præstet. Spinis caribunt, ut hortorum cultores testantur, Carduorum capitula, si priusquam seratur semen, acuminata eius latera retundantur. Sine aculeis etiam nascuntur, si delibratis lactucæ radicibus, et dissectis semina integra condantur. Vnde illud facile potuit factum esse, ut ij, qui aculeis non rigent, humano cultu mitiores euaserint, cum natura Carduorum omne genus spinis uacare nequeat. Cardui meminit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum: nec tamen plura de eius uiribus tradidit, quam fecerit Dioscorides. Sed de temperamento differens, ei caliditatis secundum ordinem completum, aut uerum incipientem; siccitatis uero secundum assignauit. Et libro II. de alimentorum facultatibus, Carduum Cinam appellauit, ac alimentum, quod corpori præbet, merito dannauit, quod melancholicum succum generet.

Cardui uires  
ex Gal.

Ποτερίου. POTERIVM.

CAP. XV.

POTERIVM, Iones neurada uocant, largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, tragacanthæ proximis: folijs paruis, rotundis: flore exiguo, candidi coloris: semine nullius usus, sed gustu acuto, & odorato. Nascitur in aquosis, & collibus. Radices demittit binum, ternumue cubitorum, neruosas, & firmas: quæ proximè terram recisæ, dant succum gummi similem. Tusæ, præcisus neruis, & vulneribus glutinandis illinuntur. Decoctum quoque eius neruorum affectibus prodest.

Poterij confi-  
deratio.

EX REI herbarie peritis hæcenus neminem reperi, qui Poterium in Italia nasci dixerit, atque ipsum ostenderit. Quamobrem facile crediderim, quod illud non procreet Italia. Nam si inibi nasceretur, fieri quidem non potuisset, quin hæc etas, quæ rerum cognitioni maxime dedita est, ipsum adinuenuisset: præsertim cum Dioscorides, ceteriq; scriptores Poterij faciem clare satis descriptam reliquerint.

Andreas.

ACANTHIVM albæ spinæ simile, folijs aculeatis per extremitates, † & lanugine arancosa obductis. ex qua collecta, & neta, uestes bombicinis similes texunt. Folia, vel radices ad remedia opisthotoni bibuntur.

QVOD Acanthium, cuius hic inter aculeatas herbas meminit Dioscorides, in Italia nascatur, equidem affirmare non audeo. Quandoquidem hactenus neminem inueni, qui folia alicuius aculeate herbe mihi ostenderit, quæ adeo arancosa, ac subtili lanugine obducta spectarentur, ut ex ea neta uestes bombicinis similes texere quis potuisset, ut hic Dioscorides, & libro XXI. cap. XII. testatur Plinius. Quamobrem ingenuè asserere non dubitauerim, eos magno in errore uersari, qui pro Acanthio quandam Cardui montani speciem, echino lanugine quadam obducto, demonstrant. Nam præterquam quod hæc folia habeat nulla lanugine uelata, nullo pacto quæ echinatum capitulum circumuestit, depecti, uel neri potest, utpote quæ tenuissima sit, sine ullis, fragilis, ac omnis lentoris experta. Verba illa de lanugine non leguntur in Græcis Dioscoridis exemplaribus: quæ tamen hic desiderari ostendit abruptus auctoris sermo. Unde ea non temerè ex Plinio adiecerunt interpretes, eius tantum, ut puto, auctoritate freti. Nos uerò eo audacius illa addenda putamus, quod ea legantur in Orbasij codice manu scripto, in quo ex probatissimo Dioscoridis libro ita transcripta inueniuntur. Ακανθ. αρακxοειδης εστι xvois. quæ ad uerbum sonant. Cuius quæ arancosa est lanugo.

Acanthij consideratio.

Quorundam error.

ACANTHVS, Romani pæderotam uocant, nascitur in hortis, petrosis, & riguis. Folia habet multo lactucaceis latiora, & longiora, erucæ diuifura, nigricantia, pinguis, læuia: caulem binum cubitorum, digitali crassitudine, læuem, prope uerticem ex interuallis circumdatum foliolis, ceu nucamenta quædam oblonga referentibus, spinosis, ex quibus flos prodit albus: semen oblongum, luteum: caput thyrsi specie: radicibus nititur longis, mucosis, rubris, & glutinosis. Quæ uis igni, & luxatis artubus illitæ subueniunt: potæ urinam ciunt, sed aluum cohibent: ruptis, conuulsis, tabem sentientibus, mirè profunt. Nascitur & syluestris Acanthus, scolymo similis, aculeatus, breuior quam satiuus, & is qui in hortis prouenit. Cuius radix ad eadem ad quæ superior efficax.

CREPVNT omnes ferè huiusce temporis rei herbarie studiosi, Acanthum eam esse plantam, quæ nobis uulgò uocatur Branca ursina. Quorum sententiæ nec prorsus refragari, nec planè adstipulari possum. Nam etsi in eorum opinionem multis adducar rationibus, non soliam quod ij magnæ sint apud me auctoritatis; sed etiam quod ipse uiderim hanc, quæ Branca ursina dicitur, folijs lactuca latioribus, longioribusq; erucæ modò laciniatis, nigricantibus, ac molli quodam læuore pinguib; caule item læui, bicubitali, pollicari crassitudine, per interualla sub ipsum usq; uerticem foliolis quibusdam oblongis, ueluti nucamentis, circumdato: è quibus flos prodit candidus, & inde semen oblongum, luteumq; atq; etiam radice eadem constet, quæ Acanthus; aliqua tamen relinquitur dubitatio, an Branca ursina legis-

Acanthi consideratio.



si sit Acanthus, cum foliola, quæ nucamenti instar illius caulem cingunt, nullis spinis horrida conspiciantur, plantæ ipsa uideatur topiarijs operibus inepta, ad quæ Acanthus olim (ut Plinius libro & cap. XXII. auctor est) conueniens habebatur, ac etiam ea hodie ab omnibus ferè negligatur, et ueluti ignobilis planta, in perpauca tum hortis, tum arborijs seratur, cum apud antiquos Acanthus celebris, & in magno honore habitus sit, ac plurimis laudibus fuerit decuratus. Neq; illud suspicionem nostram diluit, quod dixerint aliqui Acanthina folia, quæ in quibusdam Italiæ locis memoratis columnis, præsertimq; Corinthias imitantibus, insculpta reperiuntur, nulla prorsus lineæ à Branca ursinæ folijs differre. Siquidem contra ijs quispian facile respondere posset, quod etsi utraq; eandem retineant formam; non ob id tamen necessariò unam, & eandem speciem representant. Quare quemadmodum dubium est asserere, Brancam ursinam ab Acantho non differre; ita idem negare uerum esse uidetur. Ceterum ad hanc tollendam dubitationem non parum, meo iudicio, facit, quod iisdem facultatibus Branca ursina prædita sit, quibus pollere Acanthum Dioscorides, & Galenus memoriæ prodiderunt. Illud insuper addiderim, quod etsi dicat Dioscorides, oriri Acanthum caule

caule foliis spinosis, ceu nucamentis, prope uerticem usq; ex intervallis circumuestito; potest tamen intelligi, quod non re uera foliola illa aculeis horreant; sed quod adeo acuminata erumpant, ut sanè spinis persimilia uideantur. Id quod facile credi potest, cum ceteris omnibus notis Branca ursina Acantho à Dioscoride representato admodum respondeat. Neq; impedit, quod loco citato asserat Plinius, Acanthum in hortis crepidines marginum, assurgentem; puluinorum toros uestire. Quauis enim neci haud facile ex se ualeat; tamen tum caulis, tum folia ob eorum modum, lentoremq; adeo flecti queunt, ut uimineo aliquo nexu topiario operi etiam non incommode aptari possint. Est itaq; rationibus innixus, eos equidem non aberrasse existimo, qui Acanthum, et Brancam ursinam, unam et eandem plantam esse scriptis tradiderunt. Repertum et sylvestris Acanthus carduo (ut Dioscorides inquit) similis, spinosus, folijs tamen domestico angustioribus. Quocirca non ab re Plinius quoq; duo Acanthi genera constituit. Acanthi meminit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, sic inquitens. Acanthos, alij quidem Melampyrum minant, alij uerò Pederota. Folia quidem mediocriter digerentem facultatem obtinent. At radix exiccata est, et leuiter incisoria, et tenuium partium.

Acanthi facultas ex Gal.

ANONIS, SIVE ONONIS. CAP. XVIII.



Anonidis consideratio.

Restia bonis.

ANONIS, quam aliqui ononida appellant, ramos habet fruticosos, dodrantales, aut maiores, frequentibus geniculis cinctos, caulis alarum multis, capitibus rotundis, folijs lenticulae, tenuibus, pusillis, ad ruz, aut pratensis loti folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non iniucunde olentibus. Muria conditur, atque spinosa fiat, cibis gratissima. Rami acutioribus spinis, et veluti spiculis firmioribus horrent. Radicem mittit candidam. Quae excafcit, et extenuat. huius cortex ex uino potus urinam citet, calculos comminuit, margines ulcerum erodit. Radix cum decoquitur in posca, dolorem dentium collutione mitigat. Decoctum eius potu haemorrhoidas sanare creditur.

NASCITUR Anonis in pratibus, cultis, atq; etiam incultis locis, arido praesertim solo: folijs tenuibus lentis modo, pusillis, quae ad ruz, uel pratensis loti effigiem proximè accedunt, et ceteras omnes notas refert, quibus à Dioscoride depingitur. Restia ob id notissima est, quod non modo suo ramorum, ac radicis implexu, aratra iniucis bubulcis in medijs agrorum sulcis sepius remoretur, unde Restia bonis compluribus nominatur; sed quod etiam messoribus, et foenisecis spinis suis acutis admodum sit infesta. Nam etsi praedura, callosaq; sit eorum cutis; eam tamen saepe perforat aculeis, quibus quasi spiculis, cum maturuerit, horrida conspicitur. Insuabres hanc uulgo Bonaga uocat. Ceterum quauis floris eius nihil meminerit Dioscorides; constat tamen florere plerumque purpureo, subalbicante, interdum tamen auro. Sed haec quibusdam in locis aculeis uacat. Meminit Anonidis ononidis nomine Theophrastus lib. vi. cap. v. de plantarum historia, scribens. Ononis ramis aculeigerum est, anno tantum perdurans, folio ruzae similis, sed per totum caulem appropinquans, ut ueluti coronam ex intervallis tota species representet. Florem minutulum, et in siliqua non undiq; sepiam est. Nascitur glutinoso, latoq; solo, et praecipue in segetibus, atq; cultis: qua de causa agricolis inimica exit. Vixit et modum est. Cum enim altam nacta tellurem fuerit, protinus sua infima pellit: et singulis annis, surculus in latas creffis, rursus postero anno deorsum uersus pellere solita est. Ideoq; effodienda tota, extirpandaq; penitus est. Incipit germinare estate, perficiturq; autumno. haec tamen Theophrastus. Huius quoq; mentionem fecit Plinius lib. xxvii. cap. iiii. ubi sic inquit. Anonim, quidam ononida malunt uocare, ramosam, similem sceno Greco, nisi fruticosior, bisfatioreq; esset, odore iucundo: post uer spinosa. haec Plinius. Qui tamen hac in re errasse deprehenditur: siquidem non post uer Anonis spinosa reddatur, sed (ut Theophrastus autor est) in autumno. Id quod etiam experientia comprobatur. Anonidis radix uim maximam praestat ad renum calculos comminuendos, expellendosq; obstructis praesertim urinae meatibus. quod multorum testimonio compertum est, qui calculo affecti, ubi tantum radicis corticem pauerem ex uino diutius bibissent, pristinae sanitatem recuperarunt. Noui ego quendam, qui huiusce radicis puluere diutaxat pluribus mensibus sumpto, carnosum ramum absumpsit, et sanatus est: licet à medicis nullo alio medicamento, quam sola sectione, unctioneq; hunc curari posse antea statutum esset. Anonidis uires descripsit Galenus lib. vi. simplicium medic. sic inquitens. Ononis radicem habet tertio quadantenus ordine excafcientem. Cortex eius maxime est utilis, habens quippiam et abstersorium, et incisorium. Proinde non tantum urinas promouet: sed et lapides confringit. Eadem facultate et crustus cito detrahatur. Utuntur porro ea quoq; et ad dentium dolores, et coxerato decoquentes, et collui decocto iubentes.

Anonidis uires ex Gal.

LEVCACANTHA, prædita est radice cyperi, valida, & amara. Quæ manducata dolorem dentium sedat: veteri laterum dolori, atque ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex vino potio. Eadem ruptis, et conuulsis medetur. Radicis epotus succus eisdem præbet effectus.

IN manifesto errore uersantur, qui sentiunt, Leucacantham, hoc est, albam spinam, de cuius historia, et uiribus hoc capite tractatur, ab Acantha leuce, id est, spina alba, de qua paulo superius differuimus, nullo pacto differre. Quæ in sententia, uel potius errore, fuisse nonnulli ex recentioribus, aliqui rei herbarie periti. In quorum etiam numero Ruellius fuisse ex eo maxime deprehenditur, quod cum debuisset, more suo, post Anonidis tractationem, cuius titulo spinam albam quoque adiunxerat, quam tamen albam spinam nominasse rectius forte erat, eiusdem albe spinæ historiam referre, ex industria eam silentio præterijit. Nam cum existimasset, alteram ab altera non distingui, non opus esse iudicauit, earum historiam in Alba spina repetere, quam antea in Spina alba mentione tradiderat. Quo tamen in loco ab errore uindictari non potest: quippe quoniam, postquam spinæ albe, quam Mauritani Bedeguar appellant, meminere, alteram eius nominis spinam subdidit, quæ cum in arbuscum undique aculeis armatum assurgat, sepibus extruendis rusticis nostratibus maxime expetitur. Non tamen ob id declarat ipse hanc esse Leucacantham: sed lubrico quodam lapsu, quasi sui ipsius, et cuius spinæ albe mentionem faceret, oblitus, in capitis calce aculeate illius arbuscule radicibus, quæ (ni fallor) candida est Dioscoridis rhamnus, omnes tribuit facultates, quibus legitima spina alba à Dios-

Leucacanthæ consider.

Ruel. lapsus.



scorde commendatur. Qui quidem Ruellij error omnibus euidentior est, quam ut pluribus refelli possulet. Quod autem differant inter se Acantha leuce, et Leucacantha, non modo Dioscorides inter ceteros simplicium medicamentorum scriptores facile princeps ostendit; sed Galenus etiam, et Paulus, qui præterquam quod alteram ab altera diuersis capitibus distinxerunt, earum singulam differentibus facultatibus præditam esse tradiderunt. Quorum sententiæ subscribit Plinius: nam de Acantha leuce differens lib. xxiiii. cap. xii. sic inquit. Spinæ albe semen contra scorpionum auxilium. Corona ex ea imposita capitis dolores minuit. Sed uires longe alias ab his Leucacanthæ idem retulit libro xxii. cap. xvi. ubi sic habet. Leucacantham alij phyllon, alij ischiada, alij polygonaton appellant, radice cyperi, quæ manducata dentium dolorem sedat. Item laterum, et lumborum (ut Nicestus tradit) semine potio drachmis octo, aut succo. Eadem ruptis, conuulsisque medetur. hæc Plinius. Quæ quidem iudisse debuerat Ruellius aliqui Pliniani historie studiosissimus: aut certe Hermolao doctissimo uiro credidisse, à quo (etsi nunquam illum citet) integra quandoque capita, imò (pace eius dixerim) integrum ferè surripuit opus, ita ut is omnibus illud suum fecisse uideatur. Siquidem Hermolai cum in Leucacantha, tum alias se penumero commouit in suo Corollario, hanc ab acantha leuce differre. Porro illud etiam nobis silentio non dissimulandum, ut ingenuè quod sentimus de simplicibus dicamus, quod Leucacantha herba est, non autem arbuscula sepibus conficiendis idonea, ut falso, mea quidem sententia, Musa Brasauoli suo de syrupis libello in eupatorii syrupo existimat. Nam hoc loco de herbis tantum, et non de arbusculis scribit Dioscorides: qui nimirum in stirpium historia peritissimus, arbusculam illam supra libro primo inter Rhamnum generatè descripsit, et sub candido, ut puto, complexus est. Ceterum cum nec Dioscorides, nec Plinius tradant, quibus folijs, quo caule, flore, ac semine Leucacantha proueniat, difficile quidem fuerit inter tot aculeatarum stirpium genera, non tam secernere, quæ uerè Leucacantham representet. tamen si damnandus usquequaque non esset, qui dixerit Leucacantham esse fortasse aculeatum illum Carduum, de quo in Acantha leuce diximus, cuius folia albis quibusdam maculis depinguntur. Nam præterquam quod coniectura quadam dici posset, eam à maculis illis albicantibus sibi Leucacanthæ nomen aduenisse, radicis etiam ipsius tum durities, tum amaritudo, etsi forma cyperinas non emuletur, consentire uidentur. Sed hoc potius disputandi, quam asserendi gratia proponimus: cum adhuc nihil certi nobis compertum sit.

Brasauoli error.

Leucacanthæ uires paucis perstrinxit Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Leucacanthæ, quædam autem polygonaton, alij ischiada nuncupant. Huius amara radix est, ac proinde incidit, et exicat in tertio ordine: in calfaciendo autem ex primo est ordine.

Leucacanthæ uires ex Gal.



Τραγανθα. TRAGACANTHA. *Dioscorid.* CAP. XX.

TRAGACANTHAE radix lata, & lignosa, summo cespite nititur: vnde furculos humiles robustos, latissimè fundit: in quibus minuta folia, multa, nonnunquam tenuia exoriuntur: quæ sub se spinas albas, rectas, & firmas occulunt. Est etiãnum tragacantha lacryma, quæ vulnera radice manans, concreuit. Præstat pellucens, gracilis, lævis, syncera, & subdulcis. Cutis spiracula, ut gummi, obstruit. Huius increbuit usus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas voces, cæterasque destillationes, cum melle in delinctu: subdita quoque lingua liquefit. In passo madefacta, drachmæ pondere bibitur, cõtra renum dolorem, & uellicæ rosiones, mixto cornu cerui usto, & eloto, aut scissi aluminis momento.



Tragacanthæ  
consider.

Monachorū  
erratum.

Tragacanthæ  
uires ex Gal.

TRAGACANTHAE plantam ex Apulia allatam misit ad nos hoc anno excellentissimus medicus herbarumque non ignarus Augustinus Alpagus Bellunensis, quæ nullis sanè notis à Dioscoridis historia dissentit, ut ex præseni pectura, omnibus liquidò constare potest. Ceterum lacryma è vulnerata radice manans, quam seplasiarj uulgo nuncant Gomma draganti, passim in officinis concreta uisitur, è Creta, Asia, & Græcia aduecta. At non modò hæc (ut Dioscorides inquit) è vulnerata prius radice manat; sed etiam sponte (ut Theophrastus est author) ab ea scissimiliter cortice distillat. Sed hanc, qua utimur, Monachi illi reuerendi, qui in Mesuem commentarios ediderunt, uerum esse Tragacanthæ lacrymam negant, quod legitima lingue subdita facile, Dioscoridis testimonio, colliquefit: hæc uero nunquam, cum lingue supposita adeò lenta, tenaxque euadat, admixta salua, ut nullo ferè temporis tractu dissolui quarique possit. Qua quidem in re ij (pace eorum dixerim) toto cœlo aberrant, ut qui Dioscoridis sententiam perperam acceperint. Siquidem Dioscorides non de sola lacryma lingue subdita, sed in eclegmate cum melle confirmat, illud fieri scribit, cum inquit. Vfus eius ad oculorum medicamenta, ad tussis, exasperatas fauces, retusas voces, cæterasque destillationes, cum melle in delinctu: liquefitque subiecta lingue. hæc Dioscorides. Ex quibus palam est uoluisse Dioscoridem Tragacanthæ lacrymam non solam, & per se tantum, sed in eclegmate cum melle paratam lingue esse subiiciendam, ut clarissimorum medicorum institutione fieri adsolet cum beebicis catapotijs, & diatrachacanthæ trochiscis, quibus ipsa commiscetur. Quippe cum oporteat medicamenta, quibus aspera arteria, pulmo, ac pectus uisum expurgari debent, quadam temporis diuturnitate ore retenta, uel lingue subdita sensim, leniterque liquefcere, ut commodè in tracheam percolentur arteriam, uoluit hic Dioscorides eclegmatis usum recta methòdo describere. Nam si huiusmodi medicamenta deuorarentur, nihil prorsus proficerent, cum ita non in pectus & pulmones deferantur, sed in uentriculum. Huic & alia accedit ratio, quòd si intellexisset Dioscorides lacrymam per se tantum lingue submittendam, subiunxisset quidem, ut sui moris est, quibus in morbis id faciendum esset. quandoquidem planè absortum uideretur scribere, quòd aliquod gummi lingue subiiciatur, paulatimque liquefcere cogatur, ac deinde silentio remouere, quibus in morbis id faciendum. His itaque rationibus non modò rectè, meo quidem iudicio, intelligi potest uoluisse Dioscoridem, eclegma, quod Tragacanthæ lacrymam exceperit, lingue subiiciendum esse, non ipsam tantum lacrymam; sed etiam Monachos in hoc, ut aliàs sepe, deceptos esse. Tragacanthæ uires scriptas reliquit Galeus lib. viii. simplicium medicamentorum, his paucis uerbis. Tragacantha similem gummi uim obtinet, emplasticam quandam, & acrimoniam bebetiorem (legunt aliqui, quæ acrimoniam obtundit). Et sanè similiter illi deficcet.


Ερύγγιον. ERYNGIVM. *Dracopis* CAP. XXI.

ERYNGION aculeatarum generis est. Cuius folia in principio, sale condita, in cibos recipiuntur. Lata autem sunt, & extremo ambitu aspera, gustu aromatica: sed ubi adoleuerunt, circa complures caulium eminentias in spinas aculeantur. in quorum summitatibus globosa capitula, durarum, acutissimarumque spinarum ambitu stellatim circumuallantur, quorum colos aliàs uiridis

## ERYNGIVM.



## A L O E.



ridis, aliàs albus, interdum cœruleus inuenitur. Radix oblonga, lata, foris nigra, internè candida, pollicis crassitudine, odorata. Nascitur in asperis, & campestribus.

Vim habet calfactoriam. Pota menses, & urinas pel- lit: tormina, inflationesque discutit: cōtra iocinerum uitia, serpentium morsus, & hausta uenena, cum uino prodest: bibitur aduersus plurima, cum seminis pastina- cæ drachma una. appensa, illitave, tubercula discute- re proditur. Pota cum hydromelite radix, opistho- tonicis, & comitialibus medetur.

LONGE quidem aberrant seplasiarij Senenses in Eryngij cognitione, utpote qui pro Eryngij radicibus assumant aculeate cuiusdam stirpis radices, quam Cacatreppola uulgo uocat. Hinc error omnibus facile apprehenditur, quòd nulla penitus illius plā- te nota eryngio respondeat. Legitimum Eryngium, quod, meo iudicio, Dioscoridis descriptioni nihil refragetur, frequens inue- nitur prope Tridentina mœnia, ac in Goritienſi agro, quin & in compluribus Italie locis. Est et Eryngium marinū, quo Veneta litora undiq; referta spectantur. Assurgit hoc folijs altero latio- ribus, circumnato ambitu spinosis: radicibus longioribus, molliori- busq; saccharo asseruandis longè magis idoneis, quàm alterius. Huius tanetsi non meminert Dioscorides, Plinius tamen libro XXII. cap. VII. utriusq; historiam tradidit. Quo fit, ut eorum sententiam minime probauerim, qui Eryngium marinum Croco- dilium esse existimant, ut in crocodilij mentione superius diximus.

Eryngij con- sideraui.

Quorundam errores.

Sunt & qui credant, Eryngium Mauritanis à Secacul nō differ- re. Veruntamen ij quoq; hallucinantur: nam cum Serapio in ca- pite de Secacul, neq; Dioscoridem, neq; Galenum citet, quos maxi- me in simplicium historia sequitur, quorumq; dicta bona fide re- fert, sed tantum suæ gentis autoribus nitatur, clarissimum præ- bet indicium, Secacul diuersum fuisse, & plantam Græcis inco- gnitam. Siquidem si pro eryngio Secacul scripsisset Serapio, ei sa- nè non fuisset opus, paulò inferius de eryngio tractare ex Dio- scoridis, & Galeni sententia, magno uirium & notarium discrimi- mine. Quamobrem non parum falluntur, qui Secacul ab eryn- gio secernere nescientes, Eryngij radices tum saccharo, tum melle asseruatas ueneris infelicitè commiscent auxilijs, ut qui ede- rint, fortiores, salacioresq; reddatur. Quippe hac facultate E- ryngium præstare nusquam hætenus apud Dioscoridem, & Ga- lenum mihi reperire licuit, qua tamen pollere Secacul memorie prodiderunt Arabes. Cæterum animaduertendum est Serapio- nem Aſtera Atticum, siue Bubonium cū eryngio cōfudisse, stel- larum similitudine deceptum, qua cœruleo colore seinuicè amu- lantur: etsi quæ Bubonio insunt, nullis aculeis horreant. Mem- init Eryngij Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, sic in- quiens. Eryngium caliditate quidem aut parum, aut nihil, quæ temperata sunt, superat. Siccitatem uerò in tenui essentia consi- stentem non parum obtinet.

Eryngij uires. ex Galeno.

## ΑΛΟΗ. ALOE. CAP. XXII.

A L O E S. folium scillæ similitudinem habet, cras- sum, pingue, modicè latum, rotundum, retrorsus pan- dum: folia gerit curta, quæ vtrinque ex obliquo lon- gioribus interuallis striantur, & in spinulas desinunt. Caulis emittitur non dissimilis antherico: flos albus: fructus hastulæ regiz cognatus: graui tota est odore, & gustu amarissima: radice vna, ceu palo, in terrâ depa- cta. Plurima, præpinguisque in India gignitur, ex qua coactus succus adfertur. Nascitur etiam in Asia, & Ara-  
ce 2. bia in

bia in locis quibusdam maritimis: & in insulis (vt in Andro) non valde succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera sanè quàm utilis, si detrita illinatur. Duo succi genera: quoddam arnosum, quod sedimentum purissimè esse videtur: alterum ad iecinoris imaginè vergit. Eligi debet boni odoris, syncera, quæ nihil doli sensit, nitida, calculorū expers, rufi coloris, friabilis, ac iecinoris modo coacta, facilè liquefscens, eximie amaritudinis. Improbatur nigra, & fractu contumax. Gummi eam adulterant: quod deprehenditur gustu, amaritudine, & valido odore: coque arguimento, quòd digitis friata non ad minima usque frustra resoluitur. Nec desunt, qui acaciam immisceant. Natura eius est spissare, exiccare, somnum allicere, & corpora densare, aluum resoluit. Stomachum repurgat binum cochlearium mensura, in aqua frigida, aut egelida pota: sanguinis reiectiones sistit: regium morbum purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu: deuorata cum resina, aut cum aqua, vel melle cocto sumpta, aluum soluit: purgationis perfectæ carbis tribus drachmis sumitur. alijs purgatorijs medicaminibus admista, præstat, ut minus stomachum infestent: sicca glutinandis vulneribus inspargitur: vlcera ad cicatricem perducit, cohibetque. Eadem peculiariter exulceratis genitalibus medetur, & disrupta puerorum præputia iungit: condylomata, rimasque sedis ex passio sanat: hemorrhoidum abundantiam, & sanguinis eruptiones sistit: pterygia ad cicatricè ducit: liuores, & insignita ex melle tollit. Priuatim scabras lippitudines, pruriginisque angulorum permulcet: dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo: capillum fluentem continet cum vino: tonsillis, gingiuis, & omnibus oris vlceribus, cum melle & vino proficit. Oculorum medicamentis torretur in munda, & candenti testa, pennaque subinde versatur, vt possit æqualiter torreretur. Lauatur, vt quod sit arenosissimum, tanquam inutile: subsidat, & læue, ac pinguisimum assumatur.

Aloës consideratio.

Non dubium est, quin ea legitima sit Aloë, quæ passim officinæ utuntur. Nam electissima, ac purissima (adulterata enim quandoque etiam inuenitur) omnes præstat tum notas, tum vires, quæ syncerissimæ à Dioscoride assignantur. Aloë etate nostra in quàm plurimis Italiæ locis uirescere conspicitur, præsertim Romæ, & Neapoli, ubi super eduum fenestris, ac atrijs in fictiliibus uasis terra plenis alitur, ac fouetur ad spectaculum potius, quàm ad medicum usum. quemadmodum & herba Plinio Opuntia dicta, folio Aloë longè crassiori: quæ folio tantum implantata radices mittit.

Mesues à calumnia uindictus.

Inuehantur acerrimè in Mesuem Manardus Ferrariensis, et Fuchsius ipsum secutus, quòd affirmauerit ille, Aloë per os sumptam uenarum oscula adeò referare, ut inde postea sanguis facilè exiliat, cum id (ut ipsi aiunt) tum Dioscoride, tum Galeni placitis maximè repugnet. Verum quàm longè à ueritate descuerint, non multo quidem labore demonstrare possem, ni præter institutū nostrum id esse censuerim, niq̃; compertū haberem, illis prius rectè, meo iudicio, repositum fuisse à Iacobo Syluio clarissimo etatis nostræ medico in Mesuem scribentem, et à Grætionopolitano quodam. quoniam probatissimis rationibus Mesuem tuentur, ut non amplius Manardo, ac Fuchsio hic eum lacerandi locum reliquum que

Aloës vires ex Galeno.

putem. Aloës meminit Galenus lib. v. 1. simplicium medicamentorum, ubi sic habet. Hæc herba non admodum ex nos prohenit: & quæ nascitur in magna Syria, aquosior est, & facultatis imbecillioris: attamen usq̃; adeò desiccare potest, ut vulnera cōglutinet. At in regionibus calidioribus, qualis est Cœlesyria, & Arabia, multò est melior. Opuntia autem Indica, cuius liquor est id, quod ad nos importatur, medicamentum Aloë cognominatum, ad plurimas res, propter siccitatem mordicationis expertem, utile. Est autem non simplicis naturæ, sed ut indicio est gustus, adstringens simul, & amara est: adstringit quidem mediocriter, sed uehementer amara est. Subducit & uentrem, ut puta ex cetero medicamentorum, quæ Græci ab excernendo stercore uocant ἐκκρωστωτικὰ. Itaq̃; ex dictis patet (si quidem memoria tenemus, quæ in quarto libro sunt demonstrata) quòd tertij sit ordinis exiccantium, calfacientium autem aut primi intensi, aut secundi exoluti. Sed & ipsius facultatis misturam attestantur particularia eius opera: nam & uile stomacho medicamen est, ut si quid aliud: & sinus glutinat. Sanat & ulcera, quæ egrè ad cicatricem duci possunt, & maximè, quæ in ano sunt, & pudendo, luvat & eorum inflammationes aqua subacta, & uulnera eundem ad modum glutinat. Congruit similiter utenti & ad inflammationes in ore, ac naribus, & oculis. In summa, repellere, & digerere simul potest, cum hoc, ut paulim extergat, quantum uidelicet ulceribus puris non sit molestum. hætenus Galenus. Describit Aloë (ut Mesues autor est) non modò bilem; sed & pituitam ipsam. Caput, uentriculumq̃; mundat, quorum tamen cruciatibus maximè succurrit. Inflammato, æstuantiq̃; bilis redundantia uentriculo auxilio est. Quotidianus eius usus à mortiferis morbis tuctur. Vindicat à putredine, addita myrrha, non modò uiuentium; sed etiam defunctorum corpora. Cum draconis sanguine, & myrrha ulcera cōtumacia sanat, quòd sine morsu aliquo exiccare possit. Sensus omnes, & intellectumq̃; acuit, secur ab infarctu purgat, & regio morbo medetur. Hemorrhoidibus tanè, ac ceteris sedis inflammationibus nocet: quamobrem ijs ab eius assumptione abstinendum est, qui aliquam in illis partibus noxam patiuntur. hæc Mesues. Ceterum necat Aloë uentris tineas ex lacte, uel melle sumpta: aut umbilico tenus apposita, bubisio scilicet, & aceto subacta.

Ex Mesue.

ΑΨΙΝΘΙΟΥ. ABSINTHIUM. CAP. XXIII

ABSINTHIUM, aliqui bathy picron, herba vulgò cognita. Præstantius in Ponto, & Cappadocia, in monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi, & adstringendi. Bilem expurgat, quæ & stomacho, & ventri inhæsit: vrinam cit, & crapulam præsumptum arcet. ad inflationes ventris, & stomachi dolores prodest, cum seseli, & nardo Gallico potum: fastidia discutit, & arquatos fa-



nat madefacti dilutum, aut decocti ins, quotidie tribus cyathis haustum: menses cit potum, aut cum melle appositum. Contra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur: aduersatur ixiæ venenis cum vino: ite cicuta, & muris aranei moribus, & draconi marino. Angina eo cum melle, & nitro perunguntur, & epinyctides ex aqua. Ad sugillata, & oculorum caligines, ex melle illinitur: item auribus, si manat sanies. Dentium, auriumque dolores decoctum vaporis suffitu compescit. Decoctum in passio dolentibus oculis oblinitur: item præcordijs, & iecinori, tritum cum cerato cyprino: stomacho quoque longa valetudine laboranti cum rosaceo: cum ficis autem, aceto, & loliacea farina, aque inter cutem diensisque subuenit. Vinum ex eo fit, quod absinthiten vocant, præsertim in Propontide, & Thracia, quo ad antea dicta vtuntur, cum febri carent: alioquin in æstate propinant, & acceptam huic vino incolumitatem referunt. In parsum arcis absinthium, vestes ab erodentium iniuria vindicat: culices ex oleo perunctum abigit, & a corpore arcet: atramentum librarium diluto eius temperatum, literas a murium erosionem tuetur. Existimatur liquamentum eosdem præstare effectus: atramentum potionibus improbat, quoniam stomachum male habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta amurca, liquamentum adulterant.

Ἀψίνθιον θαλάσσιον. ABSINTHIUM MARINUM. CAP. XXIII

Myrr. 253

ABSINTHIUM marinum, quod aliqui Seriphium vocant, copiosissimum in Tauro monte, iuxta Cappadociam, & in Taphorisi Aegypti gignitur: quo Iliaci pro oliuæ ramo vtuntur. Herba est tenuis, abrotoni parui similitudine, referta minutulis seminibus, subamara, stomacho inimica. Ea grauius olet, & cum quadam calfactione adstringit. Per sese, aut cum oryza cocta, interaneorum animalia, teretesque tineas, adiecto melle enecat. aluum læuigat: cum edulio autem, vel lenticula decocta, eadem præstare potest. Pecora maxime pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus absinthio assignatur, quo Gallia alpius finitima scatet. Id patrio nomine Santonicum vocant, regionis, in qua nascitur, cognomento, absinthio non dissimile: verum subamarum est, non adeo seminis fecundum. Eadem quæ seriphium potest.

ABSINTHII genera tria hic à Dioscoride traduntur, nempe vulgare nostrum, marinum, quod Seriphium vocant, & Santonicum, quo Gallia alpius finitima abundat. Absinthium, quod in Ponto nascitur, ceteris præstare ad iecinoris, & ventriculi inflammationes lib. x. cap. xvi. Methodi medendi prodidit Gal. sic scribens. Cum autem duplex in omni Absinthio facultas, & qualitas sit, veluti in libris de medicamentis est traditum, utique in Pontico adstringendi qualitas non parua est. In reliquis omnibus amara quidem qualitas est, uehementissima, adstrictio uero (quam saltem gustu agnoscas) aut plane obscura, aut prorsus nulla sentitur. Proinde Ponticum ad iecinoris & uentris phlegmonas eligi præstat. Porro id est tum folio, tum flore longè quam

Absinthiorum consideratio.

cetera absinthia minore. Odor quoque huic non modo non insauis, uerum etiam aromatum quid præferens: reliquis omnibus est sœdus. Quare hæc fugere conueniet, & Pontico semper uti. hæc Galenus. Cuius auctoritate freti credide

Quorundam  
errores.

dere recentiorum nonnulli, Ponticum absinthium à communi nostrate specie non parum differre, quemadmodum Seriphium, & Santonicum. Sed equidem nullo alio discrimine alterum ab altero diffidere crediderim, quam quod Ponticum sit climatis illius temperie, & folijs, & floribus nostrate longè minoribus: quin & eam ob causam adstrictioris cultate, ac etiam odore præcellat. Quod abunde declarauit Gal. lib. v. i. simp. medicament. ubi de Abrotano agit, cum inquit. Abrotoni due sunt species, altera quam marem, altera quam fœminam nuncupant. quod ipsum definitum est, tum apud Dioscoridem, tum apud Pamphilum, aliosq; innumeros. At aliud est ab eo Absinthium, cuius rursus ut statuende sunt species, quarum unam eodem cum genere ipso nomine appellant, cuiusmodi potissimum est Ponticum, alterum Seriphium, tertium Santonicum. hæc ille. Quocirca rectè quidem sensisse uidetur Dioscorides, quod in ægæis Absinthij genere Ponticum præ ceteris commendauerit. Ex his igitur palam esse puto, speciem quidem à nostrate non differre absinthium quod in Ponto gignitur, sed quibusdam tam facultatibus, tum qualitatibus tantum. Sane per rō qui putent semen illud, quod officinæ Sanctum cognominant, quodq; saccharo circumdatum contextumq; necesse inter anteorum uermibus præbent, Absinthij marini esse semen. Attamen, ut fatentur rei barbarie periti, qui ex Gargano Apulie monte inter multa simplicium genera, semen hoc ad nos comportant, à planta quadam profertur Absinthij nostrati paululum absimili. Ex quo facile (ut mea fert opinio) conijci potest, id potius esse Santonici absinthij semen, quam Seriphij: præsertim quod Sanctum illud nomen non aliunde, quam à Santonico deductum esse uideatur. Ceterum procul dubio hallucinari deprehenduntur qui Canabel Serapionis semen sanctum interpretantur, cum longè à modum hæc inter se differant. Quippe Serapioni nil aliud esse Canabel constat, quam terra tenuis sono sabulo perfusilis, quæ (ut ipse ait) unā cum pluuia cælo decedit, cuius non modò apud Arabes ad interaneorum tunc necesse, uerum & ad fictilia fracta conglutinanda increbuit usus. Absinthium marinum, siue Seriphium, in quam plantam Tyrrheni, quam Adriatici pelagi litoribus prouenit, præsertimq; Aquileisibus, & Tergestinis. Sed Fuchsius suspicor illud non cognouisse: siquidem quod in suis clarissimis commentarijs magno uolumini appictum spectatur, Absinthium marinum non est. Quod cum fortasse & ipse animaduertisset, in paruo simplicium libello sententiam mutauit. Veruntamen non prius ab hoc errore sese uindicauit, quam in alium inciderit: quippe quod eandem plantam pro syluestri nasturtio perperam, meo iudicio, depinxerit. Marinum itaq; absinthium cum primis in terra erumpens, sed absinthio simili, crassiore tamen. Sed postquam adoleuerit, & caules ediderit, mutatis in longum foliis, ut præsertim quæ ubiq; caulem ambiunt, abrotanum emulatur, non tamen folijs est adeò paruis. Semen profert exiguum, copiosumq; abrotani modo inter caulis folia erumpens, amari, & adstringentis gustus. Volunt patres illi recentia, qui Mesuem commentati sunt, tantum superficie tenus Absinthium uulgare amarefcere, imis uerò partibus dulcescere, ob idq; gustui gratum esse. Vnde etiam aquam, quæ ab eo ignium ui distillat, dulcem potius, quam amarā sentiri contendunt. Quæ in re ipsa parum rem naturalem callere deprehenduntur. non quod Absinthij stillatitia aqua sit dulcis, non ex eo sit (quantum equidem sentio) quod Absinthium ipsum constet extrema parte amarum, medullitis uerò dulcem, sed quoniam cum exteriores illæ partes, quibus amaror inest, admodum sint tenues, ac in uapore faciliè resoluibiles, ignis calore tenuiores factæ, non magno quidem labore resoluuntur, euenitq; ob hoc, ut stillatitia, quæ inde fluit aqua, omnis sit amaritudinis expers. Præterea dulcedo, quæ in ipsa inuenitur, non ab intimis Absinthij partibus emanat, sed eam tantum à plumbeis instrumentis, quibus conficitur (ut diuturna docet experientia) prouenire conperimus. Nam ipsius dulcedinis qualitas non modò in Absinthij stillatitia aqua sentitur, sed etiam in quauis alia, quæ ex herbis temperamento calidis extrahatur. Siquidem cum plumbeum instrumentum huiusmodi barbarum uaporibus tum æstus, tum potentia excalscientibus, terrena quadam substantia superficie tenus inficitur, quæ actutum in dulcissimam uelut rursam conuertitur, non mirum quidem uidetur, si aquæ inde manantes ascititia dulcedine imbutæ, gustu dulces percipiuntur. Quod quidem ijs non euenit absinthij stillatitijs aquis, quæ duplici uase uitreis organis, calentis aquæ balneo conficiuntur. non hæc sufficienter amarefcere cognoscuntur, nec tantillum quidē dulcedinis gustantibus præbent. Facit sane hoc, quoniam balneum suæ ipsius aquæ humiditate, partes tenuiores illas retinet, conseruat, ac cohibet. Quo fit, ut non adeò in uaporem uertantur, quemadmodum cum illis fieri solet, quæ carbonum, & lignorum uolentia igne in auram euanescere coguntur. Dulcedine præterea carent, eo quod à uitreis organis, quibus eliciuntur, nullam fortitiam qualitatem recipiant. Quare satius, mea quidem sententia, esset, ut otium, quod superest, consumerent medici in re christiana, & medici in re medica, & singuli de arte sua bene mereri discerent, uel saltem quisq; quam rectè instituit, uitam sequeretur. Absinthij meminit Galenus lib. v. i. simplicium medicamentorum, sic inquit. Absinthium adstrictorium, & amarum, & acrem simul qualitatem possidet, excalsaciens pariter, & extergens, & roborans & desiccans. Proinde biliosos uentris humores per egestionem infernam propellit, ac per urinas euacuat. Magis autem quod in uenis est biliosum, per urinas expurgat. Ob hæc contentam in uentre pituitam, oblatum nihil elidit. Sic neque si in thorace, aut pulmone contineatur: nam adstringens in eo facultas, quam amara, ualentiore est. Porro quod insit quoq; acrimonia, idcirco maiori portione calidum est, quam frigidum. At si opus est generatim comprehensam eius temperiem secundum primas circumscribere facultates (etsi anomæ omnes & dissimulare su) calidum si dixerim primi excessus, siccum tertij. Succus autem eius longè quam herba ipsa, calidior est. Sed cum de Absinthio marino, siue Seripho ageret libro viii. simplicium medicamentorum: Seriphium, inquit, specie, & gustu Absinthio simile est. Id quod de Santonico scripsit Dioscorides, cum tradiderit magis cum abrotano conuenire Seriphium, quam cum Absinthio. Quamobrem relinquatur suspicio, quod aut Dioscoridis, aut Galeni scriptura sit hoc loco liberiorum incuria deprauata.

*Non Fuchsius*

Fuch. lapsus.

Monachorum  
opinio falsa.


NB

Absinthij vi  
res ex Gale.




## ABROTONVM MAS.

## ABROTONVM FOEMINA.

*Abrotonum. Santolina. Cypripedium.*

Αβρότονον. ABROTONVM.



CAP. XXV.

ABROTONVM duorum est generum. Foemina quadam arboris specie fruticans, candicat, circum ramulos folijs, seriphi modo, minutim incis: floribus referta est, comantibus in summo, fulgore auri, corymbis. quod per æstatem prodijt, suauiter olet, cum grauitate quadam, & amaro gustu. Id genus Siculum esse constat. Alterum mas, uocatur, farmentosum, gracilibus ramulis uti absinthium. Plurimum in Cappadocia gignitur, & Galatia Asiatica, atque in Syriæ Hierapoli.

Vtriusque semen crudum tritum, & feruesfactum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, cõuulsis, ruptis, coxendicibus; vrinæ angustijs, mensibus suppressis, aut remorantibus. In uino potum cõtitialium uenenorum antidotum est: horribus ex oleo illinitur. Serpentes & substratu, & nido refugant: contra ictus eorum cum uino potum prodest, priuatim efficax contra scorpionum, & phalangiorum uenena. Oculorum inflammationibus commodè illinitur cum cotoneo cocto, aut pane tritum cū farina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit. Irini compositionibus admiscetur.

ABROTONVM mas planta est uulgaris notitiæ: Cuius duo obseruauimus genera, hortense, & per se in capite tribus nascens, tenuioribus folijs, & minutiore semine. Quod uero foemineo generi adscribitur, non omnibus notum est: non ideo, quod & ipsum frequentissimum non feratur in hortis: sed quod a paucis pro Abrotono foemina cognoscatur. Quandoquidem id alij Cypressum, alij Santolinam uulgò appellant, alij uero maritimum esse absinthium existimant. Sed & profecto falluntur: quippe Santolina uulgò uocata, nil sanè aliud est, quàm Abrotonum foemina. Quod primùm (ut Dioscorides inquit) arboris speciem quandam representet, unde & à quàm plurimis Cypressum uulgò dicta est. Deinde quod candicantibus constet folijs, circum ramulos minutim incis, floribus aureis, orbiculatis, caulem summum, est & in æstatis tempore, corymborum modo comantibus. Postremo quod in uniuersam suauiter oleat cum grauitate potum, & amaro gustu. Ex hac equidem delineatione adducor, ut decernere non dubitem, hanc plantam quam uulgo Cypressum, siue Santolinam appellat, esse Abrotonum foeminam. Hinc itaq; Fuchsum alioqui rei herbariæ gnarum errasse crediderim, quod pro foeminei generis Abrotono plantam subiecerit ab eo longè diuersam. Qui etsi Santolinam foemina postea depinxit; non tamen eam Abrotoni foemine nomine agnouit, sed herbariorum, ut arbitror, uulgo scilicet eam Chamaecyparissum, hoc est, pumilam cypressum nuncupauit, eiusq; nullam à Græcis factam fuisse mentionem falsò credidit. Ceterum quod Goritienses Abrotonum marem Veronicam appellent, ea sanè plantam mihi in mentem uenit, quæ recentiorum quibusdam VERONICA uocatur, magnis (ut aiunt) insignita uiribus. Hæc diuim est generis. Mas, quæ humi repit, caule est dodrante maiori, rubescente, lanuginosoq; folijs oblongis, nigricantibus, hirsutis,


Abrotoni cõsideratio.

Quorundam error.

Veronice cõsideratio.

Abrotoni uir-  
res ex Gal.

hirsutis; et in ambitu serratis. Flores edit purpureos circa summum caulem emicantes, et semen in silicis, baculiforman referentibus. Radice nititur tenui, que in plures diuaticatur partes. Formina caule ex latitudine, folijs rotundioribus, minimè laciniatis, suppinguib. Flores profert in luteo purpurascens: semen in uetula rotundis inclusum: radicem uerò maris emulam. Nascitur in locis asperis, et incultis. floret Iunio mense. Hu quidem adstringens, et amara est: unde conijcere licet, eam esse tum excalfaciendi, tum siccandi in prædum. Medetur cruentis uulneribus, ac etiam diuturnis ulceribus. Sunt, qui dicunt quendam Francorum regem elephantias laborantem à uenatore suo hac tantum herba fuisse sanatum. Tumores præterea in uniuersum discutit, præcipuè qui in ceruice emergunt. Nec desunt, qui illam summis laudibus efferant ad pestiferas febres, ad tabies, et iocinoris, et lienis infarctus. Sed ut nostrum sequamur institutum, iam Abrotono medicinz reddende sue et Galeno, qui libro v. simplicium medicamentorum, ita de eius uiribus posteritatis memoriæ scriptum reliquit. Abrotonum calidum, et siccum facultate, in tertio ordine, seu recessu post media situm est. Inuenimus autem eius temperamentum non minimè quidem et ex gustu ducta coniectura, ut pote cum sit admodum amarum. Porro saporem eius habendi, cum terrenæ sit essentie, à largo calore extenuatum ostendimus: itaq; non instrenuè et excalfacit, et desiccet. Nam siue comam cum floribus (reliqua enim eius palea inutilis est) contusam ulceri puro illinas, mordax, et uirres uidetur: siue eo in oleo macerato, caput, aut uentrem persundere uoles, admodum calefacere reperies. Quoniam et qui per circuitum rigoribus capiuntur, eos ante inuasionem rigorum hoc uoles confricare, minus utiq; rigore coacti uidentur. imò et sensus quidem protinus ubi admotum fuerit, ipsum calfacere percipit. Porro quòd lumbricos uenter mat, par est, nimirum cum sit amarum. Scies autem protinus, quòd et digerendi, et incidendi quendam uim habere: sed et quòd magis quàm Absinthio id ipsi necessariò insit, in promptu erit colligere. Primum quidem ex gustu: paucissime siquidem acerbitalis particeps Abrotonum est, non pauca uerò Absinthium. Deinde ex eo quòd inuicem stomacho Abrotonum, uelut etiam Seriphum: gratum uerò, et amicum Absinthium. Siquidè de istis supra ostensum est, quòd amarum ipsum per se omnisariam insensum sit stomacho: austerum uerò, aut acerbum, aut in summa esturgens stomacho utile et amicum. Porro ibi qualitates hæc inuicem permixtæ fuerint, quæ uehementior fuerit, ea utiq; uicerit. Ceterum Abrotonum uirum calidum, et siccum facultate est, magis adhuc quàm cucurbita sicca uisita, et anethi radix. illa enim ulceribus humidis simul et citra phlegmonem callo induratis conueniunt, ac proinde maxime ulceribus, que in pudendorum præputijs sunt, competere uidentur. At cinis Abrotoni ulceribus omnibus mordax est: ac idcirco cum oleo tenuium partium, cicino scilicet, aut rhaphanino, aut scyonio, aut ueteri, et maxime Sabino, et alopecias accommodatur. Barbam quoque segnius tardiusq; enascentem cum aliquo dictorum oleorum elicit: sed ne minus illis, lentiscino maceratum. Quippe pro eo quòd tenuium est partium, rarefaciendi uim obtinet, et mordax est, et calidum. quas utiq; maxime eius facultates nouisse oportet, nec quicquam præterea particulare in hoc statu requirere.



Hyssopi con-  
sideratio.

Hyssop ὕσσωπος: HYSSOPVM.  
CAP. XXXVI.

HYSSOPVM, herba nulli non cognita, duum generum est, montanum, & hortense. Optimum est Cælicium. Vim habet extenuandi, & calfaciendi. Decoctum cum ficis, aqua, melle & ruta, potumque peripneumonicis, diuturnæ rufsi, suspiriosis, destillationibus, & orthopnoicis auxiliatur: tinea enecat. Idem facit, si cum melle delingatur: crassum humorem per aluum extrahit, decoctum ex aceto mulso epotum. Ad subducendam aluum cum ficis viridibus detritis manditur: uehementiusque addita iri, cardamomo, aut irione, deijcit: colorem in corpore fouet. Lienis, & aque intereitem, cum fico nitroque, inflammationibus quoque ex uino illinitur: cum feruente aqua impositum, fugillata discutit: cum decocto ficorum, optime anginis gargarizatur. Decoctum cum aceto detium dolorem in collutione sedat: inflationes, auricularum vaporis suffitu discutit.

Non modo sunt, qui dubitent, an uulgare Hyssopum legitimum appellari possit: sed et qui certo credant, id ipsum cum Dioscoridis Hyssopo nullam habere cognationem. Horum opinionem sequuntur Monachi illi, qui in Mesuem commentarios ediderunt, argumento quòd scripserit Dioscorides (ut Marcus interpretatur) origanum Heracleoticum folio esse hyssopi, non tamen habere umbellam hyssopi modo rotæ figura in orbem cir-

scd multifidam, & ueluti diuisam. Quæ quidem nota non uisitur in nostrate Hyssopo, ut quod flores spicatos proferat, non autem digestos in umbellam rotæ modo circumactam. Quo fit, ut non ab re illi dubitauerint, an uulgare Hyssopum legitimum sit; hi uero crediderint, eo omnino nos esse destitutos. Ceterum mihi iam compertum est, puto hos omnes in dubio, & errore uersari peruersi Marcelli interpretatione deceptos. quandoquidem se aliter hanc uulgatam Diosc. lectio (cui etiam Oribasius, et uetus quidam Græci codices adstipulantur) quam uerterit Marcellus enim Græcè legitur. Ορίανος ἡρακλεωτικῆ, οἷδ' ἐκονίαν καλοῦσιν, φύλλον ἔχει ἐμφρεῖς ὑόσῳ. ὁ γὰρ ὁρίανος δὲ οὐ τρεχάδες, ἀλλ' ὡς περ δισημέριον. id est. *Origanum Heracleoticum*, quod alij Cuminum uocant, folium habet hyssopo simile: umbellam autem non in rotæ speciem orbiculatam, sed ueluti multifidam. hęc Dioscorides. Ex quibus palam est, non comparasse Dioscoridem origani flores ipsius hyssopi floribus, ut perperam Marcellus uertit, cum absolute dixerit, nulla facta cum Hyssopo comparatione, Origano umbellam esse nō in rotæ modo orbiculatam, sed ueluti multifidam. Illud insuper hac in re non paruan ambigendi ansam præbuit, quod Dioscorides libro quarto in *Chrysocomes capite* prodidit, cum inquit. Chrysocome palmiti altitudine fruticat, comam habens specie corymborum, hyssopo similem. Veruntamen si quis præstanti iudicio Dioscoridis uerba accuratè perpenderit, illa sene nihil eorum sententiæ refragari comperiet, qui Hyssopum, quo passim utimur, legitimum esse contendunt. Si quidem in plantis coma, probatissimorum auctorum testimonio, non solum de floribus, & corymbis intelligitur; sed etiā de folijs, & ramusculis, dummodo hæc bilari quadam uenustate plantam totam, uel summa eius exornent. Vnde rectè Plinius libro XII. cap. XXV. balsamo folium proximum rutæ, perpetua coma reddidit. Item Virgilius lib. III. Geor-  
gicorum perpulchrè cecinit.

334

463

437

Ille comam mollis iam tum tondebat acanthi.  
Ex his perspicuum fieri arbitror, Chrysocomen coma, hoc est folijs, & ramusculis hyssopo esse similem, non autem ipsius corymbis, quibus fortasse in uniuersum scatur. Quamobrem hic nullus, quantum equidem sentio, relinquitur amplius dubitandi locus. Sed quod Hyssopum cōmunis usus, uerum, legitimumq; sit, nobis manifestè demonstrat Symphytum petraeum à me (ut spero) proximis annis repertū, quod folia uulgari hyssopo similia proferat. Nam cum scribat Dioscorides, Symphyti petraeum folio esse origani, Origanum uero folia habere hyssopi, clarissimum præbet argumētum, quod hyssopum, quo passim utimur, sit uerum. Quinetiam cum idem autor tradiderit, Hyssopum duorum esse generum, nempe montanum, & hortense, & utruq; genus in nostrate passim habeatur omnibus notis simile, non modò opinionem augeat, hoc legitimum esse Hyssopum; sed omnem quoque litem dirimit. Huc præterea alia accedit ratio, quod cum Dioscorides congeneres, uel similes plantas seriatim coniuncteq; describere consueuerit, statimq; post hyssopum *Stoechadem* representauerit, quæ folio, & spicato flore hyssopum nostrum admodum æmulatur, ostendit quidam hallucinari eos, qui hyssopum hoc nō legitimum esse hætenus iuerunt inficias. Adde etiam quod idem (ut experientia comprobatur) ijs omnibus polleat uiribus, quas illi reddidit Dioscorides. Hyssopi montanum in comitatu Goritienfi Sclauino monte frequentissimum nascitur, facie, floribus, & coma hortensi non absimile, rudiore tamen folio, & gustu amariore, nec usq; adeo acri. Mitescit tamen, si transplantetur in hortis, fitq; hortensi simile, exuta syluestri natura. Hyssopi paucis meminit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, sic inquiens. Hyssopum desiccatur, & excalfacit ordine tertio: sed & tenuium est partium. Hyssopi quoq; uires descripsit Mesues, ita ad sensum scribens. Hyssopum hortense pituitam facit deijcit, quanuis dixerint aliqui, quod & atram bilem educit addito fossili sale, aut Indo. At ipsum pituitam purgare manifesto experimento constat, præsertim quæ in pectore, ac pulmone cōtinetur. Facit hyssopum ad pituitosos tum cerebri, tum neruorum affectus: quod non modò mundet; sed quod etiam roboret. Quin & pectus, & pulmonem detergit, præsertim senibus, quorum pectus lenta, crassaq; pituita refertum est: quo fit, ut asthmaticis, & tussientibus opituletur. Discutit hyssopi usus contumaces inflationes, cibi appetentiam inuitat, mensis & uterum ciet, & febrium horrores excutit: usum acuit. Melle commixtum interaneorum tineas necat, miti tamen addito momento. Oleum, quod tum folijs, tum floribus paratur, neruos algore affectos inunctum sanat, & roborat. Potest eadem & montanum, atque etiam hæc omnia efficacius præstat.

hyssopi vires  
ex Galeno, &  
Mesue.

## ΣΤΟΙΧΑΣ. STOECHAS.

## CAP. XXVII.

Stoechas & uant

STOECHAS, iuxta Galliam in insulis eiusdem nominis è regione Massiliæ gignitur: vnde comomentum accepit. Herba tenuibus surculis, coma thymi, longiore folio, subamara gustu, & aliquantum acris. Cuius decoctum, hyssopi modo, ad pectoris uitia efficax est. Antidotis utiliter miscetur. Viscera omnia, & uniuersum animantis habitum extenuat, confirmat, & ab obstructionibus & fartu liberat.

STOECHADEM officinarum uulgus Sticados appellat. Nascitur hæc non modò in Gallia (ut Dioscorides scribit) ex aduerso Massiliæ in insulis illis, quas Stoechadas uocant; sed & in Arabia, unde cum alijs mercimonijs, quæ à Alexandria aduehuntur, Venetias comportatur. Quapropter tam à medicis, quam à seplasiarijs, indito ab Arabibus cognomento, hodie Arabica nuncupatur: etsi Massiliensis pelagi stoechas plerumq; Arabice uicem expleat. Proinde præterea in nonnullis Italiæ locis, uerum ea cæteris in Italia præstat, quæ ex Gargano Apuliæ monte aduehitur. quæquam omnium probatissima est peregrina, quæ ex Arabia defertur: hanc deinde sequitur, quæ in Stoechadibus insulis nascitur, à quibus primum nomen adinuenit. De Stoechade uires scripsit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Stoechadis gustu quidem qualitas amara est, & mediocriter subadstringens. Ceterum

Stoechadis cō  
sideratio.

Stoechadis ui-  
res ex Gal.

## STOECHAS.

Ex Mesue.




Ceterum temperies composita, nempe ex terrena essentia frigida exigua, unde sanè adstringit: & ex attenuata altera terrena copiosiore, à qua utique amara est. Ob utrorumq; uero conuenientiam & coitum, obstructione liberare, extenuare, extergere, roborareq; tum uiscera omnia, tum totius corporis habitum est nata. Suprà nanq; ostensum est, quòd quæ ex eiusmodi effectijs constant medicamina, dictos effectus reddere possint. Hanc quoq; meminit Mesues, ita de eius uiribus differens. Stoechas decit tum pituitam, tum atram bilem: cerebrum, nervos, ac sensa omnium organa mundat, ac roborat. Prodest còtra frigidos morbos qualescunq; sint, ideoq; comitialibus conueniens remedium habetur, addita scilla, aut eius aceto. Balnea, fomenta, ac lacernica, quæ ex ipsius tum decocto, tum uapore fiunt, oculos narium meatus aperiunt: nervorum, & compaginum cruciatus mitigant: ac interna uiscera frigido humore affecta roborant. Abstinentum tamen ab ea biliosis est, præsertim si eorum uentriculus sit bile refertus: nam eos maxime turbat, nauseam commouet, sitim accendit, & calore quodam molestissimo uniuersum afficit corpus.

O'elyavos. ORIGANVM.  
CAP. XXVIII.

ORIGANVM Heracleoticum, quod & cunilam uocant, folium habet hyssopo non dissimile: umbellam autem non in rotæ speciem orbiculatam, sed ueluti multifidam: femine in summis uirgis haud quaquà denso. Excalfacit: unde decoctum cum uino potum demorsis à serpente conuenit. qui autem cicutam, aut meconion hauserunt, ijs ex passo: si uerò gypsum, aut

ORIGANVM HERACLEOTICVM. *Hyssopus*

## ORIGANVM ONITIS.



ephemeræ,

ORIGANVM SYLVESTRE.



TRAGONIANVM.



ephemerum, ex aceto mulso propinatur. ruptis, conuulsis, hydropicis cum fico esui datur. Aridum acetabuli mensura potum in aqua mulsa, atros humores per aluum extrahit: menses ciet, & tussi cum melle linctum medetur. Ad pruriginem, pforas, regiumq; morbum, decocti ius in balneis prodest. Succus uirentis, tonsillas, yuam, & oris ulcera sanat, & per nares ex oleo irino infusum trahit, aurium dolores cum lacte mulcet. Conficitur ex eo, & cepis, & rhoë, quo ad obsonia utuntur, uomitorium medicamentum, his omnibus in cupreo uase per dies his uicenos infolatis; dū caniculæ sydus flagrat. Herba autem substratu serpentes fugantur. Quæ onitis appellatur, candidiore est folio, & hyssopō similior. Semen ueluti coniunctos corymbos habet. Vis ei origani Heracleotici, sed multo inefficior. Sylvestre origanum, aliqui panaces Heracion, alij cunilam uocāt, ex quibus est Nicander Colophonius. Folijs est origani: ramulis tenuibus, dodratem altis: in quibus umbellæ anethi insunt, flores candidi: radix tenuis, superuacua. Peculiariter percussis à serpente, folia, & flores ex uino poti auxiliantur.

Τραγογιανον. TRAGONIANVM.

CAP. XXIX.

TRAGONIANVM tenuis frutex est, sylvestri serpyllo, aut origano similis, folio, & ramulis. Quibusdam in locis latius, yrentiusque inuenitur, & latioribus folijs, satis glutinosum. Alterū exilibus furculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui prasium uocauerunt. Optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrneū, & in Chio, Cooque proueniens. Omnia excalfaciunt, urinam cient, aluo accommodantur. Decocto potu bilem deijciūt, lienosis ex aceto bibere prodest: contra pota ixiæ venena in uino bibuntur: menses trahunt: peripneumonias, tussientibus, ex melle in eclegmate dantur. Grata, ac mitis eorum potio est: quare cibum fastidientibus, & stomacho acida ructanti, imbecilloque præbetur: item si à maritima iactatione nausea, & æstus præcordiorū excitetur. Tumores uero cum polenta illita discutiunt.

VARIA, ac confusa est apud antiquos rei herbariæ auctores Origanii historia. Quandoquidem Theophrastus lib. vi. cap. ii. de plantarum historia duo tantum constituit Origanii genera, nigrum sterile, & candidū fructuosum. Plinius uero lib. xx. cap. xvii. post Onitidis origani, & Tragorigani mentionem, Heraclium origanum subiunxit, quod tria habere genera produxit. Vnum nigrum, latioribus folijs, glutinosum. Alterum exilioribus mollibusq; sampsocho non dissimile, quod aliqui prasium uocauerunt. Tercium inter hæc medium, minus quam cetera efficax. In quibus uerbis Plinius deprehenditur nō sine errore Tragoriganum cum Origanii generibus confudisse, quod Heraclii nomine, quod constat Origanii genus esse, duas illas Tragorigani species, quæ à Dioscoride redduntur, huius serè imitatione expresserit: licet tertium quoq; addiderit ex alio fortè autore. nisi dixerimus, quod & hanc pro aliquo Origanii genere sumpserit, & simul confuderit. Sed dimissis aliorum placitis, & Dioscoridem, quem nobis ducem, & autorem proposuimus duntaxat secuti, dicimus tam Heracleoticum, quam Onitum appellatum origanum aut in Italia non oriri, aut inibi hæcenus, quod sciam, à nẽmine

Origanii historia varia.

Plinij lapsus.



Brasauoli opi-  
mo relecta.

Origani uires  
ex Gal.

hinc fuisse repertum. Et si Brasauolus Ferrariensis medicus nostrae etatis clarissimus asserere uideatur, Heracleoticum illud herbae genus esse, quod in Italia passim nascitur, quodque perperam Origani uulgo ab omnibus uocatur. Verum huic (pace eius dixerim) nunquam assentiri potui: quin potius eam plantam sylvestris Origani genus esse semper ex-  
maui, quod sua sponte in campestribus, asperis, ciuiosisque locis, et montibus proueniat, purpurascens admodum uide-  
la. Nam quantum à Dioscoride una tantum sylvestris Origani species describitur, floribus candidis; nil tamen ob-  
quin in alijs quoque à Graecia regionibus una, uel altera eius species floribus differens gigni possit. Succum origani, quod Venetiae à Creta aduehunt, flore est albo, acerrimo gustu, fragrantique odore. Quo fit, ut hoc esse putem huiusmodi Dioscoridis origanum (quanquam apud plerosque Heracleotici, uel alterius nomen sibi falso uendicet) non solum quod floribus sit candidantibus; sed etiam quod gustu uel linguam admodum uellat. Siquidem hinc facile conijci potest, si-  
uestrem origanum ceteris (ut Galenus testatur) ualentiorum esse. Heracleoticum origanum, itemque Orientis origanum, ut me hoc anno clarissimus medicus Lucas Gbinus (quae mihi sunt eius non solum praestantis doctrinae; sed etiam ingenij, ac liberalis animi certa ac firma indicia) utrunque à Creta (ut ad me scripsit) allatum. Quae duo Origani genera quod si-  
tis Dioscoridis historiae respondeant, hic pictura exprimens duximus. Tragoriganum uero, cuius etiam plantam pic-  
tam exhibemus, frequens nascitur in Forouliensi agro, folijs serpylli emulis, sed gustu pulegij. Unde non ab re fu-  
tum post ipsum pulegij meminit Dioscorides. De omni tam Origani, quam Tragorigani genere differens Galenus lib.  
VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Origanus, Heracleotica quidem efficacior est omni: sed agrestis,  
quam quidam panaces Heraclium, alij conylem cognominant, ualentior utraq; est. Omnes uero incidendi, extenuandi,  
calfaciendi; facultatem possident: haecque tertio excessu obtinent. Porro ea, quam Tragoriganum appellant, quam-  
psit etiam adstrictionis quippiam. haec Galenus. Ex cuius doctrina patet, recte cum ijs agi, qui sylvestre ex Creta pe-  
titum suis medicamentis inserunt.

DE PULEGIO. PULEGIUM.

CAP. XXX.

PULEGIUM herba vulgaris notitiae. Extenuat, calfacit, decoquit: potum menstrua, secundas, ac par-  
tus eijcit. Pulmonis uitia ex melle, & aloë potu extra-  
hit, & conuulsis auxiliatur. nauseas, stomachique ero-  
siones ex posca permulcet. atram bilem per aluum exi-  
git. Bibitur in uino utilissimè contra serpentium mor-  
sus: defectos animo recreat, cum aceto naribus obie-  
ctum: gingiua arefacti cinere corroborat. Illitum cum  
polenta inflammationes omnes sedat: podagris per se  
subuenit, impositum usque dum rubescat locus: cum  
cerato varos extinguit: lienosis cum sale utiliter illini-  
tur. Decoctum eius ablutas pruriginis mitigat: con-  
uersas vuluas corrigit: contra inflationes, duritiasque  
vuluae in deflesiones conuenienter adijcitur. Vocant  
aliqui blechona, quoniam dum floret gustatu à peco-  
ribus, balatum concitat.

ET si dubitauerint recentiorum quidam, an uulgarè Pule-  
gium legitimum sit, quod ob eius uulgarem notitiam, nullis floribus, &  
florumque notis eius faciem descripserit Dioscorides; non desunt  
tamen rei herbariae periti, qui uelint Pulegium uulgaris usum Dio-  
scoridis, aliorumque antiquorum esse pulegium. Hocque argumen-  
tuntur, quod non modo experientia compertum sit, uulgare Pule-  
gium omnibus ijs uiribus esse praeditum, quas suo tribuit Diosco-  
rides; sed quod etiam Pliniana historia maxime respondeat. Plinio  
siquidem lib. XX. cap. XIII. duo Pulegij produntur genera: for-  
mina, cui purpureus flos: masculus, cui albus. Horum utrumque ferè  
Italicum, utrumque in Hetruria praestantissimum gignitur. Quia  
propter eos aperte hallucinari crediderim, qui Pulegium com-  
mune usum unum, uel alteram calaminthae speciem esse contendunt. Quippe quod certo putem (ut infra suo loco de eorum)  
omnia calaminthae genera, quorum meminit Dioscorides, à nobis iandiu fuisse reperta. Quin et illud Pulegium legitimum  
legitimum esse ostendit, quod folio sit Cretensi dicto anno simile, cui folia pulegio similia reddidit Theophrastus, ut Dio-  
scorides, qui tamen illa maiora fecit. Germanicae mulieres Pulegium in hortis ferunt, ac etiam in sigulinis uasis sunt  
diligenti admodum cultura, suis affectibus eo consulentes. Vbi letius tota coma conspicitur, & secundo calaminthae  
generi (hanc enim illi asonilauit Dioscorides) folio simile, acerrimo gustu, quadantenus amaro. Quamobrem rectè  
dem Galenus lib. VI. simplicium med. de Pulegio differens, ita scriptum reliquit. Pulegium cum acre, & subas-  
sit, ualde tamen excalfacit, tum extenuat. Porro quod excalfaciat, abundè magnum est signum, quod illud uiribus  
& quod si quis diutius toleret, exulcerat quoque. Quod uero extenuet, satis indicat, cum humida, & aspera, &  
thorace, & pulmone excreatu facilia faciat, mensesque moueat.


Pulegij consi-  
deratio.

Quorundam  
error.

Pulegij uires  
ex Galeno.



ΔΙΚΤΑΜΝΟΣ. DICTAMNVM. *Dictamn* CAP. XXXI.



PSEVDODICTAMNVM.


DICTAMNVM, aliquibus syluestre pulegium vocatur: Cretensis herba est, acris, lævis, pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento quodam, spissaque lanugine pubescunt. Florem nullum, aut semen profert. Præstat omnia, quæ satium pulegium, sed efficacius multò: nam non potum modo, sed appositum quoque, aut suffitum, defunctos partus eijcit. Pro dunt in Creta capras sagittis percussas, huius herbæ partu eas excutere. Purgadi uim habet succus illitus, aut cum polenta tritus. Herba impactos pedibus, reliquòve corpori aculeos, illitu refigit. ad lienis dolorem efficac habetur: siquidem ipsum imminuit. Metunt æstate, & autumnò. Radix eius gustu calfacit: partus accelerat. Succus cum vino potus, contra serpentium morsus presidio est. Tanta herbæ facultas est, ut olfacta abigat bestias, quæ venenato sctu sæuiant, appensaque contactu exanimet. Vulneribus ferro illatis, & venenatis moribus infusus succus, præsentaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in potu assumatur.

ΨΕΥΔΟΔΙΚΤΑΜΝΟΣ. PSEVDODICTAMNVM. CAP. XXXII. *Falsif. Jor. Jor.*

QVOD Pseudodictamnium vocant, multis in terris nascitur, antè dicto simile: sed minus, quàm illud acre. Eisdem effectus præbet, sed ineffacius multò.

ΔΙΚΤΑΜΝΟΣ ΕΥΡΕΤΟΣ. DICTAMNVM ALTE RVM. CAP. XXXIII.

DEFERTVR à Creta alterum dictamni genus, folijs sisymbrij, ramis maioribus: in quibus flores sylvestris origani, nigri, molles. Odor foliorum inter sisymbrium, & saluiam, iucundissimus. Efficax ad eadem, sed minus nares ferit. Miscetur emplastris, & medicaminibus, quæ aduersus serpentium iniurias confinguntur, theriaca vocant.



DICTAMNVM legitimum, ac probatissimum in Creta dictamni cōsideratio. insula tantum gignitur: neq; tamen inibi passim, sed in angusto loco duntaxat provenit, ut autor est Theophrastus. qui lib. ix. cap. xvi. de plantarum historia Dictamnium posteritatis memorie prodidit his uerbis. Dictamnium Cretæ insula proprium est, ui mirabile, & ad plura perutile, sed ad partum mulierum potissimum pollet. Folio pulegio simile constat, nec sapore absimile est: ramulis tenuioribus conditur. Vsus foliorum, non ramorum, nec fructus est: ualent enim ad multa, & præcipue ad difficiles partus mulierum, ut dictum est: aut enim facile posse parere faciunt, aut certè dolores penitus sedant. Dantur bibenda ex aqua. Rara hæc herba: locus enim, qui fert, exiguus admodum est, eumque capre depascunt capeffendæ causa uoluptatis. Quod etiam de telis fertur, uerum esse affirmant: capras enim sagitta transfixas dictamno deuorato telum eijcere. Dictamnium tale est, uiresq; eiusmodi possidet. Falsum dictamnium folio quidem simile constat, sed ramulis minus, & uiribus longè inferius. quanquam enim eisdem in rebus profit; tamen multò deterius, atq; debilius. Vis dictamni in ore percipi continuo potest: excalfacit enim ex paulo uehementer. Manipulos in ferula, aut canna intercludere solent, ne expiret: est enim imbecillius, cum expirauerit. Nō dea ff sunt,

sunt, qui naturam Dictamni, & falsi Dictamni eandem esse existunt. Sed quod locis letioribus exeat, degeneret, falsamq; cognominari, sicuti etiam alijs pluribus evenit, ut viribus deterioribus ex loco reddantur. Dictamnem asserunt solum vehementer amare inquit. Est etiam aliud Dictamnium veluti equivoce appellatum: nec enim eundem, nec iam habet eandem. quippe quod folio simili sisymbrio constet, & ramis condatur maioribus. Vfus eorum, & uis non eisdem conveniunt. Hoc igitur (ut dictum est) mirum, simulq; propriū Cretæ insule dicitur. hęc Theophrastus. Ceterum ut etiam quoq; nostræ Dictamnæ rationem aliquam reddamus, ut in omnibus ferè plantis fieri consuevit, non diu quidem est, quod ex Cretæ insula Venetijs legitimum Dictamnium adferri coepit. Siquidem Venardus Ferrariensis vir non solum ingenio & doctrina celebris; sed etiam simplicium medicamentorum accuratus indagator, libro vi. epistola. xii. inquit. Dictamni, nisi eam rursus Venus ab Ida sylva deportet, omnino deficit. Sed certe (ut ingenue fatear) nescio, quæ auctoritate, uel ratione scripserit Dioscorides, Cretense Dictamnium nec florere, nec semen proferre, cum id, quod è Cretæ ad nos aduehitur, unà cum floribus deferatur, nullis præterea deficiantibus, quæ in legitimo requiruntur. Quod autem fructum ferat Cretense Dictamnium, & ex consequenti etiam florem, declarat suprà declarasse Theophrastus, cum dixit: Vfus est foliorum, non ramorum, nec fructus. Id quod credimus Vergiliam quoq; carminibus expressisse libro xi. sue Aeneidis, ubi ita cecinit.

Hic Venus indigno nati concussa dolore

Dictamnium genuit, Cretæa caput ab Ida,

Puberibus caulem folijs, & flore comantem.

Purpureo non illa seris incognita capris

Gramina, cum tergo uolucres hæsere sagittæ

Plinio Dictamnium non modo flore, & fructu caret; sed etiam caule. quod tamen experientia, & ante dictorum testimonio planè falsum esse deprehenditur. Pseudodictamnium porro hodie paucis (ut arbutor) notum, Pisis hoc tempore ad me misit clarissimus medicus Lucas Gbinus, caule dodrantali, lanuginoso, albicanteq;: cui folia è caule erumpunt ex intervallis bina, dictamni tomento pubescentia: è quorum omnium medio flores purpurei prodeunt, maritimi, uel melissophylli modo, sapore pulegi, minus tamen acri. Vulgare autem Dictamnium, album uulgo cognoscitur, quod folio fraxiæ, floribus odore fragrantibus, cæcis amulit, radice alba, amarq;: prouenit, nullis prorsus nota alijs, quod Cretensis dictamni genus representat. Viribus tamen quàm plurimis, præsertimq;: aridiorum conficiendis, summe perecomendatur. Quo fit ut non satis admirari possim, quod ueteres rei herbarie peritissimi huius insignis plantæ nullam, quod sciam, meminerint. De eius historia, ac uiribus lib. i. latius disseruimus. quare nunc ea repetere superfluum esse duximus: Dictamni, ac falsi Dictamni uires tradidit Gal. lib. vi. simp. med. sic inquitens. Dictamnium tenuioris essentia constat, quàm pulegiū: cetera illi simile. At quod uocant pseudodictamnium, ad omnia imbecillius dictamni est.

Pseudodictamnium.


Vulgare dictamnium.

Dictamni uires ex Gal.

SALVIA MAIOR.

Galbry

SALVIA MINOR.



**SALVIA**, siue elelisphecon, frutex est ramosus, longus, uirgas habens quadrangulas, & canis: folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quæ sensim attritarum quasi uescium scabritiem referant, hirsuta, subalbida, perquam iucundo odore, sed graui: semen summis in caulis syluestri hormino simile gerit. In asperis nascitur. Menses cit, & urinas decoctum foliorum, ramorumque potum, & partus extrahit, & pastinacæ marinæ icibus auxiliatur. Capillos denigrat, vulnere sanguinem cohibet, tetra ulcera purgat, Testium pruritus sedant rami foliaque, si eorum decocto cum uino foueantur.

**ADEO** est uulgaris notitiæ Salvia hortensis, ut nulli prorsus reperiantur horti, in quibus hodie frequens passim non spectetur. Est etiam præter hanc Salvia syluestris, quæ in campestribus, asperis, incultis, & montibus provenit, filijs domesticæ similibus, candidioribus tamen, & hirsutioribus. Quo fit, ut longè aberrant, qui pro syluestri Salvia, agrestem *Sclerem* sic uocatam usurpant, quam seplastarij *Centrum galli*, & *Gallitricum* etiā appellant. Verum animadvertendum est, quod illa, quam syluestrem appello, ea sanè non est, quæ in Hispaniæ campestribus, & asperis locis, ac in Massiliensi agro una cum nostrate nardo, & lauendula frequentissima nascitur. Quandoquidem hæc non syluestris Salvia est, sed ea ipsa, quam domesticam uocant: nam quæ in hortis habetur alia non est, quam campestris in hos translata. Ideoq; nō scribit Dioscorides, Saluiam in hortis nasci, sed in asperis tantum locis. Cæterum Theophrastus duo Saluiæ produuntur genera lib. VI. cap. II. de plantarum historia, ubi sic inquit. Sphacelus, & salvia inter sese desunt, quasi alterum urbanum, alterum genus sylvestre dixeris. Sphacelo folium læuius, contractius, minusq; squaleus: saluiæ scabrius. hæc ille. Porro genera hæc Saluiæ, quæ à Theophrasto redduntur, in Italia quoq; in hortis quam plurimis inueniuntur: in eaq; sum sententia, ut existimem sphacelum marem esse, saluiam uerò foeminam. In Creta, ac etiam in quibusdam Apuliæ, & Calabriae locis Salvia in cacumine gignit tubercula quædam, gallarum instar, subalbida: quorum alijs mihi copiam fecit Ioannes Baptista Rhannusius Illustris. Senatus Veneti secretarius, uir moribus, ac doctrina præclarus: is enim (quæ sua est humanitas) cū ea ex Creta sibi allata essent, mihi uidenda tradidit.

Saluiæ consideratio.

Saluiam Græci elelisphecon uocant. Vnde factum esse puto, ut Plinius lib. XXI. cap. XXV. uocabulorum cōgonatione deceptus, quod Græcis lens phacos appelletur, crediderit magno errore elelisphecon lentis speciem esse. Salvia, Galeno lib. VI. simp. medic. teste, temperamento est euidenter excofaciente, ac leuiter adstringente. De eius uiribus copiosius disseruit Aëtius, sic scribens. Salvia manifestè calefacit, & leniter adstringit. Tradunt quidam, suffitam saluiam menses immoderatè fluentes, & omnino muliebres profluum compescere. Agrippa sacram herbam uocauit, quæ prægnantes mulieres, si fluide, laxæq; fuerint, utilissimè comedere prodidit: continet enim conceptum, uitalemq; reddit. Ac si succi huius heminam cum modico sale, quarto à secubitu die, mulier potauerit, deinde uiro misceatur, procul dubio concipiet. Aiunt in Copto Aegypti post sæuæ pestilentias, ab his qui superfuerunt, ad eam succum libentem mulieres coactas fuisse, plurimosq; inde productos foetus. Dato, inquit Orpheus, sanguinem expuentibus succi saluiæ cyathos duos, ieiunis cum melle bibendos, & sanguis illico cohibebitur. Tabidis pilule in hunc modum parantur. Siomito spice nardi, gingiberis, sing. drachmas duas: seminis saluiæ assati, triti, & cribrati drach. octo: pipæris longi drach. XII. & cum succo saluiæ pilulas conficito, & mane ieiunis drachmam unam exhibeto, eodemq; modo in usperere, ac postea aquæ puræ quippiam propinato.

Plinij lapsus. Saluiæ uires ex Galeno, & Aëtio.

Ἡδύσμος. **MENTHA**. *M. m.* CAP. XXXV.


**MENTHA** cognita herba est. Calfaciendi, adstringendi, atque exiccandi uim habet. Sistit sanguinem, potu ex aceto succo: tineas in uentre teretes enecat: venerem stimulat. Singultus, uomitiones, cholerasque sedant terni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti capitis dolores mulcet: mammas si tendantur, aut lacte turgeant, compescit: cum sale canum moribus illinitur: aurium doloribus cum aqua mulsâ subuenit: vuluæ ante coitum admota conceptioni resistit: linguæ scabritiem conficta læuigat. Lac coire, densarique in caseum non patitur, si folia potionibus lactis immergantur. In summa stomacho utilis est, & in condimentis peculiarem gratiam habet. Syluestris mentha, Latini menthastrum uocant, hirsutior est folio, & prorsus maiore, quam sisymbrij, grauiori odore. quare minus ad sanorum usus expetitur.

**MENTHA** cū hōrtensis, tū etiam syluestris, quam Hetrusci nostri Latinum nomen retinentes uulgò *Mentastro* appellant, adeo omnibus uulgaris, notaq; est, ut sine uitio eius delineationem silentio prætermitti posse putauerim. Et quauis plures, quam hic scribat Dioscorides, in hortis sint Menthæ species (una enim breuioribus, & crispioribus constat folijs, alia rubenti caule, & flore, alia uerò albicante) huiusmodi tamen specierum differentie non sunt, meo iudicio, plurimi faciendæ. Viuax Mentha admodum est: nam in hortis semel tantum sata, tam restibili fertilitate durat, ut uix in posterum extirpari possit, quin renascatur. Veneris uoluptatibus Meniba commendata est: cū Plinius non sine errore lib. XX. cap. XIIII. plane cōtrarium scriptis tradiderit. Huius menthæ facultatis causam scire reddidit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, ubi de ea ijs disserit uerbis. Hedyosmos, alij uerò min-

Menthæ consideratio.

Menthæ uires ex Gale.

MENTHA



MENTHA ALTERA.

MENTHASTRUM. *Wild mint*Mentha Græ  
cæ mentio.

then odoratam nuncupant. Est enim et alia quedam minto no  
odorata, quam calaminthen uocant. Vtraq; gustu acris, et sa-  
cultate calida est, ex tertio ordine excoalscentium. Inferior ta-  
men est mentha odorata, quam calamintha, et minus excoalscit.  
Ut enim in uniuersum dicam, hæc ceu syluestris quedam est, illa  
cei domestica. Quamobrem sanè ob eam, quæ ex cultu accedit,  
humiditatem, mediocriter item ad uenerem excitat. Id quod om-  
nibus commune est, quæ humiditatem semicoctam, et flatuosam  
continent. Ob talem ipsius herbe temperaturam in abscessibus ea  
quidam cum polenta mista utuntur. Id quod in Calamintha scer-  
re nequeas, propterea quod ualentius eam excoalsciat, tum des-  
cet, quam id genus poscant. Habet uerò etiam quiddam amarum  
in se, et acerbum: et amaro quidem lumbricos interficit, ac-  
bitate uerò si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis reuol-  
tiones reprimat. Substantia est, ut si qua alia herba, tenuium par-  
tium. hæc Galenus. Verum animaduertendum est, hoc loco Ga-  
lenum per syluestram Mentham non intellexisse legitimam Cala-  
mintham, quod is de odorata Calamintha (ut sequenti capite di-  
cturi sumus) initio septimi libri de simplicium medicamentorum  
facultatibus copiose tractauerit. Ex quo facile conijcere licet,  
Galenum in hoc non suam, et ueram appellationem retulisse, sed  
aliorum, et fortè Græci uulgi, qui syluestram mentham calami-  
the nomine appellare consueuerit: id quod etiam Galeni locutio  
confirmare uidetur. Ceterum est et herba passim in hortis  
crescens, folio saluie longiore, latioreq; betonicæ emulo, in ni-  
ridi albicante: caulibus cubitalibus, et aliquando maioribus: in  
quorum cacumine flores exeunt corymbacei, colore melino, tam  
ceti modo. Planta in uniuersum amara est, subadstringens, et  
grauiter odorata. Goritiensibus hæc uulgò uocatur *Menta græ*  
cæ: 3





ca. in Hetruria uero Salvia romana, quod potius folijs saluian referat, quam mentham: quin et herbam diuæ Mariæ nunciant. Sicut etiam, qui Laffulatam appellant: sed unde apud hos id sibi nomen ascriuerit, nescio, ipsi dicant. Porro Valerius Cordus in suo dispensario, in unguento Marciati magno, duas profert Menthas, nempe crispam, et Saracenicam: pro Saracenicâ autem mentha hanc, de qua præsens mentio, imponendam esse censet. Sed quoniam id nulla comprobatur auctoritate, uel ratione, eius quidem sententiæ adstipulari non tutum esse arbitror: præsertim cum Nicolais nuper à Fuchsio latinus factus, nullam huiusce Saracenicæ menthæ mentionem faciat, sed rubicundam, et agrestis mentham. Id quod facile nobis indicat, ut liberè dicamus, Cordi dispensariū quàm plurimis scaterere mendis. quippe quod non omnes medicamentorum descriptiones ex bonorum autorum fonte hauserit. Plantam hanc (ut ipse scribit) Germani uocant Vnser frauen muntz, id est, mentham sanctæ Mariæ. Verum Fuchsius aliam eodem nomine ab hac longe diuersam ostendit. Qui uero horum errauerit, in hoc Germanicæ linguæ peritiores iudices erunt. quanquam si Hetruscæ Germanicæ, uel Germanicis Hetruscæ nomina respondent, Cordo potius (quantum ad uocabulum spectat) quàm Fuchsio accesserim, quod, ut modò diximus, herbam diuæ Mariæ eam uocent in Hetruria. Huius epotus succus alui uenas, et lumbricos enecat: frigido utero subuenit. Ventriculum roborat, tam haustus, quàm illitus, et uomitiones compescit. Tota planta tam substratu, quàm suffitu serpentes fugat, et eorum uenenis resistit. quin et infarctus expedit, et capiti robur addit.

*Mentha Saracena  
Murgum salta.*

CALAMINTHA MONTANA.

CALAMINTHA ALTERA.



Καλαμίνθα. CALAMINTHA. CAP. XXXVI.

EX CALAMINTHAE generibus quædam montibus familiaris, folia ocimi habet, incana: surculos, & caules angulosos, purpureū florem. Altera pulegio similis est, sed maior: quam syluestre pulegiū ideo appellant, quod odore ipsum emuletur. nepetam Latini vocitant. Tertia mentha: cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus, quàm superiora, sed viribus inefficacior. Omnium folia gustu impensè feruentia, & acria: radix superuacua. Nascitur in campis, asperis, & aquosis. Potu, aut illitu demorsis à serpente opitulatur. Decoctum potu menses, & urinas expellit: ruptis, conuulsis, orthopnoæ, torminibus, choleris, horroribusque auxiliatur: regium morbum expurgat. Præsumpta in vino uenenis resistit: tineas, cæterasque interaneorum animalia cum sale, & melle pota, enecat: nec secus cocta, crudæve, si teratur. Elephanticos elicta adiuuat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in vellere subijciuntur, menses extrahunt, & partus enecant: accensa, aut substrata, serpentes fugant: nigris cicatricibus candorem reddunt, in vino cocta, & illita: fugillata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur, ut ex alto humore

## CALAMINTHA TERTIA.

res euocet, summam cutem exurens. Vermes necat, si  
cus auribus instillatus.

Calaminthæ  
consideratio.

Brasauoli er-  
ror.



Ruellij erra-  
tum.

Monachorū  
lapsus.


Calaminthæ  
uires ex Gal.

rit hanc Dioscorides menthastro similem, non autem melissophyllo, aut urtica, quas (ut paulo ante diximus) Gattaria representat. Quapropter non modo ea de causa eius sententiam explodendam putauerim; sed etiam quod sæpius ipse in locis aquis repererim tertiam Calaminthæ speciem, menthastri æmulam, subalbidioribus tamen folijs, ac gustu acriori. Non secus et montana mihi frequens olim occurrebat in excelsis uallibus Ananie montibus, folijs debicantibus, ocimo similibus, caule quadrangulo, et flore in purpura rufescente. Quanquam in hoc errore, mea quædam sententia, uersantur Monachi illi reuerendi, qui in Mesum commentarios ediderunt, ut asserere non dubitent, moueri nam hanc Calamintham legitimam esse Nepetam. Calaminthæ meminit Galenus libro v. 11. simp. medicamentorum, sic de eius uiribus differens. Calaminthæ essentia est tenui, et calida, siccaque temperie, ex tertio quodammodo et utraque qualitate. Horum manifesta sunt indicia, partim gustu apparentia, partim experientia cognita. Gustus scædem acris, et palam calida est, ac paulum omnino subamari habet. Periclitantibus autem, et corpori aduersariæ extrinsecus imposita, primum quidem ualde excafcit, et mordicat, cutemque laniat, postremo etiam ulcus efficit. In corpus autem intro assumpta, tum ipsa per sese sicca, tum etiam cum melicrato, perspicuo calfacit, et sudoris citi, omneque corpus tum digerit, tum exiccat. Ea ratione ducti quidam ipsam contra rigores per circuitum repetentes et bibuerunt, foris quidem oleo incoctam toti corpori inungentes cum frictione non segni, intro uero assumentes, siccitatem dictam. Quinetiam et coxendicibus eam quidam in ægitudinibus ischiadicis, tanquam strenuum remedium illiter. Trahit enim quæ in profundo herent ad superficiem externam, totumque adeo articulum excafcit, cutemque non obscure adurit, menseseque tum epota, tum apposita admodum efficaciter prouocat. Bonum etiam elephanticonum remedium, non eo tantum, quod strenue tenues humores digerat; uerum etiam quia extenuet, et incidat ualenter et ascos, quales sunt qui hunc morbum procreant. Sic et eicatricibus atris candorem reddit, et sugillata digerit. Sed in rebus in uino coctam cataplasmatibus modo imponere uiridem magis, quam siccam præstat. Quippe arefacta uehementer redditur, et ad urendum promptior. Porro talis cum sit ad uenenatarum bestiarum morsus assumitur, uelut etiam cæcæ teria, et quæcunque medicamenta calida sunt, et acria, tenuiumque partium, quæque facile ex alto ad sese circumiacentem omnem qualitatem possunt attrahere. Ceterum quæ illi inest amaritas, plane exigua est: uerum ad quædam uia efficaciter agit, ut quæ ualentissima est, nimirum cum coniuncta sit uehementi calori cum tenui essentia. Quare et ascidæ, et lumbricos succus eius aut infusus, aut epotus enecat. Eadem ratione aurium uermes, aut si alicubi in corporis parte sinuosa, aut implicata, quæ putredine tentetur, talis prouenerit affectus. Sic et conceptum seu pota, seu abortiuum interimit, et eijcit. Igitur incidendi quidem ei uis adest, propter calorem eius, tenuitatem, et amaritudinem: absterge di uero propter unicam amaritudinem. Itaque asthmaticis ob omnia ante dicta prodest: ictericis uero, siue regio morbo laborantibus potissimum ob amaritudinem, sicut alia ferè omnia amara, utpote abstergentia, et expurgantia in cinore prouenientes obstructions. Ad omnia iam dicta efficacior est montana.

Thymus

THYMVM. *Quindal*

CAP. XXXVII.



THYMVM ab omnibus cognoscitur, furculosus frutex, exilibus folijs, multis, & angustis circumdatus: capitulis in cacumine, floré purpurascēte refertis. Gracili solo, & petroso prouenit. Vim habet hanc, ut cum sale, & aceto potū, pituitam per aluum detrahat. Decocti ius prodest orthopnoicis, & anhelatoribus: tineas uentris exigit: menses, partus, & secundas pel- lit: vrinas ciet. Cum melle in eclegmate faciles facit excreationes: recētes tumores discutit, cum aceto illi- tum: cōcretum sanguinem dissoluit, verrucas thymi colorem reddentes, penfilesque tollit. Ischiadicis cum uino, & polenta impositum subuenit: hebetibus oculis in cibo prodest. Perquā utile pro condimento, duntaxat ad usus eorum, qui rectē ualent.

THYMVM duorum generum esse testatum reliquit Theo- phrastus lib. VI. cap. II. de plantarum historia, ubi de eo disseruit his uerbis. Quin & thymum candidum, nigrumque reddunt. Serō id admodum floret: nam circa æstium solstitium incipit. Mel a- pes hinc capiunt; & hoc augurio apiarij constare affirmant, an probē melletur, nec ne. Etenim si aliter defloruerit, mellatio mi- nus probē succedit. Destruitur, peritque flos, si imber inceserit. Semen fecundum satureie, atque etiā magis origani manifestō sen- titur: thymi uerō nullum ostēdi potest, sed floribus quodam per- miscetur modo. Flores etenim serūt, itaque oritur thymum. haſte nus Theophrastus. Ceterum nunc thymum in Italia notissimum est. Præstat autem quod ex Apulia fertur: quanquam laudatissi- mum est, quod ē Creta insula, alijsque nonnullis Græciæ locis ad- uehitur. Vnius tantum thymi, minoris uidelicet, meminit hic Dio-

Thymi hi- storia.

scordes. Verum cum is libro quarto in epithymi historia, Epithymum florem esse scribat ē thymo duriore, satureie simile, haud dubie ostendit se non secus ac Theophrastum, duo Thymi genera obseruasse. Vnum, quod mittit surculos complures exilibus folijs, angustis, & numerosis circumdatus: in quorum cacumine sunt capitula flore purpureo res- fecta. Alterum uerō lignosius, fruticosius, ac durius, satureie simile. Thymo hoc duriore passim ferē scatet Goritiē- sis ager, cuius præcipue colles: in eoque (ut libro quarto suo loco dicitur) legitimum epithymum oritur. Thymi me- morat Galenus lib. V. I. simplicium medicamentorum, ubi de eius uiribus ita scribit. Thymum incidit, & calfacit mani- festē: ob id & urinam, & menses ciet, sætum euellit, & uiscera potum expurgat: educendis ex thorace, & pulmone confert. Itaque in excalfaciendo, & exiccando in tertio ordine statuendum est. Præter has autem à Galeno descriptas, alius quoque Thymo uires reddidit Aëtius sermone primo, sic inquit. Hæc uerō experimentis de Thymo comperta sunt. Dato ieiunis articulari morbo laborantibus, Thymi aridi minutissimi drachmas quatuor cum oxymelitis cyatho. Pilem enim, reliquosque humores, atque acrem saniem euacuat: facit & ad uesicæ affectus. Ventre autem inflato, ubi scilicet intumescente cœperit, drachmam unam dato ieiunis cum cochleari aquæ mulsæ. Ad lumborum coxendicumque dolorem, laterisque & thoracis, ac hypochondriorum suspensiones ac inflationes, pondere trium drachmarum cū oxy- melite temperato mensura cochlearij ieiuno exhibeto. Similiter etiam & melancholicis, & mente turbatis, timoreque detentis drachmas tres cum oxymelitis temperati cochleari præbeto. Dato item ieiunis, & ante coenam aduersus lipa- ptudinem, & uehementem oculorum dolorem. Præterea contra podagram, etiam quæ motum omnino interceper- it, cum uano utilissime propinatur. Postremo ad tumefactos testes ieiunis trium drachmarum pondere exhibeatur. Verum ab atro thymo abstinere oportet: corrumpit enim temperamentum, bilemque gignit. Eligendum quod purpu- ro flore est, præstantius tamen quod album illum habet.

Thymi uires ex Galeno, &amp; Aëtio.

Θύμβρα. SATVREIA. *Satureia* CAP. XXXVIII.

SATVREIA triualis notitiæ est. Gignitur in asperis locis, & tenui solo, thymo similis, mi- nor tamen, & tenerior: desert spicam florum plenam, coloris herbacei. Eadem potest, quæ thy- mum, si modo consimili sumptetur. Aprus sanis usus. Est etiānum quædam satiaua, sylue- stri prorsus minor, quæ propter mitiorem acrimoniam commodius in cibos recepta est.

Thymbræ co-  
sideratio.

## SATVREIA.



Thymbræ ui-  
res ex Paulo.

## SERPYLLVM.



Serpylli con-  
sideratio.

THYMBRA Græcis dicta, & Satvrea, Cumula, Le-  
nis, nobis in Hetruria, corrupto à Cumila nomine, uulgo uocatur  
Coniella. In alijs tamen plerisq; Italiae locis, quod à Satvrea  
cem corrumpere maluerint, appellatur uulgo Sauoreggia. Non  
desunt etiam inibi, qui ab acrimonia, quam piperis fere modo ge-  
stui representat, eam uulgo Peuerella, quasi Piperella nominant.

Thymbræ duo inueniuntur genera, sativum, & sylvestre, quod  
& gustu acrius, & odore fragrantius est, in campis, & se-  
bulosis proveniens. Ideoq; Columella minime damnadus uidetur,  
quod Thymbram à Satvrea discreuerit: quandoquidem is opi-  
me nouerat hortensem, ac sylvestrem Cumilam reperiri. quod &  
Plinius satis notasse deprehenditur. Ex quo facile intelligi potest,  
Columellam sylvestrem, Thymbram nuncupasse, hortensem uero  
Satvream. Ceterum quod in simplicium censu usquam Thym-  
bræ meminerit Galenus, nondum compertum habeo. Paulus uero  
eius mentionem fecit libro VII. ubi de utraque specie ijs pauca  
differit. Thymbra sylvestris eadem quæ thymum præstat. Horten-  
sis autem altera quidem imbecillior est, sed ad ciborum usum gu-  
tior, & accommodatior.

## ΕΓΩΥΛΛΟΣ. SERPYLLVM.

## CAP. XXXIX.

Quendel

SERPYLLVM duorum generum est. Hortense  
odore sampfuchum imitatur, atque in coronas addi  
solet. cui à serpendo nomen inditum est: quoniam si  
qua eius particula terram attingat, inibi radices demit-  
tet. Folia, & ramulos origani habet, sed candidiores.  
in macerijs multo procerius assurgit. Sylvestre, zy-  
gis appellatum, nõ serpit, sed in altitudinem increscit,  
ramulos edens tenues, furculosos, folijs repletos lon-  
gioribus, quàm ruta, & durioribus, angustis. Flors  
iucundè olent, gustati acres. Radicis nullus usus. Na-  
scitur in petris, satiuo efficacius, atque magis excalfi-  
ciens, & ad mediendi usum aptius. Menses trahit, & uri-  
nam potu ciet: torminibus, ruptis, vullis, & iecinoris  
inflammationibus auxiliatur: & aduersus serpentes po-  
tu, illituve prodest. capitis dolores mulcet coctum ad-  
iecto rosaceo, & madefactum in aceto: maximè uero  
phreniticis, & lethargicis conuenit. Cruentos nomi-  
tus sedat, succus, drachmis quatuor ex aceto potus:

SERPYLLVM hortense in Hetruria haud negligitur, sed  
in hortis feritur, & magna admodum diligentia colitur, quod  
etiam inibi (ut Dioscorides inquit) in coronamenta additur. Syl-  
vestre duorum est generum: unum flore candido odore citrini-  
li: alterum uero flore purpureo, gustu perquam acri, sativæ  
simili. Vtrunq; copiosissime nascitur apud Goritenses Salerni  
monte, quo mihi hætenus Letius nusquam uidere contigit, nec  
odoratius. Serpyllum à Theophrasto, cui hortense nil aliud esse  
censeo, quàm sylvestre in hortis satum, describitur lib. VII. cap.  
VII. de plantarum historia, ubi de eo differit, ijs uerbis. Serpylli  
sylvestre etiam genus est, quod deferentes ex montibus serunt, ut  
apud Sycionem fieri solet, atq; etiam Athenis ex monte Hymet-  
to: apud alios uero, ut in Thracia, montes, & plana omnia Ser-  
pyllo scatent. Peculiaris huic auctio germinum: quippe cum in  
quantumvis longitudinis procedere ualeat, nactum scilicet ab-  
neculum, aut iuxta sepes aliquas satum. Genera urbana reddere  
non est, ut retulimus: ferocia esse affirmant. Hoc enim in mon-  
tibus, tum saturiatum quoddam, atq; uehementissimum: in gra-

tem odore mollior; comperiri. Tempus ferendi plurimum autumnus: hoc enim primum ferere nimirum properant. h. c. Theophrastus. Ex cuius etiam uerbis satis perspicue colligi potest, duo esse sylvestris Serpylli genera. Quare et si palam unus tantum generis mentionem fecerit Dioscorides; duorum tamen obscure meminisse potuit, cum inquit. Serpyllum, & Zygis appellatum, non serpit, sed in altitudinem assurgit. Nam si unum tantum sylvestris Serpylli genus Dioscoridi notum fuisset, ei sane necessarium non erat addere Zygis cognomen differentie causa. Satiuum radicibus quidem serpit, sed ramulis attollitur, amaraci modo, quemadmodum sylvestris altera species, quæ malum citreum olet. Proinde sicut Plinius libro xx. cap. xxi. ita de eo memorie prodidit. Serpyllum a serpendo putant dictum. quod in sylvestri euenit, in petris maxime. Satiuum non serpit, sed ad palmi altitudinem increscit. Serpylli uires paucis perstrinxit Galenus lib. v. simplicium medicamentorum, sic inquit. Serpyllum usque adeo excofacit, ut & menses, & urinae moueat. est autem & gustu admodum acre.

Serpylli uires ex Gal.

Σαμψυχον. SAMP SVCHVM. Maiorana. InpraCAP. XL. folio 55


SAMP SVCHVM in Cypro, & Cyziceno laudatissimum. Secundum sibi locum uedicauit Aegyptium. Amaracum gens Sicula, & Cyzicena appellat. Herba est ramosa, per terram repens: folijs eius calaminthæ, quæ tenui folio constat, hirsutis, & rotundis. suauissimum odorem spirat: ideo coronis inseritur. Vis eius excofaciens. Succus decocti potus, conuenit incipientibus hydropicis, & ijs quos urinae difficultas, aut tormina excruciat. Illita ex melle arida folia, sugillata tollunt; menses subditi in pello trahunt: contra scorpionis ictum ex aceto, & sale illinuntur; luxatis, tumoribusque cerato excepta, imponuntur; aduersus oculorum inflammationes, cum polline polentæ, illini prodest. Acopis, malagmatisque calfaciendi gratia commiscetur.

Cum superius libro primo in Sampsuchini unguenti commendatione, Sampsuchum, & Amaracum idem esse latius ostenderim, etsi Galenus, & Paulus diuersis capitibus Sampsuchi, & Amaraci meminerint, eadem hic repetere superuacaneum duxi: quod ea huc facile transferre possint ij, qui rem hanc se aliter fortasse habere existimant. Sampsuchum in Italia Hetruscis, uulgo appellatur Persa, quod forte illis e Persia fuerit allatum: ceteris uero inibi Maiorana, nomine a Latinis mutuato. Herba hæc tantum cum mulieribus inquit gratiam sui odoris iucunditate, ut nulle ferè reperiantur, quæ suis in hortis, aut scitilibus uasis Amaracum non serant, uel plantas non transferant, ac diligenti admodum cultura foueant. Quo fit, ut putauerim ego, ex eo Maiorana sibi nomen adinuenisse, quod maiori cura, ac diligentia seratur, colaturque, quam ceteræ plantæ. Neque id ea solim ratione, quod, ut paulo ante diximus, odore perquam iucundo commendatur; sed quod etiam perpetua ureat coma. Sampsuchi meminit Galenus libro viii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Sampsuchum tenuium partium, & digerentis est facultatis: desiccatur enim, & excofacit ordinem.

Sampsuchi eo sideratio.

Maiorana.

Sampsuchi uires ex Gal.



Μελίλωτος. MELILOTVS, SIVE SERTVLA CAMPANA. CAP. XL I.

SERTVLA campana laudatissima in Attica, & Cyzico, & Chalcedone nata: cuius color uicinus est croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nolam, colore in luteum languescens, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam. Inflammationem omnem emollit, præsertim quæ in oculis, vulua, sede, aut testibus erumpat, si ex passo cocta illinatur: interdum autem addito oui luteo assato, aut sceni græci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis papaueris, intybóve. Recentes meliceridas per se cum aqua, & ulcera manantia in capite illita cum creta Chia, vino, aut galla sanant: stomachi dolores, & cruda, & cocta cum aliquo ex antè dictis leuat: doloribus aurium mingendis cruda ex passo instillatur: in aceto, aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit.

PROBATISSIMA, legitimæque Melilotus non modo in pluribus Campaniæ locis; sed etiam Gargano Apulie monte prouenit. Cuius semen in tenuibus corniculis inclusum nuper Venetias afferri coepit. Quo factum est, ut iam cognouerint medici uulgaris usus Melilotum illegitimum esse, potiusque lotum urbanam referre, cuius historiam libro quarto

Meliloti con sideratio.



Meliloti uir-  
ret ex Gal.

quarto tradidit Dioscorides. Meliloti meminit Plinius lib. xx. i. cap. ix. ubi ita scriptum reliquit. Ergo in corce-  
ta folio uenire apistrium, meliloton, quod Sertulan campanam uocamus. Est enim in Campania Italiae leu-  
Græci in Sumio, mox Chalcidica, & Cretica, ubicunq; uero asseris, & syluestribus nata. Coronas ex hac can-  
tus facit atas, indicio est nomen Sertule, quod occupauit. Odor eius croco uicinus est, & flos. Ipsa cana placti,  
xime folijs breuissimis, atq; pinguisimis. Melilotum, ut Galenus memorie prodidit lib. v. i. simplicium medic-  
nion, mistæ facultatis est: habet enim quiddam adstringens, sed & digerit, & concoquit: copiosior enim in eo est sub-  
stantia calida, quam frigida.

### MARVM.

### CAP. XLII.

MARVM herba cognita uulgò, surculosa, flore origani, folijs multò candidioribus, flore o-  
doratiore. Vim habet hysymbrio consimilem: substringit enim, & modicè calfacit. Qua de ca-  
sa illitu serpentia ulcera sistit, & in calidas illitiones additur. Iuxta Magnesiam, & Tralleis copio-  
sissima gignitur.

Mari mentio  
ex Galeno.

ET SI Galenus inter simplicia medicamenta nusquam, quod equidem inuenerim, Mari meminerit; libro tam-  
primo de antidotis in Hedychroi compositione eius mentionem fecit, cum ita scribit. Aliæ hedychroi descriptiones re-  
periuntur, quæ neq; Amaracum, neq; Marum prorsus habent: quædam alterutrum tantum continent. Neq; enim eo  
hec omnes noscunt unguentarij, eo quòd herbas solim è Creta aduectas emant una cum seminibus, atq; succis. Ego u-  
rò & eandem herbas scio in Asia nasci, ac in alijs quidem regionibus raras esse, in Cyzico autem frequentes. In illa  
quoq; ut & alias quasdam herbas, ita & Amaracum uidi, quæ odore multum à Maro superatur. Marum enim ad-  
de redolet, putaretq; aliquis sola nominis appellatione ductus, unguentum amaracinum, quod in Cyzico facimus, ama-  
raci plurimum capere, sicq; forsitan ab antiquis unguentum conficiebatur, sed nunc solim mari imponunt. Hanc her-  
bam aliquoties cum ipse degustassem, ac eam amaracum quidem plurimum, acrem uero parum deprehendissem, bonum  
sum quendam eorum, qui Amaracinum conficere solent, ut amaraci tantum compositioni immitterent, quantum & ma-  
ri. Ac mihi uisum est id unguentum minus quidem odoratum, nihil autem uiribus inferius. hæc Galeni uerba. Ex qu-  
bus palam est, Marum ab amaraco uiribus, & facie parum admodum disidere, etsi tum amarius sit Marum, tum eū  
odore fragrantius. Quapropter non planè eorum sententiam explodendam putarem, qui Marum amaracum illa q-  
arbitratur, quæ maiorem spirat odorem, maioremq; amaritudinem gustu præfert: quæq; folijs uiret minusculis, can-  
didioribus, & tenuioribus: unde non immeritò à nostris in Hetruria uulgò cognominatur Persa gentile. Sampsuchum  
enim, siue Amaracum, inibi Persa uulgò uocari superius indicauimus. Cuius illud genus, quod folijs constat pinguioribus,  
latisioribus, uiridioribus, gustuq; acrioribus, minus tamen amarum, legitima omnibus Amaracus esse censetur. Ma-  
rum inquam sententiæ fermè adstipularer, nisi eidem aduersari Galenus inueniretur: quippe qui loco citato testis  
sit, se in Italia amaracum uidisse, nulla quòd inibi Marum uiderit, facta mentione, sed tantum quòd hoc in alijs ab Asia  
regionibus rarum oriatur. Hinc itaq; facillè adducor, ut existimem Marum non nasci in Italia. Auget nobis opinio  
Plinius, qui quasi Galeno subscriberet, Marum duxit esse rarum inuentu, & Italiae peregrinum. quare ipsum re-  
cauit lib. xx. i. cap. xx. i. i. inter ea dumtaxat odoramentorum genera, quæ ab externis regionibus in Italiam conue-  
hebantur, sic inquit. In Aegypto nascitur & Maron peius quam Lydium, maioribus folijs, ac uarijs: illa breui-  
ac minuta, & odorata. hæc Plinius. Ceterum non ob id eos errare crediderim, qui graciliorem amaracum Maro lo-  
co substitunt. Quandoquidem testatur Galenus, quòd unguentum illud, in quo Amaracum pro Maro admissum fuit,  
est minus quidem odoratum uideretur; non tamen uiribus inefficacius erat.

Marum Italiae  
peregrinum.

### ACINOS.

### CAP. XLIII.

ACINOS, aut aconos à Græcis dicitur, tenui, siccoque ramulo herba, ocimo similis, odo-  
rata, sed hirsutior: qua coronæ faciuntur. à nonnullis olitoribus colitur. Menfes, & aluum po-  
ta sistit. Illita panos, ignemque sacrum sanat.

De Acino o-  
pinio quorun-  
dam explosa.

QUANQVAM sunt aliqui, qui Acinum eam ocimi speciem esse existimant, quæ angustioribus consistit folijs,  
quæq; iucundum esset odorem, cuius gratia, atq; etiam umbræ gratæ uirentis æstiuo tempore passim in singulis uis-  
fouetur extra fenestras ædium, & in atrijs, quam nos ob eius gracilitatem uulgò uocamus Basilico gentile: bonum ta-  
men opinioni apertissime refragatur Plinius libro xx. i. cap. xv. ubi Acinum scribit nunquam florere. Id quod minori  
ocimo non cuenit: siquidem hoc æstate, & autumnò floret, floribusq; ornatur albis, ac odoratis. Illud præterea illis  
etiam reclamatur, quod idem Plinius scriptum reliquit libro xx. i. cap. xxv. i. i. cum ait. Acinon & coronarum cas-  
ciborum Aegyptij serunt, eademq; erat, quæ ocimū, nisi hirsutior ramis, ac folijs esset, & admodum odorata. Ex his  
Plinij uerbis abundè palam fieri potest, Acinum non esse ocimum tenuifolium, eum hoc nec folia, nec caulem hirsuta  
proferat. Ceterum Manardus Ferrariensis, uir acri ingenio, & præstanti doctrina, nil aliud Acinum putauit esse,  
quam herbam quandam, quæ in incultis prouenit locis, sed præcipuè in agrorum, & uiarum aggeribus, ocimo hirsu-  
tior, ac satis suauiter olens. quæ quòd ocimum admodum æmuletur, à quibusdam syluestre Ocimum appellatur. Qu-  
bus sane notis aliàs adductus sum, ut Manardo prorsus assentiendum putauerim. Sed cum postea animaduertiret, her-  
bam hanc flores emittere contra Plinij auctoritatem, nunc cogor mutare sententiam. Nec me paritet, quòd nostris  
aut aliorum diligentia futurum sperem, ut de hac, & de alijs rebus dubijs quandoq; certiora proferantur.

Manardi opi-  
nio non acce-  
pta.

ΒΑΧΧΑΡΙΣ. BACCHARIS. *Smilax* CAP. XLIII.

BACCHARIS herba fruticosa, quæ in coronas ad-  
ditur. cuius folia aspera sunt, media uiolæ, & uerbasci  
magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinem pe-  
tens, aliquantulum asper, non sine appendicibus adna-  
tis: flore purpureo, subalbicante, odorato: radicibus  
ueratro nigro similibus, quibus odor inest cinnamo-  
mo proximus. Asperum, squalidumque solum amat.  
Radix in aqua decocta rupis, vulvis, ex alto præci-  
pitatis, spirandi difficultati, salutaris: item diurnæ tus-  
si, & urinæ difficili: menses pellit: contra serpentium  
morsus utilissimè datur in uino. Recens radix appo-  
sita partum extrahit. Puerperis eius decoctum in desef-  
sionibus prodest. In diapsmata utiliter inseritur in-  
cundi odoris gratia. Folia, utpote quæ adstringant, ca-  
pitis doloribus illius profunt: oculorum inflamma-  
tionibus, mammis tumentibus à partu, ægilopijs inci-  
pientibus, ignibusque sacris auxiliantur. Odor som-  
num gignit.

DVM EAM de Bacchari sententiam, quam superioribus  
annis lingua Italica expresseram, nunc demum his nostris Latinis  
commentarijs repetitam, excudendam, tradidissim, confessus in-  
genue me nusquam hactenus ueram Baccharim reperiisse, aut ab  
alijs repertam uidisse: accidit interea temporis, ut eam ad me Ro-  
ma misisset Andreas Lacuna Secobiensis, medicus hac nostra æta-  
te clarissimus. Cuius literas hic referre libet, quod eæ sint, quæ  
mihi maximum faciant argumentum humanitatis & beneuolentiæ  
sue, atq; etiam rei fidem addant: Literæ autem eius sunt ita ad me  
scriptæ. Etsi nos eidem, cui tu negotio illustrandi, locupletandiq;

Baccharis cō-  
sideratio.And. Lacuna  
literæ.

Dioscoridem nauemus asiduâ operam, ob idq; nobis ex usu sit hanc ad rem extorquere facultates alienas potius, quam  
dispare nostras: uolumus tamen tibi & amico, & de materia medica quàm optime merito communicare ueram Dio-  
scoridis Baccharim, quam haud ita pridem in hisce Romanis agris reperimus, quò possis illam ad uiuam formâ expre-  
ssam in usum humane salutis inferere tuis luculentissimis commentarijs, quos iam (ut fama est) primum Latine scriptos  
edere iussisti. Eam itaque chartæ alligatam ad te mitto, adeò per omnia respondentem descriptioni Dioscoridis, ut in  
ipsa nulla nota possit desiderari. Quippe folia eius sunt aspera, media uiolæ & uerbasci magnitudine: caulis angulo-  
sus, cubiti altitudinem petens, aliquantulum asper: radices nigro ueratro similes, quæ odore, & sapore imitatur exqui-  
ssimum cinnamomum. Porro flores, quos per inclementiam temporis nunc mittere ad te non licet, in nonnullis locis  
perperam, in alijs lutei uisuntur: Nā ut huius stirpis esse quæ species uideantur, uel si meminerit unius tantum Dioscori-  
des. Postremo huius plantæ uires, & facultates sunt omnino eadem, quas suæ Bacchari diuus tribuit Dioscorides. Hic  
caucus literis suis finem imposuit. Sed certè illud mihi permirum accessit, quòd eadem die, & ferè hora, qua Bacchari  
Romæ accepi, eandem Ariminò ad me misisset Iulius Moderatus diligentissimus pharmacopola, herbarumq; studio-  
sus: id quod aperte testatur hortus eius apud herbarios Italie non uulgari, ut qui sit uarijs ac nobilibus plantis refer-  
tus. Hanc sanè comperi nullis prorsus reclamantibus notis, Dioscoridis Baccharim representare: Nā præter quàm  
quòd constaret, ut illa, folijs asperis, magnitudinem inter uiolam & uerbascum referentibus, caule anguloso, cubitali al-  
titudine, aliquantulum aspero; habebat etiam in caule sua adnata folia, non coliculos. Hinc obiter suspicor legendum  
esse βαχχαρίς, non παρβαχρίς, ut uulgati Græci codices habent: quandoquidem illi lectioni adstip-  
ulant etiam Orbasij manu scriptus codex. Præterea flores, quibus illa carebat, huic in purpura candicabant, odor a-  
li. Eius deniq; radices erant ueratro nigro similes, & odore cinnamomo proxime. Huius igitur plantæ delineatione;  
quæ aduersioni historie Dioscoridis respondet, ut eius quoq; effigies, quam pictam damus, affabre demonstrat, facile ad-  
ducit ut affirmare non dubitem, hanc esse ueram, & legitimam Baccharim. Ceterum Leoniceus, & Erasaulus  
ipsam secutus, eam plantam magnò errore putarunt Baccharim esse, quam quidam Selaream, nonnulli uerò Matrisal-  
nam appellant. Sed cum huius radices non sint ueratro nigro similes, neq; minimum quidem odore cinnamomum imi-  
tentur, planè eorum sententia improbanda uidetur: præsertim quòd ueram Baccharim eam esse censeamus, de qua su-  
perius disseruimus. Non desuerunt etiam, qui crediderint, Baccharim Dioscoridi accreuisse caputq; hoc adulterinam  
esse, eo fortasse argumento, quòd eam hactenus inuenire non potuerint. quorum suspensionem augere potuit Galenus:  
quippe qui in simplicium censu de Bacchari quicquam, quòd equidem legerim, memorie prodiderit. Vnde ij in eam sen-  
tentiam denegerunt, ut Baccharim eandem esse cum asaro certò putarent. Verum horum quoq; error iam omnibus  
sententior factus est, quàm ut hic à me explodi debeat. Neq; enim ea solium ratione proditur, quòd pridè legitima Ba-  
ccharis

Leoniceus, &  
quorundā opi-  
reprobata.

Baccharis vi-  
res ex Paulo.

charis reperta sit; sed etiam quod legitimum hoc Dioscoridis caput esse comprobet Oribasius, in quo illud ex Dio-  
ride transcriptum legitur. Quinetiam idem confirmat Paulus Aegineta, qui Baccharis meminit lib. v. c. 11. atq; scri-  
bit, quæ facili, si cōstantur, Dioscoridi accepta ferrentur: sic enim inquit. Baccharis odorata est herba, odore cra-  
momo proxima, coronaria, acris. Huius, & asclepiadis decoctum meatus obstructos aperit, urinam, & menses cūa. Ita  
ipsius, cum sint adstringentia, fluxu nibri opitulatur.

Pharmac. RUTA. Ruta. CAP. XLV.



RUTA montana, sylvestrisque, sativa, & bor-  
tensi acrior est, & in cibis damnata: sativa uerò, quæ  
sub ficu arbore enascitur, magis in cibos admittitur.

Vtraque urit, calfacit, exulcerat, vrinam ciet, men-  
strua pellit, aluum sistit potu, ciboque. Lethalium me-  
dicamentorum antidotum est, si semen ex vino acetu-  
buli mensura ebibatur. Folia per se præsumpta, an-  
cum nucibus iuglandibus, aridisque ficis, inefficaces  
uenenorum vires reddunt: contra serpentes simili mo-  
do sumere conuenit. Genituram cibo, potuque extin-  
guunt: cum anetho, sicco decocta, tormina sedat. Fa-  
cit ad pectoris, laterumque dolores, difficultatem spi-  
randi, tussis, pulmonis inflammationem, coxendicū,  
articulorumque cruciatus, & horrores febrium cir-  
cuitu repetentes, pota, ut ante dictum est. Item ad in-  
flationes coli, vuluæ, rectique intestini cum oleo de-  
cocta, & infusa. Fœminas vuluæ strangulatū liberat, si  
à genitali sedētus cum melle subijciatur. Perues-  
ta ex oleo, & pota, ventris tinea excutit: articula-  
rijs doloribus ex melle, aquæ inter cutem cum ficis il-  
linitur: eisdem in potu auxiliatur, decocta in uino ad  
dimidias partes, & oblita. Cruda, conditaque ciborum  
suis aciem excitat: dolores oculorum illita cum polen-  
ta lenit: doloribus capitis cum rosaceo, & aceto illita,  
auxiliatur: profluentem naribus sanguinem sistit tri-  
ta, & indita. Testium inflammationibus cum laureis  
folijs imposita, & eruptionibus papularum cum myr-  
to, & cerato prodest: cum pipere autem, vino, & tu-  
tro affricta, albæ uirilgini medetur: cum eisdem illita

formicationes tollit, & uerrucas, quæ thymi florem repræsentant. contra impetigines cum alu-  
ne, & melle utilissimè imponitur. Succus in mali punici calyce calfactus, aurium dolor: efficaciter  
infunditur. Idem oculis, qui hebetudinem sensere, cum fœniculi succo, ac melle inunctis, opta-  
latur. Ignem sacrum, viscera quæ serpunt, aut in capite manant, cum aceto, rosaceo, & ceruſa illi-  
tus perſanat. manſa alliorum, ceparumque acrimoniam domat. Montana si copiosius estur, is-  
terficet. Dum florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, & rubore quodam inficit, cum  
pruritu ac uehementi inflammatione. oportet itaque eam unctis antea manibus, & facie colligere.  
Tradunt succum gallinaceis pullis insparſum, feles arcere. Adjiciunt eam, quæ in Macedoniar-  
ca Haliacmon amnem prodeat, comedentes interimere. Montosus autem is locus, uiperis fertur.  
Semen eius potum contra intestina uitia efficax est. In antidota commodè additur. Contra inco-  
tinentiam vrinæ tostum semen septenis diebus potui datur. Radix huius montanum moly voca-  
tur. Sylvestris ruta satiuæ similis est. Prodest comitialibus, & coxendicum doloribus: menstrua  
mouet, partus enecat. Acrior est viribus, quàm hortensis, & ualidior. Sylvestris, utpote noxa,  
cibis abdicatur.

Ruta confi-  
deratio.

Monachorum  
hallucinatio.

RUTA utraq; planta est uulgaris notitiæ, tam sativa inquam, quàm sylvestris. Non tamen uelim de illa sylvestri  
intelligi, de qua capite proximo differendū est, sed de ea tantum, cuius meminit Dioscorides in presenti capite, quæ  
in eius calce satiuæ similem fecit: siquidem hæc ab illa plurimum differt. Nascitur hæc sylvestris Ruta in Gortyni  
agro copiosissima, adeo ut qui circumstant montes, ea ubiq; scateant; præsertimq; Saluatinus mons, qui eadem sita  
uestitur. Facie hæc hortensi perquam similis est, graciliori tamen folio, & gustu acriori, amariorq;. Id quod Mo-  
nachorum in Mesuem scribentium (pace tamen eorum dixerim) ineptijs prorsus refragatur. quippe qui asserunt  
nullam ferè esse differentiam inter hanc, & androsenum, siue hypericum, uel quæ in alterius locum subsana pos-  
tur errore. Primum quod existimauerunt, turpi nimirum lapsu, sylvestrem Rutam ab androseno, & hyperico  
distingui.

*Edere.* Deinde quod putauerint hallucinati etiam, androsam, et hypericum unum, et idem esse, cum tamen Dioscorides de his seorsum, tanquam de differentibus plantis tradiderit. Huc tertius accedit error, et is quidem, mea sententia detestandus: quod prodiderint hanc sylvestris Rutæ historiam bis à Dioscoride descriptionem repetiri, magnamque habere cum hyperico cognationem. Quod potius somniasse, quam libero sensuum iudicio scripserint uidentur Monachi, cum non huius Rutæ caput sit illud, in cuius fronte in quibusdam codicibus, isque non probatis, illa legantur, quæ doctissimorum testimonio hic ascripta, hyperici autem propria censentur; sed quod proxime sequitur, in quo alterius sylvestris Rutæ, quæ alij Moly, alij Harmalam, alij uero Besasan appellat, tractatur historia. Quare caueat pharmacopoea, qui fortasse horum patrum scripta sequuntur, ne unâ excutientes sæpe ducantur in uarios errorum labyrinthos. Scribit Rutæ (ut auctor est Plinius libro xix. cap. v. 111.) fauonio, et ab æquinoctio autumnii. Odit hyemem, et tæmorem, ac frumum. Apricus gaudet, et siccis, terræque maxime lateritiis: cinere uult nutriri, hic et semini miscetur, ut careat erucis. Sub fici umbra libentius acquiescit. cuius rei causam suis in problematis reddidit Aristoteles. Mustela cum serpente dimicatura, in murium uenatu Rutam prius edendo se munit, gnara hanc contra uenena pollere. Vtuntur et ipsa hoc nostro tempore ad eadem demones depellendos, fortasse quod contra fascinationes eam commendauerit Aristoteles in problematis. Rutæ sylvestris, et sativæ meminit Galenus libro v. 111. simplicium medicamentorum, sic requiens. Ruta agrestis ex quarto est ordine excelsa facientium: domestica uero ex tertio. Est autem non solian gustu amari, sed et amaro. Ex quo etiam sanè digerere, atque incidere crassos, lentosque humores potest. Ob eandem uim et uisus mouet. Quia et tenuum est partium, flatibusque extinguit. Quare ad inflationes competit, ac ueneris appetitum cohibet: digeritque, atque exicat strenuè. Est enim eorum ex numero medicamentorum, quæ ualenter desiccant. Porro quod superius Moly, et Besasan nominari diximus, et ipsum utique fuerit ruta sylvestris.

Rutæ vires  
ex Galeno.

ΡΥΤΑ ΣΥΛΕΣΤΡΙΣ. RUTA SYLVESTRIS.

CAP. XLVI.

Vocant etiamnum syluestrem Rutam, quod in Cappadocia, & Galatia Asiæ finitima moly dicitur. Frutex est, qui ab una radice multos emittit cauliculos: folijs multò, quam alterius rutæ longioribus, tenerioribusque, odore graui: flore candido: capitulis in cacumine paulò maioribus, quam sativæ rutæ, quæ tribus maximè partibus constant: in quibus triangulum semen, subrufum, gustu amarum recluditur. cuius est usus. Semen autumnò maturescit. quod cum melle, uino, croco, & feniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem. Sunt qui eam harmalam uocent, Syri besasan: qui Cappadociam incolunt, moly, quoniam quandam cum moly ferunt similitudinem: radice nigra, flore candido. In collibus, & læto solo prouenit.

INVENIUNTUR ex Græcis codicibus Dioscoridis, item ex Latinis illorum fidem ad unguem secutis, qui uel maximo librorum lapsu, uel potius eorum temeritate, qui nimis scioli uideri uolunt, plura de hac altera syluestri Rutæ in capituli fronte scripta ostendunt, quæ doctissimorum quorumque consensu adiectitia sunt, et hyperico legitime debentur. Hac deprauata, imò addititia lectione decepti quidam uerum, literarumque parum gnari, turpiter aberrarunt, ceri credentes syluestrem hanc Rutam ab hyperico nihil differre. Quorum error simul deprehensus est: atque Dioscoridis lectio restituta à peritissimis uiris, qui rei discrimen exactissime nouerunt, et uetustissima Græca exemplaria consulerunt, in quibus nihil tale offenderunt. quemadmodum neque id sese offert lectitandum, in Oribasij codice manu scripto, herbarum descriptiones Dioscoridi acceptas referente. Quo fit, ut nullus amplius supersit ambigendi locus, quin ea ascripta sint, et ex hyperico, cuius propria sunt, hic perperam repetita. Sed hæc iam missa faciamus, et consueuimus duplicem esse sylvestris Rutæ speciem: unam domesticæ similem, de qua diximus in precedenti capite: alteram uero, de qua nunc agimus, quam quidam Harmalam uocant. Hanc ut ingenue fatear, hæcenus non uidi: non desunt tamen, qui eam demonstrare promittant in Italia, ac etiam iam ostendatur (ut audio) in publico horto Patauij. Quod non equidem negauerim, tamen si fuerit hæc peculiaris Cappadociæ, et Galatiæ planta. Aphri corrupta à Græcis appellatione Harmel pro Harmala dicunt. Verum enī numero grauissimo errore ducuntur seplasiarij, qui Luminis apothecariorum scripta secuti, huius Rutæ, siue Harmel loco, fortidis, et aggregatiuis dictis catapotijs, alijsque compositis medicamentis cicutæ semen admiscunt. Quod non soliam suis uan qualitibus, tum facultatibus Harmale omnino repugnat: sed etiam uenenum lethale existit. Errandi causam præbuit Quiricus Augustus Tortonenfis: quandoquidem is, ubi in consueuendis fortidis catapotijs, quid sit Harmel explanare contendit, ait Siluatici Pandectarum auctoris testimonio, quod quotiescunque reperitur Harmel cum aspiratione nil aliud apud Arabes designat, quam semen cicutæ: si uero afflatu, Rutæ sylvestris semen. Quod euident, ac execrandum est mendacium: siquidem Harmel tam afflatum, quam nudè scriptum Mauritanis perpetuò agrestem Rutam significat, ut Serapionis, et Auicennæ auctoritate facile probari potest suis in libris, in quibus simplicium historias, et facultates posteritatis memorie prodiderunt. Nam quæ illi de Harmel scripserunt, Dioscoridi, et Galeno Rutam hanc describentibus prorsus adstipulantur. Ceterum Auicenna ipse Harmel etiam meminit libro quarto sui Canonis, ubi uiperarum morsus curationem tradens, sic inquit. Rutæ sylvestris (et non est alharmel, secundum quod existimauerunt quidam, imò est species rutæ ipsius) confert morsibus uiperarum. hæc ille. Sed ne forte quis Auicennam non rectè intelligens, in his uerbis decipiatur, ut suis in Paradocis Euchsium uirum alioqui expertissimum in Auicennam acriter agentem, deceptum fuisse deprehendimus, ut qui illud, ut puto, minus intellexerit, sciendum profecto est (quemadmodum etiam antea aliquoties retulimus, et nunc, quoniam ad rem faciat, id ipsum repetere non alienum erit) quod non eiusdem utique generis est sylvestris Ruta, de qua unâ cum domesticæ superius tradidit Dioscorides, et hæc, quam Græcorum quidam Harmalam, Mauritani uero Harmel.

Rutæ sylue-  
stris alterius  
consider.

Seplasiariorū  
grauis error.

Fuch. lapsus,  
& Auicennæ  
defensio.

sive Alharmel appellant. Ex hac omnibus perspicua Rutæ sylvestris distinctione, quantum equidem reor, liquet. Tebit, Auicennam baudquaquam errasse, ut errorē immerito illi iniungit Fuchsius. Quippe cum inquit Auicenna, sylvestris (et non est alharmel, secundum quod existimauerunt quidam, imò est species rutæ ipsius) confert morbum super arum, ijs uerbis declarat se illam hic sylvestrem Rutam intelligere, quæ domesticam emulatur: non autem illam, de qua hoc loco differit Dioscorides, quamq; sue Arabicæ familie autores Harmel, siue Alharmel uocant. Eius loco citato, paulò antè meminerat, sic inquit: Et alharmel est de medicinis liberantibus. Vbi per Alharmel eas sanè Rutam sylvestrem intelligit, de qua præsens sermo est. ob cuius differentiam, postea alterius Rutæ sylvestris distinctionem faciens, subiungit illa uerba, quæ iam bis citauimus. Vt hinc palam faceret, se non modò de alio sylvestris Rutæ genere intellexisse; sed etiam occurrisset, ne quis, si sine distinctione locutus esset, se idem frustrà repetisse crederetur. Porro non desunt qui sustinere contendunt, Harmel esse Cicutam, Auerroem in medium adducentes, quem libro

Quorundam error, et locus Auerrois restitutus.

v. suarum collectanearum ita scriptum reliquisse uolunt. Harmel, id est Cicutæ, calida est, et sicca in tertio gradu. Eicit crassos humores, et prouocat urinam, et menses, et ualet dolori scapularum, et purgat phlegma. Hæc sunt tunc auctoritate. Quibus ita facile responderi potest, quòd cum Cicutæ hoc loco eas Auerroes tribuat faciliat, quas etiam Harmale, nomine tanè Moly, reddidit Galenus, manifestè deprehenditur Auerrois codex librarius deperit fuisse deprauatus. Neq; difficilis lapsus fuit, quòd ij uocum similitudine decepti Cicutam pro Ruta legerint, ac persperint. Adde etià illud (hoc enim medicorum neminem latet) quòd tantum abest ut Cicutæ tertium caliditatis gradum obtineat, cui illam assignat deprauata Auerrois lectio, ut ne primum quidem attingat, cum Dioscoridis, et Galeni testimonio, in quarto frigiditatis ordine collocetur: ob idq; eam lethale uenenum esse affirmant. Quapropter quam pè me agatur ab ijs, qui Cicutæ formidandum semen ijs compositis medicamentis addunt, quorum usus est ad decedendos, incidendos, extenuandosq; lentos humores, ij dijudicent, qui ueritatis studio deliti huiusmodi cauillationes, quæ sepe

Rutæ sylvestris alterius vires ex Gal.

hominibus perniciem pariunt, tolerare non possunt. Rutam hanc sylvestrem appellat Galenus Moly libro vii. simplic. med. ubi de ea differit his uerbis. Moly, hoc quidam uocant peganon agrion, hoc est, Rutam sylvestrem, nonnulli harmolan, Syri besasan, sicut Cappadoces moly, quia radicem habeat nigram, et florem lacteum. Vis eius remota est partiu, et calida tertio abcessu: unde crassos humores secat, ac digerit, et urinam mouet. Hæc Galenus de altero sylvestris Rutæ genere. Cui constat et primum sylvestris Rutæ genus perpulchrè respondere. Ex quo crediderat, quòd sine ullo errore seplasiarij alteram alterius loco subijcere possint, quoties Arabum harmel in suis composu uicem amentis admiscendū reperunt. Est et alia Rutæ species, quæ recentioribus quibusdam Caprariis cognominatur, quibusdà uerò Galega dicitur, nostrates eam uulgò appellant Lauanese. Passim hæc in scrobium aggeribus, humentibusq; locis prouenit, scno græco persimilis. Magnificiunt ipsam nonnulli suis experimentis nixi non modò aduersus pestilentiam, et lethalia medicamenta; uerum etiam contra ferarum omnium, quæ dentibus, aut aculeo uenenum emittunt, tum morsus, tum ictus: in què usum herbam, uel eius succum bibèdum præbent, ac etià emplastri modo ualuerunt per tibus imponit. Laudant aliqui succum sesquiuicæ pondere haustu pueris comitali morbo uexatis. Ceterum aperit me falluntur, qui putant Rutam hanc caprariam dictam Polemoniam esse, ut latius libro quarto suo loco dicemus.

Rutæ capraria mentio.

**MOLY** folia habet graminis, latiora, humi sparsa: florem albæ violæ similem, sed minores, magnitudine violæ purpureæ æmulum, lactei coloris: caulem candidum, quaternum cubitorum: cuius cacumine inest aliquid, quod allij speciem referat. Radix parua, bulbosa, quæ mirum in modum ualet ad vuluæ apertiones, si trita cum irino vnguento, in pello subijciatur.

Moly historia ex Theophrasto & Plinio.

**MOLY**, ut scriptum reliquit Theophrastus libro ix. cap. xv. de plantarum historia, apud Pheneum esse, et apud Cyllenam esse (quemadmodum Homerus dixit) affirmant: radice rotunda, non absimili cepæ, folio scillæ. Vbi et eius contra ueneficia summa: non tamen effodi difficulter, ut ait Homerus. Moly quoq; meminit Plinius libro xxi. cap. xlii. ita scribens. Laudatissima herbarum est, Homero teste, quam uocari à dijs putant Moly. Ast inueniuntur eius Mercurio assignat, contraq; summa ueneficia demonstrat. Nasci eam bodie circa Pheneum, et in Cyllene Arcæ diæ tradunt, specie illa Homericæ, radice rotunda, nigræq; magnitudine cepæ, folio scillæ: effodi autem difficulter.

Græci autores solum eius luteum pinxere, cum Homerus candidum scripserit. Inueni e peritis herbarum medicis, qui et in Italia nasci eam dicerent, afferriq; Campania mihi aliquot diebus effossam inter difficultates saxæas, radice triginta pedes longæ, ac ne sic quidem solidæ, sed abruptæ. hæc Plinius. Ex cuius sanè uerbis facile cognosci potest, Moly ab eo secundo loco redditum, quod in Campania effossam, et sibi allatum scribit, ab illo plurimum discedere, quod Homerus, et Dioscorides notis non planè consentientibus representant. Moly cui Dioscoridis delineatio respondet, hætenus in Italia reperire non potui, neq; ab alijs inibi repertum, aut aliunde aduectum scio. Ceterum herbam Moly

Myles vires ex Galeno.

ly Dioscoridi appellatam, eandem nimirum esse putauerim cum illa, quæ Galeno libro vii. simplicium medicamentorum, Myle uocatur, cum inquit. Myles radix paruo bello similis est, facultatis contrahentis. nam cum farina trita, (hoc est loli) apposita apertam uulnam sanare scribit Dioscorides. His uerbis Galenus non solum quidem Mylem sicut Dioscoridis Moly acceptam refert; sed etiam nos commonet mendi cuiusdam, quod hucusq; latuit in codicibus Græcis Dioscoridis. Quippe quòd ubi in huius capitis calce legitur μετὰ ἰρίου μύρον, quod est, cum irino unguento, Galeni testimonio, legèdum sit μετὰ αἰρίου ἁλουργίδας, id est, cum farina loliacea. Et certè in id uirium facile librarij quædam scripturarum uicinitate labi potuerunt. Sed addamus rationem, qua uulgaris lectio deprauata manifestè deprehenditur. Nam si unguentum irinum efficaciter aperit, non uideo quid Moly radix cum eo præstare possit πρὸς ἰρίον ἁλουργίδας, hoc est, ad uulvæ apertiones. Sic enim ex Græco rectius reddendum puto, quam ad aperendas uulvas, ut uertuntur Marcel. et Ruel. qui tamen secus facere nō poterant, si unguenti irini rationem habere uolebant.



Πάσις ἱράκλειον. PANACES HERACLEVM.

CAP. XLVIII.

PANACES nonnullis Heracleum dicitur: ex quo opopanax colligi solet. Plurimum in Bœotia, & in Phocide Arcadiæ nascitur: ibique compendij, & quæstus, qui ex eo liquore factitatur, gratia, studiosè colitur. Folijs est asperis, in terra iacentibus, herbacei coloris, multum ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinquepartitò diuisis: caule, vt ferulæ, altissimo, qui lanugine quadam incanescit, folijs etiam minutioribus obsitus: muscarijs, ceu anethi, in cacumine: flore luteo, & semine odorato, feruenteque. Radices habet multas ab origine vna, candidas, graueolentes, crassi corticis, & subamari gustus. Nascitur in Cyrenæ Libyæ, & Macedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti caulium pullulatu. Ea candidum succum emittit, qui ficcatus in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem autem succum excipiunt, folijs excavato solo stratis, quæ ficcata tolluntur. Simili modo caule mœsisibus inciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, distentæque, siccæ, quæ cariem non sentiant, aromaticæ, feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex agnatis stolonibus, ab vsu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur, quàm amarissimus, internè albus, aut subfuluus, foris ad croci colorem inclinans, lævis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquescent, graui odore. Niger improbatur, ac molli. Adulteratur ammoniaco, aut cera. Sed synceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluatur, et lactescat. Excalfacit, mollit, extenuat: horroribus febrium, circuitibusque, vulsis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio vrinæ conuenit. Contra vesicæ scabiem ex aqua mulsa, aut vino bibitur: menses trahit, foetum enecat. Inflationes, quæ vuluam malè habent, duritiasque, ex melle dilutus, discutit: ischiadicis illinitur. acopis, & capitis medicaminibus admiscetur: carbunculos rumpit. Podagricis, cum vna passa illitus subuenit: dolore dentium liberat, cauis inditus: oculorum aciem illitu excitat. Ex eo, & pice optimum fit emplastrum contra bestiarum morsus, quæ in rabiem efferantur. Radix in ramenta conscissa, vuluæ admota, partus extrahit: ad vetera vlcera efficax est. nudata ossa corpore operit, si trita cum melle illinatur. Semen cum absynthio sumptum, menses pellit: cum aristolochia, prodest aduersus animalia, quæ venenum eiaculantur: & contra vuluæ strangulatus in vino bibitur.

Πάσις ἀσκληπίον. PANACES ASCLEPIVM.

CAP. XLIX.

PANACES Asclepij caulem à solo emittit tenuem, cubitalem, geniculatum: circa quem folia funduntur fœniculo similia, maiora tamen, & hirsutiora, odorata: in cacumine vmbella, vbi flores emicant aurei, acris gustus, & odorati. radix parua est, & tenuis. Auxiliarem vim habent flores, & semina, contra vlcera, phagedænas, & tubercula, si trita cum melle imponantur. aduersus serpentes ex vino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui panaces syluestre origanum vocant, alij cunilam, de qua in origani mentione diximus.

## ΠΑΝΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΝΙΟΥ. PANACES CHIRONIVM. CAP. I.

PANACES Chironium in Pelio monte maximè provenit. folium eius amaraco simile: flos aureus: radix parua, quæ non altè demittitur, gustu acris. Pota radix serpentium veneno reficit. Illita coma, eadem præstat.

Panacis confideratio.

Mef. lapsus.

Panacis vires ex Galeno.

PANACES Heracleum in Apulia frequens nascitur, quemadmodum in Apennini iugis, & in Argentario promontorio in nostris maritimis Senensibus. Habetur & in quàm plurimis Italiæ uiridarijs, ubi summa diligentia colitur ab his, qui simplicium medicamentorum studiosi, ad suum aliorumq; commodum innumera plantarum genera suis in botanis, ac uiridarijs serunt, ac colunt. Verum non ob id affirmauerim, eius lacrymam, quam officinæ Opoponacum uocant, excipi in Italia. Nam quæ Venetijs uenalis reperitur, ex Alexandria Aegypti conuehitur. Legitima non desit, et adulterata frequentior sit usus apud eos, qui ex quavis herba manipulos colligunt. In Panacis historia aperius aberrauit Mesues: quippe qui initio capitis omnia eius genera confundat. Quod omnibus iam notius est, quàm ut à nobis ostendi debeat. Panaces Asclepium nuper uidimus, eiusq; effigiem hic appinximus. Sed Chironium non prorsus, quod sciam, in Italia. Panacis genera ab inuentoribus cognominari tradunt. nempe Asclepium ab Aesculapio, Chironium à Chirone, & Heracleum ab Hercule: quare & Herculeum à plerisq; est appellatum, cuius tantum lacrymæ hoc tempore officinæ utuntur. Semen enim, ac radix, etsi in pluribus ualeant affectibus, ad nos tamen, quod uideremus adferuntur. In quorum defectu optimi chirurgi, cum denudata ossa carne explere uolunt, radicem segmenta, quæ lacrymæ compacta reperiuntur, quæquæ illa sint, non paruo labore seligunt, & ad hunc usum in puluerem redeunt.

Panacis vires descripsit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, his uerbis. Panaces Heracleum inquit, ex hoc fit uocatus Opopanax, radicibus eius, & caulibus excisis. Porro opopanax ipse longe est ad plurimos usus aptissimus, utpote excalfaciens, emolliens, & digerens: ponatq; ipsum quispiam in calfaciendo tertij ordinis, in desiccando uerò secundi. Cortex radicis exiccatorium simul, & excalfactorium est medicamentum: sed minus quàm succus. quin & nonnullam habet abstergendi facultatem. Quare eo quoq; utimur & ad ossa denudata, & ad ulcera maligna, & contumacia. Sufficiens enim talia carnem procreant, scilicet abstergendo simul, & desiccando, nec in malignopere calfaciendo: quæ omnia ad carnem generandam necessaria sunt, uelut in libris de curandi ratione ostenditur. Fructus calidus & ipse est, ac mensibus mouendis medicamen accommodum. Ceterum nescio, quo pacto nunc fere omnes ex more non panaces, sed panacea herbam hanc uocitent. Panaces autem Asclepium minus est calidum super dicto panace: quamobrem eo, & floribus eius, & semine melli mustis ad ulcera, phymata, & phagedenas utuntur.

Panaces uerò Chironium & ipsum similem prædicto facultatem possidet. hæc Galenus. Porro deijcit Panacis lacryma (ut auctor est Mesues) à remotis corporis partibus, præsertimq; ab articulorum compaginibus, lentam, crassam, contumacemq; pituitam. Cerebrum, & neruos expurgat, præcipue cum frigidis torquentur morbis.



## ΛΙΓΥΣΤΙΚΟΝ. LIGVSTICVM. CAP. II.

LIGVSTICVM, quod alij panaceam, alij panaces uocant, plurimum in Liguria nascitur, in monte Apennino Alpibus conterminis: unde nomen trahit. Panaces incolæ non ab re appellant, quoniam & radice, & caule Heracleotico panaci simile sit, & uiribus & eisdem præditum. Gignitur in altissimis, asperisque montibus, ac umbrosis, maximè iuxta fluuenta. Cauliculum fert anethi, geniculatum, tenuem, & in circuitu folia fertulæ Campanæ, molliora, odorata, prope verticem graciliora, & longè magis diuisa: in cacumine muscarium, in quo semen dependet nigrum, solidum, & oblongum, feniculo proximū, gustanti acris, & aroma olens: radix candida, Heracleotici panacis similis, odorata. Radicis, feminisque uis excalfactoria, concoquens. Prodest ad intestinos dolores, tumores, concoctiones: item ad inflationes, præsertim quibus stomachus turgat: & contra serpentium ictus: vrinas, & menses potu trahit. Eisdem præstat effectus apposita radix. Semen cum radice oxyporis, & medicamentis decoquentibus admiscetur. ori perquam utile: quare pro pipere utuntur eo indigenæ ad obsonia. Adulteratur semine quodam simili: quod facile gustu discernitur: amarum enim est. Alij semen feniculi, aut seselis admiscentes, ligusticum dolo vitiant.

FALLUNTUR aperte, ut mea quidem fert opinio, qui herbam uulgò hodie *Leuisticum* nominant, quam *le-*  
*gumum* *hipposelinum* censimus, putant esse *Ligusticum* hic à Dioscoride representatum, quod *Galenus* unius literæ  
 notatione *Libysticum* appellauit. Siquidem hoc caule assurgit tenui, & folijs fertule *Campanæ* similibus. Illud uerò  
 caulem profert altum, crassum, concavum, & geniculatum: folia apij palustris æmula, maiora tamen, ac etiam cras-  
 siora. Ceterum quauis legitimum, ac uerum *Ligusticum* in *Liguria*, cuius *Genua* metropolis est, unde etiã nomen in-  
 uenit, frequentissimum proueniat, sitq; inibi adeò uulgaris notitiæ, ut eius semine passim utantur incolæ in ciborum cõ-  
 dementis; non ob id tamen per cetera *Italiæ* loca hactenus, quod sciam, deferri cœpit. Nascitur in *Ananissibus* mon-  
 tibus, quoniam & in *Goritissibus*. *Venetijs* etiam uideri potest in horto *Maphei* medici clarissimi. *Galenus* de *Liby-*  
*sico* differens libro VII. simplicium medicamentorum, sic breuiter inquit. *Libystici* radix, & semen ex genere ex-  
 calascentium sunt, adeò ut menses cieant, & urinas prouocent, statusq; discutiant.

In *Ligustico*  
 quorundam  
 error.

*Libystici* ui-  
 res ex *Gal.*

PASTINACA SATIVA. *Morm*

PASTINACA SYLVESTRIS.



Σταφυλίος. PASTINACA. *Wild parsnip* CAP. LII.

PASTINACA Sylvestris folia gingidij habet, latiora, subamara: caulem rectum, scabrum: umbellam similem anethi: in qua flores insunt candidi, & in medio purpureum quiddam, ferme croceum. radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen porum, uel impositum, menstrua mouet. Iis conuenit in potione, quos urinae difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua cutem subiit: serpentium moribus, ictibusque prodest. præsumentes id, nulla affici iniuria à serpentibus traduntur: conceptus adiuuat. Radix urinam pellit, uenerem stimulat, partus apposita eiicit. Folia tria, & cum melle imposita, phagedænas ulcerum purgant.

10 Satiua ad eadem pollet, inefficacior tamen, & cibo aptior.

VULGARES admodum sunt in Italia tam satiuæ, quam sylvestris Pastinacæ radices, ut quæ passim quadri-  
 gesimalis ieiunij tempore non ingratis in ciborum usum recipiantur. Ceterum quoniam fortassis in Gallia non serun-  
 tur in hortis, Ruellius manifesto errore putauit. Carotas nobis uulgò uocatas, quas coctas, salē, oleo, & aceto addi-  
 ta, hyeme usqueparatus in acetarijs, satiuas esse Pastinacas. Vt hinc maxime admirari subeat Ruellium uirum alioqui  
 doctissimum. Siquidem hactenus neminem inueni e rei herbarie scriptoribus tam Græcæ, quam Arabicæ familie, qui  
 memorie prodiderit, Pastinacam satiuam radice niti adeò rursus, ut sanguineo succo madeat, qualis Carota dicta inesse  
 deprehenditur. Satiua in Italia frequentissima seritur in hortis. Erratica uerò nonnusquam in campis ac incultis sua  
 sponte nascitur. Vtraq; albicantibus constat radicibus, quæ in locis quàm plurimis coctæ manduntur. nanque ea in  
 quatuoragesimo præsertim ieiunio citiò farina, & oleo fringuntur, & ita sepe, ubi desunt pisces, eorum uicem suppleant:

Pastinacæ cõ-  
 sideratio. Nota Carotæ  
*Root morm*  
 Ruellij erra-  
 rum.


Quorundam  
eior.

Pastinacæ ui-  
res ex Gal.

licet pro ieiunantium instituto, essent potius eorum cibis abdicandæ: uenerem enim non obscure stimulant. Fatur præterea, qui Dauci loco, agrestis Pastinacæ semen accipiunt, illius scilicet, in cuius florentis umbellæ medio crugum quid purpurei emicat. Aliud enim est à Pastinacæ erratica Daucus, ut paulò inferius suo loco dicitur, ut autem tres species à Dioscoride redduntur. Nam quauis tam ex illius, quàm Galeni sententia libris tum de simplicium medicamentorum, tum de alimentorum facultatibus, Daucus à syluestri Pastinacæ parum, uel potius nihil uariis differat, ob idq; alterum alterius uice in medicinæ usu capi possit; non tamen rectè dici potest, Daucum erraticum esse Pastinacam. Pastinacæ meminit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Pastinacæ satius becillior: agrestis ad omnia potentior est. Vrinæ mouet, & menses prouocat cum herba quidem tota, tum maxime semen, ac radix. Habet porro etiam absterforium in se quippiam. quoniam ulcera phagedanica quidam solys eas uiridibus cum melle, quò pura reddant, illinunt.

SESELI MASSILIENSE.

SESELI AETHIOPICVM.



Σέσέλι. SESELL

CAP. LIII.

SESELL Massiliense folia fœniculi habet, crassiora: caulem uegetiorem: umbellam anethi, qua semen oblongum, angulosum, degustanti statim acre: radix longa est, iucundi odoris. Semen, & radix exalfaciendi uim habent: Potu stranguriæ, & orthopnoæ medentur: suffocationibus mulierum, comitialibusque profunt: menses; & partus trahunt: ad omnia interna mala polent: tussim ueterem sanant. Semen cum uino potum, concoquit, & tormina discutit: epialis febribus utile. contra perfrictiones in itineribus, cum pipere, & uino bibitur: Capris, cæterisque pecudibus datur in potu, quò facilius suos foetus enitantur. Aethiopicum seseli, folia habet herdaræ, minora, & ad periclymeni modum oblonga. frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis: ramis sesquipedalibus: capitulo anethi: semine in tritici morem denso, nigro amaro, Massiliensi odoratiore, & acriore, multum suauis. Peloponnense folia habet cicutæ, latiora, & crassiora: caulem supra Massiliensis magnitudinem, ferulaceum: & latam in cacumine umbellam, in qua semen latius, odoratum, & carnosius pendet. Eisdem uiribus præditum est. Nascitur in asperis, riguis, & collibus. inuenitur etiãnum in insulis.

Τορδύλιον. CRETICVM SESELI.

CAP. LIIII.

TORDYLIVM, quod aliqui Creticum seseli uocant, iuxta Ciliciam in Amano monte nascitur, herbula furculosa, semine duplici rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Con-


## SESELI PELOPONNENSE.

tra vrinæ difficultatem bibitur: potu cit menses. Succo seminis, caulisque uirentis, ternis obolis ex passo decem diebus hausto, renes sanantur. Efficax est radix ad ciendas pectoris excreationes, in delinctu cū melle.

**SESELI** Arabibus *Sifileos* dicitur. Officinæ uerò id *Siler montanum* appellant. Legitimum *Seseli* *Masiliense* in omnibus ferè *Tridentinis* montibus legitur. Sed maxime animaduertendum est, quòd quanquam in quibusdam *Italiæ* pharmacopolijs, uerum sit reperire *Seseli*; in quàm plurimis tamè quoddam semen *Seselis* uicem explens uenditur, quod nulli prorsus *Seseli* à *Dioscoride* descripto respondet: quippe quod amaritudine tantum sit præditū, & olfactui cinicium fetorem representet. Porro *Seseli* *Aethiopicum*, ac *Peloponense*, quæ prius in *Italia* non uiderā, hoc anno à me, ut spero, reperta sunt. Caterum aliquando credidimus, *Toradylum*, siue *Creticum Seseli* in quodam nostro hortulo natū esse, quòd eius semen (ita enim aiebant) è *Patauino* simplicium uiridario allatū, terræ commissem. Verum cum postea accuratius eius faciem contemplatus essem, itemq; saporem examinasset, id à legitimo longè admodum disidere cognoui. *Seselis* monstratio prima assignatur ceruis foeminis. Siquidem tradit *Aristoteles* lib. ix. cap. v. de historia animalium, ceruas statim à partu *Seselim* herbam petere, & cum eam ederint, ad prolem redire. *Seseli* omne genus in uniuersum memoriæ prodidit *Galenus* lib. viii. simplicium medicamentorum, ubi ita scribit. *Seseli* & radix, atq; etiam semen usque adeò excalfacit, ut admodum urinam mouere queat. Sed & medicamentum est tenuium partium, ut & comitali morbo, & orthopnoea competat.

*Seselis* confederatio.

*Seselis* vires ex *Galeno*.



ANISVM. *Quind*


## ΣΙΣΟΝ. SISON. CAP. LV.

*Fructus Sisonis*

**SISON** exiguum semē est, in *Syria* natum, apio simile, oblongum, nigrum, feruentis naturæ: Contra lienis uitia bibitur: vrinæ difficultatem potu emendat, remoratos menses citat. Eo in condimentis, cū cucurbita, & aceto indigenæ utuntur. In cacumine granula multa gerit.

**SISON**, ut hic *Dioscorides* testatum reliquit, semen est in *Syria* proueniens, nobisq; incognitum: quandoquidem plantam, quæ illud proferit, apud ullum authorem suis notis descriptam non inuenio: nec semē ipsum, quod equidem sciam, ad nos è *Syria* deferitur. Quapropter illius patriæ gentibus relinquendā duximus, ubi eius notitia, & seminis usus. Nam præterquam quòd difficile sit, etiam periculosum iudico, de rebus peregrinis, quarum delineationes latens, aliquam proferre sententiam.

*Sison* semen incognitum.



## ΑΝΙΣΟΝ. ANISVM. CAP. LVI.

*Quind*

**ANISVM** in summa excalfacit, exiccat. oris halitum incundiorem facit, doloris leuamentum præstat. Urinam ciet, discutiendi uim habet, hydropicis potum sitim extinguit. Animalium uenenis aduersatur; valet ad inflationes; aluum, & alba foeminarum profluvia sistit: lac ad mammas elicit: venerem stimulat. dolores capitis leuat, suffitum naribus. cum rosaceo tritum, instillatumq; fractis auribus medetur. Melius semper recens, plenum, non furfurosum, odore præstans. Inter prima laudatum est *Creticum*; proximo loco *Aegyptium*.



Anifi confide-  
ratio, & uires  
ex Galeno.

C A R V M.



### Cari confide- ratio.

Monachorū  
erroꝛ.

Cari vires ex  
Galeo.

ANISVM uulgaris omnibus fere notitie planta est, <sup>3</sup> <sup>4</sup> <sup>5</sup> <sup>6</sup> <sup>7</sup> <sup>8</sup> <sup>9</sup> <sup>10</sup> <sup>11</sup> <sup>12</sup> <sup>13</sup> <sup>14</sup> <sup>15</sup> <sup>16</sup> <sup>17</sup> <sup>18</sup> <sup>19</sup> <sup>20</sup> <sup>21</sup> <sup>22</sup> <sup>23</sup> <sup>24</sup> <sup>25</sup> <sup>26</sup> <sup>27</sup> <sup>28</sup> <sup>29</sup> <sup>30</sup> <sup>31</sup> <sup>32</sup> <sup>33</sup> <sup>34</sup> <sup>35</sup> <sup>36</sup> <sup>37</sup> <sup>38</sup> <sup>39</sup> <sup>40</sup> <sup>41</sup> <sup>42</sup> <sup>43</sup> <sup>44</sup> <sup>45</sup> <sup>46</sup> <sup>47</sup> <sup>48</sup> <sup>49</sup> <sup>50</sup> <sup>51</sup> <sup>52</sup> <sup>53</sup> <sup>54</sup> <sup>55</sup> <sup>56</sup> <sup>57</sup> <sup>58</sup> <sup>59</sup> <sup>60</sup> <sup>61</sup> <sup>62</sup> <sup>63</sup> <sup>64</sup> <sup>65</sup> <sup>66</sup> <sup>67</sup> <sup>68</sup> <sup>69</sup> <sup>70</sup> <sup>71</sup> <sup>72</sup> <sup>73</sup> <sup>74</sup> <sup>75</sup> <sup>76</sup> <sup>77</sup> <sup>78</sup> <sup>79</sup> <sup>80</sup> <sup>81</sup> <sup>82</sup> <sup>83</sup> <sup>84</sup> <sup>85</sup> <sup>86</sup> <sup>87</sup> <sup>88</sup> <sup>89</sup> <sup>90</sup> <sup>91</sup> <sup>92</sup> <sup>93</sup> <sup>94</sup> <sup>95</sup> <sup>96</sup> <sup>97</sup> <sup>98</sup> <sup>99</sup> <sup>100</sup> <sup>101</sup> <sup>102</sup> <sup>103</sup> <sup>104</sup> <sup>105</sup> <sup>106</sup> <sup>107</sup> <sup>108</sup> <sup>109</sup> <sup>110</sup> <sup>111</sup> <sup>112</sup> <sup>113</sup> <sup>114</sup> <sup>115</sup> <sup>116</sup> <sup>117</sup> <sup>118</sup> <sup>119</sup> <sup>120</sup> <sup>121</sup> <sup>122</sup> <sup>123</sup> <sup>124</sup> <sup>125</sup> <sup>126</sup> <sup>127</sup> <sup>128</sup> <sup>129</sup> <sup>130</sup> <sup>131</sup> <sup>132</sup> <sup>133</sup> <sup>134</sup> <sup>135</sup> <sup>136</sup> <sup>137</sup> <sup>138</sup> <sup>139</sup> <sup>140</sup> <sup>141</sup> <sup>142</sup> <sup>143</sup> <sup>144</sup> <sup>145</sup> <sup>146</sup> <sup>147</sup> <sup>148</sup> <sup>149</sup> <sup>150</sup> <sup>151</sup> <sup>152</sup> <sup>153</sup> <sup>154</sup> <sup>155</sup> <sup>156</sup> <sup>157</sup> <sup>158</sup> <sup>159</sup> <sup>160</sup> <sup>161</sup> <sup>162</sup> <sup>163</sup> <sup>164</sup> <sup>165</sup> <sup>166</sup> <sup>167</sup> <sup>168</sup> <sup>169</sup> <sup>170</sup> <sup>171</sup> <sup>172</sup> <sup>173</sup> <sup>174</sup> <sup>175</sup> <sup>176</sup> <sup>177</sup> <sup>178</sup> <sup>179</sup> <sup>180</sup> <sup>181</sup> <sup>182</sup> <sup>183</sup> <sup>184</sup> <sup>185</sup> <sup>186</sup> <sup>187</sup> <sup>188</sup> <sup>189</sup> <sup>190</sup> <sup>191</sup> <sup>192</sup> <sup>193</sup> <sup>194</sup> <sup>195</sup> <sup>196</sup> <sup>197</sup> <sup>198</sup> <sup>199</sup> <sup>200</sup> <sup>201</sup> <sup>202</sup> <sup>203</sup> <sup>204</sup> <sup>205</sup> <sup>206</sup> <sup>207</sup> <sup>208</sup> <sup>209</sup> <sup>210</sup> <sup>211</sup> <sup>212</sup> <sup>213</sup> <sup>214</sup> <sup>215</sup> <sup>216</sup> <sup>217</sup> <sup>218</sup> <sup>219</sup> <sup>220</sup> <sup>221</sup> <sup>222</sup> <sup>223</sup> <sup>224</sup> <sup>225</sup> <sup>226</sup> <sup>227</sup> <sup>228</sup> <sup>229</sup> <sup>230</sup> <sup>231</sup> <sup>232</sup> <sup>233</sup> <sup>234</sup> <sup>235</sup> <sup>236</sup> <sup>237</sup> <sup>238</sup> <sup>239</sup> <sup>240</sup> <sup>241</sup> <sup>242</sup> <sup>243</sup> <sup>244</sup> <sup>245</sup> <sup>246</sup> <sup>247</sup> <sup>248</sup> <sup>249</sup> <sup>250</sup> <sup>251</sup> <sup>252</sup> <sup>253</sup> <sup>254</sup> <sup>255</sup> <sup>256</sup> <sup>257</sup> <sup>258</sup> <sup>259</sup> <sup>260</sup> <sup>261</sup> <sup>262</sup> <sup>263</sup> <sup>264</sup> <sup>265</sup> <sup>266</sup> <sup>267</sup> <sup>268</sup> <sup>269</sup> <sup>270</sup> <sup>271</sup> <sup>272</sup> <sup>273</sup> <sup>274</sup> <sup>275</sup> <sup>276</sup> <sup>277</sup> <sup>278</sup> <sup>279</sup> <sup>280</sup> <sup>281</sup> <sup>282</sup> <sup>283</sup> <sup>284</sup> <sup>285</sup> <sup>286</sup> <sup>287</sup> <sup>288</sup> <sup>289</sup> <sup>290</sup> <sup>291</sup> <sup>292</sup> <sup>293</sup> <sup>294</sup> <sup>295</sup> <sup>296</sup> <sup>297</sup> <sup>298</sup> <sup>299</sup> <sup>300</sup> <sup>301</sup> <sup>302</sup> <sup>303</sup> <sup>304</sup> <sup>305</sup> <sup>306</sup> <sup>307</sup> <sup>308</sup> <sup>309</sup> <sup>310</sup> <sup>311</sup> <sup>312</sup> <sup>313</sup> <sup>314</sup> <sup>315</sup> <sup>316</sup> <sup>317</sup> <sup>318</sup> <sup>319</sup> <sup>320</sup> <sup>321</sup> <sup>322</sup> <sup>323</sup> <sup>324</sup> <sup>325</sup> <sup>326</sup> <sup>327</sup> <sup>328</sup> <sup>329</sup> <sup>330</sup> <sup>331</sup> <sup>332</sup> <sup>333</sup> <sup>334</sup> <sup>335</sup> <sup>336</sup> <sup>337</sup> <sup>338</sup> <sup>339</sup> <sup>340</sup> <sup>341</sup> <sup>342</sup> <sup>343</sup> <sup>344</sup> <sup>345</sup> <sup>346</sup> <sup>347</sup> <sup>348</sup> <sup>349</sup> <sup>350</sup> <sup>351</sup> <sup>352</sup> <sup>353</sup> <sup>354</sup> <sup>355</sup> <sup>356</sup> <sup>357</sup> <sup>358</sup> <sup>359</sup> <sup>360</sup> <sup>361</sup> <sup>362</sup> <sup>363</sup> <sup>364</sup> <sup>365</sup> <sup>366</sup> <sup>367</sup> <sup>368</sup> <sup>369</sup> <sup>370</sup> <sup>371</sup> <sup>372</sup> <sup>373</sup> <sup>374</sup> <sup>375</sup> <sup>376</sup> <sup>377</sup> <sup>378</sup> <sup>379</sup> <sup>380</sup> <sup>381</sup> <sup>382</sup> <sup>383</sup> <sup>384</sup> <sup>385</sup> <sup>386</sup> <sup>387</sup> <sup>388</sup> <sup>389</sup> <sup>390</sup> <sup>391</sup> <sup>392</sup> <sup>393</sup> <sup>394</sup> <sup>395</sup> <sup>396</sup> <sup>397</sup> <sup>398</sup> <sup>399</sup> <sup>400</sup> <sup>401</sup> <sup>402</sup> <sup>403</sup> <sup>404</sup> <sup>405</sup> <sup>406</sup> <sup>407</sup> <sup>408</sup> <sup>409</sup> <sup>410</sup> <sup>411</sup> <sup>412</sup> <sup>413</sup> <sup>414</sup> <sup>415</sup> <sup>416</sup> <sup>417</sup> <sup>418</sup> <sup>419</sup> <sup>420</sup> <sup>421</sup> <sup>422</sup> <sup>423</sup> <sup>424</sup> <sup>425</sup> <sup>426</sup> <sup>427</sup> <sup>428</sup> <sup>429</sup> <sup>430</sup> <sup>431</sup> <sup>432</sup> <sup>433</sup> <sup>434</sup> <sup>435</sup> <sup>436</sup> <sup>437</sup> <sup>438</sup> <sup>439</sup> <sup>440</sup> <sup>441</sup> <sup>442</sup> <sup>443</sup> <sup>444</sup> <sup>445</sup> <sup>446</sup> <sup>447</sup> <sup>448</sup> <sup>449</sup> <sup>450</sup> <sup>451</sup> <sup>452</sup> <sup>453</sup> <sup>454</sup> <sup>455</sup> <sup>456</sup> <sup>457</sup> <sup>458</sup> <sup>459</sup> <sup>460</sup> <sup>461</sup> <sup>462</sup> <sup>463</sup> <sup>464</sup> <sup>465</sup> <sup>466</sup> <sup>467</sup>


Καίρος. CARVM.

CAP. LVII

**C**ARYM, semen est vulgaris notitiz. Excalcificat  
vrinam concitat, stomacho utile, os commendat, con-  
coctionem adiuuat. Vtiliter miscetur antidotis, & ory-  
poris. anisi uicem præbet. Radix cocta, pastinacæ mo-  
do, manditur.

CARVM officinis vulgo Carui dicitur. semen omnibus natissimū. Planta nascitur in pratis, & collibus. Semen possum Germani pani suo subigunt, ciborumq; condimentis indunt, quemadmodum nos anisum, & foeniculum. Sed maxime, meo quidem iudicio, redarguendi sunt Monachi illi, qui in Mesueam commentarios ediderunt: quippe qui non sine magno, & aperto errore crediderint, Carum semen esse rubentis illius radicis, quae vulgo Carota vocatur. Quandoquidem Carotarum semini nulla Cari qualitas inest: id enim adeo acre non est, ut tertio calfacientis, ac exiccantium ordini ascribi possit. Quod tamen de Carota testatur Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic scribens. Cari semen calfacit, & exicat tertio quodammodo ordine, moderatē acrem qualitatem possidens. Itaq; & status extinguit, & urinas ciet, non semen tantum; sed & planta.

A N E T H V M.



Anethi con-  
sideratio, & ui-  
res ex Gal.

ic A<sup>3</sup> ymθoñ.

ANETHVM.

CAP. LVIII

**ARIDI.** Anethi coma, feminisq̃ decoctum, potu lac euocat: inflationes, & tormina sedat; aluum, vomitionesq̃ sistit: vrinas ciet, singultus lenit. oculorum aciem hebetat, genituram, restinguit, assidue potum. Decoctum eius fœminis vultu malo opportunis, ad defefsiones utile. Condylomata illitus feminis cremati cinis tollit.


ANETHVM hortis omnibus frequentissimum, omni a-  
ex parte fœniculum emulatur, ut sæpius colligentes sallat, et  
gustum consulant. Ceterum Anethum, ut auctor est Galenus li-  
v. 1. de simplicium medicamentorum facultatibus, adeo exacer-  
cit, ut habendum sit aut secundi ordinis intensi, aut tertij re-  
Exiccantium uero ordinis est secundi incipientis, aut tertij  
tis. Itaq; merito in oleo decoctum digeri, dolorem sedare,  
conciat, & crudos, & incipitos humores concoquit. Ex qua  
ex eo oleum, cuius propinqua sit tēperies p̄is inuicibus, & co-  
coquentibus uocatis medicamentis: nisi quatenus parū huius  
calidius, tum tenuiorū partium est, ac proinde digerendi facili-  
te præditum. Vsum autem tertij ordinis tum ex assu-  
tum desiccantium fit: & propterea ulceribus nimis humis  
libusq; prodest, potissimum ijs, quæ in p̄udendis consistunt. At  
quæ in præputio sunt inueterata, ea probe cicatrice uelut.  
Ceterum uiride humidius est, & minus calidū: itaq; magis cuis  
siccum concoquit, & somnum conciat, sed minus digerit. Lē-  
eo mihi uidentur ueteres in conuiuijs usi esse coronis ex co-  
cinnatis.

CVMINVM SATIVVM. *Κύμινον*

CVMINVM SYL. ALTERVM.



*Προσθεστέον*



Κύμινον ἡμετέρον. CVMINVM SATIVVM.

CAP. LIX.

CVMINVM fatium ori gratum est, sed multò magis Aethiopicum, quod Hippocrates regium appellavit. Secundum locum tenet Aegyptium. reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & plerisque alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, exiccat. ad tormina, inflationesque conuenit, coctum, & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpente, in uino. testium collectionibus auxiliatur, impositum cum vva passa, aut lolij farina, ceratòve: mensium abundantiam inhibet. Contritum autem in aceto, & naribus obiectum, sanguinis profluvia sistit. Colorem bibentium, aut perunctorum mutat in pallorem.

Κύμινον ἄγρον. CVMINVM SYLVESTRE.

CAP. LX.

SYLVESTRE Cuminum, plurimum, efficaciusque in Lycia, & Galatia Asia, atque Carthagine Hispania gignitur: frutice paruo, dodrantali caule, ac tenui: quaternis, aut quinis folijs, tenuibus, ueluti ferratis, & gingidij diuisura. In cacumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda: in quibus est semen acerosum, gustu fatiuo acriore. nascitur in collibus. Bibitur semen ex aqua, aduersus tormina, inflationesque: item contra uenenatas bestias ex uino. Singultus ex aceto sedat: stomacho utile, quem humor uexat. Sugillata tollit, si manducatum cum melle, & vva passa illinatur: testium inflammationibus, adiectis eisdem, illitum medetur. Est & aliud sylvestris Cumini genus, fatiuo non dissimile, quod à singulis floribus elata promit cornicula, in quibus semen est melanthio simile. Quod potum omnium serpentium moribus praesidio est. Calculosis, & ijs, qui urinæ stillicidio uexantur, aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur. sed apij semen feruefactum postea bibendum est.

SATIVVM Cuminum omnibus notum est. Sed an sylvestre, idq; praesertim, quod primo generi à Dioscoride assignatur, in Italia proueniat, ego quidem affirmare non ausim: quòd nec illud uiderim, aut repperim unquam, neq; praeter ab alijs repertum, uel ex Lycia, Galatia, & Hispania allatum audiuerim. Quod uerò secundo ascribitur generi, si in Italia gignitur, id equidem cum Ruellio, & Gesnero, uiris doctissimis, eam plantam esse putauerim, quam Germani uulgò *Rittersporn*, hoc est, Equitis calcar, & *Consolidam regalem* uocant. Quandoquidem planta haec nascitur

Cumini consideratio.

*Rittersporn* 93.

Monachorū  
error.

Cumini uires  
ex Galeno.

nascitur in segetibus. Caulē profert simplicem, ramulis multis, tenuibus, longis, diuisis, syluestris nigelle modo. Flores edit purpureos, nigre uiole amulos: ex altera quorum parte prodeunt cornicula sursum spectantia, quæ rum calcaris formam exprimere uidentur: unde et illi nomen à Germanis inditum. Semen ferti melanthio simile, in paruis corniculis conclusum. Vt ex hac descriptione existimem, uix aliam reperiri posse plantam, quæ magis, quæ hæc, postremum Cumini genus referat. Ceterum Monachi illi reuerendi, qui in Mesuem scripsere, flaua colore Melanthium, quod officinæ Nigellam citrinam uocant, primum syluestris Cumini genus esse contendunt. Sed ij, eadem sententia, in magno et aperto errore uersantur. Nam, ut unusquisq; sanæ mentis per se cognoscere potest, Nigella citrina sic seplasiarijs uocata, nil aliud unquam fuit, quàm flaua coloris Melanthium: cùm omnibus palam non in alio Nigellam hanc, et Melanthium inter se specie differre, quàm in seminis colore: cetera namq; in forma, et magnitudine, sapore, ac omni deniq; facultate illis maxime consentiunt. Sed quid multa? nonne hoc idem in papauera semine quotidie comperimus? in quibus tamen uarius seminis color non prohibet, quin omnia sint papauera. Hæc ut in huiusce syluestris Cumini historia patres illi, et qui eos sequuntur, planè hallucinari deprehenduntur. Quæ primi generis syluestris Cumini semen in capitulis mollibus, ac rotundis acerosum gignitur, fortasse (ut opor) uulgaris pampinelle modo, non autem in capitulis melanthij instar, durum, solidum, fractuq; contumax, quod in pampinella uulgò uocata non uisitur. Satiuum folijs ferè sceniculum representat: unico exit caule, pluribus adnatis ramis: floret in umbella, ueluti sceniculum, in qua copiosum profert semen: radix ei albicans est, summo cessare repa. Tractu gaudet calido, et putrescibili: quamobrem frequentissimum in maritimis nascitur. Cumini uires scriptum reliquit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cumini semine potissimum utimur, quædam dum anisi, ligustici, cari, et petroselini. Est autem et facultatis excoalscentis, sicut illorum unumquodq; tum nam mouentis, et flatum discutientis: ex tertio ordine excoalscentium.

Αμμι. ΑΜΜΙ.

CAP. LXI

Ammios con  
sideratio.

Ruel. lapsus.



Αμμι Aethiopicum cuminum appellant. Plerique hoc natura diuersum esse ab illo existimant. Vulgò notum est, semen exile, multò minus cumino, organum respiciens. Eligendum est purum, minimè fufurosum. Vis ei excoalscentia, feruens, & exiccans. Facit ad tormina, urinæ difficultatem, serpentium ictus, cum uino potum: menstrua ciet. Miscetur derodentibus cantharidum medicamentis, quæ eccloria uocatur, ut inde exortis urinæ difficultatibus resistat. Sugillatum cum melle tollit, colorem potu, aut illitu mutat in pallorem. Suffitum cum uua passa, aut resina, uulnas purgat.

QV ANQV AM uaria, ac diuersa semina uiderim, que legitimum Ammi mentiuntur, nullum tamen ex ijs hætenus mihi sese obtulit, quod animum ad credendum alliceret, uerum Ammi ex Alexandria Aegypti ad nos deferri. Quod Ameos nomine in officinis passim habetur, cùm probatissimum, Plinio teste, candidius sit candidius, id nigricat, adeoq; uulgaris petroselini semen emulatur, ut uisu ab eo dignosci minimè possit, sed in hoc gustum consulere oportet. Nam cùm haud leuiter sit acre, facultatis discrimen gustu facile deprehenditur. Præterea cùm hoc nullum organum saporem gustui representet, quem tanè referre uerum Ammi Dioscorides est auctor, adhuc clarius sit id non esse legitimum. Veruntamen cōtrarium sensisse uidetur Ruellius: quippe qui minus fortasse accuratè ea examinauerit, quæ de Ammi, Hippocratis testimonio, scriptis tradidit Plinius, ei alioquin similis sumus libro XX. cap. XV. cùm inquit. Est Cumino simillimum quod Greci uocant Ammi. Quidam uerò Aethiopicum Cuminum id

Monachorū  
error.

Ammios ui  
res ex Gal.

esse existimant. Hippocrates regium appellat, uidelicet quia efficacius in Aegypto iudicauit. Pleriq; aliter in totum putant, quoniam sit exilius, et candidius. Similis autem et huic usus: nam et paribus Alexandræ habetur, et cum alimentis interponitur. hæc Plinius. Ceterum non equidem negauerim, Ammi in Italia nasci, cū officinis hætenus uerum non reperiatur. Siquidem Aloisius Anguillarius Romanus in herbarum cognitione dux uersatus, ex Patauio, ubi horti publici curam gerit, nuper ad me misit legitimum Ammi, nulla prorsus reclamante nota. Verum enim uero huic sanè illud non adstipulari certum est, quo magno, ut arbutor, errore ducti Monachi illi, qui in Mesuem commentarios ediderunt, se usos fuisse asseuerant. Nam præter rationes, error satis ex suis scriptis explicatur, utpote qui suum Ammi nullo organi sapore commendari fateantur. Herbe, quam uocant Ammi, semen, et Galenus testatum reliquit libro VI. simplicium medicamentorum, maxime est utile. Facultatis est excoalscentis, et discutientis.

trix, tenuiumq; partium: sed & gustu subamarum est, & acre. Et clarum est, quod & digeratur, & urinam moueat. Facit autem in calfaciendo, desiccandoq; ex ordine tertio intenso.

Κορίανδρον, ἢ κορίαννον.

CORIANDRUM

CAP. LXII.

Coriander



CORIANDRUM, aut corianum vulgaris est notitiz: vim refrigeratorem habens. Quare illitum cum pane, aut polenta, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt, medetur. Epinyctidas cum melle, uel uia passa; testium inflammationes, carbunculosque sanat: cum faba fresca, strumas, & tubercula discutit. Tineas interaneorum expellit semen, cum passo modicè potum, & genituram adaugetur: largius tamen sumptum, mentem non sine periculo mouet. quare continuo, & copiosiore usu abstinendum. Succus cum cerussa, spumæ argenti, necnon aceto, & rosaceo illitus, arduentes summæ cutis inflammationes emendat.

CORIANDRUM omnibus notissimum est. In cuius facultate indaganda Galenus productus est, ut longum sermonem faceret contra Dioscoridis sententiam libro VII. simplicium medicamentorum, ubi ita scribit. Coriannon, siue Corion, aut utcumque uocare lubet. Vetusiores Græci Coriannon nominant: at recentiores medici omnes Corion appellant, sicut & Dioscorides, refrigeratorem esse herbam dicit, sed perperam. Siquidem ex contrarijs facultatibus componitur, plurimum habens essentie amaræ, quam ostendimus esse tenuium partium, & terrenam. Nec parum etiam aqueæ humiditatis obtinet, quæ tepentis est facultatis. Habet autem & adstrictionis paucillum. Ex quibus omnibus uariè quidem agit ea quæ scribit Dioscorides, & non tantum ex refrigeratione. Ceterum ego cuiusq; particulatim actionis causam enarrabo, tanetsi propositum fuerat, mei uicini dicitur hoc in libro sententiam expromere. Sed forte nihil obstat: imò, si uerum fatendum est, proderit nonnihil, superiores me

Coriandri facultas ex Gal.

thodos, quæ ad hunc modum in paucis medicamentis sunt dictæ, hic repetere. Primum ergo non Dioscorides tantum, sed & alij complures medicorum indeterminate de morbis pronunciant, sicut sanè hac quoq; tempestate non paucos inuenis medicos uel insignes, præter alia, hac ipse maxime hallucinantes. Interdum enim atra, liuida, frigidaq; redacta parte, quæ erysipelas habuit, nec amplius refrigerantia poscente medicameta, ceu antea, sed ea quæ infixum partem præter naturam humorem euacuent, ij tamen refrigerare perseuerant. Aliquando autem ad digerentia quidem transiunt: ceterum erysipelas sanare dicunt. Et sanè scribunt, incipientibus etiamnum, & crescentibus erysipelatis, alia esse medicamenta, alia uero iam declinantibus, ac flaccescentibus. Sed ita res non habet. Neque enim erysipelas etiam uocari debet; postquam inflammatio eius, & seruior, ac biliosum illud abierint: neque quæ facultate sunt frigida, neque quæ huiusmodi affectus sanant, remedio esse putandum est: sed uelut si uel in initio protinus aut percussis, aut alia de causa quous tumor in parte quapiam aut liuidus, aut niger extiterit, eum esse frigidum affectum existimabis, & quæ digerant calfaciantq; medicamenta poscere. Ad eundem modum, si calida affectio in frigidam reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alio appellanda nomine: aut si displicet nominis mutatio, saltem sicut quidam alia scribunt principij, alia declinationis remedia, haud frigida esse autumantes declinationis remedia, concedendum sanè est, si cui ita placet, ut talis affectio etiam erysipelas uocetur: sed eam etiam calidam dicere, ubi iam refrigerata est, id uero ne utique concedendum. Itaq; ne quod tunc ei auxilio est, refrigeratorium esse credamus, sicut Dioscorides Coriandrum, quod ut ipse inquit, cum pane, aut polenta illitum, erysipelas curet. Nam quod exquisitum est erysipelas, quod utique est, & flauum, haud unquam sanare poterit cum pane Coriandrum, sed illud quod iam refrigeratum est. Præter nos superioribus uoluminibus, cum determinata, ac definita experientia, cuiusq; medicamenti facultatem explorandum censuimus, quam maxime fieri posset, simplicissimum eligi affectum consulimus. At pleriq; medici neque quid uel plurimum morborum protinus ab initio compositi inuadant, norunt: neque quod alius affectus sit erysipelas ex alia causa, alius uero is, qui uocatur ab omnibus nobis usitate, ut à ueteribus quoq; phlegmone: alij autem inter hos medij plerumq; partim, ut sic dicam, erysipelata phlegmonode, partim phlegmonæ erysipelatodes. Ac inuenis nonnunquam utriusque nunciat, sed ad unguem paria sint. Quæ etiam nonnunquam oedematodes esse erysipelas conspiciuntur, sicut et febribodes, ut compositorum morborum non paruus aceruetur numerus. De quibus copiosius, cum alibi disseremus, tum in libris de curandi ratione. Dicitur autem & nunc quoad saltem eorum meminisse necesse est, quod ex ætate erysipelas haud unquam ab ante dicto cataplasmate curari possit. Voco autem exactum, cum à biliosa fluxione partim plena fuerit. Porro quod longe à refrigeratione absit Coriandrum, uel ex ijs, quæ ipse scripsit Dioscorides, discere

Coriandri fa-  
cultas ex Aui-  
cenna.

scere licet. Nam strumas, inquit, cum lomento dissoluit. Quod uero nullam refrigerantiam medicamentorum illo-  
sit dissoluendis strumis, uel ipsum Dioscoridem non dubitaturum arbitror: quippe qui sexcenta scripserit medicamen-  
ta strumas sanare potentia, quæ omnia tum temperie calida, tum actionibus digerentia esse confessus est. Hactenus Ga-  
lenus à Dioscoride in Coriandri facultate dissentiens. Porro uero hæc in re Galeno maxime refragatur Auicenna, qui  
in ipsum aperte inuchitur libro II. cap. CXLI. sic inquit. Scripsit Galenus Coriandrum esse compositum ex di-  
uersis facultatibus, etsi terrea facultas in eo cæteris excellat, simul cum aquea quadam tepida, et adstrictoria parte.  
Verum, ut ego conijcio, aqueitas, quæ in ipso reperitur, absque dubio frigida, non quidem tepida existit, nisi ei foras ad-  
miscetur aliquid excalfacientis substantiæ, quæ sui tenuitate uelociter in auram euanescat. Quapropter dum Ba-  
naym, remouet Galenus frigiditatem à Coriandro, et Dioscoridi repugnat. At ego quidem aliter sentio, cum frigide  
eius substantiæ meminerint Archigenes, Rufus, et aliorum posteriorum nonnulli. Frigidum igitur est Coriandrum: ut  
tura in fine primi, et usque ad principium secundi, et siccum in secundo. quanquam, sententia mea, et siccum est, et  
ad caliditatem aliquo modo uergit. Sed Galenus ipse sentit, Coriandrum esse ex omni parte calidum. Id quod foras  
euenisse putandum ex ea caliditatis particula, quæ dum bibitur, aut comeditur, ab ipso disperditur. Aliter nec nece-  
rium foret, si homines sua frigiditate interficeret, ut in multa exhiberetur quantitate. Illud præterea subdidit Galenus,  
si Coriandrum strumas dissoluit, quoniam igitur pacto frigidum erit? Cui facile responderi potest, id agere Coriandi  
sua quadam occulta facultate, ac forma: aut quod reperiatur in eo aliqua tenuis facultas, quæ in profundam penetra-  
re possit, frigida substantia exterius relicta. Sed cum bibitur caliditas illa resoluatur, quo fit, ut sola frigida remaneat,  
et in corporibus agat. Hæc Auicenna in Coriandro Galeni dicta refellens. Quæ etsi aliquid in se rationis, ac uerita-  
tis habere uideantur; tamen cum omnibus compertum putem, Galeno neminem adhuc parem extitisse, qui diligenter  
stirpium tum naturas, tum facultates inuestigauerit partim saporis gustu, partim odoris olfactu, partim substantiæ  
coloribus, partim denique ex longa experientia profundissime philosophiæ coniuncta, operæpretium est eius potius  
quiescere sententiæ, quam reliquorum omnium. Veruntamen Brasauolus in hoc maluit fortasse cum Auicenna er-  
re, quam cum Galeno recte sentire. Qui præterea cum nesciuerit, Coriandrum in Hetruria passim in pratibus, et com-  
pestribus sua sponte nasci, asserit in suo simplicium uolumine, satiuum tantum reperiri Coriandrum. Ceterum com-  
plures medici Coriandri semen saccharo contextum à cibo assumendum consulunt, ut uapores (ita enim aiunt) à uen-  
triculo caput petentes reprimat. Quod etsi Arabice familie autoribus consentiat, id tamen maxime Dioscoridis sen-  
tentia aduersatur. Quippe qui non solum hic Coriandrum mentem tentare prodiderit; sed idem quoque libro sexto  
ter uenena connumerauerit, ut inibi latius, Deo duce, dicetur.

Brasauoli  
error.

HIERACIVM MAIUS.  
hab. in pratibus et in siluis  
et in montibus  
et in uerbis  
et in uerbis  
et in uerbis



HIERACIVM MINUS.





## Ἱεράκιον. HIERACIVM. CAP. LXIII.

HIERACIVM magnum caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauum: folia ex inter-  
uallis rariusculè diuisa, similia soncho per ambitum: luteos flores, in oblongis capitulis. Vim re-  
frigerandi habet, & modicè substringendi: vnde illitum, stomacho æstuanti, inflammationibus-  
que prodest. Succus erosionem stomachi sorbitione mitigat. Herba cum radice illita, uibratis à  
scorpione ictibus auxiliatur. Hieracium paruum, folia ex interuallis habet, diuisa in ambitu:  
calliculos teneros, uirentes: in quibus lutei flores orbem circinantes, emicant. Vim suam ad  
eandem, ad quæ superior impendit.

- 31 HIERACIVM tam maius, quàm minus frequentissimum ubiq; in Italia nascitur, soncho non admodum disti-  
ncte. Horum autem non reperio Galenum mentionem fecisse, nec etiam Paulum, in libris de simplicium medicamento-  
rum facultatibus. Meminit tamen eorum Plinius lib. xx. cap. vii. inter lactucarum agrestium genera, sic inueniens.  
Sunt, quæ herbam Hieraciam uocent, quoniam accipitres scalpendo eam, succoq; oculos tingendo, obscuritatem cum  
ferere, discutiant. Succus omnibus candidus, uiribus quoq; papaueri similis. Carpitur per messes inciso caule. Con-  
ditur in fictili nouo ad multa præclarus. Sanat omnia oculorum uitia cum lacte mulierum. Arcet rubeculas, cicatri-  
ces, aduersionesq; omnes, præcipuè caligines. Imponitur etiam oculis cum lana contra epiphoras. Idem succus aluum  
purgat, in posca potus ad duos obolos. Serpenti ictibus medetur in uino potus. Et folia tosta, thyrsiq; triti ex ace-  
to bibuntur. Vulneri illinuntur maximè contra scorpionum ictus. Verum contra phalangia commixto uino ex ace-  
to. Alijs quoq; uenenis resistunt, exceptis quæ strangulando necant, aut ijs quæ uesciæ nocent, item psilumybio ex-  
cepto. Imponuntur & uentri ex melle, atq; aceto ad detrahenda uitia alui. Vrinæ difficultates succus emendat. Cra-  
tas eam & hydropicis obolis duobus in aceto, & cyathis uini dare iubet. Peculiares earum uires partim iam dictæ  
sunt, somnum faciendi, ueneremq; inbibendi, æstum refrigerandi, stomachum purgandi, sanguinem augendi. Nunc nõ  
pace restant, quoniam inflationes discutiant, ructus lenes faciunt, concoctiones adiuuant: cruditatem ipsæ nequa-  
quam faciunt. Nec ulla res in cibis auaritatem incitat, inbibetq; eadem in causa alterutrinq; modus est. Sic & aluum  
copiosiores soluant, modicè sistunt, lentitiam pituitæ digerunt, atq; ut aliqui tradiderunt, sensus purgant. Stomachi  
dissoluti utilissimè adiuuantur, in eo usu, & oxypori obolis asperitatem addito dulci ad intinctum aceti temperantes.  
Si crassior pituita sit, scillite, aut uino absinthite: si & tussis sentiat, hyssopite admixto. Dantur cæliacis cum in-  
tubo erratico, & ad duritiam præcordiorum. Dantur & melancholicis: candidæ copiosiores, & ad uesciæ uitia.  
Præcægorus & dysentericis dedit. Ambustis quoq; prosunt recentibus, priusquàm pustule fiant cum sale illite. Vlti-  
ma etiam, quæ serpunt, coërcent, initio cum aphronitro. mox in uino trite igni sacro illinuntur. Conuulsa; & laxæ  
caulibus tritis, cum polenta ex aqua frigida leniunt: eruptiones papularum ex uino, & polenta. In cholera quo-  
que coctis patellis dederunt: ad quod utilissimè, quàm maximè caule, sed amare. Quidam lacte infundunt. Defera-  
uisti y caules & stomacho utilissimi traduntur. Has omnes Plinius tam Hieracijs, quàm syluestribus Lactucis ui-  
res contribuit.

Hieracij con-  
sideratio, & ui-  
res ex Plin.

Σέλινον. APIVM. *Semine Apij* CAP. LXIIII.

- HORTENSIS Apij herba ad eadem, ad quæ coriandrum conuenit. Inflammationibus ocu-  
lorum cum pane, aut polenta illinitur: æstuantem stomachum mulcet: mammæ duritiam ex  
lacte concreto contractam, reprimat. Vrinam ciet, siue crudum, siue coctum edatur. Decoctum  
eius, radicisque potum, uenenorum noxæ resistit, cum uomitiones excitet: aluum cohibet. Semè  
vehementius urinam pellit: contra serpentium uenena, aut epotam argenti spumam auxiliatur:  
inflationes discutit. Admiscetur medicamentis, quæ dolorum leuamenta præstant, theriacis quo-  
que, ac tussis remedijs.

Oreoselinum in humidis nascitur, satiuo grandius, & ad eadem efficax. *Semine oreoselini*  
Oreoselinum caule est dodrantem alto, ab radice tenui exeunte: per cuius ambitum rami, & ca-  
pitula cicutæ, multò tamen tenuiora: semine cumini oblongo, acri, & odorato, tenui. Nascitur in  
petrosis, & montibus. Vrinam ciet, semine, ac radice in uino potis: menses trahit. antidotis, nec-  
non medicamentis urinam cientibus, & excafactorijs, inseritur. Nec hallucinari nos oportet, exi-  
stimantes oreoselinum esse, quod in faxis prouenit: aliud enim est petroselinum. Petroselinum  
in Macedonia prouenit, in præruptis locis, semine ammij, odoratiore, sapore acri, aroma olente.

- 30 Vrinam ciet, ac menstrua: contra stomachi, & coli inflationes, & tormina prodest. Laterum, renū,  
& uesciæ doloribus, in potu subuenit. Admiscetur antidotis urinam cientibus. Hipposelinum  
Latini olusatrum appellant, aliqui smyrnion, quanuis aliud sit, quod propriè smyrnion dicitur, ut  
paulò post referemus. Est autem maius, & satiuo apio candidius: caule alto, cauo, molli, habente  
ueluti lineas: folijs latioribus, in puniceum uergentibus: coma rorismarini, florum plena: depen-  
dentibus in cacumine corymbis ante quàm deflorescat. Ea semine turgit nigro, oblongo, acri, so-  
hido, aromatico. Radix dimittitur tenuis, odorata, candida, quæ os commendat. In umbrosis,  
& palustribus enascitur. olerum generis, ut apium. Radix cruda, coctæue estur. Folia cum cauli-  
bus, decocta manduntur, & per se aut cum piseibus præparantur, crudaque muria condiuntur.  
Vim hanc habet, ut potu semine ex mulso uino menses ciet: algentes calfacit potu, aut illitu: v-  
rinæ stillicidio auxiliantur. Radix eisdem præstat effectus.

*Semine oreoselini*


*Petroselinum  
Futurum / Silybum*

*Semine hipposelini*

APIVM HORTENSE.




APIVM PALUSTRE.



HIPPOSELINVM.

Apij hortensis  
consider.



Eleoselini cō  
sideratio.

PVTANT dubio procul omnes fr̃e etatis nostr̃e mē-  
ci, iūq; p̃sertim, qui diu uersati sunt in simplicium medicame-  
torum inquisitione, quiq; multum laboris ac studij impenderunt,  
ut hanc medicinae partem penē abolitam restituerent, nil aliud e-  
pud antiquos satiuum fuisse Apium, quā uulgare nostrum Pe-  
troselinum, hodie hortis omnibus frequentissimum. Quorū e-  
dem sententiam nunquam ausim improbare: cum nostrum hoc no-  
tis omnibus sit p̃editum, quibus constare Apium ueteris ite-  
dere. Plinius siquidem libro xx. cap. xi. naturalis h̃storici p̃-  
scribit. Apio gratia uulgō est: namq; rami longi portu-  
la per iura innatant, et in condimentis peculiarem gratiam habē.  
Hoc etiā confirmare uidetur Galenus libro 11. de alexi-  
corum facultatibus, cum inquit. Apium inter cetera famili-  
simum est, et ori, stomachoq; gratissimum. Quae sane omnia  
uulgari nostro Petroselino cernuntur: quippe quod nobis o-  
lerum familiarissimum in ciborum condimentis perpetuotus  
tur. Ceterum quauis id uarios nostrarum mensarum cōbes fre-  
quentissime commendat, scripsere tamen tum Chrysippus, tum  
etiam Dionysius (ut Plinius auctor est) Apium ad cibos non ad-  
mittendum, imō omnino nefas: nam id defunctorum epulis ser-  
uile dicatum. Ipsius quoq; uisus claritati inimicum. Causa  
feminae uermiculos gigni. Ideoq; eos, qui ederint, sterilesce-  
re, feminasq; in puerperis uerō ab eo cibo cominales fieri, qui  
ubera hauriunt. Innocentiorē tamen esse m̃rem. Ea q; causa  
est, ne inter nefastos fructus damnetur, h̃ec Plinius. Quae  
rerum non fuerit, si recentiores quoq; Apio cominalibus uterē-  
xerunt. Cum igitur his tum rationibus, tum auctoritatibus,  
notis p̃terea suffragantibus, constet uulgare Petroselinum  
gignum esse Apium, putandum quidem fuerit, quis potius

id quod officinis omnibus satui Apij uicem explet, nil aliud esse, quam Paludapium, siue Apium palustre, Eleoselinum Dioscoridi uocatum. Quandoquidem hoc in humentibus, & palustribus locis nascitur, caule, & folijs sicut in montibus, & arboribusq. Ea q. propter Theophrastum libro VII. cap. VI. de plantarum historia, de eo differit ex arborib. Paludapium, quod apud aque ductus, & in paludibus prouenit, folio raro, nec hirsuto consistit, sed simile quodammodo Apio est, odore, sapore, figuraq. Hinc itaq. fit, ut Ruellio minime ad stipulandum censeam, qui plantam nobis Italici Macerone uulgò appellatam, Paludapium esse putat. Quippe (ut paulò post, atq. etiam in proxima Smyrnii commentatione dicitur) non parua sanè inter uocatum Macerone, Eleoselinum, & Hipposelinum intercedit differentia. Apij porro in montibus nascentis, quod ideo Græcis Oreoselinum dicitur, nulla à Dioscoride redditur foliorum delineatio, nisi in eo scriptura fuerit deprauata, ut ferme suspicor. Verum Theophrastus, & Plinius Oreoselinum descripserunt folijs cicutæ, radice tenui, & semine unus, alter uerò caule anethi, minutiore tamen. Vnde descriptum est, ut nonnulli crediderint Theophrastum hoc in loco deprauatum esse, & quod ubi in Græcis codicibus legitur, καὶ τὰ φύλλα ἔχει καὶ ἑνὸς ἐμφερέν, id est, folia habet cicutæ similia, legendum sit, καὶ φύλλα ἔχει καὶ καὶ ἑνὸς ἐμφερέν, hoc est, capitula habet papaueri similia. In quam opinionem hos facile potuit adduxisse uulgata Græca Dioscoridis lectio, in qua nimirum capitulorum papaueris, non autem foliorum cicutæ mentio est. Verumtamen ego potius (ut modò dixi) Dioscoridi lectionem uitiatam putauerim, quam Theophrasti, licet contrà senserit Hippoclaus. Nam præterquam quod Theophrasto subscribat Plinius, est Oribasij codex, in quo non καὶ ἑνὸς, sed καὶ ἑνὸς legitur. Præterea ipse sepe numero uidit Apium in montibus nascentem, quod à Theophrasti, & Plinii pictura nullis prorsus notis disidet. Prouenit enim folijs cicutæ, radice tenui, & semine in umbella anethi modo: quæ omnia Apij generi maxime ad stipulantur. Illud insuper addiderim, quod Apij longè magis proprium est folijs consurgere acutè modo per ambitum laciniatis, semine in umbella anethi instar, quam capitulis papaueri similibus incluso.

Sed an legitimum Petroselinum Macedonicum uocatum, in Italia proueniat, non equidem asserere ausim, etsi Macedonibus illi, qui in Mesuem scripsere, se in Romanis quibusdam montibus illud aduenisse testentur, quod tamen (si uerè referunt) Romanum quidem, non Macedonicum appellandum fuerit. Quod uerò Hipposelinum uocatur, nil certe aliud esse opinor, quam quod nonnulli hodie Leuisticum nominant, grandius planè inter omnia apiorum generis, adeo ut merito Hipposelinum dicatur. Id sanè notis omnibus refert Hipposelinum: licet Brasauolus Ferrariensis herbam Macerone uulgò uocatam falsò Hipposelinum existimet, à peruersa fortasse Marcelli interpretatione deceptus, qui præter Dioscoridis sententiam, Hipposelino radicem intus candidam, foris uerò nigram reddidit, cum tamèn in Græcis Dioscoridis exemplaribus nulla nigredinis fiat mentio. Quo quidem argumento Macerone Hipposelinum non esse, satis superq. comprobatur, præsertim cum hæc coloris radicem opposita qualitate inter se discrepent.

Huius Marcelli lapsus illud causam fuisse arbitror, quod legerit apud Theophrastum, nasci Hipposelinum folijs paludapio proximis: eade magno, ac hirsuto: radice raphani modo crassa, sed nigra: nigroq. etià semine, magnitudine eruo ampliore. Quia fortasse auctoritate fretus Marcellus, nigram Hipposelino radicem inesse addidit in Dioscoride. Sed attendendum est Theophrastum eo loco non descripsisse Dioscoridis Hipposelinum, cum alterum ab altero pluribus differat notis, sed Smyrnium potius. Id quod ex eo conijci potest, quod Dioscorides, itemq. Galenus asserant, nonnullos ueneriri qui Hipposelinum à Smyrnio non separent. Quibus uerbis nil mirum inter eos, qui ita sentirent, Theophrastum quoq. ab illis comprehensum fuisse. Ceterum hac in re etiam Fuchsius, cuius tamen pace dixerim, aperte hallucinatur: quippe qui legitimum Hipposelinum Leuisticum uulgò uocatum, smyrnij loco in suis clarissimis de stirpium historia commentarijs depinxerit. Apij meminit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Apium usque adeo calidum est, ut & urinas, & menses cieat. Flatus quoq. discutit, & magis semen, quam herba ipsa. Sed & oreoselini, & hipposelini similis uis est: uerum hipposelinon imbecillius est, oreoselinum ualentius.

Eodem quoque libro superius tamen, de Petroselino disseruit his uerbis. Petroselini semen maxime usui est, cum tota etiam herba una cum radice similem, sed imbecilliolem, facultatem sortiatur. Est autem ut gustu acre cum amaritudine, sic & in operibus calidum, una cum incidendi effectu. Hinc menses, & urinas largè prouocat. Flatus quoq. discutit. Euri itaq. & ipsum tertij ordinis tum exalfacietium, tum desiccantium. Sed de Petroselino Macedonico fusius differens libro primo de antidotis, ita scribit. Quod ad Petroselinum attinet, laudatissimum Macedonicum est omnibus cognitum: quod Estreaticum etiam quidam appellant, à loco in quo nascitur, nomen imponentes. Verum exiguum est prorsus quod ibi prouenit, cum & præruptus, & angustus is locus sit. Estreaticum itaq. Macedonicum hoc, quod à Macedonibus in omnes gentes affertur, paucum & ipsum in Macedonia terra gignitur. Sed idem in petroselino Macedonia accidit, quod in Attico melle, & uino Falerno contingit. Mercatores siquidem in omnem ferme orbis terram, & in mel Atticum, uinum Falernum, sic petroselinum Macedonicum aduehunt, cum tamen in Macedonia petroselini tantum oritur, quantum gentibus omnibus satis esse queat. Verum in Epiro petroselinum plurimum gignitur, quemadmodum in Cycladibus insulis mel; atq. ut mel ex insulis Athenis affertur; sic petroselinum ex Epiro prius in Macedonia transportatur, plurimumq. & prope totum in Thessaliam: inde uerò tanquam Macedonicum exportatur. Idem in Falerno contingit. nam cum in exiguo quodam Italie agro Falernum proueniat, complura alia uina in Falerni speciem à uini magistris concinnantur, quæ perinde atq. Falernum, in omnes provincias Romano imperio subiectas importantur. Tibi uerò si petroselinum Estreaticum quandoq. decrit, ne peiorem existimes theriacā futuram, si alium importaueris. Non enim si mortiferis uenenis, si uenenatorum moribus aliud ab Estreatico petroselinum minus congruit, propterea reliquis etià morbis, ut torminibus, uentriculo debili, aque inter cutē, et id genus alijs, segnius opitulatur, quos in prius satiare theriaca non promittit. Ad hæc Estreaticum petroselinum theriacā planè amariorem facit, præsertim cum rectus adhuc imponitur. differt enim ab alijs petroselinis, quod ut acerrimum, ita quoq. amarissimum est.

Ruellij opin.  
non accepta.

Oreoselini cō  
sideratio.

Petroselinū. *frut. insign.*

Hipposelini  
consider.

Marcelli, &  
Bras. lapsus.

Fuch. error.

Apij generū  
vires ex Gal.

Smyrnij con-  
sideratio.

cant, plurimum in Amano monte gignitur. Caulem habet apij, & stolonēs multos: folia latiora, suppingua, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia iucunda, colore in luteum languescēte: capitibus caulium orbiculatis, ut anethi: semine brassicae, rotundo, nigro, acri myrrhae sapore, ita ut alterum alterius loco cedat. Radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis. Cortex eius foris niger, intus uiridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis, & collibus, atque squalidis, & limitibus terrenis. Vis radice, herbae, & seminis excalfacere. Folij muria maceratis ad obsonia utuntur: aluum sistunt. Radicem contra serpentium ictus bibere cōuenit: tussēs, & orthopnoeas mitigat: vrinae difficultati medetur. Illita recentes tumores, collectiones, duritiesque discutit: vulnera ad cicatricem perducit. partus abortu uitiat, si feruefacta subijciatur. Semen lienis, renum, & uesicae uitijis prōdest: menses, & secundas pellit, commodē datur, ischiadicis in uino: inflationes stomachi lenit: sudores eiēt, & ructus. Peculiariter datur hydro-picis in potu, & contra febrium circuitus.

¶ SI SMYRNII singulae notae, quae illi à Dioscoridis tribuuntur recte, diligenterque expendantur, facile quidem perspicere poterit, Smyrniū ei herbae simillimum esse, quae a nostris in Heritria uulgō uocatur Macerone. Siquidem hanc nasci clarum est, hanc caule apij, stolonibus multis referto: folijs latioribus, suppingui-

bus, robustis, ad terram uersis, odore medicato, cum quadam acrimonia iucundis, colore in luteum languescēte. Praeterea in caulium cacuminibus umbellam gerit anethi modo: semine brassicae maiore, oblongo tamen, nigro, acri, odore myrrham referente. Radice denique natus odorata, atque succosa, ac molli, quae exteriori cortice nigricat, interiore uero parte ex albo uirescit. Quas quidem notas ferre nos constat Smyrniū Dioscoridem reddidisse. Verum quispian, cui forte haec nostra sententia minus arrideat, eberdet nobis semen, ut quod Maceroni nostro non insit rotundum, brassicae modo. Huic illud responsum uolumus, quod cum ceterae in uniuersum notae illi respondeant, facile in seminis delineatione mendum subesse potest. Vel quod ex rotunditate, sed in alio uni cum altero semine intercedat similitudo. Porro quauis memorie non prouideret Dioscorides, quod Smyrniū feratur in hortis, in quibus hodie nostrum illud feritur, sed quod sponte in Amano Ciliciae monte gignatur, tum etiam in collibus, incultis, ac saxosis locis; Plinius tamen etate passim in hortis secebat. Id quod et se Plinius manifeste demonstrat libro xix. cap. ultimo, ubi Smyrniū inter hortensia referens, inquit. Et Smyrniū olus iisdem locis feritur, myrrhamque radice respicit. Idem quoque testatur Galenus, quod ipsam inter olera communem libro 11. de alimentorum facultatibus, et de eo scribat in hunc modum. Smyrniū non est insuauis. Ideoque Romae plurimum uenit. Multo autem acrius est, et calidius, quam apium: quoniam et odorati quidpiam habet. Quapropter et caciū urinae ciet, quam apium, hipposelinum, et sion: et mulieribus menses mouet. Veris tempore caulem proicit, qui crudus edendo est haud aliter quam folia, quae sola per hyemem inerat plantae, nondum caulem habent, haec neque tum apium habet. Postea uero caule accedente, tota planta iucundior redditur, siue quis crudum ipsam, siue etiam mandet, siue ex oleo, et gero, siue uinum, siue acetum uelit adijcere. Nonnulli cum aceto, et gero tantum bibant, ueluti apium: alij uero paululum olei ijs adijciunt. haec Galenus. Ex cuius sane uerbis liquido apparet, Smyrniū inter olera etiam inter olera fuisse receptum. His itaque fortasse, uel etiam ualidioribus rationibus adductus Macerone ferariensis, uir quidem ingenio, et doctrina celebris, Smyrniū esse nostrum dictum Maceronem constanter dicitur.

Ruellij opin.  
improbanda.Smyrnij uires  
ex Gal.Quorundam  
hallucinatio.

Quo fit, ut minus dubitem Ruellij opinionem improbandam esse, quod suspicetur (ut proxima commentaria ex-ximus) Maceronem esse Paludapium. Smyrniū uero eam esse stirpem certo putet, quam in Gallijs uocant uulgō Leuecebia. Smyrnij tum historiam, tum facultates descripsit Galenus libro v. 111. simplicium medicamentorum, sic inquit. Smyrniū quidam Hipposelinum agreste cognominant. Ex eodem genere et ipsum cum apio est, et petroselino: fueritque apio quidem ualidius, petroselino autem imbecillius. Menses itaque, et urinae mouet, calidius, succosiusque tertio ordine. Cilices petroselinum nominant, quod in Amano monte nascitur. Est quidem et ipsum Smyrniū, minus uero petroselino, et smyrnio acre. Proinde et ulceribus imponi potest, quia uidelicet sine molesta deficiat. Sed et digerere, quae indurata sunt, ualet. Reliqua uis eius apio, et petroselino similis est. Quocirca et semine utimur ad menses, urinas, et asthmata, siue anhelationes. haec Galenus. Ceterum non desunt ex recentioribus, qui

les, qui hallucinantes contendunt, plantam Imperatoriam uulgò uocatam legitimum esse Smyrniū, argumento quòd ceteris exterioribus nigrescant, interioribus uero uirescant. Verum ij ex eo aperte decepti deprehenduntur, quòd nò an-  
 duerint, an hæ plantæ ceteris inter se notis conueniant. Sed postquam de Imperatoria herba incidit men-  
 sa, ob sui nominis maiestatem, uirumq; præstantiam; prætereundum sanè non duximus, quin hic eius tum historiam,  
 tum facultates edisseramus. Præstantissima igitur IMPERATORIA in Ananiensibus montibus supra Tridentum fre-  
 quenter nascitur, folijs sphondylis minoribus, solo accubantibus, robustis, hirsutis, ac asperis: caule bicubitali,  
 parpatascente, rotundo, hirsutoq;: in cuius cacumine umbella floribus candidis ornatur: è quibus postea semen pro-  
 ducit sefelis modo acutum, pariterq; odoratum. Radix inest ei non longa, mediocriter crassa, rugosa, dura, lignosaq;  
 que foris nigra est, intus uero subuiridis. Ea gustu admodum acris deprehenditur, ac mordax, subamarata, & odorata.  
 Ex quo non temerè aliquis conijcere potest, Imperatorie radicem excalscere tertio excessu completo, uel quart-  
 to inchoante: siccare uero secundo. Discutit hæc mirificè tum uentriculi, tum intestinorum, tum etiam uteri status.  
 Quapropter coli cruciatus, ac uentriculi torminibus maxime utilis est. Cui item menses, atq; urinam. Fouetur eius  
 decoctio utiliter in dolore dentes, præsertim si in uino austero radix decoquatur. Eadem ex uino pota uteri strangula-  
 tionibus prodest. conceptum adiuuat, quem frigiditas intercipit: concoctionem roborat. Commansa est ueluti præ-  
 stantissimus apoplegmatis, ut quæ efficaciter cerebri pituitam expurget. In puluerem contrita, uinoq; subinde  
 pota, frigidis occurrit morbis. Quamobrem resolutis, comitialibus, conuulsis, auxilio est. Aiunt nonnulli quartana  
 eos sanari, qui pulueris cochlearij dimidium hora una ante accessionem, ex mero biberint. Oris halitum commendat,  
 & omnes roborat sensus. Epidemij morbis, uenenis ferè omnibus, ac uenenosorum animalium tum moribus, tum icti-  
 bus opem præstat. Asthmaticos, seu anhelosos iuuat, obstructions aperit, aqua intercute laborantes sanat, itemq;  
 liene affectos. In summa excalscit uniuersas corporis partes, quas frigus occuparit. Vt hinc palàm fiat, herbam  
 hæc non immerito sibi Imperatorie nomen asciuisse, cum tot tantisq; uiribus prædita sit.

Imperatorie  
plantæ descri-  
ptio, & uires.

Ελαφόβοσκον.

ELAPHOBOSCVM.

CAP. LXVI.

*Unguentum fortissimum*


ELAPHOBOSCO fœniculaceus caulis est, aut  
 rorimarino similis, geniculatus: folijs duū digi-  
 torum latitudine, ut terebinthi, prælongis, aliquan-  
 tum asperis, circumfractis. Adnata multa habet, fe-  
 rentia umbellas anethi similes, & semina eiusdem:  
 florem subluteum: radice ternū digitorum longi-  
 tudinis, & crassitudinis unius, candida, dulci, esui a-  
 pta. Caulis tener pro oleo manditur. Contra ser-  
 pentium ictus, datur semen in uino. Fama autem est,  
 hoc pabulo ceruas serpentium moribus resistere.

QUANQUAM aliqui profitentur, se Elaphoboscum in  
 Italia inuenisse, atq; etiam quibusdam in hortis ostendere; herba  
 tamen, quam pro eo demonstrant, folia profert incisuris multis  
 diuisa, leuiaq;. Adeo ut hinc perspicue intelligi possit, eam à le-  
 gitimo Elaphobosco plurimum disidere, si Dioscoridi magis,  
 quam Plinio fides est adhibenda. Plinius siquidem libro, & cap.  
 XII. Elaphoboscum folijs smyrnij, & semine corymbaceo de-  
 pinxit his uerbis: Elaphoboscum ferulaceum est, geniculatum,  
 digiti crassitudine: semine corymbis dependētibus, simili effigie,  
 sed non amaris: folijs olusatris, & hoc laudatum in cibis: hæc  
 Plinius. In quibus uerbis, quòd ea planè à Dioscoride diffentiāt,  
 Marardus Ferrariensis Plinij codicem deprauatum esse existi-  
 mat. Ceterum Ruellius tradit Elaphoboscum legitimum pau-  
 cis hodie cognosci, etsi frequens ubiq; reperitur, illudq; esse cē-  
 set, quod uulgò officinis simul & herbarijs Gratia dei nomina-  
 tur, è qua sui nominis unguentum conficiunt. Sed hanc Ruellij  
 sententiam non admittendam, quin potius explodendam putaue-  
 rim, si per Gratiam dei eam plātam intelligit, qua officinæ utun-  
 tur.

Elaphobosci  
consider.

in illo


Ruellij opin.  
suspecta.



Quippe quòd hæc caule, & folijs byssopo sit persimilis, non autem fœniculo, ac terebintho. Quamobrem aut-  
 dium in Gallia plātam esse eodem nomine appellatam, aut Ruellium omnino deceptum existimauerim. Ipse equidem  
 herbam quandam sæpius uidi, tum in Tridentino, tum in Goritiensi agro, cuius etiam hic picturam damus, quæ ita no-  
 tis omnibus Elaphobosco respondet, ut non potuerit animus non inclinari ad credendum, hanc legitimum esse Elapho-  
 boscum. Paucis admodum Elaphobosci facultates perstrinxit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic  
 inquit. Elaphoboscos facultatis est calidæ, & tenuium partium, ac proinde exiccatorie secundo maxime exce-  
 sum ordine.

Elaphobosci  
facul. ex Gal.





FOENICVLVM, si herba edatur, aut semen cum pi-  
sana bibatur, mammas lacte replet. Comæ decoctum in  
renum doloribus subditum proficit, quippe quod tri-  
nam excitet, contra serpentium ictus in uino conueni-  
ter bibitur: menses ciet. in febribus nauseam, & stoma-  
chi feruorem ex aqua frigida potum sedat. Contritz ra-  
dices, & cum melle illitz, morsibus canum medentur.  
Succus caule, & folijs exprimitur, & in sole siccat, in  
medicamenta adijcitur; quæ ad excitandam oculorum  
aciem commodè temperantur. Extrahitur succus ad e-  
dem ualens, etiam semine uiridi, ramulisque, & radi-  
bus prima germinatione incisis. In Iberia, quæ ad occi-  
dentem spectat, succum reddit gummi similem. Caulem  
medium, dum herba floret, rustici demerunt, ignique  
admovent, quod facilius ui caloris exudans, gummi re-  
mittat: quod efficacius succo est, ad medicamenta ocu-  
lorum.

*Μαριανδρον. f. m. f. m.*

FOENICVLVM ERRAT-  
CVM.

CAP. LXVIII.

Est & syluestre fœniculum, magnum: fert autem  
semen cachryi simile. Cuius radix iucundè olet, pot-  
quæ stranguriæ medetur: menses imposita ciet. Ventre  
sistit, radice, aut semine potò: contra serpentium mor-  
sus auxiliatur, calculos comminuit, regium morbum  
expurgat. Lactis abundantiam facit, decoctum foliorum  
haustum, & foeminas à partu purgat. Traditur aliud  
hippomarathri genus, longo, exili, & angusto folio: se-  
mine coriandri, rotundo, acri, odorato. Excalcificandi  
naturam habet, & uiribus fœniculo respondet, sed ad omnia infirmius.

Fœniculi con-  
sideratio.


FOENICVLVM tan erraticum, quàm satium omnibus in Hetruria notum est. Seritur domesticum Febru-  
rio mense uere ineunte, locis apricis, & modicè saxosis. quippe quod non minus in ciborum condimentis gustu  
ta quadam dulcedine placeat, quàm utile sit in medicamentis. Fœniculi meminit Plinius lib. xx. cap. xxiii. sic ex-  
ens. Fœniculum nobilitauere serpentes, gustatu senectam exuendo, oculorumq; aciem succo eius refectis. Vt  
intellectum est, hominum quoq; caliginem præcipue eo releuari. Colligitur hoc caule turgescente. In sole siccat, &  
ungiturq; ex melle. Vbiq; hoc est: laudatissimum tamen in Iberia è lacrymis fit, & ex semine recenti. Fit eni-  
dicibus prima germinatione incisis. Est & in hoc genere syluestre, quod aliq; Hippomarathron, aliq; Myrsine  
cant, folijs maioribus, gustu acriore, procerius, brachiali crassitudine, radice candida. nascitur in calidis, & siccis  
sis. Diocles & aliud Hippomarathri genus tradit, longo, & angusto folio, semine coriandri. Hæc Plinius, qui  
ferè omnia à Dioscoride mutuatus esse uidetur. Porro alterum syluestris Fœniculi genus, cuius semen coriandri  
giem refert, à nemine hactenus, quod sciam, in Italia cognoscitur, & ostenditur. Fœniculum, ut memorie pro-  
Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, tan ualenter excalfacit, ut ex tertio ordine excalfacientium ce-  
ri possit. Desiccatur uerò non æquè, sed ipsum quissimè in hoc primi esse ordinis posuerit: proinde lac procreat. Sed  
si admodum desiccaret, non sanè generaret. Suffusus eadem ratione auxiliatur. Vrinæ, mensesq; ciet. Est & ali-  
Fœniculum syluestre, quod præ magnitudine hippomarathrium nuncupant, cuius radix ac semen amplius quàm de-  
fici, desiccandi uim obtinet. quocirca uentrem quoq; eo nomine sistere uidetur. Nec sanè manifesta illis uerè  
ctio. Huius non radix modò; sed & multò magis semen cachryi adsimile est: potestq; & calculos frangere, & a-  
ginosos sanare, mensesq; mouere, & urinam excitare: non tamen lac congerere, sicut illud superius. Aliud est Hip-  
pomarathrium, cuius semen rotundum est, & acre, simile semini coriandri, facultate quidem hippomarathri simile,  
sed debilius.

Fœniculi ui-  
res ex Gal.

Δαυκος. DAUCVM. *βορβανιστρον* CAP. LXIX.

DAUCVM aliqui daucium uocant. Creticum folijs fœniculo simile, minoribus, & tenuio-  
ribus: caule dodrantali, umbella coriandri, flore albo: semine acri, candido, hirsuto, suauissimi  
odoris in mandèdo. Radix digitali crassitudine, & dodrantis longitudine adolefcit. In saxosis na-  
scitur, & locis sole illustratis. Aliud eius genus, syluestri apio simile, acre, odoratum, aroma-  
lens, feruentis gustus. Probatissimum Creticum. Tertium assignatur genus folijs coriandri,  
floribus

D A V C V M.



floribus albis, capite, & semine anethi, muscario pastinacæ: semine oblongo, ceu cumini, acris. Omnium semen exalfacit. potum urinam, menses, & partus extrahit: torminibus liberat: veterem tussim mitigat. phalangiorum moribus potum in uino; auxiliatur: tumores illitu discutit. Seminis duntaxat in alijs generibus inualuit usus: in Cretico etiam radice, quæ maximè contra uenenatorum iniuriam in uino bibitur.

**T A M E T S I** nonnulli inueniantur plantarum exploratores, qui Daucum ab erratica pastinacæ nihil prorsus differre contendunt, affirmantes, hoc idem sensisse Galenum, & post ipsum Paulum; ij tamen, quantum equidem sentio, manifestè falliprehenduntur. Nam etsi rectè dici possit, Daucum esse sylvestris pastinacæ genus; non ob id tamen illa, meo iudicio, fuerit unquam sylvestris pastinacæ, cuius paulò superius meminit Dioscorides. Quandoquidem si unam, & eandem plantam esse Daucum, & agrestem pastinacam credidisset Dioscorides, de ijs sanè seorsum non differuisset, neq; alterum ab altera proprijs capitibus distinxisset. Ceterum cum non desint, quibus uideatur Galenus inter has plantas nullam facere differentiam, uidendum est, an ita se res habeat. Mihi quidem inter eas discrimen fieri uoluisse Galenum, illud maximum argumentum est, quòd Dioscoridem secutus & ipse uarias utrisq; tribuerit uires, easq; diuersis locis descripserit. Dauci siquidem libro VI. Pastinacæ uerò lib. VIII. mentionem

Dauci consideratio.

Quorundam error.

fecit in simplicium censu. Hinc itaq; fit, ut aperte conijciam, Galenum inter illa discrimen nouisse: atq; eos decipi, qui in hoc Marcellum, & Ruellium secuti, contrarium asserunt. Quorum præterea sententiam, ipsius Galeni testimonio, facile explodi posse putauerim, nec solium quòd diuersis capitibus utriusq; uires speciatim tractauerit; sed quia libro VI. simplicium medicamentorum, Daucum non esse pastinacam clarissimè ostendit, cum inquit. Daucus, quæ quidam staphylinum nominant, agrestis quidem domestico minus est esui idoneus: In quibus sanè uerbis Galenus perspicue satis declarare uidetur, Daucum non sibi, sed alijs pastinacam agrestem appellari. Quamobrem cum Dioscoride non modo dixerim; sed etiam affirmauerim tria Dauci genera inueniri. quorum illud Italis frequentius est, quòd sylvestrem pastinacam emulatur. Hoc enim in Senensi agro, præsertim in maritimis, frequentissimum nascitur. Creticū autem legitimum ex Creta tantum asferri existimauerim. Porro Daucus, qui coriandri folijs provenit, & semine cumino simili, in quàm plurimis etiam Italie locis reperitur. Dauci uires tradidit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum supra citato, ubi ita scribit. Daucus, quem quidam staphylinum nuncupant, agrestis quidem domestico minus est esui idoneus, ceterum in omnibus uehementior. At domesticus comestibilis quidem, sed imbecillior. Acrè, & calefacienti facultatem obtinet, ac proinde etiam extenuandi. Certè radix præter iam comprehensa flatuosum quiddam obtinet, ac uenerum. Semen autem domestici quidem & ipsum quandam ad uenerem stimulandi potentiam possidet. Agrestis uerò planè flatu caret, quòd ἄφρονος uocant: ac proinde urinam, mensesq; ciet.

Dauci uires ex Galeno.

### ΔΕΛΦΙΝΙΟΝ. DELPHINIUM. CAP. LXX.

**DELPHINIUM** surculos emittit à radice una sesquipedales, aut maiores: à quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, prælonga, quæ delphinorum effigiem repræsentant: vnde tractum nomen est. Flos uiolæ albæ non dissimilis; purpureus: & semen in filiquis, milio proximum: quo non aliud utilius bibi potest, ab scorpione percussis. Aiunt enim obiecta herba, scorpiones resolui, atque ignauos totipescere: semota uerò ea, sese recolligere. Prouenit in asperis, & apricis. Alterum est delphinium, quod Romani buccinum uocant, superiori simile, sed folijs, & ramis longè gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus.

**Q U A N Q U A M** scribit Ruellius, herbam in Gallia nasci, cui rura nullum adhuc nomē imposuerunt, quæ omnibus prorsus notis Delphinio respondet; in Italia tamen nemo hactenus, quòd sciam, legitimum ostendit. Ex quo tantum conijci putauerim unquam, illud Ruellij uerum ac legitimum fuisse Delphinium, ut etiam sim plerumq; suspicatus, hoc Delphinij caput in Dioscoride spurium ac ascitiuū esse. Nec temerè, ut arbitror: nam suspicio inde ortū suum habuit, quòd Delphinium nusquam, quantum equidè legerim, describatur à Galeno, Oribasio, & Paulo: cum tamen horū alius uires plantarum ex Dioscoride bona fide in suo quisq; simplicium censu referat. Ceterum non desunt qui uelint, eam plantam Delphinium esse, quam Germani uulgò uocant Ritterstorn, id est, Equitis calcar, herbæ uerò uulgus Cōsolidam regalem: quam nos inter sylvestris Cumini genera superius retulimus. Verum cum hæc tantum emittat à radice caulem, non autem plures surculos: folia non ferat delphinorum effigie, nec flores albæ uolæ æquales, horum sententiā cur probem, non habeo. Non desuere præterea, quæ Senam Mauritanis uocatam, filiquarum

Delphinij consideratio.

Quorundam opiniones reprobatae.

Sene delinea-  
tio.

Ruellij hallu-  
cinatio.

Colutea, &  
Colyteamē-  
tia  
Dumet. Baum

Mesuis, & Bra-  
sauoli lapsus.

quorum conuexitate freti, & decepti, Delphinium esse crediderint. Quorum grauis error ita euidentis est, ut iam de  
nibus explodatur. Idque non iniuria, quod in Delphinio (si tamen eius caput legitimum est) folia, non siliquae, quae delphi-  
nium formam representent, requirantur: foliaque sint tenuia, longa, diuisa: flores uero purpurei: et tota demum Delphi-  
nii facies ea depingatur, quae cum Sena quam maxime pugnet, ut mox patebit. Nam quoniam Delphinii occasione in  
ne sermonem incidimus, cum huius nusquam, quod inuenerim, meminerint Dioscori. Galenus, Paulus, & ueterum Graeco-  
rum alij, sitque in repurgandis humoribus non modo innoxium, sed etiam summe utile medicamentum. Hunc locum non  
secundum duximus, quin de Sena differamus, eiusque historiam, et uires cum ex alijs, tum ex eo quod nobis compertum  
describamus. Constat itaque SENA, Mauritano nomine dicta, folijs glycyrrhizae crassis, suppinguib, siliarum spore  
re: caule cubitali, a quo rami exeunt in lori modum flexiles. Flores ei emicant aurei, ueluti brasicae, purpureis uen-  
turis uenulis: quibus succedunt folliculi falcati, adeoque natura compressi, ut superior membrana inferiori cohaereat:  
in quibus semen continetur in nigro subuirescens, uuarum uinaceis usque adeo simile, ut non facile primo oculorum uisus  
alterum ab altero discernatur. Folliculi e ramisculis prominent, tenui pediculo appensi. quo fit, ut maturi scentes, pa-  
uo uentorum flatu facile decutiantur. Planta est frigoris impatiens. ob idque feri uult maio, nec ultra autumnum per-  
durat. Siquidem (ut pluries expertus sum) prius sata, facile frigore deperditur, serius uero hyemem similiter non tol-  
lerat. Meminit Senae Serapio in suo de simplicium medicamentorum uolumine, ubi sic habet ex auctoritate Abet-  
ta. Sena asseruatur sicca, siliquas lunatas, & oblongas proferit: in quibus semina in ordinem digesta clauduntur. Sili-  
quae tenui pediculo pendent: ob idque facile uentorum impetu deturbantur. Caducas opuliones colligunt. haec Serapio.  
Cuius postremis uerbis fortasse deceptus Ruellius, Senam eam esse arborem existimauit, quam Theophrastus libro  
III. capite XVII. de plantarum historia Coluteam appellat. quandoquidem haec antiquis pastoribus fuit sagaxia o-  
uibus expetita. Vnde facile Ruellius, qui nunquam forsitan in Hetruria fuerat, ubi passim legitima Sena seruit, pre-  
sertim in Florentino agro, magno errore putauit, Senam non herbam esse, sed arborem Coluteam uocantem, eandem  
plantam esse. Sed eius error hinc praeterea apertissime diluitur, quod Colutea siliquas proferat colore in purpureum  
primis uergentes, mox albicantes, flatu turgentes, quae si premantur, crepitu magnum edunt: semine intus paruo, ro-  
tundo, lentis effigie. Sena uero siliquatur folliculis lunatis, qui nullo spiritu tumido distenduntur, quibus semen includi-  
tur uinacearum instar. Adde etiam, quod Colutea arbor sit multis perdurans annis, Sena uero non nisi paucis mense-  
bus uiuat. Quo fit, ut iam omnibus palam sit, Ruellium hac in re manifeste cecutiuisse, & inter Senam, & Coluteam  
non paruum intercedere differentiam. Et quanuis asserat Fuchsius in suis de plantarum historia commentarijs, ha-  
plantas facultate inter se minime differre; cum tamen in errore uersari putauerim, quod certo sciam Coluteam sciam  
non minus, quam genistae uomitiones ciere. Colutea, ut de ea quoque hic aliquid dicamus, Theophrasto autore loco  
paulo ante citato, Liparum propria traditur. arbor magnitudine praestans, fructum in siliqua ferens, magnitudine lon-  
gis, quo oues mirum in modum pinguescunt. Nascitur semine, & fimo praecipue ouillo. Tempus serendi cum Arcti-  
rus occidit. Serendum semine praemadefacto, cum iam in aqua pullulare inceperit. Folium habet non absume solum gre-  
co. Germinat primo uniuersum, triennio maxime: spargitur deinde in ramos, quartoque anno arborefcit. haec Theophras-  
tus. Ex quibus sane uerbis liquido apparet, quam maxime a Colutea differat Sena. Fuchsius & medicum, & Gra-  
eci sermonis peritissimus, plantam hanc non Colyteam, sed Coluteam a suo se errore uindicans, appellandam censuit. Et  
recte quidem, meo iudicio. nam Colytea longe alia est ab illa, Theophrasto teste loco modo citato, ubi eam ijs depre-  
uerbis. Arbor circa Idam proueniens, quam Colyteam uocant, genus aliud est. Est autem fruticosa, ramosa, abso-  
uentu rara, non crebra: folio laurino, lauri latifoliae, sed rotundiori, ampliori, ut uel ulmeo simile appareat, obor-  
gius tamen, colore parte altera herbido, tergo autem albido, neruosoque: cortice non leui, sed quasi iatigineo: rari-  
per summa gracilibus, & solutis, uerum uibratis, & admodum flauis. Fructu, floreque carere putatur. Ex his Theo-  
phraستي uerbis perspicuum est, Colyteam a Colutea plurimum differre. Quae tamen etsi Theophrasti uero Liparum pe-  
culiaris fuerit, hoc tamen tempore pluribus in locis sponte natam uidimus, praesertim in Tridentino agro apud Au-  
mios, ubi ego primum eam quam plurimis ostendi. Sed ut eo, unde digressa est, iam nostra redeat oratio, crediderim  
Mesues Senae folliculos in deicienda alio folijs longe praestantiores esse. Huic uero reclamant non solum Manardus For-  
rariensis uir doctissimus; sed etiam diuturna medicorum experientia: etsi Brasauolus, qui Mesuem tuum uidetur  
trararium putet. Ceterum ne quis ex altercationibus confundatur, dicam ingenue quid hac in re sentio, nec quicquam  
eo recedam, quod experimento pluries comprobauim. Sciendum igitur est, Senae folliculos, qui siccati asseruatur,  
duum esse generum: alterum per se caducum, & in planta arescens, a quo semen eximunt, nigrum, & prorsus ca-  
nidum: alterum uero, quod ante maturitatem demittitur, crassum, ponderosum, succo praegnans, & regibus ex-  
pansum in umbra siccatur, sed hoc uenundatum rarum. Cui sane, ut iam nullies periculum secimus, non minor delecto-  
ria uis inest, quam folijs. Primum uero genus, quo Venetijs omnes ferè officinae scatent, non modo minorem transfor-  
di uim habet; sed prope nullam. Ut hinc plane colligere liceat, Mesuem hic non esse sine limitatione damnum: qui  
doquidem is, ut arbitror, de folliculis decerptis intelligat, non autem de caducis, quibus tantum utuntur ijs, qui Mesum  
solum reclamant. In quorum numero ego quoque quandoque fui. uerum cum postea integrum Senae campum sensissem, &  
folliculos decerptos uirentes, & succo praegnant, mox siccatos experire, rem aliter facto periculo se habere facie  
comperi. Quare nostro exemplo, qui folliculis uti uoluerint, Senam serant, ut folliculos optimos habeant, uel saltem  
probatissimos emant, si tamen eiusmodi reperiri poterunt: sin minus folijs tutius, & efficacius utantur. Obest Senae  
(ut idem Mesues inquit) nonnihil uentriculo. quamobrem ut haec tollatur noxa, & eius roboretur facultas, gongyli  
addendum praecipit: quin & ea, quae cor, & uentriculum corroborant. Verum tamen non desunt, qui hanc reprobat  
sententiam: quod degustatis Senae folijs, aliquid adstrictionis, nonnihil siccitatis, atque etiam tantillum amaritudinis  
perceperunt.


perierint. quæ omnia potius Senam roborare uentriculum indicant, quam ipsam perturbare, ac imbecillum reddere. In quorundam sententiam ego quoque pedibus eo: nam etsi quibusdam, præsertimque mulieribus, quandoque contingat, ut eorum Sena diluta, eorum intestina torminibus uexentur, id nunquam ex Senæ facultate provenire existimavi, sed ex eius pituitosisque excrementis, ab hoc pharmaco eo impulsis, quæ sua crassitie intestinorum meatus adeo replent, ut eos non parum extensionem faciant, dum viam ad exitum querunt. Neque tamen me unquam aliquem inuenerisse memini, qui diceret se potius Sena, uentriculi dolore laborasse. Proinde Actuarius, qui solus, quantum extat, inter Græcos Senæ vires descripsit, Senam citra noxam bilem, et pituitam deijcere memorie mandavit. id quod non sine erubescens filere coegit quendam Philippum de Set medicum, qui (ni fallor) ut suam potius tueretur sententiam, quam verum pharmacum quoddam improbauerat ex Sena diluta, rhubarbaro, atque agarico conflatum, quod cuidam Illustri Reuerendiss. Cardinalis, ac Principis Tridentini nepoti in quadam quotidiana febre dederat clarissimus medicus Andreas Gallus Tridentinus. Is autem pharmacum illud damnandum esse censebat, quoniam Senæ dilutam, agaricis excipiebat, argumento quod hæc duo (ut ipse asserbat) maxime uentriculum lederent, immemor, ne dicam ignarus, quantum præstantie, ac uirum agarico tribuerint in febribus diuturnis finiendis, a pituitæ præsertim infarctu ceteris. Dioscorides, Galenus, et Mesues, quantisque laudibus Senam extulerit Actuarius. Ceterum et Sena, ea magis præstare, quæ ex Alexandria Aegypti, uel ex Syria affertur, quantumvis nostratis adhuc in agro uirentis, et rosarum diluto quoque Syrupum parare consueuerim. qui tunc, largeque omnes purgat humores. Daturque commode prægestibus, et pueris, et cuiuscunque ætatis hominibus. Dilutum tamen magis præstat, quam decoctum, quod nulla ex parte exaltet: cuius uncie quinq; uel sex aluum modestissime, et sine molestia soluunt. Quod tuto dari possit prægestibus, et pueris, experientia docuit, cui subscribit Actuarius, qui Senam citra noxam purgare tradidit. Redditur medicamentum hoc in deijcienda aluo præstantius, atque ualentius, si casia nigra, aut manna, aut rhubarbaro, aut rosarum diluto, aut rhodopharmaco, quod officina Syrupum rosatum solutiuum uocant, commisceatur, aut si maceretur Sena caprino sero. Præstantissimum dilutum hoc modo paratur. Sumuntur foliorum electissime Senæ drachmæ sex, gingiberis, aut cinnamomi contriti drachma una, florum buglossi drachmæ duæ: miscenturque omnia, et fistili uero circumlito, siue stagneo uase angusti orificij excipiuntur, et affusis feruentis aquæ, aut feri caprini uncijis decem, uas osculum adeo occluditur, ut nullus penitus spirandi pateat exitus. His peractis puluinari plumis anserinis facto, ignis calefacto uas inuoluitur, reponiturque in arca, ubi pernoctare sinitur. Sic enim conseruato calore dilutum omnem facultatem in se recipit. Sunt præterea, qui uindemie tempore Senæ folia in mustum conijciant, uinum inde conficiunt, quod alui deiectionem uim obtinet. Educit Sena per inferna (ut Mesues testatur) bilem tum atram, tum flauam, et (ut Actuarius ait) non bilem tantum, sed etiam pituitam, quod sanè experientia comprobatur. Mundat Sena

Senæ, & eius diluti vires.

Diluti præparatio.

Senæ vires ex Mes. & Serap.

## PYRETHRVM.



cerebrum, cor, iecur, lienem, pulmonem, et omnes corporis sensus, confertque omnibus eorum incommodis. Viscerum obstructions aperit, auget iuuentutem, seniumque retardat, et animi hilaritatem affert. Folia in capitis perfusionibus utiliter decoquuntur, præsertim addita anthemide. Roborat enim hoc modo cerebrum, nervos, oculorum aciem, et auditoriam facultatem. Optima demum in uniuersum est medicina morbis omnibus diuturnis, et melancholicis. Quamobrem Serapio, Sena, inquit, mirifice prodest delirio, amentie, scissuris totius corporis, resolutioni nervorum, phthiriasi, cephalalgie, scabiei, pustulis, pruritui, et epilepsie. Cor etiam roborat, si tamen ijs potissimum commisceatur medicamentis, quæ ipsum maxime confirmant, ueluti uiola.

Pyrethrum. PYRETHRVM. *Pyrethrum*

CAP. LXXI.

PYRETHRVM Romani saluarem vocant. Folia, caulemque emittit, ut daucum syluestre, & feniculum: umbellamque anethi, circinata rotunditatis. radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissima. Pituitam elicit: ideo in dolore dentium decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur: mansa pituitam extrahit. Sudores citet, peruncto ex oleo corpore: diuturnis horroribus efficax, contra perfrictiones membrorum, resolutionesque eximie conducit.

Saluaria

PYRETHRVM radix officinae omnibus est nota, in frequentibus usu habetur, præsertim in dentium cruciatibus. Nascitur Pyrethrum in quibusdam quidem Italice montibus, sed non adeo crebre, ut quod ex Orientalibus regionibus Venetias aduehitur. Huius plantæ uidi primam ego in Baisano Tirolensium emporio in bortulo

Pyrethri consideratio.



in hortulo quodam Blasij Sbaicher medici in simplicium facultate peritissimi, quæ folijs, caule, radiceq; multis dif-  
 pantibus notis Dioscoridis Pyrethrum referebant. Veruntamen non illis erant umbellæ anetho similes, quales Pyre-  
 thro reddidit Dioscorides, sed potius flores anthemidis modo spectabantur. id quod etiam testatur Ruellius de Pyre-  
 thro, quod in Gallia provenit. Ex quo facile adductus sum, ut suspicandum putem, aut hoc in loco Dioscorida-  
 cem librariorum negligentia depravatum esse, aut plura Pyrethri genera reperiri. Caterum sunt etiam verbera  
 prudentibus, qui novum quoddam Pyrethrum ostendant, passim ferè in pratis, ac incultis nascens, folijs hortensii  
 sinace proximis. Cuius radix etsi primo statim gustu acris non sentiatur; postea tamen cum diutius manditur, in  
 linguam, tum fauces sua feruenti acrimonia mordet, ac quodammodo incendit. Sed tamen huius acrimonia non est  
 fallatur gustus) cum legitimi Pyrethri sapore comparanda: quippe qui et amarior, et multo acrior, et feruor  
 percipitur. Pyrethri meminit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, ubi eius vires ijs descripsi-  
 mus. Pyrethri radice potissimè utimur, causticam, urentemque facultatem obtinente: qua utiq; etiam dentium refrig-  
 ratorum dolores lenit: et ad rigores ante periodum cum oleo confricatur. Ad hæc stupidos quoq; quos nunc  
 vocant, et resolutos adiuvat.

Pyrethri vi-  
 res ex Gal.

### ROSMARINVM.

Rosmaria.

### ROSMARINVM CORONARIVM.



### Asiaticis. ROSMARINVM.

### CAP. LXXII.

**D. v. o.** Rosmarini genera. Vnum fœcundum, frugiferumque, cuius semen cachrys vocatur. Folia fœniculi habet, crassiora, & latiora, in rotæ speciem, humi sparsa, iucundè olentia: caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis concavum alis: in cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylii simile, rotundum, angulosum, acre, resinaceum, quod in mandendo linguam exurit. radix thus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum, uti sphondylium, odoratum, minimè exurens: radice foris nigra, intus si frangatur, alba. Verùm id quod sterile dicitur, illorum planè similitudinem refert: sed neque caulem, neque florè, neque semen præmit. Nascitur in saxosis, & asperis. Trita omnium herba communiter hæmorrhoidum profluvia sistit: sedis inflammationes, & condylomata mitigat: concoquit strumas, & abscessus, qui ad maturationem ægrè perducuntur. Siccæ radices cum melle ulcera purgant: torminibus medentur cum uino potæ, & contra serpentium morsus conueniunt: menses, & urinas cient: veteres tumores illitu discutunt. Tam radices, quàm herbe succus, adiecto melle, illitus oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadem pollet: si comitialè malum sentiat, aut uetus pectoris uitium, auxilio est. regio morbo laborantibus cum uino, & pipere datur:



datur: sudores mouet, cum oleo perunctum: ruptis, & conuulsis prodest. podagris, cum loliacea farina, & aceto tritum, illinitur: purgat uirilgines, addito aceto quàm acerrimo. Semine in potio nibus utendum, eius quidem quod cachryn non ferat: quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum erica nasci, folijs lactucæ syluestris amaræ asperioribus, candidioribusque, radice breui, Theophrastus author est: potuque idipsum alterutra parte purgare. Cachrys uim habet excafaciendi, & uehementer exiccandi. Quare abstergentibus medicamentis insentur. contra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita ut tertio die soluat.

## Λιβανotis σεσαματίνη. ROSMARINVM CORONARIVM.

### CAP. LXXIII.

ROSMARINVM, quo coronarij utuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incana, supernè uirentia, grauiter odorata. Excafactoria ui præditum est. Regium sanat morbum, si decoctum in aqua, ante exercitationes bibatur: & ubi laborans exercitationi se crediderit, in balnea descendat, & merum poter. Acopis, gleucinoque unguento admisceri solet.

PRIMUM, ac summum Libanotidis, siue Rosmarini genus, quod mas appellant, sub duplici differentia à Dioscoride representatum, aliquoties uidi Venetijs in horto anconisimo Maphei medici excellentissimi, nullis sanè deficientibus, quas illi Dioscorides assignauit. Verum alterum genus, quod sceminam dicunt, hactenus in Italia nusquam esse uidere licuit, tametsi id inibi nasci non negauerim. Sed certè Cordum in suo dispensario hallucinationem crediderim: quippe qui existimauerit syriestrem Angelicam esse Libanotim. Porro Rosmarinum, quo (ut Dioscorides inquit) coronarij utuntur, nostras nimirum uulgare est, quod in hortis, ac uiridarijs passim, & in uineis alicubi plantatum conspicitur. Id in frequentiori usu est, notiusque omnibus, quàm ut de eo plura dici debeant. Ceterum uariat, meam sententia in Rosmarini descriptione Theophrastus, qui libro ix. cap. xii. de plantarum historia, de Rosmarinis hæc posteritatis memoriæ prodidit. Rosmarini genera, inquit, duo, alterum sterile, alterum fertile: & alterum tam fructu, quàm folio utile, alterum tantum radice. Fructus cachrys uocatur. Fertile folium habet palustri apocymine simile, sed multo maius: caulem ad magnitudinem cubiti, aut maiorem: radicem magnam, crassam, candidam, et uelut thus redolentem: fructum candidum, scabrum, oblongum. Nascitur potissimum solo squalido, atque saxoso. Radix medicamento ulcerum utilis, & mensibus pota in uino nigro austero. Fructus ad urinae stillicidia, & aurès, & argemam, & ad oculorum morbum lippitudinem nuncupatum, & lactis ubertatem mulieribus facit. Sterile illud folio lactucæ amaræ constat, sed scabrius, candidiorque: radice breui. Nascitur id quoque prædicto solo (alijs, ut Hermolaus legendum censet, & hic à Dioscoride commonemur, ubi erica) lætissimum. Radix partim superius, partim inferius purgat. Quod enim german uersus consistit, superius purgat: quod terram uersus, inferius. Prohibet & testibus interposita uermiculos noxios. Colligitur per messem tritici. hæc Theophrastus. Libanotidis, siue Rosmarini cum bisfortant, tum facultates descripsit Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Libanotides tres sunt, una sterilis, due fructum ferentes: omnes uero eiusdem facultatis, emollientis, & digerentis. Succus tum radice, tum herbe, mistus melli obtusam oculorum aciem ab humorum crassitudine curat. Porro eius libanotides, quæ ad coronas est utilis, quam Romani rosmarinum nuncupant, decoctum, regio morbo laborantes potum adiuvat. Omnes enim libanotides abstergentis, & incidentis facultatis participes sunt. hæc Galenus. Ceterum Cachrys non modo Rosmarini semen, significat: sed etiam quarundam arborum nucamenta, uel potius excrementa, quod nec fructus, nec flores propriè dici possunt: quæ tamen ante fructus erumpunt, & decidunt, qualia uisuntur in corylo, cui sunt longo pipere similia, item in nuce, ac quercu. Nisi inter hæc uetères Græcos autores aliquam nouisse differentiam sit iudicandum, quod apud plerosque non cachrys, sed canchrys pro Rosmarini semine scriptum reperiatur. quæ tamen uoces hactenus à recentioribus confundi inuenio.

Rosmarinorum confid.

Rosmarini uires ex Gal.

Cachrys quid.

## Σφονδυλίων. SPHONDYLIVM.

### CAP. LXXIIII.

SPHONDYLIVM folia quadantenus platani, & panacis habet: caules foeniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes: in quorum cacumine semen duplex, feseli simile, sed latius, candidius, & magis paleaceum, grauis odoris: flores eius albi, aut pallentes: radice raphani, candida. Nascitur in palustribus, & aquosis. Potum semen pituitam per aluum extrahit. medetur iocineris uitijs, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, vuluarum strangulationi: veteranosos succu reuocat. Cum oleo commodè infunditur capitibus phreneticorum, & lethargicorum, item capitis doloribus: cum ruta illitum, serpentia ulcera cohibet. Datur radix contra regium morbum, & iocineris uitia: circumrasa eadem, & injecta callos fistularum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisque accommodatur. qui cæterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

Sphondylii  
consideratio.

## SPHONDYLIVM.


Fuch. error.

Sphondylii  
vires ex Gal.



FERVULA.

Fervulae histo-  
ria.



RARA admodum sunt prata, uligine madentia, quae inter alias complures herbas, innumeras quoque Sphondylii plantae habeant: earum praecipue, quae in montibus potius, quam in planitie virent. In his sane Sphondylium copiosum nascitur, folio plantani, aut pariacis: caule sceniculi, cubitalem longitudinem excedente: in cuius cacumine umbella insidet, albis floribus referta: e quibus semen prodit, seseli non absimile, latius tamen, et squamosum, sapore iniucundo, ut quod cimices ferme respiciat. Radicem profert albam, raphani emulam, gustu non ingrato. Hinc semine utuntur quidam seselis uice, quod alterum alterius effectus prestare existiment. Porro Fuchsius non videtur scire Sphondylium nouisse, quod ipsam una cum Acantho depingit, cum cetis Acanthum Germanicum. Cui facile imposuerint officinae Germanicae, quae foliorum similitudine deceptae, pro Branca naphana Sphondylium usurpant. Sphondylii facultates memorare prodidit Galenus libro VIII. simplic. medicamentorum, sic inueniens. Sphondylii fructus acris, et secantis est facultas. Itaque ad asthma, et comitalem morbum aptum est medicamentum: prodest et regio morbo. Et radix nimium aspidulicis facit, ad eadem accommodatur. Sed et insuper fistularum celsas tollit: ceterum imponere eam oportet circumrasam. Porro floris etiam succus ad diuturniora aurium ulcera conueniens reponitur.

## FERVULA. CAP. LXXV.

E VIRIDI Ferula medulla pota utilis est ad cruentas excretaiones, coeliacosque: contra uiperum morsus in uino datur: erumpentem naribus sanguinem indita sistit. Semen porum torminosis auxiliatur: sudores ciuit, uncto ex oleo corpore. Caules si edantur, capitis dolores faciunt: inuria conduntur. Ferula itaque caulem profert ternum saepe cubitum: folia sceniculi, longe asperiora, et latiora, quae ab imo caule vulnerata sagapenum efficitur.

FERVULA aestuosis nascitur locis: ideoque nil mirum, quod Apulia Ferularum sit maxime ferax. Quinetiam frequens prouenit in Romano agro Tyrrheni maris contermino, praesertim apud Centumcellas, et in uniuersis Hetruriae maritimis. E quibus prima tantum germinatione corculum quoddam pastores eximunt, oua luteum induratum referens, quod sub cineribus assatum, prius tamen charta, aut linteo madescentis conuolutum, mox pipere, et sale conspersum, non modo gustui gratissimum est cibum: sed etiam ad excitandam uenerem ualentissimum. De Ferulae tuius differunt Theophrastus libro VI. cap. II. de plantarum historia, ubi ita scribit. Ferulaceum genus in plures spargitur species. Sed primum de eo, quod commune omnium constat, dicendum est, scilicet de Ferula: atque Ferulagine: seu idem genus habebat, differens magnitudine tantum: seu etiam alterum suum, et nonnulli putarunt. Ergo natura earum, quae conspici possunt, res similis certe sentitur, praeterquam ratione magnitudinis. Ferula enim grandis admodum surgit, Ferulago autem humilis. sed utriusque caules ambo, et geniculatae sunt: folia, et cauliculi quidem, geniculis erumpunt, ac alternatim exeunt folia: alternatim inquam, quod non ex eadem parte geniculorum, sed permutatim, caulem magna ex parte amplexa, sicuti arundinea proueniunt: nisi quod deflexa haec magis, mollitior, magnitudinisque cassa. Ferulum enim grande, molle, multifidum, ut capillamenti modo feris inspectetur: maxima, quae terra proxima sunt, et reliqua folia de ad portionem. Flos melius: semen obscurum, acetoso simile.

# In Lib. tertium Dioscoridis. 373


ferulae. Finditur cacionine, & in stipites quosdam haud magnos dispergitur: quibus flos, semenq; insidet. nec flore, fructuque laterales caules carent, sed anethi modo ferunt. Annuo caule constat, & germinatio in uere primien foliorum, tam caulis, ut etiam in ceteris fieri solet. Radice altè descendit, eademq; singulari innittitur. Talis Ferula est. hęc Theophrastus. Porro Ferula (ut Plinius est autor libro xxiiii. cap. primo) asinis gratissimæ sunt in pabulo, ceteris uero iumentis presentaneo ueneno. quæ de causa id animal Libero patri assignatur, cui & ferula. Natura Ferularum (ut idem Plinius libro xx. cap. xxiii. testatur) murænis infestissima est: tactæ siquidem ea moriuntur. In insula quadam ex fortunatis nomine Morion, ferulas in arborum amplitudinem grandescere, scripsere eundem. Apuli lignorum uice, quibus maxime carent, ferulis ad ignem utuntur. Ferula meminit Galenus libro viii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Ferule semen exalfacit, & attenuat. At interna eius pars recens-  
tis est, quod medullam uocant, adstringentem qualitatem participat. Cuius nomine sanguinem spuentibus, & co-  
hæsis conuenit.

Ferula uires  
ex Gal.

ΠΕΥΚΕΔΑΝΟΣ.

PEUCEDANVM.

CAP. LXXVII.



PEUCEDANVM caulem emittit tenuem, gracilem, foeniculo similem: comam habet statim ab terra copiosam, spissamque: flore luteo: radice nigra, crassa, graui odore, succosa. gignitur in montibus opacis. Tenera radix cultello conciditur, profluensq; e plaga succus umbræ mandatur: in sole siquidē confestim euanescit. Colligitur capite prius, & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premat, & uertigo sentiat. Assatione radix inutilis fit. Tam lac, quam succus radice, & caulibus extrahi solet, sicuti è mandragora: verum inefficacior. Succo lacryma habetur, & uelocius expirat. Interdum etiam concreta inuenitur lacryma, thuris similitudine, caulibus, radicibusque adhærens. Præfertur succus è Sardinia, & Samothrace, colore rufus, odore graui, feruens gustu. Ex oleo, & rosaceo illitum Peucedanum prodest lethargicis, phreneticis, uertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis. omnibus, in uniuersum, nitij neruorum, ex oleo, & aceto illitum, prodest. Eius olfactu respirant vuluæ strangulatus, & ueternosi reuocantur. Incensum serpentes abigit. Auriæ doloribus conuenienter ex rosaceo instillatur: cauernis dentium inditum, mitigat dolorem. contra tussim efficacissimè ex quo assumitur: suspirijs, torminibus, & inflationibus subuenit. Ventrem leniter emollit, lienem absūmit, difficiles partus mirè adiuuat. Facit ad uescicæ cruciatus, & renum distentiones potum: vuluam aperit. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior: eius decoctum bibi-

tur. Farina eius, sordida ulcera purgat, & uetera cicatrice obducit: squamas ossium extrahit. In cerata, & calfacientia malagmata additur. Radix eligi debet recens, quæ cariem non senserit, firma, odoris plena. Succus ad poriones amaris amygdalis, aut ruta, aut pane calido, aut anetho resoluitur.

QVONIAM nullis prorsus foliorum, ac seminis, & paucis admodum floris notis Peucedanum representauit Dioscorides, utpote plantam, quæ omnibus fortasse suo tempore notior erat, quam ut longiorem descriptionem posuisset; idcirco nobis quidem perdifficile esse iudico, decernere quòdnam genus herbe hodie in mediū afferri possit, quæ legitimum Peucedanum referat, præsertim cum Theophrastus, Plinius, Apulcius, ac antiquorum alij, qui simplicium herbarum descriperunt, plura, quod legerim, de Peucedano memorie non prodiderint. Verumtamen cum scribat Dioscorides, Peucedanum nasci comam statim à terra copiosa, ac spissa, hinc planè coniectandum uidetur, Dioscoridem ipsam uocare, quod Peucedanum cōstet multis folijs, capillaribus, tenuibus, ac longis, foeniculi, aut anethi effigie: Huic accedat illud etiam accedit, quod cum Peucedanum, Dioscoridis testimonio, florem proferat melinum, siue luteum; non temerè credendum arbitror, hunc non in alio, quam in umbella sustineri, cum omnes ferulaceæ stirpes, & quæ foeniculo, & anetho similes habentur, cuiusmodi sunt, quæ hoc in loco à Dioscoride recensentur, umbellæ in caulium cæuicibus gignere conspiciantur, & quibus semen prodit foeniculi modo. Quod si ita se res habet (ut equidem existimo) asserere non dubitauerim, me sæpenumero Peucedanum uidisse in Ananienfibus montibus, ubi huiusmodi plantæ frequēter proueniunt, quæ non solum prædictis notis Peucedano adstipulantur; sed etiam radice, quam habent nigram, crassam, succi plenam, grauiusq; olentē. In hac itaq; sententia persistam, ut hanc herbam, quam etiam pictam damus.

Peucedani cōsideratio.

Peucedani ui-  
res ex Gal.

uerum Peucedanum putem, donec aliam nactus ero, quæ certioribus notis illud exprimat. Ceterum radices, quæ pro Peucedani radicibus uulgò officinæ utuntur, legitimas ementiuntur. nam præter id quòd exteriore parte nigrescent, nulla graueolentia, nullaq; acri facultate sunt præditæ. Cuius uerò plantæ hæc sint radices, ego quidem præferre non possum: eas siquidem hætenus non nisi siccas, & sine caule, ac folijs mihi uidere licuit. Præterit Desfontaines Sardonium peucedanum, quod non magno quidem negotio ad nos aduchi posset, cum frequens, nec longa sit mercatoribus in Sardiniam nauigatio. Vnde seplasiarijs, si rerum legitimarum studio caperentur, facillè Peucedani radices conueherentur. Peucedani meminit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi de eius uiribus disserere in hunc modum, Peucedani radice quidem maxime, sed tamen etiam succo, & liquore utimur. Sunt autem hæc omnia eiusdem speciei facultatis: sed ualentior succus, admodum excalfaciens, & digerens. Quare affectibus omnibus circa neruos consistentibus conuenire creditur, tum morbis in pulmone, & thorace ex crassitudine, & uiscositate morum prouenientibus. Atque intro quidem in corpus sumptus, sed tamen etiam olfactu prodest. Porro quòd iudicat, & extenuet, sæpe etiam dentium perforatorum dolores cavitati impositus protinus sedauit, quia uidelicet tenuis est partium, & excalfactorius. Quinetiam lienes induratos iuuat, nepe incidendo, digerendo, atq; extenuando crassos humores. Sed & radice ad hæc uti licebit: quæ et squamas celerrimè ab ossibus detrahât, quia uidelicet ualidè desiccât, minus tamen quàm succus excalfaciens. Et ulceribus malignis remedium est optimum arida illita: ipsa enim expurgat, carnem gignit, & ad cicatricem perducit. Excalfacit quidem ordine secundo iam completo: desiccaturò tertio iam incipiente.


MELANTHIVM SATIIVM.

*Chrysanthemum sativum*



Μελάνθιον. GITH, SEV MELANTIVM.

MELANTIVM SYLVESTRE.



CAP. LXXVIII.

GITH exilibus surculis fruticat, sæpe binos dodrantes excedens: folijs, ut fenecionis minutis, sed multò tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo, ceu papaueris, oblongo, intercurrentibus intus membranis: quibus semen includitur nigrum, acre, odoratū, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus illitum fronti, subuenit. discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex irino, & infusum naribus: tollit lepras, lentigines, duritias, tumoresque uetustos, cum aceto illitum: circumscarificatos clauos excutit, cum uetere urina impositum. Dentium doloribus, cum aceto, & teda decoctum, & colliutum prodest. teretes uetris tineas expellit, peruncto ex aqua umbilico. destillatione laborantes adiuuat, tritum in linteo, & olfactum. Vrinam, & menstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac extrahit: difficultatem spirandi cum uino potum, leuat: phalangiorum morbis ex aqua, drachmæ pondere, haustum auxiliatur. Incenso serpentes fugantur. Tradunt largiùs epotum enecare.

GITH, quod Græci Melanthium appellant, officinis Nigella uocatur. Legitimum folijs est minutum incis, ræ-  
 culis tenuibus, capitulis in summitate oblongis: in quibus semen includitur nigrum, intercurfantibus membranis di-  
 ffectum, acre, ac odoratum. Seritur in hortis, & uiridarijs, atq; etiam in alijs locis satum prouenit. Quod cùm  
 ante nos probè animaduertissent Hermolaus, & Ruellius, asseruerunt omnino hallucinari eos, qui putant eam str-  
 pem leguminum Melanthium esse, quæ inter segetes in aruis passim nascitur, folijs ferè porri: caule prælongo, hirsu-  
 to: flore purpureo, rosæ parue effigie. Et rectè, mea quidem sententia, iudicarunt: siquidem herba illa cùm Dio-  
 scoridis historia quàm maxime pugnat, utpote quæ folijs, caule, ac floribus, nulla ex parte Melanthium reftrat, sicut  
 neq; etiam semine. quod etsi nigrum Melanthij modo gigniatur, non tamen gustui aliud repræsentat, quàm amaritu-  
 dinem simul & asperitatem. Hinc itaq; perspicuum esse potest, Brasauolum, alioqui medicum clarissimum, in suo sim-  
 plicium uolumine Romæ excuso manifestè cecutiuisse. quippe qui affirmare nō dubitauerit, illud uerum, legitimūq;  
 esse Melanthium, quod in segetibus passim sua sponte nasci superius diximus, quodq; uulgò Gittone à Ferrariensibus  
 appellari scribu. Cuius error non solum prædictis rationibus; sed ea quoq; herbæ appellatione faciliè deprehenditur,  
 quod etiam ij, qui ita eam appellant, illegitimum esse Melanthium existiment. Quandoquidem nil aliud Italis hoc nomē  
 Gittone denotare uideatur, quàm spurium Gith, quod ideo Githago, et pseudomelanthium uocari potest. quæ admodum  
 & illud, quod rura Tridentina appellant formentone, nil aliud significat, quàm spuriam tritici speciem. Quod cùm po-  
 tuit ipse Brasauolus animaduertit, nostris fortasse, aut aliorum commentarijs admonitus, suam reuocauit senten-  
 tiam. Quare posthac Brasauoli quoq; sententia, ij damnandi erunt, qui in hac persistent opinione. Iam igitur consti-  
 tuitur licet, uerum Gith in hortis, & uiridarijs satum prouenire, in quibus frequentissimum seritur in Germania.

Melanthij cō-  
siderano.Brasauoli er-  
ratum.

Ceterum est & sylvestre Melanthium, quod in Hetruria reperitur, hortenji non admodū dissimile, capitibus tamen  
 & strobilibus, & semine minus odorato. Ex quo quidem planè colligere possumus, pseudomelanthium sponte inter se-  
 getes nascentis, quod uocant uulgò Gittone, nullo modo sylvestre Melanthium esse. Sed longè minus id fuerit Lolium,  
 in apertissime hallucinatus credidit Fuchsius, medicus alioqui peritissimus: cuius error à nobis explosus est libro se-  
 cundo in loly mentione. Porro & illud semen odoratum, subrubrumq;, quod aliqui pro minori Cardamomo perpe-  
 ram usurpant, seplasiarijs Nigella Citrina uocatum, Melanthij genus est. quippe ipsa seminis forma, odor, ac sapor  
 nihil prorsus à Melanthio discrepant. Verum si modò in aliquo disident, color est, qui in altero niger, in altero uerò  
 subflauus conspicitur. Quo fit (quod etiam superius de Cumino differentes diximus) ut magno in errore uersentur  
 Monachi illi, qui in Mesuem commentarios edidere, quod præter rationem asserere sint ausi, Nigellam subflauam,  
 nil aliud esse, quàm Cuminum sylvestre primo generi à Dioscoride assignatum. Melanthij meminit Galenus libro  
 vii. simplicium medicamentorum, his uerbis. Melanthium excalfacit, atque desiccatur tertio ordine. Videtur etiam  
 tenuium esse partium: unde etiam destillationes sanat, calidum in luteo admotum, atque assiduò olfactum. Quinetiam  
 si intro in corpus sumatur, uel maxime flatus extinguit. Hinc constat essentia ipsam esse subtilis, & ad unguem à ca-  
 luitate elaborata. Propterea sanè etiam amarum est. Ostensum uerò in quarto horum uoluminum est, quod cùm ad  
 extremam tenuitatem, atque elaborationem terrena pertingit substantia, amara proueniat qualitas. Itaq; mirum non  
 est, si lumbricos intermat non esum modò, sed etiam foris uentri impositum. Siquidem & id præstare posse saporem  
 amarum monstratum est. Neq; sanè etiam mirandum, si lepras, clauos, myrmecias eiiciat, ei præsertim, qui in supe-  
 rioribus libris comprehensorum haud est immemor. Sic uerò etiam orthopneam iuuat, & menses prouocat, qui utiq;  
 ob crassitiem, aut uiscositatē humorum retenti fuerint. In summa, ubi incisione, extersione, desiccatione, excalfac-  
 tione est opus, præstantissimum id remedium est.

Melanthium  
sylvestre.Melanthij ui-  
res ex Gal.

## ΣΙΛΦΙΟΝ. LASERPITIUM. CAP. LXXXVIII.

LASERPITIUM in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur: caule ferulaceo, quem ma-  
 spetum uocant: folijs apio similibus: lato semine. Radix excalfacit, in cibis ægrè concoquitur,  
 uesicæ noxia. Sugillatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cerato, medetur: ischiadicis  
 conuenit cum irino, aut cyprino cerato: excrecentibus circa sedem tollendis illinitur, cum puta-  
 mine mali punici, & aceto decocta. Venenis pota resistit: os commendat, cibis, aut sali permista.  
 Laserè radice, atque caule scarificatis colligitur. Præfertur autem rufum, translucens, myrrhæ  
 zmulum, non porraceum, odore ualens, suauis gustu, quod dilutum faciliè albescit. Cyrenaicum si  
 quis degustauerit, humorem toto corpore ciet: blandissimo odore, adeò ut ne os quidem gustan-  
 ti nisi paululum spiret. Medicum, & Syriacum minus uiribus ualent, & magis uirosum reddunt.  
 Laser omne antequàm siccescat, adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento. quod malefi-  
 cium deprehenditur gustu, odore, uisu, & dilutione. Caulē aliqui silphion, radicem maguda-  
 na, & folia maspeton uocauere. Efficacissimum laser, mox folia, postremò caulis. Acrem uim  
 habet, inflationes facit: perunctas cum aceto, pipere, & uino alopecias sanat, oculorum aciem exa-  
 cuit: & incipientes suffusiones, illitum cum melle, dissipat: cauernis dentium in dolore inditur,  
 aut cum thure in luteo circumligatur, aut cum hyssopo, & ficis coctis in posca, os colluitur. ijs  
 prodest, quos bestia in rabiem efferata momorderit, vulneribus immisum. Valet aduersus uene-  
 na telorum, & animalia omnia, quæ uirus eiacularunt, potum, aut illitum: scorpionum plagis o-  
 leo dilutum circumlinitur. gangrænis præcoërcitis immittitur: & cum ruta, nitro, & melle, vel  
 per se carbunculis. Clauos, callosq; prius circumrasos uellit, cerato, aut aridorum ficuum carne  
 præmolitum. Recentes lichenas ex aceto sanat: & excrecentia in carne, polyposq; si aliquot  
 diebus



diebus cum atramento futorio, aut ærugine illinatur, extuberantia cum forfice extrahit. Vetribus faucium scabritijs opitulatur: grauem, subitoque irrucescentem uocem, dilutum aqua, sorbitione confestim expedit: vuam illitū cum melle reprimat: anginis ex aqua multa utilissime gargarizatur. Vescientes lætiore colore mangonizat: tussi commodè in sorbili ouo datur, & pleuriticis in sorbitionibus: in fellis suffusione, & aqua inter cutem, cum aridis ficis. Horrores discit cum uino, pipere, & thure potum. neruorū contractionibus, opisthotonicisque datur oboli pondere deuorandum. hærentes gulæ hirudines, gargarizatum cum aceto decutit. Ad lac intus coagulatum bibitur: comitialibus ex aceto mulso proficit: menses ciet, cum pipere, & myrrha potum: cœliacos adiuuat, in acino vuæ sumptum: cum lixiuio autem potui datum, repente conuulsis, ruptisque prodest. ad potiones resoluitur amygdalis amaris, aut ruta, aut calido pane. Foliorum succo eadem præstantur, sed multò inefficacius. Cum aceto mulso manditur, ad expediendam arteriam, maximè cum uox retunditur. Eo cum lactucis utuntur, exitque in uicem erucæ. Fertur & altera magudaris in Libya nasci, radix laserpitio similis, sed minus crassa, acris, & fungosa, ex qua non profluit succus, Eiusdem cum laserpitio facultatis.

Laserpitij consideratio.

MAVRITANI Laserpitium Anuiden nominant. Laser uerò, quæ Laserpitij est lacryma, Assam appellant: quam in foetidam, & odoratam diuidunt. Id quod & ipse Dioscorides fecisse uidetur, quod Cyrenaicum Laser suis uisimo odore commendauerit; Medicum uerò, ac Syriacum, quoniam uitrosū emittant odorem, omnino damnauerit. Quonobrem non planè improbanda uidetur eorum opinio, qui concretum illum succum, quem officine, & uulgò Belzoinum uocant, legitimū Laser uolunt esse, cui Dioscorides blandissimum tribuit odorem. Assam uerò foetidam Mauritanis uocatam, id tantum, quod ex Media, Syriaq; defertur, quod Sagapeni instar foetidum deprehenditur. In quorum equidem sententiam non potui non ipse quoq; deduci, quod uiderim selectissimum Belzoinum admodum odoratum, subrubeum, pellucidum, gustui gratum, & quod aqua dilutum albescit. Assam uerò foetidam uitrosi odoris, & sagapenum redolere compererim. Neque hac tantum ratione, siue experientia adducor, ut Belzoinum prætem esse præstantissimam Laserpitij lacrymam; uerum etiam eorum recentiorum testimonio, qui remotissimas peragrarunt regiones. Quippe Ludouicus ille Romanus, qui Aegyptum, Aethiopiam, utraq; Arabiam, Syriam, Persidem, Indiāque tam intra, quam extra Gangem perlustrauit, ubi mores enarrat cuiusdam Indie urbis, quam suo idiomate Tanasari uocant, lib. vi. cap. ix. de Laserpitij lacryma in hunc modum differt. Qui Tanasari inhabitant, ciam comburunt defunctorum corpora, omnifariam odores in rogi conijciunt, agallochum uidelicet, & id genus arboris, cuius gummi elegantissimum illud unguentum gignit, quod uulgò Belzoi nuncupatur, Laserpitium eruditores ab arbore Laseris dicunt, & item styracem, thus, corallium, sandalum, & id genus prope innumeras odoratas arbores. Et cap. xiiii. eiusdem libri: Bangellæ, inquit, christiani nominis complusculos negotiatores ex urbe Sarnæ, (ut referebant) oriundos offendimus. Qui illò ueluti ad nundinas ferunt sericos pannos, odorataq; ligna, agallochi uidelicet, & Laseris. Ea hæc est arbor, quæ electissimum gummi illud gignit, doctioribus Laserpitium appellatum, uulgò autem Belzoi dicitur. Item libro eodem cap. xix. Sumatræ insulæ complura recolens: Ibi, ait, Laser arbor nascitur, quæ gummi gignit, cui Laserpitio nomen est, uulgò Belzoi dicitur. hæc ille. Ex his igitur tum rationibus, tum auctoritatibus (etsi interpres ille, qui Ludouici historiam ex Italico in Latinum transtulit, contra Dioscoridis, & doctorum sententiam, arborem Laser, gummi uerò Laserpitium perperam appellauerit, utpote qui fertasse stirpem historiæ fuerit ignarus) rectè concludi posse putauerim, nil aliud Belzoinum uocatum nobis referre, quam probatissimam Cyrenaici laserpitij lacrymam. Assam uerò foetidam eam tantum, quæ ex Media, Syriaq; deuehitur, græce uerò redolens, ac etiam (ut Dioscorides refert) sagapeno adulteratam. Cuius rei illud certum indicium præbet, quod hæc omnia ex Alexandria Aegypti, quò ex Libya, Media, Syriaq; conuehantur, ad nos afferantur. Ceterum non desunt, qui inter Assæ genera dulcem etiam conuenerent. Sed ij, meo quidem iudicio, hallucinantur: siquidem antiquorum nullus, quod sciam, Laser dulcedine præditum esse, nec item Assam, posteritatis memoriæ prodidit. Nisi forsitan ij pro dulci Assa odoratum Laser accipiant; quòd id, teste Dioscoride, gustu suaue percipitur. Nemo tamē hallucinatione tueri poterit eos, qui dulcis Assæ uice glycyrrhizæ succum assumunt. Quo fit, ut horum opinio omnino sit explodenda. Sed quoniam non inuicendam, quanuis longam, de Laserpitio historiam tradidit Theophrastus lib. vi. cap. iiii. de plantarum historia, ideo eius uerba hic subiiciam. De Laserpitio, inquit, nunc indicandum est. Laserpitio radix multa, crassaq;: caulis quantus ferula, & crassitudine ferè proximus: folium, quod massetum uocant, apio simile est: semen latum, foliaceum, quale quod folium appellatur: caulis annuus, sicut ferula. Ergo uere inueniunt massetum hoc exit, & pecus eo purgatur, pinguescitq; uehementer, & carnes mirabilem in modum suaves redduntur. Posthac caulem edit hominum cibo idoneam omnibus modis, elixum, assumq;. corpora eo quoq; purgari ferunt, quadraginta diebus. Succus capitur duplex, alter ex caule, alter ex radice: qua de causa alterum scaparium, alterum radicarium uocant. Radix nigro cortice tegitur, eumq; detrabere solent. Sunt ueluti certæ mensuræ & ædæ de radicis, quibus quantum conferre putetur ad futuram cesuram reseruantes, reliquum abscindunt. Nec enim donec, neq; plus constituto cedere licet: corrumpitur enim, putrescitq;, si diu mansit. Preparant id conficiuntq; in præteritum portum aduectum hoc modo. Cion in uasis coniecerint, farinamq; admiscuerint, quatiunt longo spatio temporis: hinc etiam colorem capefuit, & conditum iam incorruptum perdurat. Preparatio, cesurq; ita se habet. Locum Aphricæ amplum occupat, ampliozem, quam quatuor stadiorum millia in hortis Hesperidum ferunt. Sed maiore partem colligi apud Syrtis, Peculiare huius culta fugere loca proditur, quonobrem, si colatur mitescatq; folium, ac

Quorundam error.

Laserpitij historia ex Theophrasto.

atque omnino degenerat : utpote natura culturae aspernans, ferocitatisq; constans uernaculum . Cyrenenses annis se-  
 ptem prius, quam ipsi urbem habitarent, Laserpitium extitisse affirmant . Habitāt uerò annos maximè trecentos usq;  
 ad Simonide Athenis magistratum . Illi sic referunt . Alij radicem Laserpitij cubitalem fieri tradunt, aut paulò ma-  
 iorem . Hanc in medio extuberare in caput, quod sublimè penitus extat, ut ferè super terram esse appareat . Vnde pri-  
 mum quod lac appellant, erumpit : dein caulis assurgit, ex quo magydaris, et quod solum dicitur, exeunt . Folium  
 id semen est, quod cum auster unguenè post caniculam flauerit, discutitur : atque ita Laserpitium nascitur, eodemq;  
 anno radix consummatur, et caulis . Sed hoc haud quicquam peculiare notetur : nam alijs quoq; idem tribuitur . ni  
 llexeris, quod discussum id protinus nasci potest, ortum peculiarem sortiri, supradictisq; propterea diuersum accipi  
 posse . Ad hæc circumfodiendum id annuum censent . Nam si relinquatur semen omne, caulemq; totum proferri, et de-  
 10 uiora tam hæc, quam radicem reddi existimant : defossa autem fieri meliora, scilicet solo subacto, beneq; gluto . Sed  
 huius contrarium illi uolunt, qui culta recusare id iniquiunt . Manti quoq; radices in aceto recens decisas referunt . For-  
 litem colore aurum emulatur . Contrarium etiam, quod pecora folio esitato purgari minimè indicant . Nam et uere,  
 et byeme, pecus ad montem dimitti affirmant : cibis non soliam hoc ; sed etiam altero quodam abrotono simili admini-  
 stratur . Vm ambo calefactoriam sortiri planè uidentur, et purgare quidem nequaquam ualere : exicare autem, et  
 concoquere uicè posse . Quòd si qua pecus egrescens, aut aliàs minus bene se habens ingressa sit, mox eam sanari, aut  
 eam auerit, sed magna ex parte posse seruari . Hæc igitur utro tandem sint modo, querendum . Quod uerò Magy-  
 daram uocant, nimirum à Laserpitio differt : tenerius enim, minusq; uehemens, et sine Lasere est . necnon et aspectu  
 manifesta experto homini constat . Nascitur in Syria : nam apud Cyrenam, et monte Parnaso largè prouenire ean-  
 dem affirmant . Sed quidam Laserpitium id appellant . An culta id quoq; modo Laserpitij fugiat, querendum . Quin  
 20 a si quid simile, aut proximum habeat, ad folij, caulisq; rationem, et si quam ullo pacto emittat lacrymam, id inuesti-  
 gandum . Ergo naturam ferulaceam, hisce contemplari oportet . hæc Theophrastus . Meminit Galenus Laserpiti-  
 ij libro VIII : simplicium medicamentorum, sic inueniens . Laserpitij succus calidissimus est . Verum enim uero et  
 folia, et caulis, et radix sat strenuè exalfaciunt . Sed omnia flatulenta magis essentia sunt, ac proinde concoctu dis-  
 ficilia . Foris tamen imposita corpori efficaciora, et omnium potissimum succus, admodum trahentem facultatē pos-  
 sident . Attamen et excrecentias amolendi, et liquandi uim quandam propter prædictam eius temperiem obtinet .  
 Lasere quoq; mentionem fecit, idem Galenus libro citato, sed antea seorsum, et sub absoluto ὀνόμαϊ, hoc est, succi ti-  
 tulo, ita scribitis . Opus, siue succus Cyrenæicus quidem omnium et calidissimus, et maximè tenuium partium est : ac  
 proinde omnium maximè discutit . quanquam sanè et reliqui admodum calidi sunt, et spirituosissimi : siquidem plurima  
 eorum pars essentie aeris est, et ignis . Porro complures habentur succi : quauis namq; radice incisa, aut caule,  
 30 quod ex sectione crassum, ac lentum effluit, succus est . Ceterum specialius, et uelut per excellentiam quandam Cy-  
 renæicum ita uocant, et Medicum, et Syriacum .

Laserpitij ui-  
 res ex Gal.

Σαγαπένιον . SAGAPENVM . CAP. LXXIX .

SAGAPENVM ferulaceæ herbæ succus est, quæ in Media nascitur . Optimum est translucēs,  
 fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter laser, & galbanum redolens, gustu acri .  
 Prodest laterum, & pectoris doloribus, tussibus uetustis, conuulsis, & ruptis . crassam pulmo-  
 nis pituitam expurgat . Datur comitialibus, opisthotonicis, lienosis : item contra neruorum reso-  
 lutionem, perfrictiones, & febrium circuitus in potu . In vnguenta probè admittitur . menses pel-  
 lit, sed fortum exanimat, cum hydromelitè potum . Prodest ex uino hauustum, serpentium ictibus .  
 40 oluscrum ex aceto vuluarum strangulatus excitat : oculorum cicatrices, offusam caliginem, hebe-  
 tudines, suffusionesque detergit . Resoluitur ut laser, ruta, aqua, & amaris amygdalis aut melle,  
 aut calido pane .

SAGAPENVM officinae interpolato uocabulo Serapinum appellant . Ceterum etsi eius adulterati frequentior,  
 et communis ferè sit usus ; tamen Venetijs præstantissimum quoq; uenditur, idq; illi præcipuè comparant seplasiarij,  
 qui bonorem diuitijs anteponunt . Ferulaceas plantas, è quibus Sagapeni lacryma emanat, etiam in Apulia nasci au-  
 tor est Musa Ferrariensis . Id quod equidem hætenus compertum non habeo . Ex orientalibus siquidem regionibus al-  
 latum, ut constat, ceteris præstat . Arabice familie autores inter deiectoria medicamenta Sagapenū referunt : quan-  
 quam ea Sagapeni facultas, quantum extat, à Græcis silentio prætermissa est . Sagapenum itaq; ( ut Mesues tradit )  
 50 crassos, lentosq; humores deiecit, crassamq; pituitam, et aquam intercutem educit . Porro facultate quidem propria  
 cerebrum mundificat, ac neruos, crassaq; ab his excrementa detrahit . Confert item eorum morbis frigidis, nempe do-  
 loribus capitis diuturnis, hemicranijs, comitialibus, uertigini, paralyti, orisq; distentioni . Pectus ualentissimè expura-  
 git, cuiusq; ac etiam lateris dolores tollit, præsertim si bibatur ex helenij, aut rutæ decocto . Foris emplastri modo im-  
 positum, aut intus assumptum tussi diuturna uexatis, ac difficulter spirantibus, opem maximam fert . Aqua intercute  
 laborantibus singulare remedium est, si tamen flauis myrobalanis duplicato pondere additis exhibeatur . Discutit cō-  
 paginam duritiā emplastri modo impositum, addito aceto, et cappari succo . Ruta succo, et auium rapacium fel-  
 le diutius maceratum, et in collyrijs additum, oculorum caligines disijcit, aquamq; in eos defluentem cohibet . Palpe-  
 brarum item bordeolos uocatos sanat, si cum aceto superponatur . Articulorum compaginibus quomolibet admotū,  
 dolores eorum mirificè sedat : quippe quoniam ualentissimè humorum lentores in his cruciatus excitantes radicatus  
 cauit, etiam si in coxendicum aliarumq; partium remotis, profundisq; locis ij delitescant . Potum, aut chysteribus in-

Sagapeni con-  
 sideratio .

Sagapeni ui-  
 res ex Mesue .

Sagapeni uires ex Gal.

ditum coli doloribus à frigiditate, ac flatibus prouenientibus maxime auxiliatur. Menses cit, sed factum interficit, et haustum, quam suppositum: contra uteri dolores, strangulatusq; prodest. Ventriculo tamen officit: uerum recte corrigitur lentiscina resina, et Indica nardo. Sagapeni meminit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi de eius uiribus disserit ijs uerbis. Sagapenum liquor est calidus, et tenuium partium, sicut et alij liquores. Sed et abstersionem quandam possidet, qua oculorum cicatrices expurgat, atque extenuat. Quin et suffusionibus, et hebetudinibus oculorum, quæ ob humorum proueniunt crassitiam, non malum est medicamentum. Porro planta ipsa, ex qua prouenit, ferule asinilis, imbecilla, et inutilis est. Sanè ipsa primum Sagapenum appellatur. At liquor eius abusu hoc nomen obtinet, cæu alia quoq; multa ex nominis defectu per abusum nuncupamus. Perfectum namque foret ipsum cognominare non Sagapenum, sed Sagapeni succum.

Εὐφωρίβιον. EUPHORBIVM. CAP. LXXX.

EUPHORBIVM Libyca arbor est, ferule speciem habens, quæ in Tmolo iuxta Mauritania inuenitur. Ea acerrimo succo turget. Cuius eximium feruorem expauescentes incolæ, ouillos uentres elutos, arbori circumligant, & eminus caulem contis incidunt, confestimque è plaga, perinde atque uase quodam, in uentriculos copiosus lactis humor effluit, præter id quod humi sparsum, vulnus eiacularur. Duo succi genera: vnum orobi magnitudine, sarcocollæ modo emicat: alterum in uentriculis concreuit, atque uitreum spectatur. Eligendum est translucens, & acre. Euphorbium adulteratur sarcocollæ, & glutini mistione. Sed difficile quidem experimentum: quippe cum leui gustu, os accensum diu detineat, adeo ut quicquid ori obijciatur, planè euphorbium respiciat. Eius inuentio tempore Iubæ regis Libyæ cognita extitit. Succus illitu suffusiones discutit. potus tota die exurit: quare melli, collyrijsque pro acrimoniæ ratione admisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera potione haustus. squamas ossium eadem die eximit: uerum eo utentes, necesse est linamentis, aut ceratis communire corpus, quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoriæ prodiderunt, percussos à serpente nihil molesti passuros, si incisa olle tenus capitis cute, intritus succus infundatur, vulnusque postea consuatur.

Euphorbij cōsideratio.

NON equidem dubitandum censeo, quin illud legitimum sit Euphorbium, quo passim officinæ utuntur, cum tamen gustu, quam olfactu acerrimum deprehendatur: ob cuius uolentissimam acrimoniam nunquam, nisi inuito animo, à se plasi ijs tunditur. Quandoquidem tamen sibi nares, et os omni prorsus ingenio gossipio, et linteis aqua rosarum madefactis muniunt: tanta tamen est acrimoniæ uis tenuissima, ut omnibus una cum aëre penetratis munimentis, in eorum tandem perueniat nares, ubi molestissimum excitat ardorem, qui non facile tollitur: quanquam etiam medicamentis admodum refrigerantibus succurratur. Quo fit, ut solertissimi pharmacopolæ baulis, ac alijs uictum querentibus hominibus id muneris obeundum tradant: interim tamen certo sciunt, non absq; conuictijs, et maledictis opus hoc illis peragi posse. Quamobrem mirum sanè non fuerit, si qui ab arbore recentem colligunt, eximium acrimoniæ feruorem expauescentes, è longinquo corticem feriant. Hanc plantam (ut Plinius quoq; testis est) aduenit primum Iuba Libyæ rex in monte Atlante ultra Herculis columnas, appellauitq; Euphorbian medici sui nomine, et fratris Mæse, à quo diuus Augustus fuit conseruatus. Euphorbio deiectoria inest facultas. cuius nusquam, quod equidem nenerim, meminere Dioscorides, et Galenus: tamen eam minime silentio inuoluerint Aëtius, et Aëtarius, qui concordēs de eo his uerbis disseruerunt. Euphorbium non modo pituitam trahit: sed etiam aquam, hancq; ualidius educit. Est autem acerrimum omnium, quæ ego nouerim, ardentissimumq;: propterea colicis, et uentrem frigidiore habentibus datur. ceteros uehementer conturbat: sitim maxime cit. Nonnihil ex odoratis seminibus ei est commiscendum. Modus triobolaris, ex aqua mulsæ. Prestat tamen cum melle cocto ipsum in catapotia redigere. Id quod etiam Paulus annotauit libro septimo, ubi inter ea Euphorbium recensuit, quæ aquam, et pituitam deiciunt. Verum in simplicium censu, Dioscoridē, Galenumq; secutus, de hac deiectoria facultate ipse quoq; nihil memoriæ prodidit. Ceterum inter Arabes Mesues fufius Euphorbij uires tradidit in soluentium medicinarum mentione, ubi ita, ad sensum saltem scribit. Euphorbium gummi est, quod usq; adeo excafcacit, extenuatq; ut in hoc cætera gummi generis excellat. Excafcacit enim ordine quarto: quo fit, ut exulceret, ruborem, inflammationemq; inferat, penetret, et molenter abstergat. Euphorbium noxium admodum est medicamentum, ita ut non sine labore, animi defectu, ac dolore frigido aluum deiciat. Iocineri ob id, uentriculoq; sua ingenti acrimonia magnam infert noxiam. Quapropter exhiberi minime debet, nisi prius ijs commisceatur medicamentis, quæ acerrimam eius uim retundere ualeant. Extrahit potum à profundis corporis partibus tum crassam, tum lentam pituitam, mundatq; compaginum cavitates à crassis constitutis excrementis, qua in re omnium ualentissimum est medicamentum. Nervos expurgat ab infectis laniis humoribus. Proficit ad hæc resolutis, conuulsis, stupidis, tremulis, orisq; distentionibus, et cæteris neruorum morbis à frigore abortis, si ex leucoij oleo leuigatum exterius inungatur. Iocineri, lieniq; inunctum, mirifice eorum dolores tollit à frigore, et flatu prouenientes. Sternutamenta ualentissime cit. Occipiti autem confricatam, ueternofos, obliuiofosq; iuuat. Aquam intercutem facillimè extrahit duorum obolorum pondere potum. Sed drachmarum trium pondere haustum (ut Serapio, et Auicenna scriptum reliquerunt) potantem interficit, trium dierum spatio erosus ab eo intestinis, et uentriculo. Euphorbium, teste Mesue, quatuor edurat annis: neque eo prius utendum est, quam annum integrum conseruerit. namq; recens ob ingentem acrimoniam reprobat. Seruatur commode milio, cui fa-

Euphorbij uires ex Mesue.

is, ex lentius sepultum. Euphorbij facultates paucis perstrinxit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Euphorbium caustica, siue urentis, & tenuium partium facultatis est, alijs succis similiter.

Χαλβάν. GALBANVM. CAP. LXXXI.

GALBANVM succus est nascentis in Syria ferulæ, quod nonnulli metopium uocant. Maxime laudatur cartilaginofum, merum, thuris effigiem præbens, pingue, minimè lignosum, retinens nonnihil adiecti seminis, & ferulæ, graui odore, neque nalde humidum, neque nimis aridum. Adulteratur faba fresa, resina, & ammoniaco. Galbanum excalfacit, urit, extrahit, discutit: menses, ac partus trahit appositum, uel suffitu. Lentigines aceto, & nitro perunctas tollit. Deuoratur ad 15 misim ueterem, difficultatem spirandi, suspiria, rupta, conuulsa. Aduersatur toxicis, porum cum uino, & myrrha: simili modo sumptum mortuos partus extrahit. Imponitur lateris doloribus, & furunculis: comitiales, & vuluæ strangulatus, & uertiginosos olfactu suscitatur. Si uratur, fugat nidore serpentes, & perunctos feriri non patitur. Serpentes cum oleo, & sphondylo circumpositum, necat: dentium dolorem oblitum, aut cauernis inditum, mitigat. vrinæ difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad potiones amaris amygdalis, aqua, aut ruta, aut calido pane, mulsæ: aliàs metopio, æreusto, aut felle liquido. Si purgare Galbanum noles, in feruentem aquam demittito. namque cum liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt: quas hoc modo facillè separabis. Mundo linteo, raroque alligatum in fictili, aut ærea pyxide ita pendeat, ut imum uasis ne tangat: opertoque uase in feruidam aquam demittito: sic enim syncerum, ueluti per colum eliquescet, & ligno- 20 sum in linteo remanebit.

QUANVIS legitimum, optimumq; Galbanum in pluribus Italiæ locis, præsertimq; Venetijs uenale reperitur, id tamen quo passim officinæ utuntur, nihil, uel sanè parum Galbanum refert, quod in laudatissimo genere à Dioscoride representatur. Siquidem illud non modò ab impostoribus adulteratum est; sed etiam lignorum ferularumq; tenentis, lapidibus, ac alijs compluribus recrementis uitiatum. Querant itaq; probi seplasiarij, quod optimum est: alij uerò, qui parsimonie, ne dicam auaritiæ student magis, quàm honori, ut qui probatissimum uix nunquam assequi possint, id saltem, quod impurum est, purgare deberent à Dioscoride edocti. quippe quod ea ratione, facillè ab aduentitijs sordibus expurgari possit. Galbani uires tradidit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Galbanum succus est plantæ ferulaceæ, molliendi, & digerendi ui. Fueritq; sanè ex tertio ordine excalfaciens 10 tum incipiente, aut secundo completo: in deficcando uerò ex secundo incipiente.

Galbani consideratio.

Galbani uires ex Galeno.

Ἀμμονιακόν. AMMONIACVM. CAP. LXXXII.

AMMONIACVM ferulæ succus est, quàm iuxta Cyrenen Aphrica gignit: cuius fruticè cum radice agafyllim uocant. Probatum bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. Hoc genus thrausma, id est, friaturam appellant: quod uerò terram, & calculos collegit, phyrana. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Molli, extrahit, calfacit: tubercula, duritiæque discutit. porum aluum soluit, partus extrahit: 40 lienem consumit, drachmæ pondere haustum: articulorum, coxendicumque doloribus liberat. Auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus: item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum ptisanæ succo sorbeatur. Cruentam urinam pellit, albugines oculorum absterget, genarum scabritiam absumit: tritum autem cum aceto, & impositum, iocineris, lienisque duritiæ sedat. discutit tophos, qui in artubus concalluerunt, cum melle, aut cum pice illitum. Lasitudines, & coxendicum dolores eo perungi utile est, cum nitro, & cyprino oleo, uice acopi.

AMMONIACI lacrymam officinæ, mutata una litera, Armoniacum uocant. Cuius tamen syncerissima pars non ad nos conuehant, qui ex Alexandria Aegypti cum mercimonijs Venetias redeunt. Quandoquidem rarissimum Ammoniacum uisitur, quod suis minutis glebis thus referat. Nam omne ferè, quo officinæ utuntur, picæ resinæ mollior massam compactum cernitur, impurum, ac quàm plurimis impostorum adulterijs uitiatum. Vt hinc facillè dici 10 posse putauerim, hoc uel illegitimum, uel saltem deterius esse, idq; fortasse, quod Dioscoridi phyrana nuncupatur. Cuius etiam meminit Plinius lib. XII. cap. XXIII. ubi de Ammoniaco ita scribit. Ergo Aethiopie subiecta Aphrica Ammoniaci lacrymam stillat in arenis suis. Inde etiam nomen ab Ammonis oraculo, iuxta quod gignitur arbor, quam Metopion uocat, resinæ modo, aut gummi. Genera eius duo, thrauston masculi thuris similitudine, quod maxime probatur: alterum pingue, & resinosum, quod phyrana appellant. hæc Plinius. Ceterum Ammoniaco usi sunt antiqui (ut Paulus est autor) in sacrificiorum odoramentis, ac suffimentis. In quem sanè usum illud ab ijs receptum fuisse conieciendum est, quod electissimum & thuri persimile extitit. Huius rei illud maximo est argumento, quod ab ipso Paulo, itemq; Aëtio in suis medicamentis Ammoniacum thymiana hoc est, suffimentum cognominatur, quasi Ammoniacum præstantissimum ita intelligere uoluerint. Ammoniaci meminit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Ammoniacum liquor est ferulæ cuiusdam. Hoc habet emolliendi facultatem intensam, adeo ut & 20 tuncalorum tophos dissoluat, & lienes induratos sanet, & choeradas discutiat.

Ammoniaci consideratio.

Ammoniaci uires ex Gal.

## ΣΑΡΚΟΚΟΛΛΑ. SARCOCOLLA.

## CAP. LXXXIII.

**SARCOCOLLA** lacryma est arboris in Perside nascentis, pollini thuris similis, rufa, gustu amara. Vulnere glutinat, oculorum fluxiones inhibet. emplastris inseritur. Adulteratur admixto gummi.

Sarcocollæ  
consider.

**LACRYMAM** hanc Sarcocollam dixere Græci, quoniam sicuti glutinum lignum, ita hæc sauciatam, coalescatque corporis carnem agglutinet. Quæ autem ad nos aduehitur, non omnis legitima est: quippe quod ea plerumque (ut de alijs quoque pluribus lacrymis, resinis, & liquoribus fieri superius diximus) gummi, & alterius generis lacrymis adulterata deferatur, & talis in officinis inueniatur. Verum fraus gustu facile deprehenditur. quandoquidem quæ amara non est, adulterium sensit. Plinius libro XIII. cap. XI. albam ceteris prætulit, sic inquit. Fit & ex Sarcocolla (ita uocatur arbor) gummi utilissimum pictoribus, ac medicis, simile pollini thuris: & ideo candidum, quam rufum melius. Et lib. XXIII. cap. XIII. idem ita scribit. Sunt qui & Sarcocollam spinæ lacrymam putent, pollini thuris similem, cum quadam acrimonia dulcem. Cum uino tusa sistit fluxiones: illinitur infantibus. Vetsstate & hæc maxime nigrescit. melior quo candidior. hæc Plinius. Qui tamen in Sarcocollæ historia à Dioscoride, & Galeno maxime dissentit, cum hi Sarcocollam gustantibus amaritudinem relinquere asserant, ille uero contra dulcedinem.

Sarcocollæ  
uires ex Arabibus.

Sarcocolla Mauritanis pituitosas cruditates, ac crassos, & glutinosos deiecit humores, præsertim qui in coxæ genum, & coxendicum cavitatibus delitescunt. Cerebrum mundat: item nervos, & pulmones: proinde tussibus, & difficulter spirantibus auxiliatur. Est etiā ex medicamentis, quæ senes iuuant, præcipue pituitosos. Caluescent tamen, qui frequentius ea utuntur. Præstat mirum in modum ad oculorum albugines, nubeculas, cicatrices, & id genus impedimenta, si in cratere uitreo asinino lacte maceretur quinq; diebus: interea tamen nouum lac quotidie est infundendum, priore effuso. Vulneraria præterea penicilla hydromelite prius madefacta, ac inde Sarcocollæ puluere circumlita auribus exulceratis utiliter imponuntur. Cruentis uulneribus, ac diuturnis ulceribus mirifice medetur: quippe quæ proprio suo munere ea à sordibus mundet, carne repleat, cicatriceque obducatur. Alium tardè deiecit, perturbatque eos, quorum uenter bile redundat: quare cauendum est, ne ijs exhibeatur. Roboratur eius deiectionis facultas, quæ giberet, & cardamomo additis. Hæc ex Arabibus deprompsimus, quæ sanè tam antiquis, quam recentioribus incognita fuerunt, utpote qui ea nusquam, quod equidem legerim, scriptis tradiderunt. Sarcocollæ uires retulit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. Sarcocolla lacryma est arboris Persicæ. matiam uim habet ex emplastica quadam substantia, & pauca amara. Itaque citra morsum, desiccatur, ac proinde glutinare uulnera ualet.

Ex Galeno.

## ΓΛΑΥΚΙΟΝ. GLAUCIUM.

## CAP. LXXXIII.

**GLAUCIUM** succus est herbæ, quæ ad Hierapolim Syriæ nascitur, folijs ferè corniculati papaueris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tetri, gustus amari. tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semifrigidis clibanis calfaciunt indigenæ, usque dum flaccescant: deinde coctus succum exprimunt. Cuius est usus ad oculorum medicamenta, utpote cum inter initia refrigeret.

Glaucij  
confideratio.

**GLAUCIUM** medicorum, & officinarum uulgo, qui barbarorum, & Arabum nomina usurpare solet, Serapionis, & Auicennæ modo, Memithe dicitur: Id autem, quo passim seplasiarj utuntur, meo quidem iudicio, uerum syncerumque Glaucium est. Quippe quod omnibus ferè notis, & facultatibus legitimo respondeat. Præter id enim, quod facti periculo, oculorum uitij opitulatur; forissecus rufescit, intus uerò croceo colore spectatur, et gustu amaro sentitur cum quadam graueolentia. tametsi pharmacopolas nonnullos quandoque deprehenderim, qui è maioris chelidonijs succo Glaucium conficiunt. Sed animaduertendum est, quod in Serapionis codice, præter proprium Memithe caput, quod Dioscoridis est Glaucium, legitur. etiam in capite de Curcuma (nisi fortasse interpretis fuerit lapsus) Chelidonium minus uocari Memithe. Quod in Serapione uel interpretis, uel alterius culpa, mendium subsit, inde uix quidem orta est suspicio maxima, quod Dioscorides, cuius uerba ad unguentum refert Serapio, Glaucij non meminisse Chelidonijs. Quo factum est, ut illi seplasiarj deprauata Serapionis lectione decepti, in hunc & alterum errorem inciderint: quod non solum ex chelidonijs suum Glaucium eliciant; sed etiam maius chelidonium minoris loco sumant, quandoquidem illud succum croceum mittat Glaucio similem. Glaucij facultates memorie prodidit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Glaucium adstringit cum quodam fastidio. Tum adeo manifestè refrigerat, ut solum sepe erysipelata, utique si ualentia non fuerint, curare possit. Mistura eius composita est ex aqua terreaque substantia: utraq; sanè frigida, uerum non summe, sed ceu aqua fontana.

Glaucij uires  
ex Galeno.

## ΚΟΛΛΑ. GLUTINUM.

## CAP. LXXXV.

**GLUTINUM**, quod xylocollan, alij taurocollan uocant, præstâtissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis corijs conficitur. Id candidum est, & translucens. Nigrum uerò minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines, leprasque cutis delet: ambustis igni ex aqua calida dilutum, illitumque pustulas erumpere non patitur. Vulneribus prodest melle, aut aceto madefactum.



## Ἰχθυόκολλα. PISCIVM GLVTINVM. CAP. LXXXVI.


*Piscium* gluten, uenter est piscis cetacei. Præstat candicans, natione Ponticum, subaspermum, minimè scabrum, & quod celerrimè liquefcit. Vtile emplastris capitis, & leprarum medicaminibus, & tetanorthis, quæ cutem faciei erugant, & extendunt.

Nemo est, qui taurinum, & piscium Glutinum non cognoscat: quare hac in re non pluribus uerbis opus est. Verum sciendum, quod Glutinum taurinum hac etate non modò è taurinis corijs conficitur; sed ex omnium quadrupedum pellibus. Huius, neq; alterius non reperio meminisse Galenum in simplicium censu. quanquam inibi libro VII. uis glutinis librarij mentionem fecerit, quod ex polline farine, & muria paratur, sic scribens. Gluten, quod ad libros præparant ex similagine, & garo, emplastica, concoctoriaq; facultatis est, quibuscunq; ipsum partibus illinas. Ceterum illud gluten, quod è piscibus fit, inter cætera simplicia Paulus quidem retulit, sed ea tantum ferè de eo scribit, quæ Dioscoridi accepta referri possunt.

## Ἰξός. VISCVM. CAP. LXXXVII.

*Viscum* optimum est recens, intus porraceum, extrà fuluum, quod asperi nihil, aut fursu-rosi conceperit. Fit t̄ acinis in quercu nascentibus, buxæ fruticis folio. Contusum acinum lauât, & postea in aqua decoquunt. Sunt qui commanducando ipsum efficiant. Gignitur quoque in malo, pyro, & plerisque alijs arboribus. quinetiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus.

Emollit discutit, extrahit. parotidas, tubercula, cæterasque collectiones ad maturitatem perducit, cum resina & pari cera mixtum: epinyctidas in splenio sanat: vetera ulcera, abscessusque, quos cacoëthes uocant, ex thure mollit. Lienem cum calce, gagate, aut Asio lapide coctum, & impositum absmit: cum sandaracha, aut auripigmento illitum, ungues extrahit. mixtum cum calce, & uini fece, suam uim intendit.



*Viscum* fit pluribus, ac diuersis modis. Verum omnium præstantissimum est, quod è granis in quercu nascē- tibus conficitur. Huius præter id, quod inualidum in pyris, malisq; nascitur, ingens in Hetruria prouentus. Siquidem intè non modò in quercu laudatissimum prouenit; sed etiam in cerro, ilice, & castanea, in nostris præsertim mariti- nis Senensibus, ubi uastissimæ assurgunt syluæ, quæ non paruo pretio ijs locantur, qui uiscum efficiunt. Scandunt au- tem illi arbores immensas, non sine magno uitæ suæ periculo, sæpiusq; funibus adalligati id muneris in aëre pendent- es decunt. Grana, quæ legerunt, in aqua decoquunt, donec disrumpantur: postea contundunt, & tādū lauunt in aqua, quousq; furfuracea excremēta eximant. Refert Plinius, nasci Viscum in quercu tantum, robore, ilice, syluestri pru- no, berberino, pinu, & abiete. At in Hetruria gignitur etiam in castanea, quod optimum est, malo, ac pyro, non tām syluestri, sed etiam domestico, quanuis penitus inutile. Visci maxima Hetruscis utilitas est: nam præter eius usum in aucupijs, quibus mirum in modum delectantur ob ingentem turdorum copiam, qui autumnii tempore, in syluis quædam ex uniperis arte constructis, eo capiuntur, id etiam in primis utile est uitibus muniendis, ne prima germi- natione ab erucis, quibus omnia scatent, gemmæ deuorentur. Siquidem agricolæ Visco uites omnes circundant, quo postea erodentes uermiculi, qui tam præstantissimo latice insidiantur, è terra sursum petentes, meritò implicantur. Quod cum perspexisset natura omnium rerum parens, uisci multum Hetruriæ largita est, ne hanc ob pestem uino de- ficeretur. Visci fructu uestuntur turdi, præcipuè magni, quos nostri uulgò turdellas appellant. Quorum sterco- re uisci semine pleno inficiuntur, & seruntur arbores, in quibus pernoctant, & uictitant, è quo tandè semine nascitur planta, quæ uiscum creat. Vnde scitè à Plauto dictū est. Turdus exitiū sibi cacat. Ceterum Viscum per se non est ar- bor, sed in arboribus uiuât, fronde plerumq; perpetua. Id quod etiam testatur Virgilius lib. VI. Aeneidis, cum inquit.

Visci confi-  
deratio.

Visci uilitas  
in Hetruria.

Quale

Quale solet syluis brumali frigore Viscum

Fronde uirere noua, quod non sua seminat arbor.

Proinde Plinius lib. xvi. cap. ultimo ita scriptum reliquit. *Quedam enim in terra gigni non possunt, & in arboribus nascuntur. Namque cum suam sedem non habeant, in aliena uiuunt, sicut Viscum. Omnino enim sciam nullo modo nascitur, nec nisi per alium autum redditum, maxime palumbis, & turdis. Hec est natura, ut nisi maturum in uentre autum non proueniat. hęc Plinius. Quę ante ipsum memorie prodidit Theophrastus libro iii. cap. xxi. de plantarum causis, unde illa mutuatus est Plinius. Porro id, quod in pinu, & abiete nascitur, quod (ut Plinius inquit) stelin Eubœa dicit, hiphear Arcadia, frequentissimum in Tridentino agro in uallis Ananę syluis conspiciunt, ubi gens turdellarum copia uicinat. Sed hoc ad aucupia prorsus inutile est: decoctum enim & deinde elotum omnem uit lentorem. Quod autem in pinu, abiete, amygdalo, malo, pyroq; prouenit, perpetua fronde uret. Id uero contra, quod quercui, robori, & castane innascitur, ut pote cia appetente hyeme omnia folia decidant. Huius rei causam retinere tentauit Theophrastus loco paulo ante citato, cum ita scribit. Viscū aliud folio esse perpetuo, aliud deciduo, hoc quaquam absurdum est. Siquidem aliud uirentibus semper arboribus, aliud frondem amittentibus insidet. fit enim, & in his careat alimento, in illis habeat, quantum abunde sit. Causa enim perpetue, deciduę uero frondis hęc est, quę et modum diximus. hactenus Theophrastus. Verim enumeratio hęc Theophrasti sententia non omni ex parte probata uidetur. quippe quoniam uniuersum Viscum, quod in amygdalo, pyro, maloq; in Italia prouenit, tam æstate, quam hyeme fronde perpetua uiret, cum tamen he arbores hyeme frondibus destituantur. Quo fit, ut aliunde huius rei causam petendam existimem. Fit præterea Viscum auculis tantum capiendis commendatum, in Syria ex myrs, quę Aphris Sebestena dicuntur, ut libro primo in prunorum mentione de ijs differentes retulimus. Utuntur hoc insubres suis in aucupijs, quod arboreo uisco careant, illudq; Venetijs deferunt, quod primum ex Damasco Syrię aduehit: unde Damascenum uocatur. Sed id querno bonitate cedit. Fit quoq; Viscum ē quarundam arborum radicibus, agrofilijs præsertim, & uiberni, quarum etiam arborum historiam libro primo palucri, & rhois commentarijs inferimus. Qui autem ex huiusmodi arboribus uiscum conficiunt, cortices radicum sumunt, effossaq; scrobe inter suarum arborum frondes humido solo sepeliunt, ibiq; tanto tempore dimittunt, quoad computrescant: mox eximunt, & tandiu in pala contundunt, donec lentorem concipiant: deinde aqua calida lauant, & manibus commiscunt. Hęc etiam ratione quibusdam in locis fit ex ibisci radicibus. Sunt qui querni uisci lignum in tenuissimum puluerem redigunt, & comitalibus hauriendum præbeant. quo tantum medicamento multos fuisse sanatos pro certo affirmant. Sed noua ego complures morbi, & medicamenti prorsus ignaros, qui ligni loco Viscum ipsum in catapotijs deuorandum dederunt.*

Theophrasti  
sententia non  
accepta.

Visci uires ex  
Galeno.

Visci meminit Galenus libro vi. simp. med. ubi de eius uiribus differit ijs uerbis. Viscum ex plurima aërea, &

#### APARINE.



Aparines con  
sideratio.

quea calida, paucissima terrena substantia constat. Nam armonia in eo anaritudinem excellit. Itaq; etiam affectus substantie respondent. Siquidem ualenter ex alto humores extrahit, nec eos tantum tenues, sed & crassiores, eosq; diffundit, ac digerit. Est autem ex eorum genere, quę non protinus post primam appositionem excalfaciunt, sed quę tēpus requirunt, uelut thepsia. Sed & supra commonuimus, inesse calidis facultate medicamentis, ubi longum continent humorum recrementum.

† Nulla hic in Græcis codicibus fit acinorum mētio, sed hęc tantum leguntur. *ἡ ἁπάρνη ἐκ τῶν κατὰ πρὸν περιστερῶν.* hoc est. Fit ex quodam fructu rotundo. Cui etiam lectioni ascribitur Serapio. Sed interpretes iudicantur secutus Plinium, qui lib. xvi. cap. ultimo sic inquit. Viscum fit ex acinis, qui colliguntur mesium tempore immaturi.

*ἡ ἁπάρνη ἐκ τῶν κατὰ πρὸν περιστερῶν.*  
A. P. A. R. I. N. E.  
CAP. LXXXVII.

APARINE ramis multis, & paruis fruticat, asperis, quadrangulis, per interualla orbiculato foliorum ambitu, ut in rubia: flos albus: semen durum, rotundum, concavum, album, umbilici figura, asperitate uestium tenaci. Ea pastores coli uice utuntur ad erimendos elacte pilos. Seminis, caulium, ac foliorum succus, potu contra uiperarum, phalangiorumque morsus auxiliatur: infusu aurium dolori medetur. Herba cum axungia trita, strumas discutit.

APARINE nusquam non prouenit, sed præsertim (ut Theophrastus inquit) inter lentas. Itali hanc uulgo uocant Spe ronella, quod folia circa caulem ad calcæum stimuli modum, asperis

desicci in lar prostrat. Tactu hæc asperissima est, quapropter cum adoleuerit, attingentium uestibus pertinaciter  
tere. Huius succum magnificiunt quidam ad recentia uulnera glutinanda, & ad papillarum tumas. Aparines  
perit Galenus lib. v. i. simplicium medicamentorum, ubi sic breuiter inquit. Aparine, quidam phylanthropon, alij  
apocarpum cognominant, modice extergit, & desiccatur: habetq; nonnihil subtilium partium.

Aparines ui-  
res ex Gal.

ΑΛΥΣΣΟΥ.

ALYSSUM.

CAP. LXXXIX.

*Allyssum in ingob. & uenit*

ALYSSON exiguus frutex est, uniuersalis, subasper, rotundis folijs: fructu dupliciū scutorum  
effigie, in quo est semen quadantenus latum. In montibus, & asperis locis emicat. Eius decoctū  
singulus sine febre, potu discutit: idem efficit, si quis eam aut teneat, aut odoretur. cum melle tri-  
ta uita cutis in facie, & lentigines emendat. Contusa in edulio rabiei canis mederi putatur. domi-  
bus appensa salutaris esse creditur, & hominibus, atque brutis fascini amuletum. Purpureo lin-  
neo circumligata, pecorum morbos abigit.

ALYSSI uaria est apud auctores historia. Nam si Plinio est adhibenda fides, Alyssum ea planè fuerit herba,  
quæ Rubiam minorem uocamus, quæ quidem, præterquam quod folia ferat longè minora, prorsus Rubiæ similis cõ-  
stat. Quod autem Plinio hæc Alysson sit, eius uerba declarant libro xxiiii. cap. xi. ubi de erythrodano ita scribit.  
Erythrodanus, quam aliqui erythrodanum uocant, nos Rubiam, qua tinguntur lane, pellesq; perficiuntur, in medi-  
cis utrimque ciet. Morbum regium sanat ex aqua mulsæ: & lichenas, ex aceto illita: & ischiadicos, & paralyticos,  
ita ut bibentes lauentur quotidie. Radix, semenq; trahunt menses, alui sistunt, & collectiones discutunt. Contra ser-  
pentes rami cum folijs imponuntur. Folia et capillum tingunt. Inuenio apud quosdā morbum regium sanari hoc fru-  
tice, etiā si adalligatus spectetur tantum. Distat ab eo, qui Alysson uocatur, folijs tantum, & ramis minoribus. Quip-  
pe nomen accepit, quod à cane emorsos rabiem sentire non patitur, potius ex aceto, adalligatusq;: hætenus Plinius.  
Quem facile quis suspicari posset, Dioscoridis Alyssum reddidisse, eo ductus argumento, quod is statim post aparinē,  
quæ rubiæ similem fecit, Alyssum descripsit: nisi omnibus serè notis hoc à rubia minore differre perspicuum esset.  
Siquidem Dioscoridi Alyssum folijs est rotundis, fructu dupliciū scutorum effigie, in quo semen quadantenus latum:  
in montibus, & asperis locis nascitur. Quæ sanè omnia in minori Rubia desiderantur. Quod præterea Dioscoridi,  
et Plinio, Rubia minor non sit Alyssum, ex eo aperte cognoscitur, quod is infra de maiori, & minori Rubia, eodem  
capite tractauerit. Id quod minime quidem fecisset, si nullam iudicasset inter minorem rubiam, & Alyssum interce-  
dere differentiam. Quare uel Plinium hac in re hallucinatum, uel diuersum à Dioscoride Alyssum accepisse credider-

Alyssi confi-  
deratio.

Porro magis adhuc Alyssi historiam ea confundere mihi uidentur, quæ de eo posteritatis memorie prodidit  
Aëtius, cum inquit. Alyssum eam herbam esse aiunt, quam Heracleā syderitum uocant, quæ propter uias ubiq; nasci-  
tur, purpureo flore, folijs crassioribus. Nomen traxit, quod à cane rabido emorsus mirum in modum opituletur. His  
uerbis Aëtius non solum non referre Dioscoridis Alyssum deprehenditur; sed neq; etiam satis exprimere, quam syde-  
ritum pro Alyssum intelligat. Nam cum tres sint syderites à Dioscoride monstratæ, quarum duæ, prima scilicet, & ul-  
tima, heracleæ uocantur, non equidem scire possum, an primam, uel ultimam in suum Alyssum receperit Aëtius. Flo-  
rem siquidem purpureum habet syderitis Dioscoridi postrema, in uineis, & macerij nascens; folium tamen non cras-  
sum, sed tenue, coriandri modo, in ambitu laciniatum, ut eam planè referat plantam, quam uulgius herbariorum Ru-  
bertum appellat. Hæc postremo, ut alij quoq; non consentiunt quæ de Alyssum retulit Galenus libro ii. de antidotis,  
ubi nonnulla Asclepiadis medicamenta ad rabidi canis morsus commemorat. Alyssum, inquit, herba est marrubio ad-

421

451

similis, asperior tamen, & magis aculeata circa orbiculos: florem ad cæruleum uergentem profert. Hanc sub cani-  
cule estu colligere oportet: excucata contundi, cribrari, & seruari debet, ne diffusetur. Ex his Galeni uerbis palam  
est, Alyssum ab eo ex Asclepiade descriptum, potius primam, quam ultimam syderitum referre. Cum igitur uaria  
modum sit de Alyssum auctorum sententia, cumq; eius historia tam uaria, incertaq; babeatur, difficile quidem fuerit  
asserere, quænam planta Alyssum legitime uocari possit. Ruellius tamen eam plantam, quam herbarij (ut ipse ait)  
plustrem cannabinam uocant, putat esse Dioscoridis Alyssum, uel ad ipsum propius accedere. Quod, ne semper alio-  
rum errata corrigere uidear, ijs diiudicandum relinquo, qui in simplicium historia etiam mediocriter uersati, hæc &  
maiora diiudicare possunt. Ceterum Alyssum à Galeno ex Asclepiade representatum, in Italia provenire non equi-  
tum iudicatur, neq; illud similiter, cuius meminit Aëtius. Sed quod horum in usu medico probandum, uel reprobandum  
se, non facile decernere ausim. quanquam à Galeno nunquam discedendum putauerim. Qui præterea Alyssi facultate-  
ut tradidit lib. v. i. simplicium medicamentorum, his uerbis. Nuncupata est hæc herba Alysson, quod mirifice iuuat  
emorsos à cane rabido. Sed & rabienti quoq; data, sepe in totum sanauit: atq; hoc ex totius substantiæ similitudine  
efficit. Dictumq; prius est talem facultatem ex sola percipi experientia, & planè nulla constare metodo. Quod si  
quis ad multa experietur, cognoscet facultatem habere mediocriter siccificam, & digerentem, cum hoc ut absterfo-  
rum nonnihil etiam obtineat. Hac ratione & uiriliginem, & maculas faciei à sole prognatas expurgat.

Ruellij error.

Alyssi uires  
ex Galeno.

ΑΣΚΛΗΠΙΑΣ.

ASCLEPIAS.

CAP. XC.

*Asclepias in ingob. & uenit*

ASCLEPIAS, ramos emittit longos: folia hederæ, longa: radices numerosas, tenues, odora-  
tas: floris uirus graue: semen securidacæ. nascitur in montibus. Radices ex uino potæ tormini-  
bus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia aduersus vuluæ, mammarumq; ulcera, quæ ca-  
coëthe uocant, illinuntur.

Asclepiadis  
consider.  
Quorundam  
lapis.

Hedera  
terrestis  
infra 513

Fuch. error.

FALLUNTUR, mea quidem sententia, qui Asclepiadis uice, quam in montibus nasci tradidit Dioscorides, non etiam Plinius, eam herbam accipiunt, quam uulgares quidam chirurgici hederā terrestrem nominantque Pieris secus uias nascitur, et perpetuo humi serpit folijs rotundis, asperis, per ambitum quadantenus serratis, longo et funiculo appensis: floribus exiguis in purpura albicantibus: radicibus tenuissimis. Siquidem praterquam quod Dioscorides scriptum non reliquit Asclepiada in uis publicis nasci, nusquam etiam, quod legerim, prodidit eandem in longo repere tractu, et folia rotunda proferre. Nec minus etiam, ut equidem arbitror, ballucinantur ij (per meum Fuchsij cruditissimi dixerim, quem constat ex suis commentarijs hanc habuisse sententiam) qui putant Asclepiada eam esse plantam, quam uulgius herbariorum Vincetoxicum uocat. quæ frequenter in saxosis, et asperis locis prouenit, læui admodum caule: folijs lauro acutioribus: flore albo, muscoso: corniculis tenuibus, oblongis: radicibus innumeris, albicantibus. Quandoquidem huius cùm folia, tum radices nullo odore commendantur: flores uisus aliquid non redolent: semen non est securidace simile. Adde etiam, quod ex Oribasijs lectione Asclepias non proferit folia longa. cui subscripsit Marcellus interpres, fretus fortasse, ut solet, probatissimis exemplaribus. Præterea antiquissima codex manu scriptus de radicibus non legit ωλλας, hoc est, multas, sed tantum λεωτας, εὐώδες, id est, tenues, odoratas. Sunt tamen qui Vincetoxicum hoc uenenis maxime aduersari scribant: quin et fractis, et ab alio deuotis auxiliari, si contritæ in puluerem radices ex uino sumantur. Has præterea laudibus effertunt ad mammæ a parturientes, præsertim ubi lac in eis coierit: in quorum usu radices ipsas decoquunt, quas deinde cum potentia mellea illiunt. Sed perperam, quod hoc Asclepiadis sit proprium. Ceterum non desunt, qui illam humi repentem herbam, de qua antea diximus, pluribus celebrent facultatibus, præsertim ad thoracis, et intestinorum uulnera. quæ uero potiones ex ea magna opinione faciunt, et succum eius in unguentis admiscunt: namq; uulneraria est, et glutinosa. Asclepiadis meminit quidem Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, sed nihil de eius uiribus differens, ac sic tantum inquit. In tertio Dioscorides de hac herba conscripsit. at nos eius nondum periculum fecimus.

Ατρεακτυλῖς.

ATRACTYLIS.

CAP. XCI.

ATRACTYLIS, spina est cnico similis, folia multo longiora ferens in summis uirgis, magna parte nuda, asperaque, qua feminae pro fusis utuntur. capitula in cacumine spinis horrent: flos leuissimus, quibusdam in locis purpureus inuenitur: radix tenuis, superuacua. Coma, semen, & folia cum pipere, & uino teruntur utilissimè contra scorpionum ictus. Percussos tradunt, quandiu teneatur herba, nullum experiri dolorem, ipsumque deposita statim recrudescere.

Atractylidis  
consider.

Ruel. & Hermolai error.

ERRANT haud dubie, ut mea quidem fert opinio, Ruellius, et Hermolaus: quippe qui existimauerint Atractylida esse Cnicum sylvestrem, cuius primo loco meminit Theophrastus libro vi. cap. iiii. de plantarum historia. Siquidem magnam ego inter sylvestrem Cnicum, et Atractylida inuenio apud Theophrastum esse differentiam. Quod ut omnibus perspicuum esse possit, ijs præsertim, qui aliter sentiunt, hic Theophrasti uerba de Cnico, Acarna, et Atractylide subiiciam. Cnicum, inquit, sylvestri, urbanoque discernitur. Sylvestris genera duo notantur: alterum urbano admodum simile, recticaule tamen: quamobrem eo mulierum priscarum nonnullæ pro colu utebantur. fructus nigrum, maiusculum, amarumque parit. Alterum genus densum constat, caulesque soncheos proferit, quodammodo bemicale fit: nam propter foliorum mollitiam declinatur, procumbitque ad arua. fructum amarum, frequentem, barbaque modo hirsutum gignit. Sunt ambo seminosa, uerum sylvestre copiosius fert. Eius peculiare præ alijs syluestribus est, quod illa duriora, spinosioraque urbanis proueniunt: hoc autem mollius, ac læuius constat. Acarna quoad simplicem ratione exprimi licet, aspectu cnico urbano similis est, colore flauicans, succo pinguis. Fusus agrestis (sic enim et Atractylida Latini nominauerunt) his candidior est: habetque peculiare, quod in folijs euenit. decerpta enim, eamque delata, succum sanguineum effundunt: qua de causa φόνος, id est, cruor à quibusdam spina hæc est nominata. grauis etiam odore, cruoremque representans. Serò perficit fructum, autumno enim. et quidem in totum (ut summam proponam) uniuersa spinaceorum natura fructus serotina existit. hæc Theophrastus. Ex quibus uerbis facile cognosci potest, in Atractylidis historia aperte aberrasse Ruellium, cum in tertio suo de natura stirpium libro asseruit, Fusum agrestem, hoc est Atractylida, nil aliud esse Theophrasto, quam primum Cnici sylvestris genus. utpote qui non cum maduerit, quod Atractylis Theophrasto alia est à Cnico sylvestri planta: quanquam illi fortasse non absimile, et cui ea tantum insit proprietas, ut è folijs succum sanguineum fundat: id quod nullo Cnici generi tribuitur. Errant autem occasione, meo quidem iudicio, præbuit Plinius, quod libro xxi. cap. xv. sylvestrem Cnicum à quibusdam Atractylida uocari tradiderit. Vbi postquam commemorasset nonnullas spinosas plantas, quibus Aegyptij in cibis utuntur, de Cnico tandem in hunc modum differuit. Multas præterea, inquit, ignobiles habent plantas. Sed maxime celebrant Cnicon Italiae ignotam, ipsis autem oleo, non cibo gratam. Hoc faciunt ex semine eius. Differentia prima syluestris, et sativæ. Syluestrium duæ species, una mitior est, simili caule, tamen rigido, exilis. Itaque et pro colu antiquæ mulieres utebantur. quam quidam atractylida uocant. Semen eius candidum, et grande, amarum. Altera hirsutior, pro flore caule, et qui penè humi serpat, minuto semine. hæc Plinij uerba. Quæ etsi quidem certam fidem faciunt, præmum syluestris Cnici genus à quibusdam Atractylida fuisse uocatum; non tamen propterea affirmant Atractylidem esse Cnicum sylvestrem. Atractylidis deinceps speciatim meminit ipse Plinius cap. xv. eiusdem libri, cum inquit. Acarna colore tantum rufum (à scolymo scilicet) distinguitur, et pinguiore succo. Idem erat Atractylis quoque, nisi candidior esset, et nisi sanguineum succum funderet, qua de causa φόνος uocatur à quibusdam. Odore etiam grauis, serò maturescente semine, nec ante autumnum. quanquam id de omnibus spinosis dici possit. hæc tamen Plinius. Ex ijs

in cunctis merito colligendum esse putauerim, legitimam Atractylidem nullum esse sylvestris Cnici genus, sed aliam per se plantam, nempe illam, qua pro fusis priscæ utebantur mulieres. Quod sanè animaduertens Theodorus sui Græci idiomatis peritissimus in Theophrasti uersione, Atractylida fusum agrestem interpretatur, non autem colum, ut prius agrestis Cnici genus uertendo, ex antiquo ad colos usu, id Colum agrestem rectè cognominari posse monstrauit. Quam in re is plane declarasse uidetur, priscas mulieres agresti Cnico coli uice fuisse usas, fusorum uero loco ipsa tantum Atractyli. Ceterum hactenus in Italia, ut ingenue fatear, Atractylida non inueni, neq; eam ab aliquo repertam esse scio. quamvis non iure inficias, quin ea possit etiam in Italia nasci. Equidem plures uidi plantas aculeis horrentes, quæ illis notis pulchre respondebant: attamen ex ijs nullam unquam nactus sum, quæ folijs carni adhibitis sanguineum succum funderet. Credidit Ruellius alteram Cnici sylvestris speciem eam nimirum esse stirpem, quam herbariorum uulgus Carduum benedictum, uel sanctum appellat. Quam profecto opinionem haud quaquam improbandam puto. quoniam quidem Carduus benedictus uocatus solo procumbit densa foliorum coma, et quodammodo humicaulis cernitur. Quinetiam fructum gignit amarum, barbæq; modo hirsutum: et caules profert sonchi modo rubentes. Ut ex ijs notis accuratius expensis, quibus prorsus conuenit Carduo benedicto cum altero Cnici sylvestris genere, nil mirum si cogor mutare sententiam, et hoc quod aliàs negaueram, nunc plane asserere non dubitem. Sed certè Ruellium mirari sibi, quod tam facile asseruerit Carduum benedictum uocatum sanguinem ex se fundere. Nam etsi ego milles periculum fecerim; nunquam tamen euulso folio, uel ramulo sanguinem è uulnere profluere comperi. Præterea si concedamus, quod Ruellius uera referat, id maxime ipsius repugnabit sententiæ, cum tam Theophrasto, quam Plinio nullum Cnici genus sanguinem fundat: quoniã id Atractylidis est proprium. Hinc itaq; palam fieri arbitror, Ruellium, alioqui doctissimum, turpiter confudisse Atractylidis historiam. Quippe si, ut suam tueretur sententiam, asserere uoluisset, Atractylida esse primum sylvestris Cnici genus, illud quidem succum fundere sanguinis instar scribere debuisset, non autem hoc, quod Carduum benedictum esse censemus. Neq; etiam mihi, ut liberè liceat quod quisq; sentit dicere, placet Fuchsij opinio. qui libro primo de compositione medicamentorum, et in suis de plantarum historia commentarijs, Carduum benedictum uulgò nominatum Atractylidem hirsutiorem esse existimat. hirsutiorem dixi, quoniã is duas esse constituit Atractylidis species, nempe muiorem alteram, alteram hirsutiorem: tametsi tum Dioscoridi, tum Theophrasto Atractylis unum duntaxat sit genus. quod, quantum reor, Carduus benedictus nō est. Siquidem hic nec sanguineum succum fundit, nec in summis uirgis unquam uisitur nudus: quinimò uirgas non profert, sed caules lætos, quibus humi ferè reptat, uel potius solo procumbit. Sed postquam in hac nostra Atractylidis, et Cnicorum syluestriam disquisitione, sermo incidit de Carduo benedicto, non ab re hic de miris eius atq; excellentibus dotibus nobis discendum est. Est igitur CARDVVS Benedictus ita uulgò nuncupatus, planta nullis hoc tempore non cognita. Sèrius tamen in hortis, sapore admodum amaro, quod terreis constet partibus calore quodam attenuatis. Magni nominis, magnæq; estimationis planta est non modò apud Italos; sed etiam apud exterarum nationes, præsertim contra pestilentiam: item aduersus uenena lethalia, tam interius sumpta, quam uenenosorum animalium ictibus, aut moribus imposita. Sanantur hac herba quartana laborantes, aut alijs febribus detenti, quarum accessiones cum frigore adueniunt. Id enim præstat hausto eius decocto, aut stillatitia aqua, aut pulueris drachma pota. Præstant eadem comitialibus insaniensibus eodem modo bibita. Herbe decoctum ex uino sumptum illum, et rensum dolores mulcet, et cætera uentris tormina sedat: sudorem cit, alui tinea necat, et uteri uirgæ auxiliatur. Herba ipsa tam recens, quam secca et pota, et exterius admota, contumacia ulcera, et quæ cacoëthe uocantur, sanat, cuteq; obducit. Quamobrem decoctis miscetur, quæ è ligno Guaiaco ex uino, et aqua ijs parantur, quos lues Gallica corripuit.

Ruel. lapsus.

Fuchsij opin.  
reprobata.Cardui bene-  
dicti uires.

## ΠΟΛΥΚΝΗΜΟΝ. POLYCNEMVM. CAP. XCII.

POLYCNEMON, frutex est furculosus, folijs origani: caule, ut pulegij, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui tamen in cacumine corymbo, boni odoris, & acris. Vulneribus agglutinandis recens, aut aridum, cum aqua efficaciter illinitur: sed quinto die solui debet. ad urinæ stillicidia, ruptaque cum uino bibitur.

POLYCNEMVM hactenus, quod equidem ipsum cognouerim, non reperi, neq; uidi in Italia. Ceterum etsi mihi nonnullæ inueniantur, atque etiam à quibusdam pro eo ostendantur plantæ, quæ aliquibus notis Polycnemum quadantenus referre uidentur; cion tamen plura etiam ijs desint, quæ in Polycnemo requiruntur, quam ut pro uero probari possint, non equidem quicquam in hoc certi statuere ausim. Vnde satius ipsum inter alias ignotas plantas collocandum esse duxerim, donec aliud certius compertum fuerit. Sed si quis interim Polycnemi uires ex Galeno quoque scire desiderat, is libro VIII. simplicium medicamentorum illas ita paucis retulit. Polycnemon desiccatur, et excalfaciit secundo excessu. Itaque et ob id uulnera glutinat.


Polycnemi  
consider.Vires ex Ga-  
leno.

## ΚΛΙΝΟΠΟΔΙΟΝ. CLINOPODIVM. CAP. XCIII.

CLINOPODION frutex est folijs serpyllo similis, furculosus, duum dodrantum altitudinis. Nascitur in petrosis. Flores, marrubij modo, ex interuallis distincti speciem lecti pedum præbent. Bibitur herba, & succi eius decoctum, ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus: menies, & partus pellit: & penfiles uerrucas, quas acrochordonas uocant, eiicit, aliquot diebus potum.



## CLINOPODIVM.

Clinopodij  
confider.Clinopodij  
facultas ex  
Galeno.Leontopetali  
confider.

## LEONTOPETALVM.

Leontopetali  
uires ex Gal.Teucrij con-  
sideratio.

potum. Alnum sifitit decoctum ad tertias, potumque, si febrim sentiunt, ex aqua; alioquin, ex uino.

**CLINOPODION**. nil aliud nobis designat, quam leu-  
ce pedem, quod circinata florum figura, qui intercedentibus in-  
terstitijs caulem circumplectuntur, basin leuice pedum refe-  
rat. Nascitur ubiq; frequens, folijs non modo serpyllo proxi-  
mis; sed etiam montane calaninthe, quam maxime represen-  
tat. Huius meminit Galenus libro VII. simplicium medicame-  
torum, sic inquit. Clinopodium excafaciendi uim obtinet, sed  
nondum adurendi: est uero etiam essentia tenuium partium: po-  
natq; ipsum quissiam in tertio ordine tum excafacientium, tum  
resiccantium.

## ΛΕΟΝΤΟΠΕΤΑΛΟΝ. LEONTOPETALVM.

CAP. XCIII.

Leontopetalum

**LEONTOPETALON**, caulem emittit dodran-  
talem; aut altiozem, plurimis alis concuum, & in ca-  
cumine semina parua duo, aut tria, in siliquis, ciceris  
modo: flores anemonæ similes, puniceæ coloris: fo-  
lia brassicæ, sed papaueris diuifura: radicibus nigris,  
rapæ similibus, strumosis. Nascitur in aruis, & sege-  
tibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus, ex uino  
pota: nec alia res celerius dolorem finit, miscetur  
ischiadicatorum clysteribus.

**LEONTOPETALVM**, eiusq; nigram, extuberan-  
temq; radicem, rapi instar magnitudine, non modo Venetijs, &  
Patauij in quibusdam hortis uidimus; uerum etiam in Hetrurie  
aruis, alijsq; Italie locis. Nascitur frequens in Apulia. Leon-  
topetali meminit Plinius lib. XXVII. cap. XI. ubi ipsum ijs depin-  
git uerbis. Leontopetalon, alij rhapecion uocant, folio brassicæ,  
caule semipedali, alæ multæ, semen in cacumine in siliquis cice-  
ris modo. radix rapæ similis, grandis, nigra. nascitur in aruis.

Leontopetali facultates paucis perstrinxit Galenus lib. VII.  
simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Leontopetali rade-  
ce maxime utimur. Digerendi facultatem, & exiccandi, exca-  
faciendiq; in tertio ordine possidet.

## ΤΕΥΚΡΙΟΝ. TEUCRIVM.

CAP. XCV.

Teucrium


**TEUCRION**, siue, ut alijs placet, teucriis, herba  
est uirgæ referens effigiem, triflaginis similitudine, te-  
nuifolio, non multum à cicere alieno. Hæc in Cilicia  
iuxta Gentiadem, Cissademque ubertim provenit.

Recens cum posca, aut aridæ feruifacæ ius potu lie-  
nem potenter absumit. Lienosis cum aceto, & fisis  
illinitur: item serpentium moribus ex aceto solo  
sine fisis.

**HERBA** quedam nascitur pluribus in locis, folijs quidem  
ciceris, sed caule, & facie triflagini adeo similis, ut sepe extem-  
pore uisa oculos decipiat. Hanc esse uerum Teucrium mecum  
semper existinaui, quod ea mihi planè notis respondere uide-  
tur, quas Dioscorides Teucrio reddidit. Qui tamen scribat  
ubertim nasci Teucrium in Cilicia iuxta Gentiadem, & Ciss-  
adem; id tamen nihil impedit, quin & in Italia provenire queat.  
Plinio duo Teucrij produntur genera libro XXV. cap. V. ubi ita  
scriptum

scriptum

## TEUCRIVM.



TRISSAGO.



scriptum reliquit. Inuenit & Teucer eadem etate Teucrion, quam quidam bermion uocant, spargentem iuncos tenues, folia parua, asperis nascentem, austero sapore, nunquam florentem. neq; semen gignit. Medetur lienibus. Constatq; sic inuentam. Cum exta super eam proiecta essent, fertur adhæsisse lieni, eumq; exinanisse. ob id à quibusdam splenion uocatur. Narrant sues, qui radicem eius edunt, sine splene inueniri. Quidam ramis hirsuti plantam, surculosam, folio fabæ, eodem nomine appellant. Et colligi florentem adhuc iubent, adeo florere non dubitant, maximeq; ex Cilicijs, & Pisidiæ montibus laudant. hæc Plinius. Ceterum non desunt, qui putent alterum Plinio Teucrium eam esse plantam, quæ Italis uulgari sermone uocatur Fæua grassa. quanquam hanc alij falso, ut opinor, Telephium esse contendunt. Teucrij uires descripsit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Teucrium incidentis, & tenuium partium facultatis est: quare lienes sanat. Ponatq; ipsam quissiam in tertio exiccantium, secundo uerò excalfacientium ordine.

Teucrij uires  
ex Gal.

## Χαμαίδρυς. TRISSAGO. CAP. XCVL.

CHAMÆDRYS Græcis, alijs chamædrops, Latinis trissago dicitur. Sunt qui eam teucrion appellauere, propter eam quam cum teucrio seruat similitudinem. Nascitur in petrosis, & asperis. Frutex est dodrantalis, folia habens exigua, amara, effigie & diuisura quercus: flore paruo, penè purpureo. Carpitur semine prægnans. Recens in aqua decocta, potu tussibus, indurato lieni, urinæ difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliatur: cit menses, partus extrahit: lienem ex aceto pota consumit: aduersus serpentium uenena ex uino, potu, illituque efficacissima. Trita digeritur in pastillos, ad supradicta. purgat uetera ulcera, cum melle: cum oleo illita, caliginem oculorum discutit. natura eius est calfacere.

CHAMÆDRYS herba est uulgaris notitie. In Hetruria, Senensibus præsertim, uulgò appellatur Querciuola. Quo nomine Græcos imitati uidentur, quibus nil aliud per Chamædryn significatur, quam humilis, & terrestris quercus. Insubribus uerò uulgò Calamandrina uocatur. Alijs herba februm, uel Febrifuga dicitur, eo quod epoto eius decocto diebus aliquot tertianas fuget, & finiat. Magnificiuit Chamædryn Hetrusci, quod (ut affirmant ij, qui rem hanc experimento comprobauerunt) ieiunij acetarij modo sumpta, pestilentiam arceat, nō minus quam scordii planta ei cognata. Ceterum quanuis Dioscorides, alijsq; ueteres unius tantum, quod extet, Chamædryos meminerint; tamen Fuchsius quatuor eius genera depinxit. De Chamædry, siue Trissagine differat Theophrastus libro IX. cap. X. de plantarum historia, ubi ita scriptum reliquit. Trissaginis folia ad rupta, & uulnera, in oleo trita ualent, & ad depascentia ulcera. Semen bilem extrahit, & oculis quoq; beneficum est. Folium ad albugines tritum, in oleo prodest. Habet hæc herba folia quercus: & statura uix palmum excedit: & odorata, atque suauis est. Sed partes quidem omnes herbe eiusdem minime ad idem utiles fore, haudquicquam absurdum fortasse appareat. Radicis uerò eiusdem partem unam superius, alteram inferius purgare mirabilis sit, ut thapsia, & ischadis, quam alij Apion appellant. hæc Theophrastus. Quibus mirum nulli esse debet, quod Chamædry tertiana correptos liberet: siquidem ea, Theophrastus

Chamædryos  
consideratio.  
& lym. baryngal.

Chamedrys  
uires ex Gal.

sto autore, bilem deiecit. Trissaginis uires memorie prodidit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Chamedrys uincens habet qualitatem amarum, & est quodammodo acris. Quocirca meruo lena colligat, & urinas, ac menses prouocat, & astutudinem humorum incidit, & uiscerum obstructions expurga. Ponatq; eam quispian in tertio ordine excalfacientium, & desiccantium: plus tamen desiccet, quam calfaci.

Λευκάς. LEUCAS.

CAP. XCVII.

LEUCAS montana, latioribus quam urbana folijs, semine acriore, amariore, ori ingrato. efficacior tamen quam satiuua habetur. Vtraque ex uino contra animalium uenena, præcipue marinorum, opitulatur.

Leucadis con  
sideratio.


TAMETSI Hermolaus, & Ruellius contendunt scriptis testatum relinquere, herbam quandam in uicinis nascentem mercuriali congenerem, esse Leucada; ego tamen eam mercuriali consimilem facere profecto non astra, cum nullum hactenus ex rei herbarie autoribus inuenerim, qui eius faciem repræsentet, pluraq; de eius notis ita, quam fecerit Dioscorides, qui certe, quantum extat, nullis prorsus notis ipsam descripsit. Ceterum recte, meo quidem iudicio, putat Marcellus Florentinus huic Leucadis capiti decurtatum esse principium. Id quod nobis indicetur detur ipsius Dioscoridis sermo: nam cum statim ab ipso capitis initio montanam Leucada urbanæ comparauerit, rurum ostendit à se prius urbanam fuisse descriptam. Neq; hac de causa tantum adducor, ut Marcello adstriperet, sed quia etiam se habuisse testatur Latinum Dioscoridis codicem uetustissimum, in quo initium huius capitis ita legebatur. Leucæ duo sunt genera, una est montana, & altera hortiana. Montana latiore quam satiuua folio est &c. Quæ omnia maximo sunt argumento, quod hoc in loco Dioscoridis codices sint deprauati, quodq; in ijs plura adhuc desiderantur, quæ faciunt ad perfectam huius plantæ historiam.

Λύχνις. LYCHNIS.

Ingulbrant

CAP. XCVIII.

Lychnidis cō  
sideratio.




LYCHNIS coronaria, flore est albæ uiolæ simili, sed purpureo. quo corollæ factitantur. Contra scorpionum ictus semen in uino potum auxiliatur. Lychnis syluestris, omnia urbanæ similis. Bilem per aluum detrahit, semine duabus drachmis. potu. ictus à scorpione subuenit. Aiunt huius herbæ appositum scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

QUANQUAM non facile est hac ætate plantas in Italia ostendere, quæ legitime referant utraq; Lychnidem, hortensem scilicet, & syluestrem, cum earum folia, & caules tam à Dioscoride, quam ab alijs rei herbarie scriptoribus, quod inuenerim, nullis prorsus repræsententur notis, ut potè plantarum, quæ fortasse olim omnibus erant notissimæ ob frequentem earum usum tum ad lucernarum lumina, tum etiam ad coronas contendas; ætamen in Tridentino, & Goritienfi agro planta quedam in hortis, ac fictilibus seritur, coronis necandis accommodata, quam equidem non dubitauerim pro legitima Lychnide in medium offerre. Siquidem flore exit purpureo, albæ uiolæ simili: folijs longis, tomentosis, albicantibusq;: caule lanuginoso, cubito maiore, in cuius cacumine flos emicat, ut dixi, purpureus, inodorus tamen. Quod præterea planta hæc uerè sit Lychnis coronaria, illud mihi fidem auget, faciūq;: ut in hoc nihil ferè addubitem, quod alteram eiusdem generis frequentissimam apud Ananienfes syluestrem repperim, illi satiuæ adeo per omnia similem, ut cum natalis taxat discrimen intercedat, hæc merito Lychnis syluestris appellari queat. His accedunt tomentosa earum folia, quæ ad lucernarum usum pro ellychnio commodè usurpari possunt. Vnde apud ueteres Lychnidis sibi nomen ascriuit. quippe lucerna Græcis

λύχνος dicitur, quemadmodum et ἐλλύχνιον funiculus, qui è gossipio nobis hoc æuo paratur, lucernusq; inseritur ad lumen edendum, flammamq; nutriendam. Quare cum gossipio, ut puto, carerent antiqui, tomentosis herbis uterentur, quædam folijs ad hoc munus obeundum utebantur, nempe lychnidis, uerbasci, aliarumq; nonnullis. Illud deniq; ætatem, ut nostra melius firmetur opinio, quod flos plantarum, quas Lychnides esse opinor, mirum in modum ruralibus, urbanisq; uirginibus expetitur ad coronas factitandas: qua in re prisca imitantur ætatem. Ceterum Plinius lib. XXI. cap. IIII. Lychnidem inter rosas retulit, sic inquit. Est & rosa, quæ Græca appellatur à nostris, à Græcis uero Lychnis, non nisi in humidis locis proueniens, nec unquam excedens quinque folia, uolæ magnitudine, odore nullo. Lychnidis coronariæ semen, ut Galenus est auctor libro VII. simplicium medicamentorum, calidum est secretum quodammodo ordine, aut iam etiam tertio: siccum sanè eodem quoque modo.

Lychnidis fa  
cultas ex Gal.



**LILIA** coronamentis se dedunt, Liria à quibusdam uocata. E quibus unguentum temperatur, quod aliqui lirinum, alij fufinum appellant, neruos, & priuatim vuluæ duritias emolliens. Folia herbæ illita, contra serpentium ictus auxiliantur: feruefacta ambuftis proficiunt: aceto condita vulneribus opitulantur. Succus adiefto melle, aut aceto in æreo uafe coquitur conuenienti medicamento uetustati ulcerum, & ad recentia vulnera. Inaffata radix, & ex rosaceo trita, igni ambufta sanat; uuluum emollit, menses ciet, ulcera cicatrice obducit. Cum melle detrita neruis præcis, luxatistisque medetur: vitiliginēs, furfures, & lepras emēdat: vlceraque in capite manantia expurgat: abstergit faciem, & erugat. teritur in aceto cum hyōscyami folijs, & farina tritici mulcendis testium inflammationibus. Semen potum moribus serpentium aduerfatur. Ignibus facris semen, & folia cum uino illinuntur. Trādunt & purpurea esse lilia. In Syria autem, & Pisidia Pamphiliæ efficacissima unguentis nascuntur.

**LILIA** Italici notissima sunt, atq; adeo omnibus, ut planè superuacuum esse putem, exemplo Dioscoridis adductus, uel ex nobis eorum faciem repræsentare; uel alterius historiam referre. Sed tamen quoniam ijs quandoq; mos gerendus est, qui semper hortis nouis ac uarijs floribus refertis delectantur; idcirco silentio præterire non potui, quin hic insererem, qua ratione, quoue matronio alba lilia (si tanta fides præcis rei herbariæ autoribus adhiberi potest) purpurea fieri possint. Quod cum Plinius docuerit lib. XXI. cap. V. ubi de Lilijs latius differit, ideo eius uerba subi-

Liliorum historia ex Pl.

ciemus. Liliū, inquit, rosæ nobilitate proximum est, & quedam cognatione unguenti, oleiq; quod lirinon appellatur. Et inpositum etiam maxime rosas decet, medio prouentu earum incipiens. Nec ulli florum excelsitas maior, interdum cubitorum trium, languido semper collo, & non sufficiente capitis oneri. Candor eius eximius, folijs foris stratis, & ab angustijs in latitudinem paulatim sese laxantibus, effigie calathi, resupinis per ambitum labris, tenuiq; filo, & semine stantibus in medio crocis. Ita odor, colorq; duplex, ut alius calycis, alius staminis: differentia angusta. In unguenti uero, oleiq; usu folia non spernuntur. Est flos non dissimilis illi in herba, quam conuolualum uocant, nascens per fruteta, nullo odore, nec crocis intus, candorem tantum referens, ac ueluti naturæ rudimentum lilia facere condiscens. Alba lilia iisdem omnibus modis seruntur, quibus rosa: & hoc amplius lacryma sua, ut hipposele-

*Lilium rubens*

*Purpurea lilia*

non nocant. Alij florem eius cynorrhodon: Laudatissimū in Antiochia, & Laodicea Syriæ, mox in Phaselide, quam locum obtinet in Italia nascens. Sunt & purpurea lilia aliquando gemino caule, carnosiore tantum radice, maiorisq; bulbi, sed unius. Narcissum uocant. Huius alterum genus, flore candido, calyce purpureo. Differentia à lilijs est & hæc, quod narcissi folia in radice sunt, probatissimis in Lyciæ montibus. Tertio generi cætera eadem. Calyx herbaceus. omnes serotini: post arcturum enim florent, ac per æquinoctium autumnum. Inuenta est & in his ratio inferendi, monstrificis hominum ingenijs. Colliguntur namq; mense Iulio scapi arecentes, liliaq; suspenduntur in fumo. Dein nudantibus se nodulis, in sæce nigri uini, uel Græci mense martio macerantur, ut colorem accipiant, atq; ita in scrobiculis seruntur; heminis sæcis circumfussis. Sic fiunt purpurea lilia, mirumq; ita tingi aliquid, ut nascatur infectum. hæc Plinius. Lilia (ut Anatólius testatum reliquit) totum annum uiridia durabunt, si cum oclusa silent, necdum patentia debiscunt, decerpta, nouis fictilibus non picatis indito diligenter operculo recondantur. sic enim clausa perpetuum annum uegeta manebunt. Sed ut intermedio tempore ad usum promuntur, statim ad solem prodacta, cum senserint eius calorem, aperta panduntur. Porro ut uicissim, & uarijs temporibus flores pariant lilia, bulbi ita seruntur, ut aliqui duodecim digitorum altitudine obruantur, alij octo tantum, alij quatuor duntaxat profunditate mergantur. sic diuersis diebus dabunt lilia: quod & in alijs floribus fieri pollicetur. Ceteram illud in toto lilio merito annueneri potest, quod Martagon chymistæ appellant. Hoc enim radice, etsi croceo colore infecta sit, à lilio candido non dissidet, sicuti nec caule. Folijs uulgarem saponariam imitatur, quæ in stellæ, uel rosæ modum intercedente spatio caulem ambiunt: in cuius cacumine tenui pediculo appensi flores emicant liliorum effigie, minores tamen: quorum folia etiam reflexa cernuntur, colore purpureo, punctis quibusdam rubentibus respersa, & ipsi odorati sunt, aspectuq; iucundi. Lilijs genus hoc in suis de stirpium historia commentarijs Fuchsius, aphodelum feminam putauerat esse, pro eoq; depinxerat. Sed quia sui erroris conscius factus, hanc ipse suam mutauit sententiam, nō

*Martagon.*


Liliorum di-  
res ex Gal.

est cur iam nos eam pluribus refellamus. Liliorum facultates posteritatis memorie prodidit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Lilij flos temperaturam mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrea essentia, ex qua utiq; in gustu amaritudinem habet, partim ex aquea, eaq; temperata. Itaq; etiam quod ex eo conficitur oleum, & unguentum, citra morsum digerendi, simulq; emolliendi facultatem obtinet. unde fit ut utriusque sit aptissimum. Porro radix, foliaq; per se trita desiccant, & abstergunt, & digerunt moderate. Proinde quoq; ambustis competunt: siquidem hæc quoq; moderate desiccantem, extergentemq; facultatem postulant. Radicem ergo tritam, ac deinde cum rosaceo contritam ambustis, quoad obducatur cicatrix, imponunt. quippe cum alioqui & durum ulcerum omnium bonum sit inducendæ cicatrici remedium. Quinetiam uteros emollit, mensesq; prouocat. Folia uero præcoquentes, & ipsa ad obductam usq; cicatricem imponunt, non in ambustionibus duntaxat: sed alijs quoq; uulneribus. Sed sunt etiam, qui aceto ea condientes ad uulnera suo tempore utantur. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice, quam in folijs: quanquam tamen nec in ea ipsa multum inest, sicut prædiximus. nam primum ordinis abstergentium est medicamentum. Itaque cum aut uirilgines, aut psoriam, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere uolumus, commiscemus illi aliquid aliorum medicamentorum ualidius extergentium, cuiusmodi est mel. Ceterum si id moderate illi, ac conuenienter admisceatur, & ad neruorum diuisiones competit, & ad alia uniuersa, quæ ualenter exiccari postulant absq; morsu. Imposuimus uero etiam quandoq; & foliorum succum cum aceto & melle coctum. Quintuplus autem erat succus ad utrumq; atq; insigne medicamen fuit ad omnia ea, quæ exiccari postulant absq; morsu, seu uulnera omnia ingentia, & maxime quæ in capitibus musculorum eueniunt, & quæcumque ulcera humida flaccidaue, & diuturna sunt, quæq; ægrè ad cicatricem perducuntur. Sed hæc iam ad medicamentorum componendorum institutum attinent, à quo quantum licet abstinere in præsentia adnotor. ceterum rerum ipsarum natura sepe numero ut attingam adigit, celeriter uero relinquenda sunt, atque ad propositum reuertendum.

ΒΑΛΛΟΤΗ. BALLOTE.

ἡ δὲ φάρμακον αὐτῶν

CAP. C.



Ballotes con-  
sideratio.

**BALLOTE**, nomine alio nigrum marrubium uocant. Caules edit quadrangulos, nigros, subhirsutos, complures ex una radice: folijs maioribus, quam marrubij, hispida, per interualla in caule dispositis, subrotundis, graueolentibus, apiastro proximis: unde aliqui apiastrum eam uocauerunt. candidi flores uniuersi uerticillato ambitu caulem coronant. Vis eius efficac aduersus canis morsus, folijs ex sale illitis. Feruenti cinere flaccescunt folia, ut condylomata reprimant: purgant & sordida ulcera cum melle.

**BALLOTE**, siue Marrubium nigrum, quod etiam ob odoris grauitatem à quibusdam Marrubium fetidum cognominatur, frequens in agrorum marginibus nascitur, & passim seminat. Est autem hoc apiastro adeo simile, quod facile legentes falleret, nisi nares consulerentur: ita enim sua graueolentia cito innotescit. In Italia nullis non cognitum est, appellaturq; ab aliquibus Marrubiastrum, ab alijs Marrubium spurium. Huius meminit Paulus (est iures eius silentio præterierit Galenus) lib. VII. sic inquit. Ballote, quod alij marrubium nigrum dicunt, acris est, et absterforie facultatis. Illitum cum sale canum morsibus medetur. In Orbiasij codice manu scripto hic interiectum legitur: *ἡ δὲ φάρμακον αὐτῶν*, quod folia quoque Ballote nigra reddit. Nec temere fortassis illud quis adijciendum putabit, quod pulchre alteri eius nomini conueniat, quodq; ipsius meminerit Plinius libro XXVII. cap. VIII. cum inquit. Ballote folijs est marrubij maioribus, & nigrioribus.

ΜΕΛΙΣΣΟΦΥΛΛΟΝ. APIASTRUM.

CAP. CI.

**MELISSOPHYLLON**, siue melittæna, id est, apiastrum, id sibi nomen usurpauit, quoniam apes ipsa herba delectantur. Cauliculi, & folia ballotæ, de qua paulò antè diximus, similia essent, nisi maiora, tenuioraq; nec ita hirsuta spectarentur: citreum malum olent. Folia cum uino pota, aut illita prosunt, contra ictus phalangiorum, scorpionumque: item aduersus canis morsum. Decocto eorundem gratia, foueri prodest: defæssionibus scæminarum ad ciundos menses conuenit: dentes eodem in dolore colluuntur, dysentericis infunditur. Fungorum strangulationibus

folia,



## APIASTRUM.



MARRVBIVM.



folia, addito nitro, potu auxiliantur: torminibus, & orthopnoicis delinctu. Illita cum sale strumas discutiant, ulcera purgant: articulares dolores illita sedant.

MELISSOPHYLLON, quod Latinis Apiastrum, & Citrago dicitur, Hetrusci ab odore citri vulgò uocant Cedronella, itemq; Melissa, sicut etiam Insulæ. Herba est vulgaris æque notitie, atq; odorata. Duo eius habentur genera, unum sativum, alterum sylvestre. Vtrumq; in cordis affectibus Mauritani miris laudibus efferunt: tamen si id Græci, quod extet, silentio præterierunt. Proinde hæc Serapio retulit. Melissophylli, inquit, proprium est animum hilarem reddere: humenti, ac frigido uentriculo auxiliari, concoctionem adiuuare, cerebri obstructions referare, deficientem animum reuocare, cordis imbecillitatem roborare, eamq; præsertim, qua somnus frequentius nocte intercipi solet, quin & eius pulsus reprimere, animi sollicitudines fugare, ac sollicitas imaginationes tollere, quæ tum ab atra bile, tum ab exusta pituita gignuntur. His præterea facultatibus pollere Melissophyllum, comprobatur Auicennæ quoque testimonio, qui libro medicinis, quæ cordi conueniunt, dicat, ita de eo scribit. Melissophyllum exal facit, siccataq; ordine secundo. Cor exhilarat, vitalesq; facultates roborat, odoris fragrantia, saporis austeritate, partiumq; tenuitate. Quibus facultatibus ceteris etiam uisceribus competit. Vires deiectionis possidet, nec adeo imbecilles, quin atrabiliarios vapores à spiribus, & à sanguine, quæ cordi, & arterijs inest, educere queat, quod in ceteris corporis partibus, ac etiam in toto corpore efficere nequit. Melissophylli meminit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, his uerbis. Melissophyllum marrubio simile est facultate, sed plurimum ab eo vincitur: quamobrem nec utitur eo quissiam. Superuacaneum siquidem foret præsentem marrubio, cuius tantus est ubiq; terrarum proventus, uelle uti melissophyllo. Ceterum si cui fortè ad manum quandoq; marrubium non fuerit, illo uti licebit ad eadem, modo quanto ab hoc exuperetur, cognitum habuerit. hæc Galenus. Apiastrum, Plinio libro XX. cap. XI. autore, in confessa damnatione est uenenatum in Sardinia.

Apiastri consideratio.

Melissa

Apiastri uires ex Arabibus.

Ex Galeno.

## Πεδύον. MARRVBIVM. CAP. CII.

Ἄνδρον

MARRVBIVM, frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis: folium pollicem æquat, subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro: semen in caulibus, & ex interuallis: flores uerticillato ambitu, asperi. Nascitur propter ædificia, ruinas, & rudera. Huius folia sicca cum semine decocta in aqua, aut æridium succus datur: cum melle suspensio, tussientibus, & ad tabitudinem redactis. Crassam è pectore pituitam cum sicca Iri eijcit. mulieribus à partu non purgatis, datur, ut menstrua, & secundas extrahat: item in difficili partu, & his qui uenena hauerunt, aut à serpentibus demorsi sunt. vesicam, renesq; lædit. Folia cum melle illinuntur sordidis ulceribus purgandis: pterygia, nomasque sistunt. laterum dolores mitigant. Succus folijs contusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet: cum uino, & melle illitus oculorum claritatem adiuuat: naribus regium morbum expurgat: aurium doloribus conuenienter instillatur per se, aut cum rosaceo.

MARRVBIVM

Marrubij con-  
sideratio.

Marrubij ui-  
res ex Gal.


**MARRUBIUM** vulgaris est planta, notiorq; omnibus in Italia, quam ut pluribus indicanda sit. Eius duo genera constituit Theophrastus lib. VI. cap. II. de plantarum historia, ubi ita scribit. Sunt & Marrubij duo genera. Aliud enim folio herbido, serrationi, incisurisq; profundioribus, & proinde conspectioribus discreto constat, quo frequentarij uti ad nonnulla consuevere. Alterum rotundius, squalensq; uehementer, sicut sphaceli, incisuras habens obscuriores, minusq; serratum. hæc Theophrastus. Ex quibus utiq; constare potest, Theophrasto alterum marrubium non aliud esse, quam Dioscoridi balloten. Marrubij uires tradidit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Marrubium ut gustu amarum est, ita si quis utatur, consentientem huic saporis actionem possidet, iecur, ac lienem obstructione liberans, & thoracem, pulmonemq; expurgans, ac menses promouens. Sed & illitum detegit, ac digerit. Ponatq; ipsum quissiam in caliditate quidem secundi ordinis iam completi: in siccitate uero tertij medij, aut completi. Succo eius cum melle ad uisus acumen utuntur. Quinetiam & per nares morbum regium purgat, & ad aurium dolores inueteratos adhibent, in quibus sanè obstructiones disicere, meatumq; ipsum, & ramos membranarum expurgare est usus.

ΣΤΑΧΥΣ. STACHYS. *ἡ ἁγία ἄνθος* CAP. CIII.

Stachys cō-  
sideratio.

Plinij lapsus.

Stachys ui-  
res ex Gal.



**STACHYS**, frutex est marrubio similis, sed longior, folia ferens numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi: & complures virgas ab una radice exeuntes, marrubio candidiores. Nascitur in montibus, & asperis. Vim habet excafactoriam, & acrem. Foliorum decoctum potu pellit menstrua, & secundas.

**STACHYS** frequentissima in Italia nascitur. Assurgit enim uirgis compluribus, angulosis, ab una tantum radice exeuntibus, hirsutis, marrubio tum longioribus, tum candidioribus: folijs numerosis, incanis, hirsutis, oblongis, præduris, odorisq; iucundi. Flores gerit in purpura albicantes, qui per interualla uerticillato ambitu caulem circundant marrubij modo. Ex quibus sanè notis satis constare arbitror, hanc herbam quam præter exhibemus, esse ueram Stachyn. Quibus etiam accedit, quod ea (ut Galenus testatur) amara sit, & gustu acris. Plinius libro XXIII. cap. XV. Stachyn porri similitudinem habere tradidit, Græcarum uocum affinitate deceptus, præson pro præson legens. Siquidem πρᾶσον porrum significat, πρᾶσον uero marrubium, cui Stachys est similis. Stachys meminit Galenus lib. VIII. simplic. medicament. sic inquit. Stachys frutex est marrubio similis, gustu acris, & amaro: tertij est ordinis excafacientium. Quamobrem rationabiliter non solum menses mouet; sed & abortum affert, & secundas eiecit.

ΦΥΛΛΙΤΙΣ. PHYLLITIS. CAP. CIIII.


**PHYLLITIS** folia promit rumici similia, longiora, & viridiora, senu, aut septena, recta, quæ parte anteriore leuiora cernuntur, à tergo autem pensiles quasi vermiculos tenues ostendunt. In umbrosis, & opacis hortorum locis emicat. gustu acerbo. Neque caulem, neque florem, neque semen profert. Folia in vino pota serpentium moribus aduersantur. quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: et si dysenteria, aut resoluta aluus exercet, potui datur.

Phyllitidis cō-  
sideratio.

Lingua ceruina  
vide infra 415

**QUI** notas omnes, quæ Phyllitidis à Dioscoride tribuntur, diligentissime expendere uoluerit, haud difficile quidem fateri cogetur, Phyllitim esse eam herbam, quam aliqui Lingua ceruinam, nonnulli uero Scolopendriam perpetuam appellant. Perperam dico, quod legitimum scolopendrium (ut infra suo loco dicetur) illa nimirum sit herba, quæ Græcis asplenos, Mauritanis uero ceterach dicitur. Quod autem ita se res habeat, hinc in primis ad credendam impellor, quod umbrosis, opacis, humentibusq; locis proueniat: quodq; folijs sit rumici maioribus, longioribus, ac uiridioribus, rectis, anteriore parte leuibus, à tergo autem eminentijs quibusdā transversim per interualla signatis, subrubentibus, quæ (ut Dioscorides inquit) pensiles uermiculos referunt. Opinionem deinde auget acerbus sapor, qui gustu percipitur. Huc postremo accedit, quod caule, flore, & semine nacet: tamen non desint, qui credant, eius semen è pensilibus illis uermiculis prodire. Neque illud sententiæ nostræ quicquam obstare crediderim, quod huius herbe complures reperiantur plantæ, quæ præter Dioscoridis auctoritatem uel quinquaginta emittant folia. Quippe (ut experientia compertum habeo) effodientibus nobis è terra hanc herbam nunquam ab una tantum radice tot folia erumpere uisa sunt, sed à quàm plurimis se simul tangentibus, ita tamen ut una ab altera separari posset. Unde facile cognoscitur.

## PHYLLITIS.



cognoui, quod si singulæ radices abinuicem distinctæ considerentur, non pluribus, quàm senis, aut septenis folijs refertè inueniatur. His itaq; rationibus, mea quidem sententia, hac in re planè hallucinati deprehenduntur Manardus, Leoniceus, Ruellius, & Fuchsius, omnes alioqui clarissimi nominis uiri, quod tam facile crediderint, Linguam ceruinam uocatam Phyllitim nequam referre, sed Hemionitim. Nam etsi Hemionitis caule, flore, & semine uidua sit; non tamen folijs constat rumicis, sed dracunculi, curuis, nouæ lunæ instar. Illud insuper addiderim, quod iam reperta sit Hemionitis, quæ omnibus prorsus notis legitimam refert. Sed ijs fortasse errandi occasionem præbuit uulgi opinio, qui Linguam ceruinam non magno quidem negotio ad omnes leonis affectus assumere suadet. quod tamen Hemionitidis est proprium. Cuius fortè uulgi opinionem ijs potius secuti, quàm quod Phyllitidis lineamenta, notasq; diligentius perpenderint, in hunc facile lapsum inciderunt. Phyllitidis meminit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Phyllitis ciam qualitatis sit acerbæ, non absurdè diarrhoeas, siue profluentias, & dysenterias pota iuuat.

Manardi, Leonice, Ruellij, & Fuch. lapsus.

415

Phyllitidis uires ex Gal.

## Φαλαγγιον. PHALANGIVM.

CAP. CV.

PHALANGIVM, à quibusdam phalangites, ab alijs leucacantha uocatur. Ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresve, in diuersa tendentes: flos candidus, lilio similis, multas incisuras habens: semine nigro, † lato, ad lenticulæ dimidiatæ figuram, multò tenuiore: radice parua, tenui, herbacei coloris, dum à terra eruitur. prouenit in collibus. Huius folia, semèn, flos

cum uino pota, auxiliantur contra scorpionum, phalangiorumque ictus: tormina quoque discutunt.

EADEM ferè, quæ hic de Phalangio posteritatis memoriæ prodidit Dioscorides, retulit Plinius libro XXVII. cap. XII. ubi ita scribit. Phalangites à quibusdam phalangion uocatur, ab alijs leucanthemon, uel, ut in quibusdam exemplaribus inuenio, leucacantha. Ramuli sunt ei nunquam pauciores duobus, in diuersa tendentes. Flos candidus, lilio rubro similis: semine nigro, lato, ad lenticulæ dimidiæ figuram, multò tenuiore: radice herbacei coloris. Huius folio, uel flore, uel semine auxiliantur contra scorpionum, phalangiorumq; & serpentium ictus: item contra tormina. Hæc Plinius. quæ omnia ferè, si conferantur, Dioscoridi accepta referri poterunt. Ceterum etsi non desint bodie barbarij, qui in Phalangij, ut in plurimum aliarum quoq; incognitarum plantarum locum herbis quasdam quales quales sint, substituant, atq; rei barbariæ parum gnaris pro legitimis sæpe ostendant; ipse tamen hætenus, ut ingenue fatear, uerum Phalangium non uidi in Italia, neq; ab alijs inuentum scio. quanquam non equidem negauerim, ipsam ubi nasci. Phalangij uires tradidit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Phalangites sic appellata est, quod morsis à phalangijs auxilietur. Est autem facultatis tenuium partium, desiccantis. quanobrem & tormina patientibus succurrit.

Phalangij consideratio.



Phalangij uires ex Gal.

Si quis Græca Dioscoridis exemplaria consulat, hic non τλατὺ, hoc est latum, sed τὰ χυ, quod est crassum, scriptum reperiet. Quod si præterea ea legat, quæ ex Plinio in commentario retulimus, deprehendet Ruellium in ueritando secutum fuisse Plinium, ex eoq; uocem illam reddidisse.

## Τρίφυλλον. TRIFOLIUM.

CAP. CVI.

TRIFOLIUM, Græci triphyllon, alij oxytriphyllon, alij menyantes, alij asphaltion, uocant. Frutex supra cubiti altitudinem attollitur, uirgas habens tenues, iunceas, & nigras, unde ramulæ enascuntur appendiculæ, in quibus terna singulis germinationibus exeunt folia, loto arbori similia. ijs recenter enatis rutæ odor inest, ubi autem adoleuerunt, bitumen olent. Florem edit purpureum: semen quadantenus latum, subhirsutum; ex altera extremitate exertum; antennis modo corniculum gerens. radix tenuis, longa, ualida. Semen, & folia in aqua pota pleuritis, urinae difficultati, comitialibus, & ijs qui aquæ inter cutem principia sentiunt, foeminis quoque uulvæ uitij opportunis, auxiliantur: menses ciunt. ternæ drachmæ è semine dari debet, è folijs uerò quaternæ. Contra serpentium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt. Tradunt aliqui, totius fruticis, radicis, foliorumque decoctum fotu dolores eorum finire, quos serpentes



TRIFOLIUM PRATENSE.

Trifolij con-  
sideratio.

serpentes percusserint. qua autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui ulcus habuerit, perinde afficitur, ut à serpente demorsus. Quidam terna folia, aut semina in tertianis, cum uino. pomi dedere: & in quartanis quaterna, ut quæ febrim circuitus discuterent. Radix antidotis inferitur.

TAMETSI plura in Italia passim in pratis, ac uiridibus Trifolij inueniantur genera omnibus plane nota; non tamen de his tradidit hoc capite Dioscorides, sed de eo tantum genere, quod à bituminis odore Asphaltitis dicitur, de quo etiam scribit Galenus. Verum non ob id putandum, Trifolium pratense omne genus Dioscoridi fuisse ignotum: siquidem eius meminit libro quarto in sylvestris loti capite, dum ita scribit. Sylvestris lotus plurimum in Libya gignitur, caule bicubitali, & sepe maiore, à multis, folijs trifolij pratensis. Ex quibus utiq; Dioscoridis uerbis liquet, eos maxime hallucinari, qui recenter contendunt Trifolium pratense esse lotum sylvestrem, uel urbanam. Plinius lib. XXI. cap. IX. de tribus trifolij generibus differuit in hunc modum. Folio coronat & trifolium. Tria eius genera. mentanthes uocant Græci, alij asphaltion, maiore folio, quo utuntur coronarij. Alterum acuto, oxytriphylon cognominatum. Tertium ex omnibus minutissimum. haftenus Plinius. Trifolij acuti meminit quoq; Scribonius Largus, qui ita scriptum reliquit. Trifolium acutum, quod oxytriphylon appellant, nascitur in Sicilia plurimum. nam in Italiae regionibus nusquam eam uidetur, nisi in Lame portu, cum in Britanniam peterem cum Claudio Cesare. Est autem folijs, & specie communi trifolio similis, nisi quod pleniora sunt folia, & quasi lanuginem quandam super se habet,

ita, et in extrema parte uelut eminentem aculeum. Sed frutex huius duam pedum, interdum altior conficitur, et  
 etiam grana emittit, quorum nihil circa pratense trifolium inuenitur. hæc ille. Est et aliud trifolij genus sa-  
 pere acetoso, folijs subpallidis, tenuibus, cordis effigie: quod à quibusdam Paris cuculus, ab alijs Trifolium acetosum,  
 et Alcarya uocatur. Plinius (ut quidam putant) hoc oxyn nominat libro xxviii. cap. xii. ubi sic inquit. Oxys fo-  
 lio laterum habet. Datur ad stomachum dissolutum. Edunt et qui enterocælen habet. Nec plura de hac herba Plinius.

Trifolium  
 acetosum.

Alleluia

Ceterum Trifolium pratense in Italia trium est generum. Primum folijs exit rotundis, et amplis: secundum lon-  
 giusculis: tertium ut primum circinatis, sed breuioribus. Distant et florum colore, quod in uno flores albicent, in  
 altero rubescant, in tertio lutei spectentur. Pratense trifolium tempestates prænuñciat. nam (ut Plinius est auctor)  
 inhorrescat, et folia contra tempestatem subrigit. Habetur præterea herba, de qua ideo hic inter trifolij genera

10 Interdum duximus, quod folio exeat triplici cornu diuiso: unde etiam apud quosdam herbarios sibi Trinitatis no-  
 men comparauit. Hæc itaq; herba TRINITAS uulgò uocata, in locis prouenit uliginosis, et inter fruteta: gaudet

Trinitatis her-  
 bæ mentio.

etiam opacis. Folia fert triquetra, longis pediculis appensa, quæ auersa parte cyclamini modo subpurpurascunt, su-  
 periore uero albis quibusdam maculis resperguntur. Caulem habet tenuem, in cuius cacumine primo statim uere flos  
 ciscit ceruleus. Radicibus nititur numerosis, tenuibus, subrubentibusq;. Huiusce meminisse Græcos, nec pariter  
 Romanos, hætenus cõpertum non habeo. Probatur maxime recentioribus medicis ad uulnera glutinanda, tam ex-  
 ternis illata, quàm interius sumpta. quinetiam et ad enterocælas: in quem usum puluerem dimidij cochlearis men-  
 sura ex uino austero propinant. Sed ut ad trifolium nostra redeat oratio, eos in apertissimo errore uersari existima-

Quorundam  
 error.

uerim, qui Andacocam Apbriis uocatam, ad quàmuis trifolij speciem referunt. Quandoquidem Andacoca (ut testa-  
 tur Serapio) nil aliud est, quàm Dioscoridis Aegyptia lotus. E cuius semine, quod papauerum modo capitibus qui-  
 busdam includitur, Arabes sibi oleum conficiunt, quod miris laudibus efferunt in neruorum morbis, præsertimq; tre-  
 moribus: illudq; oleum de Andacoca appellant. Id enim non desunt, qui credant è uulgari trifolij semine fieri. sed

quia aperte decipiantur, uel ipsi uideant, uel alij iudicent. Trifolium scriptis tradidit Galenus libro viii. simpli-  
 cium medicamentorum, sic inquit. Triphyllum, quidam asphaltion, quidam oxyphyllon, nonnulli minyanthes, sunt  
 et qui cnicum uocent. Prima quidem tria ab accidentibus frutici, reliqua duo nomina haud scio unde. Vis plantæ  
 et calida, et sicca ut bitumen, cui odore est similis, utrinq; tertio ordine. Proinde pota laterum dolores ab obstru-

Trifolij uires  
 ex Galeno.

ctione natos iuuat, et urinam, mensesq; prouocat. hæc Galenus. Sed animaduertendam est, an Galenus ipse in Tri-  
 folij facultatibus rectè perceperit Dioscoridis sententiam. Quippe is in libro de iheriaca ad Pisonem, ubi plurimum me-  
 dicamentorum facit mentionem, quibus contrariæ insunt facultates, hæc de eo memoriæ prodidit. Trifolium herba;

quæ hyacintho similis est, cum uere parturit, et semen agresti cnico persimile obtinet, decocta admodum, deinde mor-  
 30 sus aranei, uel uiperæ quoq; ex aquæ fotu adhibita ipsi medetur, et dolores statim sedat. Sin autem in alio non cõ-  
 morso sanum locum eodem fotu circundederis, similem sensum, similesq; dolores ijs, quos morsus inuehit, omnes ef-  
 ficat. Vt re uera miraculo dignum opus esse uideatur, uidelicet herbam et morsum sanare, et ferarum modo sanam

Galenî senten-  
 tia damnata.

partem præuè efficere. hætenus Galenus. Verum id, si Dioscoridis uerba rectè expendantur, nullo miraculo fieri  
 facile constabit, sed potius secundum ipsius naturæ ordinem. Siquidem (ut Dioscorides scribit) non omne trifolij de-  
 coctum illud efficere potest, sed tantum id, cuius folia quissiam à ferarum morsibus liber euaserit, si eo alterius locus

ulcere affectus persundatur. Id quod aperte Dioscoridis uerba declarant, cum inquit. Tradunt aliqui totius fruticis,  
 radicis, foliorumq; decoctum fotu dolores eorum finire, quos serpentes percusserint. Qua autem aqua sanatus quis  
 fuerit, si ea quissiam alius foueatur, qui ulcus habuerit, perinde afficitur, ut à serpente demorsus. Ex ijs Dioscoridis


uerbis clarum fieri puto, hanc rem in se nihil admirationis habere. Nam cum Trifolij ipsius decoctum, quo demorsi fo-  
 40 uentur, uenenum à uulnere extrahat, eiq; permisceatur, haud dubiè id uenenosum redditur. Quamobrè minime qui-  
 dem mirum uideri debet, si idem decoctum, quo quissiam non demorsus foueatur, ubi perfuse partes aliquo ulcere la-  
 borauerint, ueneno per ulceris poros ingrediente, ac sanguini se commiscente, ea omnia excitet mala, quibus demorsi

uexantur. idem enim uenenum cum sit, eosdem quoq; præbeat effectus necesse est. Vnde liquidò colligi potest, quod ui-  
 tas à Trifolij decocto euocatum, non autem Trifolium, sit illud, quod similem sensum, similesq; dolores faciat. Quod  
 autem uenenum exuctum à ferarum morsibus ulceratis particulis contactum necem asferre possit, cõplures tam Græ-  
 ci, quàm Arabes auctores, manifestè demonstrant. Quandoquidem scribentes ore demorsos sugere præstantissimum

est remedium, seriò nos admonent, ne id ore ulceribus affecto fiat: quoniam si uenenum illud ulcus inficeret, sugentem  
 in mortis discrimen duceret. Hæc itaq; sunt, quæ me maxime mouent, ut credam Galenum hac in re Dioscoridis men-  
 tionem non accepisse, atq; etiam, si licet dicere, cæcutiuisse. Ceterum non desunt, qui uelint, ut Galenum tueantur, li-

50 brum de iheriaca ad Pisonem non esse legitimum, idq; pluribus rationibus comprobant. Quibus an assentiendum sit,  
 iudicent ijs, qui Græcæ Galeni pbrasm profitetur, quiq; eius uolumina diutius euoluerunt. Ego certe, ut dicam quod  
 sento, non possim non illis subscribere, qui librum illum spurium esse censent.





Póλιον. POLIVM. CAP. CVII.

Dvo genera polij. Montanum, cui teuthrio nomen est, & cuius est usus. tenuis frutex est candidus, dodrantalis, semine refertus: capitulo in cacumine quandam corymborum speciem præ se ferente, paruo, cano hominis capillo simili, grauiter olente, non sine quadam suauitate.

Alterum fruticosius, non usqueadeo ualens odore, & uiribus infirmius. Potum feruescenti ius auxiliatur serpentium ictibus, hydropicis, morbo regio: & lienosis ex aceto: stomachum malè habet, caput doloribus afficit: aluum, & menses ciet. substratum, suffitumve serpentes abigit: illitum vulnera conglutinat.

Polij consi-  
deratio.

SEPLASIARII illi, qui pro Polio herbam quandam usurpant, quæ numerosos profert cauliculos, tenues, rectos, rotundo quodam semine undiq; refertos, euidentius, meo quidem iudicio, errant, quam ut eorum erratum ex-  
plodi mereatur. quandoquidè herba hæc nullis prorsus notis Polium representat. Porro utrunq; Polij genus, quod nulla reclinante nota legitimo respondeat, in pluribus Italie locis prouenit. Primum uulgi herbariorum locum in-  
scatam appellat, à quo secundum effigie non longè distat, quanuis non adeò sit odoratum. Secundi generis Polium, cuius etiam picturam adiecimus, uiret Venetijs in horto Maphæi excellentissimi medici. Polij meminit Plinius lib. xxi. cap. vii. ubi ita scriptum reliquit. Apud Græcos Polion herba inclita Musæi, et Hesiodi laudibus, ad omnia uicem prædicantium; superq; cætera ad famam etiam dignitatis: prorsusq; miram, si modò (ut tradunt) folia eius mane can-  
dida, meridie purpurea, sole occidente cærulea aspiciuntur. Duo genera eius, campestre maius, syluestre quod mi-  
nus est: quidam teuthrion uocant. folia canis hominis similia, à radice protinus, nunquam palmo altiora. hæc Plinius, quorum plura à Theophrasto mutuatus est. Ceterum in ijs Plinius aperte hallucinatus deprehenditur, quòd tur-  
piter Polium cum tripolio confuderit, cuius historiam libro quarto pertractat Dioscorides. Siquidem Tripolij pro-  
prium est, non autem Polij, teste Dioscoride, ut colores ter in die mutet: neque id quidem à Dioscoride, ut à Plinio  
folijs, sed floribus adscribitur. Præterea capitulum Polio inesse cano hominis capillo simile scribit Dioscorides, non  
autem folia, ut ipse Plinius tradit. Polij uires memoriæ prodidit Galenus libro viii. simplicium medicamentorum,  
ubi sic inquit. Polium amarum est gustantibus, et modicè acre. Itaq; uiscera omnia obstructione liberat: urinamq;  
et menses ciet. Ac uiride etiànum magna uulnera glutinat, maxime species eius fruticosa. Aridum cum fuerit ma-  
ligna ulcera sanat illitum: et magis hoc præstat quod minus est. Polium minus, quo etiam utimur ad antidota, et  
crius, et amarius est, quàm maius, adeò ut ex tertio sit ordine desiccantium, ex secundo autem completo excas-  
cientium.

Plinij lapsus.

Polij uires ex  
Galeno.

Σκώδιον. SCORDIVM. *Quod cumq; granit* *ODALICAP. CVIII.*

SCORDIVM in montibus, & palustribus nascitur, folijs triflaginis, maioribus, non sic in ambitu diuisis, aliquantum allia redolentibus, gustu amaris, & adstringētibus: quadrangulis caulibus: subrubro flore. Herba uim excafactoriam habet: urinam cit. Cocta recens, aridave cum uino, aduersus uenenatos serpentium morsus bibitur: ad stomachi quoque risiones, dysenteriam, & urinæ difficultatem, binis drachmis cum hydromelite: crassamen purulentum pectore expellit. Facit aridæ farina ad ueterem tussim, rupta, conuulsa, si cum nasturtio, melle, & resina miscetur in eclegmate. Inflammata modicè præcordia, cerato excepta, recreat: cum aceto acri, aut aqua, podagris conuenienter illinitur: menses imposita mouet, vulnera conglutinat, uetera ulcera purgat, & ex melle cicatricem perducit. Sicca excrecentias in carne cohibet. Succus ad eadem uitia bibitur. Inter prima efficax Ponticum natione, Creticumq;.

SCORDIVM non ita pridem inueniri, & cognosci cepit in Italia. Siquidem præterita nuper ætate omnes tum medici, tum seplassarij Mauritanorum monumentis decepti, syluestre tantum allio, quod à Dioscoride ophioscorodon uocatur, pro legitimo Scordio utebantur. Neq; ijs solium rerum imperitia, sed etiam uocabulorum uicinitas imposuerat, ut qui Scordium à Scorodo, quod Græcis allium significat, distinguere nesciuerint, pro unoq; acceperint. Sed illis potissimum errandi occasionem dederat. Auicenna, uel eius interpres, quod in altera theriace compositionem Scordium, in alteram uero syluestre allium addiderit.

Scordij consideratio.

Quod cum uidissent superioris ætatis medici nonnulli rei, & prioris uocis ignari banc ex altera exposuerunt, & Auicennam in hac re sui ipsius interpretem fecerunt. Vnde adducti sunt, ut certò crediderint syluestre allium, & Scordium nihil inter se differre, atq; unam, & eandem plantam esse. Quo postmodum factum est, ut syluestre allium apud omnes in Scordij locum illegitimè successerit. Verum enim uero in hunc nunquam fortasse incidissent errorem, si Dioscoridis, & Galeni scripta diligēter perlegissent. Porro uerum legitimumq; Scordium, triflagini adeò simile, ut Trifago palustris merito dici queat, humentibus ac palustribus locis proueniens, alij odore præditum, recentiorum diligenti iam omnibus magis innotuit, quàm ut sit à nobis longiori historia representandum. Prætulit Galenus libro primo de antidotis Scordium, quod ex Creta aduehitur, ijs uerbis. Scordium optimum ex Creta defertur: quanquam non sit improbandum quod in alijs quoque nationibus reperitur. Scriptum autem est à quibusdam uiris grauioribus, cum in bello interemptorum cadauera multos dies insepulta iacuisent, quæcunq; supra Scordium fortè fortuna ceciderant, multo minus alijs computruisse, ea præsertim ex parte, qua herbam contigerant. Ob quam rem sanè omnibus persuasum est, tam putrefacientibus animalium uenenis, quàm medicamentorum deleterijs Scordium aduersari. Præterea Scordij meminit idem Galenus libro VIIII. simplicium medicamentorum, ubi de eius uiribus ita scribit. Scordium ex multiformibus id tum saporibus, tum facultatibus constat. nam & amarum quid obtinet, & acerbum, & acre, & maxime scorodo, hoc est, allio adsimilis eius est acrimonia: unde sanè, mea sententia, nomenclaturam sortitum est. Expurgat igitur, simulq; excalfacit uiscera, tum menses, urinamq; mouet. Præterea conuulsa, ruptaq; & laterum dolores ab obstructione, & frigore natos sanat epotum. Deniq; uiride quidem illitum magna uulnera conglutinat: sed sordida purgat, & maligna ad cicatricem perducit, illitum aridum. hætenus Galenus. Ceterum herba

Scordij uires ex Galeno.

Alliarie herbe mentio.

quædam iuxta sepes, & in agrorum marginibus nascitur, quæ & odore, & sapore ita abunde allium refert, ut non tamen uulgò Alliaris, siue Alliaria uocetur. Huius folia cum primùm erumpunt, ferè rotunda spectantur uiolæ similitudine: postquàm uerò adoleuerint, per ambitum in serræ modum laciniata uisuntur, ut quadantenus melissophylli effigiem representent, leuiora tamen sunt, nec adeò rugosa, & prope caulem latiora: quæ digitorum attritu, gustatq; alij odorem, & sorem reddunt. Caulem proferit bicubitalem, rotundumq;: flores albos, & semen nigrum, minimeq; irionis modo tenuibus siliquis inclusum. Radix, quæ longiuscula est, eundem cum folijs odorem retinet.


Vix plantæ huic calfactoria, & desiccatoria, uerum non adeò uehemens est, ut in allio. Attamen hinc certò colligi potest, quod ea crassos humores extenuare, & lentos incidere ualeat. Semen emplastri modo impositum, uulnèq; claudum, mulieres uteri strangulatu oppressas liberat, & excitat.

Brumet luteus

Baxior. TVSSILAGO, huff Vobliß CAP. CIX.

Vngula caballina TVSSILAGINI folia sunt maiuscula, quam he-

Rof. huff

Tussilaginis  
consider.

derz, sex aut septem à radice, subalbida à terra, superne uirentia, in plures angulos exeuntia. Caulis palmum altus: flos luteus, uere prodit, quo una cum caule confestim exiit: inde nonnulli his uacare existimant. Radix tenuis est, † & superuacua. nascitur in amoenis, & riguis. Folia ex melle trita igni sacro, & omnibus inflammationibus illitu medentur. Arida suffusa, ita ut fumus per infundibulum hianti ore rapiatur, hos sanant, qui sicca tussi, atque orthopncea infestantur: peccatoris uomicas rumpunt. Eundem effectum præbet suffusa radix. decocta in hydromelite, & pota, emortuos partus eiecit.

TVSSILAGO Hetruscis uulgò dicitur Farsara, et Farsarella, nomine à Romanis fortasse deducto: hanc enim ab ijs Farsariam uocant. fuisse testantur nomina Dioscoridi falso adscripta. Officinæ hos, uel illos secute eam Farsariam appellant, nec non etiam Vngulam caballinam. Herba est uulgaris notitie. Caele, & flore exit adeo fugacissimis, ut Plinius, qui eorum tam subito iacturam non animaduertat, deceptus Tussilaginem sine caule, & sine flore nasci memorie prodiderit: cum tamē ea uere primo & caulem, & florem proferat, sed qui enati breui admodum tempore durent, quo non nisi etiam à peritis, uel ab ijs, qui tunc sese forte fortuna tulerint obuiam, conspici possint, eoq; magis, quod iidem caulis, & flos prædeant, priusquam folia emicent. Quare scite scripsit Dioscorides, Tussilaginem confestim exiit tum flore, tum caule, atq; inde nonnullos his uacare existimasse. Sed certe uel hæc non legit, uel illa non obseruauit Plinius, quod Tuf-


Plinij lapsus. silaginem aperto errore & caule, & flore iudicium fecerit. Is Plinij error deprehenditur libro xxvi. cap. vi. ubi ipse de Tussilagine differit ijs uerbis. Tussim sedat Bechion, quæ & Tussilago dicitur. Duo eius genera. Syluestris ubi nascitur, subesse aquas credunt, & hoc habent signum aquileges: Folia sunt maiuscula, quam hedere, quinque aut septem, subalbida à terra, superne pallida: sine caule, sine flore, sine semine: radice tenui. Quidam eādem esse bechion, & alio nomine chamæleucen putant. Huius aride cum radice sumus per arundinem haustus, aut deuoratus, ueterem tussim sanare dicitur: sed in singulos haustus passum gustandum est. Altera à quibusdā salvia appellatur, similis uerbasco. hæc Plinius, Verum altera Tussilago, cuius nulla sit mentio à Dioscoride, utpote qui uno tantum eius genere contentus fuerit, mihi hæcenus incomperta est: nisi ea fortasse sit, quam aliqui herbariorum Centrum galli uocant. Porro nascitur in Tussilaginis radice quedam subalbida lanugo, quæ à radicum segmentis prius repurgata, & deinde linteolis inuoluta, & in lixiuio parum decocta, addito salis nitri aliquatulo, ac demum sole siccata omnium opem est fomes ad ignem è silice excussum excipiendum. Quippe adeo ignis est rapax, ut statim primo tantum chalybis concussu accendatur. Tussilaginis facultates posteritatis memorie tradidit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Bechium ideo sic nuncupatum est, quod Baxas, hoc est, tusses, & orthopnceas uicare crederetur, si quis uidelicet folia arida sumens, aut radicem in prunis accendens, ascendentem inde fumum inspiratu attrahat. Est autem modicè acris, ut sine molestia noxæ omnes thoracis abscessus credita sit rumpere. Sanè folia urentia partes crudæ inflammatione obsessas illitu extrinsecus adiuuant, propter aqueæ humiditatis admistionem, qua omnia uiridia, teneraq; participant alia plus, alia minus. Nam sicca Bechy folia acriora sunt, quam ut partibus inflammatione laborantibus conueniant.

† Nulli dubium est, quin hoc loco in Dioscoride mendum subsit. Quomodo enim radicem Tussilaginis ex pisor, hoc est, inutilem rectè uocauerit Dioscorides, si paulò post ei nonnullos usus tribuit? Errorē hunc à nemine interpretum, quod sciam, animaduersum, uidit Manardus, uidit item Fuchsius, sed uterq; tamen locum in emendatum reliquit. Equidem, ut dicam quod sentio, uerbum illud ut adscititium delendum esse puto, Oribasij testimonio uix in eius codice manu scripto illa dictio non legitur.

Αρτεμισία. ARTEMISIA. B. n. f. CAP. CX.

ARTEMISIA magna ex parte in maritimis nascitur, absinthij modo fruticosa, maioribus, & pinguioribus folijs, ramisque. Huius quidem genera duo. Vnum lætius, habitiusque, folijs, uirgisque latioribus. Alterū tenuius, flore paruo, tenui, candido, graueolente. æstate floret. Sunt qui in mediterraneis uniuersalis nomine appellent tenuem herbulam, simplici caule, & minuta, floribus

## ARTEMISIA.



ribus scatente tenuibus, flauo colore. hæc iucundior, quàm præcedens efflat odorem. Vtraq; excalfacit, extenuat. feruēfactæ cōuenienter in muliebres defessus adiunguntur, ad detrahendos menses, partus, secundasque: item ad præclusiones vuluæ, & eiusdem inflammationes: calculos comminuunt, remoratam urinam cient. menses pellunt pūbi illitæ. Succus vuluæ inditus ex myrrha eadē, quæ infessio trahit. Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

Ἀρτεμισία λευτόφυλλος. ARTEMISIA  
TENVIFOLIA. CAP. CXI.

ARTEMISIA tenuifolia in sepibus, & cultis iuxta aquarum ductus nascitur. Eius flores, & folia contrita sampsuchi odorem reddunt. Si quis stomacho laborans, herbam cum amygdalino oleo bene contundat in malagmatis lentorem, & stomacho imponat, sanitati restituetur. Qui neruorum quoque dolore cruciatur, si succum eius cum oleo rosaceo miscens illinat, sanatur.

TRIA à Dioscoride recensentur Artemisia genera. Verum priora nullis inter se notis certant, nisi quod in uniuersum altera maior est, altera uerò minor. quæ priuatim florem gerit candidum, paruum, tenuem, ac grauiter olentem: Quæ autem tertio generi adscribitur, herbula est simplici, tenuiq; caule, floribus plurimis referto, flauo colore. Id quod etiam confirmat Plinius libro xxv. cap. vii. sic inquit. Artemisia absinthij modo fruticosa est, maioribus folijs, pinguibusq;. Ipsius duo genera: altera latoribus folijs: altera tenera, tenuioribus, & non nisi in maritimis nascens.

Artemisia cōsideratio.

Sunt qui in mediterraneis eodem nomine appellant herbam simplici caule, minimis folijs: flores copiosi erumpentes, cum uia murescit, odore non iniucundo, quàm quidam botryn, alij ambrosiam uocant. Talis in Cappadocia nascitur. hæc Plinius. Qui tamen in prioribus Artemisia generibus, nihil à Dioscoride dissentiat; disidet tamen, & errat in tertio, quod in eius locum ambrosiam sequenti capite ab ipso Dioscoride descriptā subiecerit, credideritq; deceptus hic ambrosiam, & tertium Artemisia genus, unam & eandē esse plantam. Ceterum prima duo Artemisia genera Hetruscis frequentissima sunt, neq; in alio inter se distant, quàm quod in maiori omnes partes maiores spectentur, in minori uerò minores: aliās facie, & forma similia constant, quinetiam idem sapor, & odor, eademq; facultas utriusque est. Quare equidem nescio, quā ratione ductus Brasauolus Ferrariensis in suo simplicium examine pro certo crediderit, eam herbam minorem esse Artemisiam, quæ in Hetruria officinis Matricaria, & uulgò mulieribus Amarilla uocatur. Sed eò magis uirum hunc alioqui celebrem admirari subit, quod scriptis tradiderit duas alias esse Ferrarie Artemisia species nullis prorsus notis distinctas, præterquàm quod alteri unus tantum sit ramus, alteri uerò plures. Eius uerba subjicere lubet. Non dubito, inquit, ut nonnulli fecere, eam quæ apud nos corrupto uocabulo Artemisiae dicitur, ac si Artemisia dictum sit, ueram Artemisiam esse, quæ folia absinthio similia habet, ut Dioscorides inquit, & eius duo genera facit Monoclonon, & Polyclonon, id est, unum ramum, & plures ramos habentem. Ambas species Ferrariense uulgus nouit, si aptè distinguere sciret, quoniam & ipsis indiscriminatim utitur. Quam nos Matricariam, & Marellam uocamus, Artemisia species est, illa scilicet, quæ malè olet. Nec obstat, quod Ferrarie hæc species Artemisiae sint per unum, & plures ramos distinctæ, quoniam & hæc in specie est, quæ plures habet ramos. hæc Brasauolus. In quibus sanè uerbis eius plura, meo iudicio, deprehenduntur errata. Quorum primum illud est, quod non scripserit Dioscorides, alteram primi generis Artemisiam multiplici constare caule: alteram uerò simplici tantum consurgere, ut Brasauolus suo modo interpretari uidetur. Sed autor is duntaxat tradidit (ut etiam Plinius refert) quod aliqui reperiuntur, qui in mediterraneis unicaulis nomine appellant tenuem herbulam, simplici caule, & minuto, floribus scatente tenuibus, flauo colore. Verum hæc tertio Artemisiae generi assignantur, non autem secundo, uel primo, ut Brasauolus existimat. Altero deinde errore notatur, quod asserat Matricariam, siue Marellam, quam legitimum Dioscoridis parthenium censemus, esse graueolentem Artemisiam. Quandoquidem minor illa, quæ Dioscoridi secundo loco redditur, grauiter olens, non quidem florem profert in medio luteum, & per ambitum albis foliis cinctum Matricariæ, uel Amarillæ modo: sed candidum, paruum, ac tenuem. Tertius his accedit error, quod non assentire uideatur, duo illa Artemisiae genera, quæ Ferrarie persimiles habentur, ea esse, quæ à Dioscoride primo loco representata sunt, magnitudine tantum, ac paruitate differentia. Sed cian porro seipsum hac in re deceptum deprehendisset Brasauolus (ut legitur in suo ultimo uolumine Venetijs impresso) dum longa oratione contendit Amarillam, seu Matricariam inter Artemisiae genera reponendam esse, Cotulam uerò foetidam Ferrariensibus Brus-

Plinij lapsus.

Matricaria 417

Plura Brasauoli errata.

Ruellij hall  
cinauo.

Monachorū,  
& Fuchij er-  
ror.

Artemisiæ ui-  
res ex Gal.

sciaculo uulgo uocatam esse legitimum Parthenium, adeo seipsum (pace eius dixerim) et sua scripta confudit, et in lo pacto (dicam libere quod sentio, alijs tamen iudicandum relinquo) quid is tandem decernat, percipi possit. Nam cum asserit Amarellæ, siue Matricariæ succum unciarum quatuor pondere haustum utranque bilem, ac priuatim de-  
cere, aperte quidem fatetur hanc esse Parthenium, cui priuatim ea uis inest. Attamen paulo post eorum fortè obuijs, argumentis quibusdam satis, mea quidem sententia, leuibus contrà asseuerat, nil aliud esse Parthenium, quàm solum Brusaculum. Ruellius præterea quanuis in primis Artemisiæ generibus planè Dioscoridi subscribat; in tertio tamen hallucinatus deprehenditur, quod tertij generis Artemisiam eam esse putet, quam alij Athanasiam, alij Tanacetum appellant. Siquidem Tanacetum nostrum stolonibus compluribus ab una tantum radice prosilit, crassius, albis, et firmis: folijs longis, amplis, crebris diuisuris dissectis: floribus luteis, in caulium cacumine gregatim emicantibus. Porro Artemisia, quæ tertio adscribitur generi, tenuis herbula est, uno duntaxat caule, ipsoque minuto consurgens. Hanc equidem (ut ingenuè fatear) hætenus in Italia non inueni, neque ab aliquo inuentam uidi. Quin potius eam inuentu difficillimam duxerim. quippe cum tam Dioscorides, quàm Plinius satis obscure, perplexeque de ea scripserint, et caulis, foliorum, florum, seminis, et radice notæ silentio inuoluerint, non modò difficillimum uidetur; sed uix etiam fieri posse putauerim, ut quis unquam hanc Artemisiam legitime demonstraret. Neque tamen in hoc audiendus est Plinius, qui (ut supra diximus) hanc esse Ambrosiam falsò memoriæ prodidit. Nam præterquam quòd rationi consentaneum non est, quòd Dioscorides duobus tam propinquis capitibus unius, et eiusdem plantæ historiam tractauerit, euidentissimum est, Ambrosiam sequenti capite descriptam huius tertie Artemisiæ descriptioni baud quaquam respondere.

Ad hæc non in minori, quàm Brasauolus, et Ruellius, uersantur errore Monachi illi reuerendi, qui Mesium commentati sunt. quippe qui et hunc, et illum secuti duplici hallucinatione scriptis tradiderint, Matricariam uulgo uocatam omnino esse minorem Artemisiam, Tanacetum uero eam, quæ unicaulis dicitur. In horum denique opinionibus, uel potius erroribus ipse quoque Fuchsius implicatur, uir alioqui ingenio, et eruditione præclarus, adeo ut etiam nemini dubitandum esse censeat in suis de stirpium historia commentarijs, quin Matricaria sit alterum Artemisiæ genus, Tanacetum uero tertium. qua in re is fortasse fuit, qui maluerit cum alijs errare, quàm solus rectè sentire. Ceterum facile credidere nonnulli diligentissimi simplicium medicamentorum inquisitores, ac etiam Dioscoridis studiosi, qui sanè nulli unquam labori pepercerunt, ut hanc medicinæ partem superiori ætati obscuram nostræ illustrem redderent, tertium Artemisiæ genus in Dioscoride ascititium esse. Quòd in huius capituli initio non tria, sed duo tantum esse Artemisiæ genera scribat Dioscorides. Quòd præterea reperiantur huius auctoris codices antiquissimi, in quibus illa de tertio Artemisiæ genere non leguntur. quemadmodum etiam in nostro ex impressis libro, in quem castigatones ex uetustorum exemplarium manuscriptorum Dioscoridis, et Oribasij collatione excerptas collegimus: quas acceptas refert Gabrieli Falloppio Mutinensi medico clarissimo, nunc Patauij summa cum omnium laude, et admiratione, corporis humani, et rei medicæ materiam proficenti. Cui certè ob eius singularem in me amorem ac liberalitatem, atque etiam in omnes humanitatem, me plus debere scio, quàm aut re, aut uerbis respondere possum. Cum itaque (ut eò redeam, unde obiter digressus sum) in Dioscoride suspecta sit tertia Artemisia, nil mirum uideri debet, si in eius historia cæcutiuit Plinius. Neque item mirandum est, si eius non meminerunt Galenus, et Paulus: qui tamen alioqui in simplicium censu Dioscoridis scripta bona fide referre solent. Non desunt insuper doctissimi uiri, et in plantarum historia diutius uersati, qui Artemisiæ tenuifoliæ caput Dioscoridi accreuisse, atque adulterinum esse censeant, hoc ducti argumento, quòd cum superiore capite de omni Artemisiæ genere differuisset Dioscorides, absurdum quippe esset, quòd seorsum Artemisiæ genus aliud subiungeret. Addunt etiam, quòd huius Artemisiæ inter simplicia nusquam meminerint Paulus, Oribasius, et Serapio, qui tamen (ut paulò antè dixi) illa ex Dioscoride transcribunt. Horum sententiam etsi planè probandam existimem; cum tamen uulgati Græci codices hoc loco Artemisiæ tenuifoliæ caput habeant, illudque à quibusdam reddatur, nobis quoque adiciendum, eiusque aliquam saltem mentionem faciendam dari: præsertim quòd non desint, qui id Artemisiæ genus inueniri tradant. Siquidem Ruellius est autor, ipsum in Gallia uisci circa riuulos, aggeresque, item in frumentaceis agris, atque inibi uulgo diui Ioannis herbam nominari. Verum cum difficillimum esse putem, ut hæc planta ab aliquo cognoscatur, et legitime demonstretur, quòd nullis prorsus notis designatur, nescio equidè quomodo Ruellio uiro alioqui fide digno in hoc quis rectè adstipulari debeat, aut merito possit.

Quoniam tantum generum Artemisiam fecit, eorumque uires reddidit Galenus libro v. simplicium medicamentorum, his uerbis. Duplex quidem est herba Artemisia. Vtraque excoctat, et modicè desiccatur: et sunt, quòd ad calcinationem attinet, excessus secundi: quòd uero ad resiccationem, aut primi intensi, aut secundi incipientis. Sunt autem et modicè tenuium partium. Itaque ad renum calculos mediocriter commode sunt, et ad fomentationes uteri.

#### Αμβροσία. AMBROSIA. CAP. CXII.


AMBROSIA pusillus frutex est, ramosus, trium palmorum altitudine: folijs rutæ, circa inum caulem exiguis: cauliculi feminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquam florem pariunt, odore uinoso, suauis: radice tenui, sesquipedali. Coronantur ea Cappadoces. Vis eius reprimere, ac repellere, et illitu adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.

Ambrosiæ cō-  
sideratio.

ET SI in nostris illis commentarijs, quos primùm superioribus annis Italica lingua conscriptos edideram, ingenuè confessus essem, me nunquam uidisse Ambrosiam in Italia; postea tamen ea uarijs in locis se mihi obtulit inspicienda, præsertimque secus mœnia arcis Vipacæ (locus enim is distat à Goritia circiter uiginti millia passuum) inter durisces



## AMBROSIA.



BOTRYS.

durissimos lapides orta. Cui ciam inibi ex tempore obuiam factus essem, eamq; conspexissem, botrys modo, racemoso semine rebrtam, statim inclinavit animus, ut certo ducerem hanc esse Ambrosiam. Ea quamvis à Dioscoride, & Galeno non alijs representetur uiribus, quam ut reprimere, repellere, & illius adstringere ualeat humores, qui in aliquam partem decumbunt; dixeretamen non poetæ solum, sed plantarum quoque scriptores non contemnendi, nulla alia de causa præstantissimam hanc plantam à ueteribus Ambrosiam fuisse uocatam, quam quòd suo in cibus usu longæuos faciat homines; quemadmodum Ambrosiam illam, quæ Deorum fertur cibus, Deos immortales, perpetuosq; conseruare fabulantur. Ambrosiæ meminit Plinius libro xxvii. cap. iiii. ubi eam ijs uerbis depinxit. Ambrosia uagi nominis est, & circa alias herbas fluctuans, fruticem unum habens densum, ramosum, tenuem, trium fere palmorum, tertia parte radice breuiore, folijs rutæ circa imum caulem. In ramulis semen est uuis dependentibus, odore uinoso, qua de causa botrys à quibusdam uocatur, ab alijs artemisia. Coronantur illa Cappadoces. Vfus eius ad ea, quæ discuti opus sit. hæc Plinius. Ambrosiæ quoq; facultates, sed quam breuissimè, tradidit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Ambrosia cataplasmate imposita uim habet adstringentem, ac repellentem.

Ambrosiæ uires ex Gal.

## BOTRYS. BOTRYS. CAP. CXIII.

*Evambrosia*

BOTRYS fruticosa herba est, lutea tota, & in multis alas sparsa: semen circa totos ramulos prouenit: folia cichorio similia. tota suauem odorem spirat, quare uestimentis interponitur. Inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Pota orthopnoeas mulcet. Hanc Cappadoces ambrosiam uocant, alij artemisiam.

LEGITIMA, & uera Botrys sabulosis, & aridis gaudet, quin & glareosis fluuiorum aluicis. Ideoq; Tridenti frequentissima nascitur secus Fersinam, & Lauisium rapidissimos torrentes, & in alijs quam plurimis locis. Goritiæ mulieres Botryn in hortis ferunt, quod eam uteri affectibus opitulari existiment. Fruticat hæc folijs cichorii, laciniatis, sinuosisq; quercuum foliorum similitudine: ramis numerosis, tenuibus, semine copiosissimo, racemosoq; refertis. Planta tota succo quodam resinoso madet, adeo ut comprehensa resinæ modo manibus hæreat. Odorem quidem acrem spirat, & qui nares quodammodo feriat, sed tamen is suauitatem retinet. Plinius uidetur ex Dioscoride Botryn reddidisse libro xxvii. cap. viii. ubi eam in hunc modum descripsit. Botrys fruticosa herba est, luteis ramulis: semen circa totam nascitur: folia cichorio similia. Inuenitur in torrentium ripis. Medetur orthopnoicis. hætenus Plinius. Ceterum huius herbe, quod equidem legerim, nõ meminit Galenus in simplicium medicamentorum censu. Eius tamen facultates ex Dioscoride retulit Paulus lib. vii. ubi sic inquit. Botrys, quam alij ambrosiam, alij artemisiam uocant, planta est admodum odorata. Hæc cum uino pota nõ nisi recta ceruice spirantibus, quos orthopnoicos appellant, auxiliatur.

Botryos consideratio.

Botryos uires ex Paulo.


## GERANIVM. CAP. CXIII.

*Geranium*

GERANION folijs anemones, diuisuris longioribus: radice subrotunda, cum estur dulci. Quæ drachmæ pondere in uino pota vuluæ inflationes discutit. Geranium alterum caulibus minutis, & pilosis,

GERANIVM PRIMVM.

GERANIVM ALTERVM.



GERANIVM TERTIVM.

Geranij con-  
sideratio.



sesquipedalibus: folijs maluæ. in summis alis sursum  
spectantia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut  
canini dentes. Nullius in medicina usus.

Dvo tantum Geranij genera à Dioscoride traduntur. Ve-  
rion Latini, Plinio autore, tertium genus addere videntur, quod  
alterum quidem eorum à Græcorum descriptione differat. Id quod  
ipse Plinius aperte testatur lib. xxv i. cap. xi. ubi de Geranijs dis-  
ferit ijs uerbis. Geranion aliqui myrrhim, alij myrrida appel-  
lant. Similis est cicutæ, folijs minutioribus, et caule breviori, ro-  
tundo, saporis, et odoris iucundi. Nostri sic eam tradunt. Gre-  
ci folijs candidioribus, paulo quam maluæ minoribus: caulibus te-  
nuioribus, pilosis, ramosam ex interuallis, binum palmorum, et  
in ijs folijs, inter quæ in cacuminibus capitula sunt gruum. Alie-  
rum genus folijs anemones, diuisuris longioribus: radice uero  
modo rotunda, dulci. hæc Plinius. Ex quibus facile colligi potest,  
tria esse Geranij genera, Romanis unum, Græcis uero duo. Quæ  
omnia hodie passim ferè uisuntur in campestribus, secus uias, et  
iuxta sepes. Porro non desunt, qui putent eam herbam, quam scri-  
bit Plinius Geranium à Latinis uocari, à Dioscoridis myrride nō  
differre. Ipse tamen non dubitandū existimo, quin hæc illa sit her-  
ba, quam quidam Rostrum tum gruis, tum ciconiæ appellant, qui-  
dam uero Acum muscatam, eo quod (ut Plinius inquit) odorem in-  
cundum spiret. Namq; assurgit hæc folijs cicutæ, minoribus tamen  
diuisuris: caule breui, ac rotundo: semine gruum capitulis con-  
tento, à quibus Geranij nomen omnibus inditum est. Ceterum Ge-  
ranium, quod Dioscoridi secundo loco proditur, caulibus minutis,  
pilosis, sesquipedalibus, folijs maluæ, in summis alis gruum capi-  
tula gerens sursum spectantia cum suis rostris, nunquam debet  
ueri

sciri eam esse herbam, quæ *Pes columbinus* vulgò nominatur, quòd nullis prorsus reclamantibus notis hæc illi re-  
 ferret. Alterum uerò, primo scilicet loco descriptum, et in Ananiz uallis agro, et ubique ferè locorum passim  
 fruente, folijs anemones modo laciniatis: floribus in purpura albicantibus, è quibus grauius capitula prodeunt: ra-  
 dice dicitur, ferè rotunda, ac dulci. Quapropter Ruellium hallucinatum crediderim, quòd Acum muscatam dictam, Ruellij erra-  
 tam. Ipse herbarijs etiam Acum pastoris appellari ait, primi generis Geranium Dioscoridi esse opinetur. Quando-  
 quæ Acum muscatam radice non nittitur rotunda, ac dulci, nec folijs uisitur anemones æmulis: sed eam plane repræ-  
 sentare, quam Plinius testimonio, Latini Geranium uocant. Præterea aduersus Hermolaum eos reprehendit Ruellius,  
 qui putant secundum Dioscoridis Geranium eam esse herbam, quam quidam à rubro foliorum colore *Rubertam* ap-  
 pellant. Sed ipse mihi magis reprehendendus uidetur, quòd crediderit Rubertam esse legitimam Myrrhim. De Ru-  
 bertam autem, ut dicam quod sentio, eam quidè illius Geranii genus esse arbitror, quod Plinius ad Latinos retulit, cum  
 ipsa tota illi sit similis, odorem iucundum reddat, flores proferat subpurpureos, et gruinis capitulis scateat, reliquo-  
 rum Geraniorum more. Verum hanc non ita Myrrhidem referre comperio, ut Ruellius existimat. Siquidem Myr-  
 rham folijs admodum rubentibus, et gruino capite nasci, nec Dioscorides, nec alij, quod legerim, memorie prodide-  
 runt. Myrrhis enim folijs est cicutæ: radice rotunda, molli, cibis non insuauis. at his omnibus Ruberta caret, ut libro  
 quarto clarius patebit. Porro tamen Hermolaus ab errore, quantum reor, uindicari non potest, quòd scripserit, Hermolai la-  
 psus.  
 Geranium id esse Latinis, quod Dioscoridi myrrhis, Plinij fortasse lectione deceptus, qui loco supra citato Latinis  
 vocant Geranium à quibusdam Myrrhim appellari scriptum reliquit: quanquam legitimæ Myrrhidis historiam  
 tractat libro xxiiii. cap. xvi. Nec sanè mirum est, Plinium scripsisse Geranium aliquibus uocari Myrrhim, cum  
 tamen à Grecis fuerint, qui Geranium, quod secundo generi adscribitur, Myrrhim appellauerint, ut uidere est in ijs  
 Dioscoridis exemplaribus, in quibus cuiusq; capituli initio innumera plantarum nomina leguntur. Fallitur quoq; Brasauoli er-  
 ror.  
 hæc in historia Brasauolus, asserens nullo modo ijs esse adstipulandum, qui Pedem columbinum uocatum Geranium es-  
 se contendunt, quòd Geranium folijs exeat maioribus anemones incisuris. Sed is, meo quidem iudicio, ignorasse uide-  
 tur, quòd secundum Geranii genus, non autem primo generi à Dioscoride assignatū, est illud, quod *Pes columbinus* cen-  
 setur. Vel fortasse dum hæc scriberet, alterum Geranii genus non animaduertit in Dioscoride, quòd tunc lectionis im-  
 patiens, totum illius caput non perlegerit. Aliam ab his Geranii plantam uidimus in pluribus hortis, ac uiridarijs  
 satam, folijs rotundis, secundi Geranii modo per ambitum laciniatis, maluum magnitudine æquantibus, fructu gruinis  
 capitulis simili. Hanc herbariorum nonnulli Momordicam nuncupant, quemadmodum et Balsaminam alij eodem no-  
 mine uocant: eamq; ceteris præferunt in potionibus ad interna uulnera glutinanda. Hæc, mea quidem sententia, ma-  
 gis respondet alteri Dioscoridis Geranio, ut quæ folijs ad maluum propius accedat. Quare et hanc magis eandem es-  
 se cum illo putauerim. Veruntamen haud eam inficias, quin *Pes columbinus* dictus idem sit Geranium: sed eum quis  
 rectius fortè Geranium minus dixerit. Primi Geranii radix (ut Plinius est author) rescipientibus se ab imbecillitate  
 insidiosa est. Bibitur contra phthisim drachma in uini cyathis tribus bis die: item contra inflationes. quæ et cruda  
 idem præstat. Succus radicis auribus medetur. Opisthotonicis semen drachmis quatuor cum pipere, et myrrha po-  
 tum. Secundum uerò Geranium etsi nullius esse in medicina usus scriptis tradiderit Dioscorides; non desunt tamen ho-  
 die herbarij, qui in internis uulneribus glutinandis, et fistulis sanandis ipsum in potionibus sumptum, mirificè cōmen-  
 dent. Sed equidem uereor, ne et hi decipiantur, Serapionis interpretem secuti, qui Amomum Pedem columbinum ap-  
 pellauit. quippe quoniam propria sit Amomi facultas internis corporum uulneribus mederi. Geranii non reperio  
 meminisse Galenum in simplicium medicamentorum libris. Eius quidem meminit Paulus, sed ea tantum de Geranijs  
 posteritatis memorie mandauit, quæ ex ipso Dioscoride sumpsit.

## Γναφαλίον. GNAPHALIVM.

## CAP. CXV.

GNAPHALII folijs albis, mollibusque aliqui pro tomento utuntur. Bibuntur efficaciter  
 folia in uino austero ad dysenteriam.

GNAPHALII historiam adeò paucis perstrinxit Dioscorides, ut nobis non modò difficile, sed etiam impossi-  
 bile uideatur, ut quisquam conijcere, ac decernere possit, quænam planta sit, quæ uerum Gnaphalium representet:  
 præsertim cum antiquorum hætenus repperim neminem, qui Gnaphalii faciem longiori historia exprefferit. Ete-  
 nim Plinius eadem, quæ Dioscorides, breuitate usus, Gnaphalii notas reddidit libro xxvii. cap. x. Fuchsius tamen in  
 sua clarissimis de stirpium historia commentarijs herbam quandam pro Gnaphalio ostendit, quam ideo fortasse Gna-  
 phalium existimauit, quòd incana, tomentosaq; conspiciatur. Sed mihi planè eam Fuchsius pro Gnaphalio depinxisse  
 metetur, quam Plinius libro xxiiii. cap. xix. Herbam impiam uocari tradit: quæ meritò IMPIA Plinij dici posset,  
 quòd eius è ueteribus nemo, quantum equidem legerim, præter ipsum meminerit. De qua is differens loco modò cita-  
 to, eam ijs notis, et uiribus descripsit. Herba impia uocatur incana, roris marini aspectu, thyrsi modo uestita, atque  
 capitis. Inde alij ramuli assurgunt, sua capitella gerentes. Ob id Impiam appellauere, quoniam liberi super paren-  
 tem excellent. Alij potius ita appellatam, quòd nullum animal eam attingat, existimauere. Hæc inter duos lapides  
 trita seruet, præcipuo aduersus anginas succo, lacte et uino admixto. Mirumq; traditur, nunquam ab eo morbo ten-  
 tari, qui gustauerint. Itaq; et subus dari, quæq; id medicamentum noluerint haurire, eo morbo interire. Sunt qui  
 et in auium nidis inferi aliquid ex ea putent, atq; ita non strangulari pullos auidius deuorantes. hætenus de Impia  
 Plinius. Ceterum quoniam Gnaphalium ob eius tomentum, illud candidissimum uellus, quod vulgò nos appellamus  
 Bambagia,  
 Gnaphalii cō-  
 sideratio.  
 Impia herba  
 Plinij.

Xyli historia,  
& uires.

Bambagia, & alij Cotone, Latini uero Xylon, & Gossipium, mihi in mentem redegit, à ueteribus Grecis nusquam, quod sciam, descriptum; ideo hic de eius historia, ac uiribus latius differendum duxi, quam fecerim in lni meo, ubi eius quoque memini. De hoc itaque Plinius lib. xix. cap. i. sic loquitur. Superior, inquit, pars Aegypti in Arabiam uergens gignit fruticem, quem aliqui Gossipion uocant, plures Xylon, & ideo lina inde facta xyliua. Paruaque, similemque barbatae nuci desert fructum: cuius ex interiore bombice lanugo netur. Nec ulla sunt ei in candore, molitiue preferenda. Vestes inde sacerdotibus Aegypti gratissime. hæc Plinius. Hac etate Xylon scribitur etiam in Cypro, Creta, & Sicilia insulis, ubi copiosissimum prouenit: quin & in Apulia, alijsque regionibus nascitur. Hæc lanugo manifestè excalfacit, ac siccatur. quæ si comburatur, mirum in modum manantem è uulneribus sanguinem sistit. Seminis medulla tussis, & difficulter spirantibus auxiliatur: genitale semen procreat, proinde uenerè stimulat. Oleum ex ea exprimitur, quo tum lentigines in facie, tum etiam ceteræ cutis maculæ optime delentur. Sed ut iam Gnapthio suas ex Galeno reddamus uires, eas ipse lib. vi. simplicium medicamentorum, his uerbis retulit. Gnapthium ita sic nominatum est, quod folijs eius mollibus aut γναφαλαον, hoc est, pro tomentis utantur. Sunt autem candida, & mediocriter adstringunt: ac proinde quidam id exhibent, ex austerorum uinorum quopiam, dysentericis.


Gnapthij uires  
ex Gal.

Τύφη. ΤΥΦΑ.

CAP. CXVI.

ΤΥΦΑ folium edit cyperidi simile: caulem album, læuem, æquabilem: florem in cacumine ambitum, densum, qui in pappos soluitur, quod paniculam aliqui nominant. Huius herbæ flos suillo adipe eloto exceptus, ambustis medetur. Gignitur in palustribus, & aquis stagnantibus.

Typhæ con-  
sideratio



Typhæ usus,  
& uires.

ΤΥΦΑ planta est in Italia uulgaris, notiorque omnibus, quam ut eius effigies explicari debeat. Ea in paludibus, stagnis, & lacubus frequentissima prouenit, ita ut rarè admodum sint stagnantes aquæ, quæ Typha non scateant. Claua, quam in læuissimo caule gerit, à nostris Hetruscis Mazza sorda uulgo dicitur, quod eius lanugo, si in aures decidat, surditatem afferat.

Expetuntur clauarum pappi infimæ gentis hominibus plurimum uice ad grabatos farciendos. Foliorum uero usus ad conuersionem uitrea uasa, & ad muliebres cathedras tendendas: quin et ad tegetes parandas. Typhæ pappis, additis betonicæ folijs, & gladioli, ac hippoglossi radicibus, omnibus in puluerem tenuissimum redactis, & affatis ouorum luteis exceptis, utuntur quidam feliciter ad enterocoelas. Id autem medicamentum exhibent quotidie ieiunis drachmæ pondere triginta dierum spatio: eoque nos modò pueros, adolescentesque sanari pollicentur; sed etiam iuuenes iam etate cõsistentes: si tamen interim præstanti ligaturæ, & emplastris glutinantibus ima pubis pars probe muniatur. Typhæ meminisse Galenum in simplicium medicamentorum censu, non uenio. Eius tamen meminit Theophrastus libro primo cap. xiii. de platarum historia, ubi inter enodes palustrum locorum platas Typham quoque recensuit.

Κίρκαια. CIRCÆA.

CAP. XCVII.

CIRCÆA, quam & dircæam aliqui uocant, folijs est hortensis solani, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semine milij, nascente in quibusdam ueluti corniculis: dodrantali radice, triplici ferme, aut quadruplici, candida, odorata, excalfaciente. Nascitur in apricis, faxis, & uento perflatis. Radicis tussæ pondo quatuor, in sextarijs tribus uini dulcis per diem, & noctem macerantur, potuque triduo uulvas expurgant. Semen in forbitionibus datum lætè mammæ nutricum explet.

Circææ con-  
sideratio.

HAVD equidem ausum affirmare, an Circæa hodie inueniri possit in Italia: quanuis ea antiquis fortasse notissima fuerit. Siquidem nulla hactenus se mihi obtulit planta, neque alijs, quod sciam, quæ Circæam representaret. Ceterum credidere nonnulli banc sibi Circææ nomē comparasse, quod Circæa uenefica in suis ea uteretur ueneficijs, uel quod fortassis eius fuerit inuentrix, à Sole patre plantarum omnium genitore edocta. Quod etsi nonnullis uerisimile præcitur; cian tamen à nemine Circæam his polle uiribus proditum sit, aliunde potius id nominis sibi uendicasse existimandum. Meminit Circææ Plinius lib. xxvii. cap. viii. ubi eam his notis, ac uiribus depinxit. Circæa stricno (hoc est, solano) satiuo similis est: flore nigro, pusillo: paruo semine, ut milij, nascente in quibusdam corniculis: radice

semipetala

triplici ferme, aut quadruplici, alba, odorata, gustus calidi. Nascitur in apricis saxis. Diluitur in uino, ad dolorem uulue, & uitia. Macerari oportet in sextarijs tribus quadrantem radicis tuse per noctem, & Trabit eadem potio secundas. Semine lac minuit in uino, aut mulsæ aqua pota. Hæc Plinius, qui illa omnia se- re ab ipso Dioscoride mutuatus est. Est ab eo in hoc magno, ut puto, errore dissentiat, quod Circæ semen in uino, et mulsæ aqua potum lac minuere tradat, cum potius, teste Dioscoride, ipsum eliciat. Qua in re Plinius non modò Dioscoridi refragatur, sed ipsi quoq; Galeno. qui de Circæ uiribus differens libro VII. simplicium medicamento- ram, sic inquit. Circæ herbæ radicem scribit Dioscorides ex uino dulci potam secundas expurgare. Est enim boni odoris, & excafactoria. Semen autem eius in sorbitione exhibitum, ad lactis generationem conducit.

Plinij lapsus.

Circæ uires  
xe Galeno.

## OENANTHE.

## CAP. CXVIII.

OENANTHE folia habet palmatæ: florem candidum: caulem crassum, palmi altitudine: se- men atriplicis: radicem magnam, in multa rotunda capitula extuberantem. nascitur in petris. Huius semen, caulis, & folia cum mulso uino pota, secundas eiiciunt. Radix è uino urinæ stilli- cidio conuenit.

OENANTHEN, cuius hic Dioscorides meminit, Theophrastus libro VI. cap. VII. de plantarum historia, & Plinius libro XXI. cap. XXIIII. non equidem hætenus reperi, ac uidi in Italia, etsi in ea indaganda non parum la- boris insumpserim. Fuchsius, & recentiorum herbariorum pleriq; Oenanthem eam esse herbam existimant, quæ ho- die passim Filipendula uocatur. Quorum certè sententiæ, quanuis uirorum magnæ apud me auctoritatis, nunquam potui subscribere. quod Filipendula hæc magna nusquam, quod inuenerim, radice nitatur, quæ rotundis extuberet capitibus: quod semen non ferat atriplicis: quod deniq; nō in petris, sed in pratis, & læto ubiq; solo proueniat. Qui- bus sanè rationibus non potui non adduci, ut apud Dioscoridem aliam omnino à Filipendula Oenanthem semper esse crediderim. Oenantes uires, quas descripsit Galenus in simplicium censu, non licuit mihi reperire. Ceterum Fi- lipendulam non uulgaribus pollere uiribus, testantur recentiores. Ea enim urinæ remoratui, eiusq; stillicidio auxilia- tur: item renum tum calculis, tum doloribus. Eadem stomachi inflationes discutit. Medetur suspiriosis, & anhelan- tibus, omnibusq; in uniuersum morbis, quos causa frigida excitauerit. Prodest comitialibus insperso. cibus radicem puluere.

Oenantes  
consider.

Filipendulæ  
uires.

## CONYZA MAIOR.

## CONYZA MINOR.



Κόνυζα.



## CONYZA MEDIA.

## Κόνυζα. CONYZA. CAP. CXIX.

Conyze con-  
sideratio.

CONYZAE duo genera. quæ parua uocatur, odore præstantior est: maior uerò frutice altior, & folijs latioribus, graui odore. Vtriusq; folia oliuæ similia, hirsuta, pingua. in maiore caulis binum cubitorum altitudine attollitur, in minore pedem æquat. flos fragilis, lutei coloris, qui in pappum abit. radices supernacæ. Suffitu, substratuq; frutex totus serpentes fugat, culices abigit, & pulices necat. Folia conuenienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis, ac vulneribus. Flores, & folia cum uino ad menses, partusque eiiciens bibuntur: item contra urinæ stillicidia, arquatum morbum, & tormina: comitiales pota ex aceto adiuuant. Decoctum in defensionibus medetur vuluæ malis. Impositus succus abortum facit. Herba ex oleo efficaciter horribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat. Est & tertium conyza genus, caule crassiore, & molliore: folijs mediæ inter maiorem, & minorem amplitudinis: minimè pinguis; multò tamen grauioris odoris, & iniucundioris, sed inefficacior. Prouenit locis humentibus.

CONYZAE omne genus non in Hetruria solum, sed alibi quoq; passim ferè prouenit, nullis prorsus reclamantibus notis, quæ earum singulis à Dioscoride tribuuntur. Conyza maior uulgo Pulicaria dicitur, quia substrata (ut Dioscorides inquit) pulices necat. Qua fortasse ratione adductus Theodorus in Theophrasto Conyzam Pulicariam interpretatur. Meminit autè Conyze Theophrastus lib. v. cap. ii. de plantarum historia, ubi de eius generibus differit his uerbis. Conyza mascula, & femina constat. Di-

stant quemadmodum cetera, quæ sic discerni desiderant. Femina enim tenuiori uestitur folio, & compressior est, atque in totum minor. Mas amplior, crassiorq; caule, atq; ramosior, & folium amplius, pinguiusq; habens: necnon & flore splendidior est. Ambo fructifera sunt, in totum serotina germine, floreque constant: quippe cum circa æstuum, & post æstuum incipiant. Mari grauior odor: femina acrior, ideoque contra bestiarum morsus commodior est. hæc Theophrastus de duplici tantum Conyza genere. Ceterum tertia eius species, cuius à Dioscoride sit mentio, inter marem, & feminam media est. Nascitur hæc in Ananie uallis agro, & in Goritienfi comitatu copiosissima, humentibus præsertim locis, & secus uias, ubi ex agrorum marginibus aqueus humor stillicidio quodam in proximos defluit canales. Conyze uires posteritatis memorie prodidit Galenus lib. vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Conyza & maior, & minor adsimilis sunt tum temperaturæ, tum facultatis: gustui amara, & acris apparent. Excalfaciuntq; admodum luculenter, siue quis folia læuigata cum teneris ramulis (est enim fruticosa planta) parti cuiuspiam illinat, siue ubi in oleo coxerit, eo utatur. Siquidem concussiones, siue rigores per circuitum redemptes, tale sanare oleum uidetur. Flores quoque eorum adsimilis sunt facultatis. Itaque quidam, & ipsos cum folijs tritis in uino bibendos exhibent ad menses fortiter ducendos, ciendumq; foetum. Est & tertium Conyze genus, in locis humidioribus proueniens, utrisque illis tum graueolentius, tum imbecillius. Sed primæ memoratæ tertij sunt ordinis in excalfaciendo, & exiccando.

Conyze uires  
ex Gal.

## Ημεροκαλλίς. HEMEROCALLIS.


## CAP. CXX.

HEMEROCALLIS folium, & caulem habet lilij, herbacei coloris ut porrum: flores in caule per singulos exortus, terni aut quaterni erumpunt, lilij diuisura, quoties dehiscere coeperunt, colore perquam pallido: radix magna est, atque bulbosa. Quæ pota, aut cum melle, & lana in pello apposita, aquam educit, & sanguinem. Folia trita mammarum inflammationes à partu contractas, oculorumque collectiones mitigant. Radix, & folia igni ambustis utilissimè illinuntur.

Hemerocallis  
consider.Quorundam  
error.

HEMEROCALLIS nusquam non prouenit in Italia. quandoquidem circa messem in aruis inter segetes, in pratis, in montibus, & in uallibus aureo colore emicat. Vulgus Lilium sylvestre nominat. Radice nititur bulbosa, hortensi lilio persimili, sed colore diuersa. Flores, cum suo tempore dehiscunt, colore perquam pallido (ut Dioscorides ait) conspiciuntur, adeo ut fulgentis auri modo rutilent. Hinc itaq; eorum error, ut arbitror, euidentissimè deprehenditur, qui Lilium conuallium uulgo dictum Hemerocallim esse existimant. Namq; illud folijs constat ferè plantaginis, tenuioribus tamen, minusq; striatis. cauliculis iuncis, tenuibus, ac mollibus: in quibus cacumen uersus præ-

## HEMEROCALLIS.



LEVCOIVM.

prodeunt flores albicantes, balauftij, & arbuti effigie, odore perquam iucundo. Radices demittit laxas, longas, fibris, capillis lomentisq; refertas, nullis adiacentibus bulbis. Hemerocallis uero, Dioscoride teste, folia, & caulem profert lilio similia: flores colore admodum pallido: radicem magnam, bulbosamq;. Que sanè notè, si diligenter conferantur, manifestissime indicabunt, eos hallucinari qui Liliū conuallium Hemerocallim esse contendunt.

Lilij conuallij magnus apud Germanos in medicamentis est usus (abundat enim eo maxime Germania) ad uarios corporis morbos: Aiunt eo roborari cor, cerebrum, & omnes principes facultates: Idcirco resolutis, comitialibus, conuulsis, ueriginosis, animi deliquio correptis, & cordis pulsatione concussis, ipsum exhibent. Quin & ictis, seu commorisis à uenenosis animalibus prebent: Item agrè parturientibus, oculorumq; inflammationibus maximo esse auxilio prædicant. Consciunt autem ex floribus per æstatem siccatis uinum uindemiæ tempore, ipsos calcatis uuis admiscentes, quo postea utuntur ad prædictiona. Sunt & qui recentes flores uetere uino macerent, & in uitreo uase diu insolent, admixtis lauendule uocatæ, & roris marini floribus, additisq; odoramentis nonnullis: deinde ex ijs stillatitiam aquam in calentis aquæ balneo uitreis organis eliciunt, eamq; aureis, argenteisq; uasculis reponunt. Hanc aquam auream appellant: qua utuntur ad omnes prædictos corporis affectus. Quinimò eam iamiam animam expirantis ori inferunt, rati ex eius assumptione homines morientes, in uita retineri posse per plusculum temporis spatium: Sed quàm uana isti ferantur opinionione, mihi quidem sæpenumero experimèto deprehensum est. Quod etsi ijs quoq; irritum comperitur; ea tamen est huiusce aquæ apud omnes auctoritas, ut pleriq; ab eius exhibitione abstinere nequeant, etiam in morbis calidissimis. Hemerocallis meminuit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, sic inueniens. Hemerocalles radicem habet lilij radici similem, non figuratantiam, sed & uiribus. Prodest non secus atque illa, igni ambustis: quippe que leniter digerentem facultatem habeat, & cum hoc repulforium quiddam.

Lilij conuallij uires. *Whij Blum*

Hemerocallis uires ex Gal.

Λευκόιον. LEVCOIVM, SIVE ALBA  
VIOLA. CAP. CXXI.

Leucoion vulgaris est notitiæ. sed in floribus differentia quædam: nanque aut cœrulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur: Luteum uerò præcipui in medicina usus. Huius aridi flores feruefacti in defensionibus, ualent contra vuluæ inflammationes, & menstrua expellunt: sanant oris ulcera, cum melle: cum cerato, rimas sedis. Semen duū drachmarum pondere ex uino potum, aut cum melle inditum, menses, secundas, & partus extrahit. Radices cum aceto illite, lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

Leucoion etsi Latinis albam tantum uiolam ipso nomine significat; tamen à rei herbarie autoribus & pro cæteris uiolarum generibus, luteo scilicet, purpureo, cœruleoq; colore distinctis, sæpe usurpari solet. Id hodie officinis, atque etiam medicis ijs, qui Arabum factionem sequuntur, horum uoce. Cheiri nūcupatur. Leucoium omne serè genus in Italia in hortis, ac uiridarijs, in ædium fenestris, parietibusq; frequentissimum uisitur: ubi illud in figulinis, ac ligneis uasis mulieres studiosè colunt, ac fouent. Namq; eius flores cum coloris uarietate, tum odoris suauitate tantam cum oculis, & naribus inuicant gratiam, ut in cor-  
namentis

Leucoij consideratio.



Dioscoridis  
locus suspen-  
sus.

Leucoij vires  
ex Galeno.

namenta frequentissime addantur. Porro non temere omne fere genus Leucoij in Italia nasci modo diximus. quod quidem caeruleum inibi, quod sciam, non prouenit. Quamobrem Marcello Dioscoridis interpreti subscribere puto, qui Leucoium caeruleum hoc loco accreuisse suspicatur, uetustissimi Latini Dioscoridis Longobardis inter scripti testimonio nixus, in quo nullum planè de caeruleo Leucoij colore uerbum legebatur. Suspicionem hanc argui, itaq; esse comprobant Oribasius, et Serapio, quos item id uerbum hoc loco non habere comperio in simplicium conspectu, cum alioquin reliqua Dioscoridis refrant. Ceterum ex Leucoio, siue ex albis uiolæ floribus, utpote quæ cæteris odore præcellant, Persæ odoratum illud unguentum parant, quod lasminum appellant, ut primo libro in ipsius lasmini unguenti mentione ostendimus, ubi eorum sententiam refutauimus, qui è floribus Gelsimini uulgò uocati id fieri contendunt. Leucoij vires tradidit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Leucoij fructus uersus extergentem facultatem possidet, ac tenuium partium est: plus tamen flores, et inter hos qui sunt sicciore, magis etiam quam uirides, adeo ut et oculorum cicatrices crassas extenuent. Tum menses quoq; decoctum eorum uet, et secundas, foetumq; emortuum elicit: et si bibatur, foetum uiuum perimens, et abigens est medicamentum: quod enim id, ut si quod aliud, amarum. Quod si quis uirum eius uehementiam multa aqua admista retundat, ac muret, ac certe id genus aliquo, habebit et ad phlegmonem bonum medicamentum. Sic decoctum eius si non merum fuerit, utri phlegmonas identidem perfusum sanat, potissimum quæ diutino tempore ad scirrhi modum induruerit. Sic cum crato ulcera egrè ad cicatricem peruenientia curat. Sunt uerò etiam, qui cum melle ad oris ulcera adhibeant. Semen eiusdem sit facultatis, aptissimum est duarum drachmarum mensura potum: tum mensibus ciendis appositi cum melle, conuenire creditur, foetumq; uiuentem interficere, ac mortuum eijcere. Radices similis quoque facultatis, ubi quatenus crassioris sunt essentia, et magis terrene, cum aceto lienes induratos sanant. Nonnulli uerò et phlegmonas in articulis induratas ijs curant.

ΚΡΑΤΑΙΟΓΟΝΟΝ. CRATAEOGONVM. *Floruit* CAP. CXXII.

CRATAEOGONVM, siue, ut alijs placet, crataënon, folijs melampyro simile est, multis calamis ex una radice emicantibus, multorumque geniculorum: femine milij. Nascitur in opacis, & frutetosis parte plurima: summopere acre. Traditum est à quibusdam, hoc si bibat ieiunio ore, ter die post menses purgatos, tribus obolis, in cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptum quadraginta diebus; & uir modo confimili, toridem diebus ante coitum hauriat, uirilis sexus partum futurum.

Crataëgoni  
consider.

QUANVIS: putent nonnulli Crataëgonum esse quandam Persicariæ uocatæ speciem: ego tamen eorum sententia non ausim subscribere, quod Persicaria nullis fere notis Crataëgonum emulati mihi uideatur. Neq; uerò aliam herbam, quæ Crataëgoni effigiem repræsentaret, hactenus reperi, aut repertam uidi in Italia, ubi tamen ipsam nasci non negauerim. Sed certè id inuentu difficile suspicor, quoniam eius descriptio, quemadmodum et sequentis, ab ætibus, qui extant, rei herbariæ autoribus obscura satis, et confusa traditur.

ΦΥΛΛΟΝ. PHYLLON.

CAP. CXXIII.

PHYLLVM, quod elæophyllon uocatur, in saxosis nascitur. duum generum est. Quod autem thelygonum appellant, prouenit musci modo, folio oleæ, sed colore magis herbaceo: caule tenui, breui: radice exili. florè m album profert: semen papaueris, maiusculum. Sed arrhenogonum cætera huic simile, solo fructu distat: habet enim racemosum quiddam deflorentibus oleis non dissimile. Arrhenogonon potu, masculi sexus facere partus, ut thelygonon foeminei, proditur. Horum Crateus author est. Sed huiusmodi historiæ tenus mihi produxisse uisum est.

Phylli consideratio.

LEGITIMVM Phyllum nondum hac ætate, quod sciam, in Italia compertum est: quanquam uidetur Radelius existimasse, Persicariam, quam maiorem cognominant, esse Phyllon. Quam in re is, meo quidem iudicio, aperte delituit: siquidem Persicaria illa humentibus, ac uliginosis locis prouenit, Phyllum uerò in saxosis nascitur, ut Dioscorides testatur. Qui tamen, si eius uerba accurate expenduntur, nullam huius herbe cognitionem habuisse deprehenditur, nisi eam, quam ex Crateus herbarij historia habere potuit, unde fortè ea omnia sumpsit. Quo fit, ut mirari non liceat, si nobis quoq; Phyllum cognitu sit difficile. De quo nihil à Galeno, et Paulo proditum inuenio: id quod haud debet fidem facere potest, non secus illis, ac nobis Phyllum fuisse incognitum. Ceterum non desunt qui uelint Phyllum à Lizonosti, hoc est, Mercuriali non differre, quod pluribus tum notis, tum facultatibus sibi inuicem respondeant. Verum quod cum ijs non possim libere consentire, hæc me maxime animo suspensum detinent, quoniam Mercurialis folijs habet ocimi, helxinæ cognata, non autem oliuæ: florè herbaceum, non album. quod præterea Mercurialis nascitur passim in hortis, et uineis, non in saxosis tantum. quod de his deniq; seorsum diuersisq; capitibus scripserunt Dioscorides, et Plinius, utpote de rebus inter se differentibus. Equidem hoc anno plantam inueni inter saxa in Salustiano monte non longè à Goritia, folio mercuriali crassiore, breuiore, aliquantum in ambitu serrato: femine iam deflorentis oliuæ simili. Quibus utiq; notis ea mihi uisa est satis Arrhenogono suffragari. Sed an uerum fuerit Arrhenogonum pro certo affirmare non ausim.

Opinio quorundam.

Phylli mentio ex Theophr.


Phylli meminuit Theophrastus lib. IX. cap. XIX. de plant. historia, ubi ita scriptum reliquit. Quedam ad procreandum marem, aut foeminam ualere traduntur. Quamobrem Phyllon tum arrhenogonon, hoc est, masculicum, tum thelygonon, id est, foeminificum uocant. Ambo inter se similia sunt, et ocimi speciem referunt. Fructus thelygoni modo musci oleaginei, uerum pallidior: thelygoni uerò sicut oliuæ, cum primum ex masculo flore erigit: geninus modo testiculi hominis. hæc Theophrastus.

TESTICVLV. SPECIES.



TESTICVLV. SPECIES.



TESTICVLVS.



TESTICVLVS.



## Oξυς. TESTICVLVS.

## CAP. CXXIII.

TESTICVLVS, quem Græci cynosorchin uocant, folijs circa caulem, & ima eius parte in terra stratis, oleæ molli similibus, longioribus, angustioribus, læuibus: caule dodrantali: floribus purpureis: radice bulbosa, oblonga, oliuæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: inferiore, quæ mollior, ac rugosior. Eduntur radices coctæ, ut bulbi. Ex quibus si maiorem edant uiri, marces generari dicuntur: si minorem fœminæ, alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollem mulieres in lacte caprino bibere, ad stimulos coitus: aridam uerò ad inhibendos. & alterum alterius potu resolui. Nascitur in petrosif, & sabuletis.

## Oξυς ἑτερος. TESTICVLVS ALTER.

## CAP. CXXV.

TESTICVLVS alter alio nomine serapias, Andrea autore, uocatur: quoniam radix ad multa utilis sit. Folijs est porri, latoribus, oblongis, pinguibus, ex alarum sinu inflexis: caule palmeo: floribus penè purpureis: radice testiculis simili. Quæ illita tumores discutit, ulcera purgat, & serpere eadem non patitur: abolet fistulas, & illitu inflammationes lenit. Aridæ radices nomas inhibent: sanantque putredines, & oris ulcera cacoethe: aluum fistunt è uino potæ. De hac, eadem quæ de testiculo canis, produntur.

## Σατύριον. SATYRIVM.

## CAP. CXXVI.

SATYRIVM aliqui trifolium uocant, quoniam tria fert folia, ad terram infracta, rumici, aut lilio similia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalem, nudum: florem lilij effigie, candidum: radicem bulbosam, mæli magnitudine, fuluam, intus ut ouum candidam, gustanti dulcem, & ori non ingrati. Quam in uino nigro austero bibere conuenit, contra opisthotonum. Utendum ea dum concumbendi incesit cupiditas: siquidem ea proniores ad uenerem fieri affirmant.

## Σατύριον ἐρυθρόν. SATYRIVM ERYTHRONIVM,

## CAP. CXXVII.

EST alterum Satyrium erythronium, siue erythraicon, id est rubrum, semine lini, maiore, duro, leui, splendente. quod fertur non secus atque scincus, libidinem excitare. Cortice radicis gracili, rufo: intus autem album includitur, sapore dulci, non ingrato ori. In montosis, & apicis enascitur. Venerem, ut produnt, si omnino manu teneatur radix stimulat: coque magis, si bibatur in uino.

Satyrii, & Testiculi consideratio. Multorum error.

Palme Christi genera.

Fuch. errata.

Monachorum lapsus.

ERRANT, mea quidē sententia, omnes ferè huius ætatis medici, ac seplastarij: quippe quod Canis testiculis legitimi Satyrii uice passim in medicamentis utantur. Nam hæc plantæ (si Dioscoridi credimus) notis, ac facie maxime inter se distant, quanuis uiribus, & facultate non longè sint dissimiles. Testiculorum enim radices, præter id quod animalium testes representant, oblongæ sunt, binæ, utrinque pendentes: superior tamen altera, quæ plenior est: inferior altera, quæ mollior, et rugosior. Satyrii uerò radix bulbosa, mæliq; modo extuberans describitur colore exterius fulua, interius ut ouum candida, gustanti dulcis, & ori non ingrata. Ceterum uerum Satyrium, ut ingenue fatear, hætenus in Italia uidere mihi non licuit. Testiculorum porro in Ananiensibus montibus, alijsq; compluribus locis non modo duo inueniuntur genera: sed alia quoq; longè plura. quibus & illud addendum esse existimaui, cuius rader humanæ manus similitudinem refert. Vulgus à prædicta radicis figura id Palmam CHRISTI appellat. Auicenna hæc radices Digitos citrinos nuncupat. etsi eas Digitos citrinos esse perperam, nullaq; quod in libro suo legeram, ratione ducti negent Monachi illi, qui in Mesuem commentarios ediderunt. Huius duo in Ananie uallis montibus habentur genera. Vnum maius, quod folia ferè lilij habet, leuia, patula, maculis quibusdam nigris respersa: caule rotundum, leuem: florem spicatum, uarium, in purpura albicantem, odore non ingrato: radices duas, quæ sanè testiculos caninos referrent, nisi raris quibusdam quasi digitis, humanam manum exprimere uiderentur. Alterum minus, quod folijs constat croci: caule dodrantali, iunceo, leuiq; in cuius cacumine flos emicat purpureus, amaranti coloris, qui recens odorem quàm suauissimum reddit. Huius exiccati puluis ex aqua ignitum chalybem experis, epotus (ut perhibent ij, qui ita esse experimento comprobant) dysentericis maxime prodest. Idem aquam præparare aui, quæ per uitrea organa ex ijs elicitor. Radices huic similes, sed quæ alteri magnitudine cedunt. Excussant utriq; (ut auctor est Auicenna) siccantq; secundo recessu. Crassa corporis excrementa pellunt, faciemq; deterunt. Dantur maniacis magno iuuamento: quin & in neruorum affectibus. Seminis puluis drachmæ pondere ex uino potus comitialibus subuenit. Item radicis decoctum uino diutius commixtum, quod bibendum paratur tam in prædio, quam in cœna. Radices, Nicoli Florentini testimonio, febrem quartanam fugant: is nanq; earum tantum usu Bilhotum quendam curatum retulit. Fuchsius Palmam Christi non rectè, pace eius dixerim, inter Satyrii genera depinxit: siquidem ea potius, meo iudicio, inter Canis testiculos erat representanda. Quinetiam in eo mihi planè errasse uidetur, quod Satyrium triphyllon, perinde atq; canis testiculos, cum duabus radicibus pictura expresserit contra Dioscoridis delineationem: qui unam tantum radicem Satyrio mæli magnitudine reddidit. Nisi fortasse is potius fuerit pictoris lapsus. Hallucinantur præterea uir cum Mesue Patres illi reuerendi, qui eius antidotarij commentati sunt. quippe



canis sibi persuaserint, tot esse Satyrio radices, quot Canis testiculis. Verum ij Dioscoridem consulant, & tunc eas sperie decipiantur, intelligent. Sed his facile errandi occasionem potuit dedisse Plinius, quem lib. xxv. cap. x. Orchis, id est, testiculum, cum satyrio turpiter confudisse constat. Ceterum quoniam legitimo Satyrio deficiamus, offere, ac medici eius uice Testiculi radices suppeditant, infelici tamen, nec pari successu. Nam etsi ad prole gignendam testicul radices prætulit Dioscorides, quod maior à uiro deuorata masculum gignat, minor uero à femina foetum: deturq; mollis foeminis bibenda in lacte caprino ad stimulandam uenerem, arida uero ad inhibendam; non tamen ob id inquam comperi quæquam, qui ex earum largiore esu referret, se magis ad uenerem fuisse excitatum, quam esset, priusquam eas comedisset. Sed id forte fortuna illis accidit, quod utraq; simul radices ederint medicorū imperitia. Quos sciam sit, ut altera alterius uim destruxerit, cum alteri uis insit, ut uenerem stimulet, alteri uero ut eandē inhibeat.

Id quod fortasse ijs nō eueniret, si legitimum haberemus Satyrium: uel si herba illa inueniri posset, quæ homines salacissimos reddit. Cuius Theophrastus meminit lib. ix. cap. xx. de plant. histor. ubi ita scribit. Ad rem autem uenerē miram in modū herba pollebat, quam Indus attulerat. Non enim solum edentibus, sed etiam tangentibus tantam genit aliam uim dixere uehementem adeo fieri, ut quoties uellent, coire ualerent. Et quidem qui usi fuerūt, duodecies egisse dixerant. Indum autem ipsum, qui uel magno, atq; robusto corpore erat, septuagesies aliquando coiuisse fatentem licet audire. uerum emissionem seminis guttatim fuisse, demumq; in sanguinem deuenisse. Mulieribus uero uehementius etiam curi libidinem, cum eo medicamine use fuerint, dicebatur. hæc tamen Theophrastus. Canini testiculi uires posuerunt memorie mandauit Galenus lib. v. simp. med. sic inquit. Orchis, nuncupatur & Cynos orchis eadem herba. Radici eius bulbosæ, ac geminæ uis inest humida, & calida, ac gustantibus dulcior apparet. Ceterum maior radix multam uidetur habere humiditatem excrementitiam, & flatuosam: quapropter epota uenerem excitat. Altra uero, minor uidelicet, contra admodum elaborata est, ita ut eius temperamentum ad calidius, & siccius uergat. Vnde hæc radix non modo non stimulat ad coitum; sed etiam planè contrā cobibet, ac reprimit. Eduntur tostæ bulborum more. Orchis uero, quem & Serapiada nuncupant, sicciorē facultatem obtinet, quam ut primi ordinis haberi mereatur: quocirca ad uenerem non similiter accommodus est. Oedemata illius discutit, & ulcera sordida purgat, & herpes sanat. Siccatus multo etiam magis desiccatur, adeo ut & putrescentia, contumaciæque ulcera sanet. Habet etiam quidpiam subadstringens, ac proinde uentrem ex uino potus sistit. Meminit item Satyri Galenus eodem libro. Satyrium, inquit, aut Triphyllum humidum, & calidum temperaturæ est: quamobrem gustu quoq; apparet dulce. Attamen excrementitiam, & flatuosam humiditatem possidet: quocirca ad uenerē incitat. Hæc uero & herba ipsius radix præstare potest. Porro, ut quidem scribunt, ex uino nigro austero potum sanat opisthotonon.

Canis testicu  
li uires ex Ga  
leno.

Satyrii uires  
ex Gal.

## Ὀρμινύμ. HORMINVM.

## CAP. CXXVIII.



HORMINVM satiquum herba est folijs marrubio similis: caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur. Siqui dem in syluestri rotundum, fuscumque inuenitur: in altero nigrum, & oblongum, cuius est usus. Ad uenerem stimulandam, cum uino bibi uolunt. Purgat cum melle argemas, albuginesque: illitam ex aqua tumores discutit: eo etiam extrahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est illitæ herbæ. Syluestre magis uiribus pollet: quare unguentis, præsertim gleucino, permiscetur.

Ruellius, & hunc, ut arbitror, secutus Fuchs in suis quisq; de stirpium historia clarissimis commentarijs, certò credunt Horminum satium eam perquam odoratam herbam esse: quæ uulgò aliquibus Sclarea, quibusdam Matrisalua, & nonnullis Herba sancti Ioannis appellatur. Syluestre uero Horminum illam esse censent, quæ passim in pratis nascitur, quam officinæ Gallitricum, & Centrum galli nominant. Sed certè horum licet doctissimorum uirorum sententiam ut minus probem, multa mihi occurrunt. Primum quod contra Hormini utriusq; descriptionem illæ plantæ consent caule plerumq; bicubitali, folijs marrubio quam longè maioribus, & calyculis, in quibus semen recluditur, sursum spectantibus. Deinde quod in utrisq; illis plantis rotundum semen inueniatur, non autem in uno oblongum, in altero rotundum. Illud præterea addiderim, quod Dioscorides nunquam, meo iudicio, Hormini odore prætermisisset, si ei Sclarea dicta Horminum satium fuisset, ut illi existimant: si ei Sclarea dicta Horminum satium fuisset, ut illi existimant:

Hormini con  
sideratio.


339

Ruellij, & Fu  
chij opin. re  
probata.

Ὀρμινύμ

ea enim adeo odorata est, ut eius odor insignis sine uitio præteriri non possit. Huc denique illud accedat, & eos plures, ut puto, reseruet, qui secus opinantur, quod nuper plantam, cuius hic effigiem datus, Pisis ad me misit Lucas Ceras medicus clarissimus, & rei herbarie peritissimus, quæ adanysum Horminum satium representat, ut picturæ a Plinio demonstrat. Hormini utriusque meminit Plinius libro XXI. capite ultimo. ubi in eum errorem lapsus deprehenditur, in quem & in stachye eundem incidisse superius ostendimus. Nam ubi Horminum folijs marrubio similibus deperire opus erat, ei folia porri tradidit, nimirum Græcorum nominum uicinitate deceptus: πρᾶσον enim marrubium significat, πρᾶσον uero porrum, quod Plinius legisse uidetur. Est & Hormini genus à Theophrasto, Galeno, & Plinio inter fruges annumeratum: quod (ut Galenus auctor est libro 1. de alimentorum facultatibus) inter erysimam, & minimum median naturam obtinet. Ceterum Hormini, de quo hic nobis est sermo, memuisse Galenum in libris simpliciū medicamentorum, non reperio. quanuis eius mentionem fecerit Pallas, qui tamen illa tantum refert, quæ à Dioscoride mutuatus est.

## HEDYSARVM.




Hedysari considerano.

Plinij lapsus.

Hedysari uires ex Gal.

## ONOSMA.



Onosmatis consider.

## H'δ'αρον. HEDYSARVM. CAP. CXXIX.

HEDYSARON, quod unguentarij pelecium, id est, securidacam uocant, frutex est, folijs ciceris: semen rufum in siliquis fert, corniculorum modo aduicis, quod ancipitè securim æmulatur, unde nomen accepit: amarum gustu. Stomacho utile in potu. Additur in antidota. Cum melle ante coitum subdrtum, concipiendi spem adimit. Nascitur in segetibus, & hordeis.

QUANQUAM Securidaca inter triticum, & hordeum quandoque proueniat; frequentior tamen inter aphacam nascitur. Id quod etiam testatur Theophrastus lib. 8. cap. VIII. de plantarum historia, ubi Securidacam in aphacis gigni, eam aphacen necari prodidit. Plinius similitudine uocabulorum deceptus libro XXII. cap. XVII. Securidaca lentem complexu strangulari scribit. In eo autem error deprehenditur, quod phaccon pro aphace legerit, & uerterit: nam Græcis lens φακός, uocatur, non ἀφακία, quæ uicis genus est. Sed re quoque Plinio refragatur Theophrastus, qui loco citato aracam, non autem securidacam lentis innasce, & inimici tradidit. Hedysari meminit Galenus libro VI. simplic. medicamentorum, sic inquit. Hedysarium, aut pelecium. Huius fructicis semen colore rufum est, utrinque anceps, uti secures. Amarum, & subacribum apparet: quamobrem potum gratum est stomacho, & uiscerum obstructions expurgat. Idem præstant totius fructicis ramuli.

## Ο'νοσμα. ONOSMA. CAP. CXXX.

ONOSMA oblonga folia habet, ad similitudinem anchusæ, longitudine quatuor digitorum, & unius latitudine, mollia, in terra iacentia, sine caule, sine semine, sine flore: radice nititur oblonga, tenui, infirma, rubescente: gignitur in asperis. Folia in uino pota, partus extrahunt. Prægnans, si eam supergrediatur, abortum facere dicitur.

PLANTA quedam ex collibus, quos uarijs herbis repletos circa Goritiam natura collocauit, in asperis nata iampridem ad me allata est, quæ folia habet minoris anchusæ: radices uero eius ita rubescunt, ut quasi rubiæ uideantur. Ex ijs notis, quæ quidem pulchrè Onosmati respondent: non potui non adduci, ut eam uerum Onosma putarem. Vnde etiam eius picturam addendam diligenter curavi, ut de eâ aliorum quoque sit iudicium. Sed certè, ut uerum fatear mihi adhuc incompertum est, an hæc caulem, flores, & semen proferat: siquidem eam hactenus non nisi

caele, & reliquis uisum uidere mihi licuit. Onosmatis uires tradidit Galenus lib. viii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Onosma, uel osmaz, uel phlonitis, uel ononis, ex acris, & amara constat substantia: proinde quæ creditur sœtus necare, & eiicere, folijs eius in uino potis.

Onosmatis uires ex Gal.

Νυμφαία. NYMPHAEA.


CAP. CXXXI.

NYMPHAEA nascitur in paludibus, & stagnantibus aquis, folijs fabæ Aegyptiæ, minoribus, & longioribus, alijs in summa aqua, alijs demersis, pluribus ex radice eadē prodeuntibus: flore lilio simili, albo, & in medio crocos habente. cū defloruerit, ut rotundum malum, aut papaueris caput, extubrat: nigro semine, denso, & lato, lenti gustus. Caulis est læuis, niger, minimè crassus, Aegyptiæ fabæ cognatus: radix nigra, scabra, clauæ similis, quæ autumnō secatur. Sicca cum uino pota coeliacis, dysentericisq̃ auxiliatur, & lienem absumit. Radix stomachi, ac uesicæ doloribus illinitur: uirilignes ex aqua emendat: imposita cum pice, alopecijs medetur. eadem contra ueneris insomnia bibitur: siquidem ea prorsus adimit. pota assiduè aliquot diebus, genitale infirmat. Idem semen potum efficit. Nymphææ nomen sibi uedicasse uidetur, quoniam aquosa amet. Plurima inuenitur in Elide, in Anygro amne, & in Bœotiæ Aliarto.

Νυμφαία ἑτέρα. NYMPHAEA ALTERA.

CAP. CXXXII.

EST ET altera nymphæa, cuius flos blephara dicitur, folijs antedictæ: radice alba, scabra: flore luteo, nitente, rosæ simili. Huius semen, & radix contra fœminarum profluvia efficaciter & uino nigro bibuntur. Nascitur in Thessalia, amne Peneo.



NYMPHAEA utraq; seplasiarijs Mauritano nomine Nenuphar appellatur. Nascitur ubiq; frequentissima in paludibus, lacubus, & aquis stagnantibus. Vnde non mirum, si ea sit uulgaris admodum planta, & omnibus notior, quam ut indicari deceat. Nymphææ facultates retulit Galenus libro viii. simplicium medicament. his uerbis. Nymphææ tum radix, tum semen desiccandi uim habet citra morsum. Itaq; uētris profluvia cohibet, semenq; siue per insomnia, siue alio pacto immodicè profluens retinet. lūuat porro etiam dysentericos. Ceterum Nymphæa, quæ candelam radicem habet, potentioris est facultatis, ut & muliebri profluuio medeatur. Verum & hæc, & ea quoque, quæ atram habet radicem, ex uino nigro austero bibitur. Porro nonnullam etiam abstergerendi uim obtinent, ita ut & albos faciant, & alopecias. Ad albos uerò macerantur aqua, ad alopecias pice liquida. Sed ad hæc aptior est ea, cuius radix nigra est, sicut ad alia, cuius alba.

Nymphææ consider.


Vires ex Galeno.

Ἀνδρῶσάκης. ANDROSACES.

CAP. CXXXIII.

ANDROSACES herba est amara, & tenues spargens iuncos, sine folijs, folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur. Gignitur in Syriæ maritimis. Ea drachmis duabus in uino pota, copiosam hydropicis urinam ciet. Idem effectus est semini pota, & herbæ decocto: podagris utiliter illinitur.

## ANDROSACES Q VIBVSDAM.



Androsaces  
consider.

ANDROSACES ex Syria, quod sciam, non deferretur in Italiam. Verum, quia eam herbam in Italia nesci posse nihil prohibeat, quoddam plantæ genus nuper inuentum est in Hetrurie maritimis, cuius hic picturam ideo exhibere libuit, quod id à quibusdam Androsaces existimetur. Idipsum ad me misit hoc anno Pifis Lucas Gbinus medicus clarissimus, & rei herbariæ peritissimus: à quo (si is illi opinioni subscriberet, & Androsaces in Italia nasceretur) non mihi ex eo dissentendum esset, quod præter alias notas hæc planta (ut Oribasius ex Dioscoride transcribens habet) tota candida spectatur. Androsaces meminit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Androsaces humida, & acris herba est. Potest autem resiccata, exhibitaq; tum ipsa, tum fructus eius magnopere urinam mouere, & nimirum discutere, & desiccare.


Androsaces  
uires ex Gal.

† In uulgatis exemplaribus hoc loco scriptum reperitur λευκή, hoc est tenuis: quam uocem, ut superuacaneum, omisit Ruellius. In Oribasio uero λευκή, id est, alba legitur: & hæc ex aliquo forte antiquo codice uertit Marcellus. Ceterum non desunt, qui ubi paulo post αφυλλος, hoc est, sine folijs legitur, εφυλλος, hoc est, cum folijs legendum putent.

ΑΣΠΛΕΝΩΝ. ASPLENVM.

CAP. CXXXIII.

Miltz & uinit



Aspleni con-  
sideratio.

ASPLENVM aliqui scolopendrium uocant, alij splenion, alij hemionium: folijs est multis, scolopendræ animali similibus, ab radice una prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisque siliceis, & opacis: nec caulem, nec florem, nec semen habet. Folia polypodij modo diuiduntur, subter flauescencia hirsutaque, superne uiridia. Vim hanc habent folia in aceto feruifacuta, ut per dies quadraginta pota lienem absumant: quibus etiam contritis lienem ex uino illini oportet. stranguariæ, & regio morbo prodest, singultum sedat, calculos in uesica comminuit. Conceptum adimere creditur, per sese, aut cum muli liene appensa. Tradunt noctu, silente luna, huius rei gratia effodiendam.

ASPLENVM, siue Scolopendrium tam à medicis, quam pharmacopolis, qui plantæ Mauritanorum scripta sequuntur, Cetrach barbaræ uoce uocatur. Nec diu est, quod nouere rei herbariæ periti Arabum Cetrach esse legitimum Scolopendrium. Quandoquidem antea uniuersa herbariorum schola Aspleni loco phyllitum, quam etiam uulgò Linguam ceruinam appellant, suis immiscebant medicamentis. Verum enim uero quiaquam hoc adeo clarum est, ut nullus amplius dubitandi locus relinquatur; adhuc tamen inueniuntur è ueteribus nostris seplasiarjs, qui ut suam potius pertinaciam, quam ueritatem ipsam tueantur, nullo pacto sibi persuasum esse uolunt, phyllitum non esse legitimum Scolopendrium: eo tantum argumento pertinaciter inniti, quod sui in scitis

si maiores phyllitum Scolopendriam appellauerint, quodq; eam spleni semper maxime profuisse experimento cognoscitur. Quia tamen in re prorsus aberrant, ut ex Asplenij notis facile ab omnibus intelligi potest: ex quibus apertissime cognoscitur, nil aliud esse Asplenium, quam ipsum Cetrach uocatum. Nec desunt praeterea, qui obnixè contendunt, Cetrach non esse Asplenium, quod scripserit Dioscorides nasci Asplenium folijs polypodij, siue filiculae, quibus tamen ipsius Cetrach folia non undequaq; respondere uidentur. Verum si is, qui ita obijciunt, eam uidissent filiculam, quae in montibus provenit in itinere, quo Goritia per montes in Carniolam itur, folijs angustioribus, et admodum uiridibus, is in posterum, quantum equidem reor, omnis dubitandi occasio sublata esset. Siquidem filicula haec folio ex Cetracho perquam simili, quanquam paulo ampliore. Tantaq; est similitudo, ut mihi primò hanc herbam inspicenti ea ferme iasa sit uerum Asplenium: quae tamen effossa radice statim pro filicula agnoscitur. Praestantissimum Asplenium in Creta nascitur, ubi repertum Vitruuius affirmat circa Potereum annem, qui duas urbes Gnoson, et Coracem interlabitur: parte quae ad Cortynam spectat, pecoribus sine liene inuentis, quia herbam hanc roderent: altera uero parte, quae ad Gnoson est, lienem habentibus, quia ibi herba illa non appareat. Aspleni uires paucis perscrutatus Galenus libro v. simplicium medicamentorum, sic inquit, Asplenium tenuium quidem partium, non tamen edula herba est. Haec utiq; ratione et lapides frangit, et lienes liquat. haec Galenus. Ceterum sunt qui existiment Asplenium, et Scolopendrium Graecis non idem, sed diuersas omnino plantas representare, Galeni auctoritate freti. Quippe qui libro v. capite xii. simplicium medicamentorum de his differens, quae obstructo lieni conserunt, Scolopendrium ab Aspleno segregasse manifestè uideatur, cum inquit. Maiores lienis obstructions uehementiora desiderant medicamenta, nempe capparidis corticem, tamaricis radices, scolopendrium, et scillam, et eam, quae id ipsum nomen repraesentat asplenon appellata. Haec certe uerba differentiam fieri aperte declarant. Sed, meo quidem iudicio, credendum esse suspicor, hoc in loco praeter Galeni sententiam accreuisse Scolopendrium, deprauatamq; in eo esse scripturam uel librariorum incuria, uel nimia alicuius scoli diligentia. Quandoquidem in sequentibus libris, in quibus de simplicium omnium, quorum cognitionem habuit, facultatibus sigillatim differit, nusquam, quod inuenerim, Galenus Scolopendrij meminit, sed tantum Aspleni, cuius etiam uires (ut supra retulimus) sane quam paucis perscrutatus. Quod si Scolopendrium non esse Asplenium sensisset, minime dubitandum est, quin utriusq; seorsum mentionem fecisset contra Dioscoridis sententiam. Ex his itaq; facile colligi posse putauerim, hoc loco in Galeni codice medium subesse. Nam et Paulus Galeni sectator acerrimus libro vii. Scolopendrium asplenon esse scribit: id quod etiam inter Arabes testatur Serapio. Neq; alia puto ratione Asplenon Scolopendrij nomen sibi uendicauit, quam quod scolopendrium uenenosum animal foliorum facie referat.

Quorundam error.


Aspleni uires ex Galeno.

Galeni locus suspectus.

HEMIONITIS.

CAP. CXXXV.

HEMIONITIS. quam aliqui splenion uocant, folium emittit dragunculi, lunatum, radicibus eohæret multis, tenuibus: nunquam flores, neque semen, neque caulem gignit. In petrosis nascitur, austero sapore. Ea ex aceto pota lienem absumit.



Falsè uero, prout dubio fuit in Phyllitidis commentatione superius diximus) Leoniceus, Ruellius, et Manardus: quippe qui sibi certò persuasierint, Hemionitida eam esse plantam, quam seplastiariorum uulgus Linguam ceruinā, perperamque Scolopendriam nominat. Sed quoniam in prædicto loco hos uiros aliqui doctissimos, et Fuchsum pariter eos secutum, et rare euidentissimis, ut puto, argumentis ostendimus; idcirco superuacaneum esse duximus hic eadem repetere, præsertim quod neminem futurum sperem, qui eò se conferre grauetur, si cupiat nostras contra uiros tam celebres rationes audire. Porro non modo iam nobis compertum est ueram Hemionitida, quae à Dioscoridis historia nihil prorsus disidet Romæ nasci in quibusdam rudibus, ædificiorumq; ruinis prope magnū Amphitheatrum, unde quidam rei herbariae studiosi eam in suos transtulerunt hortos; sed nos quoq; hoc anno eam accepimus ab Aloysio Anguillario Romano rei herbariae peritissimo, qui Hemionitidis plantam, cuius picturam datus, ad nos Patavio misit. Equidem credidimus iam dudum unā cum Hermolao, et Ruellio fecerim, et hemionitida unam tantum Plinio plantam esse, deprauatis eius exemplaribus decepti, quae lib. xxv. cap. v. ita scri-

Hemionitidis consideratio.

Vide supra fol. 393

ptum habebant. Inuenit et Teucer eadem ætate teucrion, quam quidam hemionion uocant. Veruntamen cum postea tractu temporis Plinij codex mendis quam plurimis expurgatus ad manus esset, non hemionion legendum fuisse comperi, sed hemion. Quo factum est, ut omnino fuerim coactus in hoc mutare sententiam, contraq; asserere teucrium à Plinio descriptum à Dioscoridis teucrion nullis notis differre. Ceterum inter hemionium, et asplenium Plinio nulla intercedit



Lunariæ mi-  
noris descri-  
ptio, & vires.

Lunaria mi-  
nor alia.

435

Numularia

Hemionitidis  
vires ex Gal.

intercedit differentia, quod scripserit libro xxvii. cap. v. Asplenium sunt, qui hemionion uocant. Sed equidem reor, ne et ipse in errore uersetur. quandoquidem Dioscorides non modo utriusque historiam diuersis capitibus descripsit; sed etiam asplenium nusquam, quod sciam, hemionitum appellari ait: tametsi contra Hemionitum non asplenium, sed splenion à quibusdam uocari tradiderit. Sed posteaquam Hemionitidis lunata folia mihi ad memoriam reuocant herbam illam, quæ à chymistis LUNARIA minor, et ab alijs ob semen racemosum Lunaria botrytis cognominatur, cum et ipsa miris in medicamentis polleat uiribus, non prætereundum duxi, quin hic de ea aliquid differerem. Hæc itaque brevis est planta, dodrantali fere altitudine. Caule constat simplici, rotundo, lento, ac gracili: è cuius medio in latus exit ramusculus, costæ effigie, cui folia sunt utrinque septem annexa, lunata, crassa, firmaque, bracteæ moris modo. Flores profert in summitate caulis, oxalidis minoris instar: semine rufò, rotundo, minutoque, in uale modum racematim coherente. Vis totius plantæ mirè efficax uulneribus glutinandis, itemque intrinsecis, atque extrinsecis corporis fracturis sanandis: quare miris celebratur laudibus ad puerorum enterocelas. Datur utiliter, comodeque dysentericis, planta tota in puluerem contrita. Albas uteri fluxiones supprimit, quemadmodum et rubentes. Ferunt equos, qui in moribus herbas depascuntur, ubi hæc copiosa prouenit, auulsis ab ea clauis, suos ferreos calceatos amittere, et ob id uulgò à nonnullis Sferra cauallò appellari. Sed perperam, meo quidem iudicio, quòd alia sit planta, quæ uel ab ipsa effectui legitime sic fuerit appellata, uel quòd semen proferat ferreis equorum calceis simile. Magnificam hanc quidam, præsertim chymici, eamque pluris ferme æstiment, quam aurum. Sed quàm isti in suis uanis opinionibus deludantur, ipsi magno sepe suo damno experiuntur. Est et alia herba, quam aliqui similiter Lunariam minorem nominant, quæ in scrobium ripis, et aggeribus uligine madentibus, secus uias plerumque nascitur. Serpit hæc humi necis cauliculis, cubito longioribus, clematidi illi similibus, quæ Vinca peruinca uulgò uocatur, in quibus à radice et summum ex utroque latere breuibus interstitijs folia exeunt crassiuscula, rotunda, paruorum nummorum speciem referunt: unde à nonnullis Nummularia ducta est. Sunt qui existiment, hanc esse Elatinem. Verum quia Nummularie dicte folia pilosa non sunt, sed leuia: quia præterea non nascitur in segetibus et cultis, sed in scrobium aggeribus et uliginosis locis: ideo ijs non possum adstipulari. Hæc quoque glutinandi, et cohibendi facultate prædita est. Sed iam, ut nostri moris est, Hemionitidi sue reddantur vires ex Galeno, qui eas retulit libro vi. simpl. medic. his paucis notis. Hemionitis simul et adstrictionem, et amaritudinem possidet: quamobrem cum aceto pota lienosis auxilio est.

#### Ανθυλλίς. ANTHYLLIS.

CAP. CXXXVI.

ANTHYLLIS duplex est. quædam enim lenti simillima, folijs mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine: radice parua, tenui. Nascitur in salis terris, & à sole illustratis, non insulso gustu. Altera est folijs, ramulisque aiugæ similis, hirsutioribus tamen, breuioribus, & asperioribus: flore purpureo, odoris admodum grauis: radice cichorij. Pota drachmis quatuor, urinæ difficultati, renibusque plurimum prodest. Tritæ, vuluæ pituitas emolliunt, cum rosaceo, & lacte impositæ. vulneribus medentur. Quæ autem aiugæ similitudinem refert, præter alia pota cum aceto mulso, comitiales sanat.

Anthyllidis  
consider.

Vires ex Gal.

PRIMAM, aut alteram Anthyllida, quæ Dioscoridis historie respondeat, non equidem hæcenus in Italia reperi, aut repertam uidi: quanquam non negauerim, quin ea inibi proueniat. Ruellius hæc posteritati Salsolam uocant fuisse tradit, quòd ex ea salem fieri memorie proditum sit. Vtriusque Anthyllidis meminisse Galenus libro vi. simplic. medicam. sic inquit. Anthyllis duplex est, sed utraq; modicè desiccata, ut et ulcera glutinet. Ceteris autem, ea scilicet quæ chamæpitij adsimilis est, quadantenus subtiliorum est partium, quàm altera, adeo ut et comitibus competat. Quin et ipsa magis quàm altera extergere potest.

#### Ανθεμίδης. ANTHEMIS.


CAP. CXXXVII.

ANTHEMIDIS genera tria, tantum flore distantia: rami dodrantales, fruticosi, alis multis concaui: tenuibus foliolis, paruis, numerosis: rotundis capitulis: floribus in medio aureis, foris fecus orbiculato ambitu candidis, melinis, aut purpureis, magnitudine foliorum rutæ. Nascitur in asperis, & iuxta semitas. colligitur uere. Vim habent radices, flores, & herba excalfaciendi, extenuandique. Potu, & infusione, pellunt menstrua, partus, urinam, calculosque: aduersas inflammationes, & ilei tormenta bibuntur: bilem suffusam expurgant: iocinerum uitia sanant. Decocto earum uesicæ fouentur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. Hanc propriè heranthemon uocant. Ea cui leucanthemo nomen est, item quæ chrysanthemum dicitur, uehementius urinam ciunt. Aegilopijs illitæ medentur: commanducatæ ulcerum eruptiones in ore sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo runtur, terunturque in farinam, ad abigendos febrium circuitus. Flores, & folia recondi debent, & priuatim tusa, in pastillos digeri: radix quoque siccari, dumque ingruit necessitas, binæ partes herbæ dari, modò floris aut radice pars una, modò contra floris partes duæ, & herbæ una, permixtatim duplicato pondere, alternis diebus. bibere autem oportet in uino mulso diluto.

## CHAMAEMELON.



## PARTHENIVM.



**ANTHEMIS**, quæ & Chamæmelon ab odore mali Græcis dicta est, officinis, & vulgo corrupta uoce Camomilla uocatur. Verum quauis tres Anthemidis species florum colore tantum differentes, memorie prodiderit Dioscorides, eamq; cæteris præstare tradiderit, cui flores in medio aurei, per ambitum uerò purpurei bubonij modo insunt; pharmacopola tamen in Italia illam duntaxat sibi comparant, quæ floribus cõstat intus aureis; foris folijs albicantibus circumseptis: quod hæc cæteris frequentior, copiosiorq; inter segetes in campis proueniat, oleatq; suauiter. Quandoquidem cætera eius genera, à paucis sanè cognita, in raris Italiae locis reperiuntur. Vidimus tamen nos utraq; pluries in Italia. Anthemidis meminit Galenus libro III. simplicium medicamentorum, sic scribens. Chamæmelum tenuitate quidem rosæ persimile est, calore uerò ad olei facultates magis accedens, animali tum familiares, tum temperatas. Quapropter lassitudinibus, ut si quid aliud confert, doloresq; sedat, mitigatq;. Præterea tensa remittit, & laxat, quæq; mediocriter dura sunt emollit, quæq; conspata rarefacit. Ad hæc febres, quæ citra uisceris alicuius inflammationes instant, discutit, ac dissoluit. ac præsertim quæ ex humoribus biliosis, aut cutis densitate proueniunt. Quæ de re & ab Aegyptiorum sapientibus soli consecratum est, febriumq; omnium remedium putatur. Verum hæc quidem in re à ueritate aberrant; solas enim, quas dixi febres sanare potest, easq; quæ iam concoctæ sunt. Iuuat tamen pulchrè reliquas etiam omnes, quæ melancholicæ sunt, aut pituitosæ, aut ex uiscerum inflammatione prognatæ. Nam & harum remedium chamæmelum uel strenuissimum est, ubi iam concoctis adhibetur: quapropter & hypochondrijs, ut si quid aliud, gratum existit. Meminit etiãnum libro VII. eorundem simplicium medicamentorum, sic inquit: Dictum quidem in tertio libro de hac herba copiosius est, diciturq; nunc summam, quod calefacit, & desiccant in primo ordine. Est & tenuium partium, ac proinde digerendi, rarefaciendi, & laxandi facultatem obtinet.

Anthemidis consideratio.

Anthemidis uires ex Gal.

## Παρθέριον. PARTHENIVM.

## CAP. CXXXVIII.

## Μέντιον &amp; ραντ

**PARTHENIVM**, aliqui amaracõ uocant, folijs est coriandri; tenuibus: flore per ambitum albo, intus melino, odore subuiroso, sapore amaro. Siccatum, cum aceto mulso, aut sale potum, non secus atque epithymum, & bilem, & pituitam detrahunt: suspiriosis prodest, & melancholicis. Herba sine flore à calculosis, & anhelatoribus magna utilitate bibitur. Valet decoctum ad insidendum in duritia vuluarum, & inflammationibus. Illinitur sacro igni, & collectionibus cum flore.

**SECTIVM** Parthenium in Italia in hortis sæpe omnibus, neq; modo in ijs satum; sed in alijs quoq; locis sponte prouenit. Folio est coriandri, amaro sapore, odore graui: floribus per ambitum albis; intus melinis. Hetrusci Matricariam, & ab amaro sapore, Amarellam uocant. Ceterum hallucinantur, mea quis dem sententia, in Parthenij historia Brasauolus, & Euchsus, utri alioqui doctissimi: quin & Monachi illi reuerendi, qui in Mesuem commentarios ediderunt, quod concordēs sibi persuasērūt (ut superius in Artemisiz commentario, eorum errorem exponendo, diximus) Matricariam, siue Amarellam uulgò uocatam esse illud Artemisiz genus, quod secundo loco à Dioscoride res presentatur: utpote qui nō recte expenderint hæc esse legitimum Parthenium.

Parthenij consideratio.

## Matricaria

Parthenium. Porro contendunt Brasauolus, & Fuchsius eam omnino plantam uerum referre Parthenium, quam herbariorum uulgo Cotulam foetidam appellat. Sed quam isti clarissimi medici magno in errore uersentur, uideantur, qui probe sciunt Cotulam foetidam folio esse sceniculi, aut anthemidis potius, quam coriandri: neque sapore uicari deo anaro, ut in Parthenio requiritur. Sunt praeterea antiquorum nonnulli, qui Helxinem quoque Parthenium uocare, illam scilicet, quae in parietibus nascitur detergendis uitreis uasis aptissima, ut Galenus ipse testatur lib. vi. sup. med. & Plinius lib. xxii. cap. xvii. naturalis historiae. Nec desunt etiam, qui uelint mas Parthenium appellare Anthasian, quam & Tanacetum uocant seplasiarij. Quorum equidem sententiam magis probandam censerem, quam Matricariam, qui tertium Artemisiae genus Tanacetum esse contendunt. Utuntur Tanaceto recentiores ad uentriculi, & alui status discutiendos, item ad lumbricos ex uentre pellendos. Utuntur & ad frangendos renium calculos, & ad cedendam urinam. Sed id uiris magis, quam mulieribus commendant: contra uero Matricariam dictam feminis tantum bibendam praecipunt. Parthenij in simplicium medicamentorum censu Galenum meminisse non reperio.

Tanaceti medicinalis.


Rinofand.

ΒΟΥΦΘΑΛΜΟΝ. ΒΥΡΗΘΑΛΜΟΝ. Gal. Aug. CAP. CXXXIX.

Rinofand. Aug. & Rindell.

BYPHTHALMON, quidam cachlam uocant, cules emittit tenues, mollesque: folia sceniculi: luteum florem, anthemide maiorem, oculi similitudine, unde nomen traxit. Circa oppida nascitur, & in campetribus. Flores cum cerato triti, tumores, duritiasque discutiunt. Aiunt epotam post exitum à balneis, regio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.

Buphtalmi consideratio.



Non parum profecto inter se uariant de Buphtalmo recentiorum sententiae, ut herban, quae ipsum legitime representet, decernant, & ostendant. Nam aliqui putant herbam quandam cubito altiore, in pratis & agrorum marginibus nascentem, quae & ut equidem opinor, Bellis maior est, folio nonnulli ambitu serrato: flore intus melino, extra uero candidissimo foliolis undique circumdato, anthemide maiore, esse legitimum Buphtalmum. Alij uero, quibus adstipulatur Fuchsius, aliam ab hac herbam uerum Buphtalmum esse contendunt, uulgaris anthemidis cognatam, quam officinae Cotulam non foetidam uocant. Sed cur horum sententias comprobem, sane non habeo. quippe quauis Cotula non foetida dicta foliorum facie quadantenus Buphtalmum referat, flores tamen in medio melini, & in ambitu anthemidis modo candidi, Dioscoridis picturae non utique respondent. Quemadmodum & hinc perspicuum est alteram plantam, cuius primo loco meminimus, non esse Buphtalmum. Siquidem cum diligentissime scripserit Dioscorides, uulgaris anthemidis, tum etiam parthenij flores intus aureo micare colore, per ambitum uero candido, dubitandum quidem non est, quin & eadem fuerit usus diligentia in describendo Buphtalmi flore, quem tamen luteum in uniuersum factum, non autem in ambitu candidum,

qualis in uulgari parthenio conspicitur. Cum itaque Buphtalmum luteo plane flore praeditum esse debeat, haud dubie errant, meo quidem iudicio, qui pro Buphtalmo praedictas, aut similes plantas accipiunt. Ceterum legitimum, si fallor, Buphtalmum ad me attulit hoc anno Patavio Ioannes Odoricus Melchiorius Tridentinus, iuuenis speciei in philosophia, ac medicina eruditionis, ubique perinde ac filius charissimus, quod in nullis prorsus notis à Dioscoridis descriptione disidet, ut eius effigies, quam hic damus, abunde demonstrat. Buphtalmi uires retulit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, ijs uerbis. Buphtalmum, inquit, sic appellatum est à floribus, qui figura quidem bouum oculis uideantur adsimiles, colore autem anthemidis floribus simillimi sunt, sed multo illis tum maiores, tum acutiores. Proinde & uehementius discutiunt, adeo ut duritias sanent cerato misti. haec Galenus. Vbi, ne quid nobis obstat, ammaduertendum est, quod Galenus, qui Buphtalmi flores anthemidis floribus simillimos reddit, de ea tantum anthemide intelligit, quae luteos flores profert. Sed quoniam de Buphtalmi flore differenti mihi Bellis sic à Plinio uocata occurrit, cuius etiam initio commentarij memini, non alienum esse duxi, hoc in loco eius historiam, & uires recensere. Bellis igitur in Italia trium est generum. Primum in hortis seritur: cetera in pratis, & campestribus nascuntur. Hortense herbula est folijs longiusculis, in cacumine subrotundis, solo procumbentibus, & in rosetum modum radiantibus, crassiusculis, per ambitum minutim serratis: è quorum medio cauliculi prodeunt uillosi, flexibilesque: quorum cacuminibus anno fere toto flores emicant, centro tenus aurei, per ambitum uero foliolis duplicibus in purpuram rubentibus circumdati, coronis texendis aptissimi. Alterum in pratis plerumque nascens, folijs, & cauliculis constat hortensi similibus, maiusculis tamen: sed flore intus melino, circum uero candido, anthemidis modo. Hoc quod primo statim uere floreat, Hetrusci appellat uulgo Primo fiore, et Fiore di primavera. Tertium ceteris maius, &

Buphtalmi uires ex Gal.

simplicium medicamentorum.

Aug. & Rindell.

Aug. & Rindell.

Aug. & Rindell.

Aug. & Rindell.

Aug. & Rindell.

Aug. & Rindell.

Aug. & Rindell.

Aug. & Rindell.

Aug. & Rindell.

Aug. & Rindell.

Aug. & Rindell.

Aug. & Rindell.

Aug. & Rindell.

Aug. & Rindell.

Aug. & Rindell.

Aug. & Rindell.

gi, flore predicto non dissimili, sed maiore: folijs etiam maioribus, magisq; serratis, caulibus lignosis, interdum cubi-  
m minoribus, non nisi estate florentibus. Facultas omnibus eadem: nam (ut recentiores perbibent) ualent in strumis,  
et capitis fracturis: quinetiam in uulneribus thoracis, que in pectoris cauitatem usq; penetrarunt, in quem usum  
eius potius inferunt. Sunt et qui Bellidis genera laudent ad ischiada, et paralyin.

ΓΛΥΚΥΣΙΔΑ. PÆONIA, *Pæonia*

CAP. CXL.

PÆONIA, siue glycytide, Græcis aliquibus pen-  
torobon dicitur: sunt qui Idæos dactylos radicē pæo-  
niam uocant. Caulis altitudine sesquipedis adolescit,  
comitantibus multis stolonibus. Huius duo genera:  
mas folia iuglandis habet: in fœmina uerò smyrnij  
more diuiditur. Summo caule filiquas emittit amyg-  
dalis similes: in quibus, cum dehiscunt, multa grana,  
exigua, rubra, acinis puniceorum similia inueniuntur,  
& in medio nigra, purpurea quinque aut sex. Radix  
maris digitali crassitudine, & palmi longitudine, gu-  
stu adstringens, alba. fœminæ radicibus ceu glandes  
circiter septem aut octo inhærent, ut in hastula regia.

Fœminis à partu non purgatis sicca radix datur: ciet  
mensēs amygdalæ magnitudine pota: uentris dolori-  
bus cum uino pota auxiliatur. valet contra regium  
morbum, & renum, ac uesciæ dolores. decocta in ui-  
no aluum sistit. Rubra grana rubentes menses sistunt,  
decem uel duodecim pota in uino austero, & nigro:  
stomachicis, & erosionibus ea esse prodest: à pueris  
pota initia calculorum eximunt. Grana nigra auxiliā-  
tur suppressionibus nocturnis, vuluæ strangulationi-  
bus, & matricis doloribus, quindecim numero pota,  
in aqua mulsâ, aut uino. Nascitur in altissimis mon-  
tibus, & præruptis.

PÆONIA fœmina planta est uulgaris notitiæ: mas ue-  
rò contrā, quod pauci in Italia locis proueniat. Hanc Pisis ad  
me Goritiam misit hoc anno Lucas Ghinus Forocorneliensis, uir  
et doctrina, et rei medicæ cognitione præclarus. Sed et eam

Pæoniæ con-  
sideratio.

Vires ex Gal.

Galenī histo-  
ria.

inter Germania allatam uidimus. Pæoniæ uires posteritatis memoriæ tradidit Galenus lib. v. i. simplicium medi-  
camentorum, ubi ita scriptum reliquit. Glycyside, quam pentorobon, et pæoniam nuncupant, radicem habet leui-  
ter adstringentem cum quadam dulcedine: etsi plusculum dentibus mandas, acrimoniam item quampiam subamarā  
fuisse percipies. Proinde menses ciet ex melicrato amygdalæ pota quantitate. Sanè tundere eam oportet, ac cribrā-  
re, et sic inspergere. Expurgat porro etiam icterum obstructū, et renes. Sed hæc efficere nata est, quā acris, et sub-  
acris est: quā uerò quiddam etiam adstrictorium obtinet, uentris fluxiones sistere potest. Verū eam tunc in auste-  
riorum minorum quopiam decoctam bibere conuenit. Est autem facultate omnino rescicatoria uehementer, ita ut non  
desperauerim eam etiam adalligatam, quod meritò creditum est, puerorum epilepsias sanare. Equidem uidi puella  
hanc quandoque octo totis mensibus morbo comitiali liberam, ex eo quo gestabat radicem tempore: ubi uerò forte for-  
tuna quod a collo suspensum erat decidisset, protinus morbo correptus est. rursusq; suspensio in locum illius alio, incul-  
pæ postea se habuit. Porro uisum est mihi satius esse denuo id collo detrāhere certioris experientiæ gratia. Id cū  
fuissem, ac puer iterum esset conuulsus, magnam recentis radicis partem ex collo eius suspendimus: ac deinceps pror-  
sus sanus effectus est puer, nec postea conuulsus est. Rationabile itaq; erat aut partes quaspiam a radice defluentes,  
et deinde per inspirationem attractas, ita affectos locos curare, aut aërem a radice assidue mutari, et alterari. Nam  
hoc pacto succus cyrenæicus columellam phlegmone affectam iuuat, et melanthium frictum palam destillationes, et  
grædines desiccant, si quis id in calidam linteam raram liget, assidueq; calorem ex eo per inspirationem, quæ per na-  
res fit, attrahat. Quinetiam si compluribus linis, et maxime marine purpure, collo uiperæ injectis, illis uiperam  
preces: eaq; postea cuiuspiam collo obuincias, mirifice profuerit tum tonsillis, tum omnibus ijs, quæ in collo expul-  
sant. Sed de talibus priuatum aliquando forte conscribam. Nunc uerò sciendum est Pæoniæ temperamentum tem-  
peratum esse partium, et exiccatorium, haud tamen insigniter calidum, sed aut symmetrum, aut paulo calidius.

ΛΙΘΟΣΠΕΡΜΟΝ. LITHOSPERMUM.

CAP. CXLI.

LITHOSPERMON à feminis duritia nomen accepit. Folijs est oleæ longioribus, & latiori-  
bus, mollioribus, iacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulis rectis, tenuibus, firmis, crassi-  
tudine acuti iunci, lignosis: in quorum cacumine bifidi exortus cauliculorum speciem exhibent-  
folijs

folijs longis, inter quæ paruum semen, rotundum, erui magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis, & editis locis. Vim hanc habet, ut semine cum uino albo potu calculos frangat, pelatque urinam.

Φάλαρις. PHALARIS.

CAP. CXLII.

PHALARIS cauliculos emittit zæ culmis similes, à minutis, ac nullius usus radicibus, multos, duum palmorum, geniculis cinctos, graciliores tamen, ac dulces: semen candidum, oblongum, milij magnitudine. Tunditur, & in aqua aut uino succus ad uesicæ cruciatus utilissime bibitur. Semen cochlearis mensura potum, ad eadem efficax est.

LITHOSPERMUM MAIUS.

LITHOSPERMUM MINUS.



Lithospermi  
consider.

LITHOSPERMON hodie seplastarij, & omnes ferè medici Barbaros secuti Milium solis nominant. Li. 40  
cet rectius fortasse Mauritanorum quoque imitatione ab illis Milium Soler uocaretur. Quandoquidem hæc planta (ut  
scribit Serapio testimonio Aben Iuliel) frequens nascitur in montibus Soler: unde illi aptius fortè à loco, quam à sole  
cognomentum imponeretur. Huius milij, utcumque cognominetur, duo ostenduntur genera. maius, quod legitimum  
est Lithospermon, quòue Hetruria satis referta est. minus, quod longè frequentius ubique in Italia gignitur. Hoc uis  
non temerè existimauere nonnulli esse Phalarida, quòd semen proferat milio persimile, subcandidum, & oblongum.  
Quibus facile subscribi posset, si planta hæc culmis geniculatis, ac etiam folijs zæ similis spectaretur, quòd Orisio  
Phalaris non modò culmos fundat zæ similes; sed etiam folia. Ex ijs equidem notis, quæ planè in Milio solis uisore  
desiderantur, cogor illis non adstipulari. Quin potius adducor, ut certò credam Phalarim esse plantam ab illa diuer-  
sam: eamque fortasse, cuius aliquando picturam dabimus, quæ in syluestrium frugum genere, à quibusdam recensetur,  
adeò ut non desint etiam qui hanc appellant Syluestre milium. Est enim culmo, & folio zæ, & semine candido &  
oblongo, milij ferè magnitudine. Ceterum Fuchsum, uirum alioqui doctissimum, Lithospermum Dioscoridis cum-  
nibus propè nunc compertum, non cognouisse arbitror, quòd in suis clarissimis de stirpium historia commentarijs pro-  
uero Lithospermo, illud quod officinis Milium solis minus appellatur, depinxerit. Lithospermon, ut herbam suæ  
ma admiratione dignam, eleganter descripsit Plinius lib. xxv. cap. xi. cuius hic uerba subiiciam. Inter omnes her-  
bas, inquit, Lithospermo nihil est mirabilius. Aliqui egonichon uocant, alij diospyron, alij heracleon. Herba quæ-  
cuncialis ferè, folijs duplo maioribus, quam rutæ, ramulis surculosis, crassitudine iunci. Gerit iuxta folia singulas  
luti barbulas, & earum in cæuimibus lapillos candore, & rotunditate margaritarum, magnitudine cicercis, duriti-  
a uerò lapidea. Ipsi, qua pediculis adhæreant, cæuérnulas habent, & intus semeni. Nascitur & in Italia, sed lau-  
dissimum in Creta. Nec quicquam inter herbas maiore quidem miraculo conspexi. Tantis est decor, uelut aurificæ  
arte alternis inter folia candicantibus margaritis, tam exquisita difficultas lapidis ex herba nascentis. lacere, &  
hæc

Fuch. error.



Lithospermi  
hist. ex Plin.



hæsi serpere auctores tradunt. Ego uulſam, non herentem uidi. hæſtenus Plinius. Lithoſpèrmi in ſimplicium me-  
dicamentorum libris, Galenum meminiffe non inuenio. Verum Phalaridis, quam phalerim nuncupat, uires reddidit li-  
bro vii. corundem, ſic inquit. Phalaridis herbe tum ſuccus, tum ſemen, tum folia potu auxiliari creduntur ue-  
ſicæ doloribus, cum in ſeſe habeant quidpiam tenuium partium, & calidum. Phalaridis ui-  
res ex Gal.

## RVBIA SATIVA.

## RVBIA SYLVESTRIS.

Ερυθρόδανον. RVBIA. *Frühv. rolt.* CAP. CXLIII.



ERYTHRODANVM radix rubra est, qua tinguntur lanæ. Vna sponte prouenit: altera feri-  
tur, ut in Thebana Galliæ, & Rauenna Italiæ: in Caria inter oleas, ut in aruis, solo creditur. Hanc  
non sine quæſtu ferunt: nanque maximum ex ea sentiunt prouentum, Asperi caules, & quadran-  
guli, longi, aparinæ non diſſimiles, robuſtiores, & multò prorsus maiores: folijs per interualla cir-  
cum articulos, ſtellarim decuſſatis. Semen eius rotundum, inter initia uiride, mox rubrum, po-  
ſtea cum ematuruit, nigrum: radix tenuis, longa, rubra. Vrinam ciet: qua de cauſa regio morbo  
opitolatur, pota cum aqua mulſa: item iſchiadicis, & reſolutis. Craſſam, copioſamque urinam  
pellit, nonnunquam & ſanguinem: bibentes tamen quotidie lauari oportet, & excrementorum  
quæ redduntur differentiam ſpectare. Aduerſus ſerpentium morſus, ramulos cum folijs uino bi-  
bere prodeſt. Semen ex aceto potum, licæm abſumit. Impoſita radix trahit partus, menſes, ſecun-  
dasque. albæ uutiligini illita ex aceto medetur.

RVBIA, quam Græci Erythrodanum dicunt, Hetruſcis nullis non cognita: neq; medicis ſolam ac ſeplaſtarijs, Rubiæ confi-  
deratio.  
cognoſcitur: ſed etiam mulierculis, ac ruſticis, ijs præſertim, qui in locis habitant, ubi lanificio opera impenditur.  
quandoquidem inſciendis tingendisq; lanis aptiſſima eſt. Quapropter ruſtici, & agreſtes mulieres, quod lanarum in-  
ſciæ Rubiæ quotannis plurimum emant, huius radices effodiunt, & uendunt, unde tantum quæſtus faciunt, ut ſibi  
ſuiq; victum ſuppeditent. Mittit hanc abunde Hetruria, præcipuè Senenſis ager. Expetuntur folia noſtratibus mu-  
lieribus, quod aſperima ſint, ad ſtagnea uafa detergenda: ſiquidem mirum dictu quam pulcherrimè niteſcant, quæ  
Rubem fuerint experta. Rubia meminit Galenus libro vi. ſimplicium medicamentorum, ubi ſic ſcribit. Eſt au-  
tem Rubia tinctorum radix acerba, & guſtu amara. Itaq; quæcunq; agere dictum eſt ſuperiore libro, ubi in unum  
cuſmodi coierunt facultates, ea omnia in hac radice luculenter conſpicias. Quippe cum & lienem, & iecur expur-  
get, & urinas craſſas, multasq; ac nonnunquam etiam ſanguinolentas uacuet. Quin & menſes ciet, ac mediocriter  
quæ extenſionem poſtulant, extergit: proinde uutiligines albas cum aceto illita iuuat. Sunt qui eam iſchiadicis, hoc  
eſt, coxædicum doloribus aſſectis, & reſolutis, in potu cum melicrato exhibeant.

Rubiæ uires  
ex Galeno.

## LONCHITIS ALTERA.

ΛΟΥΧΙΤΙΣ. LONCHITIS. CAP. CXLIII.

Lonchitidis  
confider.ALTHAEA. *Althea*Lonchitidis  
uires ex Gal.

LONCHITIS folia habet porri, latiora, rubra-  
tia, plurima, ad radicem circumfracta, ueluti in terram  
procumbentia, pauca in caule: in quo flores, cer-  
glericuli, hiantibus comicis personis similes, nigri, &  
rictu albam exerentes uelut linguam, quæ ad labrum  
inferius spectet. Semen in uolucris clausum lanceo-  
simile, triangulum: unde sibi cognomen arrogat.  
radix dauci. Nasceitur in sitientibus, & asperis. Ra-  
dix ex uino pota urinam ciet:

ΛΟΥΧΙΤΙΣ ΕΤΕΡΑ. LONCHITIS ALTERA.  
CAP. CXLV.

ALTERA est Lonchitis, quam aliqui asperam  
lonchitin dicunt: folia scolopendrij emittit, sed aspe-  
riora, maioraque, ac multo magis diuisa. Vuln-  
eribus mirum in modum prodest, in eisque inflam-  
mationes excitari non patitur. Pota ex aceto lienem ab-  
sumit.

ET ER in copulibus Italia, ac Germanie montibus, &  
asperis, & aridis locis diu multumque perquisierim prius Lon-  
chitidis genus: ipsum tamen hactenus mihi non licuit reperire,  
neque etiam ab alijs inuentum uidere. Ceterum Lonchitis altera  
iam pridem uidimus studio, ac liberalitate Luce Gualtheri  
clarissimi, qui eam Pisis ad nos misit. Hæc folia habet scolopendrij,  
asperiora, maiora, magisque diuisa, ut eius pictura  
exhibemus, probe ostendit. De prima Lonchitide differunt Plin-  
nius libro xxv. capite xi. ubi sic inquit. Lonchitis non, ut p-  
terique existimauerunt, eadem est, quæ xiphion, aut phlegmon,  
quanquam cuspidi similis semine. Habet enim folia porri ruben-  
tia ad radicem, & plura quam in caule, capitula personis comi-  
cis similia, paruam exerentibus linguam, radicibus pro-  
longis. nascitur in sitientibus. Hactenus Plinius, qui horum plerumque a  
Dioscoride mutuatus est: Lonchitidis utriusque meminit Gale-  
nus libro vii. simplicium medicamentorum, ubi de earum uir-  
tutibus ita scribit. Lonchitis, eius uidelicet, quæ semen habet trian-  
gulare figura lanceæ simile, radix potissimum quodammodo si-  
milis est radici dauci: proinde urinam ciet. Porro eius, quæ scolopendrijæ  
similia habet folia, ea ad glutinanda uulnera uocata  
sunt uiridia: sed sicca cum aceto pota, lienes induratos sanat.

ΑΛΘΕΙΑ. ALTHAEA. CAP. CXLVI.

ALTHAEA, quam alij Ibisum uocant, in syl-  
estrium maluarum genere est, cui folia ut cyclamino  
rotunda, lanugine canescunt: flore rosaceo: bicubi-  
tali caule radice terna, intus alba. Althea appellatur,  
quod inter primas sit utilis, & pluribus polleat reme-  
dijs. Decocta enim in uino aut aqua mulsa, & per se  
cum imponitur tusa, efficax est contra vulnera: item  
ad strumas, parotidas, abscessus, mammarum inflam-  
mationes, fracta sedis, inflationes, nernorum rigores:  
siquidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatri-  
cem perducit. Cocta, ut dictum est, adiecto suillo adipe,  
aut anserino, terebinthinæ, ut malagmatis len-  
tor fiat, facit ad uulnæ inflammationes, præclusiones-  
que, in pectus subdita. Decoctum eodē fungitur ma-  
nere: onera uulnæ, reliquiasque à partu extrahit. De-  
cocta radice, succus ex uino potus, succurrit urinae  
difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis,  
ischiadici, tremulis, ruptis, dentium mulcet dolo-  
rem, cum

rem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen siccumque tritum, uiligines in sole cum aceto perunctas emendat. Eodem cum oleo & aceto peruncti, à uenenatis non feriuntur. valet contra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, aluique profluuium. In posca, aut uino decoctum bibitur, contra omnes uesparum, apum, similiumque aculeatos ictus. Folia cum olei momento, moribus, & igni ambustis illinuntur. Constat aquam, trita radice addita, sub diuo addensari.

ALTHAEA à Latinis posset Medica simpliciter dici, quoniam ab ἄλθαῖνα, quod Græcis mederi significat, et non habere uidetur. Quocirca meritò scriptum reliquit Dioscorides, Althæam id nomen traxisse à multitudine rectorum, & frequenti eius usu. Ea uulgaris herba est, nullisq; non cognita. Latini hanc Ibisum nominant. Italici, corrupti à Latinis appellatione, & præposita malua, quod cum ea quandam habeat cognationem, composito nomine Maluauisco uulgò uocatur. Althæam memorie prodidit Theophrastus libro ix. cap. xix. de plantarum hisforia, ubi de ea dixerit ijs uerbis. Et radicem Ibisici aquam posse addensare aiunt, si tritam inieceris, sub duoq; humorem posueris. Constat Ibisicus folio malue maiori, pilosioriq; caule molli; flore luteo: radice nervosa, alba: fructu melae. caulis quoq; gustu maluan reddidit. Vfus eius ad rupta, & tusses è uino dulci, & ad ulcera in oleo. Aliam quendam si carnibus concoquas, in idem aggregare, ac ueluti conglutinare posse affirmant: alias uim attractoriam possidere, modo magnetis lapidis, atque succini. hæc in inanimatis. hæcenus Theophrastus. Meminit Ibisici Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, ubi eius uires ita descripsit. Ebiscus, siue althæa (est autem malua agrestis) facultatem habet digerendi, laxandi, phlegmonem leuandi, mitigandi, concoquendi difficilia coctu tubercula. Radix porro eius, & semen cætera quidem similiter agunt, ut herba uiridis, sed tenuiorum partium, magisq; exiccatorum, ad hæc magis exterioriam quam illa facultatem ostendunt, ut & uiligines detergant, & semen renum calculis confringat. Radicis uerò decoctum dysenteriae, alui profluuii, & sanguinis reiectioni utile est, nempe ciam ad frangentem quandam facultatem possideat.

Althææ consideratio.

Althææ uires ex Galeno.

## herba sativa ALCEA. CAP. CXLVII.



ALCEA syluestrium maluarum generi assignatur. folia habet diuisa, uerbenacæ proxima: caules tres aut quatuor, cortice cannabino uestitos: florem rosæ, paruum: radices albas, latas, quinque aut sex, cum plurimum cubitales. Quæ cum uino, aut aqua potæ, dysentericis, ruptisque medentur.

Alceæ consideratio.

ALCEAM hodie passim ferè in Italia aliqui Bismalum, alij Maluam syluestrem, nonnulli etiam Maluauiscum agreste nominant. Herba est caule, floribus, ac semine hortensi malue perquam similis, sed folijs longiori incisura laciniatis, ranunculi modo. Nascitur in incultis, campestribus, & agrorum, scrobumq; marginibus, iuxta sepes, uias, ac semitas. Alceæ radicibus non desunt, qui althææ loco utantur, cum huius copiam non habeant, ad tumores tum soluendos, tum emolliendos. Porro Alceæ peculiari capite meminisse Galenum non reperio, nisi hanc syluestrem maluam appellauerit, dum malue facultates libro vii. simplicium medicamentorum describit, his uerbis. Malua sylvestris quidem digerentis paululim, & emollientis leuiter est facultatis. Hortensis uerò quanto plus habet aqueæ humiditatis, tanto facultate imbecillior est. Fructus eius tanto ualidior est, quanto & siccior. hæc Galenus. Ceterum Paulus seorsum Alceam retulit libro vii. ubi sic inquit. Alcea sylvestris malue genus est. In uino pota dysenteriae, & erosionibus medetur, potissimum eius radix.

Alceæ uires ex Paulo.

## Κανναβις CANNABIS. CAP. CXLVIII.

CANNABIS satiuæ planta magni in uitâ usus ad robustissimos funes factitâdos: folijs fraxini, graui odore: caulibus proceris, inanibus: semine rotundo.

quod largiore cibo genituram extinguit. Succus ex ea recente conuenienter aurium doloribus infunditur. Syluestris cannabidis uirgas fert althææ similes, minores, nigriores, & asperiores, cubiti altitudinæ æquantes: folio satiuæ, nigriore, & asperiore: flore lychnidis, subrubro: semine, & radice althææ. Decocta radix, illitu inflammationes mulcet, tumores discutit, tofos articulorum dissipat. Huius cortex torquendis funibus accommodatus.

CANNABIS satiuæ planta est adeo uulgaris notitiæ apud omnes Europæ nationes, ut omnino superuacuum sit eius faciem uerbis representare. Sylvestris autem quanquam in multis Italiæ locis proueniat ciam syluosis, tum ex campestribus; paucos tamen esse puto, qui legitimam ostendant. Ceteram satiuæ semen in cibis sumptum planè contrarium

Cannabidis consideratio.


## CANNABIS.

Cannabis, uir-  
res ex Galen.

ANAGYRIS.

contrarium efficit in gallinis, et in nobis: siquidem largius com-  
 edatum nobis genituram extinguit: gallinas uero ouiferas  
 reddit. Experientia enim compertum habeo, gallinas, quæ hyeme,  
 quo tempore algoris seuitia raro oua parere solent, Cannabis se-  
 mine uescuntur, numerosiore ouorum partu gaudere: id quod fre-  
 quenti cantu suo declarant. Illud præterea mihi non abiit in-  
 stitutum, quod Cannabis recentis decoctum, expressa deinde fortiter ber-  
 ba, terrestrium lumbricorum cauernulis inspersum, statim eos euo-  
 cat. Quod piscatoribus acceptum referendum est, qui hoc ingenio  
 uermiculos capiunt suis hamis infigendos. Verum non modo terre-  
 nos uermes euocat Cannabis decoctum, et succus eius expressus,  
 sed etiam (ut Plinius lib. xx. cap. xxiii. autor est) uermiculos, et  
 quodcumque animal in aurem intrauerit, eiicit. Hinc itaque quædam  
 conijcere potest, eius facultatem ad interaneorum uermes hanc in-  
 becillam fore. Cannabis meminit Galenus lib. vii. simpl. medic.  
 sic inquit. Cannabis semen flatus discutit, adeoque desiccatur, ut si  
 plusculum edatur, genituram exiccat. Sunt qui ex eo uiridi succum  
 exprimentes ad aurium dolores ab obstructione, ut mihi uidetur,  
 natos utantur. Et lib. i. de aliment. facult. idem de Cannabis in-  
 scribit. Non quemadmodum planta ipsa Cannabis uiridis quodcumque  
 do est similis, ita semen semini facultate est simile: sed plurimum ab  
 eo disidet, ut quod decoctum est difficile stomacho, ac capiti nocet,  
 prauis sit succi. Sunt tamen qui eo quoque friso cum alijs tragemen-  
 tibus uescantur. Tragemata autem uoco ea, quæ post cenam uolun-  
 ptatis inter bibendam excitande gratia manduntur. Multum autem ca-  
 lesfacit: ideoque sumptum paulo largius caput ferit uapores sursum ad  
 capsum mittens, calidum simul ac medicamentosum. hec Galenus. Ex  
 quo apparet quam grauiter errent mulieres, quæ pueris comitanti  
 morbo laborantibus Canabini seminis decoctum exhibent. quo tan-  
 abest, ut morbum curent, ut etiam eius augendi occasione præbeant.

ANAGYRIS ALTERA.



ANAGYRIS frutex est arboris instar, perquam grauis odore: folijs uiticis, uirgisque: flore brassicæ: semen in corniculis non breuibus gignit, subrotundum, firmum, uersicolori facie, simile renibus, quod durefcit uia maturefcence. Tenera folia trita tumores illitu reprimunt: si parum hæreat, & secundæ, mensesque morentur, drachmæ pondere bibuntur in passo: sic & suspiriosis dantur, & contra capitis dolores in uino. difficulter parientibus adalligantur, ita ut à partu statim auferantur. Radicis cortex concoquendis, discutiendisque adhibetur. Semen commanducatum uomitiones uehementer ciet.

QUANVIS ueteres unius tantum Anagyris meminerint; duo tamen in Italia uidentur genera. Maius in Apulia frequentissimum nascitur, et eo Campaniæ tractu, quo Terracina itur Fundum ad Tyrrheni litus: folijs uitici promixtis: flore brassicæ racemoso: fructu hortensi simlaci simili, amplioribus tamen, et breuioribus paulo siliquis instructo, colore purpurascence, usque adeo duro, ut aqua macerato, sua in pertinaci duritie consistat. Minus, quod rursus Tridentina uulgò uocant Egbelo, maio et iunio mensibus grato in montibus spectaculo floret. Micat enim aureo flore, alteri omnino simili, odore tamen ingrato. Hinc cornicula prodeunt genistæ æmula: in quibus semen continetur eiusdem genistæ magnitudine, sed oblongum, phaseoli modo, colore subnigro. Quod comedentes quandoque ignari pastores, ueluti legumina, crebris adeo uomitionibus afficiuntur, ut nonnunquam uiderim ego quosdam, qui sanguinem usque euomuerunt. Materies ligni durissima, quæ guaiaci modo exterius lutea est, interius uerò nigra. Incorrupta diu durat: proinde uinitores ex Anagryi palos facilius sustinendis uitibus aptissimos, hosque cæteris præferunt ex alijs arboribus factis. Quin et sagittarij ex ea ualidissimos arcus conficiunt. Hac planta scatet uallis Anania; ac uersus Tridentinus ager. Anagryis uires memorie prodidit Galenus libro v. simplicium medicamentorum, his uerbis. Anagryus frutex est grauitè olens, et acris, digerentis, excalfacientisque facultatis. Sed folia etiamnum uiridia, cum propter humiditatis admissionem minus sint acris, idcirco tumentia reprimunt. At siccata incidentis sunt, exiccantisque ualenter facultatis. Similem ferè facultatem habet radicis eius cortex. Semen autem magis subtiliū est partium: sed et uomitum prouocat.

Anagryis cōsiceratio.

Anagryis uires ex Gal.

CEPÆA portulacæ similis est, sed nigriora habet folia, & radicem tenuem. Folia in uino pota uiridæ stillicidio, & uescicæ scabie laborantibus opitulantur, maxime id præstat, si cum decocto radicum asparagi eius, quem myacanthon, hoc est, corrodam uocant, bibatur.

CEPÆAM, quam antea in nostris commentarijs Italica lingua conscriptis, ingenuè confessus eram me nondum comperisse, aut ab alijs. compertam uidisse, hoc tempore Venetijs ad me misit Ioannes Odoricus Melchiorius Tridentinus medicus pro ætate sua non imperitus, reique herbariæ non ignarus, mei adeo studiosus, ut si aliud non esset, hoc nomine tantum mihi plurimum diligendus sit, atque etiam in filium habendus. Ad CEPÆAM hanc redeo. Ea sanè mihi uisa est ita adamussim Dioscoridis descriptioni respondere (id quod eius pictura, quam hic damus, graphice ostendit) ut non dubitandum putem, quin hæc sit uera ac legitima CEPÆA. Huius, quod equidem legerim, Galenus non meminit in simplicium censu. Veruntamen Paulus eius mentionem fecit libro vii. inter simplicia, ubi eam retulit his uerbis. CEPÆA portulacæ similis est. Folia ipsius contra uescicæ scabies utiliter bibuntur. Radix cum asparago, quem myacanthinum, hoc est, corrodam appellant, pota, urinae stillicidia, quæ ex obstructione sunt, abigit.

Cepæe cōsideratio.

Cepæe uires ex Paulo.

ALISMA, alij Damasonion appellant: folia ei plantaginis, nisi angustiora essent, & laciniosa, conueque in terram: caule simplici, tenui, cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, candido, pallescente: radicibus tenuibus, ut ueratri nigri, acribus, odoratis, modicè pinguibus. aquosos amat tractus. Radix, si drachma una, aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem marinum deuora-



runt, aut à rubetis ranis demorſi ſunt, aut opium hauſerunt: torminibus, atque dyſenteriz, per ſe, aut cum pari modo ſeminis dauci, potui datur. còuulſis, & contra uitia vuluæ prodeſt. Herba ſiſtit alium, menſtrua pellit, tumores illita mitigat.

Alifmatis cò-  
ſideratio.

**Q**UANTQVAM affirmat Ruellius, cui etiã Fuchſius ſubſcribere uidetur, Alifma, quam haſtenus herba equi-  
dem non uidi, ſibi cognitam eſſe, uocariq; à nonnullis Paſtoralem fiſtulam, à quibusdam uerò Plantaginem aquaticam;  
tamen plantago hæc, quam etiam aliqui Barbam ſyluanam appellant, nullis notis cum Alifmate conuenire deprehenditur. Siquidem Alifma folia fert plantagini ſimilia, ſed anguſtiora, & in terram reflexa: caulem mittit ſimplicem, & tenuem. Plantago autem aquatica folijs prodiit plātagine maioribus, lancearum cuſpidum inſtar acuminatis, ſurſumq; ſpectantibus: multiplici caule, adnatis pluribus referto. Cum itaq; ex ijs notis collatis còſtct, Alifma, & Barbam ſyluanam inter ſe plurimum diſſerre, non temerè facere uideor, quòd illorū ſententiæ non auſim adſtipulari. Duo Alifmatis genera Plinius conſtituit lib. xxv. cap. x. ubi de utroq; diſſerit his uerbis. Alifma, inquit, alij damaſonem, alij hyron appellant. folia ei plantaginis, niſi anguſtiora eſſent, & magis lacinioſa, conuexaq; in terram, alijs etiam uenofa ſimiliter: caule ſimplici, & tenui, cubitali: capite thyriſi: radicibus denſis, tenuibus, ut ueratri nigri, acris, odoratis, pinguibus. naſcitur in aquoſis. Alterum genus euſdem in ſyluis, nigrius, maioribus folijs, hæc Plinius.

Alifmatis ui-  
res ex Gal.

Alifma memoriæ prodidit Galenus libro vi. ſimplicium medicamentorum, ſic de eius uiribus diſſerens. Damaſonium, aut Alifma. De hac herba in tertio libro tradit Dioſcorides, quòd radix eius epota dyſenterias ſanet, & diſſiſtat, atq; cedemata mitiget. Sed nos ea quidem experti non ſumus. Quòd autem conſtitutos in renibus calculos aqua, in qua decocta fuerit, pota comminuat, caſu experti ſumus. Ex quo liquet, quòd abſterſoriam quandam facultatem obtinet.

† Hæc uox non legitur in Græcis codicibus, neque ab Oribafio refertur, neque etiam à Marcello uertitur. Vnde planè ſuſpicio, quòd Ruellius ita uerbum hoc ex Plinio adiecit, ut reliqua etiam ex eodem reddidit.

### ΟΨΟΒΡΥΧΙΣ. ONOBYCHIS.

CAP. CLII.

**ONOBYCHIS** folia habet lentis, longiora paulò: caulem dodrantalem: florem puniceum: radicem parua. naſcitur in uliginofis, & incultis. Herba ſuapte ui, ſi trita illinatur, tubercula diſſipat: cum uino pota, ſtrangurias ſanat: illita ex oleo, ſudores mouet.

Onobrychis  
còſideratio.

**N**ASCITUR Onobrychis, Plinio libro xxiii. cap. xvi. autore, circa fontes. Folia habet lentis, paulò longiora: florem rubentem: radicem exigua, & gracilem. Sunt qui Onobrychin uelint eam eſſe herbam, quam aliqui Rutam caprariam, alij Galegam uocant: nos uerò uulgò Lau-  
**HYPERICVM.**

Vires ex Ga-  
leno.




neſe. Verum hæc notis, quæ Onobrychi tribuuntur, haud quaquam reſpondere deprehenditur. quippe quæ folia ferat lentis quadruplò maiora, caulem plerumq; bicubitalem, flores purpureos, & radicem nò parua. Vt hinc mihi planè uideatur, quòd illorum opinioni nemo rectè poſſit, aut debeat adſtipulari. Onobrychidis uires tradidit Galenus libro viii. ſimplicium medicamentorum, ſic inquit. Onobrychis rareſaciendi, digerendiq; uim obtinet: proinde folia eius uirentis etiamnum illita ad morum cataplaſmatis tubercula diſcutiunt: arefactæ uerò, ſi cum uino bibantur, ſtrangurias ſanant. Quinetiam ſudores eliciunt cum oleo inuncta.

### ΥΠΕΡΙΧΟΝ. HYPERICVM. CAP. CLIII.


St. Jamb. & Kant

**HYPERICVM** alij androſæmon, alij corion, alij chamæpityn appellant, quoniam ſemē odore refinam imitatur: ſurculaceo frutice, dodratali, ruſcente: folio rutæ: flore luteo, † leucoio ſimili, qui digitis attritus ſanguineum ſuccum remittit, qua ex cauſa androſæmon cognominatur: ſubhiſſuta ſiliqua, & in rotundo oblonga, hordei magnitudine: ſemine intus nigro, refinofi odoris. gignitur in locis cultis, & aſperis. Vrinam cit, menſtrua pellit appoſitū: tertianis, quartanisq; cum uino potum liberat. Semen quadraginta diebus hauſtum, iſchiadicis medetur. Folia cum ſemine illita, ambuſta ſanant.

ASCYRVM. *h. art. f. m.* ANDROSAEMONVM.



CORIS.



Ασχυρον. ASCYRVM. CAP. CLIIII.

ASCYRON, siue ascyroides, hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosus, maiores habens ramos, furculosiores, rubentesque: folia tenuia: flores luteos, & fructum resinofum, hyperico non absimilem: cuius attritu digiti ferè cruentantur, qua de causa androsæmon uocauere. Vfus seminis ad ischiadicos, potum in hydromelitis sextario: nam biliosa recrementa amplissimè detrahit. sed assiduè dare oportet, donec sanitati restituantur. Illinitur & ambustis efficaciter.



Ανδρῶσαμον. ANDROSAEMON. CAP. CLV.

ANDROSAEMON ab hyperico, ascyroque differt, quòd fruticet ramulis furculosis, ac tenuibus: rubentibus uirgis, & folijs rurs, triplo aut quadruplo maioribus, quæ trita uinoso succo manant. complures alas habet in cacumine, utrinque expansas, pinnatasque: circa quas flores pusilli, lutei: & in calyculis semen papaueris nigri, insigne lineis: Huius comæ trita resinofum odorem reddunt. Semen tritum drachmis duabus potum, biliosa alui excrementa pellit. ischiadicis maximè medetur: sed à purgatione aquam exorbere oportet: Herba ambustis illita medetur, & sanguinem cohibet.

**CORIS**, quod aliqui hypericon uocant, frutex est folio ericæ, rubro, pinguiore, ac minore, non altior dodrante, suavis, odoratus, acris. Potum semen menses trahit, & urinas: cōtra pīnā giorum morsus, ischiadicōs, & opisthotonicos ex uino potum auxilio est: horribus ex pipere, sed opisthotonicis ex oleo, aptissimè illinitur. Radix uinō decocta potaque, defectis opem inter creditur: sed laborantem inter potandum quàm optimè cooperiri licet: siquidem corpus totum defudabit, ex qua re pristinam agilitatem recuperabit.

Hyperici, &  
congenerum  
consider.

Perforata

Plinij lapsus.

Brasauoli er-  
ror.

Monachorū  
hallucinatio.

Hyperici ui-  
res ex Gal.

**HYPERICVM**, *Ascyrum*, & *Androsenum*, eiusdem planē generis plantæ (ut Dioscorides inquit) esse uidentur. Verum in earum caulibus, & folijs aliqua notatur differentia: nam hæc folia habet rubentiora, illa uero ra, uni maiora insunt, alteri minora. Similis discriminis ratio in caulibus. Omnes hæc congeneres plantæ bodæ & omnibus uulgò cognoscuntur: eæ nanque iunio, & iulio mensibus, diuersis in locis aureis floribus ornate conspiciuntur, ijs adamusum distincte ac præditæ notis, quæ singulis à Dioscoride tribuuntur. Ceterum quæ Coris uocatur, non ita Hypericum refert, quemadmodum *Androsenum*, & *Ascyrum*. quippe quæ non altior dodrantati dimidiet assurgat: folijs ericæ, minoribus tamen, & subpinguib; caulibus rufescentibus, odore suauis, ac grato. Hæc æ pluries allata est à nostris herbarijs. nascitur frequentissima in Italia. Hypericum à perforatis folijs à nostris uulgò *Perforata* uocatur: folia enim innumeris scatent foraminibus, ijsq; adeo minutis, ut uisum effugiant, nisi ipsa sole obiecta inspiciantur: id quod silentio uidetur inuoluisse Dioscorides: quinetiam Plinius, alioquin rerum omnium diligentissimus indagator. Qui tamen hæc in historia baud dubie falli deprehenditur, quod scripserit libro xxvi. c. viii. Hypericum nasci semine in siliqua, nigro, maturescere cum bordeo. Siquidem Dioscorides non tradit Hypericum cum bordeo maturescere, sed contineri eius nigrum semen siliqua subbisfuta, & in rotundo oblonga, herbei magnitudine. Constat præterea annua experientia maturescere bordeum plerumq; abeunte maio: uerum Hyperici semen non perficitur, nisi iulio, & augusto mensibus. In hac quoq; Hyperici historia errat Brasauolus medicus licet clarissimus, quod uelit Hypericum ex Dioscoridis auctoritate florem album habere: eamq; ob causam id quod circunfertur, cum flore sit melino, illegitimum esse putat, imò non aliud, quàm *Rutam syluestrem*, pro qua pōtè & polam secum colloquentem, id ipsam asseruare admonet. Neq; in his uno tantum, sed, quantum sentio, duplici notetur errore. Primum quod Hypericum non album, sed luteum florem ferre scribat Dioscorides contra Brasauoli sententiam, cum sic in eo legatur ἄνθος ἔχον μᾶλλον, hoc est, florem habens luteum: non autem album inquit, ut perperam Marcellus Florentinus interpretatur, cuius fortasse falsa interpretatione Brasauolus seductus est. Deinde quod legitimum Hypericum pro sylvestri ruta seruandum censuerit, cum tamen in calce ferè sui uoluminis prioris sententiæ oblitus, dum olei ex Hyperico parandi seniori myropolæ rationem explicat, communis usus Hypericum *Ascyrum* esse declarat. Nec secus quàm Brasauolus hallucinantur, pace eorum dixerim, Monachi illi reuerendi, qui in Mesuem commentarios ediderunt, quod non rectè cum illo sentiant, Hypericum, quo utimur, primum esse sylvestris rute genus. Quorum sententia cum fuerit à nobis superius in rute mentione rationibus & auctoritatibus abunde explosa, & improbata, superuacuum esset idem nunc repetere: eo enim accedet, qui plura eorum errata cognoscere uolet. Hyperici uires memorie prodidit Galenus libro vii. simplic. medicam. sic inquit. Hypericum cæces facit, & desiccatur, tenuisq; substantie est, adeo ut & menses, & urinas prouocet. Sed ad hæc totus sumendus est fructus, non tantum semen. Porro cum folijs illius uiridis ad cicatricem ducit cum alia, tum etiam ambusta. Ceterum si sicca confusa inaspergas, sanabis humida, & putredinosa ulcera. Sunt & qui ischiadicis bibendum exhibeant. Vnde lib. vi. de *Androseno* ita scribit. *Androsenum* planta fruticosa, natura duplex: unum enim *Ascyron*, & *Ascyron* des nuncupatum est, species hyperici. Alterum uerò à quibusdam Dionysias appellatur. Est autem semen eorum par gatorium. Foliorum uerò facultas modicè extergens & desiccans, ut & ambusta sanare credantur. Ceterum in uino austero decocta, uinum ipsum magnorum uulnorum glutinatorium efficiunt. Sed quod de Cori mentionem facit Galenus in simplicium medicamentorum censu, mihi incompertum est.

† Quoniam hoc loco in uulgatis exemplaribus Græcis nulla sit albæ uiole mentio; idcirco sunt qui illorum testimonio freti, uerbum illud auferant ex interpretibus. Sed quomodo id rectè factum sit, non uideo: siquidem in Orbesio legitur, ἄνθος ἔχον μᾶλλον λευκὸς ὁμοίος, hoc est, florem habens luteum leucoio similem. Adde etiam, quod Hypericum ita adamusum floris colore luteam uiolam representat, ut nihil melius. Nos autem uisum uoce Græcæ, ne ex albo, quod fortè Marcello imposuit, aliqua possit oriri difficultas.

† Quæ hic sequuntur, in Græcis codicibus impressis non hoc loco, sed in fine inter notia, & Dioscoridi falso descripta leguntur, ut quæ adscititia sint habita. Nos uerò illa hæc admisimus Ruellij, ut facinus, interpretationem fecuti: necnon etiam fidem codicis manu scripti.

ἄλλοι δὲ ἀπὸ τοῦ ἁμαρπύτου. *AIUGA*. CAP. CLVII.

**AIUGA** herba in terra repens, subcurua: folijs semperuini minoris, multò tenuioribus, hirsutis, & pinguioribus, circum ramos frequentibus, odore pinus: flore tenui, luteo, uel candido: radicibus cichorij. Folia septem diebus in uino pota regio morbo medentur: & quadraginta diebus ex hydromelite, ischiadicōs sanant. Dantur peculiariter urinæ difficultatibus, iecinoris, & renum uitij; torminosi profunt. Ea apud Heracleam Ponticam, perinde atq; antidoto, contra ac-

utuntur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum polenta iure decocti subacta. Tri-  
ginta in farinam, & cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit: excepta melle, cum æris squama, &  
resina deijcit: apposita ex melle, vuluæ uitia extrahit: mammarum durities discutit, vulnera glu-  
tinat: viceræ quæ serpunt, cum melle illita, cohibet. Alterum est genus aiugæ, cubitalibus ra-  
mis, in anchoræ speciem incuruatis, prætenuibus: coma supradictæ, flore candido, femine nigro.  
hæc etiam pinum redolet. Tertia mas nominatur, paruula, folijs exilibus, albis, scabris: caule  
aspero, candido: luteis flosculis, femine iuxta alas. resipit & hæc pinum. Hæ duæ uim superioris  
obtinent, sed non usque adeo efficacem.

## CHAMAEPITYS PRIMA.

*Spina & pinus*

## CHAMAEPITYS TERTIA.



AIUGAM, quam Græci Chamæpityn uocant, quoniam folijs, & odore pinum refert, herbariorum uulgu-  
s in arthriticam appellat, quod ischiadicis, & alijs articularum doloribus opem ferat non obscuram. Vulgaris est  
notitiæ Aiuga, quæ primo generi adscribitur. Verum postrema, quam sæpius etiam uidimus, non adeo omnibus est no-  
ta. quemadmodum nec media, quam hactenus mihi quidem uidere non licuit. Caterum in aperto errore uersaba-  
tur Germanus ille pharmacopola, qui Brasauoli docuit Aiugam Germanicæ lingua uocari Vergiß mein nicht. Quan-  
doquidem herba huius nominis mihi cum Germanis iandiu uersanti notissima est: quæ tamen nulla prorsus ex parte  
quædam Aiugam representat. Chamæpitios meminit Galenus libro V. simplicium medicamentorum, ubi de  
his uiribus ita scriptum reliquit. Chamæpitys gustu quidem amarum saporem acri ualidiorem obtinet. Effectu uero  
expurgat, abstergitq; uiscera plus quam calfacit. Proinde regio morbo laborantibus, & omnino quibus facile iecur  
obstruitur, bonum est medicamentum. Quin & menses ducit tum pota, tum apposita cum mellè. Sed & urinæ mo-  
uendæ aptum est medicamen. Sunt autem qui etiam eam exhibent decoctam in melicrato ijs, qui coxendicis doloribus  
torquentur. Herba porro ipsa uiridis uulnera magna conglutinat, & ulcera putrescentia sanat: Præterea mamma-  
rum durities discutit. Est enim in siccando ordinis tertij, in calfaciendo uero secundi.

Aiugæ confi-  
deratio.

Cuiusdā Ger-  
mani error.


Chamæpity-  
os uires ex  
Galeno.

# PETRI ANDREAE MATTHIOLI MEDICI Senensis Commentarii,

IN LIB. QVARTVM PEDACII DIOSCORIDIS  
ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA.

**T**RIBVS ANTE libris, amantissime Aree, tradidimus odoramenta, olea, arbores, vnguentia, animalia, frumenta, olera, radices, succos, herbas, seminaque. In hoc autem quarto deferemus de radicibus, & eis, quæ restant; herbis.

Κεστρον. **BETONICA.** *Betonica* CAP. I.



chmæ quatuor potæ in hydromelitis decem cyathis. facit cum melle ad tabem, & purulentam excreationem. Folia ficca, tritaque fictili uasè reconduntur.

**C**ESTRON psychotrophon uocatur, quoniam frigidis locis inueniatur. Latini Betonicam appellant. Herba est caulem ferens tenuem, cubiti altitudine, aut maiorem; quadratum: folia quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicem maiora: in summis caulibus semen, ueluti satyreæ, spicatum est. Decerpta huius folia siccantur, plurimos ad usus. Radicibus nititur, ut ueratri, tenuibus. quæ ex hydromelite in potu, pituitosam uomitionem euocant. Folia dari debent ruptis, cõuulsis, mulieribus vuluæ malo opportunis, & ad laxandos uteri strangularis, denarij pondere cum hydromelite: tres in uini sextario drachmæ contra serpentium morsus ebibuntur. Herba magna utilitate illatis à serpente vulneribus illinitur, aduersus etiam uenena drachma ex uino pota conuenit: præsumpta ea, si uenenum hauriatur, nihil nocet. yrinam ciet, aluum subducit. Medetur comitialibus, & infans pota ex aqua: & iecinoris, lienisq; uitij drachmæ pondere in aceto mulso. concoctionem adiuuat, si quis cum fabæ magnitudine secundum cœnam cum melle cocto deuorauerit: modo confusum li acidâ rustantibus propinatur. stomachicis eâ manducare, & succû deuorare proderit, si postea dilutum uinum sorbeatur. Datur sanguinem excreantibus, tribus obolis cum diluti uini cyatho: ischiadicis, renâ, & uesicæ doloribus ex aqua; aquæ inter cutem binis drachmis ex hydromelite, si febricitant: sin aliter ex mulso, regio morbo laborantes recreat: menses pellic drachmæ pondere cum uino pota. aluum purgant drachmæ quatuor potæ in hydromelitis decem cyathis. facit cum melle ad tabem, & purulentam excreationem. Folia ficca, tritaque fictili uasè reconduntur.

Betonica con-  
sideratio.

Vires ex An-  
tonio Musa.

**B**ETONICA herba est nullis non cognita, & innumeris prædita uiribus. Vnde Itali, cum aliquem laudibus familiariter extollere uolunt, uulgari prouerbio dicunt. Tu hai piu uirtù, che non ha la Betonica, id est, Tu præditus es uirtutibus, quam Betonica. Scripsit de Betonica uiribus proprium libellum Antonius Musa clarissimus Augusti Caesaris medicus, in quo hæc de ea memoriæ prodidit. Herba Betonica nascitur in pratis, & montibus humidis, & opacis, circa frutices. Animas hominum, & corpora custodit: & nocturnas ambulationes à maleficijs, & periculis. Loca quietiam sacra, & busta à uisibus metuendis tuetur, ac defendit: & in omni denique re sancta est.

Cestron uocatur, & psychotrophon: siquidem frigidis reperitur in locis, radicibus tenuibus, thyrso pariter tereti, cubiti altitudinē excedente, quadrangulo. Folia profert quercus, odorata: semine in summitate thyrsi spicato, utraque modo. Pollet uniuersa planta dotibus ferè innumeris, quandoquidem tusa capitisq; uulneribus illita, ea uita ex-



lente conglutinat. Præstat id tamen efficacius, si tertio quoque die iterum, atque iterum imponatur. A iunt præterea  
 ut alienis esse facultatis, ut ossa quoque fracta extirpat. Radicum ex aqua decoctum ad tertias fori oculorum do-  
 loris medetur. quod item præstant contrita folia, et fronti superimposita: Succus à folijs per se tritus expressus,  
 et prius aqua maceratis, aurum dolores mulcet; si tamen addito rosaceo in aures egelidus instilletur. Idem dracha-  
 ne possidere haustus in aquæ calidæ cyathis quatuor, sanguinem illum per inferna trahit, cuius redundantia caligines  
 oculis offundit. quo fit, ut etiam visum acuant comesta folia. Eadem cum salis momento contusa, naribusque immissa  
 sequentem inde fluentem sistit. Betonica decoctum ex uetere uino, aut ex aceto dentium dolores finit, si eo os sæpius  
 claudatur. Herba ipsa ex tepenti aqua pota suspiriosis, et anhelosis maxime proficit. Folia melle excepta tabidos iu-  
 uat, præsertim qui purulenta extusunt. Eadem tribus continuis diebus deuorata drachmarum quatuor pondere;  
 et ex frigide aquæ cyathis quatuor ebibita, uentriculi dolores mulcet: iecinoris uero, si ex calida hauriatur. Ex  
 decoctis lienis uirgis medetur. Sanat et renum uitia ex mulso bibita, duarum drachmarum pondere: ex uino au-  
 tem uentriculi drachmarum pondere, additis piperis granis septem et uiginti, ad lateris, liamborumque dolores uti-  
 lissime bibitur. In duobus aquæ calidæ cyathis sumpta, alui et intestinorum tormina remouet, si tamen à crudis non  
 sit succis. Foliorum quatuor drachmis in aquæ mulsæ cyathis octo epotis, commodè citatur alui: sananturque ijs ex  
 decoctis colici inflammatione uexati. Betonica in eclegmate ex melle sumpta nouem diebus, tussim sedat. Pota in  
 aquæ calidæ cyathis quatuor duarum drachmarum pondere, addita plantaginis drachma, febres quotidianas expellit,  
 etiam in accessionibus tantum fieri debet. Idem præstat etiam in tertianis, si cum pari pulegio assumatur. Sanat  
 ipso quoque ordine etiam quartanas in tribus aquæ calidæ cyathis hausta, trium drachmarum pondere, addita mellis  
 duas: calculi franguntur. Betonica ex tepenti aqua feliciter bibitur hydropicis. Pariendi celeritatem affert, utriusque  
 etiam à frigore conceptus mulcet, si ex calida aqua, aut mulso duarum drachmarum pondere propinetur. Con-  
 trita folia et illa, præcisos glatinant nervos, et resolutos iuuant. Eadem trium drachmarum pondere ex caprillo  
 lacte sumpta tribus diebus, sanguinem ore reiectum cohibent: et ex pari uini ueteris mensura, medetur ruptis, et ab  
 eo deuolutis. Præsumpta ebrietatem arceat. Ex uino frequenter hausta, ictericos sanat: et fuillo adipe admixta, car-  
 bunculos curat. Pota ex aceto mulso unius drachmæ pondere, uiatoribus longo itinere defatigatis uires mirifice refra-  
 cit. Fastidia abstergit, et stomachicos recreat. Aduersatur uenenis, et serpentium, et uenenosorum rabidorumque  
 morsumque animalium moribus non modo intus sumpta, sed extrinsece emplatri modo imposita. Cuniculosa, sinuosaque  
 sunt ulcera cum sale indita. Ex uino hausta menses ciet. Potu dolores podagricos lenit, præsertim radicem deco-  
 ctam potam. Idemque præstant contrita folia imposita. Betonica uires memorie prodidit Galenus lib. vi. simpli-  
 cium medicamentorum, sic inquit. Cestron, aut Psychrotropon, Romanè uero Betonica, uim habet incidendi, ut  
 Galenus indicat. Amarior enim est, et subacris ipsa herba: id quod et particulatim edita actio ostendit. Nam consti-  
 stentes in renibus calculos diuidit, et pulmonem, et thoracem, et uicem expurgat, abstergitque, menses quoque ciet, et  
 coxalibus prodest: tum rupta, conuulsaque curat, et omnibus bestiarum moribus ulcere illi auxiliatur. Postre-  
 mo acutum ructantibus, et ischiadicis bibita, auxilio est.

Betonica uires ex Gal.

### BRITANICA. *Eugenia fraxinea* A.P. II.

BRITANICA, aut Vetonica, folia habet syluestris lapathi, sed nigriora, & pilosiora, gustu  
 adstringentia: radicem tenuem, & breuem: caulem paruum emittit. Folijs exprimitur succus, qui  
 igni aut sole cogitur. Vim habet adstringentem, priuatim depascentibus oris, & tonsillarum ul-  
 ceribus accommodata. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione est opus.

QUANQUAM tradit Ruellius Britanicam esse plantam Italiæ cognitam, atque ibi uulgo appellari *Piaton-*  
*em*; mihi tamen hætenus non solum nomen illud incompertum est, sed nullum etiam inuenire obtiguit, qui Britanicam  
 ostenderet. Hanc autem scriptis celebravit Plinius libro xxv. cap. 111. hisce uerbis. In Germania trans Rhenum  
 castris à Germanico Cesare promotis, maritimo tractu fons erat aquæ dulcis solus, quæ pota dentes intra biennium  
 tenderent, compagesque in genibus soluerentur. Stomacacem medici uocabant, et scelety benè mala. Reperta au-  
 tem est herba, quæ uocatur Britanica, non neruis modò et oris malis salutaris; sed contra anginas quoque, et serpen-  
 tes. Folia habet oblonga, nigra: radicem etiam nigram. Flos ei, qui (ut certò proditur) collectus priusquam toni-  
 bus audiantur, et deuoratus securos in totum reddit homines. Frisij, quæ castra erant, nostris demonstrare illam.  
 hec Plinius. Ceterum non desunt, qui Britanicam censeant eam esse stirpem, quam herbariorum uulgus ideo Bi-  
 storta appellat, quod radice contorta nitatur: Sed eorum planè error facile deprehenditur: quandoquidem etsi Bi-  
 storta uulgi coniet folijs; non tamen ea nigra sunt, neque pilosa: quinimò leuia apparent, superne rufescentia, et à  
 utraque quædam cæsa. Ad hæc Britanica radix, subest tenuis, breuisque: Bistorta uero crassa; serpentis iacentis  
 modo contracta, et intorta, colore rubro, non (ut Plinius inquit) nigro. Sed præterea non desunt etiam, qui Tor-  
 mentilla sic officinis, et uulgo uocant Bistorta generi adscribant, quod non facie, sed fortasse uiribus illi respon-  
 deat. Quæ quoniam hic nobis occurrit, et quàm plurimis effertur laudibus, ideo hic locus exposcere uisus est, ut de ea  
 diuini differamus. Est itaque TORMENTILLA folio pentaphylli minore, septenis incisuris diuiso: radice bre-  
 uia, rotunda, compacta, rubeo colore, sapore adstringenti: cauliculis tenuibus, subrubentibus: flore melino, adeo ut in  
 pentaphylli genere sit reponenda. Sunt qui à septenis foliorum diuisuris Heptaphyllon hanc uocant. Herbarij comperta  
 hæc, hanc ipsa pollicere facultatibus; quibus Bistorta prædita est. Quamobrem utraq; uirine incontinentiam  
 apprimunt: sistunt menses, si in eorum decocto ad umbilicum usque confederunt femine. Idem præstant (de radicibus  
 tamen

Britanice co-  
 sideratio.

Bistorta.


Tormentilla  
 historia, & in  
 res.

Utrum fraxinea  
 Heptaphyllon


tamen intellige) si trita & ex melle atque spica subacta, uentri ac pubi illinantur. Sanguinem è uulneribus cohibent, super aspersa earum puluere. Qui item potus biliosas coërcet uomitiones, si ouorum albo exceptus super fictili tegula inassetur, mox comedatur. Aqua, quæ ex his duplici organo elicitur, siue è radicibus decoctum, ueris omnibus remedio est. Ex quo tantum apud nonnullos Tormentillæ inualuit usus, ut ex eius radicibus etiam medicamenta componant aduersus pestilentiam. Vtræq; dysentericos sanant, & uulnera glutinant, præsertim quæ in uisceribus fuerint illata, non modò ipsis uulneribus illita, sed & in potionibus hausta. Rebella, contumaciaq; cetera curant, & ea sistunt, quæ serpendo corpora erodunt. Sed ut iam ad Britanice uires redeamus, eas scripsit tradidit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Britanice herbe folia adstringentia sunt, & uulnerum glutinatoria, similia folijs syluestrium lapathorum, nisi quatenus atriora sunt, magisq; birta. Sed & expressus ex illis succus perinde natus est adstringere. itaq; coctum quidam reponunt, tanquam inter stomachica medicamenta efficacissimum. Videtur enim sanare iam etiam putrescentia. hætenus Galenus. Ceterum non est silentio prætereundum, quòd Dioscoridis codices inueniuntur, in quibus post Britanicam alteram per se de Betonica capta legitur. Quod quoniam pluribus indicijs in Dioscoride ascititium esse constat, atque in hunc autorem ex libello Antiochi Muse Augusti Cæsaris medici fuisse translaturum; idcirco nos illud abdicauimus, neque alia commentatione idcirco censuimus.

Britanice uires ex Gal.

### LYSIMACHIA.



### LYSIMACHIA ALIA.



Λυσιμάχια.

LYSIMACHIA.

CAP. III.

LYSIMACHIA, quam aliqui lytron appellant, caules emittit cubitales, altioresve, fruticosos, tenues: prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus: flore rufo, aut aureo, gignitur in aquosis, & palustribus. Foliorum succus adstringente sua ui, sanguinis reiectionem suppressit: dysentericis potui datur, aut infunditur: mensium abundantiam sistit, in pello. sanguinis profluuio subuenit, si nares ea herba obturentur: uulnerum cruorem cohibet. Acerrimum nidorem suffita reddit: qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

Lyfimachia consideratio.

Ruellij erratum.


LYSIMACHIA à Lysimacho rege inuentore nomen accepit, ut Plinius est author libro xxv. cap. vii. de ea ita scriptum reliquit. Inuenit Lysimachus herbam Lysimachiam, quæ ab eo nomen retinet, celebrata est. Folia habet salicis, uiridia: florem purpureum: fruticosa est, ramulis erectis, odore graui. gignitur in aquosis. Vis eius tanta est, ut iumentis discordantibus iugo imposita asperitatem cohibeat. hæc Plinius. Ruellius Lysimachiam eam herbam putat esse, cuius est usus apud infectores ad inficiendos uiridi colore puros: ubi enim bos glaciatur.

tenere, eam superinducentes uiridem colorem efficiunt. Hanc Hetrusci, qui laniificio dant operam, uulgò appellat Cerretta, siue Braglia, Foroiulienses uerò Cosaria: Sed hac in re Ruellius, meo quidem iudicio, aperte fallitur: siue Cerretta, quam ipse rusticis Corneolan uocari ait, caules profert, & folia lino maiora, non autem salicis: florem lateum, semen folliculis genistæ effigie inclusum: nascitur in pratis, nullaq; est, quod gustu perceperim, ad fritione prædita. Non desunt præterea alij, qui pro Lysimachia aliam plantam ostendant, quæ quadrato exit caule, folijs salicis, flore in purpuram rubescente, spicato. uerum in hac quoq; nihil adstringens gustu deprehenditur. Lysimachiam legumnam, ni fallor, Roma ad me Goritiam misit Vincentius Cantonius cuius meus medicus eruditus, & in herbarie studiosus, quæ mihi planè singulis notis, quas Dioscorides Lysimachiz tribuit, uidetur adstipulari. Nascitur hæc in Romano, & Senensi agro. Ceterum quanuis Ruellius in mentione Lysimachiz existimauerit (ut siue prædiximus) Corneolan esse ueram Lysimachiam; in fine tamen eiusdem capituli quandam aliam herbam à rusticis sibi demonstratam fuisse testatur, ad fugandæ pestilentie efficacissimâ; buboni tantum, adalligatam, quam etiam pro Lysimachia asseruit. Ex quo palam est, Ruellium duas pro Lysimachia plantas designasse, ea fortasse ratione adductus, quod Dioscorides flore rufo, aut aureo constare Lysimachiam memorie tradiderit. Lysimachiz meminit Galenus libro 11. simplicium medicamentorum, ubi de eius uiribus in hunc modum disseruit. Lysimachios superantem habet qualitatem adstrictoriam: per quam & uulnera glutinat, erumpentemq; ex naribus sanguinem emplastri modo illita compescit: quoniam & reliquis sanguinis eruptiones sistere potest cum ipsa, tum succus eius multo magis. Potæ dysenterias, sanguinis reiectiones, ac muliebri profluuium sanat.

Ruellij alius lapsus.

Lysimachiz uires ex Gal.

POLYGONVM MAS. *Unguis Uirginitatis* POLYGONVM FOEMINA.



Πολύγωνον. SANGVINARIA.

CAP. IIII.

POLYGONVM mas ramos habet teneros, & exiles, copiosos, geniculis cinctos, qui per terram, ut gramen repunt: folia rutæ, sed t̄ molliora, longioraq;: semine sub omnibus folijs turgescite, unde marem appellari uolunt: flos ei candidus, aut puniceus. Vis epoti succi est, spissare, ac refrigerare. prodest cruentæ excretioni, cholera, alui fluxionibus, & urinæ stillicidio: nam urinam aperte ciet. Cum uino potus, contra serpentium morsus auxiliatur: datur in febribus per horam ante significationes. foeminarum profluuia impositu sistit. Idem succus aurium doloribus, ipsidemque purulentis instillatur: Facit eximie ad genitalium ulcera, cum uino adiecto melle decoctus. Stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, ulceribus quæ serpunt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, & recentibus vulneribus folia illinuntur. Sanguinaria foemina fruticat uno caule, arundini teneræ simili, densis geniculis, & in se tubarum modo factis: articulos in orbem

oo cingunt

cingunt apices, foliolis piceæ similes: radices nullus usus. nascitur in riguis. Huic quoque spūs  
fandi, refrigerandi que natura ad eadem ualens, sed inefficacior.

Polygoni cō  
sideratio.

Polygoni ui-  
res ex Gal.

POLYGONON mas, quod ab Italis uulgò uocatur Coreggiola, & Centinodia, in campis, edificiorum aris,  
& uis publicis frequens ubiq; nascitur. Formina uerò, quæ non adeo frequens est, & copiosa, in ijsdem locis inueni-  
tur. Mari polygono Proserpinacæ nomen tribuit Apuleius, quòd humi caudiculis repat. Polygoni meminit Gae-  
nus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi eius uires reddidit his uerbis. Polygonum, inquit, uti adstrictioem  
quandam obtinet, ita sanè uincit in eo aqueum frigidum, ut uidelicet secundi sit ordinis medicaminum refrigerantium,  
aut etiam quodammodo in initio tertij. Proinde sanè quibus stomachus feruet æstu, foris frigidum illud prodest: ne-  
lut etiam erysipelata, & calidis phlegmonas iuuat. Porro tale cum sit, & fluxiones repercutit, & hac ratione ne-  
detur esse exiccatorium. Quare cum herpetum, tum ulcerum, aliorumq; bonum est remedium: efficaciū autem  
inflammatione, & fluxione laborantium partium. Est & cruentorum uulneryum glutinatorium. Sed & aurium ul-  
ceribus prodest: & si uel plurimum insit puris, hoc tamen etiam desiccet. Easdem ob facultates & profluxiones ma-  
liebre sistit, & dysenteriam, & sanguinis reiectiones, & undecunq; aliunde inmoderatiores impetus. Refert Dio-  
scorides, quòd & urinam prouocet exhibitum stillicidio seu stranguria affectis. non tamen effectum exactè describit  
nat, in quo ipsum dari expediat. Porro mas ad omnia dicta, quàm formina, ualidioris est effectus.

† Impressi codices Græci tum Venetijs, tum Basileæ hic malè habent ἐπιεικές εἶνα, hoc est, mitiora, cum lega-  
dum sit ἐπιμηνές εἶνα, id est, longiora. Hoc præterea loco in ijs addendum est μαλακώτερα, hoc est, molliora.  
Huic, & alteri lectioni adstipulatur Oribasius, quem secuti uidentur interpretes.

Πολυγόνατον. POLYGONATVM. *Πολυγόνατον* CAP. V.



Polygonati  
consider.

Manardi erra-  
tum.

Polygonati  
uires ex Gal.

POLYGONATVM nascitur in montibus, frutice  
cubito altiore, folijs lauri, latioribus, & læuioribus,  
sapore mali cotonei, aut punici, cum quadam adstri-  
ctione. Flores per singulos foliorum exortus promit,  
candidos, folijs numerosiores, incèpta à radice suppu-  
tatione. Radicem habet albam, mollem, longam, cre-  
brò geniculatam, densam, graueolètem, digitum cras-  
situdine æquantem. Quæ uulneribus efficaciter illi-  
nitur: quinetiam maculas in facie delet.

POLYGONATVM Hetruscis uulgò Frasella nomi-  
natur. Alij uerò Italie populi quasi à Græcis docti, id Ginochiet-  
to uulgari sermone appellare didicerunt, ac si geniculatam radi-  
cem diceret. Mulieres è Polygonati radicibus aquam stillatitiam  
studiosè conficiunt, qua ad faciem detergendam, poliendamq; pro  
fuo utuntur. Sunt præterea, qui Polygonatum sigillum sanctæ  
Mariæ, & qui sigillum Salomonis uocent: uerum ipse quidem  
harum nomenclationum causam adhuc assequi non potui. Nec  
desunt etiam, qui asserant, ueluti Manardus Ferrariensis, eam  
plantã Polygonatum esse, quam nomine Secacul describunt Ma-  
ritani. Sed ij haud dubiè, meo iudicio, falluntur: siquidem perspi-  
cium est, Serapionem fidelem Dioscoridis interpretem nullis suis  
Secacul representare notis, quæ à Dioscoride Polygonato tri-  
buuntur. Huc accedit, quòd Serapio eo in loco nunquam Diosco-  
ridem citat, ut sui moris est in alijs simplicibus medicamentis, quæ  
ipsi Dioscoridi refert accepta. Illud insuper, si particulatim li-  
beat percurrere, Manardi errorem manifestè deprehendet, quòd  
Serapio non folia lauri suo reddidit Secacul, sed pisorum instar.

Neq; Polygonatum, & secacul eisdem uiribus pollere constat in-  
ter auctores: quandoquidem illud Græci commendant ad uulnera, & ad maculas in facie delendas. Hoc autem Ara-  
bibus laudatur ad prolifici seminis ubertatem, & ad uenerem conciliandam. Qua in re nonnulli falsa Manardi opi-  
nionem ducti, se delusos inuenerunt, qui Polygonati radices saccharo conditas ad uenerem excitandam auarissime deuor-  
arunt, nullo tamen rei successu. De Polygonati uiribus disseruit Galenus libro VIII. simplicium medicamentor-  
um, hunc in modum. Polygonatum mistam habet tum facultatem, tum qualitatem: habet enim adstrictionis partem  
& acrimoniæ, & amaritudinis quippiam, & indicibilis cuiusdam insuauitatis. Quocirca nec admodum est usua, sed  
tantum quòd radicem eius quidam uulneribus illinunt. Sunt etiam qui neuos maculasq; in facie illo detergunt.

CLEMATIS. *Jugrum*

CLEMATIS ALTERA.



ΚΛΗΜΑΤΙΣ. CLEMATIS.

CAP. VI.

CLEMATIS humi serpit. læto, pinguique solo provenit, viticulas spargens crassitudine iunci, exiguas: folio lauri figura, & colore, multò minora. Ea cum caulibus in uino pota alui profluvia, & dysenterias sedant: subdita in pecto cum lacte, & rosaceo, aut cyprino, cruciatibus vuluæ medentur: dolores dentium commanducata finit. imposita serpentium moribus iuuamentum præstat. Fertur etiam contra aspidum ictus ex aceto pota opitulari. Gignitur in terrenis.

ΚΛΗΜΑΤΙΣ ΕΤΕΡΑ. CLEMATIS ALTERA.

CAP. VII.

EST & altera Clematis, quæ viticulolum emittit ramulum, rubescentem, lentum: folium gustu admodum acre, ac exulcerans. repit per arbores, ut smilax. Semen tritum pituitam, bilemque detrahit, in aqua aut hydromelite potum. Folia eius illita, lepras purgant. Cum lepidio conditur ad cibos.

CLEMATIS, quæ primo loco describitur, aliquibus *Vinca peruvina* dicitur, nobis uulgò appellatur *Prouença*, cuius fronde mulieres pueris, ac puellis uirginibus, funestas texunt corollas. In hac siquidem nullam reperi notam, quæ Clematidi primi generis reclamare uideatur. Quamobrem eorum sententiam explodendam putauimus, qui nostratam *Peruincam* chamædaphnem esse sibi persuadent, quam uulgò *Laureolam* appellamus. Nam hæc uirgas emit cubitales, singulari stipite à radice exeuntes, rectas, tenues, læuesq: semen rotundum, rubens, inter folia resiliens, quæ facie laurina emulantur. Porro Clematis, quam secundo loco reddidit Dioscorides, nimirum à prima quam maxime distat. Et sanè, ut ex quibusdam notis, quæ probè adstipulari uidentur, colligi potest, hæc nostris *Vitalbis* uulgò uocatis plurimum facie respondet. quandoquidem hæc viticulis exeunt rubentibus, ac lentis: folijs sunt smilacis similibus, quæ si linguam consulas, & uehementer acris, & exulcerantia deprehendes. Ambiant hæc inire moluendo sese sepes, repuntq: per arbores non aliter, atq: *smilax*. quin & earum semen alium efficaciter deiecit. Quo fit, ut mihi omnino persuaserim, nostratam *Vitalbam* esse Clematidem alteram contra eorum opinionem, qui eam Clematidem eam plantam putant esse, quæ nascitur in sepibus, flores proferens candidos, calathis effigie, quorū rei barbarie imperiti *Ligustra* falsò uocant, falsò inquam quoniam Dioscoridi *ligustrum* arbuscula est, non herba, ut superius libro primo monuimus. Fuchsius, tamen medicus doctissimus nostratam *Vitalbam*, utem *nigram* esse existimat. Sed errat, mea quidem sententia, ut infra suo loco dicemus, Floris alterius Clematidis figuram non representauit

*Vinca peruvina*

Clematidum consider.

Quorundam error.

*Smilax 522*

*Vitalba*

Fuchsij error.

*Vitis nigra 555*



Flammulae hi-  
storia, & ui-  
res.

Brown & Gault

Clematidum  
uires ex Gal.

representat Dioscorides: tametsi Vitalba uocata florem album, & odoratum proferat, sitq; alia huic similis, quae purpureum florem promit, facie tamen ab altero diuersum. Ceterum herba, quam quidam FLAMMULAM dicunt, folijs, floribus, ac semine nihil ab hac clematide differt, quemadmodum nec acerrimo gustu. Attamen neq; se-  
pibus circumuoluitur, neq; arbores scandit, cum recticaulis assurgat. Plures autem haec ex se mittit caules biceps-  
tales, subrubentes, & in his folia simulacris, quibus intolerabilis inest acrimonia, unde Flammulae sibi nomen est. Ex hac ego saepius aquam elicui demisso uitreo organo in calentis aquae balneo, quae eadem, qua herba ipsa, polius acrimonia. Hanc compertum est efficacissimam esse in morbis frigidissimis. Flammula (ut Platearius est autor) ex-  
calfacit, siccataq; ordine tertio. Sed quod imposita carnem non secus exulceret, ac ignis, calidam ordine quarto re-  
ctius crediderim. Sunt qui Flammulam quartanarijs edendam praebant magno (ut ferunt) iuuamento. Alij cum olei commendant, ischiadicis, articularum, iliumq; doloribus, urinae angustijs, & renum calculis, in quibus morbis et  
calidum illud inungunt, aut clysteribus infundunt. Id autem preparant hoc modo. Flammulae folia tenuissime concu-  
sa in rosaceum imponunt, quod uitreum uas exceperit, ac inde per astatem insolant obturato uase. Datur etiam in  
cibis hisce morbis affectis, trium drachmarum pondere. Sed ut iam ad Clematidum uires reuertamur, ea de his subi-  
ciam, quae Galenus libro VII. simplicium medicamentorum adnotata reliquit. Clematidis folia, inquit, acrem & ste-  
rentem siue causticam facultatem obtinent, adeo ut & lepras excorient. Fuerit itaq; in quarti ordinis excalfacien-  
tium initio. Vocatur autem clematis & daphnoides, quod quidam myrsinoides, alij polygonoides appellant. Ce-  
terum id nec exulceratorium est, nec acre, sicut quod ante dictum est, imò profluuijs, & dysenterijs cum uino po-  
tum prodest, dentiumq; dolores mansum mitigat; tum uteri quoq; doloribus in pecto admotum, usui est, tantum docti,  
ut perinde ur at, ac ulceret, ceu illud superius. Sed summe nobis suspiciendus Pamphilus ille, sicuti in reliquis nate-  
tur de ijs, quae nunquam uidit, literis ea mandans, sic haec ambo in unum confudit. At Dioscorides utriusq; in quo-  
to meminit, & eius quae simpliciter uocatur Clematoides, idq; in fine libri, & alterius, sed in principio. Quamob-  
rem necesse non est, me etiam describere species ambas, sicut nec in alijs feci. haec Galenus de utraq; Clematide. Ex  
quibus palam est exulcerantis Clematidis caput ab aliquo curioso ex huius quarti libri calce, ubi commodè inter de-  
um deiicientia medicamenta, sibi locum adinuenerat, exemptum fuisse, & hic alteri Clematidi adiunctum ob eam,  
quam inuicem habent nominis conuenientiam.

ΠΟΛΕΜΟΝΙΑ. POLEMONIA. Lidworys CAP. VIII.

Polemonia  
consider.

Fuchij opin.

Polemonij ui-  
res ex Gal.

POLEMONIA, alij philetariam, Cappadoces chiliodynamin appellant, ramis exilibus, utri-  
que pinnatis: folijs paulò quàm rutae maioribus, ac longioribus, calaminthae, aut sanguinarum, &  
proximis: quibus in summis velut corymbi dependent, nigro semine: radice cubitali, albicante,  
radiculae simili. nascitur in montosis, & asperis. Bibitur in uino radix contra serpentes, & dy-  
senteriam: & ex aqua aduersus urinae difficultatem, & coxedicum cruciatus. datur ex aceto drach-  
mae pondere lienosis. Eadem scorpionis plagae alligatur. Tradunt eum, qui radicem gustauerit, à  
scorpione non feriri: eumque, si ictus sit, nihil molesti passurum. Dentium dolorem manfa mi-  
tigat. Credo equidem me iam saepe uidisse Polemoniam in altioribus, & asperioribus uallibus Ananiae montibus, te-  
nui, & quadrangulari caule, utrinq; pinnato: folijs effigie nepetae: corymbis quodantenus dependentibus, nigro  
semine refertis: radice praelonga, albicante. Hinc itaq; non facile adducor, ut credam, quemadmodum censer Bras-  
sauolus, eam esse Polemoniam, quam nostrum Heturriae uulgus appellat Lauanese: alij uero Galegam, alij Rutam &  
caprariam nominant. Quandoquidem haec omnibus ferè notis foenum graecum refert, in cuius ramorum summitati-  
bus cornicula dependent, in quibus semen recluditur subrubeum, non autem corymbi. Radix illi inest breuis. Na-  
scitur leto solo, & plerumq; in scrobium marginibus, alijsq; uliginosis locis: non autem in montibus asperis, ubi na-  
sci Polemoniam tradidit Dioscorides. Ceterum Fuchius libro primo de compositione medicamentorum, eam Pole-  
moniam putat esse, quam officinae Ben album uocant. Sed ab eo, pace uiri eruditissimi, plane dissentio, quod hoc re-  
mulis non sit utrinq; pinnatis: quod corymbos nullos proferat, sed siliquam, uel calycem ocimoidis modo: quod deni-  
que non solum in montibus, & asperis proueniat, sed ubiq; praesertim in pratibus. De Polemonio differens Galenus  
libro VIII. de simplicium medicamentorum facultatibus, sic inquit: Polemonium quidam philetarium, quidam (ut  
lul Cappadoces) chiliodynamon: tenuium partium est, & desiccandi uim obtinet. Quamobrem quidam radicem  
eius cum uino ad ischiadicis, dysenteriam, lienemq; induratum potui exhibent.


ΣΥΜΦΥΤΟΝ. SYMPHYTUM. Drimylion CAP. IX.

SYMPHYTON petrae nascitur in petris, ramis tenuibus, paruis, origano similibus: capitu-  
lis, & folijs thymi: lignosum totum, odoratum, gustu dulce, saluam ciens: longa radice, sub-  
rufa, digitali crassitudine. Decoctum in aqua mulsa & potum, pulmonis vitia purgat: sangui-  
nem reiicientibus, & renum malis ex aqua datur: ad dysenteriam, rubraque foeminarum profu-  
uia in uino decoctum: ad conuulsa uero & rupta, ex aceto mulso bibitur. Quin & commanduc-  
tum sitim sedat, faucibus asperis subuenit, vulnera recentia, enterocelasque conglutinat, & illam  
cohibet. Carnes autem cum symphyto decoctae coalescunt. Est & alterum symphyton, quod ali-  
qui

qui pecton uocant. id caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, ut sonchi inanem: circa quem breui interuacante spatio, folia exeunt angusta, buglosso proxima, oblonga, hirsuta: caule secundum angulos quosdam striato: folijs tenuibus, ex alarum sinu prodeuntibus: in quibus flores lutei, & circa caulem uelut verbasci semina emicant. Tam caulis, quam folia aspera lanugine horrent, tactuque pruritus concitant. Radices demittuntur foris nigrae, intus candidae, uiscae. quarum est usus. Tritae, & potae cruentis excreationibus, ruptisque proficiunt: recentia vulnera illitae conglutinant. carnes quoque si concoquantur, cogunt additae. Inflammationibus praesertim sedis, cum senecionis folijs, vtiliter illinuntur.

SYMPHYTUM PETRAEVM.

SYMPHYTUM ALTERVM,  
*Drumy wintz, Dr. Maltwintz*



QUANVIS in nostris commentarijs, quos multo ante tempore Italicè conscriptos edidimus, ingenuè confes-  
sum esse, me non antea adiuuenisse Symphytum primi generis petræon: cognominatum; id tamen postea reperi mense  
Septembri suis floribus emicans, longè à Goritia circiter uiginti millia passuum, in lacere magni montis Vipaci paulò su-  
pra arcem, ac deinde in alijs ipsius montis partibus, alijsq; lapideis locis, praesertim eo tractu, qui uulgò Sclauis dicitur  
Gabernich, nullis prorsus deficientibus notis, quae illi à Dioscoride tribuuntur. Est profectò planta, praesertim  
ubi floruerit, usu uicundissima, ita ut maxima cum uoluptate ad se uidendum uiatorum oculos alliciat, argumento qui-  
dem quod etiam uiribus polleat insignibus. Porro Symphytum alterum, quod secundo loco reddidit Dioscorides,  
nulli dubium est, quin ea sit herba, quae hodie passim Consolida maior nominatur, quam etiam nonnulli herbariorum  
Alum falso appellant. Quippe quod eius notae singulae Dioscoridis historiae ad unguem haerere deprehendantur. Hec  
frequentissima nascitur in pratis, floribus non modò luteis, ut Dioscorides inquit; sed et candidis, et purpureis, ead-  
em saepe facie, ac forma. Ceterum hallucinantur, meo quidem iudicio, qui Symphytum petræum putant eam esse  
plantam nullis non cognitam, quam officinae Solidaginem minorem uocant. Siquidem eam nihil prorsus Symphyti pe-  
træi notis respondere, omnibus rei herbariae etiam mediocriter gnatis euentius est, quàm ut à me indicari deceat.  
Neq; etiam statuendum censeo idem Symphytum esse eam aliam herbam, cuius folia auersa parte purpurascunt, quae  
ab herbarijs uulgò Consolida media nuncupatur, ab aliquibus uerò Laurentina, et à Senensibus Morandola. Ha-  
rum modò dictarum stirpium etsi nusquam, quod haecenus inuenerim, meminerint Graeci, aut Maurritani; eae tamen  
in modum prodesse existimantur disruptis, fractisque; internis, et externis corporis partibus. Idcirco utiliter  
dantur potandae ab alto deuolutis, ac etiam ijs, qui interna, intestinae uulnera acceperint: namq; illa, sint uel exte-  
rius, uel interius illata, mirifice sanant. Tradidere nonnulli, qui rerum experimenta proficiuntur, Consolidam median-  
uocantam potu sanguinis grumos in uentriculo, uel in alia corporis parte concretos disicere, et dissolvere. Illa uerò folia,

Symphytorum  
consider.

Quorundam  
errores.

Solidaginis  
minoris, &  
mediae uires.

*Sanicle*  
Saniculæ unū  
genus.

Saniculæ ali-  
ud genus.

*Solidago alia*  
*Rutifolia*

Symphyti u-  
triusque uires  
ex Galeno.

ro folia, uel eorum succum efficax medicamentum esse prædicant ulceribus omnibus in ore manantibus, exedentibus, ac etiam testium, pudendorumq; uirilium, & muliebrium. His omnibus facultatibus ea quoq; prædita est, quam Solidaginem minorem uocant, ut quidam existimant. Etenim ubi uulnera glutinare, adstringere, & reprimere sit opus, minorem usurpant, quam etiam altera longè præstantiorem esse sæpenumero compertum est. Recensetur præterea Germanis inter Symphyti genera quædam ipsis uulgaris herba, quam SANICVLAM appellant. Exiit hæc folijs pentaphylli maioribus: radice candida, tam miro naturæ ipsius artificio nodulis, ac lacinijs quibusdam elaborata, ut non parum admirentur, qui tantum naturæ opus diligenter intuentur. His utuntur in potionibus ad enterocelas, et ad interna uulnera, præsertim ad ea, quæ in thoracis cavitatem penetrauerint. Plura insuper Saniculæ officiant genera, quorum unum folia fert plātaginis magnitudine, sed crassiora, ueluti fabariæ uulgò uocata, lacinijs cæciam magno artificio factis à natura, colore in album flauescente. Id genus copiosè nascitur in agro Goritienfi monte Saluatino. Hoc cæteris præferunt ad enterocelas, & thoracis uulnera, si quotidie in potu sumatur: quin & ad interna uulnera, tam intus sumptum, quàm exterius illitum. His aliam deniq; annumerant Solidaginem, quam uulgo medicorum Consolidam regalem, & ipsi sua uulgari lingua *Ritterhorn* uocant, quod sonat nobis Sperone da caualiere, & Latinis equitis calcar. Huic sunt caules cubiti altitudine: folia oblonga, tenuia: flores planè purpurei, magnitudine uiole: e quorum basi corniculum eminet, antiqui calcaris effigie, unde illi à Germanis inditum est nomen. Laudantur flores ad rubentes, & inflammatos oculos triti, & aqua rosacea illiti. Herba auxiliatur ardoribus, tussibus, inflammationibus, uenenis, uomitionibus, biliosis affectibus, suppressæ urinae, calculosis, ischiadicisq; quin & diu citat. Verum hoc Solidaginis genus magis, quantum equidem reor, *Cuminum sylvestre*, quod à Dioscoride secundo loco describitur, repræsentat, quàm aliam quāuis plantam, ut superius in Cumini commentatione diximus. Meminit utriusq; Symphyti Galenus libro VII de simplicium medicamentorum facultatibus, ubi ita scriptum reliquit: *Symphytum petræum ex contrarijs constat uiribus: habet enim incidendi uim quampiam, quæ collectum in thorace, & pulmone pus expurgare potest. Habet etiam quandam contrahendi uim, quæ eiectionibus sanguinis auxiliatur: & tertia ad eas inest humiditas quædam non immodicè calida, per quam gustantibus dulce apparet, & odorata uicundum. Commanducatum sitim extinguit, & arteriæ asperitates sanat. Porro secundum omnium dictarum uirium missionem simul digerere abunde potest, simulq; corpora contrahere, & constringere. proinde enterocelis imponitur, & ad conuulsa, & rupta cum oxymelte bibitur. Porro qui ipsum in uino decoctum ad dysenteriam, & rebrum profluium exhibent, utuntur tanquam desiccante, & contrahente. Qui uerò ad nephritin renuue dolorum, tanquam expurgante, & incidente. Symphytum uerò alterum, puta magnum, similem dicto uim habet: non tam gustantibus dulce est, nec odorantibus odoratum. Sed his sanè à modo scripto diuersum est. Cæterum quatenus insensitatem quandam, & mordacitatem obtinet, scillæ simile est. Utuntur eo ad omnia, ad quæ iam dicto.*

† Ne quis commoueat, quòd nos hic folia adiecimus præter Ruellij, & Marcelli interpretationem. Id enim ea ratione fecimus, quoniam in Aldino codice hoc loco Φύλλα, hoc est, folia habetur. Tum uerò quia folia thymi pulchre illi herbæ quadrant, quam uerum Symphytum petræum censemus.

† Illud præterea hoc in loco adnotandum est, quòd ubi communis lectio habet τῷ ἐλαυ προκλιτικόν, hoc est, saluam prouocans, in Oribasio legitur συνηκόν, quod est adstringens.

## ΟΛΕΣΙΟΝ. HOLOSTIVM.

## CAP. X.

**HOLOSTIVM** quadrantalibus herba est pusilla, tribus quatuorve digitis supereminens extra terram: folijs, uiticulisque coronopo, aut gramini proximis, gustu adstringentibus: radice alba, prætenui usque in capillamenti speciem, longitudinè quatuor digitorum: nascitur in collibus terrenis. Vsus eius ad rupta in uino pota: nam & carnes coguntur decoctionibus addita.

Holostij cō-  
sideratio.

**HOLOSTIVM** etsi à nemine, quod equidem sciam, cognoscatur in Italia; eam tamen plantam illi consensim esse crediderim, quam libro secundo in Coronopi mentione à Goritienfibus ideo Serpentinam uulgò uocari cœnimus, quòd mirum in modum serpentium morsibus opituletur. Hæc siquidem herba est exigua, humi procumbens, quæ folijs, cauliculisq; coronopi modo exit, gustu adstringentibus: radice tenui, lignosaq;. Nascitur ipsa quoq; in collibus, ac etiam sabulosis locis. Ex his utiq; quispiam facile posset hanc herbulam pro holostio habere: quāuis hoc ego pro certo affirmare non ausim. Recensetur Holostium inter Symphyti genera. Sed hallucinantur haud dubie qui credent eam herbam esse Holostium, quam Pilosellam herbariorum uulgo appellat. nam quanquam Pilosella dicta frequens nascatur in collibus; folia tamen edit oleæ proxima, albicantibus pilis horrida, unde illi nomen. Isdem utuntur pilis & caules, qui humi serpunt, ac reptant, e quibus postea prodeunt flores aureo colore. Radicibus nititur breuib; & tenuib;. Sed hæc eius delineatio nihil prorsus Holostio competere uidetur. Piloselle plura sunt genera, quorum unum nascitur inter saxa Saluatino monte in comitatu Goritienfi: folijs in terram sparsis, longis, echij instar, pilis innumeris, lanugineq; obductis: caule diuim palmorum longitudine: flore cyani similitudine, maiore tamen. Præstat hæc planta ad uulnera glutinanda: quinetiam ad enterocelas, tam illita, quàm pota. Hanc nobis Pilosellam maiorem liceat appellare, quando nondum constet, an ueteribus Græcis, aut Latinis cognita fuerit, à quibus nomen mutuari posimus. Tota Piloselle planta uehementer adstringit: quapropter huius rei non ignari pastores maxime cauent, ne ouium greges in illis pascuis immorentur, ubi huiusce plurimum gignitur. Quandoquidem depascentes oues tanta alui adstrictione afficiuntur, ut inde facile emoriantur. Hinc didicerunt medici, eam mederi dysentericis, &

Quorundam  
error.

Pilosellæ de-  
scriptio, & ui-  
res.

de, & utri profluuijs : quin & uulnera glutinare tam scilicet exterius, quàm interius illata, cœliacisq; magno esse  
 etio, & beliois uonitiombus : cruentis uen spuitis, enterocelis, & omnibus in uniuersam fracturis opem ferre, sed  
 præcipue caluæ. Ceterum ut ad Holestium nostra redeat oratio, ingenue fateor nullam hætenus plantam se mi-  
 hi ostendisse, quæ magis Holestium referat, quàm ea, quæ Serpentina, ut diximus, à Goritienfibus uulgò uocatur.

Holestium (ut auctor est Galenus libro VII. simplicium medicamentorum.) desiccandū uim habet cum adstrictione :  
 quapropter ipsam ad rupta potui exhibent.

Holestij uires  
 ex Galeno.

ΣΤΟΒΑΙ. STOEBA.

CAP. XI.

STOEBA vulgaris est notitiæ. Cuius semen, & folia stringunt. quapropter decoctum dysen-  
 tericis infunditur : auribus quoque purulentis instillatur. Illata folia oculis ab icu cruentis pro-  
 sunt, & erumpentis sanguinis impetus cohibent.

STOEBEN Dioscoridis tempore omnibus uulgò cognitam fuisse, illud maximo argumento est, quod eam nullis  
 profusus notis representauerit. Hinc certè nobis facessit negotium, quo minus scire possumus quenam sit illa inter  
 res plantas, cuius nomina, & facultates ignorantur. Plinius libro XXI. cap. XV. Stœben inter aculeatas herbas re-  
 tat (id quod à Theophrasto libro VI. cap. IIII. de plantarum historia mutuatus est) sic inquit. Quædam sunt  
 herbe, quæ spinas in folio habent, & in caule, ut phleas, quod aliqui Stœbeni appellauere. Idem libro XXI. cap. XI.  
 Stœbe, inquit, quam aliqui phleas uocant, decocta in uino præcipue auribus purulentis medetur : itè oculis icu cruen-  
 10 tatis : hemorrhoidi quoque, & dysenterie infusa. hæc Plinius. Ex quibus equidem uerbis planè asserere ausim,  
 Phleas, & Stœben eandem plantam esse. Hanc in Orchomeno lacu nasci semine placentaceo, & molli, colore rubi-  
 do, auctor est Theophrastus lib. IIII. cap. XI. de plantarum historia. Hinc itaq; Matthæi Syluatici error mani-  
 festè deprehenditur, qui in suis pandectis Stœben eam herbam interpretatur, quam uulgus Scabiosam nominat. cuius,  
 quod sciam, nec Græci, nec Mauritani meminere. Quamquam non desunt, qui Scabiosam eam esse contendunt, quæ  
 ab Aëno uocatur Psora, quam tamen is nomine tantum expressit, nulla adiecta descriptione, ex qua aliquid certi con-  
 stitui possit. Ceterum Scabiosam uocatam non esse Stœben illud abunde ostendit, quod hæc folijs consitet laciniatis,  
 subrotatis : caulibus tenuibus, cubitali altitudine, atq; etiam maiore : in quorum cacumine flores emicent in cæruleo  
 20 albantes : & in pratibus, & campestribus proueniunt. At Stœbe folia fert aculeata, & in lacubus, stagnis, paludibus,  
 dysq; locis aquosis nascitur. Vnde Aristophanes comicus rectè in comœdia rarus inter se loquentes adducit, quæ ad-  
 30 modum letabantur, quod totam consumpsissent diem inter cyperum, & phleum saltantes. Sed quoniam nusquam  
 reperi ueteres SCABIOSAE meminisse, ne à nobis quoq; silentio prætermissa in posterum deperdatur, hic eius  
 facultates explicabo. Pollet in primis hæc aduersus scabiem, unde illi nomen : in quem usum non modò eius decoctum  
 quotidie potandum præcipiunt : sed & herbe ipsius succo, per se, aut in unguentis addito, scabiosa corpora illinunt.  
 Prodest omnibus pectoris uitijs, & respirationi inservientibus organis : quippe quæ & eorum inflammationes puru-  
 lentas dissipat, & omnia pectoris excrementa expurget. Anthracibus, siue carbunculis pestiferis utiliter illinuntur :  
 adeo ut illata hos letales abscessus trium horarum spatium prorsus abolere existimetur. Sed iam ad Stœbes uires re-  
 40 deamus, de quibus Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, disseruit his uerbis. Stœbes fructus, & folia ma-  
 ximo sunt usui, adstringendi uim habentia mordacitatis expertem. Sed & desiccant euidenter in tertio ferè ordine in-  
 apiente. Quamobrem decoctum eorum dysentericis inijcitur, & auribus pure fluentibus, tum uulnera magna con-  
 50 glutinat. Euidentiùs hæc præstat cum uino atro austero : ualenter enim desiccant omnes præter naturam humiditates.  
 Præterea folia uiridia, si illinantur, uim habent erumpentis sanguinis suppressendi : deniq; & oculorum ex icu sus-  
 fusiones illa iuuant.

Stœbes confi-  
 deratio.

Matthæi Syl-  
 uatici error.

Scabiosæ men-  
 tio, & uires.

Stœbes uires  
 ex Gal.

ΚΛΥΜΕΝΟΝ. CLYMENVM *Blatrukrant* CAP. XII.

CLYMENVM caulem fert fabæ, quadratum : folia plantaginis : folliculis supra caulem sese in-  
 flexis, ut in polyporum cirris. Probatissimum est è montibus. E frutice toto cum radice succus  
 exprimitur : qui ad sanguinis reiectiones, in potu efficax est : cœliacos, rubraque fœminarum pro-  
 fluuia, refrigerando infrenat : sanguinem naribus erumpentem suppressit. Trita folia, aut siliquæ  
 10 recentibus vulneribus impositæ, ea ad cicatricem perducunt.

SI CAULES, itemq; flores herbe, quæ Saponaria uulgò uocatur, Clymeni delineationi responderent, quem-  
 admodum folia illi quadrare uidentur, quippe quæ plantagini prorsus referant imaginem, cum Ruellio utiq; sentirem,  
 fateriq; Saponariam legitimum esse Clymenon. At certè neq; caulis, quem rotundum profert, & per interualla ge-  
 miculatum, neque flores illi quicquam adstipulari deprehenduntur. Quamobrem quenam herba Clymenum in Italia  
 hodie referat, hætenus non satis compertum habeo. Hanc (ut Plinius memorie prodidit lib. XV. cap. VII.) inue-  
 nit rex Clymenus, unde & nomen herbe. Quo in loco idem Plinius clymeno perperam illa omnia reddidit, quæ Dio-  
 scorides periclymeno assignauit. Huius nusquam, quod inuenerim, meminit Galenus, sicut nec post ipsam Paulus.

Clymeni cõ-  
 sideratio.

Περικλῦμενον. PERICLYMENVM.

CAP. XIII.

Caprifolium, Matrisylva.



Periclymeni  
consider.  
Matrisylva

Quorundam  
error.  
Caprifolium

Periclymeni  
vires ex Gal.

**PERICLYMENON** simplex fruticat, ex interuallis parua folia habens, ipsum amplectentia, subcandida, hederacea: inter folia surculi exeunt, in quibus baccæ hederæ similes: flos fabæ, candidus, quantum rotundus, & quasi in folium procumbens: semen durum, & quod difficile euellatur: radice rotunda, crassa. Nascitur in aruis, ac sepibus, conuolvens se adminiculis propter asidētibus: Semen eius postquam ematuruit collectum, & in umbra siccatum, si drachmæ pondere detur in vino, quadragenis diebus lienem absumit, lassitudinem discutit: sed urinam ciet, statim à sexto die cruentam. orthopnoeæ, & singultui prodest: partum accelerat. Folia sunt eisdem viribus prædita: quæ tricenis septenis diebus epota, sterilitatem facere produntur: peruncis ex oleo, febrium algores abigunt.

**SUNT** qui Periclymenum perperam Caprifolium appellant: officinæ Matrisyluam uocant: nos uero, quod propinquius uinciat plantas, uulgo appellamus Vincibosco. Ceterum si potissimum nos ad credendum impellit, uulgaræ Matrisyluæ esse Periclymenon, quod non solum omnes huiusce ætatis rei herbarie peritissimos in hanc sententiam deuenisse compererim: sed quod etiam ex notis, quas illi reddidit Dioscorides, ita esse cognouerim. Quandoquidem Matrisylua unico tantum caule fruticat, qui ex interuallis gemina tantum folia mittit, ipsum amplectentia, subcandida, hederacea: flos ei fabæ non dissimilis, candidus, cum adoleuerit, in folium procumbens: Semen hederaceum, prædictum, & quod difficile euellitur, in surculis quibus-

dam connexum, qui inter folia erumpunt. Constat præterea eius caulem, qui ab radice simplex assurgit, arbusculus, & fruticibus mirè sese conuoluere, ubi in sepibus, & frutetis nascitur, adeo ut sæpe tam pertinaciter inhereat, legētq; adminicula, ut in ea manifestum imprimat uestigium: unde à nobis meritò Vincibosco ducitur. Porro plures quædam sententia, hallucinantur, qui Caprifolium, & Matrisyluam seu Periclymenum idem esse existimant: in quorum numero esse deprehenduntur Ruellius, & Fuchsius, alioqui uiri doctissimi. In hunc autem lapsum eos fortasse deduxit Matthæus Syluaticus pandectarum author. Siquidem is suum Caprifolium Matrisyluam nominat, ciam tamen, ut subinde legitur, nil aliud Syluatico Caprifolium fuerit, quam Dioscoridi pyracantha, seu *hecum*, non autem periclymenum, de quo seorsum sub titulo Matrisyluæ Syluaticus ipse disseruit. Quod forte non animaduertentes ij, Caprifolium, & Periclymenum idem esse putarunt. Ceterum Matrisylua in eorum unguentorum usum uenit, quæ ad capitis uulnera parantur. Namq; hac in re efficacissimum est medicamentum. quantum è ueteribus nominem hactenus inuenerim, qui Periclymenon ea ui pollere, memorie prodiderit. Hanc etiam herbam commendauit Ioannes de Vigo clarissimus chirurgicus, ad crurum ulcera, quod eam ad hoc (ut ipse inquit) utilem esse tradiderit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum. Veruntamen id non legitur in meo Galeno: nam loco citato Galenus de Periclymeno ita scriptum reliquit. Periclymeni tum fructus utilis est, tum siliæ, adeo nebetèter incidentis, simul & excoalscentis facultatis, ut si plusculum bibatur, urinam sanguinolentam efficiant: præcipio quidem urinam tantum mouent: porro foris cum oleo illita excoalsciunt. Liuant & lienosos, & difficulter spirantes. Competens potionis mensura est, drachmæ unius pondus cum uino. Porro desiccata quoque semen. Et quidam aiunt, si copiosius bibatur, sterilitatem omnino bibentibus asferre. Sed & sunt qui certum dierum numerum ad talem potionem præfiniunt, ut Dioscorides, qui septem & triginta eos tradi refert. Hic etiam urinam cruentam reddi à sexto die memorat.



## TRIBVLVS TERRESTRIS.

TRIBVLVS AQUATICVS.  
*Asperula*Τριβόλος. TRIBVLVS. *Asperula* CAP. XIII.

TRIBULI genus vnum terrestre, folijs ad effigiem portulacæ, tenuioribus: viticulis † in terra fratis: spinis secundum folia rigidis, præduris. iuxta amnes, & rudera nascitur. -Est & alterum genus, aquis familiare, quod in fluminibus natum comam exerit, aculeos condens: folijs latis, & pediculo longo: caule parte summa, quàm ima crassiori: adsunt ei & capillamenta quædam spicacea: semen durum, ab altero non abhorrens. Vterque refrigerantis, & inspissantis est naturæ: ideo inflammationes omnes cataplasmate adiuuat. ulcera in ore erumpentia, putredines, gingiuas, tonsillasque per sanat. Succus ex his colligitur ad oculorum medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuuamentum affert. Drachma terrestris tribuli pota, illitave, ictos à uipera recreat: contra uenena cum uino aptissimè bibitur. decoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strymona amnem habitant, uirenti tribulo equos saginant: & è dulci semine & esculento panem, quo uescuntur, faciunt.

ET SI unum duntaxat, Tribuli terrestris genus descripserit Dioscorides; duo tamen eius genera à Theophrasto redduntur libro VI. cap. V. de plantarum historia, bis uerbis. Tribulo peculiare est, ut fructum gerat aculeatum. Eius duo sunt genera: uni folium est ciceris, alteri aculeatum. Vtrunque terrestre, & surculosum: serius germinat, cui in folijs sunt aculei, magisq; hoc apud septa uillarium erumpit. Semen præcoci sesamæ figura cernitur: alteri, hoc est serotino, rotundum, nigrum, siliquis inclusum. Hæc duo terrestris genera Theophrasto. Tribulum, cui folia portulacæ Dioscorides assignauit, memini me uidisse Venetijs in maris litore prope diui Nicolai sacellum. At hunc, cuius hic figuram exprompsimus, Pisis misit ad me Lucas Gbinus Forocorneliensis medicus rei herbariæ peritissimus.

Tribuli consideratio.

Ruellius Tribulum aculeatum Theophrasti eam plantam esse arbitratur, quam Hetrusci uulgò uocant Cacatreppola, et fortasse ratione ductus, quod prope torrentium, & fluminum ripas proueniat. Verum cum lateat nos foliorum effigies, quæ à Theophrasto illi tribulo non redditur, atque etiam constet hanc plantam surculos non mittere, neque siquam ferre, in qua intus claudatur semen, cogor omnino à Ruellio dissentire. Nostrates seplastarij huius radices melle, & saccharo condiunt, eryngij eas esse existimantes. Qua in re haud dubiè illi falluntur, ut superiori libro in eryngio ostendimus. Sed ad Tribulos redeamus. Aquaticum genus in plerisq; Italiae fluminibus, & lacubus prouenit, præsertim in agro Mantuano, & Ferrariensi: neq; solum in dulcibus aquis gignitur; sed etiam in mari. Hos tribulos

Ruellij error.

Tribuli vires  
ex Galeno.

tribulos Venetijs in foro uendunt, quos marinos appellant, ut qui in lacunis illis uicinis enati inueniantur. Ex his porro qui peregre proficiscuntur, uerticillos faciunt, quibus suas preces enumerant, colloq; gestant, ut maiores præ se ferant religionem, ne dicam hypocrisim. Nonnulli fructu, qui castaneis refert similitudinem, sub ceteris calidis cocto, non secus, atq; illis probellarijs uestuntur. Tribulus utriusq; facultates perstrinxit Galenus lib. vii. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Tribulus ex humida essentia modice frigida, & sicca non mediocriter & ipsa frigida componitur. In terrestri tamen superat terreum frigidum, quod & adstringens ostendimus: in aquatico uero aqueum. Propter utrumq; itaq; & contra phlegmonarum generationes, & omnino contra omnes mæxus congruunt. Porro terrestris fructus cum tenuium sit partium, potus lapides in renibus commouit.

† Hoc in loco ita equidem legunt uulgata Græca exemplaria, sed Oribasius libro xii. itemq; uetus Dioscoridis codex habent μαχαρά. qua uoce Tribulum terrestrem uticulis longis representant. Id quod etiam satis plantæ pictura demonstrat.


Σαξιφραγος. SAXIFRAGA.

CAP. XV.

Saxifrage cō-  
sideratio.

Plantæ saxi-  
frage dictæ.

Saxifraga al-  
ba.



† SAXIPHAGON aliqui saxiphragon, alij empetron, Romani saxifragam vocant. frutex est furculosus, in petris, & asperis locis nascens, epithymo similis. Coctus in vino, mox potus, febricitantibus opitulatur: stranguriæ prodest, singultum sedat, calculos uesicæ frangit, & urinam ciet.

LICET omnibus huius ætatis rei herbarie peritis satis superq; persuasum esse non ignorem, hoc Saxifragæ caput Dioscoridi illegitimum esse, quod Latina nomenclatura contra scriptoris more Græcè proferatur; tamen cum in omnibus fere Græcis exemplaribus habeatur, id mihi quoq; dissimulandum non putauit: eaq; maxime ratione, quod eam plantam habet, nomenq; Italia. cuius usus præcipue expetit ad renem, & uesicæ calculos comminuendos, & ad urinam remouendam ciendam. Ea in Hetruria pluribus locis è durissimis erumpit saxis, folijs capillisq; raris, epithymo non dissimilibus, præsertim Argentario promontorio in maritimis nostris. Inuenitur quinetiam in agro Goritensi quibusdam saxis enascens, iuxta Sonty fluminis ripam, quâ Salicano rure itur Canalem. Ceterum sunt & alia herbarum genera, quæ sub Saxifragæ nomenclatione uulgaribus demonstrantur: nempe Trichomanes, Adiantum, Asplenium, Filipendula, Massiliense fefeli, Pimpinella quæ hic cum redolet, & alie plures herbe: quæ ideo Saxifragæ nomine insigniuntur, quod omnes urinam ciant, & calculos frangant pellantq;. Est porro alia quoq; planta Germanis herbarijs notissima, quam Saxifragam albam cognominant. Prouenit hæc mense maio saxosis, arenosis, asperis, sitientibusq; locis: folijs humi procumbentibus, exiguis, rotundis, in ambitu serratis, uulgaris terrestris bedæ modo; pinguioribus tamen, & mollioribus. Caulem profert tenuem, iunci modo, bisfutum, cubitalem: in cuius cacumine flores prodeunt albi, candidis uiolis non absimiles, qui mense Iunio absq; semine decidunt. Radex hinc exilis, granulis quibusdam coherens, coriandri magnitudine, quæ partim albicant, partim uero rufescunt, & profertur mine feruntur, amaro gustu. Folia cum radice in uino decocta urinam ciant, renem, & uesicæ calculos pellunt. Idem præstant & granula, quæ radicibus adherent, si tusa deuorentur.

† Qui postremo impressi sunt Græci Dioscoridis codices non hic, sed in fine separatim scriptum habent hoc caput de Saxifraga, inter ea relatum, quæ in hoc autore adscritta censentur. Hoc dictum sit, ut omnibus constet, illud non solum Latine, sed etiam Græcè scriptum reperiri.

Λιμόνιον. LIMONIUM. CAP. XVI.

LIMONIUM folia habet betæ, tenuiora, & longiora, decem, sæpe plura: caulem tenuem, rectum, lilio æqualem, seminibus rubris scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum, & ex uino acerabuli mensura potum, dysentericis, cæliacisque prodest: rubra sceminarum profutua sistit. Nascitur in pratis, & palustribus.

LIMONIVM. *Uoaltunango. St.*

LIMONIVM ALIVD.



PROVENIT Limonium, nullis prorsus reclamantibus notis, innumeris ferè plantis in paludibus, quæ Ti-  
mon fontibus irrigantur, ac etiam Tergestino tractu. Plinius libro xx. cap. viii. Limonium sylvestrem betam uo-  
cari tradit. Sed huic, ut in beta notauimus, refragatur Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus, ubi se nul-  
lam unquam sylvestrem betam nouisse scribit: nisi quis pro ea rumicem accipiat. Limonij uires memorie prodit-  
it Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Limonij semen utpote austerum, coeliacis, dy-  
sentericis, et sanguinem fluentibus cum uino exhibent. luvat et profluvium muliebre. Satis autem est acetabuli  
mensura.

Limoni con-  
sideratio.

Limoni ui-  
res ex Gal.

Λαγόπους. LAGOPVS. *hastun fup' Linn.* CAP. XVII.

LAGOPVS herba sistit aluum in vino pota: aut in febris, ex aqua. Eadem inguini alligatur in  
inflammatione. Nascitur in segetibus.

SANE tam paucis Lagopum perstrinxit Dioscorides, utpote qui ne ullam quidem eius imaginis notam designa-  
re, ut arduum eque, atque difficile sit asserere, quinam statuendus sit in tam ingenti plantarum multitudine, quarum  
nulla apud homines extat cognitio. Ceterum Matthæus Syluaticus parum recte, meo quidem iudicio, tradidit Laga-  
pum eam esse herbam, quam herbariorum uulgus Caryophyllatam appellat: quandoquidem hæc non gignitur in se-  
getibus, sed in montibus, et in uis iuxta septa. quod mirum in modum sepibus opacari gaudeat. De hac ueteres,  
quod sciam, nihil memorie prodiderunt. Nisi fortasse fuerit Geum à Plinio descriptum libro xxvi. cap. vii. cui ra-  
dices reddidit tenues, nigras, et bene olentes. Porro CARYOPHYLLATA planta est non uulgaris, ne-  
que uiribus inefficax, argumento quod eius radices manifestum caryophylli spirant odorem. Ea recentiores utuntur  
pota ad thoracis interna uulnera. Quin et eius succum admixta erugine cuniculosis, contumacibusq; ulceribus uti-  
litter inijciunt. Eadem olfactu spiritus recreat, et frigidum roborat cerebrum. Epota prodest coeliacis, dysentericis,  
fœminarum profluijs, et cruenta expuentibus. Tam intus sumpta, quam foris illita enterocelis auxilio est. Tem-  
peramentum ei excoalsciens, et exiccans, ut manifesto sunt indicio eius radices: quippe quæ gustu odoratæ, adstringen-  
tesq; deprehendantur. Quibus qualitatibus non modo attenuare, discutere, et adstringere ualent; sed etiam ro-  
borare. Sed, ut ad nostrum institutum reuertamur, Germanorum uulgus Lagopum appellat herbam, quæ folia bæ-  
ber trifolij similia, oblonga: caulem tenuem, rotundum, hirsutumq;: semen in paniculis paruis, muscosis, lanuginos-  
is: cui non obscura adstringendi uis inest. Proinde sunt et Germanis, qui ea utantur ad detergendam sedem in dysen-  
teria.

Lagopi confi-  
deratio.

Syluatici opi-  
nio explosa.

Caryophyl-  
latæ uires.

*Ernsti fup' Linn.*

teria. Nascitur hæc quidem in segetibus. uerum an ea legitima sit Lagopus non ausim affirmare: nullus enim, quod sciam, Lagopi faciem representat. Lagopi uires scriptas reliquit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, his paucissimis uerbis. Lagopus facultatis est desiccantis, adeo ut fluxus alui probe exiccet.

## MEDIUM. CAP. XVIII.

MEDION in faxis, & opacis nascitur. folia habet iridis: caulem tricubitalem, & in eo florem grandem, purpureum, rotundum: semine cnici, miruto: radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quæ trita in farinam, & ex melle decocta, rubros menses foeminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in uino potum, menstrua pellit.

Medij consi-  
deratio.

MEDION in Media duntaxat nasci quibusdam proditum est. Quod si ita se res haberet, mirum profecto uer-  
esset, si non proueniret in Italia, ubi ipsum hæcenus fateor me non reperisse, aut uidisse. Sunt qui eius folia mirabo-  
familia faciant, non autem iridi, ut communis habet lectio, quibus etiam Oribasius adstipulatur. Et certe facili potius  
esse librariorum lapsus, ut qui uocabulorum affinitate decepti in eisdem pro seipso in Dioscoride scripserint. Medij se-  
cultates tradidit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Medij radicem contra atque semen ip-  
sum, temperatam esse contigit. nam illa quidem austera est, & fluxiones cobibet cum alias, tum profusum muliere  
quod uocant. At semen tantum abest, ut tale quid efficiat, ut etiam menses cieat, ut pote quod tenuium partium, &  
incidentis est facultatis.

Medij uires  
ex Galeno.

## EPI-MEDIUM. CAP. XIX.

EPI-MEDIUM, caulis est non magnus, hederæ folijs, denis atque duodenis, neque florem, neque fructum ferens: radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo. nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mammas incrementum non sinunt. Radix conceptum adimit. Folia trita quinis drachmis, post menstruas purgationes, quinque diebus in uino pota, præstant mulieribus, ne concipiant.

Epimedij con-  
sideratio.

QVI Epimedium in Italia, quantum mihi perquirere licuit hoc tempore cognoscat, demonstratq. hæcenus repe-  
ri neminem. Quare putauerim alijs in regionibus hæc plantam prouenire: uel si fortasse nascatur in Italia, nondum  
ad nostram peruenisse cognitionem. Non tamen nos fugit medicum esse in Italia materiam medicam profitemem,  
cuius nunc nomen libet silentio dissimulare, qui Epimedium eam plantam esse censet, quæ à triquetra foliorum figura  
quibusdam recentioribus Trinitas appellatur, idq. illis constanter affirmat, & persuadet, qui maiorem forsitan ei fidem  
præstant, quam ipsi Dioscoridi. Sed quod his aperte hallucinetur, est unicuique mediocriter etiam in rebarbaria uer-  
sato perspectum esse possit, pro alijs tamen iam nobis ostendendum est. Quod facile constabit, si expendatur utriusq.  
plantæ descriptio: siquidem Epimedium, Dioscoridis testimonio, caulis est non magnus: folia habet hederæ similis, de-  
na aut duodena. Trinitas uero nullo constat caule, sed folijs tantum, modo uicenis, modo tricenis, modo quadre-  
gis, pluribusq. à radice cyclamini modo exeuntibus. Præterea Trinitas primo statim uere florem edit cœruleum, uer-  
semen. Epimedium uero, Dioscoride autore, neq. florem, neq. semen profert. Adde quod Trinitas radice miruto mel-  
tifida, odore non ingrato, & sapore adstringente. Radix uero Epimedij tenuis describitur, graui odore, & insipido  
ac fatuo gustu. Ex quibus omnibus, ni fallor, harum plantarum discrimen luce clarius ostenditur, & medici illius  
opinio uana apertissime exploditur. Ceterum Plinius libro XXVII. cap. IX. Epimedij historiam ad ueritatem ferre à  
Dioscoride mutuatus est: cui item Galenus suam acceptam referre potest libro VI. simplicium medicamentorum, ubi  
ita scribit. Epimedij uis est moderatè refrigeratoria cum aquea humiditate. quare nullam habet insignem qualitate.  
Mammis cataplasmate impositum rectas seruare potest. Aium uero epotium concipiendi spem adimere.

Epimedij ui-  
res ex Gal.

## GLADIOLVS. CAP. XX.

XIPHIOM, alij phasganon, alij machæronion, Romani gladiolum uocant. nomē inde acce-  
pit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus, & angustius uideretur, &  
gladij modo mucronatum, neruosumque. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in  
ordinem digesti, inter se distant: rotundo semine: radicibus geminis, una paruorum bulborum  
modo, super alteram insidente, quarum inferior gracilis est, superna uberior. nascitur in aruis.  
Superior cum thure illita, admisto uino, spicula & aculeos è corpore extrahit: panos cum lolij  
farina, & hydromelite discutit: qua de re huiusmodi emplastris inseri solet. menses imposita tra-  
hit. Superiori radice ex uino pota, venerem stimulari, & inferiore sumpta sterilesce tradunt.  
Superiorem quoque utiliter infantium enterocelis, cum aqua potui dari præcipiunt.

GLADIOLVS. *Gr. Gladiolus*



SPARGANIVM.

NASCITVR Gladiolus, quem Græci xiphion uocant, frequens in Hetruria, & in comitatu Goritienſi, in pratiſ, & in aruiſ inter ſegetes: unde Segetaliſ pleriq; dicitur. huius flores noſtri uulgo appellant Monacucci. Folia ei iridiſ, breuiora tamen, & anguſtiora, lineiſ neruorum modo ſtriata, micro-nataq; . Caule attollitur cubitali, ſuccoſo: in quo flores emicāt ſubſe purpurei, paribuſ inter ſe ſpatiſ diſtanteſ, qui etiam iridiſ flores ſorma effigieq; plurimum emulantur, quanquam Gladiolo minores ſunt, & uno tantum colore conſtant. Prodit ex hiſ ſemen ( ut Dioſcorideſ inquit ) rotundum. Radicibuſ coheret geminiſ, rotundiſ, preſiſq; uerticillorum modo, una ſuper alteram inſidente, albicantiſ, bulboliſq; . He obteguntur capillaceo inuolucro, in nigrum purpureſcente, ueluti croci radiceſ. Ceterum quauis tradiderit Dioſcorideſ, quod ſuperior radix magnitudine inferioreſ ſuperat; plerunq; tamen contrarium uſitur. Pliniuſ porro hac in hiſtoria à Dioſcoride diſſentit: ſiquidem Gladiolum, quem in aruiſ naſci ſcribit Dioſcorideſ, in paluſtribuſ, iſ & aquoſiſ inueniri exiſtimat. Ex quo facile crediderim, Plinio illuſ uocari Gladiolum, quem paſim officinæ Acorum nominant. Gladioli meminit Galenuſ libro viii. ſimplicium medicamentorum, ubi ſic inquit. Xiphii radix, & maxime altera, quæ ſuperior eſt, attrahentem, digerentem, & exiccantem ſcilicet facultatem etiam poſſidet.

Gladioli hiſtoria.

Pliniuſ à Dioſcoride diſſentienſ.

Gladioli uireſ ex Gal.

Σπαργάνιον. SPARGANIVM.

CAP. XXI.

SPARGANION, aliqui xiphidion uocant. folia habet gladioli, ſed arctiora, & in terram magiſ procumbentia: in ſummo caule ueluti pilulæ prominēt, in quibuſ ſemen. Contra ſerpentiſ uenena, radix cum uino datur.

EXISTIMAT Ruelliuſ eam plantam eſſe Sparganium, quæ in aquoſiſ lociſ prouenit, quam herbariorum uulguſ Spatulam foetidam appellat. Verum hæc, ut in proxima commentatione dicitur, nil aliud eſt, quam Dioſcoridiſ xyriſ. Quare mihi planè reſellenda uidetur in hoc Ruellij opinio. Siquidem herba hæc, quam ideo Spatulam foetidam cognominant, quod grauem exhalet odorem, folia quidem habet gladioli; ſed latiora, longioraq; , minime in terram procumbentia. Adde etiam quod illa in ſummo caule non pilulaſ, quæ ſemen contineant, ſed folliculoſ, aut ſiliquaſ proferit. Syluaticuſ Spatulam foetidam deſcribens, eiſ hiſtoriam Paulo Aeginetæ perperam acceptam reſert: id enim ipſe in Paulo nuſquam potui reperire. Sed ad Sparganium noſtra redeat oratio. Vidimus hoc primum in agro Romano apud Tolpham prope aluminis fodinaſ ad pedem montiſ Ronconi, & deinde in aliſ pleriq; lociſ, foliſ gladioli arctioribuſ: piluliſ in caulib; cacumine platani proximis, herbaceo colore, in quibuſ ſemen continetur. Sanè quàm pauciſ de Sparganio diſſeruit Galenuſ lib. viii. ſimplicium medicamentorum, ſic inquiens. Sparganium & ipſum deſiccantiſ eſt facultatiſ.

Sparganii coſideratio.

Syluaticiſ eratum.

Sparganii facult. ex Gal.

Ξυρίς. XYRIS. CAP. XXII.

*Doct. Linnæus*

XYRIS folia habet iridiſ latiora, & in cacumine mucronata: quorum medio cauliſ erumpit, ſatiſ craſſuſ, cubitaliſ, ex quo ſiliquæ triangulareſ dependent: in quibuſ purpureuſ fioſ, in medio puniceuſ: ſemen in folliculiſ, ſimile fabiſ, rotundum, rubruſ, acre:

pp radix





## XYRIS.

Xyridis conf-  
deratio.

Xyridis uires,  
ex Galeno.



ANCHVSA PRIMA. *Notosiffm. 2m*

radix longa, geniculata, rufa. Contra capitis vulne-  
ra, fractaque efficax est: aculeos, & spicula omnia, ci-  
tra molestiam extrahit, adiecta floris æris tertia parte,  
& radice centaurei, ac mellis quinta: tumoribus, & col-  
lectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex passo  
bibitur, ad cõnuulsa, rupta, coxendicum dolores, strã-  
gurias; & alui profluuia. Semen tribus obolis potum,  
vrinam uehementius impellit; & cum aceto, lienem  
absumit.

XYRIS pluribus locis prouenit in Italia, præsertim in He-  
truria, nullis deficientibus notis, quas ei tribuit Dioscorides.  
Eam uulguſ Spatulam foetidam appellat, quod eius folia, si ma-  
nibus atterantur, grauem & ingratum reddant odorem. Sunt  
qui huiusce succo utantur ad scabiem, uiriliginem, & lichenas.


Hanc memoria prodidit Galenus libro VIII. simplicium medi-  
camentorum, ubi de eius uiribus ita differit. Xyris tenuium par-  
tium, attractorie, digerendi, ac nimirum etiam desiccandi est  
facultatis; cum radix, tum multo etiam magis eius fructus: qui  
quidem & urinam ciet, & lienes induratos sanare potest.

Αἴχουσα. ANCHVSA.

CAP. XXIII.


ANCHVSA, quæ alio nomine calyx, aut onoclea  
appellatur, folia habet lactuæ, in acumen fastigiata,  
hirsuta, aspera, nigra, multa, ab radice quoquo uersum  
humi sparsa, spinis horrida: radici crassitudo digita-  
lis, quæ æstate prouenit, & manus inficit sanguineo  
colore, læto solo nascitur. Radix adstringit: ad am-

ANCHVSA ALTERA.



busta, &

## ANCHUSA TERTIA.



busta, & uetera ulcera, ex oleo & cera efficax est: igni sacro cum polenta medetur: lepris, & utiliginibus illinitur ex aceto: partus extrahit, vuluæ indita. Eius decoctum renum uitijis, lieni, & bile suffusus datur: & si febris sit, ex aqua mulsæ. Sistunt aluum folia in uino pota. Radice pigmentarij utuntur ad unguentorum spissamenta. Est & altera, quam aliqui alcibiadion, aut onochiles appellarunt. Hæc à priore distat, quod minora habeat folia, sed simili modo aspera: ramulos exiles, in quibus flos purpureus in puniceum uergens cõspicitur: radices habet rubras, prælongas, quæ melsibus sanguineum succum fundunt. in sabulosis nascitur. Vis ei, folijsque inest, quæ contra uirus cum reliquorum serpentium, tum maximè uiperarum auxilietur, siue cibo, siue potu, siue alligatu: nam si quisquam mandens, in serpentis os inspuit, eum necabit. Est & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuitur, eam interficiet. Radix acetabuli mensura cum hyssopo, & pasturtio pota, latas uentris tineas excutit.

TRIA sunt Anchusæ genera, quæ hic à Dioscoride describuntur: quanquam Plinio libro XXII. cap. XX. quartum quoque genus additur, quod pseudanchusam ob id appellat à ait, quoniam primo aliarum generi quadantenus similis est, hirsutior tamen hæc lanuginosior, & minus pinguis, folijs tenuioribus, & languidioribus. Sed hanc nusquam equidem uidi, cum tamè alias omnes locis compluribus in Italia inuenisse me certò sciam. Anchusæ omne genus in toto serè caule purpureos explicat flores à uulgaribus

Anchusarum consider.

hirsutissimo non longè dissimiles, quamuis Anchusis magis subrubentes, magisque expansi spectentur. Galenus inter Anchusas Lycopsis quoque recenset libro VI. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. Anchusæ quadruplex species est. Quarum onoclea quidem radicem habet admodum refrigerantem, & desiccantem, tum adstringentem, & subamaran, tum quæ sufficiat extenuandis, & extergendis humoribus biliosis, corporibusque condensandis. Ceterum folia habet imbecilliora quidem radice, adstringunt tamen & ipsa, & desiccant. Porro Lycopsis cognominata refrigerat, & desiccant, magisque radix eius, quam onoclea adstringit. At onochelos calidior est, & magis medicata. nam plusculum habet & gustu ipso protinus acrimoniæ. Hac uerò etiam calidior est parua, quæ & amarior, & magis etiam medicata est. Anchusæ non omnes easdem vires obtinent. Nam onoclea quam uocant, radicem habet simul adstringentem, & subamaran, corporibus condensandis, & modicè extenuandis idoneam: tum abstergendis quoque, & abluendis biliosis, & salsis succis. Dictum enim supra est, quod qualitas acerba mista amaritudinis præstare queat. Sic sanè regio morbo, & lienosis, & renum affectibus est utilis. Sed & refrigerare idonea est. et sanè cum polenta illita iuuat erysipelata, & abstergit non modò epota, sed & foris imposita. Proinde rutiligines, & lepras sanat cum aceto. At radicis quidem hæc opera sunt, & operum facultates, quas diximus. At folia ipsius herbarum radice quidem sunt imbecilliora, non tamen aliena sunt à rescificatione, & adstrictione. Itaque etiam profluuium sanant pota cum uino. Et quæ Lycopsis nominatur eodem modo erysipelatis congruit, & radicem habet quam onoclea magis adstringentem. At onochili, & alcibiadij cognominata uis magis est medicata. Nam & gustu protinus maiorem habet acrimoniam, & eos qui à uiperis morfi sunt, admodum iuuat tum illita, tum suspensa, tum esca. Reliqua uerò, nempe quarta, quæ parua est, & serè nomine caret ex illis sola, alcibiadio quidem persimilis est, uerum & amarior, & magis medicaminosa: ac proinde ad latos lumbricos idonea, oxybaphi mensura cum hyssopo, & nasture

Anchusarum vires ex Gal.

## LYCOPSIS. CAP. XXIII.

LYCOPSIS, quæ & anchusa à nonnullis uocatur, folijs est lætioribus, longioribus, asperioribus, latioribusque, crassis, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis, multis, cubitalibus: flore in ijs paruo, purpurascens: radice rubra, & adstringente. nascitur in campestribus. Cum oleo radix illita, vulneribus medetur: & cum farina hordeacea, ignibus sacris: sudores peruncta mouet, adiecto oleo

Ego quoque una cum Ruellio, & Fuchsio uiris doctissimis, crederem Lycopsis eam esse plantam, quam officinæ legitimi Cynoglossi uice passim usurpant, uocantque Cynoglossam; si tamen hæc radice rubra, non autem candida nite-

Lycopsis consideratio.

retur: si folijs uiresceret asperis, non autem leuibz, ad terram recidentibus, non sursum spectantibus: si caule as-  
peret scabro, non molli: si deniq; Plinius huic sententiæ non prorsus refragaretur. Porro cùm Pliniam uideam libro  
xxvii. cap. xi. de Lycopsi seorsum tractasse, & similiter de hoc Cynoglossi genere priuatim scripsisse libro xxi.  
cap. viii. cogor omnino, ut ingenuè dicam, ab illis dissentire. Potius enim adducor, ut credam, Lycopsin herbæ ef-  
se anchusæ non absimilem: quam ideo non temerè Galenus, & Aëtius cum secutus in anchusarum genere retulerat,  
ut superiori commentatione diximus. Lycopsin, quam ego legitimam esse existimo, uidi sæpius in campestribus, ste-  
tientibus, aridisq; locis enatam, anchusæ adeò similem, ut uix ab ea discerni posset. Ceterum quoriam in huius libri  
quarti progressu, Deo iuuante, nobis de Cynoglossa differendum est suo proprio capite; idcirco disputatio quædam  
uerum sit Cynoglossum, & nunquid illud esse possit, quo officinæ uulgo utuntur, in illud tempus commodius differunt.  
Lycopsis, ut Plinius est author loco citato, folijs est longioribus, quàm lactuca, crassioribusq;: caule longo, bracteis  
adnatis, multis, cubitalibus: flore paruo, purpureo. nascitur in campestribus.

EX107. ECHIVM. *Unitt of Spine-Grass*. CAP. XXV.



Echij confi-  
deratio.

Е с н и о н folia habet prælonga, aspera, aliquantùm tenuia, anchusæ proxima, minora tamen, subrutra, & pingua, spinulis tenuibus horridula: caliculos exiles, numerosos: minuta quæ utroque latere folia, expansa, pinnata quæ, nigra, in summo caule proportionè minora: flores secundum folia purpureos, in quibus femina capiti uiperarum familia insunt: radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percussis modò à serpentibus ex vino prodest; sed eos qui antea biberint, feriri non patitur. Folia, & semen idem præstant munus. Lumborum dolores sedat: in vino, aut forbitione sumpta, lac extrahit.

**ECHION** à uiperis omnino nomen adinuenit (uipera enim  
 Græcis **ἔχιν** dicitur) uel quod semen proferat capitibus uiperinis  
 simile, uel quod uiperarum morsibus præstantissimum sit medicame-  
 ntum. Hanc herbam ab Alcibio quodam fuisse inuentam autor  
 est Nicander in theriacis, & proinde à posteris cognomine Alci-  
 biacum appellatum. Is enim dum secus aream dormiret, à uipera  
 in extremo inguine ictus est, excitatusq; à somno ex hac herba  
 succum commenducando palato & dentibus expressit, haustiq;  
 in corpus. Mansit uerò herbe reliquum vulneri superimposuit  
 contra dolorem, quo medicamentò liber euasit. Vnde postea Echio  
 nomen inditum est Alcibion ab eo, qui primus ostenderat, quantum  
 uiribus polleret contra uiperarum ictus. <sup>36</sup> Nimenius scriptor  
 grauissimus duo Echij genera inueniri scriptum reliquit: quorum  
 alterum Ocimoides appellari inquit, quod folia ocimo similia ha-  
 beat: alterum uerò, quod folio est spinis horrido, priusatum Echion  
 nominari. Id sanè quod in theriacis ante ipsum scripserat Nica-

der. Quibus uidetur etiam Dioscorides adstipulari, quippe qui Echo statim subiecerit ocimastrum. His quoque describit Plinius libro xxv. cap. ix. sic inquit. Echios diuion est generum: altera folijs coronata, pulegio similis: & tera lanugine distinguitur spinosa, cui & capitula uiperæ similia sunt. Sed tamen ignorasse Plinium Alcibion, & Echium idem esse, satis manifestum est: siquidem is libro xxvii. cap. v. Alcibios, inquit, qualis esset herba, apud aethores non comperi. Ex cuius uerbis illud facile colligi potest, quod scilicet Plinius non satis accuratè Nicandrum legerit. Ceterum non parua admiratio eum capiet, qui in Echo diligenter opus prudentissimæ naturæ perspexerit, nempe quod ipsum genuit uiperinis capitulis, ut ita apud homines, quorum potissimum curam gerit, testatum requeret, eam herbam præstantissimam esse ad huiusmodi lethaliū ferarum morsus. Echium, quod ubiq; ferè promanet, aridis præsertim locis, sepe in Hetruria, in agro Tridentino, & Goritienſi uidimus, semenq; eius uiperinam decerpimus ad antidota. Herba est anchuse, quæ secundo loco Dioscoridi redditur, non abſimilis. Vocant quatenus synæstre Buglossum. Flores profert hæc in rubeum purpurascens inter minuta folia à medio caule ad summum, i quibus semen prodit nigrum, hirsutis, spinosiq; inuolucris inclusum, uiperarum capitibus simile. Non inuenio Galenum ullam Echij mentionem fecisse in libris, quos de simplicium medicamentorum facultatibus edidit. Paulus tamen eum res describit Dioscoridem secutus libro vii. ubi hæc refert. Echion, alij doriada, nonnulli alcibiadion uocant. Spinosa herba est, quæ non modo à serpente commorsis cum uino pota auxiliatur; sed præsumentes quoq; ex ista nimis molestum pati sinit.

*Anchúsa*

**Echij vires ex  
Paulo.**

OCIMASTRUM. CAP. XXVI.

Oxioides.  
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

ERINVS.

OCIMOIDES, Latini ocimastrium uocant, folia fert ocimi, & ramos dodrantes, hirsutos: siliquas hyoscyamo similes, semine, ut gith, nigro praegnantibus. Vim habet semen in uino potum, quatuorperarum, cæterarumq; serpentium moribus medetur. Datur ischiadicis, cum melle, uino, myrrha, & pipere. Radice nititur tenui, & superuacua.

OCIMASTRUM, siue sylvestre Ocimum idipsum nobis appellare liceat, passim copiose nascitur in Italia, praesertim inter segetes prope septa, & in agrorum marginibus, folijs sane satiuo similibus: ramulis hirsutis, quadratis, dodranti, uel cubitali longitudine: in quorum summo flores emicant candidi, quandoq; uero purpurei, id quod silentio praeterijt Dioscorides: e quibus uascula erumpunt hyoscyami figura, capaci uentre, arctis faucibus, per ambitum denticulatis, uiperinis capitibus similia: in quibus semen includitur nigrum, melanthio ferme simile. Hæc uascula ita à natura facta pueri nostrates colligunt, ubi exaruerint: siquidem, cum semen exciderit, ijs intus sufflantes acutissima edunt sibila: sic enim natura pueris interdum ludendi praebuit instrumenta. Meminit huius Nicæder in theriacis inter echij genera, sic inquit. Echij genera duo: alterum spinoso folio, anchuse simile: alterum minoribus folijs, & purpureo flore, asperro lanuginosq; caule, capitulis uiperarum figura. Ocimastri uires tradidit Galenus in calce libri VIII. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Ocimoides quidam Philiterii cognominant. Radix superuacanea est. At semen tenuium partium, & desiccantis citra mordacitatem facultatis est.

Ocimastri consideratio.

Ocimastri uires ex Gal.

ERINVS. CAP. XXVII.

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.



ERINVS nascitur apud fontes, & fluuios, folijs ocimi, sed minoribus, parte superna diuisis: furculis quinis, senisve, dodrantalibus: flore candido: semine nigro, & acerbo: folia, & caules lacteo succo turgent. Semen drachmis duabus in quatuor mellis cyathis oblitum, oculorum fluxiones cohibet. Succus cum sulphure, & nitro instillatus, aurium dolores sedat.

ET SI nonnulli Dioscoridis codices habeantur, in quibus non legitur Erinum aliquo lacteo succo turgere, non desunt tamen et in quibus planè oppositum scriptum inueniatur, quorum lectio mihi magis probanda uidetur non infirmis, ut arbitror, nitus rationibus. Quippe quod herbam hæc apud aquarum riuulos uiderim, legerimq; lacteo succo manantem, adeo ut eo manus inficeret. Quod praeterea Plinio reddatur Erinus herba lactaria, seu lacte madens libro XXIII. cap. VII. ubi de ea hæc memorie prodidit. Herba, inquit, quam Graeci Erinon uocat, reddenda est in hoc loco propter gentilitatem. Palmo alta est, cauliculis quinis, ferè ocimi similitudine: flos candidus: semen nigrum, paruum, quod tritum cum melle Attico oculorum epiphoris medetur. Manat lacte multo, & dulci. Herba perquam utilis aurium dolori, nitri exiguo addito. Folia resistunt uenenis. hæc Plinius. Ceterum Erini facultatis aduersus uenena non meminit Dioscorides, quanquam Nicandro, ut quæ ad id præstet, addatur in antidotis. Galenus hanc herbam non Erinum, sed Echinos appellat: neq; id sanè mirum est, quandoquidem in uetustis aliquot Dioscoridis codicibus Echinos legitur. De qua differens ipse Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inquit.

Erini consideratio.

Erini uires ex Galeno.

sic inquit. Echini herbe semen acerbis est: ac proinde repellentis, & exicatorie facultatis. Vtuntur eo ad oculorum, & narium fluxiones.

Αἴγως. GRAMEN. *Gras*.

CAP. XXVIII.



Graminis historia ex Pl.

GRAMEN geniculatis serpit ramulis, à quibus radices spargit dulces, articulis præcinctas: folia acuminata, dura, & ut arundinis parua lata, eaque iumenta, & boues pascunt. Trita radix illitu vulnera conglutinat. Decoctum eius in potu, torminibus medetur, & vrinae difficultatibus: calculosa etiam vesicae excrementa comminuit. Est & arundinaceum gramen, priore multo maius, quod iumenta necare traditur, præsertim in Babylone, idque iuxta vias nascitur. Quod in Parnaso monte gignitur, densius fruticat: folijs hederaceis: flore odorato, candido: semine paruo, non inutili: radicibus quinis, aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, & admodum dulcibus. Succus si in vino cum melle pari, & myrrhæ dimidio decoquatur, adijcianturque piperis, & thuris tertiae portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum: id in ærea pyxide reconditur. Decoctum radices idem, quod herba, præstat. Semen vehementius vrinam impellit: aluum, uomitionesque sistit. Natum in Cilicia gramen, quod incolæ Cinnam appellant, boues inflammat, si eo virenti sæpe pascantur.

PLURIMA, ac uaria sunt Graminis genera: siquidem præter hæc tria, quorum meminit Dioscorides, alia quoque tria aculeati generis Plinio redduntur lib. xxiii. cap. xix. naturalis historiae, his uerbis. Gramen ipsum, inquit, est inter herbas uulgatissimum: geniculatis serpit internodijs, crebroque ab ijs, & ex cacumine nouas radices spargit. Folia eius in reliquo orbe in exilitatem fastigiantur. In Parnaso tantum hederacea specie densius, quam usquam fruticante: flore odorato, candidoque: lumentis herba non alia gratior, siue uiridis, siue in sæcno siccata. Tunditur aspersa aqua. Succum quoque eius in Parnaso excipi tradunt propter ubertatem: dulcis enim hic est. In uicem eius in reliqua parte terrarum succedit decoctum ad uulnera conglutinanda. Quod & ipsa herba tusa præstat illita, tueturque, & ab inflammationibus placat. Decocto adijcitur uinum, ac mel ab aliquibus, & thuris, & piperis, myrrhæque tertiae portiones. Rursus coquitur in æreo uase, ad dentium dolores, & epiphoras. Radix decocta in uino torminibus medetur, & urinae difficultatibus, ulceribus uescæ: calculos frangit. Semen uehementius urinam impellit: aluum, uomitionesque sistit. priuatim autem draconum morsibus auxiliatur. Quod è graminum genere septem internodia habet, efficacissime capiti contra dolores adalligatur. Sunt qui & aculeatum gramen uocant trium generum, cum in cacumine aculei sunt plurimum quini, dactylon uocant. Hos conuolutos naribus inserunt, extrahuntque sanguinis ciendi gratia. Altero, quod est aizo simile, ad paronychia, & pterygia unguum, & cum caro unguibus excreuerit, utuntur cum axungia. Tertium genus, quod tenuius est, nascitur in parietibus, & tegulis. Huic caustica uis est. Sistit ulcera, quæ serpunt. Gramen capiti circumdatum, sanguinis è naribus fluxiones sistit. hæc Plinius de graminibus. Ceterum hinc omnibus planè perspicuum esse puto, Gramen, quod in Babylone, quodque in Parnaso monte prouenit, non gigni in Italia: quanquam illud primum, ac uulgatum genus nobis passim frequentissimum nascatur. Neque illud quoque omnibus non cognitum & uulgare est, cui in cacumine caulium quini sunt aculei, ueluti digiti, quos pueri naribus inserunt extrahuntque, ut sanguinem eliciant. Hanc herbam Hetrusci ab effectu uulgo appellant Sanguinella, alij Capriola. De qua latius in Coronopo diximus, ubi Leonicieni, & Ruellij sententiam reprobauimus, qui hanc & Coronopam Dioscoridis unam & eandem herbam esse asseruerunt. Verum de Coronopo separatim differuit Plinius libro xviii. capite lxi. suæ naturalis historiae. Sed iam Graminibus suas reddamus uires ex Galeno, qui de ijs agens libro vi. simplicium medicamentorum, ita scriptum reliquit. Graminis radix mediocriter frigida est, & sicca, mordacitatem quandam exiguan, & partium tenuitatem obtinens. At herba ipsa primo quidem excessu refrigerat, in huiusmodi uero, & siccitate moderata. Porro semen alibi quidem imbecillum est, in Parnaso uero desiccatorium, & tenuium partium, & subacerbum. Gramen esculentam habet radicem, ubi mollis fuerit, dulcem quidem instar aquæ, sed acere quiddam exiguum, & subacerbum obtinentem. Hæc herba planè aquea gustantibus est. Ex quibus apertum est, & dicem modicè esse tum frigidam, tum siccam: ac proinde cruenta ulcera glutinare. At ipsa herba illita, non uehementius refrigerat, in medio constituta humiditatis, & siccitatis. Porro mordacitas & tenuitas, quæ radici inest, &

Graminis uires ex Gal.





qua est quidem, sed interdum tamen lapides frangere assolet, si quis eam decoctam ebibat. At semen alterius quidem medicamentum est, eius uero quae in Parnaso nascitur, urinam ciet: & fluxus uentris, & stomachi ressecat: uis enim est exicatoria, tenuium partium, & subacerba.

## SIDERITIS PRIMA.

## SIDERITIS ALTERA.

*Sideritis*




## SIDERITIS TERTIA.

## Sideritis. SIDERITIS. CAP. XXIX.

SIDERITIN aliqui heracleam uocant. folia habet marrubij, sed longiora, fatis ad frondem quercus, aut saluæ accedentia, minora tamen, & aspera: caules edit quadratos, dodrantem altos, aut etiam maiores, non iniucundi gustus, aliquantumque substringentis: in quibus per interstitia orbiculatae uertebrae, ut in marrubio spectantur: & semen in eis nigrum: nascitur in petrosis. Illita folia, suapte ui vulnera sine inflammationis periculo iungunt.

## Sideritis trieta. SIDERITIS ALTERA. CAP. XXX.

ALTERA Sideritis binum cubitorum ramulis, exilibus: folio filicis, numeroso, utrinque per oras diuiso; pediculo longo, prodeuntibus e summo alarum sinu furculis, longis, tenuibus: capitulo in cacumine orbiculato, aspero: in quo semen continetur, quam betæ rotundius aliquantò, ac durius. Huius uis, foliorumque ad vulnera, præcipua est.



**SIDERITIS** aliam esse tradunt, quam Crateuas heracleam uocat, in macerijis, & uineis nascentem: folijs, ab una radice multis, coriandro similibus, circa coliculos dodrantes, laeues, teneros, subcandidos, atque subrubicundos: flore puniceo, paruo, gustanti amaro, & lento. Huius et uis est, ut quauis recenti vulnere imposita, sanguinem supprimat.

Sideritidis cō siderano.

Fuchij erratum.

Ruellij opin. reprobata.


Virgæ aureæ facies, & uires.

Sideritidis uires ex Gal.

**T R I A** Sideritidis genera præter Achilleam, de qua sequenti capite dicetur, hic à Dioscoride representari cōstat. Quorum etsi illam, quæ secundo loco describitur, antea in nostris Italicis commentarijs me nunquam inuenisse, ac uidisse tradiderim; eā tamen hoc anno Pifis ad me misit Lucas Ghinus Forocorneliensis uir rei medicæ peritissimus. Reliqua uerò genera iandiu nouisse nos putamus, quòd ea omnibus notis suam quæq; historiam sequiprehenderimus. Ceterum nemini mirum sit, quòd tam uaria effigie primæ Sideritidis folia reddiderit Dioscorides, ut quæ eam modò marrubij, modò quercus, modò saluæ figura depingat. Quippe eorum longitudo saluæ accepta referatur oportet: scabrities deinde superficiei tenus, ac subalbidus color tum eidem saluæ, tum marrubio: quercui postremo, quæ in ambitu est diuisura. Sed ea mihi quidem nihil prorsus primæ Sideriti adstipulari uidetur, cuius imaginem expressit Fuchsius in suo insigni de stirpium historia commentario. Siquidem perspicuum est, quòd eius pictura non solum non præfert folia, & caules, quæ Sideritim ueram referant; sed etiam flores eius spicati in cacumine, non in caulibus uter folia marrubij modo, planè ueræ Sideriti refragari conspiciuntur. Ruellius porrò Sideritim hanc nonnullis herbæ Iudaicæ appellari tradit. Verum si is Iudaicam illam intelligit, cuius libro II. meminit Auicenna, nullo modo erroris culpa uacare potest. Nam Auicennæ Iudaica herba nil sanè aliud designat, quàm eruam. Sunt tamen aliqui, qui herbam Iudaicam, itemq; Paganam eam nominant, quæ barbarijs, & medicis quibusdam **VIRGA aurea** dicitur, caule rubente, bicubitali, læui: folijs oliuæ latioribus, circim minutissimè ferratis, in superficie læuibus: floribus in summitate caulium spicatis, colore aureo, non tamen anthemidis modo rotundis, radiatisq; ut eam minus rectè depingit Fuchsius. flores ij, ubi maturuerint, in pappos abeunt. Hanc chîrurgici in Germania, alijs quibusdam additis, ijs feliciter potandam exhibent, quibus intrinsecus inflata sint uulnera, & ad fistulas. Quinetiam eam in unguentis, quæ ad id conficiuntur, utiliter addunt. nam, ut ipsi referunt, glutinandis uulneribus tam intrò in corpus sumpta, quàm exterius illita, efficax admodum est medicamentum. Extulit hanc Arnaldus inter recentiores clarissimus auctor, ad urinam ciendam, comminuendosq; calculos. quod tamen apud alium scriptorem hactenus mihi non licuit reperiri. Pota hæc alui fluxiones cohibet: id quod etiam præstat clysteribus infusa. Eius decocto sanantur oris ulcera, firmantq; dentes. Adem gargarizatu anginam, & colicæ inflammationem arceat, et sauciata morbis medetur. Verum tamen hæc, ut ad institutum nostrum redeamus, non erit Sideritis primæ generis, ut fortasse Ruellius existimauit. Sideritidis uires memorie prodidit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. Sideritis habet quidem etiam destergendi quandam facultatem: sed plurima eius pars humida est, & mediocriter frigida: paucula uerò inest adstrictio. quæ rephlegmonem sedat, et glutinat. Hæc Galenus, de una tantum Sideritide scribens. Sed cuius ex tribus meminerit, non facile est decernere.

Ἀχιλλεὺς ἰατρικὸν ἔχον  
**ACHILLEA.**

ὁμοῦ ἑστῶς γὰρ ὀνόματι



Achilleæ con siderano.

Ἀχιλλεὺς. **ACHILLEA.**  
CAP. XXXII.

**ACHILLEA**, quibusdam Achillea sideritis, dodrantes, aut maiores gerit scapos, fusorum effigie, minutulis folijs circumdatos, ex obliquo crebras incisuras habentibus, coriandri similitudine, subuluo colore, lentis, odore multo, non insuauis, uerum medicato: umbella in cacumine rotunda: floribus candidis, purpureis, & aurum æmulantibus. prouenit læto solo. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur: erumpentem sanguinem inhibet, & cruenta vuluæ profluuiâ in uelle. Decocto quoq; insident fœminæ fluxione vuluæ laborantes. ad dyfenteriam bibitur.

**QVI** uulgaris usus Millefolium Achilleam esse existimant, haud dubie, mea quidem sententia, decipiuntur. Siquidem si (ut infra latius dicemus de Stratiote millefolio differentes) folia uia

profert crebris ex obliquo sectionibus, coriandri similitudine, sed auicularum pennas emulantiæ. Porro tanetsi con-  
fiet, Millefolium umbellæ coronari modò alba, modò purpurea, modò aurea; non tamen propterea colligendum est  
Millefolium, & Achilleam unam & eandem herbam esse. Quandoquidem non putauerim ego fuisse Dioscoridis insti-  
tutum (ut Ruellio placet) quòd hæc Achillea umbellam ferat candidam, illa uerò purpuream, alia deniq; auream:  
sed quòd omnibus in uniuersum Achilleæ plantis eadem insit umbella, quæ tantum prædictis coloribus distincta spectetur.  
Nascitur in Hetruria planta, nascitur & in Goritiensi agro, scapis frè cubitalibus: folijs coriandri proximis,  
odore quadatenus graui, non tamen ingrato: umbella in cacumine rotunda, ampla; colore in purpura candicans  
et, punctis quibusdam aureis depicta, quam semper putauit esse legitimam Achilleam: Atq; in hac persistam senten-  
tia, donec quis certiorẽ plantam protulerit: quòd hæc mihi planè omnibus notis Achilleam Dioscoridis repræsen-  
tare uideatur. Ceterum in hunc fortè errorem, ut crederent nostrum millefolium esse Achilleam, illos deduxit Plin-  
ius, qui libro xxv. cap. v. Achilleam Latinis millefolium uocari tradidit. Veruntamen is, quantum uidere est, eo in  
loco non Achilleam hanc describit, sed eam omnino plantam, quam Dioscorides myriophyllum appellat. Quare pau-  
lò post hæc uerba subiunxit. Sed alij, inquit, fatentur ueram Achilleam esse scapo cæruleo, pedali, sine ramis, ex  
cuius parte singulis folijs rotundis eleganter uestitam. Ex quibus uerbis liquido apparet dubitasse Plinium, qualis le-  
gitima esset Achillea: & ideo ita indeterminatè locutum fuisse, ut nihil in eo perpetuum statui possit. Serapio, au-  
tem oboruit Constantini, Achilleam, quòd (ut ipse ait, licet falsò) rubeum succum fundat, Sanguinem draconis ap-  
pellat. sed fortasse hic interpretis lapsus suus factus est. Siquidem succum rubeum fundere Achillea non tradidit Dio-  
scorides: neq; etiam (ut omnes compertum habent) lacryma, quam officinæ Sanguinem draconis appellant, herbæ  
succus est, sed Arabicæ cuiusdam magnæ arboris gummi, uel, ut aliqui uolunt, draconis animalis est sanguis ab ele-  
phante colligi. Cuius loco illius plurimum uendunt impostores, quem hirci sanguine cum resina quâuis, sorbis siccis,  
alijsq; nonnullis adulterant, & in rotundas placentas conformant. Achillea meminit Galenus libro viii. simpli-  
cium medicamentorum, sic de eius uiribus scribens. Quidam etiam uocant Achilleam sideritin, quæ propositæ qui-  
dam, quod ad iam dicta attinet; uiribus est non dissimilibus: ceterum adstrictione exuperat. quare ad sanguinis eru-  
ptiones, dysenterias, & muliebri profluuium congruit.

Multorum  
error.

Serapionis  
lapsus.

Achilleæ ui-  
res ex Gal.

BATOS. RUBVS. *Brum* CAP. XXXIII.

RUBVS notitiæ vulgaris. Vim habet siccandi,  
& adstringendi: capillum tingit. Ramorum decoctum,  
potu aluum sistit, & feeminarum profluuium. præteris  
morui accommodatissimum. Gingiuas firmant, &  
oris vitijs medentur folia commanducata: cohibent  
ulcera quæ serpunt: ulceribus in capite manantibus,  
oculisque procidentibus, remedio sunt: condyloma-  
tis, & hæmorrhoidibus folia illinuntur. cardiacis, &  
stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur.  
Caules cum folijs tunduntur, exprimiturque succus,  
mox sole cogitur, singulari remedio contra omnia,  
quæ modo dicta sunt. Mori in rubo nascentis quàm  
optime maturi succus, ad oris medicamenta conue-  
nit. Sistitur alius præmaturi cibo, necnon flore in vi-  
no potio.


*Brum*

BATOS IDAIA. RUBVS IDAIVS. CAP. XXXIII.

IDAIVS Rubus appellatus est, quoniam copio-  
sus in Ida prouenit. Est autem longè tenerior priore,  
& minoribus spinis hõrens: quanquam & sine spinis  
inueniatur. Insuper eadem præstat, quæ supradictus.  
Ceterum flos cum melle oculorum collectionibus il-  
linitur, ignem sacrum extinguit, stomachicisquẽ ex  
aqua bibendus datur.

RUBI vulgaris plantæ, plura apud nos reperiuntur ge-  
nera. quod etiam testatum reliquit Theophrastus libro iii. cap.

Ruborum cõ-  
sideratio.



xviii. de plantarum historia. Alius namq; arboris instar crassescens, in altum attollitur: alius sepibus, frutetisq;  
applicatur: alius humi serpit; radicaturq; graminis modo, quem ideo humirubum appellant: alius deniq; alijs modis  
in siluis, & montibus uisitur. In montibus siquidem Tridentinis, præsertimq; Ananiensibus Rubi quoddam genus  
nascitur, rubra proferens mora: fragis non dissimilia, nullis intus osiculis, quæ ab incolis uulgò uocantur Ampo-  
mele, gustui per æstatem non iniucunda. Iis maxime delectantur ursi: qui hac de causa eo potissimum tempore, quo  
illa

Opinio quorundam reprobata.

Rubi vires ex Galeno.

illa maturefcunt, à uenatoribus captantur. Hoc rubi genus sunt è recentioribus, qui pro certo crediderint esse *Idem rubem*. Sed equidem nō uideo, quomodo illorum sententia prorsus recte probari possit: nam si *Idem rubus* dicitur esse (ut interpretatur Dioscorides) quod in Ida proueniat, hinc nimirum colligi posse putauerim, ut Plinius lib. xxiii. cap. xiiii. non temere fortasse collegisse uidetur, quod is in Ida tantum, non alias nascatur, quemadmodum etiam dixi, quæ *Idæa* dicitur, & dictamnum in Creta. nisi forte quis *Idem* pro montano accipiat. Fuchsius rubi *Idæi* (in libro primo in ligustri mentione diximus) uacina esse putat. Sed quare ab eo dissentiam ibidem diffusius ostendi, quid scilicet uacina flores, non fructus esse existimem. Rubi vires descripsit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Rubi folia, germina, flos, fructus, & radix qualitate adstringente participant, eaq; non obscura. Sed hoc inter se differunt, quod folia, mollia potissimum, & recens nata, plurimum in se habent substantiæ aqueæ, parum uero adstrictionis: eadem ratione & germina. Itaque si mandantur, apertibus, & alia oris acria sanant. quin & alia uulnera glutinare ualent. Est enim eorum temperies & ex terrea frigida essentia, & aqua tepida. At fructus, si quidem maturus fuerit, non parum habet succi calidi temperati, qui dulcis est, uti monstratur. Proinde ob hoc, & propter medicam adstrictionem, esui non insuauis est. At immaturus à frigida substantia terræ uincitur: & propterea acerbior est, & ualde exiccatorius. Et sanè uterq; siccatus reconditur, ualidius quàm recens desiccans. Sed & flos eandem fructui immaturo facultatem possidet: utraq; ad dysenterias, & uentris proflum, tum robur deperditum, & sanguinis expuitiones, idonea remedia. Porro radix præter adstrictionem non parum in se habet substantiam tenuem, propter quam & lapides renum comminuit.

ΕΛΞΙΝΗ. HELXINE. *Uindor* CAP. XXXV.

Helxines cōsideratio.

Quorundam opinio.



Helxines vires ex Gal.

HELXINE cognomento cissampelos, folijs est hederæ, minoribus: ramulis exilibus, quibus completitur quodcumque contigerit adminiculum. Nascitur in sepibus, uinetis, & segetibus. Foliorum succus potu deijcit aluum.

NVLLI certe dubium esse putauerim, quin Helxine cognomine cissampelos, quasi hederæ acem uicem dixeris, species sit Conuoluuli. Sed quæ ea sit, non facile explicari potest. Verum cum eam reddiderit Dioscorides folijs hederæ similibus, minoribus tamen: ramulis exiguis, quibus quodcumque contigerit completitur: nasciturq; in sepibus, uinetis, & segetibus, satis mihi declarasse uidetur: eam esse Helxinem, quæ quidem in aruis tum segetes ipsas, tum linum, tum legumina omnia irretit, ac uincit, & in uinetis, palis, & uiribus circumuoluitur. Hanc Hetruscum uulgus suo idiomate nominat Vilucchio minore, Tridentinis uero Minutola dicitur. Quamquam non desunt, qui putent Helxinem eam esse herbam, quæ crebra reuolutione septa, & uicinos implicat frutices, flores illos candidos æstate ostentans, quos nostri uulgò appellant Campanelle. Hanc Plinius conuoluulum uocat libro xxi. cap. v. ubi eam his uerbis depingit. Est, inquit, flos non dissimilis lilio in herba, quam Conuoluulum uocant, nascens per fruticetâ, nullo odore, nec crocis intus, candorem tantum referens, ac ueluti naturæ rudimentum lilia facere condiscens. Sunt qui aberrantes hanc herbam, & eius florem ligustrum uocent: in qua appellatione deceptus fuit Seruius grammaticus. Hunc errorem explosimus libro primo, ubi ueri ligustri mentionem facimus. Helxinem perpaucis perstrinxit Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Helxine, quæ & cissampelos nuncupatur, digerendi facultatem habet.

ΕΛΑΤΙΝΗ. ELATINE. siue Hederæ terrestris CAP. XXXVI.

ELATINE folia habet helxinæ similia, minora, rotundiora, pilosa: tenuibus, & dodrantalibus ramulis, quinque, senisve, à radice foliosis, gustu adstringentibus. nascitur in segetibus, & cultis. Oculorum fluxionibus, & inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis, & impositis. Eadem cocta sorbitionis vsu dysenteriam sistit.

Elatines cōsideratio.

SUNT qui uelint Elatinem eam esse plantam, quam quidam Numulariam uocant. Alij uero non hanc uolunt, sed eam quam nos uulgò uocamus Solbastrella, officinæ Pimpinellam, & alij quidam Sanguisorbam dicunt. Sed non quidem, ut dicam quod sentio, neutrorum placet opinio. Siquidem Numularia in primis nō fert folia pilosa, neq; in segetibus, neq; in cultis prouenit, sed plerumq; in scrobium marginibus, præsertim uligine madentibus. Deinde Pimpinella uocata ramulis exit longè pluribus, quàm senis in terram procumbentibus, et folia habet undiq; in ambu laciniata.

*Critici modo.* Ruellius porro *Elatin* in Gallia uulgò *Rapistrum* uocari ait, eoq; ut *rapo sylvestri* in uernis acetarum rari. Verum si *rapistrum* id *Hetruscis* est, quod *Gallis*, certò scio, *Elatin* esse non posse. Quæ tamen quòd *est* in Italia, nec negare quidem, nec affirmare ausim, cum hactenus plantam non uiderim, quæ illam legitime *est*. *Galenus* de *Elatine* quàm breuissimè disseruit libro vi. *simplicium medicamentorum*, sic inquit. *Elatine* medicæ tum refrigerat, tum adstringit.

*Elatines uires*  
ex Gal.

## ΕΥΠΑΤΟΡΙΟΝ. EUPATORIUM. ODERMENNIG CAP. XXXVII.

**EUPATORIUM** fruticosa herba est, vnicum effrens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, tenue, hirsutum, cubitale, interdum ampliorem: folijs per interualla quinq;folijs, aut cannabis potius similibus, quinq;partito, aut amplius diuisis, nigricantibus & ipfis, per ambitum serratis: semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum spectans, quod siccatum uestibus inhæret. Contrita huius folia, & cum suillo adipe imposita, vlcibus, quæ ægrè cicatricem trahunt, medentur. Herba, aut semen in uino potum, dysenteria, iecinoris uitijs, & serpentium ictibus liberat. Nec defunt, qui aberrantes *argemonem* hanc appellarint, cum tamen longè alia sit, uti exposuimus.

fol 299

**SUMUNT** nonnulli, imò uniuerfa ferè seplasiariorum turba legitimi *Eupatorii* uice quandam aspectu insignem plátam, quæ plerunq; in uliginosis locis, & in scrobium marginibus enascitur, tricubitali longitudine, folijs cannabinis æmulis, maioribus tamen, subalbidis, hirsutis, & amaro gustu: caule subrupeo, rotundo, firmo, hirsutoq; multis alarum cauis, multisq; adnatis refferto. Huic flores in umbellam exeunt, non tamen simul coherentem, sed diuulsam, origani uulgaris modo, colore in purpuream albicante, qui maturescences in pappos abeunt. Radix, quæ in plures diuarcatur partes, illi inutilis est, nulliusq; in medicina usus. Et quanquam ij sciunt, legitimam *Græcorum Eupatorium* eam esse plantam, quæ uulgò *Agrimonia* uocatur, eorum fortè imitatione, qui *Dioscoridis* ætate eandem perperam *argemonem* appellabant, cum tamen animis imbibitos iandiu errores reicere nequeant, uel potius nolint, difficile quidem adduci patiuntur, ut

*Eupatorii cò*  
*sideratio.*

*Agrimonia*  
*Odermennig*

uulgarem *Agrimonia* *Græcorum* medicamentis, quæ *Eupatorium* excipiunt, admisceant. Non tamen hæc propter dicimus, quòd omni ex parte illius *Eupatorii* usum damnemus, cum id proprium sit *Auicennæ Eupatorium*; sed ut unumquodq; suo reddatur auctori. Palàm etenim est, ut ex foliorum amaritudine, & odoris præstantia, quo huius *Eupatorii* tota redolet planta, percipi potest, id & obstructions aperire, & crassos, lentosq; humores misce in- cidere posse. Veruntamen nunquam eò deueniam, ut assuerem, hoc apud *Græcos* legitimi *Eupatorii* nomen sibi ascis- sisse: tantum illud abest, ut etiam à nullo, quantum equidem inuenerim, ueterum sub alio nomine posteritatis memoriæ proditum sit, præterquam ab *Auicenna*. Ruellius tamen nescio qua ratione ductus in suis de natura stirpium commen- tarijs non sine magno errore sibi persuasit, uulgare hoc *Eupatorium* dubio procul *hydropiper* esse à *Dioscoride* li- bro secundo descriptum. Sed nos ibi in nostra *hydropiperis* commentatione Ruellij errorem latius explosimus, quàm ut hic quicquam superfit addendum. Ceterum *Mesues* quoque habet suum peculiare *Eupatorium*, quod, ut ex eius descriptione apparet, à prædictis longè diuersum est. Id namq; plures ab radice emittit caules: folijs minori centau- no similibus, per ambitum laciniatis: floribus aureis, in umbellam coherentibus, *helichrysi* modo. Hoc nostratibus senesibus uulgò uocatur herba *Giulia*. Huius coman mulieres per noctem uino albo macerant, ac subinde dilutum pueris potandum præbent dimidij cyathi mensura ad necandos uermes admirabili successu. Nasitur hæc in campe- stribus: atque, ut mea fert opinio, ea est planta, quæ *Dioscoridi* *ageratum* dicitur: quippe quæ omnibus notis illi re- spondeat. Hinc itaq; addiscant *Mauritanorum* sequaces, cum tres habeantur plantæ nomine *Eupatorii*, in medicamen- tis à *Mesue* relictis suum interponere *Eupatorium*: in *Auicennæ* remedijs suo item uti: & in *Græcorum* compositio- nes *Agrimonia* uulgò uocatam addere. Sed animaduertant uelim, ne in hoc *Valerij Cordi* dispensarium sequantur, quòd perperam, meo quidem iudicio, scribat in confectioe pilularum aggregantium, quin & in syrupo de *Eupato- rio*, pro ipsius *Mesuis Eupatorio* admiscendam esse *Gratiolam*. Siquidem hæc præterquam quòd alium magno in- commodo deiciat, nullis etiam plane notis, ac reliquis facultatibus illam representare deprehenditur. Nempe sua de- iectoria ut, quæ magno cum impetu uentrem soluit, iecur imbecillum, atq; infirmum reddit. *Eupatorii* meminit *Gal- lenus* lib. vi. *simplicium medicamentorum*, ubi ita scribit. *Eupatorium* herba tenuiū partium, incidendi extergendiq; facultatem citra manifestam caliditatem obtinet. quocirca obstructions iecoris expurgat. Inest ei & adstrictio mo- dica,

*Eupatorium*  
*Auicennæ.*

285

*Eupatorium*  
*Mesuis.*

464

455

*Eupatorii ui-*  
*res ex Gal.*



Potentilla de  
scripao & ui-  
res  
Anlerina  
Steuferi?

dica, propter quam robur uisceri addit. haecenus Galenus. Est et herba Agrimonie non dissimilis, quae nomen  
**POTENTILLA** uocatur, tametsi hirsutioribus sit folijs, supernè urentibus, infernè uerò albicantibus. Cae-  
culos profert, qui humi repunt, pilosella uocata modo: aureis floribus ornatur, singulari pediculo pedentibus, et  
culo hortensi emulis. Radice nititur exterius purpurascete, interius uerò candicante. Nascitur in uirginis locis,  
et propter semitas. Vniuersa haec planta adstrictoria, et exiccatoria facultate pollet. Idcirco mulierum profusa,  
et dysenterias cohibet, et uulnera recentia agglutinat. Prodest item et sanguinem reiicientibus. Pudendorum, et  
oris ulcera sanat. Firmat commotos dentes, stringitque gingiuas, et dentium dolorem mulcet, si eius decoctio se-  
pius colluatur.

ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟΝ.

QVINQVEFOLIUM.

CAP. XXXVIII.



Quinquefo-  
lij genera,

**QVINQVEFOLIUM** ramulos fert festuacum  
similitudine, tenues, dodrantaes, in quibus semè: so-  
lia menthae, quina singulis pediculis, raro plura, in am-  
bitu serrata: florem ex candido pallescentè, auri emu-  
lum. Nascitur in riguis, & aquarijs ductibus. Subra-  
bram habet radicem, oblongam, ueratro nigro crassio-  
rem. plurimis pollet remedijs. Ius radices decoctæ ad  
tertias, si in ore cõtineatur, dentium dolores sedat: pu-  
trida oris ulcera, collutione sistit: arteriaë scabritias,  
gargarizatu læuigat: contra alui profluvia, & dysente-  
rias auxiliatur: item articulorum, coxendicumque cru-  
ciatibus potum. Cocta in aceto, & illita, serpentia ul-  
cera cohibet: strumas, tumores, duritias, abscessus, &  
collectiones discutit: ignes sacros, reduuias, condylo-  
mata, pforasque sanat. Teneræ radicis succus, contra  
iecinoris, pulmonumque uitia prodest: item aduersum  
uenenâ. Cum hydromelite autem, uel diluto uino, &  
piperis exiguo, bibuntur folia contra febrium circui-  
tus: in quartana quidem, quaternum ramulorum fo-  
lia: in tertiana uerò, ternum: in quotidiana, unius. 31  
Ea quoque folia tricenis pota diebus, comitialibus pro-  
funt. Foliorum succus tribus cyathis aliquot dies po-  
tus, celerrimè regio morbo medetur. Illita cum melle  
& sale, tam vulneribus, quàm fistulis remedio sunt:  
enterocelicis auxilium præstant. Quinquefolium san-  
guinis profluvia & potu, & illitu sistit. Ad expiatio-  
nes, castimonias, & incantamenta inciditur.

in Italia. Quorum utiq; primum à Dioscoridis historia nihil prorsus dissentit. Secundum à primo differt, quod folijs  
sit albicantibus, hirsutis, et flore candido. Tertium folio erumpit paruo, subalbido, per terram repit. Vltimum uerò  
folia fert uitiginea, in partes quinque diuisa, quod aliqui Diapensiam, alij Saniculam appellant. Huic in cauliculo-  
rum summitatibus, et adnatorum fastigijs, capitula prodeunt subalbida, facie fragie similia. Primum prouenit in ri-  
guis, et scrobium marginibus, cauliculis tenuibus, floribus aureis, è quibus subinde semen oritur. Pediculos e semine  
tit, et in singulis quina folia oblonga, menthae ferè emula, in ambitu tamen magis serrata. Radix illi subrubens appa-  
ret, quod quauis negat Brasauolus; id tamen alijs, ut mihi eam effodienti uerum esse deprehendetur. Hæc in plures  
radiculas diuiditur, elleboro nigro crassiores. Hinc autem mirari subit Manardum Ferrariensem uirum aliquo tem-  
pus nostræ ætatis ingenio, et doctrina insignem: quippe qui tam facile sibi persuaserit, id legitimum esse Quinquefo-  
lium, quod Græci heptaphyllon, officinæ uerò herbariorumque uulgus Tormentillam dicunt. Siquidem hæc septem ex  
mo tantum cauliculo profert folia: Pentaphyllum uerò quinque, unde et illi nomen. Hoc radices elleboro similes ha-  
bet, crassiores tamen, oblongas: illa uerò admodum breues, strumosas, simulque in unum compactas globum. Cernitur  
hæc plerumque in incultis, siticulosisque locis, in altis præsertim montibus: illud uerò in campestribus, et prope aquas  
ductus, et in riguis. Quæ sanè omnia aperte declarant, hæc in re Manardum cecutiuisse. Ceterum nunquam  
miratus sum Plinium in hoc (in quo tamen à Leoniceo, ut arbitror, immeritò reprehenditur) quod libro xxv. cap.  
ix. tradiderit reperiri Quinquefolium, quod fraga gignendo commendatur. Quandoquidem (ut paulo ante diximus)  
Quinquefolij genus est, quod à quibusdam Diapensia nominatur, in cuius summis cauliculis capitula spectantur fragis  
non dissimilia. Verum etsi asserat Brasauolus in Veronensi agro nasci Fragariam, cui quinque unicuique pediculo tres  
folia, et quæ fraga gignit, in cibis gratissima, putetque de hac intellexisse Plinium, quod à Verona, ut ipse inquit, facta  
oriundus; non tamen ita planè eam à calumnia uindictæ posse putamus, cum Suetonius Tranquillus suo de illustribus

Sanicula 438

Manardi erra-  
tum.

431 Tormentilla

corum catalogo, Plinium Nouocomensem fecerit, non Veronensem. Quarta hac Quinquefolij specie Germanie corargici maxime: tuntur ad intrinseca uulnera, enterocelas, & fistulas, eius puluerem, uel decoctum potui exhibere. Quinetiam ad morbos omnes, ubi adstringenti, solidantiq; medicamine sit opus. Est tamen non ignorandum, hoc non esse Saniculam illam, quæ etiamnum quinis exoritur folijs, radice alba, miro naturæ artificio laciniatâ, de qua superius in symphyti mentione differuimus: sed aliud longè differens. Quinquefolij uires retulit Galenus libro viii. simplicium medicamentorum, his uerbis. Pentaphylli radix, inquit, desiccatur uehementer, minimè uerò arida est. Quare in multo est usu, uelut alia quoq; omnia, quæ cùm sint tenuium partium, citra morsum desiccant. Est etiam hæc radix desiccatoria ex tertio quodammodo ordine, minimum habens euidentis caliditatis. hæc Galenus.

Quinquefolij uires ex Galeno.


Ceterum quoniam Pentaphyllum Fraga nobis in mentem redegit, cùm ea sint tam cibis, quam medicamentis idonea, ita & res, & locus mihi expetere uidetur, ut hic tuam plantæ, tum fructus eius uires perstringamus. Fragaria itaq; planta est nemini ferè non cognita, adeo ut hoc nomine superuacuum putem, eius faciem representare. Refrigerat ordine primo, siccaturq; secundo. Folia, & radix uulnera, & ulcera sanant: muliebres fluxus, & dysenterias cohibent, urinam cient, & leni conferunt. Herba, & radicem decoctum potum, auxiliatur iccinoris inflammationibus, mundatq; renes, & uescicam. Idem ore contentum, collutionisq; modo agitatam, gingiuas roborat, dentes commouit firmat, & destillationes sistit. At Fraga præter id quod gustui estate in cibis arrideant, biliosis, æstuantibusq; uentriculis profunt, siticulososq; sitim sedant. Vinum, quod ex ipsa elicetur, uiscusculis, quæ in facie à caliditate proueniunt, morrice medetur: itemq; uaros, & oculorum nubeculas, calidasq; defluxiones impositum tollit. Neq; etiam hic si lenio dissimulanda uidetur Eupbragia, quam nobis Fraga nunc ob uocabulorum uicinitatem ad memoria reuocarunt, cùm et ipsa miris ad oculorum morbos uiribus prædita sit: etsi à ueteribus Græcis nusquam, quod legerim, describere reperitur. Est itaq; Eupbragia tenuis planta, quæ ad palmi altitudinem assurgit: folijs minutis, crispis, per ambitum serratis: gustu adstringentibus, paululumq; amaris: caule exit tenui, rubentiq;: flore inter purpureum & aurum albicante, quem emitit abeunte æstate. nascitur in pratis. Præstat hæc quocunq; modo sumatur tam in cibis, quam in medicamentis recens, uel exiccata ad omnia impedimenta, quæ oculorum claritati officiant, præsertim cùm in cibis diutius sumitur. Fit ex ea uinum uindemiarium tempore, uuis & musto, macerata, de quo Arnaldus in hunc modum disseruit. Eupbragie uinum, inquit, fit ad oculos ponendo herbam in musto donec fiat uinum. Cuius usu oculi senum reuiuescunt, & aufert impedimentum eorum, & defectum uisus in quocunq; cuiuslibet ætatis hominibus, præsertim ubi pinguedo, & pituita redundent. Et est qui permansit nihil uidens per longum tempus, & infra annum, eius usu restitutus est ad uisum. Ipsa enim herba calida est & sicca: & habet hoc à proprietate, quod quando puluis eius comeditur cum ouorum uitellis, idem mirifice præstat, uel quando puluis idem recipitur cum uino. Et supersunt testes fide digni, qui fecerunt in se ipsis, & qui non poterant legere sine ocularijs, & legerunt postmodum absq; ipsis, etiam literam subtiliorem. Et usus uini Eupbragiati non habet par in proficiendo uisui. Si autem uinum esset nimis forte, temperetur cum aqua fœniculi: & si opus est, addatur zuecharum necessarium. Hæc Arnaldus in libro de uinis.

Fragariæ, & fragorum uires.

Eupbragie de lineatio, & uires.

Eupbragie.

## PHOENIX.



## PHOENIX. CAP. XXXIX.

PHOENIX folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora: spicam lolio similem: calamos digitorum senum, radici aduolutos: septenas octonasue spicas. In aruis, tectisque recenter illitis nascitur. Harum uirum compos, ut in uino austero pota alui profluuium, & emanantem vulua sanguinem sistat, urinæ impetum infrænet. Sunt qui adalligatam in puniceo uelleré, & suspensam, sanguinem suppressere prodant.

PHOENIX Hetruscis syluestre Lolium dicitur, quod spicas proferat lolio similes. Nascitur frequens in uicis secus uias, in agrorum marginibus, & in templorum plateis: quæ quidem nulla prorsus repugnante nota Dioscoridis descriptioni adstipulari deprehenditur. Plinius libro xxii. capite xxv. Phœniceam herbam ita à Græcis appellatam, à Latinis lolium murinum uocari ait, quod fortasse mures derodent spicas illius, quæ in ædificiorum tectis prouenit. Hæc frequentissima uisitur Goritiæ in cœmeterio diui Francisci, & Venetijs in litore maris prope sacellum diui Nicolai: in summa eius uber ubiq; prouentus.

Phœnicis consideratio.

## Ἰδαία ῥίζα. IDAEA RADIX.

## CAP. XL.

IDAEA radici folia sunt ea, quæ rufco: adhærent ijs veluti exigui capreoli, è quibus flos. Radix spiffandi naturam habet, his conueniens, quibus adstrictione opus est. Pota, citam alium, mensesque, & omnem abundantiam sanguinis sistit.

Idææ radicis  
consider.

IDAEA radix hodie, quod sciam, ad nos non conuehitur: nec quenquam hactenus reperi, qui scribat, ubi hæc planta proueniat: etsi cognomine natale eius solum facile indicari uideatur, quod scilicet in Ida monte, qui ad Troædem spectat, nascatur: uel in eo eiusdem nominis, qui in Creta habetur, ut etiam Idæo rubo euenire superius dictum est. Huius uires tradidit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Idæa radix gustu admodum acerba est: ac si opere periculum facias, eandem uim præferet, nimirum sanguinis profluvia, alui fluxus, dysenterias, profluum mulierum, & quæcunq; eius sunt generis tum pota, tum foris imposita curatis.

Idææ radicis  
uires ex Gal.

## Ῥόδία ῥίζα. RHODIA RADIX.

## CAP. XLI.

Ῥοδίον ῥίζα

GIGNITUR Rhodia radix in Macedonia, costis similis, leuior, inæquabilis: quæ contrita rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta fronti, & temporibus cum rosacei momento imponatur.

Rhodie radicis  
consider.



RHODIA radix planta est non omnibus plane uulgata, & cognita in Italia: etsi ea facile in Apennino, & Gargano montibus nasci, & inueniri possit. Quæ in nostro horto Goritiæ uiret, iandiu eam Gratio Styriæ oppido Petrus Salicetus medicus clarissimus, & in simplicium facultate non imperitus, ad nos primum uidentem misit: quam tamen postea frequentissimam reperi in monte magno supra Vipacum, qui circiter uiginti millia passuum à Goritia distat. Ceterum quoniam paucis sane notis eam perstrinxit Dioscorides, ut ab omnibus facilius, & cognosci, & reperi possit, nos non temere facturos duximus, si eius historiam hiediffusus tradamus. Radix itaq; Rhodia caules emittit rotundos, quodantenus concauos, cubitales, à quibus circumquaq; folia prodeunt longiuscula, in acutum desinentia, portulacæ, aut sedi instar pinguis, minutimq; per ambitum serrata. In caulium cacumine umbellam profert, uiridem titthymali, & parisijs modo, sed quæ ubi desloruerit, rubescat. Radix ei inæqualis, strumosa, crassa, qualis costo, leui cortice quæ recens est, exterius splendescens, & intus subalbida: quæ uerò sicca est, leuis percipitur, intus rubens, & foris squamosa. Massa hæc recens, aut trita odore mirum in modum rosas refert: unde merito ei Rhodia nomen. Præterea omnium radicum uiuacissima est: quippe quæ è terra effossa, nisi locis perquam siccis reponatur, post multos menses rursus plantata statim repullulat. Nascitur in aliofem montium rupibus saxosis, præruptisq; locis, ubi uix tantum terra circum habet, ut illi inherere possit. Valet hæc ad capitis dolores à quacunq; causa prouenientes, si recens confecta, & rosacea aqua perfusa, ubi calidus sit affectus, aut cum anaraci aqua, si frigidus sit morbus, fronti temporibusq; illinatur. Cerebrum roborat odoris iucunditate, conuenitq; (ut diximus) omni capitis dolori, utpote quæ temperatis sit qualitatibus prædita: id quod indicat rosaceus eius odor, quo mirificè redolet. Rhodia radicis meminit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic de eius uiribus scribens. Rhodia radix ea uidelicet, quæ in Macedonia nascitur, tenuium partium, & discutientis est facultatis. In calefaciendo uerò secundi recessus censenda est, aut certè tertij incipientis.

Rhodie radicis  
uires ex Galeno.

Ῥοδίον ῥίζα

EQVISETVM.

CAP. XLII.



Hippuris

EQVISETVM in riguis, & scrobibus nascitur. cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se facti, rubescens, leniter scabri: & iuncea circa eos folia, crebra, exilia. In sublimi attollitur, vicinos arborum caudices scandens, obuolutumque dependet, comis multis, nigris, ut equorum cauda: radix lignosa, dura. Vis herbæ spiffare: quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit: prodest dysentericis in uino potus: urinam cit. Sanguinolenta vulnera glutinantur, tritis folijs, & illitis. Radix cum sua herba tussim, orthopnoeam, ruptaque adiuuat. Folijs in aqua portis, disse-

is, dissectiones vesicæ, & intestinorum, enterocelæque in vnum coalescere, cogique feruntur. Alterum Equisetum caulis est rectus, cubito maior, inanis: comis per interualla breuioribus, candidioribus, & mollioribus. Id cum aceto tritum, vulneribus remedio est, eademque fungitur facultate.

EQVISETVM PRIMVM.

EQVISETVM ALTERVM.



EQVISETVM officinis, et herbarijs plerisq; uerbum Græcum reddentibus Cauda equina nominatur. Vtrumque eius genus uulgaris est notitiæ. Alterum, quod aspero sit caule, à quibusdam uulgò Asperella uocatur. Expetitur hæc mulieribus ad stagnæ uasa detergenda, illustrandaq; necnon etiam materiarijs fabris, ijs præsertim, qui toruo opera sua conficiunt: siquidem huius herba scabritia illæ suis uasibus splendorem, nitoremq; conciliant: isti uerò similiter suorum operum ruditatem expoliant. Primum autem Caudam equi omnes ferè appellant, quod facie equorum caudas referat, unde & Græcis Hippuris dicta est. Profert hæc, cum primum è terra erumpit, quoddam tenerum germen, oblongum, iuglandium iulo non absimile. Hoc rura nostra uulgò uocant Paltrufalo, in cibumq; assuunt, ieiunij quadragesimalis tempore. Etenim illud prius elixant, mox farina circumspargunt, & oleo in sartagine frigunt, manduntq; piscium uice. Ex quo cibo aluus quandoq; eorum adeò constringitur, & constipatur, ut in coli cruciatum facile incurrant. Sunt qui primum hoc Equiseti germen siccum asseruent per annum, quo subinde estate utantur ad dysenteriam. Quippe quod aqua calida nocte maceratum eo modo decoquant, quo dictum est, & in cibum magno successu exhibent. Vtrumq; Equisetum eleganti admodum pictura expressit Fuchsius clarissimus in suis magnis de stirpium historia commentarijs. Sed nescio qua postea ratione ductus, is in paruo libro, in quem plantarum imagines duntaxat depingi, & imprimi curauit, primi generis Equisetum pro Polygono foemina aperto lapsu reddiderit. Equiseti meminit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, ubi eius uires retulit his uerbis. Hippuris, inquit, adstringentem cum amaritudine facultatem possidet, ac proinde ualenter, simulq; citra mordacitatem exiccantem. Itaq; uulnera maximè cataplasmate imposita conglutinat, etiam si præsectos esse nervos contingat: præterea uocatas enterocelas glutinat. Ceterum ad sanguinis reiectionem, ad profluium muliebre, potissimum rubrum, & dysenterias, & ad alios uentris fluxus generosum est remedium herba ipsa aut ex aqua, aut ex uino pota. Sunt qui de ea scriptum reliquerunt, quod nonnunquam etiam uesicæ, ac tenuium intestinorum uulnera succus ipsius sanauerit. Prodest etiam profluium sanguinis ex naribus, tum fluxui obnoxij in uentre affectibus ex austerorum uinorum quopiam potus: ac si febre teneantur, ex aqua.

Equiseti consideratio.


Fuch. lapsus.

Equiseti uires ex Galeno.

Κόκκος βαφικί.

COCCVM INFECTORIVM.

CAP. XLIII

Cocci infecto-  
rij confid.Monachorū  
opin.explosa.Grani tinctorij  
uires ex  
Galeno.

COCCVM, quo infectores vtuntur, frutex est sculofus, paruus, cui grana ceu lentes adhærent, quæ electa congeruntur. Optimum gignitur in Galatia, & Armenia: deinde Asia, & Cicilia: vltimum ex omnibus Hispanicum. Vis huic spissandi: vulneribus, neruisq; præcis, conuenienter ex aceto tritum illinitur. Nascitur quoque in Cilicia è quercubus, cochlearum exiliū similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & coccum vocitant.

ET SI Coccum seu granum tinctorium seplasiarijs, & infectoribus notissimum sit, quod et medicamentis admisceatur, eo plurima tum sericea, tum lanea stamina infici solent; nescio tamen an eius arbuscula in Italia proueniat. Nos autem eam, cuius picturam damus, uidimus ex Byzantio allatam. Porro Coccum tinctorium communis usus constat rotunda, inanisq; bacca, quæ nullam profectò lentis faciem refert, ut Dioscorides asserit. Ut hinc planè conijcere liceat, Coccum hoc diuersorum esse generum, nostrumq; facile illud esse, quod Plinius in Attica, & Aethiopia prouenire tradit, Scolecion ideo uocatum, quoniam ex eius medulla tenues exoriuntur uermiculi: argumento quòd hoc inane uis deprehendatur. Huius puluere non infeliciter utuntur mulieres Italicae ad prohibendum abortum, ipsum gravidis in ouo sobili propinantes pauco addito thure, uel mastiche. Ceterum con-

tendunt Monachi illi reuerendi, qui in Mesuem commentarios ediderunt, aliud esse Coccum, aliud uerò Chermesinum uulgo uocatum, quo serica stamina roseo colore inficiuntur. Etenim asserunt ij legitimum chermesinum è quibusdam fieri granulis, quæ ut plurimum uulgari Pimpinellæ radicibus adhaerentia reperiuntur, uocariq; hæc propriè Mauritanis Chermes: & hinc isti deinde colligunt, minime credendum esse, quòd Græcorum coccum uulgo grana tinctorum nuncupatum, sit Mauritanorum chermes: quandoquidem magna omnino inter colorem coccineum, & chermesinum intercedat differentia. Sed hos patres hallucinari (pace tamen eorum dixerim) ex eo equidem euidentissimum fieri arbitror, quòd hætenus neminem Arabicæ sectæ inuenerim, qui eorum adstipuletur sententiæ. Siquidem Serapio per chermes nil aliud intelligit, quàm coccum tinctorium à Græcis appellatum, cum de Chermes agens ea sanè omnia in eius historia referat, quæ Dioscorides suo cocco tribuit. Quapropter scirem libentissimè qua ratione, quæue auctoritate nixi ij reuerendi monachi in hanc uanam, & erroneam deuenierint opinionem. Verum non ob id negauerim ego nostrum Chermesinum à cocco minime differre, quòd certò sciam, aliud esse coccum, aliud chermesinum, unde & infectores differentie causa coccum Granum nuncupant, Chermesinum uerò, quod è pimpinellæ radicibus decerpitur: sed negauerim quidem Mauritanorū Chermes nostri usus Chermesinum esse, quòd nil aliud Chermes esse putem, quàm Coccum, cuius hic meminit Dioscorides. Chermesinum nouum iam pridem conuehitur in Italiam ex Hispanijs ab occidentali India importatum, quod cum copiosissimum asseratur, Chermesina stamina nunc ulescere cœperunt. Cocci seu Grani infectorij uires descripsit Galenus lib. VII. simpl. medic. his uerbis. Granum tinctorium adstringentem, simulq; amarā facultatem possidet. Vtraque siue morfu desiccatur. proinde ad ingentia uulnera congruit, præsertimq; neruorum. Sed tunc ipsum quidam cum aceto terunt, alij cum oxymelite.

Τράγιον. TRAGIVM. CAP. XLIIII

TRAGIVM nascitur in Creta tantum insula, lentisco semine, folio, & ramis simile, singulis tamen minoribus: succus ei lacteus, gummi non dissimilis. Semen, folia, lacrymaque illitu spicula è corpore eijciunt: omnia quoque corpori impacta, euocant: pota stranguriæ medentur, calculos uesciæ frangunt, menses trahunt. modus in sumptione est, drachma vna. Fama est syluestres capras sagittis confossas, eius herbæ pabulo spicula excutere.

Τράγιον ἑτερον. TRAGIVM ALTERVM. CAP. XLV

EST alterum Tragium, quod tragoceros aliqui vocant: folia scolopendrij habet, & radicem syluestris raphani, tenuem, candidam. Quam crudam vel coctam esse dysentericis prodest. Folia autumnō, hirci virus olent: exinde sibi tragij nomen adoptauit. Prouenit in montibus, & præcipitijs.



TRAGIVM, quod in Creta tantum nasci tradit Dioscorides, quodq; in uniuersum lentisco simile facit, Plinius libro XIII. capite XXI. ipsum fruticem terebintho similem reddidit, & libro XXV. capite ultimo, idem iuniperum asimilauit. Id quod dubio procul ostendit, Tragium hoc omnino illi fuisse ignotum, & quod tantum id de eo memorie prodiderit, quod ab alijs autoribus non minus fortasse hac in re cecutientibus mutuatus est. Hoc etate nostra non defertur, quod sciam, in Italiam. Quo fit, ut id mihi haecenus, sicut & ceteris herbarum studiosis, ut ferme suffragor, sit in Italia incognitum. Quod autem secundo loco à Dioscoride representatum est, id potius herbam esse crediderim, quam arbusculam, cum eius radix tam cruda, quam cocta in cibum ueniat, sitq; syluestri raphano proxima. Verumtamen nondum reperi qui plantam mihi demonstraret, folijs scolopendrio similibus, quæ hirci uirus occidit. Ex quo adducor, ut ab ijs plane dissentiam, qui putant Tragium hoc eam esse plantam, quam quidam Pimpinellam, quidam uero ab odore Saxifragiam hircinam appellant. Quandoquidem huic scolopendrij folia non insunt, nullusq; eius ad dysentericos usus, tametsi ad ciendam urinam, expediendosq; uiscerum infarctus plurimum praestet.

Tragij consideratio.


Huius PIMPINELLAE duo habentur genera. Maior radice nititur longa: folijs circumquaq; solo procumbentibus, dissectis, per ambitumq; serratis: caule quadrangulati: floribus in umbellâ coherentibus, tenuibus, albican-  
tibusq;. Minor caule exit rubenti: folijs minoribus, minus dissectis, minutiusq; serratis. Vtraq; tamen hircum redollet. Radix, in qua uis tota consistit, excoquitur, siccatq; ordine secundo completo, aut sanè tertio incipiente. Praestit hac ad renum, et uesicæ morbos, quorum calculus est causa. Ob id enim renes à calculis expedit, & urinâ remotam pellit. Prodest expressus è radicibus succus ex uino haustus, deleterijs medicamentis, & uenenosorum animalium morsibus. Qua ratione non desunt, qui ad pestilentiam, radicem hanc miris laudibus efferant. Est & alia Pimpinella, quæ à nostris uulgò SOLBASTRELLA nominatur, nullis non cognita, utpote quæ acetarijs frequentissime inferatur. Verum hæc ab antedictis longè distat uiribus, etsi foliorum facie satis inter se conueniant. Si-  
quidem ultima hæc gustata non leuiter adstringens percipitur, & lentoris copiam præbet. Vnde facile conijcitur, eam esse adstrictorie facultatis. Hinc itaq; fit, ut muliebri profluuium efficacissime sistat: dysenteriam, & ceteros eius fluxus cohibeat: quin & biliosas uomitiones reprimat. Herba ipsa uulnera, & ulcera sanat: misceturq; uiguentis, quæ tunc ad capitis uulnera, tum ad carcinomata parantur. Hanc Matthæus Curtius clarissimus etatis nostre medicus, contagiosis, pestilentibusq; febribus maxime commendauit. Sunt qui eam Elatinen esse putent. Sed  
iudicio, aberrant, ut supra etiam in sua mentione docuimus. Tragij meminit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi hæc de eius uiribus tradit. Tragij, inquit, folia semen, & lacryma trahentis, digerentisq; sunt facultatis. Est uero & tenuium partium, & facultate in principio tertij ordinis calida. Corpori infixæ extrahi, lapides frangit, menses mouet drachmæ pondere potum. Porro in Creta sola nascitur tragion lentisco simile. Ceterum alterum Tragium hoc minus, cuius folia scolopendrio similia sunt, uisitur quidem multis in locis: sed non parum habet facultatis adstringentis, ut & ad fluxionum affectus conueniat.

Opinio reprobata.

Pimpinellæ genera, & uires.

Pimpinellæ uulgaris uires.

454  
Tragij uires ex Galeno.



Τραγίος. TRAGIVM.

CAP. XLVI.

Σκάρδιον

EST etiam herba tragos, quam aliqui scorpion, aut traganon uocant: maxime in maritimis nascens, palmum alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs: pusillis circa ramos acinis, rufis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum acini decem ex uino poti, celiacis, & foeminis fluxione vuluæ laborantibus, auxiliantur. Tunduntur à plerisque, & in pastillos digesti asseruantur: quibus utuntur, cum opus est.


TRAGIVM aliquibus Scorpion uocari non modò tradidit Dioscorides; sed etiam Plinius libro XXV. cap. ultimo, his uerbis. Est & herba Tragos, quam aliqui Scorpion uocant, semipede alta, fruticosa, sine folijs: pusillis racemis, rubentibus, grano tritici, acuto cacumine, & ipsa in maritimis nascens. Et libro XXI. cap. xv. Spinosarum, inquit, multe species. In totum spinosa est asparagus, scorpio: nullum enim folium habet. Id quod ante ipsum posteritatis memorie prodiderat Theophrastus libro. VI. cap. primo de historia plantarum, cum inquit. Aculeatorum alia ex toto aculei sunt, cæu corruda, et scorpium: hæc enim nullum præter aculeum folium gerunt. Hinc itaq; omnibus abunde constare arbitror, herbam, cuius hic effigiem damus, legitimum esse Tragium. Ea siquidem in maritimis nascitur (plurima enim in Tergestino litore provenit, & ad Argem-

Tragi consideratio.

tarium promontorium in Hetruria) nulla prorsus reclamante nota ex ijs, quas rei herbarie auctores Trago rell-  
derunt, Huius tamen nusquam, quod inuenerim, meminit Galenus in simplicium medicamentorum censu.

Expositos. IVNCVS. *Sicut*

CAP. XLVII.



Iunci conside-  
ratio, & vires  
ex Galeno.

LICHEN.



Lichenis con-  
sideratio.  
*Hepatica*

Lichenis ge-  
nera ex Plin.

IVNCVS duo genera. vnum levis nominati: alte-  
rum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cuius etiam  
duo assignantur genera. vnum sterile: reliquum fert  
semen nigrum, rotundum, & crassiore constat cala-  
mo, carnosioreque. Tertius est iuncus, qui voca-  
tur oloschœnos, prioribus carnosior, asperiorque: is  
similem supradicto fructum in cacumine parit. Se-  
men utriusque tostum, ex diluto vino potum, sistit  
aluum, & rubra foeminarum profluvia: vrinam cit,  
capitisque dolores facit. Quæ proxima sunt radici fo-  
lia tenera, conuenienter illinuntur aduersus phalan-  
giorum morsus. Aethiopi iunci semine somnus al-  
licitur: sed modus in porione seruandus est, ne sopor  
fiat.

IVNCVS omne genus vulgare est notitie: quandoque  
dem propter stagnantes aquas omnes eius reperiuntur species.

Iunci generum meminit Galenus libro VII. simplicium medi-  
camentorum, ubi de ijs ita scriptum reliquit. Schœnos lea,  
hoc est, iuncus levis, quædam oxyschœnos, alia oligoschœnos  
nuncupatur. Gracilior, duriorque oxyschœnos: crassior, le-  
xiorque oligoschœnos. Fructus oligoschœni somnum affert. At  
oxyschœni duæ sunt species: altera sterilis, cuius quidem in me-  
dicina nullus usus est: altera uero semen fert, cuius etiam semen  
somnum conciliat, sed minus quam oligoschœni: quanquam ta-  
men hoc caput tætet. Vtrumque si frictum cum uino bibatur, ven-  
tris fluxus desiccatur, & muliebri profluvium rubrum sistit. Ex  
quibus clarum est, quod composita eorum temperies est ex ter-  
rena uidelicet essentia leuiter frigida, & aquea leuiter calida:  
ut & inferna desiccare possint, & sensim frigidos ad caput uas-  
pores submittere, quibus somnolentos efficiant.

LEX LICHEN.

CAP. XLVIII.

*Lichenis*

LYCHEN, qui saxis est familiaris, aliquibus bry-  
on appellatur, asperginosis petris adhæret, ut muscus.  
Is illitus sanguinis profluvia sistit, inflammationes  
arceat, impetigini medetur. Iuuat regio morbo cor-  
reptos, cum melle illitus: oris, & linguae defluxio-  
nes inhibet.

LYCHEN, procul dubio ea est planta, quam officinae, &  
herbarij hodie Hepaticam vocant. Hanc autem Greci Liche-  
na appellant, quod lichenas serpentis morbi genus, impos-  
ita sistat, & sanet. Lichen in asperginosis, & rorulentis pro-  
uenit locis, nudis petris adherens, musci modo. Folio constat  
suppingui, cartilagineo, prope radicem angusto, in latum se-  
pendente, triplici uel quadruplici lacinio interfecto. Prodeunt  
à radice cauliculi tenues, quibus capitula insunt parua, stel-  
larum effigie. Lichenis Plinio libro XXVI. capite IIII. duo  
produuntur genera; quæ his uerbis depingit. Lichen, inquit,  
herba omnibus his præfertur, inde nomine inueniend. Nascentur  
in saxosis, folio uno ab radice lato: caule uno, paruo, longis  
folijs dependentibus. Hæc delet & stigmata: teritur cum melle.  
Est aliud genus Lichenis petris tantum adherens, ut muscus,  
qui & ipse illinitur. Hic & sanguinem sistit uulneribus instilla-  
tus, & collectiones illitus. Morbum quoque regium cum melle  
sistit.

scit et illito, & lingua. Qui ita curantur, aqua salsa lauari iubentur, ungi oleo amygdalino, bortenſibus abſti-  
nere. hæc Plinius. Ceterum eſt herba Licheni non longè diſſimilis, quæ in quercuum, aliarumq; ſylueſtrum arbo-  
rum caudicibus naſcitur, in opacis præſertim ſyluis. hæc tamen eridior, & ambitu latior, ſuperiore parte uire-  
ſcens, inferiore uerò pallicens, maculis quibuſdam reſerta, adeo ut formam pulmonis referat: unde pleriq; PUL-  
MONARIA dicta eſt. Utuntur hac nonnulli magis forte nomine, quàm ipſis uiribus freti, ad tabem, pulmonum  
ulcera, & cruenta ſputa. Nec deſunt, qui laudibus eam efferant ad uulnera ſananda, ad pudendorum ulcera, &  
clutius; muliebri profluuium, cui miſciſſe mederi aiunt. Quin & eam dyſentericis exhibent, & bilioſa euome-  
ntia. Eſt & alia herba, quæ etiam Pulmonaria uulgo nominatur, ab illa tamen maxime differens, in opacis pro-  
ſpiciens, folio bugloſi, aſpero, hiriſuto, albis maculis circumſperſo. Caulem gerit hæc ineunte uere, in cuius cacu-  
mine flores erumpunt purpurei, perinde ac in uulgarì cymogloſſo. Huic plantæ rei herbariæ periti non contemnenda  
uires tribuunt, ad pulmonis ulcera ſananda. Quia in re, itemq; in ſanguinis reiectione mirabili ſucceſſu ſe eam ex-  
hibere mihi ſæpius retulit Iulianus à Maſtoſtica Teruiſienſis medicus peritiſſimus: decoquitur enim ad medias, da-  
turq; decoctum potandum addito ſaccharo: uel ſuccus ex ea expreſſus ſerapij modo cum ſaccharo paratus. Præ-  
ſentet hæc omnia herba ipſa, & flores; quoquo modo à tabe affectis ſumantur decocta. Lichenis meminit Galenus  
libro VII. ſimplicium medicamentorum, ſic inquit. Lichen, qui in petris naſcitur, eſt uelut muſcus quidam, ſed  
reæ ex plantarum genere cenſeri poteſt. Sic autem nominatus uidetur, quòd lichenas ſeu impetigines curet. Exter-  
gentem, ac modicè refrigerantem facultatem habet, utraq; uerò reſecantem. Abſtergentem quidem, atq; exiccantem  
petra obtinet, refrigerantem uerò ab humore aquato: naſcitur enim in humidis, & grauiter olentibus ſaxis.  
Porro quod ex talibus ſubſtantijs componitur, aduerſum eſſe inflammationi, niſil mirum eſt. Ceterum an ſanguinis  
profluuium ſiſtat, ut reſert Dioſcorides, id neutiquam dicere queo.

Pulmonarie  
depictio, &  
uires.

Lingua ſimilis

Pulmonaria  
alia. *ſleren & vni*

Lichenis ui-  
res ex Gal.

PARONYCHIA. CAP. XLIX.

PARONYCHIA exiguis frutex, in petris naſcens,  
pèplo ſimilis, minor longitudine, maioribus folijs. Il-  
lita paronychijs, atque ſuis remedio eſt.

PARONYCHIA non modo in ſaxis gignitur; ſed etiam in  
ueterum ſciorum parietibus; folijs pèplo, aut rutæ ſimilibus,  
aduerſe parce pallentibus, paruiſq; maculis reſertis, phyllitidis  
uel hemionitidis modo. Hanc aliqui parietum Râtam, alij Saxi-  
fragam appellant. Copioſiſſima progenit hæc in ingenti ſylua, quæ  
in itinere eſt, quo Goriti diſcedentes petunt Labacum Carniole  
iuriam, ubi & in ſaxis, & ſiccis arborum truncis frequentiffima  
uiſitur. Meminit Paronychiæ Galenus libro VIII. ſimplicium  
medicamentorum, ita de ea ſcribens. Paronychia ab effectu no-  
minata eſt: ſanat enim paronychijs; & ut reſert Dioſcorides, ſa-  
uos quoq;. Viſ eius eſt tenuium partium, & exiccatoria morſu  
uacans: taliduenim ſint oportet, quæ paronychijs ſanant. Porro  
ſatis conſtat tale eſſe idoneum ad digerendos affectus omnes, qui  
digeri poſtulant. Siquidem euſmodi ſunt, quæ cum ex tertio ſint  
ordine excaſcentium, & deſiccantium, uelut & hoc, eſſentie  
inſuper tenuium partium ſunt.

Paronychiæ  
confider.

Paronychiæ  
uires ex Gal.

Χρυσοκόμη. CHRYSOCOME. CAP. L.

CHRYSOCOME palmi altitudine fruticat: coma  
ſpecie corymborum, hyſſopo ſimili: radice hiriſuta;

neratri nigri modo, tenui, cyperum æquante: guſtu non iniucundo, ex dulci aſtero. in petro-  
lis, opacisq; naſcitur. Radix excaſcit, & adſtringit: his conueniens, quos iecur, aut pulmonis  
inflammatio malè habet. contra purgationes vuluæ, decocta cum hydromelite aſſumitur.

Qui Chryſocomen in Italia mihi oſtenderet, hæcenus reperi neminem. Quamobrem in eo naturæ uiridario,  
plantis compluribus nobis incognitis reſerto, quod tantum in ſui ipſius uſum colit natura, ne omnibus exuta medi-  
camentis, ſuis etiam languoribus mederi nequeat, eam & uireſcere, & floreſcere omittamus, donec nobis, aut alijs  
comperam in communem quoq; cognitionem, & uſum prodere contingat. Interim tamen, ut noſtrum inſtitutum ſe-  
quatur, uires eius ex Galeno ſubiiciam, quas ipſe libro VIII. ſimplicium medicamentorum, ijs uerbis deſcripſit.  
Chryſocome uocatur & chryſites. Radix uincentes acrem ſimul, & adſtringentem qualitates habet: quare neq;  
multi uſus eſt. Vſui tamen eſt decocta in mèlicrato in peripneumonijs, & morbis hepaticis. Sed & menſtrua purgæ-  
tionis prouocande uim quandam obtinet.

Chryſoco-  
mes confid.

Vires ex Ga-  
leno.

Χρυσοκόμη.



## Χρυσόγονον. CHRYSOGONVM. CAP. LI.

CHRYSOGONVM dense fruticat, quernis folijs, flore coronarij verbasci: radix vt rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quæ trita cum aceto, atque imposita, muris aranei moribus auxiliatur.

CHRYSOGONVM, nisi aliunde in Italiam deferatur, inter plantas, quæ minime cognoscuntur, et ipsum perpetuo recensendum esse putauerim: uel nobis in abditissimis naturæ hortis, ubi delitescit, inuestigandum erit. Id siquidem hactenus mihi neque inuenire, neque ab alijs compertum uidere licuit in Italia.

## Ἑλὶχρύσον. HELICHRYSVM. CAP. LII.



Helichrysi  
sideratio.

Fuchsi error.

Helichrysi ui  
res ex Gal.

Amarati pur  
purei mentio,  
& uires.

HELICHRYSVM, quidam chrysanthemon, nonnulli & id amaranton vocat; quo deorum simulacra coronant. Ramulum habet candidum, uirentem, rectum, firmum: folia intercedentibus spatijs angusta, abrotano similia: comam aureæ lucis, in orbem: ymbella rotunda; veluti siccis corymbis dependentibus: radice tenui. Nasceitur in asperis, & torrentium alueis. Contra serpentium ictus, coxædum dolores, urinae stillicidia, ruptaque, coma e vino pota opitulatur: ciet menses. Sanguinem coctum ventris ac vesicæ absumit, pota cum mulso: ieiunis, trium obolorum pondere, sistit delirationes, data in vino albo diluto. Vestibus inferitur, oxys ab erodentium iniurijs tueatur.

HELICHRYSVM copiose prouenit in Hetruria in agro. Facili solo, incultisq; locis, sticulis collibus, necnon etiam in fluminum alueis. Caulis constat recto, equali, ac lignoso, cubitalem longitudinem non excedente: folijs per intervalla emergentibus, abrotani æmulis: comantibus in cacumine floribus, aureo colore fulgentibus, et in orbem umbelle modo coherentibus, corymbacea facie, ueluti myriophylli, uel agerati: qui exiccati aureum colorem diutius retinent. Proinde commodè hyeme, quod eo tempore flores deficiant, puella siccum Helichrysum coronamentis suis inferunt, quemadmodum et Amarantum purpureum, quod nostris Hetruscis uulgo dicitur Fioruelluto. Helichrysum depinxit Fuchsius in suis clarissimis de stirpium historia commentarijs, folio echii aculeato, et floribus euphrasii. Quia in pictura ipsum deceptum suspicor, quod ea Helichryso minime respondere deprehendatur. Helichrysi meminit Plinius lib. XXI.


capite XXV. ubi de eo differuit his uerbis. Heliochrysum, inquit, quod alij Chrysanthemon uocant, ramulos habet candidos: folia subalbida, abrotano similia: ad solis percussum aureæ lucis in orbem ueluti corymbis dependentibus, qui nunquam marcescunt. qua de causa deos coronant illo. Quod diligentissime obseruauit Ptolemæus rex Aegypti. Nasceitur in frutetis. Helichrysi sub Amaranti nomine mentionem fecit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inquit, Amarantum facultatis est incidentis, et extenuantis. Coma igitur eius menses cum uino pota educit: et grumos sanguinis liquare creditur, non solum in uentre, sed et in uesica: sed tunc potius cum mulso bibenda. Et omnes simpliciter fluxiones, pota desiccata, stomacho infesta. hæc Galenus. Ceterum cum Helichrysum tam Dioscoridi, quam Galeno Amarantum dicatur, opportuna nobis sese offert occasio, ut hic AMARANTI purpurei, quod ut paulo ante diximus, a nostris uulgo uocatur Fioruelluto, historiam, et uires tradamus, præsertim quod puellis gratissimum sit hyeme in suis texendis corollis, utpote quod tam recens, quam siccum purpureum, ac flammeum colorem diutius conseruet. Hoc itaq; folia profert ocimi maiora: caulem crassum, pinguem, subrubentem: florem spicatum, admodum purpureum. qui quanquam diu siccatus (ut supra dictum est) asseruatur, haudquam tamen suum deperdit colorem. Amarantum hoc, quantum equidem reor, memorie prodidit Plinius lib. XXI. capite VIII. cum sic inquit, Amaranto non dubie uincitur. Est autem spica purpurea, uerius quam flos aliquis, et ipse sine odore. Mirumq; in eo gaudere decerpi, et lætius renasci. Prouenit augusto mense: durat in autumnum. Alexandrino palma, qui decerptus asseruatur, Mirumq; postquam defecere cuncti flores, madefactus aqua reuincitur, et hybernas coronas facit. Summa eius natura in nomine est, appellato quoniam non marcescit. Hactenus de Amaranto Plinius. Huic facultas inest (ut recentiorum quorundam fert opinio) frigida et sicca: proinde flos eius potus coctus,

catarrhos, & dysentericos iuuat. Mensium abundantiam cohibet, & albas uteri fluxiones. Quinetiam cruenta ex-  
punctionibus prodest, præsertim si in pulmone, uel pectore, uas aliquod fractum fuerit.

Χρυσάνθεμον. CHRYSANTHEMVM

CAP. LIII.

Argemone



CHRYSANTHEMON aut caltha, nonnullis buph-  
thalmos. herba est tenera, fruticosa, læues proferens  
caules, & multifida folia: flores supra modum splen-  
dentes, luteos, orbem oculi imitantes, unde buph-  
thalmi nomen traxit. propter oppida nascitur. cuius  
caules oleris uice manduntur. Flores cum cerato tri-  
ti, steatomata discutere produntur. Regio morbo cor-  
reptis, colorem bonum breui reddunt, si sequente lon-  
go balnei usu, post exitum ebibantur.

QUANQVAM non desunt, qui crediderint Buphthalmum, Chrysanthemi confider.  
& Chrysanthemum unam, & eandem plantam esse, quod pa-  
ribus notis inter se certare uideatur: tamen si particulares quæ-  
dam notæ in utrisque diligenter expendantur, facile inter has  
platas discrimen aliquod notari deprehendetur. Quod cum opi-  
mè sciret Dioscorides, diuersis libris, diuersisq; capitibus de his  
speciatim differuit. Quod utiq; minime fecisset, si compertum  
habuisset, nullam inter eas intercedere differentiam. Quæ tamen  
hinc cognosci potest, primum quod Buphthalmo folia insint foe-  
niculo similia, quæ planè capillaria constant: Chrysanthemo ue-  
rò tenera, multifida, minutimq; per ambitum laciniata. Deinde  
Chrysanthemi caules in cibis mædi aliorum olerum modo scribit  
Dioscorides: id quod de Buphthalmo agens silentio præterijt.  
Pars uero flores Buphthalmo reddidit anthemidi similes: Chry-  
santhemi uero luteos, & uehementer splendentes. Cæterum de  
horum uiribus differens, Buphthalmi flores, cum cerato tritos,  
tumores, duritiasq; discutere tradidit in uniuersum, & affir-  
manter locutus. Verum postea de Chrysanthemo scribens, huius  
flores, inquit, steatomata discutere produntur, particulariter,

& dubiè locutus. Hæc sanè harum plantarum manifesta discrimina faciunt, ut credam, quod aliquis antiquorum cu-  
riosus, nimisq; sciolus Buphthalmum, & Chrysanthemum unam tantum referre plantam fortè existimans, omnia in  
Chrysanthemo adiecerit, & confuderit, quæ libro tertio de Buphthalmo memoriæ prodidit Dioscorides. quemadmo-  
dam imprudenter de Ruta & Hyperico, Asaro & Bacchari ab alijs factum esse in præcedentibus ostendimus.  
Hoc itaq; argumento fretus crediderim ego hoc modo Chrysanthemi caput esse legendum. Chrysanthemon herba est  
tenera, fruticosa. Læues proferens caules, & folia multifida: flores luteos, admodum splendentes. Eius caules man-  
duntur olerum modo. Flores cum cerato triti steatomata discutere produntur. Hinc itaq; sic Chrysanthemi capite  
resutato, facile patebit, quantum aberrauerint ij, qui Chrysanthemum cum Buphthalmo confuderunt. Chrysan-  
themon, cui nulla prorsus ex modo traditis reclamationibus nota, frequentissimum prouenit in Senensi agro prope Montem  
nigrum oppidum ita appellatum, esturq; ibi à rusticis ueluti beta, & brassica. Buphthalmum uero etsi antea à me non  
usum in nostris commentarijs Italica lingua conscriptis confessus essem; ad nos tamen hoc anno uerum Patauii ala-  
tum esse superius in sua mentione indicauimus. quod etiam postea accepinus Pisis à Luca Ghino medico clarissimo,  
& re herbariæ peritissimo, omnibus prorsus adstipulantibus notis, quæ illi tribuuntur. Quo factum est, ut certius  
assim affirmare Chrysanthemi historiam auctam, deprauatamq; esse in Dioscoride. Credidit Leonardus Fuchsius  
medicus doctissimus in suo de plantarum historia commentario, Chrysanthemum illud esse ranunculi genus, quod so-  
lio apij, luteis floribus, in pratibus plurimum nascitur. Qua in opinione quantum, pace eius dixerim, hallucinetur,  
evidentius omnibus esse puto, quàm ut à nobis ostendi debeat. Chrysanthemi meminisse Galenum in libris de simpli-  
cium medicamentorum facultatibus, hætenus incompertum habeo.

Chrysanthemi caput res-  
tutum.

Fuchsij error.

Αγέρων. AGERATVM

CAP. LIIII.


AGERATON fruticosa herba est, palmari longitudine assurgens, simplex, humilis, origa-  
no maxime similis: umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, helichryso minor. Nomen  
ei inditum est, quoniam diutissimè flos in sua coloris specie conseruetur. Vis decocti feruens:  
huius uisæ nidor urinam cit, & vuluæ duritias emollit.

NASCITVR



AGERATVM.

AGERATVM ALIVD.



Agerati confi-  
deratio.

Vires ex Gal.

**NASCITVR** Ageratum passim in uniuersa Hetruria, folijs origano proximis: floribus aureis, in umbella emicantibus, helichrysi modo. Hanc herbam Mesues Eupatorium existimat, ut superius in Eupatorii commentatione abunde diximus. Ea à nostris Senensibus uulgo appellatur herba Giulia. Agerati uires paucis perstrinxit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquires. Ageratum digerit, & inflammationes leuiter quodammodo resoluit.

**PERISTEREON. VERBENACA.** CAP. LV.

**PERISTEREON**, siue verbenaca, nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse uidetur, quòd columbæ circa hanc perquam libenter uersari soleant. Dodrantis altitudine, & interdum amplius adulescit. Folia è caule prodeunt incisa, & subalbida. ea singulari ramo, radiceque sola, constare sæpius inuenitur. Folia cum fuilla adipe recenti, aut rosaceo imposita, vuluarum dolores finire putantur: ignem sacrum illita ex aceto reprimunt: putrida vlcera cohibent: vulnera glutinant, veteraque ex melle ad cicatricem perducunt.

**SACRA HERBA.** CAP. LVI.


**SACRA HERBA**, quæ & peristereon nominatur, ramulos emittit cubitales, aut mainculos, angulosos, in quibus ex interuallis folia quercus, sed minora, angustioraque, eisdem diuisuris in ambitu, colore aliquatenus cæsius: radix longa, tenuis: flores purpurei, graciles. Folia cum radice in vino pota, illitave aduersus serpentes pollent. eadem drachmæ pondere cum thuris obolis tribus in vini veteris hemina, quadragenis diebus, ieiuno ore, contra regium morbum bibuntur: veteres tumores, & inflammationes mitigant: fordida vlcera purgant. Tota in vino decocta, tonsillarum crustas abrupit: oris nomas gargarizatu cohibet. Aiunt si aqua spargatur tricliniũ, quæ maduerit, lætiores conuictus fieri. Datur potandum in tertianis febribus tertium à terra geniculum, cum folijs circundantibus: quartanis quartum. Sacram vocant herbam, quoniam multum ad amuleta, expiationesque commendetur.

## VERBENACA.

VERBENACA Hetruscis uulgo Verminacola, alijs uerò

Verbenace  
consider.

ASTRAGALVS.



Italica Berbera, & Berbenaca dicitur. Huius (ut ex his duobus capitibus elici potest) duo habentur genera, quæ hoc tantum inter se differunt, quod alterum caulibus in altum attollatur, rara ex interuallis proferens folia. Alterum uerò resupinatis caulibus humi procumbat, & numerosioribus folijs constat. Nec sanè alia inter hæc tum foliorum, tum florum deprehenditur differentia. Hinc fit, ut in suo insigni de stirpium historia commentario Fuchsum uirum alioqui eruditissimum, aperte errasse existimem: quippe qui discriminis causa Verbenacæ recte florem luteum tribuat. Quod tamen in Dioscoride mihi nunquam licuit inuenire: quemadmodum neq; in Plinio, qui utraq; Verbenacæ speciem libro xxv. capite ix. his uerbis descripsit. Nulla tamen Romanæ nobilitatis plus habet quàm hierobotanæ, aliqui peristereon, nostri uerbenacam uocant. Hæc est, quam legatos ferre ad hostes indicauimus. Hæc Iouis mensa uerritur, domus purgantur, lustranturq;. Genera eius duo sunt: foliosa, quam foeminam putant: mas arioribus folijs. Ramulis utriusq; plures, tenues, cubitales, angulosi. Folia minora, quàm quercus, angustioraq;, diuisuris maioribus: flos glaucus: radix longa, tenuis. Nascitur ubiq; in planis aquosis. Quidam non distinguunt, sed unum omnino genus faciunt, quoniam utraq; eosdem effectus habeat, Vtraq; sortuntur Galli, & præcunant responsa. Sed magis utiq; circa hanc insaniunt. Hæc perunctos impetrare quæ uelint existimant, febres abigere, amicitias conciliare, nulliq; non morbo mederi. Colligi circa canis ortum debere, ita ut ne luna, aut sol conspiciatur, fauis antè, & anelle terræ ad pignorum datis. Circumscriptam ferro effodi sinistra manu, & in sublimè tolli: siccare in umbra separatim, folia, caule, radicem. hæc Plinius. Ex quibus uerbis, ut arbitror, facile deprehendi potest error Fuchsij Brunfelsium fortè secuti, quod in suis de plant. historia commentarijs primò editis, pro Verbenacæ foemina eam plantam depinxerit, quæ à Dioscoride, ceterisq; antiquis scriptoribus Erigeron, siue Senecio nuncupatur, tametsi mutata sententia libro primo de compositione medicamentorum in ultima methòdo, rectam uerbenacam perperam, meo iudicio, alteram sinapi speciem esse contendat. Ceterum haud nescius Galenus nullum, uel paruum inter utraq; uerbenacæ discrimen esse, breuiter de earum uiribus sub una tantum specie descriuit libro viii. simplicium medic. sic inquit. Verbenacæ ideo peristereon appellata est, quod in ea peristeræ, hoc est, colubæ uersentur. Vim habet adeo desiccantem, ut uulnera conglutinet. Et libro secundo de compositione pharmacorum secundum locos, de antiquo capitis dolore scribens, sic inquit. Omnium porro longè maxime discutit, & perfectè corroborat uerbenacæ recta, maxime uiridis: imò & arida cum radicibus, & simul cum serpyllo, oleo incocta. Coniicienda etiam ad ea crocodiliadis maxime iuxta aquas nascentis radix. Quin & ipsam per se uerbenacam, si oleo incoxeris, caputq; inde rigaueris, omni capitis dolori. antiquo ex frigidityte, aut ex crassis humoribus oborto medeberis.

Verbenacæ uir  
res ex Gal.

## Ἀστράγαλος. ASTRAGALVS. CAP. LVII.

ASTRAGALVS paruus est à terra frutex, folijs, & ramis ciceri similis: flore purpureo, paruò: radice rotunda, raphani modo grandi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, veluti cornua, inter se implicatas, gustu adstringentes. Nascitur in ventosis, opacis, & in niualibus. eo Memphis Arcadiæ scatet. Alnum sistit radix in uino pota: urinam mouet: uetustis vlceribus sicca efficaciter inspargitur: sanguinem suppressit. ægrè propter duritiam tunditur.

ASTRAGALVS

Astragali con-  
sideratio.

Astragali ui-  
res ex Gal.

**ASTRAGALVS** frequens nascitur in agro Tridentino, in uallis Ananie montibus, folio ciceris maiore, floribus purpureis: radice raphani emula, adnatis appendicibus firmis, nigris, præduris, inter se implicatis, & gustu adstringentibus. Astragalus aliter à Plinio, quam à Dioscoride describitur. Plinius siquidem libro **xxvi** capite **viii**. Astragalum his notis representauit. Astragalus, inquit, folia habet longa, incisuris multis, obliqua, & tres radices: caules tres, aut quatuor: florem hyacinthi: radices uillosas, implicatas, rubras, præduras. Nascitur petrosus, apricus, & iisdem niualibus, sicut Pheneo Arcadiæ. Meminit Astragali Galenus libro **vi**. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. Astragalus frutex est exiguus, radices habens adstrictorias: quomodo etiam in numero est non instrenue exiccantium. Nam ulcera uetera cicatrice obducit, & aluum fluxu tuncatum sistit, si quis in uino decoctam radicem bibat. Plurimus huius fruticis prouentus est in Pheneo Arcadiæ.

Υάκινθος. **HYACINTHVS.**

CAP. LVIII.

Hyacinthi co-  
sideratio.

Hyacinthi ui-  
res ex Gal.



**HYACINTHVS** folia habet bulbi: dodrantalem caulem, læuem, minimo digito tenuiorem, herbacei coloris: comam procumbentem, florum purpureorum plenam, incuruam: radicem quoque bulbaceam. Quæ ut creditur, pueris cum uino albo illita, pubertatē coëctet, & non patitur erumpere: sistit aluum pota, & uenam impellit: phalangiorum moribus auxiliatur. Semen adstringentiū est, theriacis expetitur: regium morbum emendat, cum uino potum.

**HYACINTHVS** in uniuersum in campestribus inter segetes, & in syluis prouenit: folijs, & radicibus bulbaceis: caule dodrantali, uiridi, tenui, læuiq: floret cum uiolis circa finem Martij, & Aprilis initium: florentem emittit comam, ab ipso caulis medio usq: ad summum purpureis circumdatam floribus, qui maturescētes ad terram incuruantur, perdurantq: diu ante aquam contabescant. Hetruscis nostris Hyacinthi uulgō uocantur Cipolle caninæ. Flores primo statim exortu nostrates pueri colligunt ob purpurei coloris præstantiam. Ceterum scire conuenit, quod Hyacinthus hic non est ille, quem ex Aiæis sanguine editum poëta fabulantur, in cuius flore ipsius Aiæis nomen primis literis expressum legitur. Siquidem is (ut poëta canunt) florem profert rubentem, lilio adsimilem. Hyacinthi uires memoria prodidit Galenus lib. **viii**. simp. medic. sic inquit. Hyacinthi radix bulbosa est, ordinis primi in desiccando: secundi uero completi, aut certe tertij incipientis in refrigerando. Itaq: pueros diuissimè seruare impuberes illita cum uino creditur. Semen leuiter extergit, & atstringit: quomodo & ipse regio morbo laborantibus exhibetur in uino: ordine quidem tertio quadrantenus desiccans, ceterum in medio consistens caliditatis, ac frigiditatis.

Μήκων ῥοιός. **PAPAVER ERRATICVM.**

CAP. LIX.


Σαρματισμὸν ὀδὸν Σαρματισμὸν ὀδὸν

**PAPAVER erraticum**, quod rhœada uocant, vere quidem in aruis cum hordeo nascitur: flore protinus deciduo, unde & nomen apud Græcos accepit. Folia erucæ, aut origano, aut cichorio, aut thymo similia spectantur, sed longiora, diuisa, scabra: iuncea ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flos syluestris anemones, puniceus, interdum albus: oblongum caput, sed quàm anemones minus: semen rufum: radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinque, aut sex in vini cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis, quibus somnus accersendus est. Semina acetabuli mensura ex aqua mulsâ pota, aluum leniter emolliunt: ad idem præstandum mellitis placentulis, & dulcarijs libis admiscuntur. Folia cum calycibus illita, inflammationes sanant: eorundem fotu, & perfusione somnus allicitur.

Μήκων ῥοιός. **PAPAVER SATIVM.**

CAP. LX.

**ESATIVM** papaueris genere, quod hortense est, semen in panem densatur, qui fanis in usu sit: eo etiam ex melle pro sefama utuntur: thylacitin uocant. Capitulum habet longum, & semen candidum. Syluestre uero caput habet insidens, demissumq: & nigrum semen: quod pithitis nominatur.



nominatur: nonnullis tamen & ipsum rhœas dicitur, quoniam eius scapo lacteus succus emanat. Tertium magis sylvestre, & ad medicinas valentius, multò his longius, productiore capitulo.

Omnium in commune natura refrigeratrix. quare si capita ipsa, & folia decoquantur in aqua, somnum fotu conciliabunt. Bibitur decoctum contra vigilias. Calyces cum polenta triti, & cataplasmatibus admisti, ignibus sacris, & inflammationibus profunt. Tunduntur quoque virides, & digeruntur in pastillos; qui siccati ad usum reconduntur. Capita quoque per se in aqua coquantur ad dimidias, iterumque adiecto melle, dum humor coëat in eclegmatis lentorem. Id medicamentum in tussi, arteriæ fluxionibus, & celiacorum affectu, doloris leuamentum præbet. efficacius tamen redditur, addito hypocistidis succo, & acacia. Papaueris nigri semen tritum cum vino bibitur, contra citam aluum, & sceminarum profluvia. in peruigilijs fronti, temporibusque illinitur ex aqua. Opium eius magis refrigerat, inspissat, siccatque. Sumptum erui magnitudine, dolore finit, concoquit, & somnum allicit: tussi, atque celiacorum valetudini auxiliatur: verum si copiosius hauriatur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad dolores capitis cum rosaceo perfusum, efficax est: aurium dolori cum amygdalino, myrrha, & croco instillatur: inflammationibus oculorum cum torrefacto oui luteo proficit: igni sacro, & vulneribus cum aceto: podagris, cum lacte mulieris, & croco. somnum accersit subditum sedi pro balano. Optimū habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferum, quod facillè aqua diluitur, læue, candidum, neque asperum, neque grumosum, quod inter colandum non vt cera coëat, & in sole diffundatur: dein admotum lucernis, non atra luceat flamma: extinctum denique odoris uim conseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut sylvestris lactuæ succo adulterant. Verum glaucio fucatum, in dilutione croci colorem reddit: lactuceo succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur: gummi uitiatum splendescit, & infirmum est. Nec desunt, qui eò dementiæ deueniunt, vt adipem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad oculorum medicamenta, dum mollius, atque rufius appareat. Diagoras, vt Erasistratus auctor est, usum eius damnauit, oculorum lipitudinibus, & aurium vitij infundi uetans, quoniam uisus aciem hebetaret, & soporem gigneret. Addidit Andreas, illitos eo protinus excæcari, si non adulteraretur. Mnesidemus usum duntaxat olfactandi probauit, quoniam ad conciliandum somnum conueniret: alioqui nobis ut noxio interdicit. Quæ commentitia esse experimento deprehenduntur: siquidem effectus, uirum huiusce medicamenti fidem faciunt. Quare non alienum fuerit scriptis mandare, quoniam

rr modo is

Opium. | v. succus ex papauere.  
Bast non magdalenum

modo is excipiat succus. Aliqui capita ipsa, & folia tundunt, & prælo exprimunt, terentesque in mortario digerunt in pastillos: id meconium uocatur, multum opio ignauius. Porro opij faciendi ratio hæc est. Cum ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem incidere oportet, lacrymam exeuntem digito in concham abstergere: nec multò post redire, ut concreta inueniatur: etenim quæ tum, aut postero die etiam offenditur, in uetere pila teri debet, & in pastillos cogi. cum tamen inciditur, retrocedendum est, ne uestibus succus deradatur.

Papaueris erratici confideratio.

Papaueris satiuu confideratio.

Papaueris succi, siue Opij facultas.


Papaueru uires ex Gal.

**SPECTANTVR** Maio mense Papauera erratica rubentibus floribus nitentia, in aliquibus campestribus locis adeo numerosa, ut deceptis oculis, campi uideantur coccineis uelaminibus uestiti. Horum flores non desunt, qui affirmant lateris dolori, qui Græcis πλευρίτις dicitur, mirificè mederi: in quem usum eos siccatos in puluerem redigunt, & in potu exhibent. Ab hoc experimento nonnulli medicorum edocti, ex ipsorum florum recentium succo ter, aut quater iterato diluto, serapium faciunt: quo postmodum magno, ac prospero successu in pleuriticis uidentur. Tridentina rura Papaueris erratici folia prima statim germinatione olerum modo decoquant, sumuntque in cibum cæseo, & butyro admixtis. Nec mirum sanè, cum etiam Theophrasti etate (ut ipse scriptum reliquit lib. ix. cap. xiii. de plantarum historia) eadem sumerentur in cibis. Loco enim citato ita de eo scribit Theophrastus. Papauer erraticum uocatum non absimile intubo erratico constat: quare in usum uenit cibarium. Nascitur in aruis potissimum inter hordea. Florem rufum producit: caput pollicaris unguis magnitudine. Legitur ante hordei messem, atque uiridius etiam. purgat inferius. hæc Theophrastus. Sed iam de Papauere satiuo, siue domestico nobis differendum est. Videtur Dioscorides cum satiuo duo syluestris Papaueris genera tradidisse, et hoc nomine hæc ab illo distinxisse. Quæ in re animaduertendum est, ne aliquis fortasse decipiatur, quod omnes hæc papauerum species ab agricolis seruntur. Verum illud duntaxat, mea quidem sententia, hortense appellauit Dioscorides, quod albo constat semine, quoniam hoc frequentius in uiridarijs, & hortis prope ædes seritur. Cætera uero syluestria nominauit, non quod sponte, & perse nascantur (seruntur enim omnia) sed quod asperiora, hirsutioraque proueniant tum caule, tum capitibus, tum etiam folijs: quod præterea nigrum, asperumque proferant semen: quod denique serantur in campestribus segetum, & leguminum modo. Rem autem se ita habere testari uidetur Plinius libro xix. capite viii. cum sic inquit. Papaueris satiuu tria genera. Candidum, cuius semen tostum in secunda mensa cum melle apud antiquos edebatur. Hoc & paucissimi rustici cruste insperguntur adfuso ouo inherens, ubi inferiorem crustam apio, githy, cereali sapore conduunt. Alterum genus Papaueris nigrum, cuius scapo inciso lacteus succus exprimitur. Tertium genus rhoëam uocat Græci, id nostri erraticum dicunt. Sponte quidè, sed in aruis cum hordeo maxime nascitur. hæc Plinius. Papauere candido passim abundat Hetruria. Vtrisque uero nigris scatet uniuersa Insulæ tellus: sed præcipue apud gentes, quæ Tridentinas incolunt ualles, ubi Papauera hæc copiose seruntur in campis, & inter legumina, præsertim inter fabas. Ibi se quidem eius semine uescuntur homines, immixto placentalis, quas ex pasta foliosa multiplici inuolucro faciunt. Comedunt illi quidem hæc placenta ad saturitatem usque: nec ob id tamen unquam (quod mirum alicui fortasse uidebitur) diuturniore somno capiuntur, neque ueternosi fiunt. Quin nec illi etiam, qui Stiriam, superioremque Austriam incolunt, in ueternum incurrunt: etsi oleum è nigri papaueris semine expressum in cibis continue assument, oliuæ olei uice. Ea demum experientia fecit, ut intrepide quandoque ausus sim Papaueris seminis cremorem hordei decocto expressum in ardentissimis febribus ad sitim extinguendam, somnumque conciliandum etià largius exhibere. Hinc præterea factum est, ut eum metum excusserim, & deposuerim, quem mihi olim præceptorum meorum graues admonitiones incusserant, & ingesserant. Ceterum ex incisis Papauerum capitibus opus, siue succus manat, qui in Opium uocatum addensatur, ut scite docuit Dioscorides. Et quantum Opium quarto excessu frigidum statuatur; tamen si ex sapore, & effectum rerum temperamenta, & qualitates cognoscuntur, opium nostri usus (quantum equidem deprehendere potui) non modò gustu amarum percipitur; sed etiam acre, adeo ut paululum in ore detentum linguam, & palatum exulceret. Vnde haud dubie colligi posse putauerim, calidissimas illi inesse qualitates. Cuius rei fidem argere potest, quæ ex eo prodit odoris grauitas. Veruntamen ne impudentis, atque arrogantis nomen subeam, quod in hoc omnium fratre medicorum sententiam destruere uelim, eorum iudicio rem hanc æstimandam relinquam, qui ante nos opij tum qualitates, tum facultates diligentissime expendunt. Sed fortè ea acris, amaræque facultas in opium facile uadit ex glaucij adulteratione, quod illi sepius admiscunt, ut Dioscorides adnotauit. Illudque argumento esse potest, quod aqua colligatum croceum colorem reddat. Adde quod opium, quod hodie ad nos conuehitur, non est illud uerum & legitimum è lacryma, quæ ex inciso papaueris capite exierit, concretum, sed potius hoc è foliorum, & capitum contritorum succo confectum est: idque meconium uocatum erit, opio longè deterius. Papauerum uires memorie prodidit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Papauer alterum Rhoëam nuncupatur, quod scilicet celeriter flos eius defluat. Alterum domesticum, quandoquidem colitur. Quin & altere duæ sunt præter his species syluestris papaueris: alterum uelut incidentem calycem sustinens: alterum longiorem quam illud calycem obtinens, totum autem procerius, ac squalidius. Ab hoc succus defluit, atque hinc est, quod hanc speciem quidam Rhoëa nominent. Porro omnium facultas refrigeratoria est. Ceterum satiuu semen, quod & thylacite cognominant, medicriter somnum conciliat, uisu candidum: proinde panem ipsum inspergunt, ac melle maceratum edunt. At cum, quod primo loco recensimus, cuius florem celeriter decidere posuimus, ualidius semen refrigerat ita ut nequaquam eo quæ innoxie solo uti possit, sicut satiuo siue domestico melli admiscens. Admodum uero, si ita sumptum sit, somnum conciliat. Ceterum pusillum eius inspergunt ijs, qui ex melle conficiuntur bellarijs, atque placentis, panibusque. Porro in loco



in loco dicti semen atrum etiam medicamentosum est, admodum refrigerans. At quod quarto loco positum est, omnemque medicamentum, tum in semine, tum in calyculis, tum in folijs, tum in succo. Valide enim refrigerat, ad stuporem usque, et mortem perducens. quare medici quod probe eo utantur medicamenti miscetes, frigiditatis uehementiam reuolunt. Est enim ex quarto, et ultimo refrigerantium ordine. Porro quo pacto maxime ex methodo missionem facere oporteat, non est presentis tractationis proprium. Et lib. 11. de comp. medic. secundum locos, de dolore capitis agens circa manifestas causas oborto, ita de opio differit. Raro, inquit, cogimur pharmacis ex opio uti, cum uidebimus pro doloris uehementia homo de uita periclitatur. Quanquam et tunc solidæ partes ex eius usu offenduntur, adeo ut post hæc correctione opus habeant. Sic et ex opio collyria multis detrimento fuerunt, adeo ut debilem oculum redderent, et uisus hebetudinem, amblyopiam Græcis appellatam, induxerint: uelut etiam auditus grauitatem inducunt. Quædamque ad uehemētem aurium dolorem ex papaueris succo sunt composita. Idem Galenus lib. 111. eiusdem tractatus, de aurium inflammationibus agens, sic inquit. Pharmaca ex papaueris succo omnia sensum stupefaciunt: et ob id sanè necessario cogimur ipsis uti ubi nullum aliud mitigatiuum opem tulit. hæc Galenus. Ex quibus sanè omnibus admodum esse debent medici, ne temerè, aut inconsultè ad usum opij se conferant. Sed ratio, qua id corrigendum, administrandumque sit, ex ipso Galeno colligi potest, libro. V. 111. de comp. pharmacorum secundum locos, ubi ita scriptum reliquit. Calefacientia miscetur, quæ refrigerantium stupefactionem deducere possunt, cum illa ipsa per se tardi transitus existant. Hæc igitur ubi quis inaudiuerit, quantitatem consideret simplicium pharmacorum, quæ in compositionibus miscentur. Ex hac enim sciet num magis, an minus efficere possit compositum pharmacum, ea quæ promittunt. Sinque refrigerantia plura apparuerint, sensum affectorum magis obtundit, et quantum caloris in ipsa particula fuerit, etiam hunc extinguit. Vbi uero calefacientia fuerint aucta, minus quidem hæc efficit ipsum pharmacum, nocentius autem reddetur. Nosse enim oportet, corpora uiuentium mortificationi simile quippiam perpeti ab omnium ex opio, hyoscyamo, et mandragora compositorum pharmacorum usu: nimirum causis dolorem infligentibus insensibilibus factis, et multi sanè qui assidue talia accipiunt, ad immedicabilem frigiditatem particulas perducunt.

ΠΑΠΑΒΕΡ ΚΟΡΝΙΚΥΛΑΤΟΝ. PAPAVER CORNICVLATVM. CAP. LXI.



PAPAVER ceratites, id est, corniculatum, folia habet candida, hirsuta, verbasco similia, in ambitu syluestris papaueris more ferrata: caule non dissimili: flore pallido: calyculo fœni græci, in corniculorum modum inflexo, unde nomen mutuatur: semine papaueris, pusillo, nigroque: radice per summa cespitem, nigra, crassa. nascitur in maritimis, & asperis. Radici ea vis inest, ut in aqua decocta ad dimidias coarctandicum, & iecinoris affectus potu sanet. prodest his, qui crassa quædam, & araneosa cum lotio reddunt. Alium leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulsa posito. Crustas emarginant, illita ex oleo folia floresque: Margema ac nubeculas iumentorum, perunctas abstergunt. Sunt qui glaucium hoc papaueris genere facitari existimarunt, falsi quadam foliorum cognatione.

ΠΑΠΑΒΕΡ ΣΠΥΜΕΥΜ. PAPAVER SPVMEVM. CAP. LXII.

ALIUD Papaueris genus aphrodes, id est, spumeum vocatur, ab alijs heracleum, caule dodrantali: folijs admodum paruis, radiculæ similibus: fructu interea candido. nam herbula alba est, & spumæ tota: radice in summo cespite. Legitur æstate semen, cum integrè adoleuit, deciditque exiccatum. Darum acetabuli mensura in aqua mulsa, vomitione expurgat. priuatim huiusmodi purgatio, comitialibus prodest.

PAPAVER corniculatum in maritimis nostris Senensibus Crassetano, et Orbetellano agro, et circa Heraclei portum Argentario promontorio, itemque in Adriatici maris litore non longè à Timæo fonte, et Tergesto saxoso litoris tractu, ubi sæpius ipsum legimus, frequentissimum prouenit: quanquam etiam in alijs Italie locis nascitur, sed quod potissimum in hortis, et uiridarijs ad publicum omnium commodum, et spectaculum fuerit satum. Huius meminit Theophrastus libro IX. capite XIIII. de plantarum historia, sic inquit. Papaueris quoque syluestris genera plura notantur: quoddam enim corniculare appellatum: quoddam autem nigrum est, folio constans uerbasci

Papaueris corniculati consider.

Papauer spumeum.

Plinij lapsus.

Papaueris corniculati uires ex Gal.

nigri, sed minus nigro: cauli altitudo cubitalis: radix brevis, per summaq; cespitum: fructus inflexi, ut corniculati, gurantur. Legitur circa messes. Aluum purgare potest: folium albuginem oculis aufert. nascitur iuxta mare, scilicet locis. hæc ille. Credidere nonnulli Glaucium, quod Mauritanis memithe uocatur, fieri è corniculati Papaueris succo. Verum ij (ut Dioscorides est author) procul dubio decipiuntur. Ceterum Papauer spumeum, quod aliqui heracleum uocant, nondum mihi compertum est, neq; etiam hactenus aliquem reperi, qui illud legitimum ostenderet. Quo fit, ut ipsum quoq; inter tot alias nobis incognitas plantas relinquere malim, quam aliquod incertum proferre, ut quidam faciunt. Veruntamen non mihi uidetur silentio prætereundus fatalis serè Plinij lapsus, in Papaueris spumei mentione lib. xx. cap. xix. Quippe qui huius papaueris folia speciem passerum auium representare tradidit, deceptus nimirum duplici eiusdem nominis Græci significatione. Σποδίου enim Græcis non modo passerem auiculum significat; sed et plantam eam, quam Latini radiculam, siue lanariam herbam appellant: cui quidem Dioscorides, non autem auiculis, quas passeret Latini dicunt, Papaueris spumei folia similia reddidit. Quemadmodum et Theophrastus, qui de eo loco citato ita scriptum reliquit. Papauer heracleion nuncupatum folio constat struthij, hoc est radicula, qua linteis candorem conciliant: radice candida, in summa terra eunte: fructu albo. Huius radix purgare superius nata est. Non desunt, qui contra comitiales ea utuntur in uino mulso. hæc Theophrastus. Papaueris corniculati meminit Galenus libro v. simplicium medicamentorum, de eius uiribus in hunc modum differens. Papauer corniculatum nominatum quidem est à semine leuem inuersionem habente, ueluti et saxum græcum, ut bovis cornu uideatur esse simile. Vocatur porro à quibusdam paraliū, quandoquidem ut plurimum iuxta mare nascitur. Vim habet incidendi, et abstergendi. Itaq; radix herbæ in aqua decocta ad dimidium, hepaticos affectus adiuuat. Porro folia, et flores sordida admodum, et maligna ulcera iuuant. Sed ab his abstinere oportet, ulceribus iam expurgatis: adeo enim abstergere ualent, ut et puræ quoq; carnis nonnihil eliquent. Hoc uirum robore non sordent: duntaxat, sed et crustam ulceribus detrahunt. Papauer uero Herculeum, quod et aphrodes, hoc est, spumum uocatur, eo quod totum sit candidum, et spumosum, exile est. Semen habet pituitam expurgans.

ΥΠΕΚΟΟΝ. HYPECOON. CAP. LXIII.

HYPECOON, aliqui hypopheon uocant. nascitur in fegetibus, aruisque, folijs ruta, exilibus ramis. Natura eadem, quæ papaueris succo.

Hypecoi consideratio.



HYPECOON ijs facile sese offeret, qui inter segetes et legumina ipsum perquirere non grauabuntur. Hoc pro syluestri ruta olim Petrus Spexzalancia Clesij uallis Ananie oppiduli pharmacopola compater meus, mihi ostendere solebat. Quandoquidem id prouenit in aruis, folijs rute paulo maioribus, caulibus exiguis, mollibus, leuibusq; floribus luteis, tenuibus: capitulis tenui inuolucro contextis, atro intus semine. Meminit breuius Galenus libro viii. simplicium medicamentorum, his paucis uerbis: Hypecoon, inquit, refrigerandi uim habet, ex terio serè refrigerantium ordine, adeo ut parum absit à papauere.

ΥΟΣΚΥΑΜΟΣ. HYOSCYAMVS, SIVE APOLLINARIS. CAP. LXIIII.

HYOSCYAMVS frutex est. caules emittens crassos: folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta: flores è latere caulis, ordine prodeunt, tanquam puniceorum cytini, scutulis septi seminum plenis, ut papaueris. Tres eius differentie. Vna semine nigro, floribus penè purpureis, similacis folijs, cytinis præduris et spinosis. Alterius semen subflauum ut irionis, flores lutei, folia & filiquæ simpliciores. ambo infaniam gignunt, & soporem: ideo in communi usu damnantur. Tertium genus, ut quod mitissimum esset, medici receperunt: pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminisque, in maritimis rudibusque nascens. cuius occasio si non adsit, rusum usurpari oportet. niger, ut deterrimus, improbat. Recentissime, caulis, folijsque tuis succus in sole exprimitur, & exiccato humore, usus ad annum usque prorogatur: nam facile corruptionem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine separatim in aqua calida tuso, & expresso. Liquamentum autem succo lacteo præstantius est, & magis dolores finit. Contusa herba recens, addita trimestri farina, digeritur in pastillos, & reconditur. Liquamentum

## HYOSCYAMVS.



PSYLLIVM.



mentum primum, & quod à sicco semine exemptum est, collyrijs, quæ doloris sensum auferunt, commodissime inferi solent. contra acutas, calidasque fluxiones, dolores aurium, atque vulnæ mala prosunt: cum farina autem, aut polenta, oculorum pedum, cæterarumque partium inflammationes placant. Semen eadem præbet: tussi, destillationibus, oculorum fluxioni, & doloribus efficax: contra mensium abundantiam, & erumpentem aliunde sanguinem; oboli pondere cum papaueris semine, & aqua mulsa bibitur: podagris subuenit: testibus inflatis, mammisque tumentibus à partu, tritum ex uino illinitur. Alijs quoque cataplasmatibus, quæ doloris leuamētum præstant, admisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta utilissimè imponuntur. recentia ad mitigandos omne genus dolores oblinuntur: cum uino terna, quaternave pota sanant algidas febres, quas epialos uocant. Cocta oleum modo folia, si acetabuli mensura manduntur, mediocrem insaniam gignunt. idem efficere tradunt, si colo ulcus sentiente, infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

Et tria Dioscoridi Hyoscyami tradantur genera; id tamen solum mihi uidere licuit, quod aureum florem profert, & semen in usculis subflauum potius, quàm nigrum: nam reliqua; quanquam diligenter inquisuerim, qui mihi ostenderet, hæcenus reperi neminem. Hyoscyami meminit Scribonius Largus, iniquiens. Altercum, quod Græcis hyoscyamus uocatur, qui biberint, capitis grauitate, & uenarum distentione laborant, mentesq; abalienantur cum quadam uerborum altercatione: unde & nomen apud Latinos. Hoc idem equidem testari possum, quod uiderim in Ananiæ uallis montibus pueros, qui Hyoscyami semen comederant, adeo desipientes factos, ut parentes, & uicini eos crederent à cacodemonibus uexatos esse. Hinc est, quod eius regionis incolæ Hyoscyamum uulgari sermone appellant Di-sturbio, ut quod mentem maxime turbet. Aues, quæ huius herbe semen ederint, præcipue quæ in gallinaceo habentur genere, non multo post tempore pereunt, quemadmodum & pisces. Hyoscyamus uidetur Græcis dicta, quasi faba suilla: propterea quod (ut Helianus inquit) huius herbe pastu resoluuntur, & conuellantur apri. Sed remedium nouere, aquas enim statim adeunt, & caneros uenantur, atq; ita protinus saluti restituntur. Hyoscyami uires recensuit Galenus libro VIII. simplicium medicament. his uerbis. Hyoscyamus, cui semen atrum est, insaniam, ac soporem affert. Huic autem is, cui semen mediocriter flauum est, propinquam facultatem obtinet. Verum utriusque fugiendi sunt, ut inutiles, & ueneni seu deleterij. Cæterum cuius semen, ac flos candidus est, ad sanationes uel maxime idoneus est, ex tertio quodammodo ordine refrigerantium. Porro flos eius quidē, cui semen est nigrum, mediocriter purpureus est: eius uero, cui est subflauum, leuiter mali colorem refert.

Hyoscyami  
consideratio.Hyoscyami  
uires ex Gal.

## PSYLLIVM. CAP. LXV.

PSYLLION folijs est coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus. sarmentosa sceni modo in totum herbula, ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribusve conuolutis in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, pulicem simili, unde & nomen. in aruis, & incultis nascitur.

Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conueniens: articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, luxatis, illitum auxiliatur: imponitur in dolore capitis, cum rosaceo, aqua, aut aceto: enterocelis infantium, & prominenti umbilico, illitum ex aceto medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aquæ sextario madefactum, ubi concreuit aqua, illinitur: siquidem uehementer refrigerat, & in feruentem aquam deiectum calorem reprimat. contra ignes feros efficax est. Fama est, si uirens domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. Cum adipe tusum sordida ulcera, & quæ cacoëthe uocantur, expurgat. Succus uermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle prodest.

Psyllij confideratio.

Psyllij uires ex Mesue.

PSYLLIUM, quod & Pulicariam herbam nuncupant, ubiq; ferè prouenit, sed in maritimis frequentius. Sepias semen recondunt ad glutinosos liquores conficiendos, quibus in infrigidandis inflammationibus, probenter calidis defluxionibus, & ad extinguendam sitim, leuigandamq; linguam, & faucium scabritiem, in ardentissimis febribus utuntur medici: quinetiam ad aluum emolliendam. Psyllij uires retulit Mesues inter ea medicamenta, quæ deiectionia ui pollent, ubi hæc ad sensum saltem habet. Psyllium de his est, quæ temperamentum immutant, & quæ molliendo aluum citant. Huius seminis tria habentur genera, candicans, subflauum, & ad purpuram uergens. Prestantius perfectè maturum, ponderosum, & quod in aquam demissum statim inum petit. Contrarijs constat cum uiribus, tum substantijs: ea siquidem, quæ in medulla continentur, calida est, & sicca ordine quarto, admodum acris, incidens, exulcerans, septica, & deleteria facultatis. Quæ uerò in cortice residet, teste Ruso, infrigidat, humectatq; tertio excessu. Infunditur psyllij semen in aqua fontana frigida, agiturq; rudicula tandiu, quousq; aqua lentorem contrahat, percolaturq; deinde à seminibus, & admiscetur oleo, aut syrupo uiolaceo. hoc enim modo psyllium potu aluum mirificè emollit, & deijcit. Verum si frixum prius semen rosaceo admixtum eodem modo agatur, tunc sumptum dysentericis remedio est, & ceteris alui fluoribus, præsertimq; ijs, qui deiectionio medicamentis exasperante hausto superueniunt, sed præcipuè acris, quale est scammonium. Ceterum maxime animaduertendum est, ne Psyllij semen (id quod tamen detestantur recentiorum quidam) tusum in puluerem potandum exhibeatur. Quippe quod, attrita medullari substantia, uenter, & intestina exulcerat: iecur, & sanguinem inflamat, & cetera deniq; uiscera ledit. Integri seminis dilutum eo modo, quo diximus, paratum bilem deijcit: eaq; propter ardentissimis febribus, intolerabili siti, inflammationis ualde spiritibus, & faucium, & pectoris asperitatibus mirificè medetur. In aceto diu agitatum inflammatione, igni sacro, & herpete laborantibus auxiliatur, exterius illitum: prius prodest capite dolentibus fronti impositum, si tamen delor à causa calida fuerit excitatus. Hæc ex Mesue descriptum. Psyllij uires paucis perstrinxit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Psyllij semen admodum utile est, ex secundo refrigerantium ordine: in desiccando uerò, & humectando medium quodammodo est, & symmetrum.

Psyllij uires ex Galeno.



Στεφύχος κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν. SOLANVM HORTENSE. CAP. LXVI.

HORTENSE Solanum frutex est cibus idoneis, exilis, pusillus, multis concavus alis: folio nigro, maiore quàm ocimi, & latiore: fructu rotundo, uiridi, qui post maturitatem nigricat, aut fuluescit. herba innocentis gustus. Natura ei refrigerandi: quare folia vlcibus quæ serpunt, & ignibus sacris, conuenienter cum polline polentæ illinuntur: ægilopia, capitisque dolores, trita & imposita per se sanant: æstuanti stomacho auxiliantur: parotidas cum sale detrita illitu discutiunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum, atque vlcera quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo, & argenti spuma: ad ægilopas cum panis infantium aditioni, quam syriasin vocant, cum rosaceo perfusus proficit: in collyrijs, aquæ vel oui vicem exhibet, contra acutas fluxiones illitus: aurium dolori instillans prodest. mensium abundantiam sistit in vellere subditus. Succus fuluo gallinarum cortalium fimo subactus, & linteo appositus, ægilopijs præsentaneo est remedio.

Στεφύχος ἀλικακάβος. SOLANVM HALICACABVM. CAP. LXVII.

EST aliud Solanum, quod peculiari nomine halicacabon, aut physalida, id est vesicariam vocant, folijs antedicto similibus, verum latioribus: cuius caules, postea

is, posteaquàm adoleuerunt, prona terram spectant: folliculis orbiculatis, vesiculis similibus, in quibus semen continet fuluum, rotundum, læue, acinorum vuz figura: quo coronarij vtuntur, corollis intextentes. Vim, vsuq̃ue hortensis solani habet: verùm cibus nequaquam expetitur. Regium morbum purgat, semine potio, & vrinam pellit. Ex utraque herba succus extrahitur, qui sicatus in vmbra reconditur, ad eadem valens.

*Solanum*  
**SOLANVM HALICACABVM.**

**SOLANVM SOMNIFERVM.**



Στεφύλος νιχτιλός. **SOLANVM SOMNIFERVM.**

**CAP. LXVIII.**

*Staph. h. v. v. v.*

**SOLANVM** somniferum, aliqui etiam halicababon appellant, fruticat multis ramis, densis, caudicosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, cotoneæque mali similibus, plenis: flore grandi, rubro: fructu in folliculis crocato: radice grandi, subrubro cortice vestita: nascitur in faxis, non procul à mari. Radicis cortex, in vino drachmæ pondere potus, somnificam vim habet, opio mitiorem. Semen vehementer vrinam cit. Corymbi duodecim hydropicis dantur: si quid numero adjiciatur; alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. Succus pastillis inferitur, & medicamentis, quæ doloris leuamentum præbent. decoctus in vino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

Στεφύλος μανικός. **SOLANVM FVRIOSVM.**

**CAP. LXIX.**

*Staph. h. v. v. v.*

**SOLANVM** manicon aliqui persion, alij thryon appellauere. Huic folium erucæ simile, maius aliquantò, satis acantho, quem pæderota vocant, accedens: caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, vlnæ altitudine adulescentes: caput in cacumine oliuæ figura; sed vt platani pilulæ hirsutius, verùm maius, latiusque: florem nigrum: postquàm eo exiit, racemus exiit rotundus, niger, dens aut duodenis acinis constans, similibus hederæ corymbis, vt vuz molli- bus: radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali: gignitur in montibus, vento perflatis, & platanearis. Radix drachmæ vnus pondere pota ex vino, facit species vanas, imaginesque non in- iucundas obuersari: sed duplicatus hic modus, ad tres vsque dies mentis alienationem affert: qua- duplicatus interimit. Remedio est aqua mulsa copiosius pota, & vomitione reiecta.

**E QUATVOR**



Solani generū  
confider.

Solatrium

Fuchij error.

Solani histo-  
ria ex Theo-  
phraſto.

Veficariæ ge-  
nus aliud.

Stramonia.

Solanorū ui-  
res ex Gal.

E QUARTO Solani generibus, quæ hic à Dioscoride describuntur, etſi in commentarijs, quos antea li-  
lico ſermone conſcripſi, me duo tantum genera nouiſſe prodiderim, bortenſe ſcilicet, et quod aliqui Halicacabum,  
alii Veficariam uocant; hoc tamen anno tertium, quod Somniſerum appellant, Piſis ad nos nuſit ut rei medicæ et  
datione clariuſ Lucas Gbinius Forocorneliensis: idq; mihi planè omnibus notis legitimo reſpondere uidetur. Verum  
quartum Solani genus, quod Manicum cognominant, haſtenus me non uiſiſſe fateor. Ceterum errant, mea ſan-  
dem ſententia, qui eam plantam, quam herbariorum uulguſ Solatrium maiuſ nominat, Veneti uerò uulgo Herba  
bella donna, Solanum ſomniſicum Dioscoridis eſſe exiſtimant. Siquidem id fructum non proferit in ſolliculis croceis,  
tanetſi eius baccæ largiùſ ſumptæ interficiant, factò inexpugnabili ſomno, ut quandoq; accidit pueris, qui diſcrimi-  
nis ignari eas uice deuorant. Vnde quauis hæ plantæ uiribus conuenire poſſunt; facie tamen inter ſe maxime  
diſtant. Horum ſententiæ adſtipulatus eſt Fuchſius medicus alioqui peritiſſimus, in ſuo magno de ſtirpium hiſtoria  
commentario. Sed cum in hoc ſe manifeſtè erraſſe deprehendiſſet, in ſuo poſtea paruo plantarum libro, hanc ber-  
bam in Mandragoras repoſuit, eamq; Mandragoræ ſpeciem uoluit eſſe, quam Dioscorides Morion uocari tradit, le-  
pſus, ni fallor, de uno in alterum errorem. Mandragora ſiquidem nomine Morion, folia fert mandragoræ mari ſe-  
milis, dodrantali longitudine, terræ procumbentia, circa radicis ſiummum. Id quod manifeſtum præbet indicium, hæc  
perpetuò caule uiduam eſſe, quemadmodum cætera mandragoræ genera. nam pediculi, quibus mandragoræ fructus  
ſuſtinentur, caules dici non poſſunt. Hinc itaq; ſit, ut plantam hanc, quæ uulgo Bella donna uocatur, in nullo Ma-  
dragoræ genere legitime referendam putem: cum hæc folia emittat bortenſi Solano maiora, palmi menſuram  
quam excedentia, minimè candicantia, nec humi ſtrata, ſed in caulibus exeuntia, adnatis plurimis reſertis, bicor-  
libus, et ligni modo præduris. Quinimò crediderim ego, hanc eſſe Solani quintam ſpeciem, antiquis ſcriptorum  
incompertam. Nam, quantum equidem longa experientia comperi, uaria ac diuerſa Solani reperiuntur genera. 29

Somniſici, et manici Solani meminit Theophræſtus lib. ix. cap. xii. de plantarum hiſtoria, ſic inquit. Solano-  
rum genera duo. Alterum ſomniſicum, radice rubra, ſanguinis modo, ſed candida cum ſicceſcit: fructu cocco-  
briore: folio tithymalo ſimili, aut malo dulci, ſed piloſo, et parte ima magno. Huius corticem radicis timentes  
admodum, et in uino meraculo madefacientes dant, atque ita dormire faciunt. Naſcitur in rupibus, et ſacis,  
atq; ſepulchris. Alterum genus inſanire facit. id alij Bryoron uocant, alij periffon. Conſtat radice candida, et lon-  
ga ad cubitum, atq; caua. Dabitur eius radicis drachmæ pondus, ſi ut quis ludat, ſeq; pulcherrimum putet, placarit:  
at ſi magis inſaniat uis, drachmis duabus opus eſt: ſi autem nunquam inſania ſolui malueris, tres dabis: et quatuor,  
ſi interueniendum ſit. Habet folium crucæ proximum, maiuſ tamen: caulem longitudine fere quatuor cubitorum: ce-  
put geihyi, ſed maiuſ, atque piloſius: nec fructui platani abſimile conſtat. Eſt et aliud Veficariæ genus, quod  
hæc tempeſtate ſcenas, attegias, tuguria, et pergulas inumbrat: quinetiam ædium fenestras topiario opere conte-  
xit, et opacat. Conſtat hæc folijs oblongis, per ambitum laciniatis: floribus candidis, è quibus ueficulae prodeunt,  
in quibus ſemen includitur album, piſi ſimilitudine, in cuius medio ueluti humani cordis effigies uſitur, obſignata ni-  
gro colore. Nec ſine ratione id à natura factum conijci poteſt, quod forteſſe huiusce cordis nota nobis inſinuet, hanc  
ſtirpem ad cordis affectus maxime præſtare. quemadmodum et in Echio herba contra uiperarum morſus celebra-  
rima, ſemen uiperinis capitibus ſimile procreauit. Reſertur etiãnum inter Solani genera alia quedam planta  
STRAMONIA multis uocata, adeò Solano ſimilis, ut nil aliud, quàm ipſum repræſentet, uerum eius folia o-  
pium redolent. Flores, qui ſuauem lilij odorem ſpirant, gerit hæc albos, æmulos conuoluuli illius, qui compluribus  
rei herbariæ imperitis Liguſtrum falſo dicitur. Fructus ei circumquaq; ſpinofus, umbilicatusq; colore uiridi. Fo-  
lia ſolanum quadantenus reſerunt, maiora tamen. Quo factum eſt, ut quidam exiſtimauerint, hanc uiribus ſolano  
non diſtinctis præditan eſſe. Solani ſingulis generibus uires reddidit Galenus libro viii. ſimplicium medica-  
mentorum, ubi ita ſcriptum reliquit. Solanum eſculentum, quod in hortis naſcitur, notum eſt omnibus, uiribusq;  
ad omnia ea, quæ refrigerari, et adſtringi poſtulant: poteſt enim hæc duo ordine ſecundo. Ceterorum uerò non  
eſculentorum unum quidem nuncupatur Halicacabum, fructum habens ruſum, acino uice tum ſigura, tum magni-  
tudine adſimilem: quo etiam ad coronas utuntur. Alterum autem fruticoſum, ὑπνωτικόν, hoc eſt, ſomniſicum: et  
tertium eſt præter hæc, quod μανιόν, id eſt, furioſum appellant. Halicacabum igitur in foliorum facultate bor-  
tenſi ſolano ſimile eſt, fructum habens ciende urinae idoneum: proinde multis compoſitis facultatibus, quæ ad uer-  
adueſicam, et renes accommodantur, miſcetur. Solani uerò ſomniſici cortex radicis, ſi cum uino bibatur, ſomnum  
accerſit drachmæ pondere ſumptus. Sed et ad cætera quoq; papaueris ſucco perſimilis eſt: niſi quod eoſque ab-  
cilliſſe eſt, ut ipſe tertij habeatur ordinis refrigerantium, cum hic in quarto ſit conſtitutus. Huius ſolani ſemen ur-  
nam ciendi uiam habet. Verum ſi plus duodecim corymbis hauſeris, dementionem furiamuè adſciſcet. Porro quod re-  
quum eſt ex dictis Solanis, ad medicationes, quæ intro in corpus adhibentur, inutile eſt. Nam ſi quatuor eius drach-  
mæ ſumptæ fuerint, mortem inferent: ſi pauciores inſaniam. Vna certè innoxie ſumitur: ceterum nec ipſa utile  
quid obtinet. Verum ſi ſoris corpori emplaſtri modo illinatur, ulcera maligna, et depaſcentia curat. Sed ad talia  
radicis cortex optimus eſt, deſiccans ſecundo ordine iam completo, et tertio incipiente: refrigerans uerò ſecundo  
incipiente.

Δοξικὸν ἢ DORICIVM. ſiquis, quæ, alij CAP. LXX.

DORICION Crateus halicacabon, aut caleam vocat. frutex oleæ nuper prodeunt ſimilis.  
Naſcitur in petris non procul à mari, ramis cubito minoribus: folijs oleæ ſimilibus colore, mi-  
nufculis.

caulis, firmioribus, præter modum scabris: flore candido: filiquis in cacumine, ceu ciceris, densis, rotundis: quinis intus aut senis seminibus, exigui erui magnitudine, læuibus, firmis, versicoloribus. radix ad digiti crassitudinem, & cubiti longitudinem adolescit. Id somniferum esse constat. Copiosius haustu mortem adfert. Nec defuere qui dicerent, semen in amatoria expeti.



DORYCNIVM, Cratæ testimonio, inter saxa in maritimis nascitur, folijs cian forma, tum etiam colore cianæ proximis. Verum mihi hactenus non contigit ipsum inuenire, aut inuentum uidere: quanuis in eo quoq; inquirendo multum laboris insumpserim. Ceterum hallucinantur, meo quidem iudicio, qui putant Dorycnium esse eam Vesicariam, quæ semine est rotundo, albo, macula cordis effigie insignito: cuius historiam inter Solani genera præcedenti capite retulimus. Siquidem hæc Dorycnio omnibus ferè notis repugnare deprehenditur. Dorycnij meminit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, ubi de eius uiribus ita scribit. Dorycnium temperamento papaueri simile est, & mandragoræ, & ijs qui sic refrigerandi uim habent: excellit aquea frigiditate admodum efficaci. Quamobrem modicum quidem soporem conciliat: largius uero sumptum interimit.

Dorycnij cōsideratio.

Vires ex Galeno.

MANDRAGORA MAS. *Alraun*

MANDRAGORA FOEMINA.



Μανδραγόρας. MANDRAGORAS.

CAP. LXI.

MANDRAGORAM, aliqui antimelum, alij circzam vocant, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera. niger, quæ foemina existimatur, thridacias appellatus, angustioribus folijs, ac minoribus quàm lactucæ, virosis ac graueolentibus, in terra sparsis: mæla gerit forbis similia, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorum: radicibus inhæret bene magnis, binis, ternisve, inter se conuolutis, nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis: caulem non fert. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis morion vocitatur. huius folia magna, alba, lata, læuia vt betæ: mæla quàm alterius duplò maiora, colore in crocum inclinante, iucundè cum grauitate quadam olentia, quorum pomorum cibo aliquantùm opiliones soporantur: radix alterius similis, maior & candidior, orbata & hæc caule. Succus fit è cortice recentis radicis triso, & prælis subiecto: qui insolatus, vbi concreuerit, fictili reconditur. Mælis quoque succus depromitur, sed aliquantò ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad vsum suspenditur. Aliqui radices in vino ad tertias coquunt, & defæcatum ius seruant, cyathoque vno utuntur in

tur in perugilijs, & doloribus, & ante sectiones, vſionesque, ne ſentiantur. Succus duobus obolis ex mulſo potus, vt ueratrum, per vomitiones bilem atram, pituitamque extrahit: verum potu largiore vita adimitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ dolores finiunt, peſſis quoque mollientibus, admiscetur: ſemjoboli pondere inditus, per ſe menſes, & partus expellit: ſubditi ſedi pro balano, ſomnificus eſt. Radix ebur emollire fertur, quæ ſenis horis cum eo decocta fit: & ad accipiendam quam effingere optaueris formam ipſum facile præſtat. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectionibus, quas vlcera citarunt, cum polenta illinuntur: duritias omnes, ſuppuraciones, ſtrumas, & tubercula diſcutiunt: ſtigmata ſine exulceratione delent, ſi quinis, ſeniſve diebus ſenſim perfricentur. Folia ſeruantur in murijs eoſdem ad vſus. Trita radix ignibus ſacris ex aceto, & ſerpentium iſtibus ex melle, aut oleo medetur: ſtrumas, atque tubercula cum aqua diſſipat: articulorum cruciatus, cum polenta ſedat. Fit citra coctionem vinum è cortice radicis, ad hunc modum. Ternæ minæ in vini dulcis metretam conſciuntur. Dantur ex eo ternicyathi, ijs qui ſecari, aut amburi debent, vt antè dictum eſt: ſiquidem nullo tunc afficiuntur dolore, ſed veterno quodam preſſi torpeſcunt. Mâla ſoporem afferunt olfactu, & etiâ ſi mandantur: item expreſſus ex eis ſuccus. nimio tamen odore percuſſi, obmutſcunt. Semen mâlorum potum vuluas purgat: appoſitumque cum ſulphure ignem non experto, rubra ſæminarum profluuiâ ſiſtit. Scarificata, punctisque multifariam aperta radice erumpens lacryma, cauo vaſe recipitur. Liquamentum autem ſuccho lacteo præſtantius eſt. ſed non ubique, vt experientia docet, radices lacteum ſuccum delacrymant. Alium tradunt eſſe mandragoram, nomine Morion, in opacis iuxta ſpecus enatum: folijs albi mandragoræ, minoribus, albis, drantalibus, radicem ambientibus: quæ mollis eſt, & candida, paulo maior palmo, pollicemque craſſitudine æquat. Tradunt eam in pane, offa, obſoniôve drachmæ pondere deuorata, vſum rationis intercipere. obdormiſcit enim homo, eo ſerè quo comederit habitu, ſenſus impositis, ternis quaternisve, ex quo data eſt, horis. Hac medici vtuntur cum ſcindendi, vrendive neceſſitas adeſt. Antidotum eſſe volunt radicem, cum manico ſolano potam.

Mandragoræ  
utriuſq; cõſi-  
deratio.

Mandragoræ  
humana for-  
ma factitia.

Hermolai tu-  
tela.

MANDRAGORÆ utrunque genus frequens naſcitur in compluribus. Italiæ locis, præſertim in Apulæ Gargano monte, unde radicum cortices, & pomi herbarij quotannis ad nos conuehant. Habentur & in varijs ſpectaculi gratia. etenim Neapoli, Romæ, & Venetijs utranq; Mandragoram in hortis & vaſis fictilibus ſæpe adimimus. Sed proſpecto uanum ac fabuloſum eſt, quod Mandragoræ radices ſerant, quæ humanam effigiem repræſentent, ut ignarum uulguſ, & ſimplices mulierculæ certò credunt, & affirmant. Quibus etiâ perſuaſum eſt, eas effodidit haudquaquam poſſe, niſi cum magno uitæ periculo, cane qui effodiat, radicibus adalligato, & auribus pace obturatis, ne radicis clamorem audiant effodientes, quod audita uoçe periclitentur, pereantq; ſiſſores. Quippe radices illæ, quæ humanam formam reſerunt, quas impoſtores, ac nebulones quidam uenales circumferunt, inſecundas mulieres decepturi, factitiæ ſunt ex barundinum, bryoniæ, aliarumq; plantarum radicibus. Sculptum enim in his adhuc uiuentibus tam uirorum, quàm mulierum formas infixis hordei, & milij granis, iſs in locis, ubi pilos exariri uolunt: deinde facta ſcrobe tandiu tenui ſabulo obruunt, quousq; grana illa radices emittant: id quod fiet uiginti ad ſummum dierum ſpatio. Eruunt eas demum, & adnatas è granis radices acutiſſimo cultello ſcindunt, aptantq; ea ut capillos, barbam, & cæteros corporis pilos reſerant. Huius ſanè rei certam fidem facere poſſum, quod cum Romæ eſſem, impoſtorem quendam circumforaneum lue Gallica correptum nobis curare contigit, qui præter alias innumerat impoſturas, quibus circumuentis hominibus multam pecuniam extorquebat, docuit & artem, qua ſcimus ſibi comparabat Mandragoras: quarum complures mihi demonſtrauit, afferens unam tantum inter diuinitates uendidit quinque, & uiginti, nonnunquam etiâ triginta aureis. Quamobrem nos, qui omnium utilitati & ſaluti quantum poſſumus conſulimus; hæc ſilentio haudquaquam inuoluenda duximus, ut palam omnibus fiat, quibus fallacis & fraudibus maximo cum detrimento, & uitæ ſæpe diſcrimine homines ab his impoſtoribus, & nebulonibus decipiuntur. Qui ut antiquorum quoq; authoritate ſuas impoſturas adſtruant, prædicant Pythagoram uocaſſe Mandragoram Anthropomorphon, quod eam humanam formam reddere uoluerit. Verum ſciendum eſt, non ſine ratione Mandragoram ita à Pythagora ductam fuiſſe. quippe quod in uniuerſum omnes ſerè Mandragoræ radices à medio ad uicem bifurcate proueniant, adeo ut crura hominum modo habere uideantur. Quapropter ſi eo effodiuntur tempore, quo fructum gerunt, qui mâli inſtar ſuper folia ad terram procumbentia breui pediculo appenſus, parum à radice deſtat, hominis, cui brachia deſint, effigiem quadantenus repræſentant. Hanc quidem rem nulli, quod ſciam, uel pauci ſunt, qui rectè acceperint. Quin potius pleriq; huius ſententiæ ignari adducti ſunt, ut Pythagoræ, & Columelle ad maxime uitio uerterint, ut qui eos de Mandragora fabulatoſos eſſe crediderint. Cæterum tertium Mandragoræ genus, quod Dioſcorides Morion appellari tradit, in opacis iuxta ſpecus proueniens, qui mihi oſtenderet in Italiâ, hactenus reperi neminem. Braſauolus, itemq; Fuchſius Hermolaum immerito, meo quidem iudicio, damnant, quod uerum huc in ea ſententia fuiſſe uelint, ut putauerit mâla illa, quæ Inſubribus MELANZANE uulgo uocantur, noſtris uirò Hetruſcis Petranciani, eſſe huius tertie Mandragoræ fructus. Sed quod hæc non fuerit certa ac firma Hermolai ſententia, eius uerba abunde teſtari poterunt, quæ in ſuis corollarijs de Morio ita ſcripta inuenio. De Morio, inquit, mandragora nihil habeo quod addi poſſit ijs, quæ à Dioſcoride notantur. Sed quoniam mâla terreſtra & canina Mandragoræ fructus appellantur, in mentem ſubeunt, quæ uulgo Melanzana uocantur, hoc eſt, ut ipſe præ-

*malis insana*: de quibus nihil ueteribus scriptum fuisse iam desino mirari, quod multa huiusmodi reperio, sicut hercle *malis* quondam fructe, quæ modo uel ignorantur, uel certe non habentur. Mala ergo insana è frutice uulgarè sunt, p. n. nascente, ut melones, & cucurbitæ: pari quoque cultu, folijs propè ficulneis: flore oblongo, specioso, candido. Mandatur uulgò pomum ex oleo, sale, pipere, fungorum modo coctum. Hæc ad uerbum Hermolaus. Ex quibus equidè omnibus palam fieri arbitror, quod perperam tum Brasauolus, tum Fuchsius hac in re Barbarum infimum *læcerunt*. Sunt è nostratibus, qui Malis insanis uescantur ad uenerem excitandam. Quod fortè ideo præstant, quoniam status gignunt, concoctumq; contumacia existunt. Verum cum frequenter manduntur (ut testis est Auicenna) huiusmodi generant huiusmodi. Quinetiam pariunt uiscerum obstructions, carcinomata, elephantiasin, capitis dolores, trêmam, & iccinoris & lienis infarctus: unde postea diuturnæ proueniunt febres, & habitus malus. Hinc itaq; fit, ut Auerroem mirari subeat, quod libro v. collectaneorum, mala insana commendauerit suo quodam modo parata. Iam & aliud horum genus importari cœpit, pressum, orbiculatum malorum modo, melopeponum more sectum, colore præmian uiridi, deinde ubi maturitatem senferit, in quibusdam plantis aureum, in quibusdam uerò rubrum uisitur. Ideoq; uulgò appellantur POMI d'oro, hoc est, mala aurea. Eduntur & hæc quemadmodum illa. Mandragoræ uires descripsit Galenus libro VII. simp. medic. his uerbis. Mandragora uincentem habet facultatem refrigeratoriã, adeo ut tertij sit ordinis refrigerantium. Veruntamen & caliditatis cuiusdam particeps est, & in pomis humiditatis: proinde soporem conciliandi uim ea habent. Radicis cortex, cum sit ualentissimus, non tantum refrigerat; sed & desiccet. reliquum quod intus est, imbecillum existit.


Malorum insanorum uires.

Mala aurea.

Mandagoræ uires ex Galeno.

### ACONITVM PRIMVM.



*Wolff's*



### ΑΚΟΝΙΤΟΝ. ACONITVM. CAP. LXXII.

ACONITVM, aliqui pardalianches, alij cammiron, alij thelyphonon, alij myostonon, alij theriophonon uocant. Folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora, & subhirsuta: caulè palmo altum: radix scorpij caudam æmulatur, & alabastrum modo splendet. Torpescunt, ut fama est, scor-

### ACONITVM SECVNDVM. *Wolff's* ACONITVM TERTIVM.



piones

## ACONITVM QVARTVM.



Aconiti genera, &amp; consideratio.

Dioscoridis locus suspectus.

piones admota radice, stupentq; : qui rursus ellebori contactu, excitantur. Oculorum medicamentis leuandi doloris gratia adijcitur. Enecat pantheras, fures, lupos, & feras omnes, in carnibus obiectum.

Α'κόνιτον ἑτερον. ACONITVM ALTERVM.  
CAP. LX XIIII.

EST alterum Aconitum, quod aliqui cynostonon, alij lycoctonon appellant. Huius genera sunt tria: vnum, quo utuntur uenatores: alia duo in usum suum uertere medici. & quibus tertium, quod Ponticum nominatur, plurimum in Italia, montibus Iustinis exilit, à priore distans, quoniam folia faciat effigie platani, crebriore diuifura, longiora, & multò nigriora: caulem filicis pediculo similem, nudum, cubitali altitudine, aut ampliozem: semen in filiquis oblongis recodit: radices in modum squillæ marinæ cirrhorum nigrescunt. Quibus ad uenationem luporum utuntur: insertæ siquidem crudis carnibus, & deuoratæ lupos enecant.

DVO DIOSCORIDI produntur Aconiti genera, quanquam postremum triplici distinguit differentia. Primum, quod pardos enecat, Pardalianchen: alterum uero, quod canes, luposq; conficiat, Cynostonon, Lycoctononq; uocari ait. Hoc (ut diximus) in tria genera distribuit: ueruntamen postremum tantum describens, duorum priorum historiam, & uires silensio præterijt. Quo fit, ut Hermolai, & Marcelli sententiam probandam putem: qui non temerè quidem suspicatur, in altero e-

pire plura desiderari, quibus & priorum historia, & quonam pacto tum medici, tum uenatores ijs antiquitus uterentur, palàm fieret. Huius diminutæ lectionis illud non parum suspicionem auget, quod in tertio genere, quod Ponticum appellauit, nihil sit ab ipso Dioscoride prætermisum. ex quo quis fortè conijcere potest, in ceteris quoq; cum quacquam non prætermisisse. Tertium hoc genus passim in Italia omnibus ferè montibus nascitur, folijs quæ platani quædantenus emulantur, magis tamen per ambitum serratis, albis quibusdam maculis respersis: caule filicis, bicubitali: floribus subluteis, acutis galericulis facie similibus: è quibus filiquæ prodeunt, semen continentes: radice multiplici, ac nigra. Habetur & aliud genus iisdem ferè folijs, & caule, floribus tamen melinis, ranunculo non dissimilibus, longè tamen maioribus, adeò ut syluestres rosas hic æquet amplitudine. Hoc Tridentini montes scatent, ubi rura nò modò Lupariam, sed et Vulpariam ipsum passim nominant, utpote quod præter lupos, uulpes etiam interimat. Quæ & canes occidit, & feles, & mures, & omnia deniq; animalia, quæ suo exortu tanquam cæca producuntur. Primum genus thelyphonon appellatum, quo uenatores pantheras, & pardos interficiunt, sæpius legitur in Tridentinis montibus. Huius generis est & illud, quo utuntur quidam in Romano, et Neapolitano agro, lupis eo tantum eadem procurantes. Radices eius pluries uenales uidimus Romæ in Aurelio ponte iuxta molem Adriani: quandoquæ non desunt, qui eas expetant, ad mures, canes, & lupos enecandos. Primi generis Aconiti, quod thelyphonon uocant, meminit Theophrastus lib. ix. cap. xix. de plantarum historia, ubi ita scribit. Thelyphonon, quod alij scorpionem appellant, quia radicem scorpioni similem habet, admotum, scorpionem occidere tradunt: & eum reuulsere posse, si elleboro candido linatur. Enecat idem & oues, & boues, & iumenta, & ad summam omnes quadrupedes cotidie, si genitalibus folium, uel radícula imponatur. Proficit potum contra scorpionum ictum. Folium habet cyclameno simile: radicem, ut dictum est, scorpionis effigie. Nascitur graminis modo, & geniculis constat. loca autem est brosa. Quod si uera sint, quæ de scorpione narrantur, iam & reliqua eiusmodi haudquaquam incredibilia, & fabulosa dici debent. Hæc Theophrastus de thelyphono. qui alterius quoque Aconiti mentionem fecit cap. xvi. eiusdem uoluminis, sic inquit. Aconitum nascitur in Creta, atq; Zacyntho: sed plurimum, optimumq; in Heraclea Ponti. Constat id folio intubaceo, radice tum specie, tum colore nuci proxima. uim illam mortiferam in hac esse, folium, & fructum nihil nocere affirmant. Fructus herbe est, non humilis materie: herba ea breuis est, & nihil superuacui habens, sed frumento similis: semen non spicuum. Nascitur ubiq; & non in Aconis solion, à quibus habet appellationem: is autem uicus est Periandrinorum. Amat autem loca potissimum saxosa. Nascitur eo neq; pecus, neq; uilum animal. Preparari ad afficiendum modo quodam errant, nec nosse quenquam: quamobrem medicos, quoniam componere nesciant, pro putrefactorio uti. Hæc ille de secundo Aconiti genere. quod duorum alterum Dioscoridi esse potest, & illud fortasse, quod (ut ipse inquit) in usum suum uertere medici. Sed & de tertio Aconiti genere differasse Theophrastum equidem crediderim, cum eodem loco paulò post hæc uerba subdit. Aliud quoq; uenenum uim dur-



etiam cecidit sortiens compertum affirmant: esse namq; radicem quandam, quæ eodem die possit occidere: fœ-  
 licet habere ellebori, notantq; omnibus esse. hætenus Theophrastus. In quo nihil moueor, quod huic Aconito,  
 quod iterum suspicor, ueratri folia tribuerit. nam & Dioscorides nigro ueratro folia platani reddidit, quemadmo-  
 dum etiam tertio Aconitorum generi. Fuchsius in suis claris de stirpium historia commentarijs, primi generis A-  
 conitum eam plantam esse censet, quam herbariorum uulgus HERBAM Paris appellat. Sed is planè, mea senten-  
 tia, aberrat: siquidem hæc uno tantum constat caule, rotundo, duorum palmorum altitudine: è cuius medio quatuor  
 erumpunt folia, eodem ambitu, crucis instar patentia, sanguineæ uirgæ simillima: alia præterea quatuor eodem modo  
 prodeunt prope caulis summitatem, sed hæc minora sunt, & longiuscula: in quorum medio purpureus, uinosusq;  
 extat globulus, acino uirgæ similis, in quo semen concluditur album, minutum, copiosumq; halicacabi modo. Radix,  
 quæ ubi subest tenuis, in capillares fere particulas dissecta, pallescit, nulla scorpionis caudæ effigie, nec alabastrum modo  
 aliqua ex parte nitet, ut primum Aconiti genus à Dioscoride representatur: cuius folia (ut etiam Plinius lib. xxv. tit.  
 cap. iiii. est autor) præter id quod cyclamino, aut cucumeri similia sunt, nunquam, quod uiderim, in caulis medio  
 fœces habent originem, sed statim ab ipsa radice exeunt, hirsuta, biumq; recumbentia. Semen huic nullum, quod sciam,  
 à herbariis scriptoribus redditur. Sed ex herbæ Paridis acino semen colligitur, cui non modo nulla deleteria uis  
 est: sed etiam contra ueneficia præstantissimum est medicamentum. Noui enim ego quosdam, quorum aliqui mor-  
 borum diuturnitate, alij uerò ueneficijs semistulti facti erant, hoc tantum Paridis herbæ semine ad uigessimum usque  
 ætam in puluerem hausto drachmæ pondere, pristinae sanitati omnino restitutos esse. Porro idem Fuchsius in suis  
 peritæis nul aliud Aconitum esse putat Mauritanis, & præsertim Auicennæ, quam Napellus. Quia in re rursum,  
 meo quidem iudicio, salutar. quippe quod reperio Auicennam de utroq; Aconiti genere scriptitasse, & alterum ap-  
 pellasse strangulatorem adib, alterum uerò strangulatorem leopardi, quæ nomina eadem sunt, quæ apud Græcos Hy-  
 cadonon, & pardalianches: atq; eundem prius magna differentia speciatim de Napello egisse constat. Præterea NA-  
 PELLVS radicem Aconitis longè dissimilem proferit: sicuti & folia, quæ potius artemisiæ, quam cyclaminum,  
 & platani referunt. Flores idem edui purpureos, qui anteaquam dehiscant, mortui hominis caluariam repræsen-  
 tant, dehiscentes uerò pandunt sese urticæ mortuæ modo. Caules ei bicubitales, & aliquando maiores: semen par-  
 uum, nigrum, corniculis conclusum breuib. Quæ certè omnia & harum plantarum discrimen aperte ostendunt,  
 simul & Fuchsij sententiam refellunt. Hinc itaq; colligendum putauerim, Aconitum cuiusq; generis nullam habere  
 cum Napello cognationem. Napelli uis in necandis hominibus adeo inmanis, seuq; existit, ut nullis fere antidotis  
 occurrere possit, nisi quam primum, & statim succurratur, quod tamen Aconitum sumentibus non euenit. Napelli im-  
 manitatem uidimus nos Romæ anno à Christo nato 1524. mense nouembri in Capitolio Clementis vii. Pont. max.  
 anno primo. Nam cum decreuisset experiri olei cuiusdam præstantissimi uires, quod Gregorius Carauita Bononi-  
 ensis chirurgicus tunc præceptor meus contra deleteria medicamenta, & uenenosorum animalium quoruncunq; mor-  
 sus parauerat, iussit Pontifex uenenum dari duobus latronibus, quos leges damnauerat, quò suorum facinorum poenæ  
 luerent, laqueo uitam finire, ut in ijs olei huius experimentum fieret. Horum alterum, qui plurimum Napelli sumpse-  
 rat dulcioris panibus cõmixtum, pontificij medici statim oleo inungendum præbent, qui post tertium diem sæpius oleo  
 perunctus euasit incolumis: quanquā non sine magna formidabilium symptomatum accessione. Alterum uerò, cui longè  
 minus uenenati panis exhibuerant, oleo inungi uerant, ut assumpti ueneni effectum, seuitiamq; cernerent. Id quod illis  
 rei exitus facile comprobauit: quandoquidè paucis post horis obiit infelix, ijs omnibus incommotis, cruciatibus, et sym-  
 ptomatibus correptus, quæ ab epoto Napello prouenire scribit Auicenna. Cæterum idem quoq; Fuchsius loco su-  
 præcitato Leonicieni testimonio nitens in Auicennam acerrimè inuehitur: nec sanè eum, ut nostri recentiores, prin-  
 cipem, sed tyrannum, & homicidam nuncupat, eosq; pariter detestatur, qui eius sectantur doctrinam. quippe quod  
 Auicenna scripserit (ut ipse inquit) Napellum perniciosum esse uenenum: mox subdiderit, quod linitum, & bibe-  
 tum delet albas cutanei morbi genus. Quia in re non possum non admirari Fuchsium uirum altoqui ingenio & eru-  
 ditione clarum, quem etiam hoc nomine plurimum diligo, quod in tam celebrem & antiquum scriptorem paulò acrius  
 & inmodestius egerit. Hominum enim eruditorum partes esse semper existimaui, etsi eas usquequaque seruare non  
 potuerim, ut non uanis contentionibus, neque conutijs aliorum scripta refellant, sed rationibus, ijsq; probatissimis,  
 præsertim cum eos accusant, qui multis antè seculis è uita decesserunt, nec amplius à calumnijs se tueri possunt. Qui  
 præterea considerare debent, an in quo aliquem reprehendunt, in eo proprius sit authoris lapsus, an interpretis, aut  
 librarij, anteaquam ullum iurgijs potius, quam rationibus inuadant. Quippe relictis tam Mauritanorum, quam Græ-  
 corum scitis, quarum uni magis quam alteri addictus esse nolo, mihi quidem non uidetur existimandum, quod Au-  
 icenna uir sane singulari doctrina, & admirabili ingenio ab omnibus recentioribus nostris maxime commendatus, eor-  
 dem in loco sibi omnino contraria scripserit in ueneno tam sauo, cui exitiales formidandasq; uires tribuit. Cuius rei  
 firmissimum præbet indicium scriptura Auicennæ ab Andrea Bellunensi castigata, in qua nusquam legitur Napel-  
 lum bibitum albas delere, sed quod hoc efficit quædam eius confectio in potu sumpta. Verba enim Auicennæ secun-  
 dam castigationem Bellunensis ita sonant. Napellus delet albas linitum, sicut & confectio eius dicta alberzacali in  
 potu sumpta. Ex quibus uerbis plura mihi sese offerunt coniicienda, ut tuear Auicennam, aut quod confectio illa  
 tam exiguum Napelli partem excipiat, aut ea, quam recipit, adeo antidotis correctæ sit, ut non solum necem non in-  
 ferre possit, sed ne tantillum quidem obesse. Aut quod Napellus in illam additus, is fortè est, quem Auicenna appella-  
 bat Napellum Moysi, aliqui uerò Antoram. quandoquidem hæc planta antidotum sit admodum efficax contra Napel-  
 li uenenum, præsertim quod dicat Auicenna, inesse similiter huic plantæ uim ad albas, & lepras: aut in eadem con-  
 fectioe fortè asse mus ille interponitur, qui Napelli radicibus uictitat, à nobis pluries inuentus in Ananienfis monti-  
 bus,

Fuchsij error.  
Herba Paris.

Fuchsij error  
alius.

Napelli hi-  
storia, & ui-  
res.  
Hammfappm


Auicennæ de  
fensio.

Aconiti vires  
ex Galeno.

bus, quod etiam nunc iste Napellus Moysi ab Auicenna dicatur, quoniam iisdem contra Napelli venenum polles-  
bus, quibus et eiusdem nominis planta. Hec fortassis fufius, quam decebat, persecuti sumus. Sed tamen eo consilio  
id libenter fecimus, primum ut quantum per nos fieri posset, Auicenna à calumnia vindicaretur. Deinde ut magis  
dicerem quod de ijs omnibus sentio, qui optimos etiam quosque authores, præsertim Arabas, lacerant ac discerpunt,  
quorum plerisque magna est habenda gratia: tantum abest ut eos odio perpetuo prosequi debeant. Verum cur id fa-  
ciant, non uideo, nisi quod tutum sit in mortuos inuehi, quando hodie pauci sint, qui eos tueri uelint. Ceterum con-  
stimarunt Manardus Ferrariensis, et Leoniceus, quod Napellus, et Toxicum Græcis uocatum inter se differant.  
Sed quantum et isti uiri grauissimi aberrauerint, inferius libro sexto in toxici mentione latius ostendemus. Aco-  
nitorum vires tradidit Galenus libro v. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. Aconitum par-  
tialitè putrefaciendi facultatem obtinet, et lethale est. Itaque in cibo potuq; fugiendum: attamen ad putrefacien-  
dum externas corporis partes, aut circa sedem idoneum est. Herbe uero radix ad hæc utilis est. Quod autem Lyc-  
ctonon uocatur, similem alteri facultatem habet, sed peculiariter lupos, sicut illud pardos, interficere consuevit.

ΚΑΨΑΝ. CICUTA. *Cicuta*

CAP. LXXIIII



Cicutæ con-  
sideratio.

CICUTA caulem edit geniculatum, ut fœniculi,  
grandem: folia ferulæ, angustiora, graui odorem: ra-  
mi, mox umbellæ in summo. prodeunt: flores quoq;  
albicantes, & semen aniso candidius: radice non alta,  
concaua. Cicuta lethale venenum inest, suaque vi re-  
frigeratoria necat. Remedio est vini meraculi potus.  
Succus exprimitur confusis cacuminibus, priusquam  
femina, & comæ siccescant, qui sole densatur in pa-  
stillos. Multus ad medendi rationem. vsus est aridi:  
commodè miscetur collyrijs, quæ leuandi doloris gra-  
tia temperantur: ignes sacros, & vlcera quæ serpunt,  
illitu restinguit. Herba cum coma trita, & testibus  
circumlita, libidinum imaginationes in somno com-  
pescit, sed genitale resoluit: lac puerperarum mam-  
mis apposita extinguit: in uirginitate mammas coër-  
cet, & incrementum non patitur. pueris præstat, ut eo-  
rum testiculi cibum non sentientes intabescant. Effi-  
cacissima uis Creticæ, Megarensi, mox Atticæ, & in  
Chio, & Cilicia nascenti.


CICUTA uulgaris notitiæ est planta, utpote quæ ple-  
runque prope urbium, et oppidorum incœnia proveniat, feru-  
le adsimilis, odore tamen admodum graui: Maxima uis Cicutæ,  
ut Plinius refert, quæ nascitur in terra Parthorum, mox Le-  
conice, Creticæ, Asiaticæ: In Græcia uero Megaricæ, deinde  
Atticæ. Ceterum in Italia constat Cicutam non adeo extraneam  
esse. Eam in Hetruria si asini depascantur, profundissimo so-  
mno, et torpore capiuntur, ita ut non tantum stupidi, sed pla-  
nè mortui uideantur. Id quod aliquando rusticos huius reig-  
ros fœellit: nam dum asinis, quos mortuos credebant, pellem ad usum detraherent, accidit mirum, quod in medio fe-  
rè operis asini experrecti sunt, non sine magno excoriantium terrore, atq; ingenti spectantium risu. Cicutæ breuiter  
meminit Galenus libro v. simplicium medicamentorum, ubi tantam omnibus notum esse scribit, quod ea extreme  
refrigerantis sit facultatis. Et in libro quod animi mores corporis temperaturam sequantur, Cicutæ potum illam fieri  
amentiam tradidit, quam à Cicuta ipsa Græci conion appellant. Hoc nobis contigit uidere, ut latius libro sexto ex-  
plicabimus, in quibusdam, qui imprudenter Cicutæ radices pastinacæ uice decoctas comederant.

Cicutæ vires  
ex Galeno.


ΣΜΙΛΑΞ. TAXUS. *Taxus* CAP. LXXV.

SMILAX à Græcis, taxus à Latinis appellatur, arbor abietis magnitudine, & foliorum eius-  
dem figura. in Italia, & Narbonensi Gallia Hispaniæ contermina nascens. Auiculæ quæ italicæ  
taxi baccas deuorant, denigrantur: & qui ederint easdem homines, alui profluuiio corripiuntur.  
Narbonæ tam præsentis est ueneni, ut si qui dormiant sub ea, aut in eius umbra subsideant, ledan-  
tur, & sæpenumero moriantur. quare de taxo hæc traduntur, ut ab ea caueamus.

TAXUS.



APOCYNVM.



NASCITVR Taxus frequens in Anania uallis montibus, saxosis ac praeeruptis locis, inter abietes, & piceas, quibus folio, ac forma non longe dissimilis uisitur: quanquam haec illarum proceritatem non nisi rarissime aequet. Baccas fert rubentes, & grisei folio modo, dulces, uinosasque: quas quandoque mandentes tum pastores, tum qui in syluis arbores cadunt, statim in febres incidunt, & dysenterici fiunt, sanguine & spiritibus inde admodum inflammatis. Ligni materies, quod rufescat, quam plurimis intercurtantibus uenis, incorruptaque sit, lignariis fabris maxime expetitur, & plurimi sit, praesertim concinnandis mensis, & bastis, telisque consuecendis. Quamobrem Germani huius arboris asferes ad sua construenda hypocausta non exigua sibi comparant pecunia. Taxi meminit Theophrastus lib. III. cap. x. de plant. histor. sic inquit: Taxus quoque genere simplex, proceras, autem insignis, similisque abieti, nisi quod non pariter excelsa, magisque alis sinuata est: folio quoque abieti similis, sed pinguior, molliori, ligno. Quae in Arcadia nascitur, nigro ligno, aut puniceo constat: quae autem in Ida, flauo admodum, & cedro simili. propter quod uendentes fraudare dicuntur, tanquam cedrum uendunt. Totum enim cor esse, cortice detracto: corticem similem cedro habere tum scabritia, tum colore: radices breues, graciles, per summaque cespitum. rara haec circa Idam. At in Macedonia, Arcadiaque uel fructum abunde proferre, rotundum, faba paulo maiorem, colore rufum, tactu mollem. Aiunt, quod si iumenta folia comederint, emoriuntur: si ruminantia, nihil patiuntur. Fructus & ab aliis quibus hominibus manditur, suauis est, atque innoxius. haftenus Theophrastus. Cuius sententiae illud obstat uidetur, quod nostra Taxus fructum ferat non innoxium, ut ipse ait, sed noxium, ut supra diximus. Taxi Plinius quoque meminit lib. xvi. cap. x. ubi de ea ita scribit. Abieti, & piceae similis etiamnum aspectu est Taxus, minus uirens, gracilisque, & tristis, ac dira, nullo succo, ex omnibus sola baccifera. Mas noxio fructu: lethale quippe baccis, in Hispania praecipue, uenenum inest. Vasa etiam uiatoria ex ea uinis in Gallia factis mortifera fuisse compertum est. Hanc Sestius similem a Graecis uocari dixit: & esse in Arcadia tam praesentis ueneni, ut si qui dormiant sub ea, cibumque capiant, moriantur. Sunt qui & taxica hinc appellata dicant uenena, quae nunc toxica dicimus, quibus sagittae tinguntur: Respertum innoxiam fieri, si in ipsam arborem clauus aereus adigatur. haec Plinius. Foliorum fumo mures necantur. Taxi praeter ea nocumenta tradidit Dioscorides libro sexto, ubi de noxijs medicamentis pertractat. quo cum peruentum fuerit, de ijs diffusius nobis differendum erit. Taxi uires quam paucis reddidit Galenus libro VIII. simplicium medic. sic inquit. Smilax, aut Taxus arbor est ueneno faculatis.

Taxi confectio.

Taxi historia ex Theophr.

Ex Plinio.

Taxi uires ex Galeno.

APOCYNVM.

CAP. LXXVI.

APOCYNON, siue cynocrambe, brassica canina, frutex est longis uiticulis constans, male olentibus, lentis, uitiliumque modo obsequiosis, fractu fere inuictis: folio hederæ, molliore tamen, & per extremum acutiore, lenito, graui odore: id luteo succo turget. Siliquæ ceu fabarum, folliculari specie, digiti longitudine protenduntur: semine intus duro, paruo, nigro. Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes, & pantheras enecant, in cibo data, & protinus eorum coxendices resoluunt.

Apocyni con-  
sideratio.

**APOCYNON**, quod & *Brassicam caninam* appellant, etsi iandiu mihi quidem incognita fuerit, adeo ut inter alias incompertas stirpes in amplissimo naturæ utridario posteris reliquerim explorandam; hoc tamen anno è Pægis medicus eruditione, & in re herbaria clarus, *Lucas Gbinus Forocorneliensis* duas ad me misit plantas, quarum una per omnia *Dioscoridis Apocynon* representat. Scribit enim uir ille, duas à quodam nobili amico siliquas dono accepisse: è Syria allatas, quarum alteri inscriptum erat *Periploca repens*, alteri uerò *Periploca non repens*, fortasse quod ex Syri eas plantas nominent. Subdit præterea, has siliquas *rhododendri* siliquis admodum fuisse similes: inter quas tamè hæc erat differentia, quod repentis *Periploce* siliqua ea sanè longitudine constabat, quæ & *rhododendri*, gracillior tamen erat: alterius uerò breuior. E' longiori sata plantam prouenisse ait, quæ nō modò humi repit; sed & arbores quantūuis proceras scandit: è breuiori uerò aliam, quæ notis omnibus *Apocynon* refert. Vtræq; porro non maculæ lacte turget, ut scribit, quàm tithymali omne genus: uerum id repenti omnino album inesse: non repenti uerò subterit. Hinc itaq; fit, ut huic uiro planè subscribam, et alteram, cui omnes prorsus notæ adamussim adstipulari uideatur, *Apocynon* esse certò credam. Neq; hanc facillè mutabo sententiam, nisi aliam plantam proferri uidero, quæ clarioribus notis, quàm hæc, cuius picturam exhibemus, *Apocyni* faciem exprimat. *Apocyni* uires memorie prodidit *Galenus* libro vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. *Apocynum*, aut *Cynocrambe*. Vocant autem quidam eam *Cynomorion*, quandoquidem canes celerrimè interimit, sicut *Lycostonon* lupos. Est autem hominibus uenenum, herba multum grauiter olens: proinde omnino calida est non instrenuè, non tamen proportionè desicca. Itaq; illita admodum digerentis est facultatis.

Apocyni ui-  
res ex Gal.

Νηρίον, ἢ Ροδόδενδρον. **NERIUM, SEV RHODODENDRUM.**  
CAP. LXVII.



Nerij cōside-  
ratio.

**NERION** aliqui *rhododaphnen*, alij *rhododendron* vocant. frutex est vulgaris notitiæ, longioribus quàm amygdala folijs, crassioribusque: flore in rosam conformato: fructu amygdalæ simili, corpiculato, qui patefactus quandam lanosam naturam ostendit, spinarum pappos representantem: radice longa, agata, lignosa, gustanti salsa. nascitur in amœnis, maritimis, & secus amnes. Flores, & folia mulis, canibus, asinis, & quadrupedum plurimis uenena sunt: 30 hominibus uerò contra serpentium morsus præsidia, è vino pota, eò magis ruta addita. Imbecille etiam animantes, ut pecus, & capræ, si aquam bibant, in qua folia ea maduerint, moriuntur.


**NERIUM**, quod flores rosarum effigie proferat, Laurinisq; folijs constet, Græcorum quidam *Rhododendron*, alij *Rhododaphnen* appellant. Italis *Oleandro* iulgo dicitur: Vidimus nos hoc primum ad *Benaci ripas*, & in *Argentario* promontorio in maritimis nostris. Planta est lauri facie, spectabilis, & uisus non iniucunda, præsertim cum roseis emicat floribus. Horum similitudine deceptus quondam fuit *Lucius Apuleius* sub asini metamorphosi, dum rosas quæreret, quarum pastu in pristinam formam restituendus erat. Nam cum procul uidisset *Nerium* suis floribus præsertim, ratus eos esse ueras rosas, eò aperto ore accurrit tanta auiditate, ut parum defuerit, quin eas primo occursum imprudens deuoraret. Verum is, ut quæ in plantarum historia, & uiribus earum indagandis diligentissimus auctor extitit, non immemor *Nerij* flores depastos asinis uenenum præsentium esse, ita deceptus labra submouit, demissisq; ad terram ex- 30

Nerij uires  
ex Galeno.

Conciliatio  
Dioscoridis  
cum Gal.

ribus abiit. *Nerij* uires descripsit *Galenus* libro viii. simplicium medicamentorum, sic inquit. *Nerium*, aut *Rhododaphne* notus omnibus est frutex. Foris quidem corpori illitus, discutiendi uim obtinet. Intrò autem in corpus assumptus, perniciosus, ac uenenosus non tantum hominibus est; sed plerisq; etiam pecudibus. hæc *Galenus*. Quæ maxime repugnant *Dioscoridis*, & *Plinij* placitis: quippe qui *Nerium* potum commendauerint hominibus contra serpentium uenenosorum morsus. Nisi dicere uelimus, quod *Nerium* sumptum secundum *Galenum* sit hominibus nō demorsis perniciosum: secundum uerò *Dioscoridem* idem ijs remedio sit, quos serpentes momorderint. Idq; e' ratione fiat, quæ & *cantharides* (ut inquit *Aluicenna*) à cane rabido demorsis medentur, & *euphorbium* à scorpionibus ictis, & alia deniq; lethalia medicamenta alijs item uenenis aduersantur, ut inferius libro sexto latius dicitur. Si quidem mihi non uidetur uerisimile, quod præter rationem id prodiderit *Dioscorides* in simplicium materia omnium facile princeps.

FUNGORVM differentia duplex: aut enim manduntur, aut perniciales sunt. Multis de causis venenosi gignuntur, vbi videlicet clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcor adfuerit: aut iuxta serpentis cauernam, arborésve, quæ priuatim pariunt noxios fructus, erumpant. Conuenient qui tales sunt, nescio quod strigmentum, concretamque pituitam, terraque eruti, quàm celerrimè computrescunt, atque marcore vitiantur. Sed qui veneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent: largius tamen sumpti nocent, & ægrius concocti strangulant, aut cholera morbum citant. Remedio est nitri potus, aut lixiuium cum acida muria, aut serufactæ saturæ, aut origani iusculum: debellantur etiam gallinacei fimi potu ex aceto, aut eiusdem delinctu cum melle multo. Corpus alunt, sed ægrè dissoluuntur, cum magna ex parte integri ipsi cum recrementis alui deiciantur.



TAMETSI duo tantum Fungorum genera hic videntur recensere Dioscorides, ad fungos duntaxat innoxios, & perniciosos respiciens; tamen; ut omnibus palàm est, plura ac diuersa eorum, quæ in cibis expetuntur, discrimina notantur. Horum inter omnes Italiae regiones feracissima est Hetruria, ubi illi Fungi cæteros antecellunt, qui uulgo dicuntur Prignoli: ij siquidem singulis annis primis Aprilis imbribus erumpunt, neq; solùm odorem eximium spirant, gustuiq; gratissimi sunt; sed etiam omnino innocui habentur. Secundum uerò locum apud nostros Hetruscos tenent ij, qui uulgo Porcini; hoc est, suilli nuncupantur: quippe qui prius elixi, ac demum farina circumliti, et oleo uel butyro fricti, magnam cum palato ineant gratiam. Verum hi non adeo tuti sunt, quòd in suo genere perniciosi plures, quàm in alijs reperiuntur. Cæterum periculosi ac malefici à peritis, & oculatis uiris facillè discernuntur, cum à terra & cortice purgantur, incidunturq; decoquendi. Nam cultello dissecti illico (ut Plinius inquit) dilutus eis aduenit rubor, rancidus subinde aspectus, luidus intus color, rimosa stria, pallidum per ambitum labrum: postremo accedit nigredo, & ita protinus computrescunt. Quamobrem rectè scribit Auicenna libro LIII. fen. VI. eos nocentiores esse, qui nigri, uel uirides, uel in nigro purpurascens uisuntur. Proinde amens quidem, & planè stupidus, & stapes fuerit is, qui tam repentinis mutationes uiderit, & non cognouerit his notis eorum uirus patefieri. Sed accidit plerumq; ut illos potissimum Fungi intercrumant, aut saltem in magnum discrimen adducant, qui eos super ferrea craticula, aut prunis, calentibusq; cineribus affatos deuorant. Hoc enim modo decocti, cum in taleolis non secantur, non tam facillè cognosci possunt, ut ij qui dissecti parantur. Ad hæc non semper officiant Fungi, quòd per se lethiferi sint, sed quòd copiosius, quàm par sit, ingerantur. Quandoquidem cum lenti admodum, crassissimiq; succi existant, artellarum oscula usque adeo obstruunt, ut conclusis intus spiritibus suffocent. Quod cum probè norint agrestes in Hetruria mulieres, rarissimè fungos mandunt, nisi allio, & pipere adiectis. Afferuntur Fungi muria, præsertim qui uulgo Porcini dicuntur: namq; hoc modo parati innocentiores redduntur amisso lentore. Præter hæc multa alia fungorum genera apud nos inueniuntur; ut ij qui nobis uulgo appellantur Prataiuoli, Turrini, Boleti, Orcelle, Cardarelle, Manne, Ordinali, Parigiole, Vescie di lupo, & complura alia; quæ, cum nihil uel parum ad rem faciant, silentio inuolanda duximus. Cæterum Fungi non tantum huius proueniunt, sed et in arborum caudicibus, qui omni fere periculo uacant (dummodo non sint arbores noxiæ) quòd è cortice proficiant, cui nec ferrum, nec tabefactus pannus, nec serpentis cadaver subesse potest. Ex hoc genere quidam, præter agaricum, laricibus innaſcuntur in Ananienſibus montibus triginta librarum pondere, aureo colore, per ambitum dissecti, in cibis gratissimi, nullo amarore præditi, licet agaricus ab eadem arbore productus sit amarissimus. Hic certe mirari subit, quòd tanta hominibus incesſerit gula libelo, luxus, & incontinentia, ut adeo inconsulto, auidèq; fungis uescantur, in quibus sæpius immatura mors delitescit. Tanta hodie intercesſit gratia Fungis cum merſis in Italia, ubi eorum frequentissimus est usus, ut Neapoli inuenti sint lapides, qui desſiſi, & in cellis uinarijs translati, terræ aliquantulum operti, et subinde tepida aqua inſperſi, intra quadriduū fungos non ingratos procreant. Hos et Romæ, et Neapoli uidimus, ubi magna ſeruantur diligentia, nempe

Fungorū genera, & consideratio.

Fungorū alia genera.



Fungi lucernarum.

Cornarij opinio explosa.

Fungorum uires ex Gal.

quorum merito quolibet tempore fungos edant. Sunt & lucernarum Fungi, qui in ellychnio sunt, presertim cum aer humorem contraxerit, & ad pluuiam preparatur. Fungus itaq; lucernarum, meo quidem iudicio, fuerit is cæ bonus globulus, qui fungi faciem representans, in ellychnij extremitate concreuit, & flammæ lumen obumbrat.

Neq; enim in hoc subscribam Cornario, uiro altoqui ingenio & doctrina celebri, qui in commentarijs, quos in tertium Galeni librum de compositione medicamentorum secundum locos edidit, censet fungum illum esse ellychnium lucernarum ex quodam fungi genere factum, quod facie (ut ipse inquit) marinas emulatur spongas. Siquidem apud metes nusquam me legisse memini, e fungis ellychnia fieri: cum tamen legerim apud Virgilium, & Plinium, cum futuri generantur in lucernis, futuræ pluuiæ esse presagium. Namq; Virgilius libro primo Georgicorum, ubi futuræ pluuiæ signa recenset, id apertissime testatur, ijs carminibus.

Tum cornex plena pluuiam uocat improba uoce, nullas canes uisallat.

Et sola in sicca secum spatatur arena.

Nec nocturna quidem carpentes pensa puellæ

Nesciunt hyemem, testa cum ardente uiderent

Scintillare oleum, & putres concrevere fungos.

Eorum porro generationis causam scite quidem reddidit Seruius Grammaticus in commento hisce uerbis. Nam (ut inquit Plinius) cum aer humidus esse cæperit, fauilla, quæ cum fumo solet egredi, prohibita aeris crassitate in lucernis residet, & quasdam uelut fungorum imitatur imagines. hæc ille. Sed præterea ipse Plinius Virgilio, & nobis quoq; ad stipulat libro xviii. cap. ultimo, cum ita scribit. Pallidi namq; ignes, murmurantesq; tempestatum nuntij sciuntur: pluuiæ etiam, si in lucernis fungi. hæcenus Plinius. Ex quibus omnibus luce clarius fieri puto, hæc in re Cornarium cecutiuisse. Fungorum uires memorie prodidit Galenus libro viii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Fungus frigida, humidaq; admodum planta est. quamobrem etiam proxime ad deleteriam, enecantem uirtutem accedit: & sanè inter eos sunt qui interficiant, potissimum qui ex natura mustam habent quidam autem putredinis. Et libro secundo de alimentorum facultatibus, idem de fungis ita differit. Inter fungos Boleti, si beuè in aqua elixi fuerint, propè accedunt ad cibos insipidos. Non tamen sic solis ipsis uulgò utuntur, sed adparant uariæ & coadiunt, ut alia omnia, quæ nulla insigni qualitate sunt prædita. Alimentum autem ex ipsis est pituitosum, & frigidum uidelicet, prauiq; est succi, si quis ipsis largius utatur. Omnium igitur fungorum ijs minimum sunt noxii. Secunda autem post hos sunt Amanitæ. Reliquos uero tutius est omnino ne attingere quidem: multi enim ex ipsorum esu inuenerunt. Equidem noui quendam, cui post Boletorum non satis elixorum (qui innocentissimi esse putantur) usum largirent, os uentriculi pressum, ac grauatum, coarctatumq; fuit, deficienteq; habuit respirationem, & in animi deliquium inciderat, sed doremq; frigidum sudauit, ac demum seruari ægre, sumptis ijs quæ humores crassos incidunt, potuit: cuius generis est oxymeli ipsum per se, & cum hyssopo, & origano ipsi meliocrè incoctis. Is enim tum hæc sumpsit, tum nitri spumam ipsis inpersam: post quæ fungos, quos comederat, uomuit, qui iam quodammodo in succum pituitosum, frigidumq; admodum ac crassum erant mutati.

COLCHICVM.

hyssopifolium



Κολχικόν. COLCHICVM.

CAP. LXXIX.

COLCHICON aliqui ephemeron, sunt qui agrestem bulbum uocant. Autumni exitu florem edit croci, candicantem: ab eo tempore folia bulbi, sed pinguiora: caulem palmo altum, ferentem rufum semen: radicem foris è nigra rufescentem, quæ delibrata, candida, & mollis spectatur, lacteo succo madet, atque gustatu dulcis inuenitur: bulbis eius mediam habet rimam, fissuramq;e, qua flos erumpit. plurimum in Messenia, & Colchis enascitur. Ea comesta, fungorum more, strangulando enecat. Hanc autem depinximus, ne à quoquam imprudenter pro bulbo deuoretur: mirum enim in modum saporis uoluptate impletos allicit. Remedio sunt eadem, quæ fungis: bubulum etiam lac potum auxiliatur, itaque cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

Εφίμερον.

ΕΦΗΜΕΡΟΝ.

EPHEMERVM.

CAP. LXXX.

EPHEMERON, aliqui syluestrem irin appellat. Folia habet lilij, sed tenuiora: caulem parem: florem candidum; amarum: semen molle: radicem unam, digitali crassitudine, longam, adstringentem, odoratam. nascitur in syluis, & opacis. Huius radix dentibus præcipua, si decocto colluatur. Folia in uino cocta, discutunt tumores, & tubercula, quæ nihil adhuc humidi contraxerunt.

EPHEMERI duo genera constituisse uidetur Dioscorides. unum, quod Colchicon, & agrestem bulbū: alterum, quod Irin syluestrem cognominant. Quod primo loco describitur, usque adeo perniciosum affirmant, ut uno die sumptum interficiat: unde illi Ephemeris nomen. Ea autem ratione illud se depinxisse tradit Dioscorides, ne ab aliquo imprudenter bulbi uice deuoretur: mirum enim, inquit, quantum saporis uoluptate impetritos alliciat. Verum cum hoc diuinum Dioscoridis institutum non animaduertent, uel fortè neglexerint Mauritanis, & eos secuti medici superioris nostre ætatis, non modò seipsos, & sequaces miserè decepterunt: sed & cæteris omnibus errandi anasam facile præbuerunt. Siquidem Colchicum ephemerum delictum medicamentum, si eius nota diligentissime expendantur, nil aliud, meo quidè iudicio, representare deprehenditur, quam candidum illum bulbū, quem uulgò officinæ Mauritanos fecisse falsò Hermodactylum appellant. Sed quantum detestandum sit erroris, & abolenda praua, ac perniciosa hæc consuetudo, quantumue discriminis, & incommodi nostris corporibus hinc imminuat, æstimabunt ij, qui rectè diligenterq; ea perpenderit, quæ non solum Dioscorides, & Galenus, sed & Paulus, &

Colchici, &  
Ephemeris cō-  
sideratio.

Mauritanorū  
& sequacium  
error.

Hermodactylus



Nicander, & Plinius de Colchico ephemero posteritatis memoriæ prodiderunt. quippe qui affirmauerint, id deuoratum eadem die homines interimere. Quem effectum etsi hac tempestate ab hoc manifestè præstari non constat experimento in his, qui ipsum in medicamentis assumunt; id tamen non alia de causa fieri putauerim, quam quòd fortasse in Italia, ut in Colchide, mortiferum non proueniat: aut quòd ea, quæ sumitur quantitas, exigua sit, neq; ad perendum sufficiens. Sed non propterea dubitandum est, quin hoc sumentibus grauius & periculosa incommoda inferre ualeat.

Erroris occasionem dedisse uidetur Serapio, utpote qui confusè uno tantum capite de utroq; Ephemero, & de Hermodactylo scripserit, nomine duntaxat Hermodactyli omnibus inscripto, inmemor, uel potius ignarus, apud Græcos, a quibus tamen quicquid ferè boni habet, mutuatus est, eas plantas inter se maxime differre. Quòd autem in hoc deceptus Serapio has herbas turpiter confuderit, fidem manifestam facit Paulus Aegineta, qui libro VII. de Ephemeris, & de Hermodactylo separatim tanquam de diuersis disseruit: & primam de Hermodactylo, sic inquit. Hermodactylus adx & per se, & ipsius decoctum uim habet purgandi: priuatim arthriticis tunc, cum humores defluunt, exhibetur. uerum stomachonimis quàm aduersatur. Mox paulò inferius, sex tantum interiectis capitibus, de Ephemeris ita scribit. Ephemeron non uenenum illud, sed quod Iris syluatica nominatur, mista potestatis est, & repellentis, & discutientis per balium. hæc tamen Paulus. Ex quibus sanè palam fit, non modò Hermodactylum cū Colchico nullam habere cognationem; sed etiam hac in re planè hallucinatum fuisse Serapionem, quem secuti cæteri Mauritanii, qui post ipsam libros conscripserunt, atq; etiam ex nostris pleriq; qui superiore ætate claruerunt, ut cæci cæcos sequentes omnes in hanc erroris stueam inciderunt, & posteros hucusq; in hunc pessimum & detestandum usum pertraxerunt. Iam itaq; resipiscant tum medici, tum seplasiarij, qui Colchicum suis medicamentis, & catapotijs inserunt, &

Serapionis la-  
psus.

ipsam iam non secus ac scopulum euitent, utpote quod, omnium probatissimorum authorum testimonio, mortiferum sit medicamentum. Quæ autem radix nobis hodie Hermodactylus dici possit, difficile quidem fuit discernere, quòd ex probatis rei herbariæ scriptoribus hæc tamen neminem inuenerim, qui notis ullis eius tradiderit historiam. Veruntamen, si ex uocabuli etymo conijcere licet, nil aliud significare uidetur Hermodactylus, quàm digitū Hermi, aut Hermetis. Vnde factum est, ut aliquando cogitauerim, an illa bulbacea radix, quæ manus humane formam refert, quæ uulgò Christi palmam appellant, ad Hermodactylum accedere posset, quòd bulbacea sit, quemadmodum & Colchicum, quòdq; sumpta non modò uomitiones, sed et aluum cieat, ut testis est Nicolaus Florentinus, qui hac radice pluribus factis uomitionibus, Biliotum quendam quartanarum curauit. Hæc in medium proferre libuit, non quòd ita esse certò asserere ausim, sed ut rei herbariæ studiosis res hæc melius æstimanda proponeretur. Nec illud sanè hoc loco prætereundum duxi, quòd Hermodactyli Actuarius, & Nicolao Myrepsico, qui albi, & rubri Hermodactyli meminere, nil aliud representant, quàm Beben album, & rubeum Mauritanis appellatum. Siquidem ex descriptione

Hermodacty-  
li coniectura.

Fuchsi; erratum.

Monachorū  
hallucinatio.

Ephemerū ui-  
res ex Gal.

Helxines cō-  
sideratio.

Helxines ui-  
res ex Gal.

aureæ Alexandrinæ apud Nicolaum, & diamoschi antidoti apud Aetnarium id liquido constat. Sed non ob id her-  
dum est, hermodactylum Pauli, & Serapionis idem cum illis esse: his namq; alterius generis radix est, quæ iam hinc  
deiectionem ad articulorum defluxiones præcipuam. Ceterum Ephemerum, quod sylvestrem Irin appellat, et  
Ananienſibus montibus tam in pratis, quam in syluis copiose nascitur, ubi indigenis uocatur uulgò Giglio matto, hoc  
est, Lilium stultum. Huic certè, nisi me fallit iudicium, omnes prorsus notæ conueniunt, quæ alteri Ephemeræ Dio-  
scoride tribuuntur. Hinc itaq; fit, ut in hoc Fuchsius, uir alioqui doctissimus, aperte errasse deprehendatur, qui plū  
tam uulgò Lilium conuallium uocatam Ephemerum alterum, & non lethale esse contendit. Quandoquidem illud fi-  
lia lilio latiora, non autem angustiora, & dissimilia profert: caulem non lilio modo, sed gracilem, & stenuis exis-  
tenuem: radicem item exilem, quæ capillaribus diuiditur fibris, tantum abest, ut digiti crassitudinem æquet, quæ in  
Ephemeræ requiritur. Præterea neminem adhuc reperi, qui tradat Ephemerum flores ferre suauiter oleres: cum  
tamen Lilio conuallij dicti flores adeo iucundū spirent odorem, ut eius gratia ab omnibus maxime expectetur: id quod  
nunquam silentio præterisset Dioscorides in re herbaria grauissimus author, præsertim quod ea nota fuisset Epe-  
mero insignis, & notabilis. Ex his igitur colligendum esse putauerim, non solum Fuchsiū in aperto errore uersari;  
sed reliquos etiam, qui Lilium conuallium uocatam Ephemerum esse contendunt. Sed ad Colchicum reuertamur.  
Floret hoc autumnī tempore, floribus croco æmulis, nullis tamen emissis folijs, nisi appetente uere, quo tempore sub-  
rubeum gignit semen, quibusdam folliculis inclusum, iuglandum similitudine. Verum hoc tempore radix ei dulcis non  
est, quemadmodum in autumnō, sed lacte prægnans, & amara inuenitur. Quare hic cogimur dicere, & sciri, quod  
hoc non obseruauerit Dioscorides, uel saltem, quod indicium id omiserit. Porro in communem illam hallucina-  
tionem antè explosam deducti sunt & patres illi reuerendi, qui in Mesuem commentarios ediderunt: quippe qui nullam  
faciant differentiam inter Colchicum, & Hermodactylum, idq; aperte asserunt. Quorum etiā auctoritate feni pba-  
macopole adduci possunt, ut cum maximo humane uitæ detrimento colchicum catapotijs immisceant. Quare casu  
meo consilio seplastarij, neq; facile fidant ijs, quos magis decet libros sacros, quam medicos euoluere, ut animabus po-  
tius, quam corporibus mederi sciant. Ceterum colchici floribus, ut audio, utuntur Turcæ, cum inebriari uolunt:  
eos enim uino macerant, eiq; potu adeo stupidi redduntur, ut in ecstasi abeant. Vtriusq; Ephemerū meminit Gale-  
nus libro vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Ephemerum non illud lethale seu deleterium, quod & Col-  
chicon uocant, sed alterum, quod & Irin agrestem cognominant, folia, & caulem lilio similem obtinet: radicem ob-  
longam, non rotundam ceu colchicum, digiti potissimum crassitudine: est autem adstringens, & boni odoris. Ex quibus  
palam sit, quod mixta sit facultatis, temperaturæq; nempe repellentis, & haliu digerentis. Testificantur uerò illi  
opera, quæ particulatim edit. Siquidem non inefficaciter radix eius in dentium doloribus colluitur: & folia tubercu-  
lorum tum augmento, tum uigori congruunt. Oportet autem ea in uino decocta, priusquam pus moueas, illinere.

### ELXINI. HELXINE.

### CAP. LXXXI.



HELXINE nascitur in parietinis, sepibus, & ma-  
cerijs: folia ei mercurialis insunt, hirsuta: cauliculi  
subrubentes; & circa eos ueluti semina aspera, adha-  
rentia uestibus. Folia refrigerandi, spissandi que na-  
turam habent: quæ ex causa sanant illitu sacros ignes,  
adusta, condylomata, panos incipientes, tumores, in-  
flammationesque. Succus eius cum cerussa, ignibus  
sacris, & ulceribus quæ serpunt, commodè illinitur:  
imponitur quæ podagris cum hircino adipè, aut ceruo  
cyprino: ueterem tussim emendat, instar cyathi hau-  
stus: tonsillis inflammationem sentientibus utiliter &  
gargarizatur, & oblinitur: aurium dolorem cum ro-  
faceo, instillatus leuat.

HELXINEN quæ hic à Dioscoride describitur, offe-  
narum uulgus Parietariam appellat, quod in ædificiorum parie-  
tibus nascatur. Alij, quod detergendis uirgis poculis sit aptissi-  
ma, Vitreolam nominant. Hæc planta omnibus notissima est:  
quare superuacaneum esset, eam longiore historia representare.  
Verum alia ab hac, & longè diuersa est Helxine, quam Plinius  
libro xxxi. cap. xv. inter aculeata retulit, & depinxit his uer-  
bis. Helxine rara uisu est; neq; in omnibus terris est: radice fi-  
liosa, ex qua media ueluti malum extuberat, contextum sua fron-  
de. Huius uertex summus lacrymam continet, iucundi saporis,  
acanthicen mastichen appellatam. hæc Plinius. Helxines ui-  
res tradidit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, sic  
inquit. Helxinen aliqui perdicium nominant, alij parietariam  
alij sideritum, sunt qui heracleam appellant. Ceterum uis ei in-  
est abstergendi, & leuiter constringendi cum humiditate subfr-  
gida.

gile. Quamobrem phlegmonas omnes in initio, & augmento sanat usque ad statum, & maxime si calide fuerint. Quoniam incipientibus phlegmibus cataplasmatibus ritu illinitur. Succus quoque eius cum rosaceo ad aurium dolores phlegmonosos, mediocriter profuerit. Gargarizandum item nonnulli exhibent ad paristhmia. Sunt uero etiam ex medicis quidam, qui ijs, qui diutina tussi uexantur, illam exhibuerint. Certè euidens extergendi experimentum præbet & in uasis uitreis.

ΑΛΣΙΝΗ. ALSINE. *negris grauit* CAP. LXXXII.

ALSINEN, aliqui anthyllion, nonnulli myosota uocant, quoniam muscutorum aures folia imitantur. Lucis, opacisque gaudet, unde alsine dicta est. Hæc erat eadem, quæ helxine, nisi humilior esset, & folijs minoribus, nec hirsuta. cum teritur, odorem cucumis reddit. Vim refrigerandi, adstringendiq; obtinet: oculorum inflammationibus cum polenta illinitur. Succus aurium doloribus infunditur. quin & emendat omnia quæ helxine, id est, muralis herba.

ALSINE ea nimirum herba est molliuscula, quæ Hetru- scis Centone, alijs uero Pauarina, alijs Pizxa gallina, alijs Centouice uulgò appellatur. Et quanuis Dioscorides unam tantum Alsinen representauerit; plura tamen eius reperiuntur genera. Porro habentur quædam Dioscoridis exemplaria, in quibus caput hoc legitur in calce libri secundi statim post Muris auriculæ mentionem. Sed nos, ut eo in loco latius diximus, hanc suam ueram ac germanam sedem esse censemus. Alsines meminit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, ita de eius uiribus scribens. Alsine, aut Myosota similem helxine facultatem obtinet, nempe refrigerantem, & humectantem: est enim essentie aqueæ frigide: quare & citra adstrictionem refrigerat. Quocirca & fruentes phlegmonas, & mediocria erysipelata competit.

Alfines consideratio.

Vires ex Gal.

ΦΑΛΟΣ ὁ ἐστὶ τῶν τελευάτων. LENS PALUSTRIS. CAP. LXXXIII.

*Wasser lens*

LENS palustris inuenitur in aqua non fluente; muscus lenticulæ similis, refrigeratoriæ naturæ. Pro-

pter quod conuenienter collectionibus, igni sacro, & podagris illinitur per se, & cum polenta: glutinat & procidentia puerorum interanea.



PALUSTRIS lens, quam officinae, & herbariorum uulgus Lenticulariam appellant, notior omnibus est, quam ut pluribus describi mereatur. Ea plerunq; stagnantibus aquis inmatat, ijsq; præsertim, quæ urbes, & oppida cingunt. Lentis palustris non nisi temperamentum prodidit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Lenticula palustris humida, frigidaq; temperaturæ est, utrinque ex secundo quodammodo ordine.



Lentis palustris confid.

Facultas ex Galeno.

Α'Ε'Α'Α'Α'

SEDVM MAIVS.

SEDVM MINVS.



Αἰζώον μέγα. SEDVM MAIVS.

CAP. LXXXIII.

SEMPERVIVVM magnum ideo nominatur, quoniam perpetuò folia uireant. cuius caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, uirentes, characiæ tithymali inodo infecti: folia pinguia, carnosæ, longitudine pollicari, in cacumine linguæ similia, alia in terram conuexa; alia in capite stantia inuicem, ita ut ambitu effigiem imitentur oculi. nascitur in montibus, & testaceis: supra domicilia etiam feritur. Eius uis refrigerare, & adstringere. Medentur igni sacro, nomis, ulceribus quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti in doloribus, cum polenta, aut rosaceo perfunditur: datur in potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam, aliusque profluuia: teretes tineas potus in uino excutit: subditus in uellere, mulierum abundantiam sistit. Succus oculorum lippitudinibus, sanguinis uitio conceptis, inungitur.

Αἰζώον μικρόν. SEDVM MINVS.

CAP. LXXXV.

SEMPERVIVVM paruum in petris, parietinis, & macerijs, necnon scrobibus opacis nascitur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, crebrò foliatis: exilibus folijs, rotundis, pinguibus, mucronatis: caule à medio emicante, palmum alto, umbellam, herbidosque flores, & ternos gerente. Folia eisdem cum priore uiribus prædita sunt.


Αἰζώον εἶδος τρίτον. SEDI GENVS TERTIVM.

CAP. LXXXVI.

TERTIVM uidetur semperuiui genus, quam aliqui andrachnen agriam, aut telephion nomenclauerunt, Romani illecebram, pusillis, crassioribusque folijs, hirsutis, portulacæ proximis. nascitur in faxis. Vis ei excafactoria, acris, exulcerans. illita cum axungia strumas discutit.



## EXEVI. SEDI GENVS TERTIVM.



23 EX TRIBVS Sedi, siue Semperuiui generibus, quæ hoc loco à Dioscoride pinguntur, primum, & alterum Sedi genera, omnibus nota sunt. Vtrunq; officinæ Semperuiuum appellant, addita maioris, & minoris differentia. quauis non & consider. desint, quæ minus Vermicularem, Crassulanq; herbam uocent. Minoris duo uisuntur genera. Alterum, cuius Dioscorides meminit, folijs crassioribus, longioribus, rarioribusq; facie nucleis pinctis à putaminibus repurgatis similibus, unde quibusdam uulgò etiam Pignola dicitur. Caules fert tenues, pluresq; in quorum cacumine flores exeunt herbacei, seu subcandidi, umbellæ diuulsæ modo. Alterum folijs breuioribus, angustioribus, copiosioribusq; floribus melius, eodem ordine prodeuntibus. Hoc marem, illud foeminam recentiorum quidã existimant. At tertium, quod mihi landiu incompertum extitit, cum usque adeo excalfaciat, ut carnem exulceret impositum, à cæteris longè facultatibus distidet. Huius uaria in Dioscoridis codicibus legitur historia: ceterum nos Aldinum exemplar secuti, hinc ea abdicauimus, quæ adulterina censentur. Nec desunt qui crediderint, tertium hoc Dioscoridi esse spurium, quod duorum tantum meminerit Galenus. Veruntamen è Pisis hoc anno tertium Sedi genus, gustu sanè acerrimo, adeo ut linguam exulceret, ad me misit Lucas Ghinus Forocorneliensis medicus rei herbariæ peritissimus. qui illi plantæ hæc uerba subiecerat, quæ hic referam eius humanitate fretus. Visitur, inquit, in uiridario Illustrissimi Ducis Florentiæ quoddam tenuissimi Sedi genus, gustu nil minus acerrimo, quam ranunculi omne genus. quod etiam in antiquis ædificiorum parietibus, & saxorum rimis prouenire conspexi. Hoc, meo iudicio, tertium est sedum: Sed cion Dioscoridis uerba hoc loco obscura sanè, & intellectu difficilia habeantur, iandiu unâ cum alijs pleriq; qui hac simplicium facultate maxime delectantur, plurimum laboris impendi, ut tertium Sedum consequi possem, cui folia inessent hirsuta, & facie portulacæ similia. Ceterum cum postea attentius, diligentiusq; Dioscoridis uerba perpenderem, sic Latine sonare uidentur. Est & tertium sedi genus, quod portulacæ respectu, folia edit pinguiora, densioraq; & c. Quibus cion hunc dederim sensum, qui, mea sententia, propriam Dioscoridis mentem explicat, tertium hoc sedum facile mihi sese obtulit cognoscendum, ut omnibus quoq; id ipsum euenire baudquaquam dubitauerim, qui Græcam dictionem δαίσα δένσα, non hirsuta exposuerint, interpretatiq; fuerint πρὸς τὰ τὰς ἀνδρογύνους ad folia portulacæ collata. Nam huiusce tertij sedi folia, portulacæ folijs comparata, ijs densiora, crassioraq; facili cernuntur. Hactenus auiculus ille. Cuius certè sententiæ non possum non adstipulari. quippe quæ doctissimis rationibus nitatur, & ipse sit quod me grauis testis. Semperuiui mentionem fecit Theophrastus libro XVII. cap. XIII. de plantarum historia, sic inquit. Semperuiuo datum à natura est, quod humidum, uirideq; semper durare ualeat. Folio carnosio, leui, atque oblongo id constat. Planis parietinis nascitur, necnon & in tegulis, cion terræ confluuium quoddam arenaceum facium est. hæc Theophrastus. Sedi uires descripsit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, his uerbis. Aëzoon utrunq; tum maius, tum minus, desiccatur quidem leuiter, quandoquidem & mediocriter adstringit, omnis alterius uehementis qualitatis expers: quare in eo plus cæteris abundat essentia aquea. Ceterum non mediocriter refrigerat: est enim ex tertio ordine, & recessu refrigerantium. Hinc etiam ad erysipelata, & herpetas, & phlegmonas à fluxione natas accommodatur.

Sedi uires ex Galeno.

KOTVΛΩΔΩΝ. VMBILICVS VENERIS. CAP. LXXXVII.



Umbilicus Veneris

COTYLEDON, siue umbilicus Veneris, folio est in acetabuli formam tornato, ineuidenter concauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest: radice oliuz modo rotunda. Succus: cum uino circumlitus, instillatusve contacta genitalia nudat: inflammationibus, sacris ignibus, strumis, pernionibus, illitu auxiliatur: stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comesa, calculos frangunt, urinam cient: hydropicis ex melle dantur. Herba utuntur ad amatoria.

KOTVΛΩΔΩΝ

UMBILICVS VENERIS.

UMBILICVS VENERIS ALETR.



ΚΟΥΛΑΔΩΝ ΕΤΕΡΑ. UMBILICVS VENERIS ALTER.  
CAP. LXXXVIII.

EST ET alterum umbilici Veneris genus, cymbalion aliqui uocant, pinguibus folijs, latioribus, ligularum modo, densis circa radicem, medium oculi ambitum describentibus, ut in maiore semperuiuo, adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores & semina hyperici: radice maiuscula. Facit eadem, quæ semperuiuum.

Umbilici Veneris utriusque confid.

Officinarum error.

Fuchsi hallucinatio.

Fabaria fol. 305

Umbilici Veneris vires ex Galeno.

UMBILICVS Veneris, quem primo generi assignant, frequens nascitur in uniuersa ferè Hetruria, saxis, et uetustis edificiorum parietibus. Huius folia, quod fictilium operculis similia sint, uulgò Senenses appellant Copertiuole. Alterum uerò eius genus à quibusdam Cymbalion uocatum, uidimus primum in Foroiulensium ciuitate Aestriae, in hortulo quodam excellentissimi medici Iuliani à Marostica Teruissensis. Hanc porro plantã in pluribus montibus saxis inhaerentem inuenimus. Cui, meo quidem iudicio, omnes prorsus conueniunt notæ, quæ alteri umbilico Veneri tribuuntur. Ceterum apud Insabres officinæ legitimæ Cotyledonis, siue umbilici Veneris loco, herbarum quandam in parietinis, et maceris nascentem usurpant, quæ ex ijs eminet, et comæ modo dependet, caule tenui, folijs hederaceis, per ambitum mucronis instar laciniatis. Hanc fortè, quod Cymbalaria uulgò uocetur, putat à cymbalio corruptè nomen traxisse, et ideo uerum Veneris umbilicum esse. Sed euidentius errant, quam ut ostendebat. Fuchsius quoque, cuius uiri aliqui eruditi pace dixerim, in hac re hallucinatus deprehenditur, quod in peruo suo libro, in quo plantarum duntaxat imagines expressit, pro utroque umbilico Veneris eas nimirum plantas depinxerit, quæ nonnullis uulgò Fabariæ, et Fabæ crassæ appellantur: quas tamen prius in suo de sterpium historia commentario pro telephio ostenderat. Verum tam prima, quam altera eius opinio, ut dicam quod sentio, mihi plane reprobanda uidetur. Umbilici Veneris meminit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cotyledon facultatis mistæ est, nempe humide, subfrigide, et cuiusdam obscure adstringentis, et cum ea leuiter anæ: underefrigerat, repercutit, abstergit, et discutit. Itaque phlegmonas erysipelatodes, et erysipelata phlegmonode curat: et maxime stomachi ardore aestuantis admodum utile est epiplasma. Putantur folia cum radice manducata calculos confringere, et urinam mouere.



VRTICA TERTIA.



Αναλυσις. VRTICA. CAP. LXXXIX.

DVO VRTICAE genera. Altera sylvestrior, asperior: latioribus, nigrioribusque folijs: semine lini, sed minore. Altera non æquè aspera, minuto semine. Folia utriusque illita, canis moribus addito sale, medentur: gangrenas, carcinomata, sordida ulcera, & quæ cacoëthe uocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesque sanant: lienosis cum cerato imponuntur: faciunt ad profluvia narium cum succo trita, & naribus indita: menses ciunt eadem detrita cum myrrha, & imposita: procidentes vulvas recentia contactu resilire cogunt. Semen potum ex pascuo uenerem stimulat, & vuluæ ora patefacit: cum melle delinctum orthopnoæ, lateris & pulmonum inflammationibus prodest: thoracem expurgat. erodētibus medicamentis admiscetur. Cocta cum conchis folia aluum emolliunt, urinas mouent, inflationes discutunt: decocta cum pisana, uitia pectoris extrahunt: mulierum menses euocant, cum myrrhæ modico posita. Inflammatione turgentem vnam, gargarizatus succus reprimat.

VRTICA adeo vulgaris notitie est, ut non modò inter diu, sed etiam noctu in tenebris solo tactu ab omnibus facillimè cognoscatur. Proinde operæ pretium non est, ut hic pluribus eius faciem depingamus. Verumtamen ignorandum non est, quòd etsi Dioscoridi duo tantum Vrticæ assignentur genera; tria tamen in Italia reperuntur. Siquidem præter Vrticæ à Dioscoride traditas, alia est, quam aliqui sylvestrem appellant, ceteris acrior, & mordacior, folijs paruis, hirsutioribusque caulibus omnibus

Vrticæ consideratio.



Urtice uires  
ex Galeno.

omnibus & hæc nota. Urtice uires memorie prodidit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, ubi sic  
quit. Urtica, & huius herbe tum semen, tum folia (nam hæc potissimum in usum ueniunt) digerentis sunt facultas,  
adeo ut & phymata, & parotidas sanent. Sed & quiddam flatuosum obtinent, quo & uenerem extimulant, & me-  
xine ubi cum multo semen bibitur. Porro quod non uehementer calfaciat, sed admodum tenuium sit partium testimo-  
nio est crassorum, uiscosorumq; humorum ex pectore, pulmoneq;eductio, tum quod partes, quas contigerit, pra-  
riant. Ceterum flatuosum eius, cuius particeps esse dicta est, dum concoquitur, nascitur: non enim actu flatuosa est,  
sed potestate. Ventrem autem modice subducit, dumtaxat abstergendo, ac ueluti titillando, non purgando. Et gangre-  
nosa, & cancrofa, & in totum quæ exiccare citra mordicationem postulant, ea conuenienter sanat. nimirum cum  
subtilium sit partium, & temperatura sicca, non tamen tantum habens caliditatis, ut iam mordicet. Et libro 11. de  
alimentorum facultatibus, idem de urtica ita scribit. Urtica, herbarum agrestium una etiam hæc est, tenuium par-  
tium uim obtinens. Iure itaq; nemo ipsa, ut alimento utitur, nisi maxima prematur fame. Vtilis autem est, ut obsoni-  
ac medicamentum, quod alium deicit. hætenus de urtica Galenus. Sed quoniam herba illa, quam hodie herbarij  
CARDIACAM nominant, nunc ob cognationem, quam cum Urtica habere uidetur, mihi in mentem uenit; ideo nō  
alienum puto, quod hic de ea quoq; aliquid differamus. Hæc itaq; urtica proxima est, tametsi folijs, quæ prope ter-  
ram prodeunt, rotundioribus constet, ranunculi modo per ambitum laciniatis. Ei caulis est quadrangulus, in quo  
bina ubiq; folia paribus interuallis exeunt, oblonga, urticae similia, sed per ambitum serratoria. Flores, quæ in purpu-  
ra albicant, urticae fetide, de qua sequenti capite dicturi sumus, non dissimiles profert, minores tamen: quæ uertice-  
lato ambitu marrubij modo caulem circumdant in ipso foliorum exortu. Radix in rubro pallefcit, alijs pluribus par-  
uis radicibus adnatis. Prouenit ubiq; iuxta semitas, circa sepes, & post urbium moenia. Gustu usque adeo amarescit,  
ut facile existimari possit ad secundum excalfaciendum ordinem, & ad tertium siccantium accedere. Præstat hæc, ut  
recentiores quidam tradunt, ad cordis affectus, unde etiam apud uulgares nomen accepit. Medetur item conuulsis, ac  
resolutis. Obstructiones aperit, quas causa frigida induxerit: urinam cit, & menses. Pectus à pituita deterge, &  
lumbricos necat. Ceterum in pulcrem contrita, & cetheleæ mensura ex uino hausta, difficile parientibus mirum  
in modum opitulatur.

Cardiacæ hi-  
storia, & uir-  
tes.

Vinsangr

GALIOPSIS. GALIOPSIS.

CAP. XC.

Urtice  
dant

Sacculis



Galiopeos  
confider.

Opinio quo-  
rundā repro-  
bata.

Fuchij erra-  
tum.

GALIOPSIS, frutex in totum caulem, & folia ha-  
bet: & lauiora, & quæ grauem odorem trita red-  
dant: flore purpureo, tenui. nascitur circa sepes, ædifi-  
ciorum areas, ac semitas ubique. Folia, caules, semen,  
oculusque, duritias, & carcinomata dissipant: strumas,  
panos, & parotidas discutit. Oportet bis die tepidum  
ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fouere.  
ad putrescentia, gangrenas, & nomas, cum sale effica-  
citer illinuntur.

GALIOPSIN eam equidem plantam crediderim esse,  
quam nos in Italia Urticam fetidam appellamus, quæ ubiq; ferè  
prouenit, in ædificiorum areis, in plateis, iuxta semitas, & circa  
hortorum sepes, odore ingrato: unde & fetide cognomen  
uenit. Quædoquidem hæc folijs, et caule constat urticae similibus,  
tactu tamen non mordentibus: floribus item purpureis, tenuibus.  
Hinc itaq; fit, ut ij, mea quidem sententia, in errore uersentur, qui  
putant Galiopsin esse herbam illam uulgare, quæ officinis, & her-  
bariorum uulgo Scrophularia maior, Millemorbis, Ferraria, atq;  
etiam Castrangula dicitur: hoc fortasse argumento nixi, quod ea  
flores edat, qui galeæ similitudinem referunt. Sed eorum error ex  
eo, ut arbitror, aperte diluitur, quod Scrophularia maior dicta so-  
lia non proferat urticae admodum emula, nec ea graui odore præ-  
dita sentiantur. Adde quod huic radix subsit magna, alba, undiq;  
strumosa, unde forte Scrophulariæ nomen traxit, adeo notatu di-  
gna, ut non uideatur uerisimile, quod eius faciem non depictam re-  
liquisset Dioscorides, quando sensisset hanc herbam esse Galiopsin.  
Huc etiam illud accedat, quod illa ut plurimum in scrobium mar-  
ginibus, in rigulis, & uliginosis locis nascitur, non autem (ut Dio-  
scorides inquit) circa sepes, & in ædificiorum areis. In hac sententia fuisse inuenio Fuchium uirum aliquo-  
ditum, qui à galea, cuius effigiem Scrophulariæ flores representant, hanc sibi nomen asciaisse existimat. Id quod mi-  
hi plane non uidetur esse rationi consentaneum, quod non sit ex more Grecorum ueterum præsertim, apud quos nullis  
uerborum inopia fuit, ut ex Latinis, & Grecis dictionibus plantarum, & aliarum rerum nomina componat: galea

omnium Græcum nomen non esse constat. Ex his igitur adducor, ut in hoc neq; Fuchſio, neq; alijs adſtipulari poſſim, quo-  
 rum potius ſententiam ex ſuprà dictis reprobendam eſſe cenſeo. Eſt præterea alia planta Vrtice foetida non abſimi-  
 lis, quæ à lacteis maculis ſingula folia in longum percurrentibus Vrtica lactea à noſtris Senſibus uulgo cognomina-  
 tur, quæ rectius fortè quæ Galioſin dixerit, ſi à γαλα, quod uocabulum Græcis lac ſignificat, Galioſin dictam  
 eſſe iudicet. Quod autem res hæc ita eſſe poſſit, ex Dioſcoridis ordine coniectura quadam colligi poſſet. nam quod  
 præſens poſt Galioſin Galion deſcripſerit, cui ex eo nomen inditum eſſe tradidit, quod in cogendo lacte coaguli uicem  
 expleat, uidetur innuiſſe, inter utruq; magnam eſſe nominis cognationem. Hanc itaq; legitimam eſſe Galioſin quaſi  
 æſtimare non dubitarem, niſi Plinius libro xxii. cap. xiiii. eam Lamium appellari prodidiſſet, laudibusq; extuliſ-  
 ſet alium, quod habet in medio folio, ad ſacros ignes, & foliorum reliquum cum uniuerſa planta, addita mica ſalis, ad  
 contuſa, incuſſaq; ad ambuſta, ſtrumas, tumores, podagras, & uulnera. Quibus ſane Plinij placitis decernere cogi-  
 tur, primam, quam Vrticam foetidam diximus, eſſe Galioſin: alteram uerò Plinij Lamium. Sed ſi ſuſtinere uelimus  
 hanc ſecundam eſſe ueram Galioſin, dicere nobis liceat, Plinium non cognouiſſe Galioſin. neque id fortæſſe temere  
 diceretur, quod in multis alijs Plinius euidenter erraſſe deprehendatur. Caterum quanuis ex rationibus ſuperius  
 adductis perſpicuum, ni fallor, factum ſit, SCROPHULARIAM non eſſe Galioſin; ea tamen uiribus pollet  
 non contemnendis. namq; eius radix ſtrumas, & hæmorrhoidas ſanat. In quem uſum radix effoditur autumnali tem-  
 pore, & repurgata tunditur cum recenti butyro, operculatoq; fictili in ulgiſoſo loco reponitur, ubi dimittitur per  
 quatuordecim dies. Deinde lento igne butyrum illud liqueſcit, & percolatum aſſeruetur. quo prædicti morbi utiliſſime  
 ſanantur.

Vrtica lactea.

Lamium Plinij.

Scrophularia uires.

Vrtica

GALION

CAP. XCI.



GALION nomen ex eo traxit, quod in contrahendo lacte coaguli uicem impleat. ramulum, foliumque habet aparine ſimillimum, rectum: florem in cacumine luteum, tenuem, denſum, copioſum, odoratum. Flos igni combuſtis illinitur, & ſanguinis profluuiâ liſtit. Cerao roſa, & galion admixcet, inſolutum uſque cum albeſcit. — r. — laſſitudines tenet. Radix uenerem concitat. — in paluſtribus.

GALION ubiq; copioſe naſcitur prope ſepes, & ſecus uias, ſolis aparine minoribus: flore tenui, ſpicato, partim luteo, partim albo. Verum non propterea omnibus nota eſt uis, quam coagulandi lactis habet: nam ſi ea paſtoribus innotuiſſet, non minus apud eos huius herbe inueniſſet uſus, quam cinere apud Hebræos, qui eius flore ut dulciore ſuauiorq; caſeus euadat, tum ouillum, tum etiam caprinum lac cogunt, ac ſpiſſant. Galio uires reddidit Galenus libro vi. ſimplicium medicamentorum, ſic inquit. Galium inde adeo nomen ſortitum eſt ſuum, quod lac coagulet. Aſimile autem eſt aparine, ſaculatem obtinens exiccatoriam, & ſubacrem. Floſ eius ſanguinis profluuijs competere uidetur, & combuſtis mederi. Eſt autem boni odoris, & coloris lutei.

Galij confideratio.

Galij uires ex Galeno.

Helycon. SENECIO.

CAP. XCII.

Erigeron

SENECIO cauliculo eſt cubitali, ſubrubro: folijs continuis, per extremitates eruce modo diuiſis, ſed minoribus multo: luteis floribus, qui celeriter diſſeſcunt in pappos. Nomen uerò ſibi uindicauit, quoniam flores capillorum ritu caneſcant, radice ſuperuacua. Naſcitur maxime in macerijs, & circum oppida. Folia cum floribus refrigerat: quare illa cum uini modico, uel per ſeſe, teſtium & ſedis inflammationes ſanant: quin & ex manna thuris medentur, cum reliquis uulneribus, tum ijs quæ acui acceperunt. Illi per ſe cum aceto pappi, idem minus præſtant: nerum recentes epoti, ſtrangulant. Totus caulis, ſi coctus in paſſo portui detur, ſtomachi dolores à bili contractos perſanat.



Senecionis cō  
sideratio.

SENECIO.

Brunfelsij er-  
ror.  
Senecionis fa-  
cul. ex Gal.



Thalictri con-  
sideratio.

Vires ex Gal.

SENECIO, que Græcè Erigeron dicitur, aliquatenus  
gò Cardoncello, alijs uerò Spelliciosa uocatur. Planta est in-  
garis notitia. Cauliculis exit (ut Dioscorides inquit) subri-  
tibus: folijs laciniatis, eruce æmulis, minoribus tamen, et esse-  
rioribus: floribus luteis, qui dehiscetes in pappos abeunt. Na-  
scitur passim, adeo ut etiam super urbium moenia, et in parietibus  
proueniat. Hanc herbam Otto Brunfelsius esse Verba-  
can supinam magno et aperto errore existimauit. Senecio-  
nis quàm breuē mentionem fecit Galenus libro vi. simplicium  
medicamentorum, eius tantam facultatem referens his uerbis.  
Erigeron, siue Senecio facultatem mistam obtinet, simul refri-  
geratoriam, et modicè digerentem.

Θάλιτρον. THALICTRUM.  
CAP. XCIII.

THALICTRON folia coriandri habet, pinguiora paulo: caulem rutæ crassitudine, in quo folia. Quæ  
terre illitu antiqua ulcera ad cicatricem perducunt.  
Nascitur maxime in campestribus.

THALICTRON, si Ruellio credimus, berbærij in Ga-  
lia Argentinam appellant, quod argenteo micet coloratu, cæ-  
teris notis Thalictri picture adstipulantibus. Hec (ut ipse scribit)  
inuenitur ubiq; sepe in campestribus, et macerij. Verum cum  
mihi hætenus non contigerit eam herbam uidere, idcirco Ruellij  
sententiam non ausim probare, neq; etiam refellere. Thalictrom  
Thalietron nominat Galenus libro vi. simplicium medicamen-  
torum, ubi de eius uiribus in hunc modum differt. Thalietron  
folia habet coriandro similia, caulem crassitudine rutæ. Vis ei  
inest exiccatoria citra morsum: itaque ulcera inueterata ad ci-  
catricem perducit.

Βρύον θαλάσσιον. MUSCUS MARINUS. CAP. XCIII.

MARINUS muscus nascitur in scopulis, testaceisque hæud procul à mari, gracilis, capilla-  
ceus, caulis expers. Præcipua ei spissandi uis, & collectiones cohibendi, & podagras, quas re-  
frigerare opus sit.

Musci marini  
consider.  
Corallina.

Non possum eorum non probare sententiam, quæ dicunt Muscum marinum eam capillaceam esse plantam, quæ  
officinæ Corallinam appellant. Hanc circumforanei in puluerem contritam in plateis uendunt ad puerorum uermes  
necandos, mirisq; laudibus efferunt. Quæ in re nimirum cæteris præstat medicamentis: siquidem non modo interficit  
lumbricos, sed eos quoq; eadem die expellit, magna sepe cum astantium admiratione, quod quandoq; uisus sit puer,  
qui ex assumpta huius pulueris drachma centum uermes excreuerit. Crediderim itaq; Corallinam banc esse Muscum  
marinum, quod certò sciam, eam ab ijs reperiri, qui corallia expiscantur, eorallijs, sicuti etiam scopulis, et piscium  
testis inherentem, eo sanè modo, quo arboreus muscus arboribus ipsis innascitur. Is utiq; cæteris præfertur, quia co-  
rallijs adnascitur, unde ei nomen. Probatur secundo loco, qui saxi adhæret, colore rubicundo: cinereus uerò impro-  
batur. Sed marinum muscum hac pollere facultate non nouere ueteres: quandoquidem nusquam apud ipsos legimus  
marino musco inter aneorum uermes necari. Meminit huius Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, sic in-  
quiens. Muscus marinus compositus est ex terræ, et aquea essentia, utraq; frigida. Siquidem et gustum adstip-  
git, et calidis quibusuis illitus, ea euidenter refrigerat, et adiuvat.

Musci marini  
vires ex Gal.

Φύκος θαλάσσιον. FUCUS MARINUS. CAP. XCV.

EPHRAZ marini generibus, quoddam latum, & alterum sublongius, & rubens: tertium can-  
didum, nascens in Creta, floridum valde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia vim ha-  
bent refrigeratorem, non podagræ modò, sed etiam inflammationibus, in cataplasmatibus efficaciter  
utilem: uerùm ijs uti humidis conuenit, priusquàm exarescant. Nicander puniceum aduersus ser-  
pentes dedit. Hoc fucus quidam putant mulieres suum colorem mentiri, cum tamen sit radícula  
eiusdem nominis, qua sese fucant.

DE FVCO marino locutus est Plinius libro XIII. capite XXIII. ubi ita scriptum reliquit. Nascuntur in maribus fructus, arboresq; minores in nostro. Rubrum enim, & totus orientis Oceanus refertus est syluis. Non habet linguam: illud nomen quod Græci uocant phycos, quoniam alga herbarum magis uocabulum intelligitur: hic autem est fructus. Et libro XXVI. cap. x. Tria, inquit, Phyci thalassij, id est, Fuci marini genera, latum, & alterum longius, quod dicitur rubens: tertium crispis folijs, quo in Creta uestes tinguntur. haec Plinius. Ceterum cum Fuci genera mihi plane incerta sint, quid de ijs dicam non habeo. Non tamen deest suspicio, quin Fucus marinus si Alga non est, in eius saltem genere recenseri possit et debeat: nam Theodorus in Theophrasto non aliter Fucum marinum interpretatur, quam algæ nomine. Adde quod & Plinius alijs in locis Fucum marinum algam maris aliquando uocauit, ut etiam adnotauit Marcellus. Sed non ob hoc existimauerim, Fucum marinum eam uulgarem esse algam, in qua Veneti uasa uitrea recondunt, ne inter uchendum collidantur, & confringantur. Quod præterea Fucus marinus alga esse possit, illud argumento sit, quod nullum aliud, quod sciam, apud Latinos nomen inuenerit. Algæ species est, quæ & Vitis dicitur, hoc tantum inter se differentes, quod hæc palustris, lacustris, fluuiatilisq; sit: illa uero tantum in mari proximat. Quod discrimen illo uulgari uersiculo indicatur.

Fuci marini  
hist. ex Plin.

Alga uenit pelago, sed nascitur uulua palude.

Vnde etiam Virgilius libro sexto Aeneidis ita cecinit.

Tandem trans fluuium incolomes, uatemq; utrumq;

Informi limo, glaucæq; exponit in ulua.

Limosq; lacu per noctem obscurus in ulua Delitui.


Et libro secundo eiusdem.

Fuci marini mentionem fecit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, his uerbis. Phycos humens etiamnum, & uirens ex mari exemptus deficiat, & refrigerat ordine secundo: habet enim quiddam modice acerbum.

Fuci marini  
vires ex Gal.

ΠΟΤΑΜΟΓΕΤΟΝ. POTAMOGETON. ΠΑΝ ΚΥΑΝΕ ΑΡ. XCVI.

POTAMOGETON, folium betæ simile, hirsutum, paululum supereminens extra aquam. Refrigerat, & inspissat: pruriginibus utile, & contra ueterum ulcerum nomas. Nomen ex eo inditum est, quod palustribus, & aquosis enascatur.



POTAMOGETON lacubus, & paludibus innasci amat, ubi folijs betæ proximis, super aquam expansis in compluribus locis emicare inuenitur. Hanc herbam nos sæpe uidimus, & legimus, priuatim in lacubus quibusdam in Ananienfium agro, quam ibi unâ cum nymphæa aquis supernatantem deprehendimus. Potamogeton, ut testatur Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, adstringit, & refrigerat similiter polygono, sed essentia eius crassior, quam polygoni est.

Potamogeto  
nis confid.

Vires ex Gal.

ΣΤΡΑΤΙΟΤΗΣ. STRATIOTES. ΑΡ. XCVII.

STRATIOTES in aquis nascens, iisdem supernatat, & sine radice uiuit: vnde cognomentum traxit. Herba semperuiuo similis, ni maiora haberet folia. Quæ refrigerant: sanguinem, qui defluit à renibus, pota sistunt: vulnera, quæ inflammationem minantur, intumescere non sinunt: ignibus sacris, & tumoribus ex aceto illinuntur.



NON EST profecto quod miremur, si Stratiotes in Italia non prouenit. Quandoquidem ea, ut lib. XXIII. capite XVIII. Plinius testatum reliquit, est in Aegypto tantum, & inundatione Nili nascitur, atzoo similis, ni maiora haberet folia.

Στρατιώτης χιλιόφυλλος. STRATIOTES MILLEFOLIUM.  
 Sansiniblut. CAP. XCVIII.

STRATIOTES millefolium exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit: folijs auium pulli pennas imitantibus, breui admodum, dissectoque foliorum exortu. Folia syluestre cuminum simulant, præsertim breuitate, atque scabritia, breuiora paulò: densiore umbella, & pleniore. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modum anethi: flores paruos, & candidos. Nascitur in asperis agris, præcipuè circa semitas. Eximij vsus ad vlcera vetera, recentiaque, profluentem sanguinem, & fistulas.

MILLEFOLIUM MAIUS.

MILLEFOLIUM MINUS.



Stratiotes mil-  
 lefoliz confi-  
 deratio.

Stratiotes vi-  
 res ex Gal.


STRATIOTES in hunc usque diem Millefolij cognomen retinet. Planta est officinis notissima, in incultis proueniens, in pratis, & circa semitas, lignosis caulibus, dodrante maioribus, pluribus ab una radice prodeuntibus, quibus folia insunt auium nouellarum pennas similia, syluestriq; cumino æmula. Flores eius densiore umbella sustinetur, candidi, etsi nonnunquam in purpura rubescant. Ex his utique notis palàm est, communis usus Millefolium aliud dici posse, quàm Stratioten, de quo hic agitur, non autem, ut Brasauolus existimat, Myriophyllum infra à Dioscoride descriptum. Siquidem Myriophyllum caulis est tener, singularis, unica nixus radice: folijs plurimis, lenibus, fœniculo similibus. Quæ sanè omnia, ni fallor, apertissime ostendunt, Brasauolum hac in re hallucinatum esse. Stratioten hunc, & superiorem perstrinxit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, ubi de utrusq; uiribus ita disserit. Stratiotes aquaticus quidem humida, & frigida facultate est: terrestris uerò nonnihil habet adstrictionis: proinde sanè, & ulcera glutinare potest, & ulceribus esse utilis. Sunt qui eo & ad sanguinis eruptiones utantur, & ad fistulas.

Φλόμος. VERBASCUM. CAP. XCIX.

VERBASCUM differentias summas habet duas, hoc nigrum, illud album: in quo mas, & femina intelligitur. Fœminæ igitur folia sunt brassicæ, pilosiora multò, & latiora, candida: caulis albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus: flores albi, aut ex luteo pallefcentes: semen nigrum: radix longa, gustu acerba, crassitudine digiti. nascitur in campestribus. Verbascum, qui mas appellatur, oblongius, albis folijs, & angustioribus, tenuiori caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore, latioreque constaret folio. Syluestre folia fert saluix: altas uirgas, & lignosas,

VERBASCUM PRIMVM. *Verb.*

VERBASCUM SECVNDVM.



VERBASCUM TERTIVM.

VERBASCUM SYLVESTRE.



## VERBASCUM LYCHNITIS.



Verbasci genera, & consideratio.

Ruellij, & Fuchsij opinio reprobata.

Verbasci uires quædam.

Blattaria historia, & uires.

Verbasci genera, & uires ex Galeno.

gnosas, & circa eas ramulos, quales marrubium: flores luteos, auri æmulos. Sunt & phlomidides dicitur, hirsutæ, rotundis folijs, humiles. Tertia lychnitis appellatur, ab alijs autem thryallis, folijs ternis, aut quaternis, uel paulò pluribus, hirsutis, crassis, pinguibusque: apta ad lucernarum lumina. Radix priorum duarum adstringit: quare quod magnitudine ludicrum talum æquet, in alui profluvio, conuenienter ex vino datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fractis, anti-quæ tussi auxiliatur: dentium dolorè collutione mitigat. Verbascum, cui flos aureus, capillos tingit, & quocumque abijciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia aduersus tumores, & oculorum inflammationes illinuntur: syderatis ulceribus ex uino, & melle, cum aceto autem vulneribus medentur: contra scorpionum ictus sunt auxilio. Syluestris folia ambustis igni sunt cataplasmata. Aiunt in folijs eius, quam fœminam dicimus, aridos-ficus omnino non putrescere.

PRIMUM Verbasci genera, domestica scilicet duo, nulli non cognita sunt. Verum syluestre, quod folijs saluie similibus, aureisq; floribus prouenit, non omnibus sanè notū existimo. Viret tamen hodie Patavij in nobilissimo simplicium horto, quæ ad commune studiosorum commodum Illustrissimus Venetorum Senatus construi curauit. Quin nec fortasse Lychnitis, cuius etiam figuram hic damus, nouere multi. Reliqua uero, qui nobis demonstrauerit in Italia, hactenus reperi neminem. Et quæritur sint, qui putent, ut Ruellio, Fuchsio, & recentiorum alijs placet, eas uulgaris notitiæ plantas, quæ quibusdam Brachæ

culi, officinæ Prunulæ ueris, Germanis clauus sancti Petri, nonnullis uero herbæ paralytici appellantur, esse Dioscoridis Phlomidides, quæ hirsutis, rotundisq; folijs, humiles prostruant; eorum tamen sententiæ, licet eruditorum uariorum, baudquaquam adstipulari possum. Siquidem plantis ijs folia non insunt hirsuta, nec etiam rotunda, sed alteri Leuia, alteri uerò crispâ, lactuce, aut dipsaci modo. Adde quod florum, quos hæc Phlomidium genera proferant, nusquam, quod sciam, meminit Dioscorides, neque è ueteribus alijs, qui Verbasci genera recenscat. Id quod in herbæ paralytici, meo quidem iudicio, silentio inuoluendum non fuerat, cum hæc omnium prima suis aureis floribus emicet, uerq; nouum pronunciet: unde illi officinæ nomen imposuerunt. His recentiores uim efficacem tribuunt ad articulorum dolores. Radicis earum decoctum ad renum, & uescicæ calculos commendant. Succum quoq; tum potum, tum exterius illitus fractis, luxatisq; osibus utilem esse tradunt. Quo item ex floribus expresso utuntur mulieres ad erugendam faciem, eiusq; maculas detergendas. Sed ad legitima Verbasci genera redeamus. Hæc omnia in uniuersum, ut plures scitis periculis constat, omnibus ferè sedis morbis mirificè subueniunt: adstringunt enim, et exsiccant. Quamobrem feminis, & florum puluis, additis chamæmali floribus, & laricis resina, procidentem sedem suffitu cobibet, & tenax præcipue dysentericis tollit. Verbasci fœminæ folia inter lapides contusa; si equi claudicantis ex clauorum noxa ungui prius excauato imponantur, mirum dictu quam breui tempore is liber euadet. Radicis eiusdem succus, æteaquam caulem proferat, duarum drachmarum pondere ex Cretico uino haustus, in ipsa acceptionis hora (ut Arnaldus refert) quartanam fugat, cum hoc tamen, quod tribus, aut quatuor iteratis uicibus hauriatur. Succus tam florum, quam foliorum asperis uerrucis illitus, eas facillè delet, etsi leuibus nihil proficiat. Est & herba folialis Verbascum, quæ BLATTARIA Plinio nominatur libro xxv. cap. ix. ubi eam ijs uerbis depingit. Est simul Verbascum herba, quæ sæpe fallit pro ea capta, folijs minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hæc abiecta blattas in se contrahit, ideoq; Romæ Blattariam uocant. hæc Plinius. Eundem uerò effectum Dioscorides illi Verbasci generi assignauit, quod folijs saluie, & floribus aureis descripsit. Porro Blattaria passim ferè nascitur: folijs oblongis, per ambitum serratis: floribus tertium Verbasci genus maximè æmulantibus. Quibus decidentibus circa caulem filiculi exoriuntur parui, lini instar, duriores tamen, ac leuiore, in quibus semen continetur. De hac herba plures, quod uenerim, facultates non produntur. Sed cum ea gustu amara deprehendatur, hinc certò colligere licet, quod eadem & aperire, & abstergere possit. Verbasci genera, & uires memoriæ tradidit Galenus lib. viiii. simplicium medicamentorum, ubi ita scribit. Verbascum, quoddam folijs album est, quoddam uerò nigrum. Et albi aliud quidam est, cuius folia angustiora: aliud fœmina, cuius maiora. Est præterea aliud Verbascum syluestre cognominatū, quod floribus constat aureis, & luteis. Sed & præter has species alia est, quæ proprie phlomida, & thryallida nominatur. Priorum itaq; duarum radix gustu acerbâ est, & fluxionis affectibus prodest: sed & ad dentium dolorum eam quæ-



et collant. Attamen folia digerendi uim habent: sic et aliarum folia, et maxime eius, quæ aureos flores obtinet: quæ etiam spinulos rufant. Omnium enim folia deficcandi, et digerendi moderate uim possident.

## Αἰθιοπίας. AETHIOPIS. CAP. C.

AETHIOPIS folia habet verbasco similia, perquam hirsuta, densaq; in orbem circa radicem imam redacta: caulem quadrangulum, † scabrum, similem apiastro, aut arctio, multis concauum alis: semen erui magnitudine, geminum, in uno conceptaculo: radices ab eodem cespite numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu: quæ siccae nigrescunt, duranturque, ut cornua possint uideri. Plurima nascitur in Ida monte Troadis, & in Messenia. Auxiliatur purulentis excreationibus, ischiadicis, pleuriticis, arteriæ scabritijs, decocta radix, & pota: quin & cū melle, eclegmatis uicem præbet.



TAMETSI iampridem existimauerim, Aethiopidæ herbam in Aethiopia, et Ida Troadis tantum nasci, quod eam inibi plurimam gigni testentur Dioscorides, et Plinius; hoc tamen anno legitima, ni fallor, Aethiopsis ad me allata est Patavio ab erudito iuueni medico Ioanne Odorico Melchiorio Tridentino, quam, nulla prorsus reclamante nota, Aethiopidem referre deprehendi, ut eius pictura, quam hic damus, pulchre demonstrat.

Aethiopidis  
consider.

Aethiopidis non reperio meminisse Galenum in simplicium medicamentorum censu. quanquam eam memoriæ prodidit Paulus libro VII. ubi non plures de hac herba uires tradit, quam quæ Dioscoridi acceptæ referri possunt, cum ita scribat. Aethiopsis similia uerbasco habet folia. Radicis decoctum potum auxiliatur ischiadicis, pleuriticis, et sanguinem reiicientibus: arteriæ etiam asperitates cum melle lenit.

Aethiopidis  
uires ex Pau.

Hoc loco in uulgatis Græcis codicibus legitur τὰ ξύλα, hoc est, crassum. Quam uocem interpret Plinium fortè, ut solet, secutus omisit. Sed cur nos eam non adiecerimus, fecit Orbasius, quem in hoc Plinia adstipulari inuenimus.

## Ἀρκτίον. ARCTION. CAP. CI.

ARCTION, aliqui potius Arcturon uocant, similis est verbasco folijs, nisi quod hirsutiora, & rotundiora sunt: caule longo, molli: semine cumini, paruo: radice tenera, alba, dulci que. Decocta cum semine radix in uino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum: ambusta, pernionesq; fouentur eodem: bibitur aduersus coxendicum dolores, & stranguriam è uino.

CREDIDIT Ruellius, Arction eam esse plantam, quæ et secus uias, et in scrobium marginibus nascitur, quamq; officinarum uulgus Lappam minorem appellat. Sed Ruellius in hoc haud dubie, meo quidem iudicio, fallitur, neq; audiendus est. Siquidem, ut diligenter notas expendentibus perspicuum fiet, Lappa minor aliud profecto non est, quam xanthium inferius à Dioscoride representatum. Etenim Lappa minor folio uerbasci, eoq; hirsutiore non uisitur: neq; caulem profert longum, et mollem: quin nec semen cumino simile, neq; radicem teneram, ac dulcem. Ex quibus sane notis repugnans Ruellij opinio euidentissime refellitur. Nullam equidem hactenus herbam reperi, ac uidi, quæ Arctium legitime referat. Huius meminit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, ubi de eo ita scriptum reliquit. Arction illud, quod uerbasco est simile, radice tenera, candida, dulci: caule oblongo, et molli: semine cumino simili, facultatis est admodum tenuium partium, et ob id exiccantis, extergentisque, tamen modice. Quamobrem radix, ac semen eius cocta cum uino, quadantenus dolores dentium mitigant. Porro ambusta, et chymibz, non horum modo decoctum persusum, sed et caules teneriores sanare possunt.

Arctij confi-  
deratio.  
Ruellij error.

Arctij uires  
ex Galeno.

## Ἀρκτου. PERSONATA. CAP. CII.

PERSONATA folia habet cucurbitæ, maiora tamen, hirsutiora, nigriora, & crassiora: caulem albicantem, quanquam & interdum uidua caule reperiatur: radice intus candida, foris nigra. Hæc drachmæ unius pondere pota cum pincis nucibus, purulenta, & cruenta extusientibus auxiliatur:

Personatę cōsideratio.

*Lappa maior*

Plinii tutela.


Fuchij error.

Brasauoli hallucinatio.

Personatę uires ex Gal.



PERSONATA ALTERA.



PETASITES. PETASITES. CAP. CIII.

PETASITES pediculus est cubito maior, crassitudine pollicis, à quo prægrande folium, galeri modo amplum; ceu fungus dependet. Contra phagedænas, & vlcera, quæ cacoëthe vocantur, efficaciter illinitur.

Petasitis cōsideratio.  
Ruellij, & Fuchij opinio.

Vires ex Galeno.

QUANQVAM scribit Ruellius, nasci Petasiten in Gallia; non tamen uideo, quomodo quis recte eius sententiae subscribere possit ac debeat. Quandoquidem is Persolatam, de qua superiori capite differuimus, pro Petasite sumpsisse uidetur, quam etiam ipsum forte secutus Fuchius, pro eadem depinxit. Sed quoniam Petasites pediculum fuisse cubito proceriorem, à quo amplum folium, galeri figura, tanquam fungus, dependet, cui folium huius Persolae, uel Arctij generis minime respondere deprehenditur; hinc fit, ut horum aliqui doctissimorum uirorum sententiam improbandam esse existinem. Nobis haecenus ueram Petasiten non licuit inuenire. Atq; adeo mea sententia est, quod haec non nascatur in Italia, argumento; quod tam grande folium, tamquam nunquam latere potuisset. Petasitis uires per cjs reddidit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit, Petasites ex tertio est ordine defecantium. Quomobrem ad maligna, quæ cacoëthe uocantur, & phagedæna ulcera, et uentur.

E. STUARTIS.

xiliatur: trita dolores à contorsionibus artuum contractos, illitu sedat. Folia utiliter antiquis ulceribus illinuntur.

PERSONATAM, Plinio libro XXV. cap. IX. triseptidam Arcion uocant, cuius folio nullum est latius, grandes lappas ferentem. Ex quibus Plinij uerbis planum fit, Personatam eam nimirum plantam representare, quam officinae uulgo Lappam maiorem uocant, quod huic folia insint herbarum omnium maxima, longeque cucurbitina excedentia: quodque haec lappas grandiores ferat. Huius altera habetur species, quæ quidem folijs cucurbitas magis æmuletur, ijs tamen maioribus, in rigis, & scrobium marginibus proueniens, caule interdum uidua, non tamen perpetuo, quoniam ueris initio & caulem, & flores praefert, licet ijs subinde confestim exuatur. Ex huius folijs nostrates rustici pileos sibi consciunt, quibus à solis radijs se tuerant, dum Sirio ardente segetem uel metunt, uel triturant. Huius licet meminit Plinius loco citato, ubi eam non quidem Personatam, sed Persolatam appellat, sic scribens. Persolatam, quam nemo ignorat, Graeci uero Arcion uocant. Folia habet maiora etiam cucurbitis, & hirsutiora, nigrioraque, & crassiora: radicem albam, & grandem. Haec Plinius de Persolata. Ex cuius notis facile cognosci potest, Plinium hic secundum Personatæ genus descripsisse. Quo fit, ut maxime redarguendum putem Lencicenum, utpote qui Plinium in hoc perperam damnauerit, afferens non nisi unum Personatæ genus reperiri. Fuchius, & recentiorum nonnulli non dubitant, quin hoc Personatæ genus sit Petasites. Sed omnes, pace eruditorum dixerim, in errore versantur, ut proxima commentatione liquet. Ceterum Brasauolus in suo simplicium examine Lappam credidit esse Dioscoridis Aparineu, in hoc euidentius hallucinatus, quem ut eius error explodi debeat, ut etiam id dyudicare poterunt, qui in re herbaria etiam mediocriter uersati fuerint. De Personatæ sub alterius Arctij nomine differuit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, his uerbis. Alium uero Arctium, quod Prosopida uocant, cuiusque folia cucurbitæ simillima sunt, nisi quatenus tum maiora, tum duriora, discipit simul, & descripta, sed & adstringit medicamentum. Quomodo rem: folia eius ueteribus ulceribus uideri possunt.

ΕΠΙΠΑΚΤΙΣ. EPIPACTIS. CAP. CIIII.

EPIPACTIS ab alijs elleborine, parua herba, exiguis folijs. Iocineris vitijs vtilis, & contra venena pota.

EPIPACTIDA adeo paucis perstrinxerunt Dioscorides, ac ceteri, qui ante & post ipsum de plantarum historia scripserunt, ut difficile admodum sit decernere, quanam planta sit hæc in Italia, ubi fortasse ea non prouenit. Nam, ut Plinius lib. XIII. cap. XX. commemorat, Epipactis in Asia, & Græcia nascitur. Verum enimvero si Epipactis Elleborine ex eo dicta est, quod cum elleboro nigro similitudinem habeat, eam equidem crediderim nasci in Goritienfi agro. Quandoquidem inibi frequens quedam parua herba reperitur, cuius hic figuram damus, quæ folijs, floribus, & radicibus elleborum nigrum representat. Epipactidis inter simplicia, quod inuenerim, non meminit Galenus. Sed Paulus idem quod Dioscorides, de eius viribus tradidit.

Epipactidis consider.

ΚΑΡΝΟΣ. FUMARIA. CAP. CV.

FUMARIA fruticosa herbula est, pratenera, coriandro similis: folijs candidioribus, vndique numerosis, cineracei coloris: flore purpureo. Huius succus acris est: claritatē facit oculis, delacrymationemque: vnde nomen traxit. Illitus cum gūmmi, euulsas palpebras renasci prohibet. Commanducata herba biliosam vrinam trahit.

FUMARIA, herba vulgaris admodum notitie, officinis passim vocatur Fumus terre. Fumaria uero nomen sibi ascriuit, quod eius succo oculis immisso, quibus mirifice claritatem conciliat, lacrymas, quemadmodum & fumus, cieat. Debet hæc Mauritanis longè magis, quàm Græcis, quod illi eam pluribus commendauerint viribus, nec eis quidem contemnendis, ut Serapionem, Auicennam, & Mesuem legentibus facile patebit. Fumaria Plinio duo traduntur genera libro XXV. capite XIII. ubi ita scriptum reliquit. Capnos prima, quam pedes gallinaceos uocant, nascens in parietinis, & sepibus, ramis tenuissimis, sparsisque, flore purpureo, uiridis, succo caliginem discutit: itaque in medicamenta oculorum additur. Similis, & nomine, & effectu alia est Capnos fruticosa, pratenera, folijs coriandri, cineracei coloris, flore purpureo. Nascitur in hortis, & segetibus bordeacis. Claritatem facit inunctis oculis, delacrymationemque, euulsas palpebras renasci prohibet. hæc Plinius. Ceterum quanam altera sit Capnos, quæ etiā ab Aëtio describitur, superius libro tertio de Aristolochia, & Pistolochia differētes latius explicauimus. Eo igitur illos remittamus, qui plura de altero fumarie genere scire desiderant.

Fumariae consideratio.

Fumariae genera ex Plin.

Porro in notis, & Dioscoridi adscriptis simplicium nomenclaturis reperio Capnon quibusdā Corydalion appellari. Vnde factum est, ut in suspicionem uenerim, an de Capno intellexerit Galenus libro XI. simplicium medicament. ubi de galerita scribens, quæ Græcis corydos dicitur, Corydalios herba meminit, sic inquit. Adieci hæc sermoni, quod uellem clarè hoc animal, nempe galeritam, manifestare, quos ferat in capite pilos erectos: quandoquidem expertus sum eius aduersus colicos utilitatem, uelimque, qui ipsum non norunt, ijs bene monstratum. Nam & ipsa Corydalis appellata herba colicis conuenit. Et hoc quoque tibi obiter sit notatum, hæc Galenus. Sed iam ad Fumariae uires redeamus, quas primum ex Mesue sic ad sensum referant.

Fumariae uires ex Mesue.

maria



FUMARIA.



maria inter mitiora, innocentioraq; recensetur medicamenta, quibus deiectoria uis inest. uerum nimia huius herbe copia facit, ut eius quoq; auctoritas et pretium plurimum diminuatur. Hæc non modo alium soluit, sed et uiscera roborat, contrahitq; distentos eorum uillos. Omni prorsus noxa caret: quo fit, ut haurientibus nullum inferat incommodum. Roboratur deiectoria eius facultas, quod non admodum sit ualentior, additis myrobalanis, sena, capreo ferro, infectorio cocco, aut uuis passis. Præstat quæ uirentior, folijs extensis, non sanè crispis, et quæ uolacæ sufficere. Colligi debet uerno tempore, et ex eo succus exprimi. Sunt quæ hanc in uniuersum temperamento frigidam dixerint. Sed aberrarunt, quoniam in ipsa foliorum superficie reperitur et caliditas, quæ tamen eius frigiditatem non superat. Siccatur præterea ordine secundo, sed semen calidum est. Deprehenditur sanè eius caliditas ex amaritudine, et acedinis parte quadam modica, quæ gustu percipiuntur. Quapropter attenuat, penetrat, obstructions aperit, et deiectoriæ est facultatis. Sicuti frigiditatis, et acerbæ qualitatis adminiculo cohibet, aggregat, et roborat. Alia facile deijcit, bilem trahit, et adustus humores. Eius uis non modo ad hepar, sed et ad uenas diffunditur. Quamobrem sanguinem expurgat, omnibusq; incommodis medetur à bile, aut exustis humoribus prouenientibus. Prout de phantasi medetur, aduersus carcinomata efficax est: lichenas, et alia cutis uitia mirifice emendat: quin et multos morbis auxiliatur, qui ex uiscerum infectu originem ducunt. Roborat Fumaria uentriculum, iecur, et cetera interna uiscera, biliosasq; finit febres, quemadmodum et eas, quæ ex uasorum obstructione excitantur. Fumariae meminuit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, ubi de eius uiribus disserit his uerbis. Capnos, hoc est, Fumaria acris simul, et anaræ qualitatis est particeps, nec tamen planè expers est acerbæ. Quamobrem urinam biliosam multam prouocat, sanatq; iecinoris obstructions, et debilitates. Succus eius oculorum aciem acuit, non parum trahens lacrymarum, uelut ipse fumus: nam hinc ei appellatio indita. Plebeius quidam ea uti solebat ad stomachum roborandum, unaq; uentrem lubricandum. Siquidem herbam primum deficcata condebat: porro etiam uti uolebat, subductionis quidem gratia, melicrato inspergebat: at roborare uolens stomachum, uino nimirum diluto.


Fumariæ uires ex Gal.

### LOTVS VRBANA.

*Trifolium*



### LOTVS SYLVESTRIS.



Λωτὸς ὕμερος. LOTVS VRBANA.

CAP. CVI.

LOTVM urbana alij trifolium vocant. nascitur in hortis. Extractus succus, addito melle, oculorum argemata, nubeculas, cæterasque caligines discutit.

Λωτὸς ἀγελος.

LOTVS SYLVESTRIS.

CAP. CVII.

SYLVESTRIS Lotus, quam trifolium minus appellant, plurimum in Libya gignitur, caule bicubitali, & sæpe maiore, alis multis: folijs trifolij pratensis: semine fœni græci, multo minore, gustu

# In Lib. quartum Dioscoridis. 505

re, gustu medicato. Vim calfaciendi, & leniter adstringendi obtinet: vitia cutis in facie, maculasque cum melle peruncta expurgat. Trita per sese, aut cum malux semine, in vino, aut passo bibitur apertissime contra dolores, qui vesicam malè habent.

12 **NULLA** certe hæcenus nobis sese obtulit herba, cui meritò subscribi possit: hæc est uera ac legitima Lotus scilicet. Nam etsi non desint, qui putent, eam plantam esse Lotum urbanam, quam vulgares herbarij, & officinæ Melilotum falso appellant, utpote quæ folijs constet trifolij effigie, nascaturq; non in pratis tantum, sed etiam in uiridarijs & hortis; eorum tamen sententiam cur planè probem, aut refellam, nihil equidem habeo, cum ij sua potius opinione ducti, quam rationibus aut auctoritatibus niti uideantur. Inclinat tamen animus ad credendum, quòd ita ut illi rentur, facile esse possit. quandoquidem vulgaris Melilotus & in hortis prouenit, & folia trifolio proxima profert: quin & eorum notissima est herba, quemadmodum Lotum urbanam olim fuisse aperte innuit Dioscorides, qui eam ut triuialem ideo non depinxit. His illud etiam accedit, quòd in hunc usq; diem proprium ferè seruauerit nomen, eo tantum aucto ex Loto in Melilotum. Vnde postea facile factum esse potest, ut eadem legitima meliloti locum occupauerit. Syluestris uerò Lotus, quam copiosam in Libya gigni tradidit Dioscorides, an nascatur in Italia, non ausim affirmare. Equidem herbam quandam sæpius uidi, ac legi in incultis, & pratis nascentem, folijs trifolio æmulis, bicubitali caule, quam plurimis adnatis, luteis floribus, è quibus cornicula prodeunt semine plena, foeni græci modo, odore non ingrato. Sed an hæc sit uera Lotus syluestris, nondum compertum, & exploratum habeo. Loti utriusq; uires reddidit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Lotus domestica, quam quidam triphyllon, hoc est, trifolium nominant, ut mediocriter concoquendi uim possidet, sic etiam exiccandi: in caliditatis, frigiditatisq; coniugatione media quodammodo est, & temperata. Lotus autem agrestis plurima in Libya prouenit. Semen eius secundi est ordinis excalfaciendum, habetq; nonnihil absterforium.

Loti utriusq;  
consider.

Loti utriusq;  
uires ex Gal.

## ΚΥΤΙΣΟΣ. CYTISVS. CAP. CVIII.

**CYTISVS** frutex est albus in totum, ut rhamnus, ramos spargens cubitales, & maiores: in quibus folia foeni græci, aut loti trifoliz, minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita erucam olent, gustataque cicer recens sapiunt. Folia refrigerant: tumores inter initia discutiunt, si cum pane trita illinantur. decoctum potu urinam ciet. Non. Ili, quòd apes alliciat, prope aluaria ferunt.

36 **CREDIDIMVS** iandudum Cytisum, si tamen is in Italia proueniret, non aliam esse plantam, quam eam Trifolij odorati speciem, quæ Romanis uulgò appellatur Tribolo, alijs uerò Trifoglio cauallino, hoc est, Trifolium equinum, eo quòd equis gratissimum sit pabulum, cum nulla sanè mihi occurreret plàta, quæ magis notis omnibus Cytisum præ se ferre uideretur. In hanc opinionem me primum deduxerat Plinius, quòd scripserit, iumenta degustato Cytiso bordem spernere. Nam cum certò scirem, equos adeò huius Trifolij genere auidos esse, ut eo magis delectètur, quam bordeo, auena, & reliquis frugibus; idcirco uidebar non temerè adduci, ut crederem, hanc stirpem legitimum esse Cytisum, præsertim cum pluribus constet notis, quæ Cytiso respondent. Huc præterea alia accedebat ratio, quòd cum Dioscoridem uiderem de Cytiso inter herbas, non autem inter frutices, & arbores differere, non aliud quidem mihi persuadere poteram, quam quòd Cytisus esset herba potius, quam arbor: præcipue cum palàm sit, iumenta herbis, & fenum potius depasci, quam arborum frondem. Siquidem eruo, et medica herbis antiqua etas armenta, & pecora alebat, ac saginabat. His itaq; rationibus fretus (tunc enim plura neglexeram inuestigare) adductus eram, ut existuarem, illud Trifolij genus odoratum omnino esse Cytisum. Verum enimuero cum postea rem hanc accuratius, rectiusq; expendissem, me in errore uersari deprehendi. Proinde in præsentia non grauabor priorem mutare sententiam, constanterq; affirmare, aliam ob illa planta Cytisum esse: nec eam quidem herbam, sed fruticem, qui cultura arborescat. Non enim is sum, qui opinionis alicuius sustinende gratia adeò pertinax esse uelim, ut falsum magis, quam uerum tueri contendam. Sed quòd iure putem in aliam me deuenisse sententiam, facit in primis Galenus libro primo de antidotis, ubi Cytisum fruticem esse myrti magnitudine scribit, his uerbis. In Mysia quoq; qua parte nostræ provincie finitima est, tractus occurrit, quem Britton nominant, in quo mel Attico persimile magna cum admiratione conspexi. Extabat enim ibi quoque collis quidam non magnus, saxosus totus, thymo, & origano refertus: alibi locus erat Cytiso plenus. Apes plurimum mellis ex Cytisi floribus excerpere scriptores uno ore tradunt. Fruticosa uerò planta Cytisus est, eam altitudinem attingens, ad quam myrti crescunt. hæc Galenus. Est deinde Plinius, quem Galeno subscripsisse inuenio libro XII. cap. III. cum inquit. Alterum est ebeni genus fruticosum, Cytisi modo, & tota India dispersum. Et libro XVI. capite XXXV. ubi inter arbores Cytisum enumerat, scribens. Tota ossæa est, ilex, cornus, robur, Cytisus, morus, lotus, & quæ sine medulla esse diximus. Accedit his etiam Columnella, qui idem testari uidetur in calce libri V. ubi cum longius de Cytiso differuisset, demum inquit. Hæcenus de arboribus præcepisse abunde est. Horum itaque probatorum auctorium testimonio planum fieri arbitror, Cytisum arboreum esse fruticem myrti modo, ut Galenus scriptum reliquit. Sed mihi quidem hæcenus inter Italicos frutices, qui arboris instar adolescunt, nullū contigit inuenire, qui legitime Cytisum refert et. Caterum nō desunt, qui sibi persuadeant, atq; etiā scriptis tradant, se Cytisum uidisse, legisseq; in Italia in syluis, alijsq; syluestribus locis, qui per se tantum proueniat. Sed equidem dubitauerim, ne & ipsi decipiantur: quandoquidem ij, quantum ex eorum scriptis colligi potest, Coluteam sic Theophrasto uocatā sumunt pro Cytiso. Neq; propterea illud dixerim, quòd putem Cytisum sua

Cytisi confi-  
deratio.

Cytisus fru-  
tex est, non  
herba.

u u sponte



Cytisi histo-  
ria ex Col.

sponte non provenire, cum teste Columella lib. ix. cap. lxxii. de re rustica, duplex sit Cytisus, una sativa, et altera spontis: sed quod scribat Plinius, raram esse in Italia. De sativa autem Cytiso diligentissime scripsi idem Columella lib. v. de re rustica, capite ultimo, cuius hic verba subijciam. Cytisum, inquit, in agro esse quam plurimum maxime refert, quod gallinis, apibus, capris, bubus quoque, et omni generi pecudum utilissimum est, quod ex eo cito purgatur, et lactis plurimum prebet ovis: tum etiam quod octo mensibus viridi eo pabulo uti, et postea arido possis. Preterea in quolibet agro, quanvis macerrimo, celeriter comprehendit: omne iniuriam sine noxa patitur. Mulieres quidem si lactis inopia premuntur, Cytisum aridum in aqua macerari oportet, et cum tota nocte permaduerit, postero die expressi succi ternas heminas permisceri modico uino, atque ita potandum dari: sic et ipse valebunt, et pueri abundantia lactis confirmabuntur. Satio autem Cytisi vel autumnum circa idus Octobris, vel vere fieri potest. Cum terra bene subegeris, areolas facito, ibique velut ocymni semen Cytisi autumnum serito. Plantas deinde vere disponito, ut inter se quoque versus quatuor pedum spatia distent. Si semen non habueris, cacumina Cytisorum vere deponito, et stercorata terram circumaggerato. Si pluvia non incesserit, rigato quindecim proximis diebus, simul atque novam frondem agere coeperit, sarrito, et post triennium deinde cedito, et pecori prebeto. Equo abunde est uiridis pondus xv. bubus pondus uicena, ceterisque pecoribus pro portione uirium. Potest etiam ante Septembrem satis comari ramis Cytisi feri, quoniam facile comprehendit, et iniuriam sustinet. Aridum si dabis, parcius prebeto, quoniam vires maiores habet, priusque aqua macerato, et exemptum paleis permisceto. Cytisum cum aridum facere uoles, circa mensem Septembrem, ubi semen eius grandescere incipiet, cedito, paucisque horis, dum flaccescat, in sole bibeto: deinde in umbra exiccato, et ita incondito. haftenus Columella. Plinius quoque, Cytisi historiam copiose prosequitur libro xlii. cap. xxlii. ubi haec habet. Frutex est et Cytisus ab Aristomacho Atheniensi miris laudibus predicatus pabulo ovium, aridus uero etiam suum: spondetque iugero eius annua H—S. MM. uel mediocri solo reditus. Utilitas quæ eruo, sed ocior satietas, perquam modico pinguescente quadrupede, ita ut iumenta hordeum spernent. Non ex alio pabulo lactis maior copia, aut melior: super omnia pecorum medicina à morbis omni usu prestante. Quin et nutritibus in defectu lactis aridum, atque in aqua decoctum, potui cum uino dari iubet, et firmiores, celsioresque infantes fore. Viridem etiam gallinis, aut si aruerit madefactum. Apes quoque nunquam desere, Cytisi pabulo contingente, promittunt Democritus, et Aristomachus. Nec aliud minoris impendii est. Seritur cum hordeo, ad are semine ut porrum, uel caule autumnum ante brumam. Si semine madidum: et si desint imbres, satum spargitur. Plantæ cubitales feruntur scrobe pedali. Seritur post æquinoctia tenero frutice: perficitur triennio: demittitur uero æquinoctio, cum florere desit, uel pueri uel anus uilissima opera. Cuius aspectu, breuiterque si quis exprimere similitudinem uelit, angustioris trifolij frutex. Datur animalibus post biduum semper: hyeme uero quod inaruit, madidum. Satiant equos denæ libræ, et portione minora animalia: obiterque inter ordines allium, et cepe feri ferale est. Inuentus hic frutex in Cythno insula, inde translatus est in omnes Cycladas, mox in urbes Græcas, magno casu prouentu. Propter quod maxime miror raram esse in Italia. Non æstium, non frigorium, non grandinum, aut minus iniuriam expauescit. hæc Plinius. Ceterum de Trifolio illo odorato, cuius superius mentionem fecimus, neque Dioscorides, neque Galenus, quod sciam, quicquam memorie prodiderunt. Non desunt, qui id uelint esse Theophrasto plantam Mel frugum appellatam, quam ipse inter loti genera recenset libro vii. cap. xlii. de plantarum historia, ubi sic inquit. Quædam enim formis pluribus constant, quanquam nomen unum sortiantur, ut ita ferme æquiuoca sint, ceu lotus. Huius enim genera plura redundant, folio, caule, flore, fructuque discreta. Inter quæ uel illud reddatur, quod Mel frugum appellatur, diuersum tum uiribus in usu cibario, tum quod non eadem loca desideret. hæc Theophrastus. Quæ sane illorum sententiam mihi probare non uidentur, quod Trifolium odoratum minime in cibus ueniat, et iisdem in locis nascatur, in quibus lotorum omne genus uirescere conspicitur. Atqui Plinio libro xlii. cap. ult. mo, nil aliud est Mel frugum, Dioclis testimonio, quam panicum. Cytisi uires Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, reddidit his paucis uerbis. Cytisi folia digerendi facultatem obtinent aquæ temperatæ mistam, sicut et malæ folia.

Cytisi histo-  
ria ex Plin.

Opinio quo-  
rundam.

Cytisi uires  
ex Galeno.

## ΛΟΤΟΣ ΑΙΓΥΨΙΟΣ LOTVS AEGYPTIA CAP. CIX.

EST in Aegypto lotus, quæ in campis flumine inundatis prouenit, caule fabæ: flore papauo, candido, lilio simili, quem tradunt occidente sole comprimi occludique, ad ortum autem aperiri: adduntque, caput ipsum uespera aquis condi, & ad exortum solis emergere. Caput quale papaueris, maximum: & intus grana, ceu milij, quæ Aegyptij exiccant, & in panes coquant. Radicem lotos hæc habet, mali coronei similitudine, quæ cruda cocta que manditur: decocta que lutei oui qualitatem exhibet.

Loti Aegy-  
ptiæ historia  
ex Theophr.

LONGAM satis historiam de Loto Aegyptia posteritatis memorie tradidit Theophrastus libro iiii. cap. x. de plantarum historia, cuius hic uerba referam. Qui Lotus, inquit, uocatur, planis parte maxima prouenit, cum riuus inundatur. Huic natura caulis similis fabæ, et fructus eodem modo, uerum minores, gracilioresque. Nascitur fructus in capite, modo quo in faba: flos candidus, lilijs foliorum angustia proximus: multi, ac densi promiscui exsunt. Sole occidente se comprimunt, caputque integunt, ad ortum aperiuntur, et super aquam assurgunt: idque factum, dum caput perficiatur, floresque defluant. Capitis magnitudo quanta papaueris maximi, et percingitur incisuris non alio modo, quam papauer: nisi quod in his fructus frequentior habetur, qui milio non absimilis est. In Euphrate caput, floresque

florēs; mergi referunt, atq; descendere usq; in medias noctes, tantumq; abire in altum, ut ne demissa quidem manu capere su, diluculo deinde redire, & ad diem magis: sole oriente iam extra undas emergere, floremq; patefacere: quo confecto amplius insurgere, ut planè ab aqua absit altè. Aegyptij capita ipsa aceruis putrefaciunt, cumq; tegumētis puerunt, in flumine lauando separant fructum, & siccantes, pinfentesq; panem faciunt, eoq; cibo utuntur. Rarior loti Corfion appellata, rotunda est, cotonei mali amplitudine, cortice nigro, quali nux castanea tegitur. Corpus internum candidum: elixum, assumq; in specimen albuminis uertitur, gratum cibus: manditur etiam crudum, sed grauius decoctum seu aqua, seu pruna. Hactenus de Loto Aegyptia Theophrastus. Ceterum hanc, & supradictas Loti species Serapio sua lingua Handachochan indifferenter nominat. E cuius semine oleum exprimitur Mauritanis et articularum dolores expetitur. Neq; enim sit Handachochæ oleum ex uulgaris trifolij semine, ut quidam aberrantes existimant, sed ex omnium Lotorum semine, & ex eo tantum trifolio, quod asphaltiten Græci uocant. Loti Aegyptiæ breuiter meminit Galenus inter alias lotos, libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Loti Aegyptiæ semen in panes quidem cogitur.

Arabum Handachocha.

Lotus Aegyptiæ ex Gal.

## MYRIOPHYLLON. Sanson. MYRIOPHYLLON ALIVD.



Myriophyllum. MILLEFOLIUM.

CAP. CX.

MYRIOPHYLLUM, siue millefolium, caulis est tener, singularis, unica nixus radice: plurimis folijs, læuibus, fœniculo similibus, unde nomen accepit. Caulis flauescit, uariis, ac necturi ex industria deliniatus. nascitur in palustribus. Vulnera recentia ab inflammatione uindicat, si uel uiride, uel siccum ex aceto oblinatur: præcipitatis in potu cum aqua, & sale datur.

ET SI non desunt, qui uelint Myriophyllum, ut superius in Stratiotis millefolij commentatione diximas, esse uulgare Millefolium, quo omnes passim utuntur in Italia; tamen cum hoc plurimis caulibus à radice prosciliat, folijs constet à fœniculo diuersis, nascaturq; in pratis & incultis, non autem in paludibus, hinc satis perspicuum fieri puto, hos qui ita sentiunt, in errore uersari. Equidem legitimum Myriophyllum me inuenisse, & sepe uidisse crediderim in uallis Ananie palustribus, unico tantum caule, uniuersis foliolis referto, capillacis fœniculi modo, odore non ingrato. Huius plantæ hic picturam damus, aliamq; appropinquamus ad nos Pisis missam ab eruditissimo uiro Luca Ghnio. Myriophylli uires paucis perstrinxit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Myriophyllum usque adeo desiccatorie est facultatis, ut uulnera glutinet.

Myriophylli confider.

Myriophylli uires ex Gal.

Εν τριτοῦ Μύρρης. MYRRHIS, *Urtica* *Embol* CAP. CXI.



Myrrhidis cō-  
sideratio.

Angelicae hi-  
storia, & ui-  
res.  
supra 36

Myrrhidi ui-  
res ex Gal.

MYRRHIS simillima est cicutæ, caule, folijsque: radix ei oblonga, mollis, rotunda, odorata, cibo non insuavis. Quæ pota in uino, phalangiorum moribus auxiliatur: cit menstrua, & partus secundos, purgatque à puerperio fœminas: subuenit & phthificis cocta in sorbitione. Aiunt quoque eandem bis die terte potam ex uino, in pestilentia salutarem esse, & de morbi contagia sentiantur, obflare.

GIGNITUR in quàm plurimis Italie locis planta quedam cicutæ faciem representans, minor tamen, minusque græuolens, Cicutariis nonnullis uocata, quàm quidam censent legitimam esse Myrrhim. Sunt deinde, qui pro Myrrhida Angelicam uulgò appellatam accipiant. Alij uerò, ut Manardus, illud oleris genus intelligunt, quod Cherefiliu uocant. Verumtamen hoc, meo iudicio, nullis notis Myrrhida refert, sicuti nec illa: tamen si huius radix à recentioribus in pestilentia miris laudibus commendetur. Quod autem Angelica non sit Myrrhis, ex eo eidentissimum esse arbitror, quod ei folia sint satiuæ pastinacæ similia, non quidem multifida, ueluti cicutæ. Ceterum si Myrrhis Italia prouenit, nulla sanè mihi hactenus sese obtulit planta, quæ magis illi respondeat, quàm hæc, cuius hic effigiem præstitimus, quæ quidem longè ab Angelica differt. Sed quoniam ANGELICAE mentio incidit, ne tam præstantissimam plantam silentio prætereamus, hic fusius de ea nobis differendum est. Hæc itaque planta cubitalem excedit altitudinem, caule geniculato, inani, multis alarum cauis repleto: folia profert oblonga, per ambitum serrata, in nigrum uirescentia: flores albos, in umbellam coherentes: è quibus semen prodit tenue, lentum modo com-

pressum. Radix ei subest crassa raphani modo, quæ in plures diuaticatur ramos, gustu acris, & suauiter odorata.

Excalfacit, pariterque desiccet ordine secundo completo, aut tertio incipiente. Proinde aperit, attenuat, & discutit. Venenis mirificè aduersatur: quare pestilentiam arcet hausta, aut frequenter commansa. Ipsa per se sumpta pituitosos, lentosque humores digerit. Idem præstat & radicis decoctum. quod etiam celerius ex frigore tuſcentibus auxiliatur: expectorat enim efficaciter crassam, lentamque pituitam. Sanantur eodem ex aqua, aut uino interna uiscerum ulcera, concretusque sanguis dissoluitur, & roboratur uenterculus. Radix in puluerem trita animi deliquis, & cæteris cordis affectibus opem unice præstat. Valet ad rabiosorum, & uenenosorum morsus, exterius cum resina composita, & intro in corpus assumpta. Hinc fit, ut recentiores quidam magna opinione hanc suis inserant antidotis.

Myrrhidi iam suas reddamus uires ex Galeno, qui eas lib. VII. simplicium medicamentorum, his uerbis descripsit. Myrrhis, quidam myrrham nominant. Radicem habet odoris iucundi, & dulcem, quæ menses mouet, & ea quæ in thorace, ac pulmone sunt, expurgat. Itaque ex secundo ordine fuerit excalfacientium, aduincta quadam parum tenuitate.

Μύαγρον. MYAGRUM.

CAP. CXII.

MYAGRUM, aliqui melampyron uocant, herba est surculacea: folijs rubiæ, pallidis, tripedanea: semen oleosum, fœno græco simile. Quod contusum igni torrent, peruncis que uirgis ad lucernarum lumina utuntur. Hoc pingui, scabritias corporis læuigari, atque expoliri constat.

Myagri con-  
sideratio.

Quorundam  
error.

Myagri uires  
ex Galeno.

SCRIBIT Ruellius, Myagrum frequentissimum nasci in Gallia, eiusque semine agros bene subactos perinde quasi napsi feri: quin & sue spontis inter segetes inueniri. Ex semine autem oleum exprimi ait, quo non ad lumina tantum lucernarum, sed ad ciborum quoque condimenta pauperes utuntur. Addit id à suis Cameliam, aut Camelinam uocari. Sed ipse non equidem Ruellio ausim subscribere: quandoquidem non pudeat fateri me hactenus Myagrum non uidisse in Italia, quod Dioscoridis delineationi respondeat. Ceterum eos haud dubie falli crediderim, qui putant, uulgare illud aurei coloris semen, quod aliqui Drodan, Drodellam alij, nonnulli uerò Dorellam dicunt, leguminum referre Myagrum. Siquidem hoc folijs rubiam non emulatur, sed syluestrem erucam, ut quæ laciniata spectentur: nec semen profert fœno græco simile, sed papaueris modo exile. Myagri semen, ut testatum reliquit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, pingue est, Quare si tundatur, oleosum quid effundit, quod emplastrum obtinet.

ONAGRA, siue onothera, aut onuris frutex est arboris instar, prægrandis, amygdalino folio, sed latiore, lilio non dissimili: flore rosaceo, magno: radice candida, longa, cum siccata est, vinum olente. nascitur in montibus. Aqua, in qua radix maduerit, in potu data, feras mitigat, & cicures facit. illitu quoque tetra viscera mulcet.

TAMETSI memorie prodiderit Theophrastus lib. ix. cap. xxi. de plantarum historia, Oenotheræ radicem è vino potam mitiores, hilarioresq; mores conciliare; nullum tamen, qui eam mihi ostenderet, hæcenus licuit repetere, quantum ad mitigandam omnium animalium feritatem, nedum hominum quorundam, esset optimū, utilissimūq; remedium. Ceterum ad me scripsit clarissimus medicus Lucas Gbinus Forocorneliensis, sæpius ex Apennino in uiridarium suum transtulisse plantam homine procuriorem: folijs amygdalæ, maioribus tamen: flore rhododendri: semine perquam minuto, exilibus teretibusq; siliquis contento, molli ac candida lanugine obuoluto: radice subalbida, longa, subter humum repente. Quæ sanè omni ex parte Onagram referre uidetur, etsi ipse quoq; pro certo non ausit asserere, hanc legitimam esse Onagram, cum hæcenus experientia compertum non habeat, an huius radix sicca vinum redoleat, mitigetq; feras aqua, in qua maduerit, pota, ut Dioscorides testatur. Onagræ meminit Galenus lib. viii. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Onagron, aut onothera, aut onothuris, huius radix arefacta uinosum quoddam redolet: sed ex uini maxime facultatis est.

Onagræ consideratio.

Onagræ uires ex Galeno.



CIRSIVM, caulis est tener, duorum cubitorum, triangulo similis: ab imo foliola, rosæ speciem referentia: anguli spinosi, per intervalla molles: folia buglosso similia, longiora, subcandida, modicè hirsuta, partibus extremis aculeata: cacumen caulis orbiculatum, hispidum: in quo capitula in summo purpurea, quæ soluantur in lanugines. Radicem huius loco laboranti adalligatam, dolores uaricum sedare Andreas scripsit.

CREDIDERE recentiores quàm plurimi rei herbarie periti, nil aliud esse Cirsium, quàm vulgare Buglossum. Sed mihi planè hæc sententia, pace eorum, dixerim, refellenda potius, quàm probanda uidetur: quod Buglosso caulis triangulus non insit, sed rotundus: quod ab imo foliola per ambitum aculeata rosæ speciem non referant, sed longa, & continua: prodeant: quod deniq; Buglosso flores non evanescent in pappos, sed languescentes integri decidunt, relicto in folliculis semine. Plantam, quàm proculdubio Cirsium referre putamus, nuper Pisis ad me misit clarissimus medicus Lucas Gbinus, cuius etiam hic figuram damus. Nascitur, ut ipse scribit, in uliginosis locis. Ea, meo quidem iudicio, Cirsio maxime adstipulari deprehenditur. Cirsij nusquam, quod legerim, meminerunt in simplicium censu Galenus, & Paulus.

Cirsij consideratio.

ASTER Atticus cauliculus lignosus, florem in cacumine habens purpureum luteūve, per ambitum diuisum, anthemidis modo, capitulum, foliolis stellæ modo radiatis: quæ autem caulem ambiunt folia, oblonga sunt, ac hirsuta. Feruenti stomacho, oculorum inflammationibus, procidux sedit, ac inguinibus illitu auxiliatur. Tradunt purpureum florem, si ex aqua bibatur, anginis, & pueris comitiale malum sentientibus, opitulari. Inguinum inflammationi recentem illinire conuenit. Si aridus flos sinistra dolentis manu decerpatur, & inguinibus adligetur, dolore liberat.

Asteris Attici  
confid.

ASTER ATTICVS.

Serapionis et  
raturum.


Amellus Vir  
gilij.

Amellus Vir  
gilij.

Asteris Attici  
uires ex Gal.

Stellariæ hi-  
storia, & ui-  
res.

Alchimilla  
Pes Leonis  
Cinnamo  
Zinnibis



ASTER Atticus, qui et Bubonion, hoc est nostris la-  
guinalis, dicitur, sibi Attici nomen ascribit, quod in Atheniensi  
agro frequentior, quam alibi proueniat. Bubonion uero, et la-  
guinalis dicta est herba, quod bubonum, siue inguinum præci-  
puum sit remedium. Asteris porro appellationem accepit, quon-  
iam eius capitula, in quibus flores etiam emali vultu et  
per ambitum diuisa foliis stelle modo radiata spectantur. Ple-  
ta est hodie non paucis cognita. Nascitur in asperis, incultis, et  
conuallibus. Hanc Serapio (ut libro tertio in eryngij men-  
326 ne prodidimus) cum Eringio confudisse deprehenditur, flos-  
similitudine falsus, qui in utraq; planta stelle figuram præse-  
runt. Ceterum non est pretereundum, quod nonnulli Diosco-  
ridis codices reperiuntur, in quibus hoc capite plura leguntur,  
quam supra sint reddita. quæ quoniam à doctissimis uiris Dio-  
scoridi accreuisse comperta sunt, ideo nos quoq; ea, utpote alio-  
citia omisimus. Quod autem adscititia sint, testimonio esse pos-  
sunt Galenus, Oribasius, Paulus, et Serapio, in quorum libris  
illa, quæ redundant, nusquam leguntur, est reliqua, ut solent,  
bona fide referant. In cuiusdam tamen Apuleij libello de plantarum  
historia et uiribus scripto, nonnulla habentur capite de As-  
tere Attico, quæ inde facile, quod ferè eadem esse uideantur, hæc  
adiecta sunt: sic enim uerba illa sonant. Stellarum radij nobis  
bus collucunt: quare qui naturam stirpis ignorant, inane sinu-  
lacrum se uidere putant. Reperitur à pastoribus peculium.  
Aster Atticum à Virgilio quoque celebratum fuisse existimamus  
libelli Georgicorum, ubi Amellum, quem florem ita ab agri-  
colis uocari ait, herbamq; eius descripsit. Id quod suis luculen-  
tissimis et minimis aperte testatum reliquit, dum ita cecinit.

Est etiam flos in pratis, cui nomen Amello  
Fecere agricolæ, facili quærentibus herba:

Namq; uno ingentem tollit de cespite foluam.  
Aureus ipse, sed in folijs, quæ plurima circum  
Funduntur, molè subluet purpuræ nigre.  
Sepe deion nexis ornata torquibus are  
Aster in ore sapor: tonsis in uallibus illum  
Pastores, et curua legunt prope flumina Melle.

Asteris Attici recens herba (ut Cræteus tradit) cum axungie senio tusa rabiosi canis morsibus utiliter imponitur.  
Turgentia guttura discutit, et incensa serpentes fugat. Huius meminit Galenus libro vi. simplic. medicament. ubi  
eius uires retulit his uerbis. Aster Atticus, alij bubonion uocant, non ob id tantum quod illatum, sed etiam quod su-  
spensum bubonas sanare creditur. Habet quiddam etiam digerens, habet uero non minime et refrigerans quiddam,  
de-reprimens, adeo ut mistæ sit facultatis, uti rosa: uerum id non adstringit. hæc Galenus. Sed quoniam At-  
tica stella mihi in mentem redegit Stellariam recentioribus uulgò uocatam, cum et ipsa uiribus non uulgaribus sit  
prædita, eam minime silentio dissimulandam duximus. Est igitur STELLARIA, quam alij Pedem leonis, alij  
Alchimillam uocant, planta, quæ ut plurimum in montibus prouenit, præsertim in pratis, folijs malue forme similibus,  
duriusculis tamen, et crispioribus, angulis octo distinctis, prominentioribus, et per ambitum serratis, adeo ut  
latius aperta stelle formam referant. Caulis ei tenuis, semicubitalis, à quo plures exeunt ramuli, in quorum summitate  
flores emicant subpallidi, tenues, stellarum effigie. Radice nititur, quæ crassitudine digitum æquat, et longitudine  
palmum excedit. Erumpit hæc Maio mense, Iunio uero floret. Efficax est pota sanandis non solum internis uiscerum  
uulneribus, sed et sinuosis ulceribus: quinetiam extrinseca uulnera glutinat. Expeditur Germanis chirurgis, mi-  
risq; laudibus celebratur: quippe qui eam felici successu uulnerum potionibus admisceant. Aride puluis in suæ ipsius  
decocto, aut cum aqua eius stillatitia sumptus, enterocelis medetur. Datur idem puluis ex uino, aut iure cochlearis  
mensura, quindecim aut uiginti diebus, mulieribus, quibus adempta sit concipiendi facultas à nimia uteri humiditate,  
quæ iniectionem semen contineri prohibet. Stillatitia eius aqua epota, tum etiam in uuluum indita, alba mulierum pro-  
fluentia mirifice sistit: adeo ut eius quoq; diutina iniectione corruptæ ab incorruptis uix dignosci possint, restrictis mi-  
rum in modum foemineis locis: quod tum celerius, tum efficacius præstat, si in eius decocto insideant. Quoniam et la-  
xus procidentesq; mulierum mammas contrahit, et duras solidasq; efficit, si lintea in eius decocto, aut stillatitia aqua  
intincta mammae sæpius imponantur, diutiusq; importentur, præsertim hypocistide, equisetis, hypteryis, succisq;  
rosis admixtis.



ISOPYRON aliqui phasiolon ob similitudinem vocant, quoniam folium, quod est aniso simile, in pampinos torquetur: capitula sunt in summo caule, tenuia, plena feminis, melanchij gustum imitantis. Contra tussim, & cetera pectoris vitia, semen ex aqua mulla bibitur: hepaticis, & sanguinem excreantibus vtile.

HACTENVS, ut ingenuè fatear, mihi non contigit verum Isopyrium inuenire, neq; ab aliquo compertum videre. non tamen negauerim, quin illud nascatur in Italia. Quare si hac nostra etate nobis non sese offeret, id posseris inquirendum relinquent, qui fortasse diligentius in hac studia incumbunt, ut earum rerum, quæ nos latent, aliquando exactam cognitionem assequantur.



VIOLEA purpurea folium habet hedera minus, tenuius, ac nigrius, nec multo dissimile: cauliculus à radice medius prodit, in quo flosculus suauissimè olens, purpureus. opacis, & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se, & ex polenta illinuntur aptissimè stomacho æstuanti, & oculorum inflammationibus, sedique procidentia.

SUNT in Violarum genere non modo purpureæ, sed etiam candidæ frigidis, & uliginosis locis nascentes, prorsus tamen in odore, de quibus nihil, quod exiet, memoriæ prodidit Dioscorides. Hæ numero sæpe proueniunt in Ananienfi agro supra Tridentum, ubi mense Aprili adeo copiosè florent, ut si longè prospectantur, oculos fallant, & extensa linte videantur. Alij præterea flores per æstatem Maio, & Iunio mensibus uisuntur: siæ perne purpurei, in medio candidi, inferius uerò lutei, forma purpureas uiolas referentes, aspectu gratissimo, cion tamen nullo ipsi commendentur odore. Prodeunt hi ex quadam planta, cui primo exortu folia insunt rotunda, per ambitum serrata, quæ tamen per incrementum in longitudinem desceunt. Constat hæc caulibus triangularibus, quadantenus striatis, & intus concavis, quibus paribus interuallis genicula supereminent, è quorum cœcavo ramusculi exoriuntur, quibus flores dependent. Vocant hæc nonnulli Iacea. Verum an hæc illa sit Iacea, quam ad interstinorum ramos magnificiunt recentiorum quidam, nõdum satis compertum habeo. Quamquam non desunt, qui affirmant, hæc esse de qua modo sermo est, eamq; symphyti facultatibus pollere. quemadmodum etiam sunt, qui eandem egrè spirantibus, & pulmonum inflammationibus, non obscure opem

Viola purpureæ consideratio.

Iacea.

ferre tradant: quin & scabiem sanare, & cetera cutis uitia delere. Violarum purpurearum facultates exquisitè descripsit Mesues inter simplicia soluentia, unde hæc decerpimus. Viola temperatam, conueniensq; sunt medicamentum, quo immutantur malæ humorum qualitates, & natura eorum soluitur. Præferuntur quæ primo uere florent, solis ardorem, qui uim resoluunt, minimè expertæ, nec imbris dilutæ. Viola refrigerant, & humectant ordine primo, cum tamen sicca minus refrigerent, & minus humectent. Recentibus quedam inest humiditas, quæ obtundit caliditatem, à qua potior est uis. Quapropter siccata humiditate, quæ in superficie continetur, gustu amaritudo deprebenditur, quæ à calido prouenit, qui prius sub humido delitescbat. Quo fit, ut exsiccatæ magis calidæ, minusq; humidæ habeantur. Humiditas, quæ superflua recentibus inest, aluum emolliendo ciet: uerim arefactæ, deiectionis sunt facultatis, non quod emolliant, sed quod dissoluant. Viola in summa soporiferæ sunt, refrigerant, calidos dolores multæ, inflammationes extinguunt, leniunt, & soluant. Earum succus, & syrupus ex eo factus uentrem leniunt. Macerantur in aceto, quod ualentius ardentissimis conferant febribus. Fit ex uiolis oleum, ijs in eo diutius maceratis: ceteris tamen præstat, quod ex immaturis oliuis, aut ex dulcibus amygdalis exprimitur. Viola bilem educunt, cuiusq; fruorem mitigant. Conferunt capitis doloribus, quos caliditas excitauerit: somnum conciliant: pectoris, & asperæ arteriæ scabritiem leniunt: medenturq; anginis, & columelle uitij: præcipuo autem auxilio sunt pectoris, & lateris inflammationibus: sitimq; arcent. At quæ sicca sunt, iecoris obstructions reserant, inflammationes discutunt, & morbo regio laborantibus opitulantur. Hactenus de uiolis Mesues. Parant hac etate è uiolarum recentium diluto, quo pluries uiolæ fuerint maceratæ, deiectionum Syrupum, quemadmodum & ex rosis rosaceum, quo deijciende

Violarum uires ex Mesue.

Syrupus uio-laceus.

Violarum uires ex Gal.

ciende alij gratia recentiores medici in pleuritide utuntur, uncias quaternas, uel quinas exhibentes. Violarum uires tradidit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Viola folia aqueam et subfrigida substantiam superantem possident: proinde tum per se, tum cum polenta illita calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur et ori uentriculi aestuanti, et oculis. hæc Galenus. Ex quibus abunde palam est non nouisse Galenum, sicut et ceteros ueteres, Violas deiectionis facultate citra noxam præditas esse.

Κακαλία. CACALIA, *Minij simili* CAP. CXVIII.

CACALIA, quæ leontice uocatur, folia fert magna, alba: è quibus medius caulis emicat, rectus, albus: florem ferens robori, aut oleæ similem nascitur in montibus. Radix in uino madefacta, ut tragacantha, delinctu aut manducatu per se tussibus, scabritijs arteriæ medetur. Grana, quæ post excussum florem innascuntur, trita & cum cerato illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

Cacaliz consideratio.

CACALIA, Plinio libro xxv. cap. xi. autore, uocatur semen margaritis minutis simile, dependens inter folia grandia, in montibus ferè. ita Plinius. Sed non propterea mihi hætenus contigit Cacaliam reperire in Italia, cū eam diu quæstuerim in montibus. Ceterum herbam Cacaliæ similem testatur se pluries uidisse in Apennini Alpibus Lucas Ghinus Forocorneliensis medicus rei herbariæ diligentissimus inquisitor, folio tussiloginis, maiore tamen, et infra parte candidiore, minusque per ambitum anguliflore: caule palmi altitudine, recto, subcandido: in cuius cacamine flores exeunt panicule faciem referentes, muscosi, oliuæ instar. Hanc ipse Cacaliam suspicatur. Equidem buni iudicio facile ausim subscribere, quod is in simplicium cognitione diligenter uersatus sit, atque inter Italos in ea mecum præstet. Cacaliam cancanon uocauit Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, ubi eius uires relictis his uerbis. Cancani radix facultatem habent mordacitatis expertem, et modicè exiccantem: essentiam et assam, et emplasticam. Quapropter macerata uino, sicut tragacantha, et lincta arteriæ asperitates sanat: nec minus, si quis eam commandat. Succus eius defluens prodest arteriæ, similiter ut glycyrrhiza.

Cacaliz uires ex Galeno.

Βύνιον. BVNIVM. CAP. CXIX.

BVNIVM caulem edit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine: in quo ramuli minutis folijs, ac floribus scatent: folia proximè radicem, apio similia, longè tenuiora, coriandrinis proxima: flores anethi: semen odoratum, hyoscyamo minus. Vrinam ciet, excalfacit, secundas euocat: leni, uesciæ, renibus utile. Tam humidi, quàm sicci, expressique succi caulibus, folijs, radicibusque, usus inualuit ex aqua mulsâ.

Πσευδοβύνιον. PSEVDOBVNIVM. CAP. CXX.

PSEVDOBVNIVM palmi altitudine fruticat in Creta, folia, ramulosque napi ferens, acris gustu. Tormina, atque stranguriam, laterumque dolores sanant quaterni rami eius poti in aqua: illiti quoque cum sale, & uino tepentes, strumas discutiunt.

Bunij consideratio.

BVNIVM, quod nostri Napum sylvestrem uocant, Plinius uidetur posteritatis memoriæ prodidisse libro xx. capite lxxi. ubi de napis ita scriptum reliquit. Naporum duas differentias et in medicina Græci seruant. Angulosissimorum caulibus florentis, et quod Bunium uocant, purgationibus sceminarum, et uesciæ, et urinae utile dictum, potum ex aqua mulsâ, uel succi drachma. Semen dysentericis tostum, tritumque in aqua calidâ cyathis quatuor: sed urinam inbibet, si non lini semen una bibatur. Alterum genus Buniada appellant, et raphano, et raposimile. Seminis præclari contra uenena: ob id et in antidotis utuntur illo. hæc Plinius. Ex cuius sanè uerbis palam fieri arbitror, eam nobis plantam esse Bunium, quæ Napum sylvestrem rura in Hetruria appellant. Nascitur hæc inculto solo, frigido præcipuè tractu. Verum Pseudobunium, quod Græci uocant, nondum mihi in Italia comperit est. Quod nulli mirum uideri debet: nam quod planta hæc fruticat in Creta, ut Dioscorides testatur, uidetur potius Cretensum propria, quàm aliarum gentium. Bunium, ut Plinius tradit, antidotis admiscetur: quare et in ipsâ Andromachi iheriaca Bunium expetitur. Vtriusque uires sanè paucis tradidit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Bunium, alij arcticon, adeo excalfacit, ut et urinam moueat, et menses prouocet. Sed et Pseudobunium adsimilis illi caliditatis est.

Bunij uires ex Gal.

Χαμαίσιςος. CHAMAECISSVS. CAP. CXXI.

CHAMAECISSVS folio est hederæ, tenuiore, longiore: ramulis à radice quinque senisve, dodrantalibus, foliosis: flore uiolæ albæ simili, candidiore, ac tenuiore, gustu supra modum amaro: radice tenui, candida, inutili. nascitur in cultis. Bibant conuenientissimè ischiadici folia, tribus obolis in aquæ cyathis tribus, tricenis, quadragenisve diebus: eodem pota modo, senis aut septenis diebus, regium morbum purgant.

CREDIDIT Leonardus Fuchsius, medicus ætatis nostræ celebris, in suo de stirpium historia commentario, *Chamæcissum* ab ea uulgaris notitiæ planta, quam, ut superius libro tertio in *Asclepiadis* mentione diximus, herbariorum uulgus *Hederam terrestrem* nominat. Sed cur eius sententiam comprobem, sanè non habeo. Siquidem uulgaris hederæ terrestris folio constat rotundo, quadantenus serrato: caulibus, uel potius funiculis uittulorum modo longis, humi longo tractu repentibus. *Chamæcissus* uero Dioscoridi folijs est hederæ, tenuioribus, longioribus: ramulis à radice quouis senisue, dodrantalibus; foliosisq;. Adde quòd *Chamæcissi* flores uiolæ albe similes facit Dioscorides, ac etiam candidiores. Sed terrestris hederæ florem profert pusillum, incandido purpurascentem. Quibus ratio-  
 10 nioribus ducor, ut putem, hanc herbam non esse *Chamæcissum*, quòd notis inter se plurimum pugnare deprehendantur. His etiam accedit, quòd *Chamæcissos* (si Plinio credimus libro *xxiiii. cap. xv.*) spicata est tritici modo: & cùm floret, existimari potest alba uiola. Ruellius hanc in Gallia nasci scribit. Sed eam aliam esse à *Chamæcisso* hic representato perspicuum est: ea enim, quæ Plinius refert, à Dioscoride dissentiant, quem nullam spicarum mentionem fecisse constat. Equidem, ut ingenue fatear, nullam hactenus in Italia herbam comperi, quam legitimum esse *Chamæcissum* ausim affirmare. De uiribus *Chamæcissi* breuiter disseruit Galenus libro *viii. simplicium medicamentorum*, ubi sic inquit. *Chamæcissi* flos, cùm sit admodum amarus, iecur obstructione liberat, sunt & qui ischiadici ipsam exhibeant.

*Chamæcissi*  
 consider.  
 383

*Hedera terrestris. sup 389*

*Chamæcissi*  
 uires ex Gal.

Χαμαίλευς. CHAMAELEUCE. CAP. CXXII.

CHAMAELEUCE lumborum doloribus propitia est. herba uirens, incuruis folijs, surculis-  
 20 que: flore rosaceo.

SANÈ quàm paucis *Chameleuces* historiam perstrinxit Dioscorides, quare difficillimè quidem decerni potest, quænam in uniuerso plantarum genere *Chameleucen* referat. Nam etsi Plinius libro *xxiii. cap. xv.* scribit *Chameleucen*, quam fortasse rectius *Chamepeucen* idem appellat, folijs laricis (ego potius dixissem piceæ) similem esse; tamen neque propterea facilis inuentu fuerit. Plures equidem herbas me uidisse fateri possum, quæ piceæ folijs uirescunt: sed nullam tamen unquam reperi, quæ, quod obseruauerim, florem roseum edat. *Chameleuce*, ut autor est  
 30 Galenus libro *viii. simplicium medicamentorum*, calide est facultatis tertio quodammodo ordine, sicca primo.

*Chameleuces*  
 consider.

*Chameleuces*  
 uires ex Gal.

BVGLOSSVM, BORRAGO.

BVGLOSSVM VVLGARE.



Βούγλωσον.

BUGLOSSVM nascitur in campestribus, & sabulosis. Iulio mense colligitur. Aiunt eam, quæ tres thyrsos emittit, cum semine, & radice tritam, potamque contra tertianos horrores prodesset: quæ quatuor, ad quartanos: ea in uino decoquitur. Herbam abscessibus utilem esse uolunt. Verbasco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitans lingens. Quod in uinum deiectum, animi uoluptates augeat.

Buglosi consideratio.

QVI diligenter Buglosi historiam expendunt, omnes herbam Borraginem uulgo uocatam, in hortis, alijsq; locis nascentem, potius legitimum esse Buglossum censent, quam illam, quæ Buglossa uulgo nominatur, cuius in officina communis est usus. Quorum equidem iudicio non dubitauerim subscribere. siquidem Borrago dicta folijs est in uersum uerbasco simulibus, nigrioribus tamen, & asperioribus: quibus etiam hæc symphytum alterum emulatur, quod folia buglosso proxima ferre superius prodidit Dioscorides. Adde præterea, quod folia Borraginis in terra procumbunt, & bubulas linguas tum forma, tum asperitate imitantur. Contra quæ Buglosi nomen sibi falso uidebatur, folia habet longa, echinifolia, non usque adeo lata, ut bubulas referant linguas, minusq; humi depressa, quæ potius è toto ferme cespite sursum asperant, nec aliqua ex parte uerbascum, aut symphytum alterum representant. Non ob id tamen negare ausum, quoniam uulgare Buglossum in campestribus nascens, isdem cum Borragine polleat uerbis: quandoquidem eadem utriusq; asperitas, idemq; sapor gustui manifestum præbent eiusdem facultatis uicem. Atq; facie non multum dissidere ea inuenias, si illud genus spectes, quod hodie in hortis feritur ex Hispanijs allatum: hoc enim etsi uerbascum adeo adamsim non representet, quemadmodum Borrago; foliorum tamen effigie bubulas linguas maxime imitatur. Sed quoquomodo hæc se res habeat, concedam facile Borraginem, & uulgarem Buglossum & specie, & forma inter se differre: attamen crediderim alteram ad alterius utres proximè accedere, & si non eadem utriusq; simillimas tamen inesse. Ceterum non desunt, qui his rationibus neglectis asserant uulgare Buglossum Echij omnino genus esse, quod illud omnibus notis referre putent. Alij uero sunt, qui idem Buglossum Cirsium existimant. Verum nos aliud à uulgari Buglosso & echium, & cirsium esse censemus, ut abunde suis locis docuimus.

**Borago**

Buglosi descriptio Auicennæ.


Quod insuper Borrago facile sit legitimum Buglossum, Auicennæ testimonio comprobari potest, qui libro 11. sui canonis ita scribit. Lingua bouis est herba lata, habens folia sicut almaru, & ad tactum aspera, & rami eius asperi, sicut pedes locustarum. Oportet autem, ut illa administretur, quæ est in Corasceni, crassa habens folia, super quorum faciem sunt puncta, quæ sunt radices spinarum, & pilorum exeuntium ab ea. Quibus notis adeo euidenter nostra Borraginem expresseit Auic. ut nemo non intelligat, hanc esse Linguam bubulam. Eam præter morem descripsi Auicenna, quod suo quoq; tempore non deesset, qui ueri Buglosi loco aliam quandam substituerent plantam, ut aperte eius uerba declarant, dum subdit. Quæ autem in hac terra reperitur, & quæ utuntur medici, plurimum eius est genus almaru, & non est lingua bouis, & neq; confert, ut iuuamentum illius est. hæc tamen Auicenna. His omnibus illud deniq; accedit, quod apud Apuleium in eo libello, qui de herbarum medicaminibus inscribitur, inuenio Buglossum. Lucæ Corraginem nuncupari prioris tantum literæ mutatione, quod cordis affectibus quam maxime opuletur. Quæ se ne omnia, ni fallor, clarissime ostendunt, Borraginem esse uerum & legitimum Buglossum. De cuius uiribus asserens Galenus libro 11. simplicium medicamentorum, sic inquit. Buglossum humide calidæq; temperiei est. Itaque uinis iniectum, letitiæ ac hilaritatis causa esse creditum est. Sed & ijs, qui ob saucium asperitatem tussunt, coctum in melicrato conuenit.

**Corrago**

Buglosi uires ex Gal.

ΚΥΝΟΓΛΩΣΣΟΝ. CYNOGLOSSVM.

CAP. CX XIII.



Cynoglosi consideratio.

CYNOGLOSSON folia latifolia plantaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa: caule uacat, & humi sternitur. provenit in sabuletis. Folia cum fuillo adipe ueteri, medentur morfibz canum, alopecij, & ambustis. Emollit aluum, decoctum herbæ ex uino potum.

LEGITIMUM Cynoglossum, quod Dioscoride teste, neq; caulem, neq; flores, neq; semen gignit, pluries non modò uideamus: sed etiam legimus Romæ post Adriani molem in sabulosis quibusdam locis enasci. Hoc à uulgari Cynoglosso, quo passim officina utuntur, perquam longe distat: quippe quod in radiantis solis morem folia fert, suppingit.

## CYNOGLOSSVM.



suppinguia, tenui lanugine albicantia, humi strata, et caule perpetuo uidiuū est. Illa uerò planta, quæ Cynoglossi usum omnibus præstat, plurimos emittit caules, cubito sæpius longiores, adnatis in cacumine ramis: quibus flores insunt purpurei, echio similes: è quibus deinde quædam parua prodeunt lappæ, non sine magno nature artificio factæ, quæ contactu uestibus pertinaciter adherent. Meminit Cynoglossi Plinius libro xxv. cap. viii. his uerbis. Iungitur et Cynoglossos caninas imitans linguas, topiarijs operibus gratissima. Auiuntq; quæ tres thyrsos seminis emittat, eius radicem potâ ex aqua ad tertianas prodesse: quæ quatuor, ad quartanas. Est et alia similis ei, quæ ferat lappas minutas. hæc Plinius, Ex quibus satis perspicuum esse puto, quod neutrum Cynoglossi genus à Plinio traditum, Dioscoridis Cynoglossi respondet. Siquidem primum Plinio caules uel thyrsos edit adeo flexiles, ut ij topiarijs operibus maxime conueniant. Dioscoridi uero plâta est sine caule, quæ humi stermitur, ut hinc apertissime constet, hanc operi topiario, ut aliquid conuestiat uel contexat, prorsus ineptam esse. Adde quod Dioscoridi Cynoglossum medetur canum morsibus, alopecijs, et ambustis: quinetiam aliam emollit. Plinio autem ad tertianas tantum, et quartanas prodest. id quod de Buglossi intelligitur, ut superiori capite testatur Dioscorides. Hinc itaque palam fieri arbitror, Buglossi historiam, et uires cum Cynoglossi turpiter confudisse Plinium. Cuius certe lapsus non animaduertent reacentiorum nonnulli, qui Plinii auctoritate freti, contra Dioscoridis grauem sententiam probare contendunt, Cynoglossum caules, flores, et semen proferre. Quod autem secundo loco à Plinio describitur, lappas minutas ferens, nil aliud, meo quidem iudicio, fuerit, quam uulgare Cynoglossum omnibus notum. Quo fit, ut omnino errasse existimem Ruellium, et Fuchsum utros

Plinij lapsus.

Ruel. & Fuch  
lij error.

alioqui doctissimos: quippe qui crediderint, uulgarem Cynoglossan esse Lycopsin, ut etiam supra suo loco monuimus. neq; enim hos animaduertisse uideo de hac cum alio Cynoglossi scripsisse Plinium, ac deinde speciatim de Lycopsi lib. xxvii. cap. xi. Cynoglossi in libris de simplic. medicament. facultatibus nusquam reperio meminisse Galenum.

## ΦΥΤΕΥΜΑ. PHYTEVMA.

## CAP. CXXXV.

PHYTEVMA folia habet struthij, minora: copiosum semen, perforatum: radicem parua, tenuem, per summa terræ nitentem. Quam ad amatoria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt.

CVM sit usus Phyteumatis ad amatoria duntaxat, exemplo Plinij ductus, plura hic de eo referre superuacuum habeo: præsertim quod nulli rei herbariæ studio id hodie compertum esse sciam. Mihi quidem hactenus herba hæc incomperta est. Quare eam relinquamus in hortis Veneris, quos ipsa ad delicias et amatoria tantum colit, donec quis Deæ charissimus hanc herbam edoctus, eam nobis quoq; indicare possit. Huius, tanquam superuacue, et inutilis herbe, Galenus et Paulus nusquam, quod legerim, inter simplicia meminerunt.

## ΛΕΟΝΤΟΠΟΔΙΟΝ. LEONTOPODIUM.

## CAP. CXXXVI.

LEONTOPODIUM duum digitorum herbula est, folia ferens angusta, longitudine ternum, quaternumve digitorum, hirsuta, quæ iuxta radicem lanosiore flocco canescunt: capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri: semen usque adeo spissa lanugine inuolutum est, ut sæpe fallat: radice parua cohæret. Quam tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

VERVM Leontopodium hactenus non solam mihi incompertum est; sed alijs quoq; ignotum esse arbitror: nulum enim inueni, qui ipsum hodie ostenderet. Neq; propterea hoc multum curare debent medici, cum et eo ad alligato ad amatoria tantum usa fuerit antiquitas. Ceterum hic non est audiendus Brunfelsius, qui Stellariam herbam uulgò uocat, in suo onomastico Leontopodium esse scribit. Quia in re non minus hallucinatusprehenditur, quam in alijs compluribus.

Brüfelsij error.



ἵππογλωσσόν.

HIPPOGLOSSVM.

CAP. CXXVII.


Hippoglossi  
confider.Hippoglossi  
uires.

HIPPOGLOSSON, frutex est folia habens rufi  
tenuis figura, & spinosam comam, & in summo cen  
linguas ē folijs exeuntes. Capitis dolorem coronae  
comis imposita minuit. malagmatīs radix, succusque  
admiscetur.

HIPPOGLOSSVM, quod in folijs ueluti prominentes  
linguas proferat, Bilinguam uocat Hetruria, alij uero Bonife  
ciam: Nasctur haec frequentissima in Liguria Alpibus, Urbis  
ti agro, & quibusdam syluosis montibus non longē à Goritici  
comitatu, quā iter est in Hydriam ad argenti uiui fodinas. Verū  
tamen non est haec Laurus Alexandrina, aut Ideā, de qua infra  
suo loco differemus, ut in suo insigni de plantarum historia com  
mentario existimat Fuchsius. Quandoquidem Laurus Alexan  
drina ē foliorum umbilico nullam aculeatam exerit linguam, sed  
tantum fructum rotundum tiliae modo longiori pediculo appen  
sum profert. Hippoglossum recentiores longe pluribus com  
mendant uiribus, quā fecerint antiqui scriptores. nam, ut illi  
tradunt, in uteri affectibus magno datur iuuamento. Quos, ut  
strangulatu mulier laborantibus mulieribus radice, aut herbe  
pulis cochlearis mensura, ex uino, uel iure haustus, presen  
taneo remedio opem ferat. Est et ad puerorum enterocelas pre  
stantissimum medicamentum, si diutius diluculo hauriatur pulis  
eodem sesquidrachma pondere ex maioris symphyti decocto. Ve  
rum id sumentibus euenit, quod primis tantum diebus adeo rami  
cem pulsare percipiant, ut intestina foras prolabi uelle uideantur.  
quare subcingulis, fascijs, & fibulis reprimentibus, roboranti  
busque primis diebus uti opus est.

Αντίρρινον. ANTIRRHINVM. Orant

CAP. CXXVIII.

Antirrhini cō  
sideratio.Antirrhini ui  
res ex Gal.

ANTIRRHINON, alij anarrhinon, uocant her  
bam caule, & folijs anagallidi similem: florem albe  
uiole, purpureo, minore tamen, ideoque syluestris  
anagallis nominata est: femine uituli narium simili.  
Tradunt, perunctos ea cum oleo lilino, uenustiores  
fieri, nec ullo medicamento laedi posse, si quis appen  
sum gestet.

VARIAT admodum Antirrhini apud ueteres historia.  
Siquidem Dioscorides Antirrhinum herbam folijs, & caule an  
gallidi similem reddidit. Theophrastus uero eandem aparine si  
milem fecit. Veruntamen Antirrhinum illud, quod ego sepe iam  
uidi, tum etiam legi, semine uitulinum caput referente, unde Ga  
lenus hoc & Bucranion appellari prodidit, folijs est longiusculis,  
& angustis, lino, aut osyridi similibus: floribus lychnidi cor  
narie amulis, purpureis, & uisui gratis. Huic sane adstipulari  
uidetur Plinius libro xxv. cap. x. ubi Antirrhinon, fortasse re  
ctius quā alij, depinxit lino simile, & semine uituli narium. Ve  
ro de facile suspicor, Dioscoridis & Theophrasti exemplaria hoc in  
loco deprauata esse, atque in aliqua parte uitium latere. Anti  
rhini meminit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, ubi  
de eius uiribus ita scribit. Antirrhinum, aut anarrhinum scaten habet  
uituli nariibus simile, ad sanationes inutile. Ipsion autem adstipulari  
est cum bubonio facultatis, sed multo minoris. Itaque ex illo de  
hoc conijcto.

Ex eo genere una, folia coronopi habet, longa: radicem iunci modo prætenuem: capitula sena, septenave, in quibus erui semen inest. Arescens in terram flectitur, & se contrahit ad speciem unguium mului exanimati. Altera mali parui magnitudinem explet, radice exigua oliuæ magnitudine: folijs quoque oliuæ colore, & figura, mollibus, diuisis, humi inclinatis: semen ut cicer, minutum, in uirgulis dependet, punicei coloris, multis foraminibus pertusum. Vtranq; narrant in amatoria expeti. Thessalicæ mulieres his uti traduntur.

NEUTRUM equidem Catanances genus hæcenus me comperisse fateor, neq; aliquem scio in Italia, qui alterum saltem legitime nouerit. Sed nihil certè referre arbitror: quippe quòd ea rebus ueneris tantum conueniant, & amatorijs nascantur. Proinde mulieribus Thessalicis relinquenda sunt, quibus olim fuit usus: præsertim cum hac ætate homines in uenerem admodum procliuēs sint, atq; etiam multi nimis calleant amatoria. tantum abest, ut etiam huiusmodi herbarum, si cognoscerentur, auxilia ijs indicari debuissent. Ceterum existimat Ruellius in hoc subscribens Hermolao, secundi generis Catanancen rectè eam herbam dici posse, quam herbariorum uulgo Bistortam appellat. Sed meo quidem iudicio errat Ruellius, quòd Bistorta dicta rumicis folia proferat, & radices quandoque humani brachij crassitudine, angustium modo contortas, non autem paruas oliuæ magnitudine, uelut altera Catanance.

Catanances  
consider.

Ruellij error.

Τριπόλιον. TRIPOLION. CAP. CXXX.

TRIPOLION in marinis nascitur locis, quæ allidit unda, recedensque dimittit, neque in mari, neque in sicco: folio glasti crassiore: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, ut tradunt, flores colorem ter die mutant, mane candidi, meridie purpurei, sero punicei conspiciuntur. Radice alba, odorata, calidi gustus. Quæ drachmis duabus in uino pota, aquam, urinamque per aluum extrahit. In medicamenta digeritur, quæ uenena arcent.

TRIPOLIUM Serapioni Turbit appellatur. Quapropter credidere nonnulli, Turbit uulgo uocatum Dioscoridis esse Tripolium, præsertim quòd ipsum & album, & diectoria facultatis esse deprehenderent. Veruntamen rem aliter se habere illud argumento est, quòd communis usus Turpetum nullo commendetur odore, nec gustui acridinem relinquat, sed tantum salsedinis, & asperitatis quidpiam. Ex quibus sanè notis asserere licet, Tripolium in Italia non reperiri, neq; aliunde aduehi: quemadmodum nec Turbit, de quo differuit Apicenna, quem etiam Dioscoridis Tripolium intellexisse reor. Ceterum ab his longè differre uidetur TURBIT, quod à Mesue describitur, nostrati Turpeto omnibus prorsus notis respondens. At enim Turbit radicem esse herbe folia ferulae minora ferentis, tripliciq; notari differentia, nempe alba, subcinerea, & nigra. Quæ quidem omnia in nostri usus Turpeto diligenter inuentibus facile sese offerunt. Siquidem in Turpeti radicibus, quæ ex orientali plaga ad nos deferuntur, omnes hi reperiuntur colores: non tamen quòd putem, eos ita factos esse tantum ex ipsius plantæ natura; sed quòd ob uetustatem, & aduentitij aeris humorem radices hæc corrumpantur, & nigrescant, illosq; sibi asciscant colores. Cuius rei in causa etiam esse potest maris, per quod conuehitur, exorta procella, undis tritremes superantibus, quibus madefactæ radices facile situm, uel nigredinem contrahunt. Præterea cum asserat Actuarius, nil aliud esse album Turpetum, quàm alypiæ radicem, eorum planè refellitur opinio, qui Mesuem errasse existimant, quòd album Turpetum dixerit plantæ radicem esse, quæ folia ferret ferulacea. quandoquidem alypum, siue alypia, ut in sequentibus docebit. Dioscorides, folijs tenuibus prosiliit, quemadmodum & ferula. Ex his igitur, ut arbitror, abunde liquet, Turpetum tam Mesui, quam Actuario alypiæ esse radicem. Est & aliud Turpetum, quod potius pseudoturpetum dixerim, crassius, et cortice nigrius, quod ex Gargano Apuliæ monte conuehitur duplici genere, quoniam unum è thapsiæ, alterum è pityusæ radicibus concinnant impostores, à quibus hæc omnia didicimus. Non itaque ab re scripsit Actuarius, nigrum Turpetum radicem esse pityusæ. Verum hoc (ut mea fert opinio) Mesui Turpetum haudquaquam fuerit, cum ipsius Turpetum nil aliud esse existimem, ut paulò ante diximus, quàm alypiæ radicem. Quanquam putat Brasauolus, nigella tamen, quod equidem sciam, ratione uel authoritate nixus, apud Mesuem Turpetum omnino tithymali myrsinitis radicem esse. Sed quantum myrti folia à ferulæ folijs differant, qui nesciunt, rei herbariæ peritos consulant. Fuchsius porro libro de compositione medicamentorum Turpetum, de quo Mesues egit, è Thapsiæ radicibus exemptum existimat. Sed ipsius quoq; sententia mihi planè, ut libere dicam, reprobanda uidetur: nam è ueteribus nullum hæcenus reperi, qui Thapsiam lacteo succo turgere scribat: cum tamen Mesui Turpetum à planta eximatur, quæ plurimo lacte madet. Præstat in Turpeti genere album ex orientali plaga allatum, resinofum, minime cariosum. Deijcit hoc pituitam, crassos lentosq; humores ad articularum compagines defluentes, remotioresq; corporis partes. Ventriculolum expurgat, & quæ illi penitus inhaerent excrementa detergit: item & pectus à pituitæ lentore. Datur magno iuuentamento aqua intercute laborantibus: item elephantiacis, & Gallica lue affectis: quin & ijs, qui morbis ab exstis humoribus prouenientibus sunt obnoxij. Prodest diuturnis febribus, & in uniuersum ubi pituita redundet. uerum qui sistant cauere debent à piscium esu, & australi flatu. Sed iam ad Tripolium nostra redeat oratio. Reperio hæc in historia non parum hallucinatum esse Plinium libro XXI. cap. VII. ubi turpiter Tripolium cum polio herba confudit, adeo ut asserere non dubitauerit, polium ter in die foliorum mutare colorem. Id quod de Tripolij floribus tradidere

Tripolij con  
sideratio.

Turpeti con  
sideratio.

Brasauoli er  
raturum.

Fuchsi opin  
reiecta.

Plinij lapsus.


Tripolij ui-  
res ex Gal.

ADIANTVM.

*Mais vauitru*  
*En rom fieur*

didere tum Dioscorides, tum antiquorum reliqui. Tripolij quam breuissime meminit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ita scribens. Tripolij radix gustanti acris est, & facultate calida in tertio excessu.

A'dianton. ADIANTVM. CAP. CXXXI.




*Notre Saint huyt.*  
TRICHOMANES.

ADIANTON, polytrichon, pusilla gerit folia, familia coriandri, in summo incisuris diuisa: cauliculi, quibus exoriuntur, nigro colore nitent, pratenus, palmum alti: radice superuacua; neque caulem, neque fructum, neq; florem profert. Decoctum herbe potum, prodest spirandi difficultati, suspiriosis, heni, & felle suffusis, & urinae difficili: calculos frangit, aluum sistit, serpentium moribus auxilio est: contra stomachi fluxiones in uino bibitur: secundas ciet, & menstrua: sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas discutit: furfures, & manantia capitis ulcera ex lixiuio emendat: defluentes capillos continet, cum ladano, & myrtino, & fusino, aut hyssopo, uinoque. Decoctum eius cum lixiuio, & uino infusum, idem praestat. Coturnices, & gallinaceos pugnaciores facit, in cibos eorum additum. Seritur gratia utilitatis pecorum circa ouilia. Umbrosis, & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

Terquans. TRICHOMANES.  
CAP. CXXXII.

TRICHOMANES nascitur eisdem in locis, quibus adianton: filici simile, sed exilius: folijs lenticulz, tenuibus, in ordinem utrinque digestis, aduersis in se, in ramulis tenuibus, acerbis, fusco colore splendentibus. Eademque & adianton prestare posse constat.

Adianti, &  
Trichomanis  
consider.



Plinij lapsus.

ADIANTVM officinae Capillum Veneris appellant. Duo eius genera Theophrastus assignauit libro VII. capite XIII. de plantarum historia, ubi ita scriptum reliquit: Adianti solum in aqua nunquam madescit, nec quicquam adhesisse humoris constat; unde et nomen herba accepit. Genera eius duo, candidum, atque nigrum. Ambo ad destium capillorum utilia; oleo trita. Nascuntur maxime locis humidis: haec Theophrastus. Cui subscribit Plinius, licet confuse satis, libro XXII. cap. XXI. dum sic inquit. Aliud Adianto miraculum, aestate uret, bruma non mercescit, aquas respuit: perfusum, mersumue, sicco simile est, tanta dissociatio deprehenditur; unde et nomen a Grecis. Quilam callitrichon uocant, alij polytrichon; utrunque ab effectu. Duo eius genera, candidius, & nigrum, breuiusque. Id quod maius est Polytrichon, aliud Trichomanes uocant. Vtrique ramuli nigro colore nitent, folijs filicis; ex quibus inferiora aspera, ac fusca sunt: omnia autem contrarijs pediculis densa inter se ex aduerso: radix nulla. Umbrosas petras, parietumque aspergines, ac fontium maxime specus sequitur, & saxa manantia. quod miremur, cum aquas non sentiat. ita Plinius. In quibus nimirum uerbis manifeste deprehenditur ipse Plinius, Trichomanes, quod & Filiculam appellamus, in secundi Adianti locum retulisse. quippe qui perperam fortasse acceperit Theophrasti sententiam, a quo illa mutatus est. Nam Theophrastus ubi de utroque Adianti genere discessisset, eodem loco citato statim de Trichomane haec uerba subiunxit.

*Trichomanes* uel ad distillationes urinae unice facit, ut aliqui existimant. Caulem hanc adianto nigro similem gerit: folia admodum parua, densa, aduersa, inter sese condita: radicem minimam. Loca amat opaca. haec Theophrastus. Ex quibus liquido apparet, Theophrasto *Trichomanes*, quod *Fidicula* à Theodoro uertitur, nullum *Adiantum* esse, sed per se suum generis plantam: quod enim *Fidiculam* dixerit cauliculum ferre nigro adianto similem, clarissime ostendit, candidum *Adiantum* cum *Trichomane* nullam habere cognationem. Hinc itaq; facile crediderim, *Adiantum* nigrum, quod caule filiculam referat, nobis legitimum esse, id sane intelligens, quod *Capillum Veneris* passim nominant. Candidum uero eam plantam esse aliquando putavi, quae una cum *Trichomane* in petris, parietum, ac fronsium asperginibus, specubus, et humentibus locis nascitur: folijs nigricantibus, minutim laciniatis, luteas maculas quàm plurimas auersa parte habentibus: caule uiridi, gracili, flexiliq;: quam nonnulli, eo quod folijs rutam emul-  
 10 leat, et in muris proueniat, *Rutam murariam* cognominant, alij *Saxifragam* dicunt. Sed nunc equidem hanc eandem cum *Parorychia* Dioscoridis esse opinor, ut etiam superius in sua mentione monuimus. Ceterum *Fuchsius* medicus clarissimus hanc herbam pro *Saxifraga* Dioscoridis depinxit in suis de stirpium historia commentarijs. Verum quod hanc folio constet rutae, illa uero epithymi, capillorumq; modo tenui, cur planè eius sententiam comprobem, non habeo. *Adianti* meminuit *Galenus* libro v. simplicium medicamentorum, sic de eius uiribus scribens. *Adiantum* in caliditate quidem, et frigiditate symmetrum est, uerum desiccatur, et extenuatur, et discutit. Etenim alopecias capillis uestit, et strumas et abscessus digerit, lapidesq; frangit epotum. Viscosorum, crassorumq; e pectore pulmoneq; ex-  
 20 creationibus non mediocriter confert, et uentris profluuium sistit: non tamen ullam manifestam caliditatem affert, sicut nec frigiditatem. Verum posuerit ipsum quissiam secundum hanc oppositionem et temperiem in ordine medio. *Trichomanis* autem meminuit libro vii. eorundem simplicium medicamentorum, ubi subscribens Dioscoridi, hanc  
 30 tantum retulit. *Trichomanes* eadem praestat, quae *Adiantum*. haec *Galenus*. Porro *Adiantum*, ut *Mesues* inter sua simplicia refert, alium subducit, bilem, et pituitam deiecit, crassaq; excrementa, quae diu interioribus inhae-  
 40 sere. Pectus, et pulmonem detergit, sanguinem clarificat, bonum facit habitum, animam dilatat, et iecur et uentriculum purgat, praesertim si obstructione laborent: tametsi ad eorum infarctus potentius sit eius dilutum ex apij, aut endinae aqua paratum, aut ex cicero nigro iure, aut caprino sero. Sed si addatur saccharum, lateris inflammationes sanat, et urinam trahit. Eius praeterea decoctum frequentius potum calculos frangit, et foeminas à partu purgat. Hos autem effectus praebet calida tantum facultate, quae illi inest. At adstringente ui, quae etiamnum pollet, defluxiones inibet: fluentem sanguinem sistit, uentriculum roborat, et capillorum defluuium usque adeo emendat, ut non modò eos cobibeat, sed et renasci faciat, praesertim emplastri modo impositum, myrtino oleo, ladano, et austero uino additis. Idem praestat et combusti cinis: quinetiam eius ex uino decoctum. Fursures reiteratis lotionibus  
 50 depellit. Eius cinis haec omnia potest, et agilopas curat. Ipsius diluti libra epota cōsimodissime aliis subducitur.

*Adianti, & Trichomanis uires ex Gal.*

*Adianti uires ex Mesue.*

## ΞΑΝΘΙΟΝ, SIVE LAPPA.

CAP. CXXXIII.

*Galenus & Mesues Botanici huius*

*XANTHIUM* nascitur læto, & pingui solo, & lacubus exiccatis, caule cubitali, anguloso, pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis: folia atriplicis habet, insecta, nasturtium odore imitantia: fructum grandis oliuae modo, rotundum, & ut platani pilula, spinosum, qui contactu uestibus adhærescit. Is ante collectus quàm perfectè siccescat, tunditur, & fictili uase reconditur. Flauos autem facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox caput, nitro ante perfri-  
 60 sum, illinatur. Alij in uino tundunt, & ita asseruant. Semen aptissimè tumoribus imponitur.

*XANTHIUM*, quod uulgus Lappam minorem cognominat, omnibus uulgarissimum est: quandoquidem publicis ubiq; semitis, et exiccatis scrobibus, lacubusq; nascatur. Huic, meo quidem iudicio, omnes conueniunt notae, nulla prorsus reclamante, quae *Xanthio* à Dioscoride tribuuntur: nam praeterquam quod caulem gerit angulosum, ac pinguem, folia, quae ei subalbida sunt, atriplicis effigiem referunt, per ambitum serrata, nasturtium odore imitantia. Prodeunt etiam e caule ramuli, quibus racematim  
 70 fructus oliuae figura dependet, aculeatus, ceu platani pilula, qui maturescens, cum tangitur, uestibus pertinaciter adhæret. Paucis admodum huius herbae uires descripsit *Galenus* libro vii. simp. medicamentorum, sic inquit. *Xanthium* uocatur etiam phasganium. Fructus discutiendi uim obtinet.

*Xanthij consideratio.*

*Xanthij uires ex Galeno.*





Aegilops cōsideratio.

Error quorundam.

Aegilops ex hordeo generatio.

Aegilops vires ex Gal.

Συμβ. Γ. 167

AEGILOPS herbula folia tritici habens, sed molliora, in summo capite semina bina ternave rubra, quibus aristæ quasi capillaceæ exeunt. Illita cum farina herba ægilopijs medetur, duritias discutit. Succus farinæ admixtus siccatur, & eorundem gratia reponitur.

NASCITUR: frequens Aegilops inter segetes, sed frequentissima inter hordeum, & zeam, folio tritici, culmo pretenui, in cuius cacumine bina ternave rubra semina dependent, oblonga: è quibus aristæ prodeunt longæ, capillorum modo tenues. Hanc nō modō uidimus in Ananiensi agro, & ubiq; fere locorum; sed etiam sæpissimè legimus. Eam rura Ananiensia vulgò Squalam appellant. Proinde errant ij, ut equidem arbitror, qui Aegilopem, & auenam idem esse contendunt. quandoquidē esī primo statim intuitu Aegilops auenæ faciem referre uideatur; diligenter tamen singulas eius notas expendenti, facile & discerni, & error deprehenditur. Etenim Avena in stipule cacuminibus grana profert, longiusculis appensa pediculis, oblongis foliulis contexta, bipedum locustarum effigiem representantibus. At Aegilops tenuissimas fert spicas, tribus, aut quatuor tantum granis contentas, auenæ fere modō dependentibus: è quibus aristæ prodeunt capillorum instar tenues, rubentes, & auena longior. Quod autem ita se res habeat, manifestum prebet indicium ipse Dioscorides: utpote qui de auena libro secundo inter cerealia tribunde scripserit; neq; bis seorsumq; eiusdem plantæ historiam tractare solet: superuacaneum enim fuisset idem repetere, & inordinatum eidem inconsultō addere. Huc accedit, quod si notæ, quæ utriq; plantæ à Dioscoride redduntur, inuicem conferantur, haud dubie alteram ab altera tum facie, tum uiribus, longè differre con-

perietur. Namq; Dioscorides Auenam, quam Βρώμον, non αἰγίλωψα uocauit, depinxit stipula geniculis intercepta, dependentibus in cacumine paruulis ueluti locustis bipedibus, in quibus semen concluditur. Aegilopa uerò in summo capite semina bina, aut terna rubra habentem, aristis capillaceis. Porro cū libro secundo de uiribus Auenæ differeret, inquit. Huius semen non secus atq; hordeum, utile est ad cataplasmata. Pulte eius alius sistitur. prodest tussientibus in sorbitione succus. Verim hic de uiribus Aegilopis scribens, herbam eius ad sinuosos oculorum abcessus, quos Græci ægilopas uocant, & ad duritias discutiendas commendauit: succumq; farinæ admixtum ad idem uideri prodidit. Quæ sanè omnia, ni fallor, apertissimè demonstrant, ægilopem auenæ quam maxime repugnare. Aegilopem ex hordei uitio fieri, sicut lolium ex tritico nimia uligine, testis est Galenus libro primo, capite ultimo de alimentorum facultatibus, ubi ita scribit. In tritico quidem, frequens lolium sæpe inuenitur: in hordeis uerò reperitur, sed paucum: quam autem ægilopem appellant, ea in hordeis frequens inuenitur, cū prima generatio, uel incrementum ipsis non rectè successerit. Porro pater meus etate iam declinante, cū agricultura delectaretur, triticum, ac hordeum aliquando seminauit, omnibus diuersi generis seminibus, quæ ipsis erant admixta, diligenter selectis, quò certò cognosceret, num ex ipsorum mutatione lolium & ægilops nascerentur, an propriam hæc quoq; semina naturam haberent. Cū autem fortè unā cum puris seminibus in tritico quidem frequens lolium, in hordeo autem parum, sed magnam ægilopis uim enatam conspiceret, in alijs quoque seminibus itidem experiri est aggressus. hætenus Galenus. Ceterum ipse quoq; testari possum; me sæpenumero in Anania ualle audiuisse agricolas conqueri, quod hordeum degenerasset in Squalam: sic enim ipsi Aegilopem uocant. Aegilopis uires retulit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, his uerbis. Aegilops digerendi uim possidet, id quod ex gustu patet: leuiter enim est acris. Verim et ex eo liquet, quod phlegmonas induratas, & ægilopas sanat. hæc Galenus. Cuius etiam testimonio satis planum fieri potest, Auenam, & Aegilopem inter se dissidere, quod de ijs seorsum egerit, & singulis diuersas uires reddiderit.

BROMVS herba ægilopi similis, exiccatoriam uim habens. Decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuri colato par modus mellis adjicitur: rursus incoquitur, dum liquidi mellis crassitudo fiat. Linteum eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam ulcerum efficax est. Aliqui tritam aloën addunt, & eo modo utuntur. Cum siccis rosis cocta in uino, grauem oris halitum emendat.



TAMETSI non desunt Dioscoridis studiosi, atq; etiam interpretes, qui putant, Bromum huic loco illegitimè accensisse, quòd de eà quoq; libro secundo idem Dioscorides tractauerit, aliudq; non sit Bromos, quàm Avena; nos tamen longe alter sentimus. Mea siquidem sententia est, eritq; donec melior ab alijs prostratur, quòd Dioscorides, in secundo libro Bromum inter segetes, legumina, & alia frugum genera, quæ satione proueniunt, descripsit; de satione Bromo tantum intellexerit: hic uerò, ubi de his, quæ sponte nascuntur, disserit, nobis syluestrem Bromum red-  
 10 dit. Hec uulgaris notitiæ est, domesticæ auenæ in omnibus persimilis, grans tamen maioribus, nigrioribus, hirsutioribusq;. Bromi huius mentionem fecisse opinor Plinium libro XXI. cap. XXV. dum sic uquit. Bromos semen est spicæ ferentis herbe. nascitur inter uitia segetis auenæ Græcæ genere, & folio, & stipula triticum imitatur. In ca-  
 minibus dependentes pariuulas uelut locustas habet. Semen utile ad cataplasmata, atq; hordecum, & similia.

Bromi confi-  
 deratio.  
 227

Γλαυξ. GLAUX. *Glaux* CAP. CXXXVI.

GLAUX cytho, aut lenticulæ folijs similis, quæ supernè uirent, auersa quæ candidiora spectan-  
 tur: ramuli à terrâ exiliunt quini senive; tenues ab radice, dodrantem alti: flores uiolæ albæ, pur-  
 purei exeunt, minores tamen, nascitur iuxta mare. Coquitur cum hordeacea farina, sale, & oleo  
 in sorbitione, ad reuocandam extincti lactis ubertatem.

QUANQVAM scribit Dioscorides iuxta mare nasci Glaucem; eam tamen ipse hætenus nusquam reperi, neq; ab aliquo compertâ audiui. Nisi Ruellio ad stipulari uelimus, qui eam herbam Glaucem putat esse, quæ fruticat multis  
 10 caulibus: folijs oblongis, in ordinem utrinq; digestis, ciceris modo, subter cæsijs, supernè utridibus: flore purpureo, paruo, filiqua terete, non in aduncum ut scenigræci corniculata. Hæc, etsi Ruellio testè nullum apud Gallos inuenerit nomen, à quibusdam Galega, ab alijs Ruta capraria, in Hetruria uerò uulgò appellatur Lauanese, siue ut quidam  
 dii Lauamani, quòd prope riuos aquarum nascatur, ubi manus lauantes rustici, hac planta saponis uice sibi sordidum  
 lutum abstergunt. Verum cion uideamus huiusce plantæ flores, & caules, qui se quandoq; ad bicubitalem altitudi-  
 nem attollunt, Glaucis faciem non representare; cogimur dicere Ruellium hac in re hallucinatum deprehendi: præ-  
 ferim quòd Glaux, Dioscoride et Plinio autoribus, inuenitur iuxta mare. Galega uerò in uliginosis locis, in scrobium  
 eggeribus, in montibus, & deniq; passim ferè prouenit. Huic plantæ recentiores assignant uires non uulgares con-  
 tra pestilentiam, & uenenosorum animalium morsus. in quorum remedium herba per se estur, atque etiam exterius  
 30 illuntur. Sunt & qui eam morbo comitadi laborantibus auxiliari prædicent: in quem usum eius succum exhibent,  
 drachmarum quatuor pondere. Quòd autem hæc extinctum lac reuocet, ad quod Glaux à Dioscoride commendatur,  
 non equidem ausim asserere, cum nullam inueniam, qui Galegam his uiribus præstare testetur. Glaucis meminit Ga-  
 lenus libro VI. simplicium medicamentorum, de eius uiribus differens in hunc modum. Glaux herba, & ipsa lactis  
 generandi uim obtinere uidetur. Quod si ita sit, calida quodammodo, humidaq; fuerit temperamento.

Glaucis con-  
 sideratio.

Ruellij opin-  
 explosa.

Glaucis uires  
 ex Galeno.

Πολύγαλον. POLYGALA. *Polygala* CAP. CXXXVII.

POLYGALA palmi altitudinem petit, folijs lenticulæ, gustu adstricto. Quæ pota, lactis  
 abundantiam facit.

40 POLYGALA mihi planè incomperata est. neq; id temerè fateri licet, quòd tam pauca eius tradantur nota  
 tum à Dioscoride, tum etiam à Plinio, ut admodum difficile sit decernere, quæ nobis hodie sese offerat planta, cui  
 Polygala nomen rectè competere possit.

Ὀσύρις. OSYRIS. *Osyris* CAP. CXXXVIII.


OSYRIS frutex est niger, ramulos ferens tenues, lentos, fractuque contumaces: & in his fo-  
 lia quaterna, quina, senave, ceu lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescentia. Decoctum  
 eius potum, iuuat arquatōs.

50 OSYRIS, quòd folijs, & caule lini faciem representet, officinis Linaria appellatur. Huius flores, quos  
 tamen omisit Dioscorides, numerosi à medio usq; ad summum uisuntur, syluestris cumini secundi generis modo, ue-  
 rion in hoc purpurei sunt, in illa sublutei. Sunt tamen qui uelint, Osyrim eam esse plantam, quam uulgò nos ap-  
 pellamus Bel uedere, quòd bellè, densissimeq; fruticet, uireatq; per æstatem, non solum in hortis, & uiridarijs sata;  
 sed etiam in fictiliibus ornandi fenestras gratia. Qui uerò ita existimant, eo ducuntur argumento, quòd hæc non mo-  
 do crescat folijs lino similibus, sed quòd etiam nunc feratur à multis ad scopas ex ea parandas. Quandoquidem id à  
 Galeno dictum uolunt in simplicium censu, ubi uerbum *κορυμνὰ* (ita enim legendum est, non autem *κορυμνὰ*  
*τα*, ut male habent codices) non solum medicamenta, quæ faciem uenustant; uerum etiam scopas Græcis signifi-  
 care arbitrantur, quemadmodum & Cornarius in Aëtio interpretatur. Quorum equidem sententiam non prorsus  
 improbandam censeo, quoniam palam est, hanc plantam folijs linum referre, & ad scopas conficiendas aptissimam  
 esse. tametsi Dioscoridis placitis ea non admodum adstipuletur, sicuti nec alia uocata Linaria, quòd neutrius folia è  
 228

Osyridis con-  
 sideratio.

## OSYRIS.

Plinij lapsus.

Osyridis vi-  
res ex Gal.


SMILAX ASPERA.

nigro, quod uiderim, in rubrum mutantur, quodq; harum ru-  
muli longè plura habeant folia, quàm quina, uel sena. Osyri-  
dis historiam tradidit etiam Plinius libro xxvii. capite xii. ubi  
ita scriptum reliquit: Osyris ramulos fert nigros, tenues, len-  
tos: et in his folia nigra, ceu lini: semenq; in ramulis nigrum  
initio, dein colore mutato rubescens. hæc Plinius. In quibus, meo  
iudicio, lapsusprehenditur ipse Plinius, quod ijs notis de-  
pinxerit huius plante semen, quæ folijs reddidit Dioscorides, à  
quo tamè Plinius illa mutuatus est. De uiribus Osyridis Gale-  
nus libro v. simplicium medicamentorum disseruit, ijs uer-  
bis. Osyridis, inquit, herba, ex qua κόρηματτα (sive scopas, si-  
ue medicamenta, quæ cutem exterunt, et læuigant, interpre-  
teris) fieri solent, amara inest qualitas, et obstructiones ex-  
pediendi facultas. quare et in iecinore consistentes obstructio-  
nes adiuuat.

Σμίλαξ τραχεία. SMILAX ASPERA.  
CAP. CXXXIX.

SMILAX aspera, folia habet periclymeni: sar-  
menta tenuia, multa, rubi modo, aut paliuri aculea-  
ta: arborescunt, ab imo ad summa perreptans, se-  
dit conuoluens eis: fert racemos exiles, qui maturi rube-  
scunt, gustumq; leniter mordent: Nascitur in palu-  
stribus, & asperis: radice dura, crassaq;e. Folia, &  
bacini, & ante, & post epoti, venenosorum antidota  
sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucem editis,  
quid ex his tritum propinetur, nullà postmodum ve-  
nena nocitura. Inciditur etiam ad alexipharmaca, id  
est, ad ea medicamenta, quibus venena arcentur.

SMILAX LAEVIS.



**LAEVIS** Smilacis folia hederæ similitudinem habent, molliora, læuiora, tenuiora: huius frumenta supradictæ similia, nullis horrent spinis: conuoluitur arboribus, vt prior: fructum parit lapini modo nigrum, exiguum: floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac smilace, quadam topiariorum arte, tentoria contra æstus molestiam faciuntur: folia per autumnum decidua. Semine cum dorycnio potio, ternis singulorum obolis, varia & tumultuosa in somnis obseruari traduntur.

**SMILAX** aspera Hetruscis Hederæ spinosa, siue Rubus ceruinus nominatur. Hanc diligentissime persecutus est Theophrastus libro 111. capite ultimo de plantarum historia, ubi ita scriptum reliquit. Smilax, id est, hederæ Cilicia, *capitæ* caulis ipsa quoque assurgit, frutex aculeatus, & uelut præhorridus: folium hederæ, paruum, sine angulo, ut *capitæ* pediculi retinaculum humectum: peculiare, quod medium illum callum, qui instar spinæ animalium secat, præterea habet, & interualla staminea, non ex eo porrecta, ut cætera, sed circa eum in orbem circumacta, ab annexu pediculi ducit, ad caulem uero foliorum internodia consummantem: iulus ab eisdem pediculis atque folia, tenuis, sequi conuolvens dependet. Flos candidus, suauiter olens, uerno proueniens tempore: fructus proximus solano, atque melothro, & maxime uis labruscæ uocitate. Racemi pennisiles ut hederæ sunt, uerign ad labruscam potius accedunt: nam de eadem puncto pediculi acinorum exeunt. Colore fructus rutilus est: nucleos in uniuersum quidē binos continet, quamquam grandior ternos, & paruulus unum. Nucleus durus admodum est, & colore forinsecus niger. Peculiare racemum, quod per latera caulium sepiunt, postremoque caulis racemus omnium maximus propendit, sicut in rhamno, & rabo: unde fit, ut extremo fructifera, & latere large fructifera ista spectetur. Hactenus Theophrasti de smilace aspera sententia. Quæ autem Smilax levis appellatur, ubique ferè prouenit, sed præsertim in Hetruria, ubi passim frequentissima inuenitur. Incolæ eam uulgò uocant Vilucchio maggiore. Hæc folijs asperam quadamtenus imitatur, nec facis ac illa arborescendit, sequi conuoluit eis, proxima quoque; uticens: uerum sarmentis, siue ramulis constat, non ut altera horridis, aculeatisque, sed læuibus, flexilibus, ac lentis. Flores profert candidos, calathi effigie: è quibus semen prodit atrum, lentibus maius, sed lupinorum figura. Officinæ hanc plantam Volubilem nuncupant. Cuius tamen plura Mauritanis habentur genera, quorum unum illud est, quod Lupulum appellant. Huius est apud medicos ætatis nostræ frequentissimus sit usus, addaturque ab ijs in quam plurima medicamenta: nihil tamen de eo, quod equidem inuenimus, Galenus, & Dioscorides, alijque ueteres tam Greci, quam Latini auctores, posteritatis memorie prodiderunt. quamquam non desunt, qui uelint, hunc Plinio esse Lupum salictarium, ab eo hoc tantum nomine demonstratum, libro XXI. cap. xv. atque ibi inter eas herbas connumeratum, quæ sponte nascuntur, quibusque plerique gentium utuntur in cibis. Lupuli uocati latius meminit Mesues inter sua deiectionis facultatis medicamenta, ubi hæc ad sensum habet. Est & aliud Volubilis genus, quod *L.V.P.V.L.V.S.* appellatur, folia habens aspera, cucumeris modo: flores exilibus folliculis squamatis compactos, racematimque dependentes, colore subcinereo. Hic flauam bilem detrahit, sanguinem ab ea expurgat, & eius inflammationes extinguit. Sero caprino maceratus, ualentior redditur. Succus cum saccharo decoctus syrupi modo, regio morbo laborantibus medetur. Sed profecto mirum est, quod eo nostræ ætatis medici tam parè raroque utantur, cum tamen præstantissimum sit medicamentum. quandoquidem tum herba ipsa per se, tum etiam succus polente admixtus, capitis dolorem à caliditate contractum tollit. Iecinoris, & uentriculi æstus mitigat. Syrupus ex saccharo, & eius succo paratus, utilissime exhibetur in febribus à bile, & sanguine exciatis. hæc Mesues de Lupulo. Cæterum ad institutum nostrum reuertamur. Smilacis utriusque uires tradidit Galenus libro VII. simp. med. sic inquit, Smilax (sic enim Smilacem uocat Galenus) aspera clauiculis plena est, ita ut uarie sursum deorsumque arboribus circumuoluatur. Folia gustata aliquid habent acrimoniæ, & alioqui si illis utaris, calefaciunt. Smilax levis facultate quodammodo predictæ similis est.

Smilacis asperæ historia ex Theophr.


Smilacis levis historia.

Lupuli historia, et uires ex Mesue.

*hoff*

Smilacis utriusque uires ex Galeno.

## RVSCVS.



Mugotia & *Stah. Wind.* RVSCVS. CAP. CXLI.

**SILVESTRIS** myrtus, aliquibus oxymyr sine, aut myrtacantha, Latinis ruscum appellatur. folium feri myrti, latius, in formam lanceæ mucronatū. bacce per maturitatem rubescunt, rotundæ, à medio folio dependentes,

dependentes, osseo intus nucleo: cubitales ramuli ab radice exeunt, uutilium modo lenti, fraxin contumaces, foliosi: radice graminis simili, acerba, & subamara. Folia, & baccæ in uino potæ, urinam cient: menses pellunt, uesicæ calculos frangunt, stillicidio urinæ medentur, dolores capitis sanant, & regium morbum. In asperis, & præcipitibus locis enascitur. Decoctum radice in uino potum, eosdem præbet effectus. Cauliculi recentes, asparagorum uice in cibo sumuntur: amari autem sunt, sed urinam mouent.

Rusci confideratio.

RUSCUM officinæ corrupto nomine ex literæ additione Bruscum appellant. Nos uero, quod arceutis miribus is aptissimus sit, si salitis appensis carnibus funiculo circumligetur, Pungi topi Hetrusca lingua dicimus. Germinat hic uere asparagi modo, turionibus tamen breuioribus, crassioribus, hirsutisq: qui elixi manduntur ex oleo, sale, & aceto. Caterum, quod non obscure amarorem gustui relinquunt, in medicamentis potius, quam in cibis expetuntur: sunt enim ciende urinæ, aperiendisq: obstructionibus perquam idonei. Græcis, quod folijs sit acutis, & myrtum æmuletur, oxymyr sine, hoc est, acuta myrtus appellatur.

*Ζυφύνη & ραυτή.*

LAVRVS ALEXANDRINA.

LAVRVS ALEX. ALTERA.



Δάφνη ἀλεξάνδρεια.

LAVRVS ALEXANDRINA.

CAP. CXLII.

LAVRVS Alexandrinā folio est rusci maiore, molliore, & candidiore: femine inter folia rubro, ciceris magnitudine: ramos spargit in terra dodrantes, interdum longiores: radice sylvestri myrto simili, maiore, molliore, odorata. inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in uino dulci, & stillicidio urinæ auxiliatur, sed sanguinem extrahit.

Lauri Alexandrinæ consideratio.

SI LAVRVM Alexandrinam, & Hippoglossum unam & eandem plantam esse sensisset Dioscorides, ut quidam existimant, nulli quidem dubium est, quin superuacuum erat, de iisdem seorsum, diuersis atq: etiam proximis capitibus Dioscoridem differere. uel nulla in earum notis, & uiribus reperiretur differentia. Sed quoniam eas seorsum tanquam diuersas retulit, diuersasq: utrisq: notas assignauit; idcirco has plantas inter se differre dicatur, necesse est. Nam etsi utriq: folia rusci reddiderit Dioscorides; tamen Hippoglossum statuit aculeatam gerere comam, & in summo ceu linguas & folijs exeuntes: commendauitq: comam ad dolorem capitis coronæ modo impositam: & radicem, succumq: malagmatis admisceri scripsit. Verum hic in Lauro Alexandrina nec linguarum meminit, nec aculeorum & folijs

fructus prodeuntium: tradidit quidem hanc folia habere rusco similia, sed maiora, molliora, & candidiora: ramos do-  
 ctiles, in terram sparsos: radicem rusco similem, maiorem tamen, molliorem, & odoratam. Cui vires tribuit ad  
 difficiles partus, ad urinae stillicidium, & ad sanguinem extrahendum. His accedit, quod (ut Dioscorides testari vi-  
 deatur) Laurus Alexandrina fructum fert rubrum, ciceris magnitudine, inter folia; non autem in medijs folijs, ut hip-  
 poglossum, & ruscus. Ex his itaq; tum notis, tum uiribus, quæ in hisce duabus plantis maxime pugnare deprehendun-  
 tur, omnibus abunde constare arbitror, hallucinari eos, qui putant Laurum hanc, & hippoglossum unam & eandem  
 esse plantam. Nos equidem hanc, cuius hic figuram damus, ueram ac legitimam Laurum Alexandrinam esse cense-  
 mus, quæ (ut pictura pulchrè demonstrat) non parum ab hippoglossa differt. Huic alteram adiecitimus, quæ & ipsa  
 haud dubie, ni fallor, fuerit Laurus Alexandrina, si huic fructum in medijs folijs innasce concedamus. Lauri Ale-  
 xandrinae vires memorie prodidit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Lauri herba, quam  
 & Laurum Alexandrinam appellant, temperatura euidenter est calida: & gustantibus acris simul & subanara  
 est: potaq; tum urinam, tum menses prolicit.

Συλάρι  
DAPHNOIDES.

CHAMAEDAPHNE.



Δαφνοειδής. DAPHNOIDES. CAP. CXLIIL.

DAPHNOIDES. cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus, obsequiosisque, multis, à medio  
 sursum versus foliosis: cortex supra modum viscosus ramos vestit: folia lauri, graciliora, & mol-  
 liora, fractu contumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntur: flores candidi: bacca, cum  
 ematuruerit, nigra: radix inutilis. nascitur in montosis. Pituitam extrahit folium recens, vel ari-  
 dum in potu: menses ciet, & vomitum: caput inanit commanducatum: sternutamenta mouet.  
 Baccae quindecim potæ aluum resoluunt.

Χαμαιδάφη. CHAMAEDAPHNE.

CAP. CXLIIL.

CHAMAEDAPHNE virgas emittit cubitales, singulari ramulo constantes, rectas, tenues,  
 laues: folia lauri similitudine, læuiora multò, ac viridiora: semen rotundum, rubens, annexum  
 folijs. Illinuntur capitis doloribus trita folia, & stomachi ardores mulcent: ad sedanda tormina  
 cum vino bibuntur. Potus cum vino succus menses, & urinam ciet: idem facit pello appositus.




Daphnoidis,  
& Chamedaph-  
nes cōsid.

Multorum er-  
ror.

Daphnoidis,  
& Chamedaph-  
nes uires.


**DAPHNOIDES**, quam officinae, & herbariorum vulgus Laureolan uocant, frutex est uulgaris notitie. Prouenit hæc frequens in uallis Ananie montibus Tridentino agro, nullis prorsus reclamantibus notis. Cabit illa enim assurgit uirgis, flexilibus, obsequiosisq;: folijs numerosis, sursum spectantibus, lauro similibus, gracilioribus tamen, ac mollioribus, acerrimo gustu: quin & ramorum cortex admodum tenax est. Hinc itaq; fit, ut eos errare toto celo deprehendantur, qui putant Mezereum Mauritanis uocationem esse Daphnoidem. quandoquidem Mezereum Chamelea est, de qua suo loco differemus. Porro Chamedaphne, quam Laureolan marem pleriq; cognominant, folijs ac fructu à Daphnoide non longe differt: uerum hæc tantum intercedit differentia, quod Chamedaphne singulari rectoq; caule constat, cui folia circumqua; prominent, adeo ut in cacumine in orbem umbelle instar diradentur: semine inde prodeunte Daphnoidis modo. Ceterum, quod uocauerit Plinius Chamedaphnen eam clematidem, quam di qui Vincam peruincam appellant, credidere quidam hanc Dioscoridi esse Chamedaphnen. Sed profectio ij falluntur: errorq; omnibus euidentior fiet, quam ut pluribus explodi postulet, si modo contemplantur, & conferantur note, quibus Vincam peruincam descripsit Plinius libro XXI. cap. XI. & quibus representauit Chamedaphnen lib. XXXIII. cap. XV. Verum Plinio, quod clematidi folia sint lauri, uideaturq; humilis laurus, ideo non temere eam Chamedaphnen dici placuit. Sunt, qui Laureola fructum Piper montanum uocent, quanuis rusticis Ananiensibus nil aliud sit piper montanum, quam Dioscoridis granum Gnidium, ut infrà suo loco dicemus. Daphnoidis, & Chamedaphnes uno tantum capite meminit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Chamedaphnes germina tenera ediquoq; assolent. Est autem persimilis uiribus lauro Alexandrina: sicut sanè & quod Daphnoides nuncupant.

Ἐλεβορος λευκός.  
**VERATRUM ALBUM.**



Ἐλεβορος λευκός. **VERATRUM ALBUM.**

**VERATRUM NIGRUM.**



**CAP. CXLV.**

**ELLEBORVM** album, Latini veratrum album uocant, fert folia plantaginis, aut betæ syluestris similia, sed breuiora, & nigriora, rubescentia: caulem cauum, quadrantalem, tunicis conuolutum, quas abdicat, cum arescere incipit: radicibus nititur multis, tenuibus, ab oblongo, & exiguo capite ceparum modo exeuntibus. nascitur in montibus, & asperis. Radices mensibus colligendæ. Optimum habetur candidum, friabile, carnosum, modicè extentum, nec tamen iunci modo mucronatum, quod frangendo puluerem emittit, & tenuem habet medullam, gustu nō admodum feruens, neque saliuam subinde ciens. huiusmodi autem strangulat. Primum Cyrenaicum tenet. Galaticum autem, & Cappadocicum candidiora, & puluere quodam obsita, celerius strangulatus mouent. Vomitione autem uarios extrahit humores. Collyrijs admiscetur, quæ

gaz caliginem oculorum discutiunt. partus impositum necat, menses pellit, sternutamenta exci-  
tat: mures interficit, cum melle, & polenta subactum: absument carnes, si coquatur unà. Datur per  
se ieiunis, & cum sesama, aut ptisanæ succo, aut halicæ, aut lentis cremore, cum aqua mulsâ, aut  
pulsâ, aut quavis alia sorbitione. Cogitur cum pane, & ita inassatur. Præparatio corporum, ac ui-  
tus ratio diligenter tradita est, cum ab his qui de medica eius portione scriptitarunt, tum maxime  
à Philonide Siculo Ennensi, cui nunc assentimur: quippe longum nimis esset in hac præsertim  
editione de materia, simul medicam curandi rationem exponere. Dant nonnulli in pultis sorbi-  
tione, aut copioso halicæ cremore, aut paucum antea cibum dari præcipientes, statim ueratrum  
offerunt, ijs præsertim, quibus strangulationis suspicio imminet, aut si ualétudo corpus infirmat:  
hoc enim modo deiectionis nihil periculi minatur, quod cibo munitis non intempestive medicamen-  
tum corporibus offeratur. Vomitiones concitant subditæ ex eo balani cum aceto.

*Christi inuit*

ΕΛΛΕΒΟΡΟΣ ΜΕΛΑΝ. VERATRUM NIGRUM. CAP. CXLVI.

ELLEBORVM nigrum appellatur melampodion, quoniam caprarum pastor nomine Me-  
lampus furentes in se Proetidas primus purgasse, & sanasse fertur. Folia ei uiridia, platani similia,  
minora, folijs sphondylii proxima, subaspera, nigriora, pluribus diuisuris incisa: caulis asper:  
flores in purpura albicantes, racematim cohærentes: semen cnici, quod in Anticyra sesamoides.  
uocant: quo deiectiones molliuntur. Radicibus cohæret nigris, tenuibus, à capitulo cepæ simili  
confibratis, quarum est usus. In collibus, asperis, & sitientibus locis enascitur. Optimum est,  
quod ex huiusmodi petitur terris, ut ex Anticyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eligi  
debet corpulentum, & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruensque: cuiusmodi est  
in Helicone, Parnaso, & Aetolia natum: attamen Heliconium præcellit. Veratrum nigrum pur-  
gat uentrem, detrahit bilem pituitasque, datum per se, aut cum scammonia, & tribus obolis siue  
drachma falis. decoquitur uel cum lente, & iusculis, quæ purgationis causa sumptantur. Pro-  
dest morbis comitialibus, melancholicis, insanientibus, articularijs doloribus, & resolutis. Men-  
ses inditum trahit, partus necat: purgat fistulas impositum, & tertio die detractum. Item contra  
grauitatem auditus in aurem demittitur, ibique in alterum, aut tertium diem esse finitur. Scabiem  
linat illitum cum thure, aut cera, & pice, & cedrino oleo: uutiliginibus, lepris, impetiginibus ex  
aceto medetur: dentium dolorem collutione mitigat. Erodentibus medicamentis commiscetur:  
hydropicorum uentri utilissimè imponitur factum ex eo, farina hordeacea, & uino, cataplasma.  
Constitum proxime radices uitium, uinum purgandi facultate donat. Huius resparfu domos ex-  
purgari arbitrantur: quare inter fodiendum stantes Apollinem, Aesculapiumque precantur, ac ui-  
tant aquilæ uolatus: aduolare enim non sine periculo tradunt. nanque si auis effolsionem ellebori  
confpexerit, moriturum qui succidit, augurium est. Celeriter effodiatur oportet, quoniam hali-  
tu caput aggrauat: quapropter ad id arcendum, fossuri allium præsumere, & uinum bibere con-  
sueuerunt: nulli ita noxæ opportuni redduntur. Veratri albi modo emedullatur.

*Christi inuit*

ELLEBORVM, quod & Veratrum Latinis dicitur, tam album, quam nigrum omnibus, ni fallor, notum est  
in Italia. Et quauis inibi unum tantum Ellebori albi genus inueniatur; nigri tamen tria nobis comperta sunt genera,  
flore duntaxat inter se distincta. Vnum quidem flores profert purpureos, quales suo reddidit Dioscorides: alterum  
uero candidos: tertium denique herbaceos. Hæc ut flore distinguuntur; ita etiam uiribus inuicem differunt. quando-  
quidem alterum, & tertium genus adeo uiribus inbecillia sunt, ut ferè nihil ad alium deiciendam præstent. Id quod  
facto periculo didici, cum primum ellebori genus flores ferens purpureos nobis non esset ad manus. Huius radicem  
diluto ex more nostro paratò, hyeme etiam media, & magis urgente frigore (etsi id improbeni medici) præparata  
prius diutius materia decoctis, ac syrupis ad id facientibus, plures quartana febre laborantes sanauimus. Nunquam  
enim, quod meminere, hoc ellebori dilutum dedimus quartanarijs nostris, quin ex unica assumptione, uel saltem ala-  
tera, Deo iuuante, fuerint ad sanitatem restituti. Ceterum albi quoque ellebori dilutum exhibuimus quibusdam melan-  
cholicis, magno sanè successu: nullo tamen egrotantium incommodo, nullaque noxa. Quod non alia ex causa euenisse  
putauerim, quam quod in Tridentino agro, alijsque circum finitimis locis, ea fortasse sit illius cæli temperies, ut non  
eleo perniciosus facultatibus scateat utrumque elleborum, quemadmodum illud, quod in calidioribus prouenit regio-  
nibus: tamen non dubitauerim etiam utriusque acerrimam uim reprimi, ac corrigi proprijs quibusdam additis medi-  
camentis. Visuntur nigri uniuersa genera Martio, & Aprili mensibus uno & eodem loco florere in amplissima sylua,  
per quam transeunt, qui Goritia Labacum Carniole urbem proficiscuntur, ubi & nos præstantissimum sæpius legi-  
mus. Purpurei radices nigriores, carnosioresque cæteris habentur: cum aliorum generum radices ut plurimum sub-  
albide specientur: omnibus tamen in uniuersum eadem est foliorum facies. Herophilus antiquissimus medicus el-  
leborum fortissimo duci equabat: concitatis enim intus omnibus, ipsum in primis exire dicebat. Ideo errauisse anti-  
quos parcius id præbendo, cum celerius erumperet, quod daretur largius. Sed hæc Herophili sententia non placet  
nostræ ætatis medicis, neque etiam nobis, ut quæ pluribus daminari, & explodi possit. Elleborus niger boues, equos,  
& sues necat: proinde id in pascuis cauere, quauis albam innoxie depascantur. Nigri radices demorsis à serpente  
quadrupedibus

Ellebori utri-  
usque consid.

Herophili sen-  
tentia damna-  
ta.

Opinio quo-  
rūdam repro-  
bata.  
Confiligo

Vgonis Sole-  
rij opinio ex-  
plosa.

quadrupedibus mirifice medentur; si recentes in vulneris osculum, sublata à carne cute, immittantur, quod ita eia-  
latum reuocent uenenum: quin et illud idem prodest, si gregi pestilentia ingruerit, in auribus traicta, uel petiori  
infixa radice. Qua ratione ducti credere nonnulli, id etiamnum in hominibus fieri posse, quod si in perforatam can-  
cane cutem nigrum elleborum inferatur, eos omnino à pestilentia tutos reddat, qui gestauerint. Ellebori semen, Ari-  
stotele auctore, coturnicibus gratissimum est: quam ob causam antiqui eas abdicarunt mensis. quæ tamen bodie ma-  
gnopere expetuntur. Porro non desunt è recentioribus, qui putent nigrum communis usus Elleborum, cui flores  
herbacei insunt, non elleborum, nec eius speciem esse, sed eam sanè plantam, quam Columella, et Plinius Confiliginem  
uocant, quamque ad pecorum pulmonariam curandam, pestilentiamq; arcendam summis laudibus efferunt, hoc tan-  
tum puto argumento freti, quod scripserint ij, si in morbo si quadrupedis auricula confiliginis radix inferatur, perfo-  
rata ferro prius aure, omnem morbi uim eò confluere, et per illud foramen pestilens uirus elici. Siquidem cùm pesto-  
res huius ætatis obseruauerint, id totum (ut nos quoq; paulò antè diximus) præstari tantum illius ellebori radicibus,  
existimauerunt hoc ueratri nigri genus, quod flores rubentes non proferat, uel (ut Dioscorides inquit) in propria  
albicantes, sed herbaceos, confiliginem esse. Sed ij, mea quidem sententia, falluntur: quippe Absyrus, et Hierocles  
idem præstare nigrum ueratrum affirmant. Quibus etiam subscribit Plinius libro xxv. cap. v. his uerbis. Nigrum  
elleborum pecorum, et iumentorum pituitas sanat, surculo per aurem traicta, et postera die eadem hora exempta.  
hæc Plinius. Ex quibus utiq; perspicuum fit, non modò confiliginis, sed etiam nigri ueratri radicem hæc omnia effice-  
re posse. Vanum profectò esset dicere, exempli gratia, sabinam esse calamintham, uel contrà, quòd utraq; remotius  
mensis eliciant. quasi natura adeò fuerit auara, ut unicuiq; morborum generi unum tantum genuerit medicamentum,  
cùm tamen nullus sit morbus, cui innumeras non creauerit medicinas, uno et eodem ordine adhibendas. Adde etiam,  
quòd cùm nullus extet auctor, quod ego inuenerim, qui Confiliginis historiam describat, neque una quidem nota eius  
faciem representet, non uideo, quomodo rectè ij asserere possint, ueratrum nostri usus esse confiliginem. Sciunt itaque  
uelim, qui nigrum herbacei floris Elleborum ideo Confiliginem esse contendunt, quòd pestilentibus pecorum morbis  
presens remedium sit, si eius radix auriculis, et alijs corporis partibus inferatur, id successu longè meliori effici, si  
rubentis floris elleboro idem fiat, citiusq; expurgari uirus illud pestilens, quòd huic uires insunt ualentiores. Cete-  
rium hic non est silentio dissimulanda inepta satis, et uana, meo quidem iudicio, de nigro ueratro opinio Vgonis Sole-  
rij, uiri alioqui doctissimi, ut eius testantur scholia, quæ nuper in priores Actij libros edidit. Is enim in predictis scho-  
lijs censet, Elleborum nostri usus tam illud, quod flores fert rosarum modo purpureos, quam quod albos, esse lycocto-  
ni, uel cynoctoni aconiti species: quod uerò herbidos habet flores, Plinij et Columelle Confiliginem aliorum iudicium  
secutus. Quod quibus rationibus comprobet, ex eius uerbis, quæ modò referam, cognosci poterit. Si quis, inquit, cõ-  
memoratarum iam plantarum radices diligenter expendat, nihil illas cum nigri ueratri radicibus (quæ teste Dioscori-  
de, cepæ modo bulbosæ sunt, erumpentibus ab imo earum bulbo multis radicibus) commune habere multò euidentius  
comperiet, quam ut pluribus demonstrari nunc debeat. Taceo nullam ex his plantis dum uelluntur, capitis dolorem  
ob uaporum halitum concitari, ut ipse millies sum expertus, id quod in nigri ueratri euulsione testatur Dioscorides.  
Ex his igitur constat, nullam harum trium plantarum ad nigrum ueratrum satis aptè posse reduci. quin duas priores  
aconiti lycoctoni postremas species esse, postremam herbam sui generis. hæc Solerius. Quibus uerbis etiam in me exis-  
se, licet non apertè, meamq; oppugnasse sententiam ex hoc planè conijcio, quòd nullus, quod sciam, ante nos scripse-  
rit, tria in Italia, ac priuatim in Carniola reperiri nigri ueratri genera, florum tantum colore distantia. Neq; id cer-  
tè agrè fero, quòd libenter audiam, indies nouas in re herbaria proferri sententias. Velim tamen id liberius, apertius,  
et firmiter tum rationibus, tum auctoritatibus fieri. Redeo ad Solerium, cuius sanè hæc in re argumenta me fac-  
tè diluere posse spero, utpote quæ (pace eius dixerim) leuia satis sunt, et prorsus à ueritate desciscant. Nam falsum  
esse, ac nimis fortasse temere dictum arbitror, quòd Ellebori genera illa, quorum superius meminimus, non mittant  
radices (ut Solerius asserit) tenues, nigras, à cepaceo quodam capitulo pendentes, ac confibratas: cùm omnibus non  
modò rei herbariæ peritis; sed etiam pharmacopolis, ne dicam lippis, et tonsoribus, manifestū sit, nigri ueratri com-  
munis usus radices non aliunde, quam à bulbaceo quodam tuberculo omni ex parte pendere nigras, ac graciles: non  
autem cepæ modo bulbosæ esse, et ab imo bulbo multas erumpere, ut ille pronunciauit. Vnde facilè adducor, ut cre-  
dam, si licet ingenuè dicere quod sentimus, Solerium aut Dioscoridis lectionem luxasse, aut eam minus rectè perce-  
pisse, aut parum adhuc rei herbariæ gnarum esse, ut qui fortè in ea re non multum laboris insumpserit. Quòd autem  
(ut idem ait) ex hoc nostro elleboro, dum effoditur, nullus ob uaporum halitum capitis dolor concitetur, et ob hoc  
illud legitimum esse non possit, nulla hæc est ratio apud me. Neq; enim mirum alicui esse debet, cur id non faciat: quo-  
niam Dioscorides non dicit, quòd Elleborum nigrum effodientibus capitis dolorem inferat, sed quòd halitu caput ag-  
grauat. Quam nimirum grauitatem id, cui flos purpurascit, tanquam ceteris acrius, apud nos sæpius excita, præ-  
sertim si ligone uulnerentur radices, et uentus aduersa parte spiret. Id quod fortasse in Anticyra, Helicone, Parnas-  
so, et Aetoliæ ualentius præstat. quandoquidem, Dioscoridis testimonio, ijs in locis acre gustu, feruensq; et om-  
nium probatissimum gignitur climatis illius ratione. quod in Gallia fortasse, et in Germania celi inclementia non e-  
uenit. Ceterum quòd priora nigri Ellebori genera, quæ flore tum purpureo, tum albo constant, aconiti cynoctoni,  
uel lycoctoni sint species (ut Solerius sibi perperam, mea quidem sententia, persuasit) mihi planè absurdius uidetur,  
quàm ut ab aliquo approbari possit, et debeat. Ea siquidem aconitorum genera iam omnibus clarissime innotuerant,  
sumq; caule filicis simili, cubito longiore, et radicibus adeò tenuibus, ut squallarum marinarum citris eas comper-  
uerit Dioscorides. Quæ sanè omnia in nigro ueratro communis usus nunquam quis inueniat. Huc præterea illud ac-  
cedit, quòd nobis iam millies experimento compertum est, nigrum communis usus ueratrum, quòd proprio sanguine

atrabiliarios omnes sanare morbos: fistulas callo induratas tribus diebus impositum emollire, & purgare: in aures demissum auditus gravitatem auferre: scabiem, vitiliginem, lepras, & impetigines illitum emendare: & carum in ulceribus excrescentem absumere. Quibus tamen viribus non Aconitum cynoctonon, sed Elleborum præesse, in confesso est. Ex his itaq; omnibus abunde perspicuum fieri puto, in hoc Solerij opinionem prorsus exprobandum esse: etsi idem in alijs quoq; non paucis, meo iudicio, falli deprehendatur. Reliquum autem est, ut de utriusque Ellebori viribus iam aliquid dicamus. Album, ut Mesues in suo de medicamentis deiectionis censu prodidit, morigerum est, quod facile homines suffocare possit: idcirco omnino reiiciendum esse præcipit. Nigri tamen usum probat, sed in validissimis tantum corporibus. Quod sanè decretum nonnullos adeo perterruit, ut non modò suis medicamentis Elleborum admiscere non audeant; sed & nomen abhorreant. Verùm ij ridendo potius timore quodam ducuntur, quàm quod iure usque adeo elleboro refragari debeant. Siquidem ego testari possum, me sexcentis ferme hominibus nigri ellebori dilutum exhibuisse nullo prorsus incommodo: atq; etiam eiusdem diluti faciendi rationem quàm plurimos docuisse medicos, qui, facto subinde periculo, effectum consecuti sunt; unde ingentes mihi gratias retulerunt, quæ merito debentur elleboro. Præstat quod, euulsis statim radicibus, interna repurgatur matrice, siccaturq; in umbra. Harum pulvis diluto longè fortior est: ob id enim non datur nisi robustis, & ubi obcalluerit morbus. Proinde de coita scriptum reliquit Actuarius in libro de compositione medicamentorum. Veratrum nigrum, atram bilem flammamq; è toto trahens corpore deorsum, nec tamen citra ullam difficultatem pellit. Ideo febribus circuitu repetentibus, & diuturnis obijcinus. Datur quoq; insanientibus: altera caluarie parte, & subter caput diutine cruciatis commotissimum: præsertim uisceribus, utero, & uesicæ deiectionum medicamen postulantis. Maxima autem eius vis est peculiariter educere, quicquid sanguini commixtum, eum corrumpit. Ideo ueterascentibus æquatis morbis utile: et quibus in superficie summatis asperitudines emerferunt, uelut lepris, impetiginibus, & horum similibus: elephantia quoque laborantibus accommodatum est. Datur scrupulorum ternum pondere, aut paulò plus minusue. Fit è siccis radicibus fibris, aqua paulum maceratis: postea cortice detracto, & in umbra siccato, proiectaq; tenui, quæ in ipsa subest, medulla. Exhibetur autem ex passo, & aceto mulso: uerum suauitatis gratia, quedam ex odoratis seminibus inferenda. Si uerò efficaciorẽ alui deiectionem moliri sit in animo, scammonij paucillum adijcito. hætenus Actuarius.

Ellebori utriusque uires.

Ellebori utriusq; uires posteritatis memoriæ tradidit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Elleborus uterq; tum albus, tum niger extergentis simul & excalfacientis est facultatis. Quamobrem ad alphos, impetigines, scabies, leprasq; accommodati sunt. Quinetiam niger, si in fistulam callo induratum demissus fuerit, duobus tribusue diebus callum detrahit. Dentibus prodest cum aceto colluentibus. Sunt autem in tertio ordine excalfacientium, & desiccantium. Porro niger gustu calidior est, candidus subamarus. Hætenus de utroque Elleboro Galenus.

Ellebori utriusque uires ex Galeno.

Ceterum quedam planta reperitur à recentioribus OPHRIS appellata, quæ folijs maxime album ueratrum representat. Duo tantum hæc folia profert: inter quæ caulis erumpit, capitulis quibusdam oblongis in uniuersum repositis: è quibus flores exeunt candidi, exiguis linguis similes. Radice nititur gracili, non sine multis appendicibus, odore præstanti. Præfertur uniuerfa planta ad denigrandos capillos, fracturas sanandas, & uulnera glutinanda.

Ophris descriptio, & uires.

Σεσαμοειδὲς μέγα. SESAMOIDES MAGNUM. CAP. CXLVII.

SESAMOIDES magnum in Anticyra elleborum uocant, quoniam albo ueratro in purgationibus misceatur. Simile est senecioni, aut rutæ: longo folio: flore candido: radice gracili, ignata: semen gustu amaro, cætera sesamæ simile. Ventrem detrahit. datur tritum ad bilis, pituitæque deiectionem, quantum tribus digitis capitur, addito ueratri albi sesquiobolo, ex aqua mulsa.

Σεσαμοειδὲς μικρόν. SESAMOIDES PARVUM. CAP. CXLVIII.

SESAMOIDI paruo cauliculi sunt dodrantes: folia coronopii, minora, hirsutiora: & in cauliculorum cacumine capitula florum penè purpureorum, medio eorum albo: semen sesamæ, fuluum, amarum: radix tenuis. Detrahit bilem, pituitasque semen ex aqua mulsa potum dimidio acetabulo: illitum ex aqua tumores, ac tubercula discutit. Nascitur in asperis.

Non est, quod in rebus incomptis longiorem moram nos ducere oporteat. quandoquidem hætenus non solum ipse non reperi in Italia maius, aut minus Sesamoidis genus, etsi in eorum inquisitione multum laboris ac studij impenderim; sed neque etiam ullum inuenire contigit, quod unum, uel alterum legitime ostenderet. Quare has plantas danceps perquirendi curam ijs relinquemus, qui navigationibus Anticyram petunt.


Σίλυσ ἄγριος. CVCUMER SYLVESTRIS. CAP. CXLIX.

CVCUMERIS syluestris fructu solo distat à satiui cucumere, quem longè minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem: folia, atque sarmenta satiui refert: radice candida, magna. Nascitur in sabuletis, & ruderibus. frutice in torum amaro. Instillatus foliorum succus aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix, ueterem omnem tumorem discutit: imposita cum resina tebeinthina, tubercula rumpit: ischiadicis infunditur: podagras discutit, decocta ex aceto & illita.

Eius

## CUCUMER SYLVESTRIS.

Elaterium.



Eius decocto dentes in dolore colluuntur. Aridæ farina impetiginem, lepras, & uiligines absterget: nigricat cicatricibus colorem reddit, & in facie maculas expungat. Radicis succus sesquiboli pondere, & item cortex acetabuli quarta parte, bilem, pituitamq; deiciunt, præsertim in hydropicis: deiectiones autem citra stomachi iniuriam mouet. Radicis felibra, in uini præsertim Lybici hemina conteritur, danturque ex eo terni cyathi triduo, dum tumor abunde deprimi cernatur. E' fructu huiusce cucumeris fit medicamentum, quod Elaterium uocatur, ad hunc modum. Decerpi cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruiantur nocte una: postridie imposito supra craterẽ rariore cribro, utrisque manibus prehenso, figillatim supino cultro, sursum uersus aciem habente, finduntur, atq; per cribrum humor in subiectum uas exprimitur: simulque carnosum, quod hæsit cribro, quò facilius excidat, relinquitur. quod ita pressum est, residere finitur, atque in uicinam peluim demittitur. Coaceruata autem in cribro segmina dulci aqua perfunduntur, & denuo pressa abijciuntur. Humor in pelui agitur, & linteo opertus, soli exponitur: dumq; steterit, tota supernatans aqua cum humore concretæ, effunditur. Hoc uerò identidem fieri solet, donec existens aqua liquecat: qua stillatim exhausta, sedimentum mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam protinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargant, & medium cauantes, triplicatum linteum obtendant, per quod elaterium cum sua humiditate diffundunt, siccatumque in pila, ut dictum est, conterunt.

Aliqui pro dulci aqua marinam perfundentes, ita eluunt. Alij in nouissima lotionem mulsam aquam respergunt. Elaterium optimum esse constat, læue, non ponderosum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimum, quodque lucernarum luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum tamen scabrumque, si turbidum spectetur, atque erui cinerisque plenum sit, graue & uitiosum esse solet. Nec desunt, qui cucumis succo amyllum immisceant, ut candorem ipsum, & læuitatem imitentur. A' bimatu ad decennium deiectionibus utile est. Integer modus obolus est, minimus semiobolus, pueris chalciduo. siquidem copiosius, periculum adfert. Bilem, ac pituitam utrauis parte extrahit. optima suspensio est purgatio. quod si in animo sit deiectionem moliri, adiecto salis duplo, & stibij quod colorare sufficiat, ex aqua, erui magnitudine catapotia dato, postea cyathus unus aquæ tepidæ sorbeatur. Ad citandas tamen uomitiones aqua diluens elateriũ, subiectas lingue partes penitissimè penna oblinito. quod si quisquam difficiliter euomat, oleo, aut unguento irino resoluto: somnum inhibeto. Porro his, qui eximie uacuantur, continuè uinum, & oleum dare conuenit: etenim uomendo restituuntur. Quod si uomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Ciet elaterium menses, & partus enecat, in pello subditum. morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum, & diuturnis capitis doloribus liberat. efficacissimè anginis illinitur, cum uetere oleo, melle, aut felle taurino.

Cucumeris  
sylvestris con-  
sideratio.

**SYLVESTRIS** Cucumis frequens in Hetruria prouenit, præsertim agro nostro Senensi in oppidorum plateis, & secus moenia, & semitas. Ex eius fructibus succum exprimunt officinae, atq; Elaterium uocatum parant. De quo differens Theophrastus lib. ix. cap. xiiii. de historia plantarum, ita scribit. Sed omnium medicamentorum diuturnissimum Elaterium est, optimumq; quod uetustissimum. Itaque medicus quidam, uir baud insolens, neque mendax, elaterium ducentorum annorum, uirtute mirabili seruare apud se retulit, eo à quodam munere donatus. Causa, ob quam tam longo seruari tempore possit, humoris copia est: quamobrem uel cum præciderint, in cinere humidum ponunt, & tamen ne ita quidem siccari potest, sed usq; ad quinquagesimum annum lucernis admotum lumen extinguit. Hæc igitur uis peculiaris isti tribuitur. hætenus Theophrastus. A' quo maxime dissentire uidetur Dioscorides: quippe qui Elaterium dixerit à bimatu ad decennium deiectionibus utile esse. Theophrastus uerò, idem ducentis annis mirabili uirtute seruatum esse. Quin & in eo discordare deprehenduntur, quod alter tradiderit tantum humoris in se continere Elaterium, ut usq; ad quinquagesimum annum lucernis admotum lumen extinguat. Alter uerò probatissimum illud esse Elaterium, quod lucernarum luminibus obiectum, facile flagret. Theophrasto subscribit Plinius lib. xx. cap. i.

ubi sic



esse inquit. Elaterium usq; ad quinquagesimum annum lucernarum lumina extinguit. Hoc enim ueri experimentum est, si ante noctem prius quam extinguat, scintillare sursum ac deorsum cogat. hæc Plinius Theophrastum secutus. Ceterum hæc in re faciliè crediderim, Dioscoridis codicè hoc in loco omnino deprauatū esse. Quippe præter Theophrasti, & Plinii sententiā, cum omne humidum, quod pingue non sit, ignis flammam protinus extinguat, nulli profectò dubium est, quin Elaterium, in quo humiditas aquea multum exuperat, potius flammā extinguat, quàm flagret: namq; flammæ excitato in humido à calore flatu, lumen extinguit. id quod nobis aliquando experimento compertum est.

Elaterij uires descripsit Mesues inter sua deiicientia medicamentā, ubi in hunc sensum inquit. Cucumis syluestris, siue finitus abradit, & uasorum oscula aperit: proinde & intestinorum tormina excitat, & alia adfert nocimenta. Sed colla hæc omnia possunt, si addatur aut bdellium, aut tragacanthæ lacryma, aut aqua mulsā cum salis modico, aut si ex lacte bibatur. Roboratur elaterij uis, addito fossitij salis momento, aut odorato puluere, quem officinæ species elephraginis uocant: ijs enim admistum felicius quoq; operatur. Purgat, ut quidam ferunt, scammonij modo. At reuera magis pituitam deiicit, quàm bilem: quanuis & hanc quandoque detrahat, præsertim cum deiectioni parata promptiq; sese offert. Mirificè præter hæc sanguinis serum expurgat, ab ijs potissimum partibus ducens, à quibus agri decumbentes humores detrahi solent: quamobrem articulorum dolore uexatis opem non modicam præstat. Radix in aqua elixata, tusa, & oleo subacta cum absinthio, diurnam hemicraniam sanat sincipiti, & loco dolenti illita, si tamen prius eius decocto foueatur locus. Præstat idem & succus ex lacte naribus inmissus, quod cerebrum purget: idcirco & narium tædia delet, & comitiales iuuat. Idem obduratos resoluit abscessus, quemadmodum & strumas, præsertim addito melle, & caprino stercore. Radicis, & cucumis ipsius succus aqua intercute laborantibus præstantissimum est medicamentum, quod flauam propriè educat aquam. Ad idem ualet & radicis decoctum. Prodest præterea arquat, & iccoris, & lienis obstructionibus. Item ischiadicis, tum chysteribus infusum, tum etiam si decocta radix exterius imponatur. Siccatae radicis puluis, uulnerum cicatrices attenuat ex melle impositus: & sugillata ex ictu delet. Eiusdem succus fabacea farina admistus, & linimenti modo adhibitus maculas omnes, quæ cutis nitorem uitiant, mirificè detergit. Sed animaduertendum est, ne plusquàm par sit hauriatur: quod reſeratis uasorum osculis sanguinem eliciat. Cucumeris agrestis uires reddidit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, his uerbis. Cucumeris agrestis, & fructus ipsius succus, quem uocant Elaterium, & non minime radicis, ac foliorum, ad medicationes accommodus est. Elaterium itaq; mensis ciet, & fetum interimit appositum, ceu alia omnia amara simul & subtilium partium, maxime si aliquam habeant caliditatem, ueluti nimirum Elaterium. Summe siquidem amarum est, leuiter calidum, ut ex secundo sit ordine excalfacientium. Porro tale protinus quoq; digerendi uim possidet. Sic igitur eo angina laborantes inungunt quidam cum melle, aut oleo uetere. Bonum item est regio morbo affectis, fusum cum lacte in nares. Hoc etiam usu dolores capitis sanat. Atq; Elaterium quidem eiusmodi est. At radicis succus, ut & foliorum, licet elaterio similem uim habeat, imbecillioſiorem tamen. Sed & ipsa radix ad similem facultatem possidet: abstergit namque, digerit, atque emollit. Porro cortex ea potentius desiccat.

Elaterij uires ex Mesue.

Cucumeris syluestris uires ex Gal.

STAPHIS AGRIA.



Σταφίς ἀγρία. STAPHIS AGRIA.  
CAP. CL. Staphis agria

STAPHIS agria, siue herba pedicularis, folia habet labruscæ, diuisa: & cauliculos rectos, molles, nigrosque: fert florem glasti: & folliculos uirides, similes ciceri, & in his nucleum triangulum, scabrum, ex nigro subfuluescentem, intus album, gustu acrem. Grana quindecim, si trita in aqua mulsā dentur, crassum humorem per uomitum purgant: sed qui hauserunt, ambulare debent. Prudenter tamen attendere oportet, & aquam mulsam continuò potui dare: quoniam pericula strangulationis inferunt, & fauces aduſunt. Trita, & ex oleo illita phthiriasi prodest: item prurigini, & psoris. Cit plurimam pituitam commaducata: decocta in aceto, dentium dolori, colluto ore, subuenit: rheumatismum gingiuarum sistit: vlcera oris manantia cum melle sanat. Vrentibus malagmatibus imponitur.

STAPHIS agria, quam officinæ Græca uoce corrupta uulgò Staphysariam uocant, Latinis ab effectu, quod pediculos necet, Herba pedicularis dicitur. Hæc in Istria, Dalmatia, Apulia, & Calabria, frequentissima prouenit. Eius semen copiosum


Staphidis agria confid.

Staphidis egr.  
uires ex Gal.

apud seplasterios inuenitur: namq; eo frequenter utuntur medici in apophlegmatismis. Id quod etiam plurimum ex-  
petitur mulieribus ad pediculos, & lendes necandos. Staphidis agriz meminit Galenus in Astaphide libro vi. sim-  
plicium medicamentorum, sic inquit. Astaphis agria uehementer acrem obtinet facultatem, adeo ut ex capite pur-  
tam purget, quod ἀποφλεγματισέν Græci dicunt, abstergatq; ualenter. Itaq; ad pforam accommodata est. Sed  
& urendi uim aliquam habet.

## Θαψία. THAPSIA.

## CAP. CLI.



THAPSIA nomen ideo accepit, quòd in Tha-  
pso eiusdem nominis insula, primum inuēta sit. To-  
ta uerò naturā ferulæ similis est: graciliore caule: so-  
lijs foeniculi: umbella anethi in cacumine, à singulis  
furculis erumpente: flore luteo: semen quale ferulæ,  
latiusculum, sed aliquantò minus: radix foris nigra,  
intus candida, longa, acris, crassiore libro uestita. La-  
ctis extrahendi ratio hæc est. Facto in ambitu scrobe  
cortices inciduntur: aut radix in fornicis speciem in  
se excauata cooperitur, quòd merus succus confluat.  
oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum  
succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, &  
succus organo per quallum expressus, fictili crasso in-  
solatur. Aliqui folium unà terunt: sed inualidior hu-  
iuscemodi succus. Hoc autem interest, quoniam qui  
ab radice manauit, grauius olet, & humidus perma-  
net: è folijs autem extractus exiccatur, atque teredi-  
num iniuriam sentit. Qui succum colligit, stare debet  
non obuersus uento: aut potius cùm dies apricus est,  
& à flatu filet: quoniam ob halitus acrimoniam facies  
uehementer intumescit, nudaq; corpora inuadunt  
pustulæ: ob id prius liquido cerato, & adstringente, 30  
nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt. Tam  
cortex radices, quàm succus purgandi uim habent, &  
lacteus succus in aqua mulsa potus: nam utrinq; bi-  
lem extrahunt. Radicis modus, quaterni oboli, cum  
tribus feminis anethi drachmis: succi, terni oboli: la-  
ctis, obolus unus. quod eo amplius assumitur, peri-  
culosum est. Huiusmodi purgatio cōuenit suspicio-  
sis, & diuturnis laterum doloribus, reiectionibusq;: datur in cibus, aut obsonio, quibus difficile  
fit uomere. Tam radix, quàm succus omnium maximè, quæ pares cùm eis uires adepta sunt, uim  
habent extractoriam ex alto, ubi ex imo aliquid euocandum est, aut meatuum laxitas aliò transfe-  
renda est. vnde succus illitione, aut radix recens affricu alopecias explent. Radix, succusq; cum  
æquis ceræ, thurisq; portionibus, sugillata, liuoresq; tollunt: sed non plus binis horis dimit-  
tantur: locus deinde aqua maris calida foueatur. Vitia cutis in facie emēdat, cum melle illitus suc-  
cus: lepras tollit: tubercula discutit, perunctus cum sulphure. In diuturnis pulmonum, laterum,  
pedum, articularumq; uoletudinibus utiliter illinitur. Valer ad integendam colis glandem ijs,  
qui natura, non circuncisione curti sunt: tumorem enim excitat, qui pinguium fotu emollitus,  
præputij iacturam refarcit.

Thapsiæ con-  
sideratio.



DE THAPSIAE uiribus locutus est Theophrastus libro ix. cap. xxii. de plantarum historia, ubi ita scri-  
bit. Thapsiæ radix uomitoria est, & si quis continuit, tam superius, quàm inferius purgat. Ad hæc liuida tollere po-  
test: suppurationes tamen aliàs exalbidat facit. Succus eius ualidior est, & quidem tam superius, quàm inferius pur-  
gat. Nullus seminis usus. Nascitur tum alibi, tum in terra Attica, in qua pecudes incolæ eam non tangunt, peregre-  
ne uerò depascunt: & aut alius soluitur, aut intereunt. hæcenus Theophrastus. Thapsiam autor est Plinius libro  
xiii. cap. xxii. à Nerone claritatem accepisse, eiq; magno usui fuisse sui imperij initio, quòd nocturnis grassationi-  
bus conuerberatam faciem illinens sibi cum thapsia, thure, & cera, sequenti die contra famam cutem sinceram cir-  
cunferret: etenim ea mirum in modum sugillata delet. Thapsia plurima nascitur in Apulia, præsertim Gargano mon-  
te, inter complures ferulacei generis plantas. Prouenit & in nostris maritimis locis adeo ferulæ adsimilis, ut non fa-  
cile, nisi à rei barbaria peritis, una ab altera dignoscatur. Visitur etiam hodie in hortis ad spectaculum plantata.  
qua ratione iam ferme omnibus innotuit in Italia. Ceterum non desunt impostores, qui Thapsiæ radicem cortices pro  
Turpeto uendunt: quæ quidem à peritis seplasiarijs in ea medicamenta iure optimo addi possunt, quæ Thapsiam ex-  
poscunt:

possunt: sed in turpeti locum non sunt, meo iudicio, recipiendæ. Quapropter maxime in hoc (ut superius diximus in Tripolij commentatione) à Fuchsio dissentimus, qui Turpetum à Mesue descriptum, nil aliud esse censet, quam Thapsiæ radices. Thapsiæ vires memorie prodidit Galenus libro v. simplicium medicamentorum, sic inquit. Thapsiæ acrem habet, ac uehementer excalfacientem facultatem cum humiditate. Quamobrem ex alto uolenter extrahit, & ipsam quod extraxit, digerit. Verum plusculum ad ea efficienda tempus postulat, ut quæ largè excrementa humiditate impleta est, ob quam celeriter corrumpitur. Et lib. primo de compositione medicamentorum secundum locos, sic inquit. Qui Thapsiæ utitur, sciat opus est, maximam differentiam esse recentis ad uetustorem. Vis enim huius pharmini post annum multum exoluitur, atq; amplius adhuc post duos annos, ausimq; ferè dicere eam penitus inutilem esse qd triennium progressam.

Thapsiæ vires ex Gal.

SPARTIVM.

GENISTA.



Σπάρτιον. SPARTIVM. GENISTA. CAP. CLII.

SPARTION frutex est longas ferens virgas, sine folijs, firmas, fractu contumaces, quibus vites vinciuntur: semen lenticulæ, in folliculis phasiolorum modo nascens: florem, vt albæ violæ, luteū. Purgant per superna vehementer ellebori vice, citra periculum flores, & semina quinīs obolis in aqua mulsa pota. Semen deiectionē mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tufis, extractus succus, ischiadicis, & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare inalunt, & infundere ischiadicis clystere: strigmenta autem elicit cruenta.

TANTA nimirum inter Spartium, siue Spartum, & Genistam intercedit similitudo tum facie, tum etiam uiribus, ut eorum affinitate deceptus iam crediderim omnino errasse eos, qui alterum ab altera secernerent: præsertim cum hac in re deprehendissem Plinium dubitasse libro xxiii. cap. ix. ubi ita scriptum reliquit. Genista quoq; uinculi usum præstat. Flores apibus gratissimi. Dubito an hæc sit, quam Græci authores Sparton appellauere, cum ex ea lina piscatoria apud eos factitari docuerim: & nunquid hanc designauerit Homerus, cum dixit: Nauium sparta dissoluta. Nondum enim fuisse Apbrikanum, uel Hispanum Spartum in usu certum est: & cum sutes fierent naues, imo tamen, non sparto unquam futas. hæc Plinius. Verum cum accuratius Dioscoridem perlegissem, hac de re prius admonitus à clarissimo medico Petro Cannizero Hispano Serenissimi Ferdinandi Romanorum Regis Protophysico, qui in Hispania copiosissimum Spartum, numerosamq; Genistam se uidisse testatus est, comperi planè inter has plantas discrimen esse. Quippe quod Spartium Dioscoridi frutex sit folijs uiduus: & floribus constet albæ uiolæ simili-

Spartij consideratio.

Sparti vsus ex  
Plinio.

bis. Genista uero folia proferat longiuscula, lini ferè modo: & flores luteos, pisti modo lunatos. Hinc itaq; factum  
est, ut nunc in eorum sententia consistam, qui Spartium à Genista differre existimant. Non tamen quod diuersi pro-  
sus generis has plantas esse putem. nam tanta, ut dixi, uni cum altera cognatio est, ut etsi non eadem sint; tamen con-  
generes esse uideantur. Sparti quidem vsus (ut Plinius est author lib. x. cap. 11.) multa post secula ceptus est, nec  
ante Poenorum arma, quæ primum Hispaniæ intulerunt. Herba & hæc sponte nascens, & quæ non queat feri: nun-  
cusq; propriè aridi soli, uni terræ dato uitio. Namq; id malum telluris est, nec aliud ibi feri, aut nasci potest. In Apri-  
ca exiguum, & inutile gignitur. Carthaginiensis Hispaniæ ceterioris portio, nec hæc tota, sed quatenus parit, mor-  
tes quoq; Sparto operit. Hinc strata rusticis eorum; hinc ignes, facesq;: hinc calceamina, & pastorum uestis.  
Animalibus noxium, præterquam cacuminum ténacitate. Ad reliquos vsus laboriosè euellitur: ocreatis cruribus,  
manibusq; tectis manicis: conuolutum offeiss, lignicisq; conamentis. Vulsam fascibus in acervo adunatum biduo, tertio  
resolutum. Spargitur in sole, siccaturq;: & rursus in fascibus redit sub tecta. Postea maceratur aqua marina opti-  
mè, sed & dulci, si marina desit. Siccaturq; sole iterum rigatur, si repente urgeat desiderium, persusum calida in so-  
lio, ac siccatum stans compendium operæ fatetur. Hoc autem tunditur, ut fiat utile, præcipuè in aquis maris inui-  
dum. In sicco præferunt è cannabi funes. At spartium altius etiam demersum, ueluti natalium sitim pensans. Est  
quidem eius natura interpolis: rursusq; quàm libeat uetustum nouo miscetur. Veruntamen complectetur animo, qui  
uolet miraculum æstimare, quanto sit in usu omnibus terris nauium armamentis, machinis ædificationum, alijsq; de-  
siderijs uitæ. Hactenus de sparto Plinius. Ceterum Genistæ in Hetruria adeo frequentissimè proueniunt, ut Maio,  
& Iunio mensibus magnum & iucundum spectaculum præbeant uiatoribus, quoniam tam copiosè suis speciosis, ac  
fulgentibus floribus ornantur, & uestiuntur colles, ut procul aurei uideantur. Gaudent earum floribus apes, ut Pli-  
nius inquit: proinde aluarijs circumferuntur. Genista nobis ligandis uitibus salicis uicem explet, maceraturq; etiam  
cannabis modo, suutq; inde funes, & rudia linteamina, quæ consiciendis saccis aptissima sunt. Expetitur Genistæ li-  
gnum etiam figulis, qui in Italia id uasorum fictilium genus consciunt, quod uulgò de maiolica uocant: quippe quod  
(ut ipsi affirmant) nullo alterius arboris ligno fornax succendi possit, quo aureus ille color conseruetur in opere.

Genistæ con-  
sideratio.

Genistæ de-  
scriptio, & ui-  
res ex Mes.

Genistam recensuit Mesues inter sua simplicia deiectionis facultatis, ubi hæc ad sensum scribit. Genista arbor est  
montana, è cuius caudice quàm plurimè funduntur uirgæ, rectæ, flexiles, fractu contumaces, quibus uites, & alia  
ligantur. Flores edit flauos, lunari figura: è quibus siliquæ prodeunt, erui magnitudine: & semina in eis lenti simi-  
lia, interuallis distincta. Planta tota perturbat, prouocat, incidit, attenuat. Obest cordi, & uentriculo. Sed tollitur  
noxæ (ut Philagrius est author) addito rhodomelle, aut rosa, & mastiche: quin & anisi, dauci, & foeniculi semine.  
Epotum semen pituitam utrinq; ualentissimè purgat, & ab articulis quoq; humores trahit. Renum excrementa pel-  
lit, urinam cit efficacissimè, & calculos disrumpit tam in renibus, quàm in uestica: nec in his materias figi, & in cal-  
culum durescere sinit. Flores contriti strumas auferunt, si cum melle rosaceo, aut sorbili oño deuorentur. Fit ex ijs  
oxymel, cuius usu indurati lienes resoluuntur. Prosunt ischiadicis, podagricis, calculosisq;: si postquam illos sumpse-  
rint, subinde frequenter euomant ægri. Modus, præsertim floris, à drachmis duabus ad quinque: seminis uero à dra-  
chmis duabus ad quatuor. hæc Mesues. Qui tamen Genistæ semen non rectè obseruasse uidetur. quandoquidem id er-  
ui, uel uiciæ faciem potius referat, quàm lentis. Sparti, ut iam ad eius uires redeamus, meminit Galenus lib. viii.  
simplicium medicamentorum, his paucis uerbis. Sparti, quo et uites apud nos alligant, tum semen, tum uirgarum suc-  
cus non instrenuè trahentis est facultatis.

Sparti uires  
ex Galeno.

## ΣΙΛΥΒΟΝ. SILYBUM. CAP. CLIII.

SILYBON lata spina est, folia ferens chamæleonis albi. Hæc recens cum fale oleoque cocta  
estur. Radicis succus drachmæ pondere potus uomitiones ciet.

HACTENVS non ex nostra tantum, sed neq; ex aliorum quoq; inquisitione: uerum ac legitimum Silybum in  
Italia nobis licuit reperire. Et quanuis inter tot alias plantas aculeatas inibi nasci, & esse possit; tamen tam paucis  
eius notas explicauit Dioscorides, ut difficile admodum illud inuentu iudicem: neq; enim ipse, ut ingenuè fatear, quod  
ex illis sit, ausum decernere.

## Βάλανος μυρεψική. GLANS VNGVENTARIA. CAP. CLIIII.

GLANS vnguentaria fructus est arboris myricæ similis, magnitudine auellanae nucis. cuius  
nucleus amygdalarum amararum more tritus, humorem reddit: quo ad pretiosa unguenta pro  
oleo utuntur. Nasceitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudæam. Præfer-  
tur plena, recens, candida, quæ faciliè delibretur. Ea drachmæ pondere pota lienem absorbit:  
cum lolij farina, & aqua mulsæ podagricis illinitur. Psoras, leprasq; decocta in aceto vitiligi-  
nes, & nigras cicatrices cum nitro emendat: & cum lotio lentigines, uaros, & papulas in facie, &  
cutis uitia tollit. Vomitiones mouet, & aluum cum hydromelite resoluit: stomacho aduersatur.  
Oleum, quod ea exprimitur, aluum potuciet. Cortex eius magis adstringit: uerum rursus, & ex-  
pressæ succus abstergentibus medicamentis adjicitur, quæ aduersus prurigines, & scabritias ido-  
nea sunt.

GLANS Unguentaria, quam Græci Βάλανος μυρεψικήν dicunt, in Hispania frequentissima gignitur. Adferre eam copiosa in Italiam. Unguentarij, ac seplasiarij Mauritanorum nomina secuti, eam Ben appellant. Forina hec pyracia maxime refert, albo cortice, triquetra, fractu facili, nucleo intus conferto, et admodum pingui: ex quo eam exprimitur, quod de Ben uocant. Magnificiunt id unguentarij, quod quāuis diu inueteratum, nunquam rancorem sentiat, ut etiam libro primo suo loco monuimus. Arabicæ familie autores (ut modò dictum est) unguentaria glanem Ben nominant. Proinde de ea inter sua soluentia simplicia scribens Mesues, in hunc sensum inquit. Ben glanem est generum. Maius est nucis auellane magnitudine, triangulare. Minus uerò ciceri simile. Vtriq; inest oleositas medulla, lenis, et alba. Præstat maius, quod noxa uacet: minus siquidem noxium est. Præfertur in maiori genere, quod putamine sit albo, leui, tenui: nucleo fragili, albo, oleosoq;. Vetusum recenti melius. In minori autem præstat ciliu in cinereo albicans, fragilis pariter, et pinguis. Dioscoridi tamen in maiori genere (minoris enim non meminit, quemadmodum nec Theophrastus, neque Plinius) præstantius est recens, etsi contrarium asserat Mesues. Oleum ab unguentarijs hoc tempore è nucleis tantum exprimitur, ut Dioscorides docuit, non autem, ut quidam existimant, ex putaminibus, quod dixerit Theophrastus, unguentarios putamine fructus contuso uti solere. Plinius, ut Theophrasti, et Dioscoridis sententiam comprobaret, unguentarios prodidit è putaminibus, medicos uerò è medulla oleum elicere quod hoc medicamentis, illud odoramentis usum præbeat. Veruntamen hac ætate (ut diximus) ab omnibus tantum è nucleis à putamine repurgatis exprimitur. Nec crediderim unquam, quod ex solis putaminibus oleum effluere possit, quoniam diligentissime comprimantur, et constringantur prælo etiam grauissimo: quoniam hæc putamina arida sunt, et omni prorsus humore carent. Illud quoq; fidem non dubiam facere potest, quod hanc parandi olei rationem silencio prætermisit Dioscorides, non modò in hoc loco, sed etiam libro primo, ubi tamen de oleis, et unguentis conficiendis latius differuit. Cuius fortè doctrine immemor Manardus Ferrariensis, uir alioqui nostræ ætatis celebris, dubitat in annotationibus, quas in Mesuem edidit, an Unguentarie glandis oleum è nucleo, an è putamine exprimi debeat, asserens quāquam in quibusdam Dioscoridis codicibus legitur, oleum hoc è nucleis exprimi debere; in aliquibus tamen nec nucleorum, nec putaminū ullam fieri mentionem. Verum etsi ambigendi non defuerit occasio, præsertim ex Theophrasti testimonio, qui putaminibus uti unguentarios tradidit; aderat tamen grauissimus author Galenus, qui rem hanc abunde enucleauit, cum constanter asseueret, Balaninum oleum unguentarijs ex carne nucleorum, non ex putaminibus exprimi. Id quod etiā facile ex Dioscoride colligi potest, cum dicat consimili modo fieri balaninum et amygdalinum. quod autem hoc ex amygdalarum nucleis fiat, nemo est qui dubitet. Hæc sanè nobis non leuem faciunt suspicionem, quod aut eo in loco Theophrasti exemplaria sint deprauata, aut minus integri, et ueraces fuerint auctores, à quibus fortassis unguentarie glandis historiam accepit. His porro accedit huius olei communis usus, et eius parandi ratio. Siquidem Balaninum oleum plurimi faciunt unguentarij, non quod aliqua odoris præstantia commendetur (inodorum etenim est) sed quod nunquam uetustate rancorem contrahat. Id scilicet quod è nucleorum medulla, non autem ex putaminibus conficiunt. Nam rancoris expertis cum sit, omnium aptissimum habetur ad odoratissima unguenta (musturas uocant) temperanda, quæ ex moscho, zibetto, et ambaro, illinendis chirothecis, et alijs, quorum in delicijs, et lasciuijs omnis est usus et gratia, parantur. Quandoquidem si hæc alio quouis oleo liquecerent in unguentum, contracto inde non multo post tempore rancore (ætate enim omne oleum præter Balaninum rancescit) non modò uersam odoris suauitatem exuerent; sed etiam putida, fetidaq; euaderent. Quo utiq; experimento apertissime dignoscitur, an oleum illud Balaninum fuerit, quod ex unguentarie glandis nucleis fieri solet. Ceterum de uiribus Ben hæc subiunxit Mesues. Maioris, inquit, generis fructus incidit, abstergit, attenuat, expurgat, et aperit: sed uentriculum subuertit, et uiscera perturbat, ob exercemētiā, acrimq; humiditatem, quam possidet. Minoris autem uis longe uehementior, et magis periculosa; namq; adeo perturbat, agitatq; humores, ut sepius animæ deliquiū faciat, et frigidos sudores concitet. Proinde non in alios usus is admittendus est, quā in unguenta, et cataplasmata. Maioris noxa demitur, cum igne torrescit: siquidem ignis calore exuperantem deperdit humiditatem, quæ uomitionem mouet, siq; medicamentum tantum deiectionum. Decoquitur etiam cum anisi, et feniculi semine: quoniam hoc modo prior noxa corrigitur. Tam in potu, quā aliter sumptus lentam, crassamq; pituitā uomitu, et deiectione purgat. Ideoq; aptissimum medicamentū est coli cruciatibus non modò haustus, sed etiam clysteribus infusus, præsertim ubi à flatu, et pituita ortum habuerint. Fit etiānum ex contritis ipsius nucleis, polenta, et melle admixtis, cataplasma ad strumas, durosq; tumores admodum utile, et ad neruorum morbos à frigidityte excitatos, addito tantum melle, quo fit, ut conuulsis, resolutis, et contractis opem ferat non obscuram. Pollet præterea ad iecinoris, et lienis infarctus duritiesq;, si addita lupinorum farina, et nardo emplastri modo imponatur: Nucleorum oleum uulnorum cicatrices attenuat, et delet: item lentigines, aliasq; cutis sorditates emendat. Auribus infusus non modò doloribus leuantum præstat; sed et surditatem, et tinnitum curat. Glandis unguentarie uires memorie prodidit Galenus libro v. simplicium medicamentorum, his uerbis. Balanus myrepsice, hoc est, glans unguentaria, adfertur ex barbarica regione. Utuntur unguentarij carnis eius succo, qui facultate calidus est. Reliquie autem, unde expressus est succus, terrestres scilicet, et duræ, uiuentem habent qualitatem amarā. Sed et admixta est quedam adstringitio. Proinde extergentem simul, et incidentem, contrahentemq;, et stipantem effectum possident. Itaq; ad ionthos, lentigines, epibeln, et pruritum, deinde et ad psoram, et lepram conueniunt. Verum enumerato et lienes liquant, iecurq; indurefcens. Quod si quis carnem eius drachmæ pondere cum melicrato bibat, medicamen experietur uomitionum. Sepe etiam per infernam aluam largiter subducit. Itaq; cum hoc medicamento utimur, ad uiscerum expurgationem, et maxime iecinoris, lienisq;, ex oxycrato ipsam exhibere consueuimus. Gaudet uerò uel maxime alioqui aceto ad extrinsecas actiones. Adeo enim efficax efficitur, ut et psoras, et lepras extergeat, et multo etiam magis quæ

Glandis unguentarie consideratio.

Manardi dubium solutum.

Glandis unguentarie uires ex Mes.

Glandis unguentarie uires ex Gal.

bis sunt



Myrobalano  
rum genera.

Myrobalano  
rum vires.

Chrysobala-  
nus.

Beben album,  
& rubeum.

his sunt minora, lentiginem, uiliginem, ionthos, ephelin, exanthemata, achoras, tum ulcerosa, et quæ crassi sunt succi omnia. Sed et cicatricibus decorem adfert. Porro quod cum illinenda est lieni, præstat admistam esse farinam quampiam exiccantium, cuiusmodi est erui, ac lolij farina, id iam potius ad componendorum medicaminum tractationem, haudquaquam ad præsens institutum pertinet: sed et in paratu facilibus ipsum dicitur. Verum in præsens significat abstergentem, et incidentem cum adstrictione quapiam propositi medicaminis dixisse facultatem, ac sic ad aliud transgredi. Cortex tamen eius admodum adstringit: itaque eo possit quis ad ea uti, ad quæ ualida usus est adstrictio. hætenus Galenus. Sed quoniam Balanus myrsipica Mauritanorum Myrobalana nobis ad memoriam reuocauit, quorum iidem quinque faciunt genera, cum ea in medicamenta frequenter, et commodè ueniant, nec eorum, quod extet, meminerint ueteres Græci; ideo nunc de ijs nobis differendum est: neque enim ob eorum usum silentio erant dissimulanda. Sunt itaque, ut diximus, MYROBALANORVM genera quinque: nempe Flaua, Chepula, Indica siue nigra, Empelica, Bellerica: quæ omnia facie inter se distant, ut etiam uiribus. Quamobrem omnino censendum esse putauerim, ea à diuersis produci arboribus. quanquam non desint, qui affirmant, flaua simul, et chepula ex una et eadem arbore nasci, existimantes flaua decerpi ab arbore immatura, chepula uero cum ultimam adeptam fuerint maturitatem. Verum cum horum fructuum ortus, et arbores nos prorsus lateant, non est quod illorum sententiam probare, aut refellere ausim. Recensentur genera omnia inter ea medicamenta, quæ alui citra noxam deprecant: nam etsi purgatoria ui polleant; nulla tamen uirium imbecillitate, aut molestia sumentes afficiunt, sed potius sua adstringenti facultate, quam possident, cor, iecur, et uentriculum roborant, quinetiam uniuersum corpus. Id tantum illis noxæ adscribunt, quod obstructions, et uiscerum infarctus augeant: proinde ne obstructis exhibeantur precipiunt. Infrenantur Myrobalanis medicamēta omnia, quæ deijciendo laborem inferunt: quo fit, ut atiliter adulescantur scammonio. In flauorum Myrobalanorum genere ea ceteris præstant, quæ in uridi plenè flauescunt, ponderosa, farcta, gummosa, crassi corticis, et quibus pumilum osculum inest. E Chepulis ea probantur, quæ ceteris crassiora sunt, colore nigro purpurascēte, cortice crasso, et quæ in aquam delecta fundum quam citissime petunt. Inter Indica excellunt, quæ maxime nigricant, crassa, ponderosa, nullo intus osse, et quæ confracta in unum compacta cernuntur. In Empelicorum classe laudantur, quæ in maiora, crassiora, densiora, ponderosiora; frusta diuiduntur, et quæ minus ossis, quam pulpæ habent. Bellericorum uero illa in suo genere præferuntur, quibus crassius, densitas, grauitasque non desit, et quibus crassus in uniuersum sit cortex. Flaua, Indica, Chepula, Bellerica refrugant ordine primo, siccantque secundo. Empelica uero primo tantum tum refrigerant, tum exiccant. Vim obstructoriam exuunt omnia genera, additis aperientibus, et urinam cientibus medicamentis: uel si macerata caprino fero, aut fumarie succo exhibeantur: uel si cum absinthio, aut agarico, aut rhabarbato hauriantur. Perfunduntur amygdalino, et sesaminò oleo, ut contracta inde pinguedine, uentriculo non inhereant. Quin et id noxæ pariter tollitur, ubi cum cassiæ nigrae medulla, aut manna, aut acidis palmulis deuorentur. Vbi diuisione sit opus, eorum tantum dilutum præbent: ubi autem adstrictione in puluerem conterunt, et subinde propinant. Chepula, quæ saccharo condiuntur magis roborant, quam deijciant. Contrarium efficiunt, quæ cruda siccataque reponuntur. Myrobalana omne genus (ut Mesues est autor) eorum senectutem remorantur, qui ipsis frequenter utuntur: colorem faciunt elegantiores, corpori odorem iucundum conciliant, hilaritatem afferunt, et uentriculum, cor, et iecur roborant: conferunt hæmorrhoidibus, et bilis feruorem reprimunt: ad quod flaua ceteris præstant, ut quæ priuatim bilem detrahāt: et eos peculiariter inuunt, qui temperamento calidi sunt. Fricantur cote ad oculorum collyria, cum uis acerbæ, aut rosarum aqua, aut feniculi succo, quod oculorum inflammationes reprimant, lacrymas sistant, defluxionesque cobibent. Sanantur horum puluere ulcera, addita lentiscina resina. Chepula pituitam exhauriunt, intellectum clarificant, et uisum; præferunt saccharo asseruata: uentriculum tum mundant, tum confirmant. Dantur utiliter aqua intercutis affectis, et diuturnis febribus laborantibus. Nigra utraque bilem trahunt, præsertim exustam. Conferunt membrorum tremoribus; coloris nitorem conciliant, elephantis eos iuuant, mœrores auferunt, et quartanam fugant: Empelica pituitam educunt, cor, et cerebrum, corroborant, intellectum augent, uentriculum à pituita, aliisque noxijs humoribus expurgant, ac etiam confirmant, ac sitim extinguunt, uomitiones cohibent, et cibi appetentiam inuiant. Bellerica ea omnia possunt, quæ et proximè dicta. Myrobalanorum inter recentiores Græcos tantum, quod sciam, Actuarius meminit: qui tamen ea, quæ de illis scripto reliquit, à Mauritanis (ut ipse quoque fateri uidetur) mutuatus est. Sed profecto nesciuerim, qua ratione dictum inter ea medicamenta, quæ uomitum eliciunt, myrobalana reposuerit, cum omnia eorum genera planè uomitiones compescant. Porro hodie ignorata uidetur quæ χρυσόβαλανος Græcis uocatur, digerens, et roborans Indice nardi modo, ad colicos affectus, uentriculi ardores, et singultus à Galeno Aesclepiadis auctoritate commendata libro VIII. et IX. de compositione medicamentorum secundum locos. quanquam non desunt et recentioribus, qui sibi persuadeant Chrysobalanum esse nucem myrsicam: cum tamen plura sint, quæ eorum destruant sententiam, nempe cinereus color, acutus ori sapor, et quod myrsicæ nucis nusquam meminerint ueteres Græci. Nullam huiusmodi legerim mentionem fecit Galenus in libris simplicium medicamentorum. Id quod argumento esse potest, Galenum ipsam non habuisse compertum, quid esset Chrysobalanus. Sed de his hætenus. Ceterum quandoquidem Balanus myrsipica, quam ab Arabibus Ben appellari diximus, nobis in mentem redegit radices illas, quas officinae Beben album, et rubeum uocant, ad cordis affectus ijs, ac etiam recentioribus expetitis, hunc locum non prætereundum esse dixi, quin de ijs quoque aliquid differerem, præsertim quod è Græcis non inueniatur, qui illa posteritatis memorie prodiderit. Sed illud in primis animaduertendum est, quod communis usus radices, quas uulgo Beben nuncupant, et quidem non sunt, de quibus Mauritani scripsere, imò eas prorsus ementiuntur. Siquidem scribit Serapio, Beben radices pro-

ferre minoris pastinacæ similes, contortas, odoratas, & mansu lentas, & in Armenia nasci. Auicenna autem radicem ignoscit frustra Beben esse ait, in se contractas, & siccitate exoletas. At nostrates, quæ in Italia, non in Armenia possuntur, nulla penitus odoris suauitate commendantur: quin & mansæ nullum ori lentorem reddunt, nec erratice pastinacæ faciem repræsentant: cum tamen Arabicum Beben radicibus adeo pastinacæ referat, ut scripserit Hæliæ clarissimus Mauritanorum auctor, Beben & sylvestris pastinacæ radices nullum inter se discrimen habere. Quo fit, ut nulla sese offerat nobis ratio, qua probare possimus, Beben communis usus esse Arabum legitimum. quævis & ipsi inter se hac in historia non parum dissentiant. Nicolaus Myrepsicus, itemq; Actuarius Beben hermodactylum uocant, nescio tamen qua ratione, cum alia sit radix apud Paulum, & Arabes hermodactylus. Beben adulterina, tæx albam, quàm rubrum, passim in Italia proueniunt. Sed quibus polleant uiribus, nondum mihi compertum esse ingenue fateor.

*Gnithos*

Narcissos. NARCISSVS. CAP. CLV.



NARCISSVM sunt qui ut lilium, lirim appellarint. folia profert porro similia, tenuia, multò minora, & angustiora: caulis uacuu, & sine folijs, supradrantem attollitur: flos albus, intus croceus, in quibusdam purpureus: radix intus alba, rotunda, bulbosa: semen uelut in tunica, nigrum, longum. Probatissimus nascitur in montibus, suaui odore: cæteri porrum imitantur, atque herbaceum uirus olent. Radix cocta, siue estur, siue bibitur, uomitoria est: ambustis igni prodest cum exiguo melle trita. præcisos neruos illitu glutinat: luxatis malleolis, diuturnisque articulorum doloribus trita ex melle, & imposta subuenit. Vitia cutis in facie, uirilignesque cum semine urticæ, & aceto emaculat: cum eruo, & melle, ulcerum sordes expurgat: abscessus rumpit concoctioni repugnantes. Infixa corpori extrahit, illita cū lolij farina, & melle.

NARCISSVS, inquit Theophrastus libro 9 capite sexto de historia plantarum, uel lirim (alij enim hoc, alij illo nomine uocant) folium albuci, terræ proximum gerit, sed longè latius, lilij modo. Habet caulem sine folio, herbaceum, florem suo ferentem cacumine, in membrana ueluti uasculo inclusum, largè amplum, coloreq; nigrum, figura oblongum. Hic decidens sponte germinat, cæterum & qui legunt defigere eum solent. Quin & radicem ferunt, quæ carnosæ, rotundæ, amplaq; constat. Serotinus admodum: post æstuum enim, & circa æquinoctium floret. Hæc Theophrasti de narcisso sententia. Porro Plinius libro XXI. cap. XIX. duo Narcissi genera prodidit, quæ his uerbis etiam depinxit. Narcissi duo genera in usu medici recipiunt.

Narcissi historia ex Theophrasto.

Vnum purpureo flore, alterum herbaceum. Hunc stomacho inutilem, & ideo uomitorium, alios quoque soluentem, neruis inimicum, caput grauantem, & à narce narcissum dictum, non à fabuloso puero. hæc Plinius. In quibus placeat deprehenditur à Dioscoride dissentire, quòd neutrum Narcissi genus flore albo descripserit. quanquam idem Plinius cap. V. eiusdem libri inter lilij genera Narcissum connumerans, hunc flore candido constare tradidit. Veruntamen nulli ex hoc mirari licet, neq; propterea Plinium damnandum esse censeo, quòd uiderim ego plures Narcissi species florum tantum uarietate distinctas. Narcissi uires retulit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Narcissi radix usque adeo exiccandi facultate pollet, ut & maxima uulnera conglutinet, uel ad incisiones usque, quæ circa tendones accidunt. Habet uerò quiddam abstersorium, & attractorium.

Narcissi uires ex Gal.

*Hippophaes* HIPPOPHAES. CAP. CLVI.

HIPPOPHAES, quo fullones vestes interpolant, in sabulosis, maritimisque nascitur, succulaceo frutice, vndique denso, & largo: folijs oleæ longioribus, mollioribusque: inter quæ candicantes spinæ emicant, siccæ, angulosæ, interstitio quodam distantes: flores hederæ corymbis similes, racematim coherent, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescetes: radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustanti: ex qua perinde ac thapsia, succus eximitur. qui per se, & cum erui farina subactus, siccatur, & ad usum reconditur. Syncerus pituitas, bilem, aquasque deijcit, oboli pondere: erui verò farina subactus, quatuor obolis, cum aqua mulsa. Frut-

tex

tex cum radicibus siccatus tunditur, & cum aquæ mulsæ dimidia hemina tritus datur. Radice, & herba liquamentum depromitur, vti in thapsia. huius in purgationibus modus est drachma.


ἵπποφάιστον. HIPPOPHAESTVM. CAP. CLVII.

HIPPOPHAESTON, id quod aliqui hippophaës appellant, nascitur eisdem locis, quibus hippophaës, estque spinæ fulloniæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore: inanibus tantum capitulis: folijs paruis, spinosis: radículas habens molles, crassas. Succus radice, folijs, & capitulo exprimitur, & exiccatur. Datus, cui voles, tribus obolis in aqua mulsæ, aquam, pituitasq; detrahit: priuatim comitialibus morbis, neruorum vitijs, & orthopnææ conuenit huiuscemodi purgatio.

Hippophaïs  
consideratio.

ET SI quandoq; maritima, & sabulosa adierim loca, ut Hippophaëm, & Hippophaestum, utpote plantas inibi nascentes, inquirerem; neutrum tamen hactenus mihi licuit inuenire. Ceterum retulit nobis Hieronymus Amaltheus Opitergensis, medicus ingenio, & eruditione clarus, se olim Venetijs plantam accepisse à Ioanne Baptista Zopisso Papiensi clarissimo medico, quæ non modò notis omnibus Dioscoridis Hippophaëm referebat; sed etiam uiribus, ut se experimento cõperisse testatus est. Quare non prorsus desperandum est, quin & nobis, & alijs quoq; aliquando cõtingat Hippophaëm consequi. Non inuenio, quòd Galenus hippophaïs, aut hippophaesti meminerit in suo simplicium medicamentorum censu. Hippophaïs tamen mentionem fecit Paulus lib. VII. inter simplicia, Hippophaesti uero Plinius libro XXV. capite 2.

Κίσι, ἢ κρότον. RICINVS. CAP. CLVIII.



Ricini con-  
sideratio.

CICI, aut croton, nomen accepit à ricini animalis similitudine. Arbor provenit parvæ ficus altitudine, folio platani, maiore, læuiore, & nigriore: ramis, caudicibusque cauis, in arundinis morem: semine in uuis asperis, quod corticibus exutum ricinum animal repræsentat, ex quo oleum nomine cicinum exprimitur, cibis scødum, lucernis emplastrisq; vtile. Grana triginta numero purgata, trita potu pituitas, bilem, aquamque per aluum extrahunt, vomitionesque movent. sed iniucunda admodum est, & molesta purgatio: siquidem stomachum vehementer subuertit. Tusa & imposita, vitia cutis in facie, varosque expurgat. Folia cum polenta trita, inflammationes oculorum, tumoresque leniunt: turgentes mammas cohibent, eadem ex aceto illita, ignes sacros restinguunt.

RICINVM uocauere Latini plantam, quæ Græcis κίσι dicitur, à similitudine, quam eius semen habet cum ricino luido ac fædo animali, quòd canibus, bubus, capris, alijsq; quadrupedibus adhaeret: neque prius decedit, quàm plenius sanguine saginatum rumpatur. In Hetruria planta hæc à quibusdam uulgo uocatur Girasole, aliquibus uerò Fagiuolo Turchesco. Apud Insulares autem pluribus in locis Mirasole. quanquam id nominis potius Heliotropio conuenit, de quo in huius libri calce differemus. Semen officinæ Cheruam maiorem appellant: taneis ab ipso Mesue, cuius uestigia pharmacopœ maxime sequuntur, Regium granum appellari constet. Ricinus copiosè feritur in Aegypto, ubi ex eius semine plurimum olei exprimitur, cibis quidem scødum (ut inquit Plinius) sed lucernis utile. Deijcit aluum, perinde ac balanus myrepica, tolliturq; eius noxa iisdem medicamen-


tis. Quamobrem de eo sic loquitur Mesues. Regium granum (hoc est Ricini semen) pituitam tam per uomitum, quàm per aluum extrahit, sed non sine assumentium molestia: quinetiam bilem, & aquam inter cutem deijcit: & ea sanè omnia excrementa purgat, quæ ad articularum compagines destuunt. Confert item coli, & articularum doloribus, nempe podagricis, & ischiadicis, si ex iure ueteris galli decoctum hauriatur. Hydropicis uerò decoquitur cum capri- no sero, aut emulso recenter lacte maceratum. Ricini uires memorie prodidit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Ricini semen, quemadmodum expurgat, detergit, ac digerit; sic quoq; folium, sed unde- quaq; debilius. Oleum, quod ex semine conficitur, tum calidus, tum tenuiorum partium est, quàm oleum commune, ac proinde etiam discutit.

Ricini vires  
ex Galeno.

TITHYMALVS CHARACIAS.

TITHYMALVS MYRSINITES.


*Evolvulus*



TITHYMALVS PARALIVS.




TITHYMALVS HELIOSCOPIVS.



TITHYMALVS CYPARISSIAS.

TITHYMALVS DENDROIDES.

Τιθυμάλος. TITHYMALI.  
Ejula.

CAP. CLIX.

TITHYMALI genera septem, quorum masculus characias appellatur, ab aliquibus amygdaloides: alter myrtites, qui foemina existimatur, eumque myrsinitem, aut caryitem vocant: tertius paralius, quem tithymalida appellarunt: alius helioscopius: quintus cyparissias: sextus dendroides: septimus platyphyllos dicitur. Characiae caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo succo, atque acri madentes: folijs oleae circum ramos, angustioribus, & longioribus: radice crassa, lignosa: pendet in cacuminibus caulium coma iunci, sub qua caueolae foliolis balnearum similes, in quibus semen continetur. nascitur in asperis, & montibus. Succus aluum purgat, trahit pituitam, bilemque binis obolis in posca sumptis, & cum aqua multa vomitiones mouet. Appetente vindemiarum tempore succus, congectis ramulis, mox dissectis, & vase conclusis, excipitur. Aliqui adijciunt farinam erui, & in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos ternas quaternasve guttas instillant, vt cum his inarescant, quas ad vsus recondunt. Per se etiam tusus in pila, & in pastillos coactus reponitur. Porro cum extrahitur lac, neque quod ventus aspiret, stare quenquam, neque manus oculis admouere conuenit, sed antequam colligas, corpus, praesertim faciem, collum, scrotumque genitalis, adipe, aut oleo cum vino perungere. Fauces autem exasperat: quapropter catapotia cera, aut decocto melle oblini par est, & hoc modo dari. binas tamen ternasve ficos purgationis gratia sumpsisse, satis est. Recens lac ex oleo, perunctos in sole capillos euellit, renascentesque flauos, & exiles efficit, denique omnes perimit. dentium cauernis inclusum, leuat dolores: sed cera dentes oblinendi, ne suo delapsu fauces, & linguam vitiât. Tollit illitu impetigines, formicantes verrucas, pensiles, & quae thymi florem repraesentant. valet aduersus pterygia, carbunculos, phagedaenas vlcerum, gangraenas, fistulasque. Legitur semen autumnis, & siccatum sole leuiter tunditur, feruefactumque loco mundo reponitur. Folia item siccantur. Semen, & folia lactei succi effectum praebent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui inueterant, admisto cum lacte lepidio, & caseo contuso. Radix drachmae pondere in hydromelite pota, per inferna trahit. decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore. Foemina, quam myrsinitem, aut caryitem vocant, similis suapte natura daphnoidi: folijs myrti, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis, & pungentibus: ramulos ab radice mittit dorantales: fructum fert alternis annis, nuci similem, mordaci gustu. nascitur in asperis. Succus, radix,



radix, semen, folia, consimilem antedicto sortiuntur facultatem: sed ad citandas vomitiones inuaidior hæc est. Aliud tithymali genus dicitur paralios, quem tithymalida, aut mecona aliqui appellauerunt. Nascitur in maritimis, ramis subrubentibus, palmum altis, quinque, senisve à radice exeuntibus: folijs lini, angustis, paruis, oblongis, in uersus quosdam digestis: capite in cacumine orbiculato, in quo semen, ut eruum, uario colore emicat: flos albus. Frutex totus cum radice lacteo succo turget. Similes ad usus reconditur. Helioscopius dicitur, folijs portulacæ, tenuioribus, rotundioribusque: ramulis prodeuntibus à radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis: capite anethi: semine uelut in capitulis incluso. Helioscopij nomen accepit, quoniam comas cum sole circummagat. circa oppida nascitur, potissimum in rudibus. Colligitur succus, semenque, ut aliorum. Eadem, quæ superioribus uires, non tamen usque adeo ualida. Cyparissias in caulem exit dodrantalem, uel maiorem, subrubrum: ex quo folia pini similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora: & in totum nascentem pinum æmulatur, unde nomen traxit. Candido succo madet: cui eadem uis, quæ superioribus. In petris nascens dendroides cognominatur. ampliter opacat, in cacumine frondosam spargens comam, succo lacteo prægnans, cauliculis rubentibus, folijs myrti tenuioris, fructu characiæ. Eiusdem effectus, cuius superiores, similiq; modo reconditur. Platyphyllos uerbascosimilis est. Radix, succus, & folia per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tusus, & aquæ in sparsus. Reliqua tithymalorum genera, quæ supra scribuntur, idem efficiunt.

**TITHYMALORVM** omne genus officinæ *Efulam* indifferenter appellant, quanquam plura sunt tithymalorum genera, quorum historiam satis confusè Mauritanii tradiderunt. quo fit, ut apud hos non sine magno labore tithymalorum genera rectè, & distinctè cognosci possint: quæ tamen à Græcis ordine pulcherrimo descripta inueniuntur. Ob id igitur mihi quidem difficile uidetur discernere quæ Tithymali genera ex ijs, quæ à Græcis representantur, eadem sint, quæ à Mesue, & Auicenna Scebram, & Alsebram nominatur: quoniam horum neuter, quod extet, earum plantarum faciem notis explicauit. Credidit Brasauolus illud esse Mesui alsebram minus, & Auicennæ scebram, quod Dioscoridi paralius. Sed equidem ab eo dissentio, quod nusquam in horum monumentis legerim, Alsebram minus in maritimis nasci: quin nec ramos ferre subrubentes, nec lini folia, nec semen eruum simile, capitulis conclusum: sed tantum repererim memorie prodidisse Mesuem, Alsebram esse plantam lacteo succo refertam, radicibus tenuibus, quæ nec hæc præferuntur, quæ subrubent. Auicenna uero Scebram nasci ait in hortis, non autem in maritimis, caule tenui, hereto, folijs tarco similibus. Quæ sanè omnia Brasauoli sententiæ aperte refragari deprehenduntur. Nec possum præterea cum eodem sentire, quod Alsebram maius apud Mesuem, & Mehezeheregi apud Auicennam idem sint Mauritanis, quod Græcis Tithymalus platyphyllos. quandoquidem in eorum scriptis nusquam reperi maioris generis Alsebram folia edere uerbascosimilia: nec quod tusum, & aquæ in sparsum pisces interficiat, sed quod rectius (ut inquit Auicenna) eius folia minori Scebram sunt similia. Porro si mihi hac in re coniectandum esset, putarem equidem nil aliud Mauritanis esse minoris generis Alsebram, siue Scebram, quam plantam illam, quæ officinis *Esula minor* vocatur, quod (ut inquit Auicenna) in hortis, & ubiq; proveniat. Hæc autem, ni fallor, ea est, quam uocat Dioscorides Tithymalum cyparissiam: quippe quæ pinum arborem nuper natam folijs prorsus imitetur. Quinetiam censerem Alsebram maius, siue Mehezeheregi eam omnino esse plantam, quæ Græcis dicitur pityusa, utpote quæ Tithymalo cyparissie folijs sit similis, quanuis magnitudine excellat: nō enim desunt, qui inter tithymalorum genera etiam pityusam recenseant. Proinde non ab re dicebat Auicenna, Mehezeheregi esse simile Scebram, sed maius, & colore subcineritio. Mesues uero, quod radicibus esset rotundis, crassis, crassoq; cortice obductis, ponderosisq;: quæ ferè omnia radici Pityusæ reddidit Dioscorides. Accedit his Serapionis autoritas, qui de Scebram agens, ea omnia ex Dioscoride illi tribuit, quæ pityusæ idem Dioscorides assignauit. Ex his itaq; perspicuum fieri arbitror, pityusam Mauritanis scebram maius appellari: minus uero id, quod Græcis tithymalus cyparissias dicitur. Ceterum Characiam uocatum, postquam multum laboris in eo indagando frustra impendissem, hoc anno misit ad me Pisis clarissimus medicus Lucas Ghinus Forocorneliensis, qui, meo quidem iudicio, omnibus prorsus notis legitimo respondet. Myrsinitem quoq; hoc tantum anno reperimus, folijs circa caulem totum crassis, acutis, myrto similibus. Paralius uero in maritimis tantum nascens, quem uulgaris usus tithymalum putat Brasauolus, in maritimis nostris Senensibus, Argentario promontorio, & in uniuerso illius regionis tractu, item in Aquileiensi agro frequentissimè inuenitur. Huic folio similis uisitur quædam alia planta, quæ in Hetruria uulgo appellatur Herba mora. Cuius radicibus prius contusis, ac dande fluminibus demersis, pisces protinus enecantur. Sed caret hæc lacteo succo. quapropter eam inter tithymalorum genera iam non esse adnumerandam cognoscimus: etsi alias aliter sensimus, quod, alijs notis neglectis, lini folia uideantur, & caules subrubentes. Si hæc defuerit, Platyphylly radices sumunt, quo uniuersa regio scatet. Porro Helioscopius, sic dictus, quod cum sole comam circummagat, omnibus uulgaris notitiæ planta est. Prouenit enim hæc parum prope urbium, & oppidorum moenia, in campis, incultis, hortis, collibus, & ubique tam culto, quam inculto solo. Cyparissias deinde (ut supra diximus) ea est planta, quam *Esula* minorem uocant, cuius pro omni Tithymalo uisus usus. Dendroidem uidimus primum in regno Neapolitano extra Terracinam urbem inter saxa antiquissimi specus in itinere Neapolim uersus, plantæ arborecentis effigie. Hunc dum contemplari cœpissim, superuenit peritissimus medicus Hieronymus Drogus Parmensis, & doctissimus Hieronymus Rorarius Portonouensis (tunc omnes nos sequebamur Bernardum Clefium amplissimum Cardinalem Tridentinum ad Cæsarem pergentem) quibus magno

Tithymalorum confid.

Brasauoli opinio explosa.

*Esula minor*

Tithymalico gniti.

*Helioscopius*

solatio Dendroidem tithymalum ibi à me primùm repertum ostendi : erant enim ambo rei herbarie studiosi, atq; etiam gnari. Nascitur idem tithymalus etiam in Tergestino litore non longè à Timaio fonte, in saxosis quibusdam rupibus, arborescens. Theophrasto tria tantum Tithymalorum genera produntur libro 12. cap. 111. de historia plantarum, ubi ita scriptum reliquit. Lactarium (sic enim tithymalum uertit Theodorus) quod maritimum granum appellatur, folio est rotundo, caule, totaq; magnitudine ad palmum, fructu candido. Demetur, cum uua nigrescere incipit : et siccatu fructus tritus potui datur acetabuli tertia parte. Mascula autem uocata olea folio constat, et magnitudine cubum aequat. Huius lac, cum undemina incipit, exprimunt, et preparato utuntur : purgat inferius. Myrtus uerò cognominata, candida lactaria est, folijs myrti condita, uerion aculeatis parte postrema : sarmentula in terram demittens, longitudine palmi, quæ non simul, sed alternatis annis fructificant, alia hoc anno, alia postero, quoniam omnia eadem radice exorta. Loca montuosa desiderat. Fructus nux appellatur. demetur, cum bordan nigræce, et exiccatus, purgatusq; datur elotus cum papaueris nigri duabus partibus, ita ut totum modo acetabuli sit : tridam pituitam per aluum. At uerò si nucem ipsam placeat dare, trita dabitur ex uino dulci, aut cum sesama tosta, torrefactaq; comedenda. haftenus Theophrastus. Tithymali omnes, Mesue autore in suis simplicibus deiectione facultatis, cordi, iecinori, et uentriculo maximè efficiunt : uasa disrumpunt, intestina abradunt, uniuersum excalfaciunt corpus, adeo ut inde febres facili concitentur. Tollitur prima tithymali noxa ijs admistis, quæ cor, iecur, et uentriculum roborant. Secunda uerò, et tertia ijs, quæ agglutinatoria facultate pollent : cuiusmodi sunt tragacanthæ lacryma, gummi, bdellum, psyllij seminis spissamentum, et portulacæ succus. Tollitur et quarta, admistis frigidis, et humidis : proinde aut fonchi succo, aut intubi, aut portulacæ, aut hortensis solani, aut acetum cum cydoniorum seminibus diutius rudicula agitato, cõmiserunt. Vulgaris usus Tithymalus pituitam uebementer deiecit, et atron quem uocant succū, pariterq; puuitas ad articulos decurrentes. Aquam inter cutē ualidissimè extrahit : nihil secus excat uniuersum corpus, et genituram extinguit. Vnde rusticorum medicamenti nomen sibi meruò ascriuit. Tithymali omnis generis uires cõmemorat Galenus lib. 111. simp. med. sic inquit. Tithymali omnes uincemtem habent uirē, calidamq; facultatē, inest uerò et amaritas. Validissimus itaq; est eorum liquor. Secundum locū tenent semen, et folia. Sed et radix distarū facultatem particeps est, sed non ex æquo. Sanè ipsa cum aceto decocta dolores dentium sanat, maximè qui illis erosio proueniunt. At liquores, ut qui ualentiorē uirē habeant, in forma quidem ipsa dentium uidentur : ceterum si altam corporis partem contigerint, continuo adurunt, ulcerantq; : proinde foris illis cetera circumdantur. quippe cum ex quarto sint excalfacientium ordine, quem esse adurentiū posuimus. Sic pilos quoq; succus mentum tollit. Porro cum uebementior sit, oleo miscetur : et si id sæpe fiat tandem prorsum pilorū radices aduste extirpantur, corpusq; depile reddetur. Eadem facultate uerrucas, quas acrochordonas nominant, et myrmecias, et pityrgia, siue oculorum ungues, et thymos auferunt, detergentque lichenas, et psoras, quia scilicet et abstergendi facultas inest propter amaritudinem. Præterea ulcerū phagedæmæ, anthraxode, et gangrenode, quia ualenter tum excalfaciunt, tum extergunt, si in tempore, et moderatè utare, iuuare aliquando poterunt. Verum enim uero et fistularū callos extirpant eadem facultate. Ceterum hæc omnia genere quidem similiter, imbecillius tamen et folia, et fructus præstare possunt. Quibus sanè et ad pisces in aqua stagnali capiendos uti assolent. Celerimē namq; ab illis in uertiginem acti, ac semimortui redditi, ad aque superficiem feruntur. Porro cum septem sint eorum genera, ualentissimus est quem characiam nominant, quem utiq; etiam quidam marem cognominant, et femina nuncupata myrsinites, et qui in petris nascitur admodum arboris : deinceps qui uerbasco adsimilis est, et cyparissia : deinde paralius, siue marinus : denique helioscopius. Proportione uerò comprehensa illorum facultatis et cinis, et ex ipso lixiuum erit.

Tithymalorum uires.

Tithymalorum uires ex Galeno.

#### PITYVSA.



#### PITYVSA. CAP. CLX.

PITYVSAM speciem cyparissia differre constat, et si tithymalorum generi assignetur. Caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus : folijs piceis, acutis, exilibus : flore paruo, uelut purpureo : semine instar lenticulæ, lato : radice crassa, candida, succo repleta. quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per aluum radix drachmis duabus data in aqua mulla : item seminis drachma. succi cum farina subacti cochlearium in catapotio datur. modus foliorum drachmæ tres.

PITYUSA, ut latius precedenti capite retulimus, ea nimirum fuerit planta, quam officina Esulam maiorem nominant. Huius radices herbarii, qui quotannis è Gargano Apulie monte succos, & alias radices ad nos comportant, magna impostura pro Turpeto uendunt, quemadmodum & thapsie radices pro eodem subijciunt, ut superius in tripoly mentione diximus. Quod cum sua etate non ignorasset Actuarius, album turpetum Alypie esse radeat: prodidit, nigrum uero Pityusæ. Nec his obstat, quod dixerit Dioscorides, Pityusæ radicem subesse candidam: tam is de interiore substantia tantum intellexit, non autè de exteriori corticis membranula, quæ uiridis rufescit, sic: nigrescit. Porro quod Esula maior sit Mauritanis alsebrâ, uel scebram, satis liquidò ex Serapione colligi potest, atque qui integrum de Pityusa caput ex Dioscoride sumpsit, & in suum Scebram reposuit. Quo fit, ut planè falli patet Erasaulum, quippe qui certò sibi persuadeat, Alsebram maius Mauritanis esse tithymalum platyphylon.

Pityusæ consideratio.

Nicolaus Myrepsicus quibusdam in antidotis, & catapotijs aluum soluentibus Esulam imponit cognomine chamæpityn. Vnde Fuchsius in suis doctissimis adnotationibus nil aliud esulam Nicolao referre scribit, quam Chamæpityn, non autem tithymali speciem. Qua in re Fuchsij opinio (pace eius dixerim) mihi non planè satisfacit. Nam cum plura sint tithymalorum genera, quæ in uniuersum Esulæ nomine appellantur, de ea tantum intellexisse Nicolau exis-  
tino, quam Dioscorides à foliorum forma Pityusam uocat, eo quod pini, uel piceæ arboris folio constet: quæ ob id esula chamæpitys differentie causa Nicolao appellata est. Paruum enim pinum pityusa representat: quare non ab re esula quoque chamæpitys cognominari potuit. Pityusa in Italia passim ferè prouenit, facie minoris esulæ, sed longè in omnibus maior, adeò ut quibusdam in regionibus, ut in Apulia, arbusci speciem referat. Visitur copiosa in Veronensi agro, ea immensa planitie, per quam ad Benacum transitur. Sed quod aridissimum ibi sit solum, non admodum adolefcit. Hæc (ut Mesues est author) agrestium hominum medicamentum est: multa enim sumentibus adfert incommoda. proinde eius usus apud medicos peritos prorsus exoleuit, quemadmodum & turpeti ex huiusce radicibus parati, postquam detecta est impostorum fraus: etsi non desunt improbi pharmacopole, qui pityusæ radices legitimi turpeti uice suis inferant medicamentis: sintq; etiam circumforanei, qui harum radicum puluere plures iugulent ruz-  
sacos, quam sanent. Adscribunt quidam Pityusam tithymalorum generibus, quoniam & ipsa similiter lacteo succo radeat, purgetq; eorum modo. Id quod Galenus aperte testatur lib. VII. simplicium medicamentorum, dum sic inquit. Pityusa, & hanc quidam speciem putant esse tithymali, quod succum habeat, ut illi, quodq; similiter illis purget: ceteraq; omnia uiribus illis est adsimilis.

Fuchsij opinio reprobata.

Pityusæ uires ex Galeno.

## Ædugis. LATHYRIS: *Springvuntz* CAP. CLXI.



LATHYRIS, quam aliqui tithymalum appellant, eamque tithymalorum numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudine, & digitali crassitudine, inanem. gignuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & læuiora: quæ autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, aristolochiæ, aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructu summis furculis gerit, triplici loculamento insignem, rotundum, ceu capparin, in quo grana, intercurrentibus membranis, inter se distincta continentur, eruis maiora, rotunda: quæ dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radicis usus. totus frutex lacteo succo turget, uti tithymalus. Grana sex, aut septem in catapotio, aut cū ficis, aut palmulis deuorata aluum purgant: sed aqua frigida postea forbenda. trahunt autem bilem, pituitam, & aquas. Succus, tithymali modo exceptus, eundem effectum præbet. Cum gallinaceo, aut oleribus folia decoquuntur ad eosdem effectus.

LATHYRIN officina Cataputiam appellant. Planta est uulgaris notitiæ. Hæc in Hetruria frequentissima nascitur. Apud Insu-  
bres, quod aluum ualenter euacuet, uomitionesq; eliciat, Capapiezza uulgò nominatur. Isdem pollet facultatibus, quibus & ricinus, isdem quoq; medicamentis infrænatur. Huius plantæ meminit Actuarius in suo libro de compositione medicamentorum, ubi ita scribit. Lathyrus uehementer pituitam purgat. Dantur grana eius maiora, quindecim: minora uero uiginti. Is qui efficacius purgari cupiunt, mandenda præcipito: is uero, qui deie-

Lathyrus consideratio.

ctionem non desiderant copiosam, iubendum est, ut integra deuorent, præsertim si qui sumit, malo fuerit stomacho. Hæc Actuarius. Lathyrus uires descripsit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Lathyrus,

Lathyrus uires ex Gal.

sunt qui dicant & hanc esse tithymali speciem, tum quòd similiter illis succum habeat, tum quòd eodem illis modo purget, totaq; illis facultate similis sit. nisi quòd semen gustantibus uideatur dulce: quod sanè etiam maxime purgatoriam uim obtinet.

ῥένος. PEPLVS.

CAP. CLXII.



Pepli, & peplidis confid.

Vires utriusque ex Gal.

PEPLOS frutex est lactei succi plenus, folijs paruis vt rutæ, paulò latioribus: rotunda coma, ferè do-drantali, humi resperfa: semine sub folijs paruo, rotundo, minore quàm candidi papaueris. pluribus scilicet auxilijs. Vnicam radicem habet, superuacua, ex qua fruticat. nascitur inter vites, & in hortis. Colligitur mensesibus, siccatur in umbra, & continuè versatur. Fructus tufus, & feruefactus reconditur. Bilis, ac pituita detrahitur acetabulo eius in hydromelitis cyathopotio. Obsonijs insperfa conturbat aluum, muria conditur.

ῥένος. PEPLIS. CAP. CLXIII.

PEPLIS, quam aliqui syluestrem portulacum vocant, Hippocrates peplion, in maritimis maxime nascitur, latè opaco frutice, candidi succi pleno: folijs fatiux portulacæ, rotundis, infernè rubentibus: semine sub folijs rotundo, vt in peplo, feruente gustu: radice singulari, superuacua, tenui. Colligi, & reponi, ac dari, vti peplos, & sale condiri solet. Easdem habet vires.

PEPLVM herbariorum vulgus, quòd orbiculata constet coma, Esulan rotundam uocat. Prouenit non modò in uincetis, sed etiam in agris cultura destitutis, lacteo succo pregnans. Peplida uerò, quæ Peplion dicitur, in maritimis nascentem, nò prius quàm hoc anno euulsam uidimus. Sed nobis non licuit hoc tempore eius effigiem pictam exhibere: tamen, Deo concedente, aliquando dabitur. Vtriusq; vires reddidit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi primum de Peplio ita scribit. Peplos, quidam uerò papauer spumeum, & hic frutex paruus succum habet similem tithymalis, cum in alijs, tum quia purgat, ceu illi. Mox de Peplio idem Galenus hæc uerba subiunxit. Peplum, & hic quoq; frutex exiguus succum obtinet, sicut tithymali: nasciturq; plerumq; ad mare, radicem habens inutilem, ut & peplos: succum uerò ualidum, non tamen admodum utilem. Sed semen utile est, & flatuosum, similiter semini pepli purgans.

Χαμαίσυκη. CHAMAESYCE.

CAP. CLXIII.

CHAMAESYCE aliqui lycen nominant. Ramos emittit quaternum digitorum, teretes, succosos, in terram deiectos: folia lentis, parua, peplum planè referentia, tenuia, quæ à terra non attolluntur: semine sub folijs rotundo, vt in peplo: neque caulem, neque florem promit: radice firmatur tenui, superuacanea. Rami ex vino triti vuluæ dolores fedant, in pello apposti: tollunt tumores, ac verrucas omnium generum illiti. Decoctorum cibo aluus resoluitur. Succus simili effectu prodest. Illitus contra scorpionis ictus auxiliatur: aduersus caligines oculorum uilis, & hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. In squallidis, petrosisque nascitur.

Chamaefyces consider.

Chamaefyces vires ex Gal.

NASCITVR Chamaefyce, quemadmodum & peplus, in uincetis, petrosis, & squallidis monticulis. Hæc, ut ex totius plantæ descriptione colligi potest, in pepli genere enumeranda uidetur: quippe quæ ramulis exeat biuni perpetuò sparsis, lacteo succo repletis: foliolis, & coma peplo similibus. Hinc itaq; quispiam fortè non aberraret, si cenferet Chamaefycen esse minorem peplum: ego tamen id planè asserere non ausim. Chamaefyces vires tradidit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, his uerbis. Chamaefyce abstergerendi simul & acrem uim possidet. Itaque acrochordonas, & myrmecias caules eius teneriores in modum cataplasmatum admoti, & ex eis liquor auferunt. Cum melle uerò crassas oculorum cicatrices detergant. sed & hebetudinem uisus à crassitie natam adiuuant, sicut sanè & suffusionum principia.

Χαμαίσυκη.

SCAMMONIA ramos ab vna radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui nonnihil crassitudinis præ se ferant: folijs helixinæ, aut hederaceis, mollioribus tamen, hirsutis, & triangulis: flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus. Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excuatur: quo fit, vt in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fodiunt, in quos subiectis iuglandium folijs, profundunt succum, siccatumque extrahunt. Laudatur autem Scammonium leue, nitidum, raram, & colore quàm simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mylia regione Asiæ deportatur. Nec attendere solum par est, si linguæ tactu albescat (hoc enim euenit adulterato, quod admisto sit tithymali lacte) sed longè magis antea narratis. item si nõ vehementer linguam exurat, id quod misti tithymali argumentum est. Natione autem Syriacum, & Iudaicum deterrima habentur, grauia, densa, erui farina, & tithymalo vitiata. Succus drachmæ vnus, aut quaternum obolorum pondere haustus ex aqua pura, vel mulsæ, per inferna bilem, & pituitam extrahit. Ad resoluendam aluum binos obolos cum sesama, aliõve semine sumpsisse factus est. Dantur efficacioris purgationis causa, succi tres oboli, cum duobus ueratri nigri, & aloës drachma una. Fiunt purgatorii sales, drachmis uiginti succi scammoniae in senos salis cyathos adiectis. Horum modus proportionem uirium: integer quidem, tria cochlearia: medius, duo: minimus, unum. Radicis drachma una, aut altera purgatur cum ijs, quæ retulimus. Nonnulli decoctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cum hordeacea farina teritur, cataplasmate ischiadicis utili. Partus enecat succus, vuluæ in lana subditus: tubercula discutit cum melle, aut oleo illitus. decocto in aceto perunctæ lepræ abiguntur: diuturni capitis dolores ex aceto, & rosaceo perfunduntur.

SCAMMONIVM, quod est Scammoniae succus, copiosum quidem in Italiam aduehitur, præsertim Venetiæ, quò ex Alexandria Aegypti, & Syria importatur: sed quod probatissimum sit, rarum admodum inuenitur. Siquidem quod omnibus ijs notis, ac dotibus præditum sit, quas optimo tribuit Dioscorides, hætenus nunquam, ut ingenue facer, sum consecutus. Nec mirum mihi quidem uidetur, cum id, quod à mercatoribus ad nos deferretur, Syriacum plurimum sit, & Iudaicum, compactum, densum, graue, & erui fortasse farina, tithymali lacte, alijsq; imposturis uitiatum, & illud deniq; quod ut omnium deterrimum, Dioscoridi improbatum. Verum hoc parum expendentes plerique pharmacopolæ, illud præstantissimum Scammonium existimant, quod linguæ saliuæ madentis contactu, facili, confestimq; albescit. In quo Dioscoridis doctrinam hi negligere manifestè deprehenduntur: quandoquidem ipsius Dioscoridis admonitio est, ut non solum illi experimento fidere conueniat, sed etiam alijs, certioribusq;: id namq; euenit adulterato quoq; lactis tithymali admistione. Quamobrem medici, qui Christianam religionem, ac pietatē colunt, si probè, sancteq; artem medicam exercere cupiunt, pro uiribus suos quisq; pharmacopolas moneat, instetq; ut laudatissimum querant, habeantq; scammonium. Nam cum hoc medicamentum omnium ferè electariorum, catapotiorumq; quorum passim est usus ad humores in morbis deiciendos, sit basis, qui ijs adulteratum immiscet, nulli dubium est, quin pessima, & plerunq; exitiosa conficiantur medicamenta. quo certè nihil detestabilius, nihilq; execrabilius esse potest. Sed caueant seplasiarij, & peritorum admonitus libenter audiant: aliàs enim, sciant, errorum perniciosorum, quos sepe committunt, tandem meritis poenas luent. Quod autem scammonium illud, quo omnes ferè officinæ referre sunt, tithymali succo sit uitiatum, hinc liquido patere arbitror, quod decem, uel quindecim eius grana aluum pluries resoluant, cum synceri drachma, Dioscoridis testimonio, id uix præstare possit. Plantam, è cuius radice scammonium colligitur, uidimus primum Neapoli, allatam (ut quidam seplasiarius assererat) ex Gargano Apuliæ monte, quæ omnibus notis, meo quidem iudicio, legitimam Scammoniam referebat. Sed profectò mirari nobis subit, quod Galeo in libris de simplicium medicamentorum facultatibus, nulla Scammonij fiat mentio, cum tamen pleraq; alia scriptis tradiderit longè etiam minoris momenti. Scammonium, autore Mesue in suis simplicibus detectorijs, quinque corporibus læsiones inferre potest. Prima est, quod status quosdam mordaces gignit, usque adeo uentericulum laceffentes, ut sumentibus nausæam commoueat. Noxa hæc tollitur, si in excuato cydonio malo, clibano, aut prunis inassetur, pasta undiq; circumlita, præsertim additis, aut fœniculi, aut dauci, aut apij semine, aut galanga. Inflammat deinde acridinis exuperantia corporis spiritus: quo fit, ut facili febris excitet, ijs præcipue, qui obstructionibus uiscerum, & humoribus putrescentibus obnoxij sunt. Sed id nocuamenti auferitur, admistis inter coquendum, quæ refrigerant, & feruorem extinguunt: cuiusmodi est psyllij seminis spissamentum, prunorum decoctum, seu potius pulpa, rosærum & uiolarum succus, aut dilutum, aut aqua: quinetiam si ante coctionem maceretur oleo rosaceo, aut uiolaceo, aut cotoneorum misti saporis succo, aut admisto rhoë, aut factitio spodio. Ad hæc quod magna tum attrahendi, tum aperiendi facultate sit præditum, immoderatas alui fluxiones facit: uasorum enim oscula plusquam par sit aperit. Hæc læsio admittitur admistis rebus adstringentibus, cohibentibusq; nempe mastiche, cydonijs malis, succoq; ab eis expresso, & myrobalanis, præsertim flauis. Abradit præterea acri succo, quo scatet, intestina: proinde & tormina, & dysenteriam, & tenasimum excitat. Sed deletur hoc incommodum, additis humidis, pinguib; lentisq; medicamentis: cuiusmodi sunt, tragacanthæ lacryma, bdellium, amygdalinum olusum, aut rosaceum: item prunorum pulpa

Scammoniae, eiusque succi consider.

Scammonij læsiones.



per se, & saccharo asseruata, psyllij spissamentum, mastiche, Cydonia mala post sumpta, & calida aqua post bibita: utpote quæ medicamentum ocus à uentriculo & intestinis expellant, & ita simul noxam prohibeant. Hinc est, quod prudentes medici, quò celerius Scammonium à uentriculo, & intestinis deiciant, hordei iusculum, cum saccharo superbibendum præbent. Obest postremo scammonium cordi, iecori, ac uentriculo, substantiæ suæ totius proprietate. Vitium hoc aboletur, si illi tum calida, tum frigida admisceantur medicamenta, quæ cordi, iecinori, uentriculoque opem suam præstant. Deijcit scammonium ualentissimè bilem, quam & à uasis, & à sanguine exhaeret. Eius deijcendi facultas haud sanè alijs medicamentis absimilis est, quæ purgant cum labore & molestia.

CHAMELAEAE. . . . . THYMELAEAE.



Χαμελαία. CHAMELAEAE. . . . . CAP. CLVI.

CHAMELAEAE furculosa fruticat, ramis dodrantalibus: folia oleæ similitudinem habent, tenuiora, & amara, quæ gustata linguam mordent, & arteriam deradunt. Detrahit pituitam bilèmq, folijs præsertim in catapotio deuoratis. nanque duæ absinthij partes, adiecta chamelææ una, hydromelite excipiuntur, & in catapotia coguntur. ea autem in uentre non liquefcunt: siquidem quotquot fuere deuorata, regeruntur. Folijs cum melle tritis, fordida ulcera, & crustosa repurgantur.

Θυμελαία. THYMELAEAE. . . . . CAP. CLXVII.

THYMELAEAE est, ex qua granum Gnidium, quod est semen ipsius, colligitur. Hoc Syria-  
polinum uocant, quoniam fatiui lini frutex suapte natura similitudinem referat. Virgas edit pulchras, multas, tenues, binum cubitorum: folijs chamelææ, angustioribus, & pinguioribus, uiscosis, gummosisque, si mordeantur: flore candido: fructu myrti in modum rotundo, qui inter initia uiret, & tandem rubescit: inuolucrum fructus durum, foris nigrum, intus album. Hoc per inferna bilem, pituitam, aquasque detrahit, si uiginti granorum pars interna bibatur: uerum fauces adurit. Itaque cum farina, aut polenta, aut in uis acino dari debet, aut melle cocto obductum deuorari. Qui ægrè desudant, trito semine cum nitro, & aceto inunguntur. Folia, quæ peculiari-ter cneorum appellantur, per messes colligi debent, & ficcata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & neruos eximere conuenit. Illitum acetabuli modo cum diluta uini portione, aquam extrahit: mediocrius purgat, addita lente cocta, aut contritis oleribus. Thymelææ fa-  
rina

rina vuz acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta. partus imposita necat. Nascitur in montibus, & asperis. Hallucinantur, qui coccon Gnidium fructum esse chameleæ existimant, decepti quadam foliorum similitudine.


CHAMELAEAM, pariter & Thymelæam Arabes confuse satis, ac perplexè Mezereon appellant. Cuius etiam duo faciunt genera, unum album, alterum nigrum; tamen ijs etiam Daphnoidem admiscunt, & hæc omnia adeo confundunt, & implicunt, ut hac in re nihil certi, nihilq; perpetuū ac tuti ex eorum scriptis elici possit. Illarum plantarum vis in exoluendo corporis humores, tam uehemens, uiolenta, ac furiosa existit, ut nisi robustissimis hominibus tunc in medicamentum dari possint: plerumq; enim imbecilles consecerunt, abasis uisceribus, apertisq; uasorum oculis. Quare non temere eas Mauritanii & terræ leones, & plantas uduificas cognominarunt. Proueniunt hæ plantæ numerosæ in uallis Ananiæ montibus Tridentino agro, & utræq; (licet hoc in chameleæ præterierit Dioscorides) fructum ferunt myrti baccis similem, quamuis Chameleæ quadratenus longior sit, & oliuæ formam representet. Vtriusque fructus initio sui exortus uirescit, mox per maturitatem rubescit, denique exiccatus niger conspicitur. Ceterum baccam, quæ è Thymelæa decerpitur, quoniam siccata piperis faciem præ se ferat, acrimoniāq; non obscuram gustantibus relinquat, rura Ananiensis, unā etiam cum Laureolæ semine, Piper montanum indifferenter nominant. Nec sanè mirum, quandoquidem & Theophrastus libro IX. cap. XXII. de plantarum historia, ubi de pipere differisset, statim Cnidij grani meminit: utpote quod maxime piperis imaginem referat, & admodum etiam acre sentitur. Sumunt hoc piper (ut eorum nomine utax) frequenter incolæ in suis purgationibus aduersus omnes ferè morbos, ita medicos, & pharmacopolas fallere credentes. Sed sepe euenit, ut cum futuram noxam non præuideant (quæ eorum multorum imperitiā est) non solum seipsos decipiant; sed etiam sibi mortem consciscant. Et certè hoc testari possum, quod ex montani illius piperis assumptione plures periissent, nisi antidotis nostris succurrissem, eosq; in uita seruasssem. Proinde scite posteritatis memoriæ prodidit Mesues; nemini Mezereon præbendum esse, nisi ijs admistis antidotis, quibus eius deleteria facultas infrenari possit, qua omnia corporis principalia membra corrumpit, ac destruit. Habentur tamen passim in pharmacopolijs catapotia, quæ de Mezereo appellant, quibus aliquando utuntur medici, ad aquam inter cutem extrahendam. Verum ea non audent exhibere (quanquam medicamenta simul receperint, quibus eorum malitia reprimitur) nisi robustis, ac fortioribus hominibus. Chameleam tantum, quod sciam, commemorauit Galenus in simplicium medicamentorum censu, de cuius uiribus libro VIII. eorundem ita scribit. Chameleæ uincem habet qualitatem amarā. Quamobrem admodum sordida ulcera, & quæ maximas habent crustas, cum melle purgare potest.

Chamelææ,  
& Thymelææ  
consider.

Chamelææ ui  
res ex Gal.

SAMBUCUS. *Hell. n. 10.*

EBVLVS. *Hell. n. 11.*



Α'κτι.

ANTI. SAMBUCVS. *Sollimicus* CAP. CLXVIII.

SAMBUCI duo genera. Vnum in arborem affurgit, furculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candicantes, proceros: folia iuglandis, terna quaternave, ex interuallis circa ramos exeunt, grauiā odore, minutim in ambitu secta: & in ramulorum cacuminibus; cauliculisque circinate umbellæ, quæ florem candidum pariunt: mox acinum terebintho similem, in nigredine subpurpureum, racemosum, succo madentem, uinosumque. Alterum genus chamææde uocatur, Romanis ebulum. longè humilius est, magisque herbaceo generi assignandum: caule quadrangulo, geniculato: folijs amygdalæ, ex interuallo longioribus, geniculatim expansis, pinnatisque, graueolentibus, in ambitu ferratis: muscario sambuci: flore, & acino eiusdem: radice nititur longa, crassitudine digitali. Eadem utriusque uis, & usus exiccans, aluo detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia olerum more coquuntur, ad pituitam, bilemque detrahendam. Caules teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in uino decocta, & in cibis data, hydropicos adiuuat: prodest uiperarum morsibus, eodem pota modo. vuluas emollit infidentium, decocto: patefacit eorum spiracula, & uitia corrigit. Acini in uino poti, eodem funguntur munere: denigrant capillos illiti. Folia, si prætenera ac mollia ex polenta illinantur, inflammationem mitigant: ambustis, & canum morsibus illitu profunt: vlcera quæ dehiscunt in fistulam, agglutinant. ijs, qui podagra tentantur, cum seuo taurino, aut hircino profunt illita folia.

Sambuci, &  
Ebuli genera,  
& uires.

SAMBUCVS, & Ebulus plantæ sunt nullis non cognite. Prioris est unum tantum genus prodatur à Dioscoride; nobis tamen duo eius obseruata sunt genera: alterum quidem montanum, & sylvestre: alterum uero urbanum, plerumque in hortorum, & uinearum sepibus proueniens. Hæc genera fructu inter se differunt: siquidem montano bæcæ perpetuò rubescunt. Illud etiam discrimen facit, quòd urbanum in maiorem proceritatem adolescit, & læuiore constat materie. Sunt præterea, qui palustrem Sambucum ostendant, nempe arbusculam uliginoso, & palustri solo enascentem, uirgis sambuci æmulis, geniculatis, alba intus medulla, sed caduca, & fragili materie: folio uirtigineo: flore albo sambuci modo, odore non prorsus inuicundo: à quo bæcæ prodeunt rubentes, oxyacanthæ magnitudine, uinoso succo refertæ. quæ deuoratæ uomitiones cient. Aqua è sambuci floribus fronti, & synipiti illita, capitis dolores mulcet; qui à calido humore prouenerint. Succus è radicis cortice expressus, uomitum ualentissime commouet, & aquam inter cutem pellit. Præstat idem è radicibus ebuli extractus succus. Quin & crassam pituitam ad articulos decurrentem extrahit. Ebuli semen per diutinas aquæ lotiones à nigro circumstante succo expurgatum, datur utiliter drachmæ pondere ex chamæpityos decocto, podagricis, ischiadicis, & Gallica lue laborantibus: mulcet enim deiectionia uel mirificè eorum dolores, cum humores eò fluentes tum reuocet, tum deiciat. Sunt qui ex ebuli radicibus succum eliciant, insolentque subinde, & in pastillos digerant, seruentque ad usus. Hic chyltere infusus tam intestinorum, quam coxendicum dolores tollit à frigidityte, & flatu genitos. Supponitur conuenienter sceminarum locis ad euocandos menses, præsertim si lana exceptus intromittatur. Suffiuntur ebuli decocto commode ijs, qui diuturna febre uexati ad malum deuenerunt habitum, si tamen uentriculus, & iecur interea roborentur odoratis adstringentibus, & ad id conferentibus medicamentis. Meminit Sambuci utriusque Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, sic inueniens. Vtraque sambucus tum magna illa, & arborefcens, tum herbacea, quam & chamæstem uocant, desiccandi, conglutinandi, modiceque digerendi facultatem obtinent.

Sambuci utri  
usque uires ex  
Galeno.

ΠΥΚΝΟΚΟΜΟΝ. PYCNOCOMVM.

CAP. CLXIX.

PYCNOCOMON constat erucæ folijs, acrioribus, scabris, & crassis: caule quadrangulo: flore ocimi: semine marrubij: radice nigra, aut pallida, rotunda, exigui mali figura, terram redolente. inuenitur in saxosis locis. Semen grauiā somnia, & tumultuosa facit, drachmæ instar potum. tumores discutit, illitum cum polenta: & spicula, adactosque corpori aculeos extrahit. Folia illitu tubercula, panosque discutiunt. Radix eius in aqua mulsā duum drachmarum pondere, aluum soluit, & bilem extrahit.

NULLAM equidem usquam plantam hæcenus siam consecutus, quæ facie Pycnocomo responderet. Quare & hoc mihi, ut ingenue fatear, referendum est inter alias herbas, quas hodie omnibus incomptas esse arbitror. Ita enim fiet, ut & posteris, quos spero futuros rei herbarie diligentiores inquisitores, suus relinquatur scribendi locus. Nec sanè quenquam pigere debet, cum ex his, quæ nobis uel incognita, uel incerta sunt, aliquid inuenerit, & conpertum habuerit, ad communem utilitatem in medium proferre.

ΑΠΙΟΣ. APIOS.

CAP. CLXX.

APIOS ramulos duos siue tres iunceos spargit, rubros, tenues, qui à terra parum attolluntur: folijs rutæ, oblongioribus tamen, & angustioribus, herbaceis: semine paruo: radice hastulæ regie in formam pyri turbinata, rotundiore tamen, succi fecunda, intus habet corpus candidum,

## APIOS.



extrà cortices nigros. Superior pars eius uomitione bilem, pituitasque extrahit : inferior per aluum : tota utrinque purgationes mouet. Succum si libet eximere, tusa radix in fictili mergitur, & agitata aqua, quod supernatat penna selectum, exiccatur. Purgat utraq; parte is succus, sesquiobolo potus.

APIOS, quæ & Ischas appellatur, nascitur in Italia, præsertim in Apulia, folijs exiguis, rutæ, uel hyperico proximis, primo statim uere ab radice erumpentibus, nigrioribus tamen, alba quadam linea in longitudinem percurrente : cauliculis iuncis subrubentibus, lacteo succo madentibus : radice exterius nigra, interius candida, pyri effigie, unde & nomen : ἰσχος enim Græcis nil aliud significat, quam Latinis pyrum. Theophrastus libro 1x. cap. x. de plantarum historia, Apion his notis representauit. Ischas, siue Apios folio constat rutaceo, breui, caulibus ternis, aut quaternis, humi prostratis : radice, qua asphodelus, uerum squamosa. Nascitur in montibus. Legitur uere. Datur ad expurgandum corpus, quod altera radice parte superius, altera inferius purget. hæc ex Theophrasto. Apion legitimam, quam primum me uidisse recorder, ad me misit Venetijs Nicolaus à Sancto Michæle No-uocomensis, medicus singularis ingenij atq; eruditionis, et rei herbariæ peritus. Ceterum scribit Ruellius Apion frequentissimam in Gallia nasci, eiusq; radice ruri pauperes per inopiam frugum uesci. Sed Ruellij sententiæ non esse subscribendum iudico : nam

Apij, siue Ischadis consideratio.

Ruel. lapsus.

cum Apios per superna, & inferna purgationem molietur, malè nimirum eos haberet, qui nulla huius facultatis habita ratione copiose ( ut rustici facere solent ) eius radices suerent in cibis. Apij huius nusquam, quod inuenerim, mentionem fecit Galenus in simplicium medicamentorum censu.

Κολοκύνθης. COLOCYNTHIS. *Colocynth* CAP. CLXXI.

COLOCYNTHIS sarmenta, foliaque satiui cucumeris emittit, per terram repentina, diuisa : fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratum, vehementer amarum. quem legere oportet, cum cœperit in pallidum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli cum aqua mulsâ, melle cocto, myrrha, & nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. Arefactæ pilæ teruntur, & infusæ clysteribus profunt neruorum resolutioni, coxendicum doloribus, & coli vitijs, ut quæ bilem, pituitam, & strigmenta, interdum etiam cruorem eliciant. ferus ad motæ enecant. Dentium dolorem tollit, si vna repurgetur, & luto oblita cum aceto & nitro inferuescat, hocque iure decocti dentes colluantur. Si aqua mulsâ, aut passum in eadem incoquatur, & sub diuo refrigescat, potu crassum humorem, & strigmenta alui detrahet : stomacho supra modum aduersatur. subdita ex ea balano alui excrementa eijciuntur. Virentis succo vtilissimè ischiadici perfricantur.

COLOCYNTHIS planta est tam medicis, quam seplarijs iulgaris notitiæ. Verum etsi ( ut Mesues est author ) præstantissimum ex eius fructu paretur medicamentum ad uaria morborum genera ; ea tamen cordi, iecinori, & uentriculo maxime aduersatur, quin & uniuersum perturbat corpus, fastidium, & intestinorum tormina excitans. Abradit enim intestina, & uasorum oscula aperit, adeo ut etiam cruenta sepe eliciat. Hinc merito fit, ut eam dari prohibeant, nisi prius malefica eius uis prorsus aboleatur, ijs additis antidotis, quæ ad id præstant : cuiusmodi

Colocynthidis consideratio.

iusmodi sunt illa, quæ uentriculum, iecur, & cor tum roborare, tum tueri possunt, & quæ lentore suo glutinandi uis habent. Colocynthis trahit pituitosa, crassa, lentâq; corporis excrementa in remotioribus partibus delinquentia: proinde cerebrum, & neruos expurgat, nec non etiam musculos, thoracem, & pulmonem. Eam ob causam uertiginosis, comitialibus, resolutis, conuulsis, hemiplegia, diuturnoq; capitis dolore affectis, asthmaticis, & ægri spiritibus utiliter in catapotijs exhibetur. Collacrymantes adiuuat oculos, & diutina tussi laborantes. Est præterea uis eius efficax ad omnes frigidos articulorum dolores, præsertim podagricos, & ischiadicos: ad quæ non modò in catapotijs deuoratur, sed etiam clysteribus infunditur. quibus sanè nil præstantius est ad coli cruciatus ex flatu, & frigidityte prognatos. Pellit aquas tam bibita, quàm per sedem infusa. Fit è colocynthidis fructu oleum, ad retardandam caniciem, denigrandos capillos, & eorum defluuium cohibendum, si exempta è fructu pulpa, cavitatis oleo repletur, & in cineribus decoquatur. Eodem mulcentur aurium dolores, & earum incerti sonitus discutuntur. Colocynthidis uires retulit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, his uerbis. Colocynthis gustu amara est, sed quæ amarissimo medicamento epoto adsunt opera, ea euidenter efficere nequit, ob purgatoriam facultatem, quam ualidam in sese continet, nimirum cum ijs, quæ expurgat, antè & ipsa per aluum excerni præuertens. Viridis ipsius succus intritus ischiadibus prodest.

Colocynthis uires ex Galeno.

Ἐπιθύμῳ. EPITHYMVM.

CAP. CLXXII.

EPITHYMON flos est è thymo duriorisatureiæ simili. Capitula habet tenuia, & leuia: & in eis caudiculas, quasi capillamenta. Potum cum melle detrahit pituitam, bilemque atram per inferna. Priuatim prodest melancholicis, & inflatis, acetabuli mensura ad quatuor drachmas, cum melle, sale, & aceti exiguo. Plurimum in Cappadocia, & Pamphylia gignitur.



Epithymi consideratio.

IN HAC equidem opinione uersantur complures huius ætatis medici rei herbariæ periti, quemadmodùm Brasauolus Ferrariensis, ut credant, Dioscoridis, aliorumq; Græcorum Epithymum magno discrimine ab eo diuersum esse, de quo scripserunt Mauritan, præsertimq; ab illo, cuius meminit Mesius. Quippe qui asserant, nil aliud Arabicum epithymum esse, quàm capillaris cassiuthæ genus quoddam, quod thymo circumuoluitur. Græcum uerò idem esse uolunt cum proprio flore durioris thymiatureiæ similis. Suam autem sententiam hoc argumento comprobare uidentur, quòd si uulgaris usus epithymum, Arabicum scilicet, illud esset, de quo differit Dioscorides, is non dixisset, Epithymum florem esse durioris thymi, sed alterius plantæ thymo adnascantis, eiq; sese conuoluentis. Id quod etiam Plinii auctoritate confirmant, ut qui eorum opinioni ex eo maxime adstipulari uideatur, quòd duo Epithymi genera prodiderit libro xxvi. cap. viii. ubi sic inquit. Epithymum est flos è thymoatureiæ simili. Differentia, quòd hic herbaceus est, alterius thymi albus. Quidam aliter epithymum tradunt sine radice nasci, tenuis similitudine pallioli (rectius fortè pili legendum esset) rubens. hæc Plinius. Ex quibus utique planum fit, duo esse Epithymi genera: quorum alterum illi ad Græcos, alterum ad Arabas referunt, & ita suam tuentur sententiam. Horum

Multorum opinio reprobata.

certe iudicio ego quoq; facile subscriberem, nisi quædam sese nobis offerrent, quæ aperte reclamare uidentur, atque etiam ostendere, Plinium ipsum Dioscoridis codicem, unde illa mutuatus est, deprauatum habuisse, uel alium autorem in hoc minus grauem secutum fuisse, uel seipsum deceptum, ut in alijs compluribus illi euenisse adnotauimus. Palam etenim faciunt, quantum equidem reor, nostri usus, & Dioscoridis epithymum, unum & idem esse medicamentum, quæ de eo Aëtius, & Actuarius, Dioscoridem, & Galenum secuti, concordēs posteritatis memoriæ prodiderunt, cum ita scribunt. Epithymum atram bilem excernit. Datur adultis tusum, & cribro excussum, scrupulorū quatuor pondere, cum passo, uel oxymelite, & salis modico. Vitijs flatu turgentibus, & præcordiorū noxis opitulatur, & quibus iecur aggrauatur, & ijs, qui spirandi uexantur difficultate. Quod uerò in stoebe nascitur, aut inatureia profilit, Epistoebe, atque Epithymbrum inde appellatum, thymi modo alium resoluit: sed utrunque facultate censetur infirmius. hæc illi ambo. Quæ sanè liquido ostendunt, quòd non secus Epithymbrum thymbræ, & Epistoebe stoebe innascatur, atq; Epithymum in thymo nascitur, uel profilit. Hoc idem præter Aëtium, et Actuarium longè antea testatus est grauissimus author Paulus Dioscoridis, & Galeni sectator acerrimus ijs uerbis. Epithymum inter ea, quæ atram bilem extrahunt, præstantissimum est remedium. Dantur ipsius drachmæ quinque leuigatæ ex lactis bemiina.

Epithymbrum



Epithymum uero, quod thymra innascitur, epithymo similiter euacuat, sed imbecillius est. haecenus Paulus. Ex his itaque omnibus non dubitauerim asserere, unum tantum esse epithymum, non autem plura. Quandoquidem si Paulus, Aeneas, & Actuarius pro certo non habuissent, legitimū Epithymum esse illum thymi florem, de quo scribit Dioscorides, putassentque duo eius genera reperiri, nulli dubium est, quin et ipsi explicassent duplex in thymo nasci epithymum. Verum cum compertum haberent, unum, & idem esse medicamentum capillamentumque, quod in thymo, thymra, & stabe profilit, ipsique nullo radice adminiculo conuoluitur, & triplicatur, sibi uisum est, quod suo tempore Epithymum uulgaris notitie medicamentum esset, sat fore declarasse non modo id in thymo gigni, sed etiam in stabe, thymra, & (ut nos saepe uidimus) in polio, et chamadry. ut hinc scirent medici, in epithymi defectu, epithymum uel epistachem substitui posse: quinetiam ut non ignorarent, id capillamentum harum plantarum propriam non esse partem, neque suam habere sedem, sed ascititium quoddam esse exterius adueniens, & in ipsis proficiens, & uiuens. His igitur rationibus adducor, ut non temere existitem, Dioscoridis codicem, quem Plinius habuit, fuisse (ut diximus) deprauatum. Et ob id ipsum Plinium deceptum esse: aut hunc aliunde accepisse occasionem, ut duo magno errore faceret Epithymi genera. Quod autem Dioscorides epithymum florem thymi dixerit, haud inepte dictum putauerim: nam cum is sciret Epithymum thymo innasci, nulla radice propria, sed thymi adminiculo fultum, floresque per se albos ferre, qui cum in thymo sunt, huius plantae proprii uidentur; ideo non absurdum fore duxit scribere, Epithymum esse florem durioris thymi. Sed quod Epithymum flores albos ferat, declarasse uidetur Dioscorides, cum dicit. Capitula habet tenuia, & leuia, caudiculas habentia capillorum modo. Siquidem his notis non descripsit Dioscorides thymi florem superius libro tertio (ut Brasauolus asserit) sed capitulis in cacumine, flore purpurascens refertis, nulla caudicularum, neque capillorum habita mentione. Praeterea conijcere licet Dioscoridem epithymum thymi florem appellasse, quod a thymo decerpatur eo duntaxat tempore, quo epithymum ipsum large floret. Nam quod pro epithymo non intellexerit is purpuream thymi florem, hinc perspicuo apparet: quoniam de epithymi uiribus libro 111. ubi de thymo, & eius floribus egit, nihil in medium protulit, nimirum eam ob causam, quod epithymum propriam thymi particulam non existimauerit esse, sed (ut supra dictum est) ascititium quoddam, ut in arboribus muscus, & ascus, quae tamen legitima arborum partes non sunt, sed uiribus & facultate diuersae. His igitur rationibus, ut arbitror, ductus Dioscorides, egit de thymo, & eius floribus libro tertio inter odoratas plantas: de epithymo uero, tanquam de re a thymo diuersa, differuit in hoc libro quarto inter deiectionaria medicamenta. Similiter de arboribus, quibus uiscum innascitur, disputauit libro primo: de ipso autem uisco libro tertio cum ipsis medicamentis, quae suo lentore glutinant. Adde quod idem indicare uidetur nomen Graecum ἐπιθύμιον, quod Latinis modo sub, modo in significat. Unde nil aliud nobis epithymum infert, quam in thymo, uel sub thymo. Id quod flori thymi quomodo conuenire possit non uideo, utpote qui non in thymo, neque sub thymo nascatur, sed super thymo, ea eminentiori parte, qua capitula emergunt. His alia accedit ratio, quod cum scripserit Dioscorides Epithymum plurimum in Cappadocia, & Pamphylia gigni, facile colligi potest, ipsum de Epithymo uulgaris usus esse locutum. Quippe si epithymum proprii thymi florem esse duxisset, et sane opus non fuisset scribere, quod magis ipsis in locis epithymum copiosum proueniret, quam alibi: quoniam scripsisse sat erat, oriri epithymum, ubicunque thymum proueniat, hoc argumento, quod thymum ubicunque nascatur, aestate suos edat flores. Epithymum in thymo satyriae simili nos saepissime legimus prope Gortiam Saluatino, & Gargaro montibus supra Salicanum, qui eo durioris thymi genere copiose uestiuntur, sed cui epithymum insideat, eo tantum tractu, qui ad meridiem spectat. Etsi enim montes illi thymo omni ex parte scatent; nusquam tamen thymi plantas mihi licuit inuenire, in quibus Epithymum spectaretur, nisi in antenioris montis parte, ubi herbae enatae austro perflantur. Quamobrem nil mirum esse debet, quod in Pamphylia, & Cappadocia epithymum frequentissimum proueniat. Sed quoniam tot scio me frustra hac adduxisse argumenta, quibus meam firmavi sententiam, nisi etiam Plinij authoritati, qua nititur Brasauolus, clarius responderem; idcirco illi ita responsum uolo, quod cum Plinius Dioscoridis mentem, a quo priorem suorum uerborum partem sumpsisse uidetur, non recte perceperit, ideo non affirmate, sed dubie duo fecit Epithymi genera, & aliorum potius, quam suam opinionem retulit, cum inquit. Epithymum est flos a thymo satyriae simili. Differentia, quod hic herbaceus est, alterius thymi albus. Quidam aliter epithymum tradunt siue radice nasci, tenuis similitudine pili, &c.

Porro uero idem Plinius in ipsis uerbis errasse deprehenditur, quod maiori, duriori que thymo herbaceum florem, minori uero album reddiderit: cum tamen minoris flos purpureus sit, alterius autem modo candidus, modo in candido purpurascens. Hinc itaque perspicuum fit, tam confuse, & inconstanter de epithymo, & thymo tractasse Plinium, ut nihil certi in hac re ex eius uerbis elici possit. Ceterum hallucinantur, mea quidem sententia, in Epithymi historia, etiam Monachi illi reuerendi, qui in Mesuem commentarios ediderunt: quippe qui Dioscoridis uerba perperam interpretati deprehendantur, etsi ut forte alijs doctiores uiderentur, suam in Epithymo sententiam proferant ipsis uerbis. Certissime a paucis uerus sensus uerborum Dioscoridis de epithymo percipitur. nam cum ipse Dioscorides dicat capitulo de epithymo, epithymum flos est a thymo satyriae similis, non per hoc intelligit Epithymum, scilicet capillamentum thymi esse simile herbae satyriae, sed asserit illud dictum capillamentum thymi esse simile capillamento satyriae, scilicet thymrae. quia etiam & supra thymram generatur huiusmodi capillamentum, sicut supra thymum. haec patres illi. In quibus facile cognoscitur horum inanis quaedam iactantia, ne dicam, pace sua, ignorantia. quod sensus uerborum obscuros, claros reddere profiteantur, atque ipsi subinde, ut mihi uidetur, maiorem caliginem offundant. Quod enim Dioscoridis sententia hoc loco euidenter sit, quam ut exponi debeat, quodque aperte Monachis refragatur, eius uerba testantur, quae ita Graece habent. Ἐπεθύμιον θυμὸν ἐστὶν ἄνθος τῶ στυλαιοτέρου καὶ θυμὸν βαρύτερον. hoc est ad uerbum. Epithymum thymi est flos durioris & satyriae similis. His sane uerbis liquet, quod Dioscorides

Epithymum  
ubi plurimum.

Plinij lapsus.

Monachoru  
expositio uana.

Epithymi uires  
ex Mesue,  
& Galeno.

Cassuthæ hi-  
stor. & uires.  
Fitzhymus

Dioscorides non comparat Epithymum, quod florem thymi uocat, flori saturcie, ut Monachi uim male interpretantur, sed illud genituum ἐπί θυμόν ad thymum tantum refert: ita ut thymum, cui Epithymum insidet, saturcie simile faciat. Thymi namque duo habentur genera. Vnum maius saturcie simile, in quo epithymum proflit. Alterum minus, tenuissimis folijs refertum, in quo nullum nascitur epithymum. Hoc certe non latebat Dioscoridem. quare ne cuiuspiam fortasse putaret utriusque thymo epithymum innasci, id tantum in thymo duriori inueniri producit. Sed satis superque de Epithymo disputatum est: iam medicinae reddenda est ratio, & de eius uiribus agendum. Illud sibi peculiare est Epithymum (ut testatum reliquit Mesues in suis simplicibus) quod ualentius ceteris medicamentis atram bilem excernit, idque facile, & citra ullam molestiam prestat. Efficax est ad morbos cerebri, nempe melancholiam, epilepsiam, diuturnos capitis dolores, aliasque atrabiliaris aggritudines. Confert cordis tremoribus, & animi deliquis. Preterea cunctis lienis affectibus mire opitulatur: item renum uitij, & hypochondriaca melancholia uexatis. Frequens epithymi usus: datur enim utilissime aduersus carcinomata, elephantiasin, & ulcera maligna, & atra. quoniam & quata febre detentos liberat. Epithymi uires breuissime perstrinxit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Epithymum thymi facultatem habet, ad omnia efficacius. exiccatur, & excalfacit ordine tertio. hactenus Galenus. Verum quia Epithymum ob similitudinem mihi ad memoriam reuocauit CASSUTHAM ita & perueniens medicis uocatam, licet officinis, & herbariorum uulgo Cuscuta nominetur, cum a ueteribus Græcis nihil, quod constet, de ea memoria proditum sit, hic locus poscere uidetur, ut de ea aliquid differamus. Cuscuta igitur, siue Cassutha eius generis est, ut in frutices, & herbas epithymi modo proflit, & uiuat earum adnuculo fulta, nulla radice nixa, sed uelut ab alarum sinu prodeuntibus cirris, capillamentisue longissimis. Hæc statim ab exortu plantarum ramulis se implicat, & adeo crebris inuolutionibus his se circumuoluit, ut breui plantas ipsas strangulet, atque enecet. Folijs nullis unquam uestita uisitur. Flores tanquam edit albos, quam plurimos, à quibus semen tenue producit. Cirri rufescent, uitium capreolis crassitudine, & facie pares. Sunt qui putent, admirabile hoc plantæ genus Pliniam Cassutam appellari libro xvi. capite ultimo, ubi ita scriptum reliquit. Est & in Syria herba, quæ uocatur Cassuta, non tantum arboribus, sed ipsis etiam spinis circumuoluens sese. Nec plura Plinius. Ex quibus equidem, quod reperiuntur Plinij codices, in quibus cadytas, non cassutas legitur, quoddam hæc arboribus tantum, & spinis se circumuoluit, nostra uero Cassutha duntaxat herbas, & frutices, non arbores complectatur, & irretiat, non ausim affirmare uulgarem cuscutam esse Plinij cassutam, præsertim cum in Syria tantum nasci scribat ipse Plinius. Credere præterea plerique Cassuthæ eandem inesse facultatem, quæ & plantis inest, in quibus nascitur. Quorum utique sententiam potius probandam, quam refellendam censeo, argumento quod Epithymum ipsam, Galeni autoritate, polleat uiribus, quibus & thymum. Excalfacit Cassutha ordine primo, siccaturque secundo. Abstergit, & quadam cum adstrictione roborat. Iecoris obstructions aperit, insarcti lienis uia expedit: uenas pituitosis, atque biliosis exonerat humoribus: urinam pellit, & regio morbo subuenit. Puerorum febribus auxiliatur: sed diuturno usu uentericulum grauatur, quæ tamen noxa tollitur, si anisi momentum adijciatur. Bilem deiecit, præsertim absinthio: admista. In quem usum decoquitur, bibiturque eius decocti selibra, cum sacchari sesquancia.

#### ALYPVM.



Alypi confideratio.

Opinio quorundam refutata.

#### Αλυπό. ALYPVM. CAP. CLXXIII.

ALYPON furculosa herba est, subrubra: gracilibus ramulis: tenuibus folijs: flore molli, leui, & copioso: radice betæ, tenui, referta acri succo: semine epithymi. Gignitur in maritimis, maxime Libyæ, quam largissima, quanquam alibi quoque plurima prouenit. Semen atram bilem deiecit, si mensura epithymo pari cum sale, & aceto sumatur: uerum interanea leuiter exulcerat.

ALYPVM, eiusque radix (si Actuarius credimus) nihil aliud sanè fuerit, quam officinarum Turpetum, turbi Arabas dictum, quod album uocant. Ipse enim suo de compositione medicamentorum libello, ubi minoris parandæ tripberæ rationem docet, sic inquit. Si hoc medicamento pituitæ deiectionem moliri instituis, alypum, id est, album turpetum addas. Idem post, ubi de simplicibus medicamentis uomitum cientibus tractauit, ita scribit. Turpetum, quod radix est pituitæ, & album alypiæ, glutinosam detrabit pituitam. Verum quia idem Actuarius, paulo ante Alypum describens, prodidit eius semen atram bilem per alium ducere, putare quidam Actuarius alypiam ab alypo differre, quod huius seminis tantum uires reddiderit. Sed

ijj refertur

# In Lib. quartum Dioscoridis. 553

is respondi potest, quod cum probè sciret Actuarius aliam uim inesse semini, aliam uero radicibus, proinde de radicibus sub turpeti, & de semine sub Alypi nomine differuit. Plantæ enim habentur, quæ alium folijs, alium semine, & aliam radicibus effectum præbent. Medium herba nobis exemplo erit, quæ, Dioscoridis testimonio, menses sistit, cum tamen eius semen contrarium efficiat. Quamobrem facile crediderim Alypum, & Alypian nullis inter se notis diffidere: nec modò his rationibus fretus; sed etiam Pauli autoritate. quippe qui libro VII. Alypum inter ea, quæ atram bilem depellunt, commemorauit ijs uerbis. Alypi semen inferius atram purgare bilem pari epithymo mensura, cum sale, & aceto dictum est: intestina uerò, si fidem Dioscoridi accommodamus, leuiter exulcerat. Est autem, meo iudicio, quæ nunc Alypias uocatur. hæc Paulus. Ex quibus palam est, Paulo nullam inter Alypum, & Alypian fieri differentiam. Ceterum ad nos solam radicem deferri, neque ullum hactenus qui plantam, uel semen ostenderit, meo iudicio fuisse, antea prodideram in commentarijs nostris Italica lingua conscriptis. Verum hoc tempore Lucas Ghislinus uir rei medicæ eruditissimus, Pisfis herbam hanc pro Alypo ad nos misit, cuius hic picturam damus, quæ quidè descriptioni pulchrè quadrare deprehenditur. Alypi, quod legerim, non meminit Galenus in simplicium medicamentorum censu. Hic de Turpeti uiribus nobis differendum esset, nisi superius in Tripoli commentatione, eius historiam, ac facultates latius prosecuti essemus, quam ut adhuc plura dicenda, uel addenda supersint.

Alypi uires  
ex Paulo.

Ἐμπέτρον. EMPETRUM. *Strimbrny* CAP. CLXXIII.

EMPETRON aliqui phacoides uocant. nascitur in montibus, & maritimis, falso gustu: sed quò propius terreno fuerit, amarius sentitur. Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur in iure aliquò, aut hydromelite.

EMPETRI herbæ faciem nullis prorsus notis depinxit Dioscorides. Vnde solo nomine nobis de hac herba potius diuinandum esset, quam quòd aliquid certi, ac perpetui statui possit. Non desunt tamen qui Oedipum se faciant, & hæc Dioscoridis obscura quasi enigmata audeant soluere. Hi siquidem Empetron eam plantam putant esse, quam bodie Romani Fœniculum marinum appellant, alij uulgari sermone herba di san Piero. Sed hanc nos superius libro secundo legitimum esse critium, pluribus probauimus. Porro & ubi nascatur Empetron, & quibus facultatibus sit præditum, Plinius quoque tradidit lib. XXVII. cap. IX. ita ut ea planè à Dioscoride mutuatus deprehendatur. Verum in reddendis medicinis, nominis fortasse similitudine deceptus, quòd Empetron saxifragam esse existimauerit, uires, quas utriusque seorsim tribuit Dioscorides, ipse uni Empetro assignauit, addens huic, quòd urinas ciet, & calculos frangat: quæ medicinae saxifragæ debentur. Qua in re Plinium omnino errasse fatendum est. Empetri meminit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, ubi de eius uiribus in hunc modum differit. Empetron ad solas purgationes uidetur esse commodum, bilem, ac pituitam educens. Gustu salsum est: proinde ad alia quoque utaris licet, ad quæ pollere ostendimus substantiam salsum. Nominatur item prasoides. Hæc Galenus. qui tamen à Dioscoride in nomenclatura discordat: quòd quidem alter Empetron phacoides à quibusdam uocari prodidit, alter uerò prasoides dici ait. Quare non deest suspicio, quin aut horum alter errauerit, aut alterius codex hoc in loco sit deprauatus. Non enim uideo, quomodo rectè idem Empetron simile reddi possit & lenti, & porro, ut illa nomina demonstrant.

Empetri con-  
sideratio.

VITIS SYLVESTRIS.



Ἀμπέλος ἀγρία. *Vitis sylvestris* VITIS SYLVESTRIS. CAP. CLXXV.

VITIS sylvestris sarmenta uitis modo prælonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice: folijs hortensis solani, longioribus, ac latioribus: muscoso flore, & capillaceo: fructu exiguis uuis simili, post maturitatem rubente: rotunda est acinorum facies. Feruifacuta radix in aqua, & in cyathis duobus uini aqua marina diluti, pota, humorem alui ciet: ideo hydropicis datur. Vux eius uitia cutis in facie, & maculas omnes expurgant. Enascentes uiticulæ, cibi gratia, sale condiuntur.

Empetri ui-  
res ex Gal.

VITIS sylvestris planta est in Hetruria mulieribus notissima: utpote quæ eius uuis, quibus lentigines, & maculas in facie emendant, plurimum utantur. Hæc constat folijs hortensis so-

Vitis sylue-  
stris confide-  
ratio.

Aa lani,

Lani, sed longioribus, ac latoribus: floribus racematis coherentibus (ita enim legendum cenſeo in Dioſcoride, non muſcoſis, ut uulgata habent exemplaria, Oribasij teſtimonio fretus, qui hoc loco non βαυώδες, ſed Βοτρύδες legiſſe) capſulaceis, purpureo colore: fructu exiguis uuis ſimili, rubente, ac uinoſo. Illud porro nobis obſtare poteſt quod minus hæc ſit uera Vitis ſylueſtris, quod etſi eius ſarmenta, quibus uniuerſe ac ſylueſti modo uacinas arbores ſcandit, ac uicit, quadantenus aſpera uideantur; non tamen, ut in Dioſcoridis codicibus ſcriptum reperitur, rimolo ſunt cortice, ſed albo. Huic obſeſſioni ita reſpondere poſſum, quod ea non ſit legitima huius plantæ nota. nam quod uerbum illud Φλοιοῦ ἁγροῦ. τὰ non legatur in Oribasio, facit ut ſuſpicer in Dioſcoride hoc loco mendum ac uitium ſubefſe. Hæc itaq; moueor, ut hanc pro ſylueſtri uite nunc proferre non dubitem, donec alia nobis, aut alijs comperta ſit planta, quæ magis notis omnibus illi reſpondeat. Theophrastus uitæ ſylueſtrem Atragenam uocafſe uidetur lib. v. cap. ultimo de plantarum hyloria, ubi de ſomitibus ad ignem concipiendum egit. Antiqua enim etas chalybea fortifſe non ex-  
 10 perta, ex ligno duriore, et fungoſo ignem parabat: ad quod, meo iudicio, ſylueſtris uitæ materies admodum apta fuit. De huius uitæ ſylueſtris uiribus ſcripſit Galenus lib. vi. ſimplicium medicam. his uerbis. Vitis aggreſſis racemū extergendi uim habent, ut epheleis, & neuos, & id genus omnia in extrema cute exiſtentia curare poſſunt. Sed & aſtriſſionem quandam extrema germina obtinent, quæ & ſale condiri aſſolent.

Vitis ſylueſtris uires ex Galeno.

Ἀμπέλως λευκή. VITIS ALBA. Τὸ ἄλλο ἐν τῇ CAP. CLXXVI.



VITIS ALBAM aliqui bryoniam uocant: Folijs, uiticulis, pampinisque ſatiuam uitæ imitatur, ſed hirsutiora ſunt omnia: ea, quos prope ſe nata ſit fructus, ſuis clauiculis complectitur: fructus rubens in uua dependet; quo coria pilis ſpoliantur. Ex ea aſparagi, qui primâ germinatione exeunt, decocti in cibo, aluum, & urinam cient. Folia, fructus, radix acrem uim ſortiuntur: itaque ulcerum phagedænis, gangrenis, chironijs, putrentium tibiârûm tædio, efficaciter ex ſale illinuntur. Radix corpus abſtergit; & cutem erugat: uitia cutis in facie, uarosque, lentigines, & cicatrices nigra emêdat, cum eruo, creta Chia, & ſeno græco. Eodem effectû prodeſt decocta in oleo, uſque-  
 30 dum liqueſcat: ſugillata tollit, & reduuias committit. Inflammationes diſcutit illita ex uino: ſuppurationes rumpit. medicamento aptè immiſcetur, quod carnem exēſt: infraſta oſſa extrahit, trita, & impoſita. Datur comitialibus in potu, drachmæ pondere, quotidie anno toto: prodeſt attonitis, & uertigine laborantibus, conſimiliter aſſumpta. Contra uiperarûm ictus pota drachmis duabus, auxiliatur: partus necat: mentem interdum ſubturbat. Fœminarum locis appoſita partus, ſecundasque morantes trahit: cit urinam pota.  
 40 Eclegma ex ea fit cum melle, difficile ſpirantibus, ſtrangulatu oppreſſis, tuſſientibus, vulſis, ruptis, & laterum doloribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto triginta diebus, conſumit: illinitur ad eadem cum fico. Ad muliebres quoque inſeſſus decoquitur: ſiquidem vuluas purgat, ſed abortum facit. Succus è radice uere exprimitur, qui trahit pituitam cum aqua maulſa potus. Ad pforas, & lepras ſemen efficaciter illinitur. Lactis abundantiam facit ſuccus eius, ſi cum tritico decocto ſorbeat.

Vitis albæ cōſideratio, & uires.

VITIS alba officinis, & herbarijs Bryonia nominatur. Vulgò mulieribus Cucurbita ſylueſtris dicitur. Nota  
 50 omnibus ſerè planta eſt, quod paſſim ſecus uias, & propter ſepes proueniat. Hanc inter ſua deſeſſoria medicamenta reſepuit Meſues, qui de ea hæc ad ſenſum ſcribit. Vitis ſylueſtris, quod hauſta, quemadmodum & dracuncululus, uentriculo, & iecinori noxam inferat, danda nō eſt, niſi aromatum puluere permixta, aut addito maſtiche, cydonijs malis, aut alijs adſtringentibus, roborantibusque medicamentis. Succus è contrita radice expreſſus pituitam ciccū, urinam remorantem trahit, & cerebrum mundat, quinetiam pectus, et neruos à pituitofis, putridis, & extremis: uiſcerum obſtructiones aperit: renes à calculis expedit: ſubuenit item uertiginofis, comitialibusque. Preſtat opem mirificè tuſſientibus: & induratos tumores reſoluit, præſertim lienis, ſi cum uino, & ficibus tuſa radix illinatur. Menſtrua elicit, & uniuerſum purgat uterum, atque etiam ſæctum expellit, ſi in eius decocto inſideant ſemine. Succus fabarum, aut cicerium farina exceptus, maculas in facie, & uulnèrum cicatrices emendat, linimenti modo bibitus. Oleum excauatis eius radicibus immiſſum, cineribusque incoctum, ſugillata delet. Præterea mulieres uulnè  
 ſtrangulæ


strangulationibus obnoxias mirum in modum iuuat, adeo ut eas à strangulatu liberet, & sanet. Equidem noui muliere[m] quotidie frere per annos hoc morbo uexatam, quæ tandem à quodam uulgaris herbario edocta, ut iunum album bibere, in quo uitis albe radice uncia effervisset dormitum itura semel in hebdomada, eam hac medicina per annum usa fuisset, optime ex illo morbo conualuit. Vitis albe meminit Galenus libro v. simplicium medicamentorum, de eius uiribus ita scribens. Vitis albe, quam & Bryoniam, & Psilobrum uocant, prima quidem germina ab omnibus pro more in uere eduntur, utpote edulium stomacho, eo quod adstringat, gratum. Habent etiam subantram, & modice acrem adstrictionem: quare & urinam moderate ciunt. At radix & abstergentem, & desiccantem, & tenuium partium, ac moderate calidam uim obtinet: quamobrem & lienes induratos liquat, tum epota, tum foris cum ficibus posita: & psoram, & lepram sanat. Porro fructus eius racemi specie præferens, ijs qui coria tingunt, utilis est.

Vitis albe uires ex Gal.

Ἀμπέλος μέλαινα.

VITIS NIGRA.

CAP. CLXXVII.



NIGRA uitis, quam aliqui nigram bryoniam uocant, folia fert hederæ, smilaceis proxima, sed maiora: caules etiam cognatos: capreolis suis arbores, quasi adminicula, comprehendit: fructus racematim coherent, qui inter principia uirent, & post maturitatem nigrescunt: radix foris nigra, intus buxco colore nitet. Viticulæ, quæ primò germinum partu erumpunt, in olea recipiuntur: menses pellunt, urinas ciunt, lienem absumunt: uertiginosis, comitialibus, neruorum resolutione tentatis profunt. Radix eadem, quæ uitis alba præstat, sed inefficacius. Folia cum uino exulceratis iumentorum, ceruicibus commodissimè illinuntur: luxatis itidem imponuntur.

VITIS nigra Hetruscis uulgò appellatur Tamaro, corrupto à tamno uocabulo. Sunt enim qui hanc tamnum, siue tamum etiam uocent, unde Latinis eius uua Tamina dicta est. Huius viticule, quæ uere primò à terra erumpunt, quod asparagis similes sint, eorum more decoctæ, hac etiam tempestate manduntur, quæ uis non eam, quam asparagi, cū palato ineant gratiam. Frequentissima hæc in Hetruria provenit, quin & in Goritiensi comitatu, ubi Martio & Aprili mensibus, eius cauliculi in fasciculos digesti in foro ueneunt ad ciborum usum. Huic tamen, quæ in Italia nascitur, illud tantum obijci posse putauerim, quod in uuarum colore ab illa disidere inueniatur, quam Dioscorides representauit, quod huic uua post maturitatem nigrescant, nostra uerò perpetuo rubentes spectentur: cetera enim, meo quidem iudicio, inter se maxime conueniunt. Sed illud nihil me mouet, neque facit, ut mutare debeam sententiam, & credere hanc aliam esse à Vite nigra, quod

Vitis nigra consideratio.

sepe uiderim solanum hortense quibusdam in locis uuas ferre modò nigras, modò rubentes, modò croceas: quædoquidem natura plerumque cum florum, & fructuum colore ludere soleat, ut in uiuis, cerasis, moris, ficibus, prunis, malis, & alijs compluribus perspicuo cernitur. Idcirco nil mirum esse debet, si in Italia Vitis nigra rubentes uuas proferat, alibi uerò nigras, ut in Græcia, Asia, alijsque calidioribus regionibus, quod huiusmodi discrimina sepe numero cæli, ac soli diuersitate contingant. Hac igitur ratione fretus, quæ, ni fallor, illam obiectionem diluit, non dubitauerim asserere, hanc plantam, cuius etiam hic effigiem pictam damus, esse ueram ac genuinam Vitem nigram, quoniam ceteræ omnes prorsus notæ illi ad stipularem deprehenduntur. Ceterum credidit Leonardus Fuchsius, medicus nostre ætatis celebris, eam stirpem esse legitimam Vitem nigram, quæ nostris in Hetruria uulgò Vitalba dicitur, quamque alteram esse Dioscoridis clematidem superius huius libri initio abunde ostēdimus. Verum hæc eius opinio nobis, pace sua, plane reprobanda uidetur. Siquidem nostra Vitalba non habet radicem foris nigram, intus buxco colore: non fert folia hederæ maiora, sed potius minora, & per ambitum laciniata: nec semen edit in racemi modum, sed simul compactum, nulla cum uitis similitudine. Adde, quod eadem sua facultate exulcerat. Vitis uerò nigra exulceratis bouum ceruicibus medetur, & luxatis ob adstringentem uim, quam habet, utilissimè imponitur. Vitis nigra uires paucis perstrinxit Galenus lib. v. simplicium medicamentorum, sic inquit. Vitis nigra: uocatur autem hæc propriè bryonia, uiti albe ad omnia similis, nisi quod imbecillior. hætenus Galenus de uite nigra. Huius autem succo (ut est auctor Mesues) nihil ualentius ad strumas sanandas, si cum uini, & mellis æquali portione is hauriatur. Præstat ad idem radix quoque si tusa, & melle excepta illinatur. Sed quoniam Vites tam alba, quam nigra, de quibus hætenus dictum est, mihi in mentem eam herbam redegerunt, quæ aliquibus uulgò uocatur Viticella, alijs Balsamina, alijs Mordica, alijs Caranxa, cum ueteribus nihil de ea posteritatis memorie proditum sit, sitque dotibus quam plurimis non

Fuchsi opinio reprobata.

Viticellæ, siue Balsaminæ historia.





Viticellæ uo-  
caræ uires.

obscuris præditæ, hunc locum opportunum duximus, in quo huius herbe historia pertractetur. Est itaque VITICELLA, siue Balsamina, planta, quæ præ longis, tenuibusq; uiticulis, ultro citroq; reptantibus, proximas tum herbas, tum arbusculas comprehendit: folijs uitis albæ, aut uiniferae similibus, sed longè minoribus, magisq; per ambusta laciniatis: capreolis tenuibus ex alarum sinu prodeuntibus, quibus sese implicat appositis adminiculis. Florem promittit cucumeri similem, colore subluteum: fructum utrinq; turbinatum, qui oui ferè faciem repræsentat, cute carnosâ, quibusdam acutis bullis rigente, dipsaci modo. Huic maturo puniceus color, qui præterea facillè dissilit ultimam maturitatem adeptus. Semen includit anguriae uocatæ simile, minus tamen, còtectum cute crassâ, pingui, lubrica & perquam rubente. Planta hæc gracili nititur radice, nec citius fructum perficit, ac maturat, quàm aduentante autumno, Augusto, & Septembri mensibus. Nusquam nisi sata, quod sciam, in Italia prouenit: pluribus autem in locis ubi plantatur, & nascitur. Folia uulnera recentia glutinant. Fructus exempto semine insolantur diu in oleo ompaci-  
no, aut macerantur eodem oleo in balneo calentis aquæ, aut equino calente fimo, sitq; inde oleum præstantissimum ad arcendas uulnerum, mamillarumq; inflammationes, doloresq; mulcendos. Valet idem ad exulceratos, inflammatosque uteros siphonie iniectum. Doloribus hæmorrhoidum mirè auxiliatur: in quem usum macerantur fructus (ut diximus) oleo amygdalino dulci, aut è semine lini expresso, addita ad unamquamq; olei libram, liquidè uernicis uncia. Medetur hoc ambustis tam igne, quàm aqua. Punctis, sauciatisq; nervis utiliter illinitur: quin et uulnere cicatrices tam attenuat, tum etiam prorsus delet. Scribunt recentiorum quidam, steriles mulieres fecundas fieri, si à balneo medicamentis utero conferentibus parato, hoc oleo uteri osculum sibi perunxerint, ac demum suis se iunxerint uiris. Ramicosis pueris efficax remedium est, si eo locus sæpius perungatur. Foliorum pulvis (ut ij affirmant, qui periculum fecerunt) cochlearis mensura ex plantaginis, siue equiseti decocto, intestinorum uulnera sanat. Nec desunt qui eundem puluerem laudibus efferant, ad colic dolores, & intestinorum tormina. Porro illud hic prætereundum non est, ne fortè huiusce plantæ nomina alicui imponant, quòd sunt qui Momordican etiam appellent geranij genus quoddam, illud scilicet, quod maiora inter cetera folia profert, maluæ amplitudine, de quo libro tertio in Geranij abunde differimus.

Vocabitur FILIX MAS. *Farmakrunt*

FILIX FOEMINA.



Trépis. FILIX MAS. CAP. CLXXVIII.

FILIX folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex uno pediculo cubitali longitudine exeunt, multifida, & lateribus pinnata, subgravi odore: radice per summa cespitum, nigra, oblonga, filices multas fundente, subaltringente gustu. nascitur in montibus, & saxosis. Radix latus tinas ex-

cutit,

cutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsā: melius si cum scammoniz, aut ueratri nigri totidem obolis detur: sed qui sumunt, alia prægustare debent. laborantes lienis incremento recreat. Radix & potu, & iilitu cum axungia, vulneribus sagitta harundinea factis, est auxilio. cuius rei probatio talis fertur. Peribit filix, quam per ambitum sata copiosior harundo coronet: & contra euanescentes abibit harundo, quam obsepiens multa filix in orbem cinxerit.

## ΕΛΥΘΙΣ. FILIX FŒMINA.

## CAP. CLXXIX.

**FILIX** fœmina folijs est filicis, surculosis, altioribusque, & quæ non singulari, ut illa, pediculo fulciantur: radicibus longis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flauescunt: aliquæ etiānum rubræ inueniuntur. Pellunt lata interaneorum animalia, cum melle, eclegmate sumpto: potæ cum uino drachmis tribus teretes tineas eiiciunt. Datæ fœminis sterilitatem faciunt: & prægnantibus abortum, si supergrediantur. Farina humidis ulceribus, & cicatrici repugnantibus inspargitur: iumentorum ceruicibus medetur. Folia recentia in oleribus cocta manduntur, ut uentrem emolliant.

**FILICIS** tam maris, quam fœminæ, quibus scatet uniuersa Italia, meminit Theophrastus libro ix. cap. xx. de plantarum historia, his uerbis. Filix fœmina utilis contra interaneorum animalia lata, melle subacta: & contra tenuia, in uino dulci cum farina hordeacea data. Si mulieribus grauidis detur, abortum facere: si cæteris, steriles in totum reddere aiunt. Differt fœmina filix à mascula, quod solum unico artu porrectum hæc habeat, radicem uerò crassam, longam, & nigram. Harum igitur uires sterilitati addixisse natura putatur. Hactenus de filicibus Theophrastus. De ijs etiam scripsit Plinius lib. xxv. cap. ix. sic inquit. Filicis duo genera, nec florem habent, nec semen. Pterin Græci uocant, alij blechnon, cuius ex una radice complures exeunt filices, bina etiam cubita longitudine excedentes, non graues odore. Hanc marē existimant. Alterum genus thelypterin Græci uocant, alij nymphæam pterin. Est autem singularis, atq; non fruticosa (forte rectius non singularis, atque fruticosa) breuior, molliorq; & densior, folijs ad radicem canaliculata. Vtriusq; radice sues pinguescunt. Folia utriusq; lateribus pinnata, unde nomen Græci imposuere. Radices utriq; longæ, in obliquum, nigræ, præcipuè cum inoruere: siccari autem eas sole oportet. Nascuntur ubiq; sed maxime frigido solo. Effodi debent Vergilijs occidentibus. Vtius radice in trimatu tantum, neq; ante, neq; postea. Pellunt interaneorum animalia: ex his ptæniæ cum melle, cæteras ex uino dulci triduo pote. Vtraq; stomacho inutilissima. Aluum soluit, primò bilem trahens, mox aquam. melius ptæniæ cum scammonij pari pondere. Radix eius diuim obolorum pondere ex aqua, post unius diei abstinentiam bibitur, melle prægustato, contra rheumatismos. Neutra danda fœminis, quoniam grauidis abortum, cæteris uerò sterilitatem facit. Farina earum ulceribus tetrīs inspargitur, iumentorum quoq; ceruicibus. Folia cimicem necant, serpentem non recipiunt. Et libro xviii. capite vi. idem de Filice hæc scripto reliquit. Filix biennio moritur, si frondem agere non patiaris. Id efficacissimè contingit germinantis ranis baculo decussis: succus enim ex ipsa defluens necat radices. Aiunt & circa solstitium aquulas non renasci, nec harundine sectas, aut exaratas uomeri harundine impositas. Filicem utranque prodidit Galenus libro viii. simplicium medicamentorum, ubi de earum uiribus in hunc modum differit. Filix mas radicem habet maxime utilem: latum enim lumbricum interficit, si quis eam quatuor drachmarum pondere in aqua mulsā sumpserit. Ad eundem modum factum uiuum quidem necare, mortuum autem eiicere mirum non est: est enim amara, paulum habens adstrictionis. Quamobrem ulceribus imposita ualenter desiccandi facultatem obtinet, non tamen mordax est. Similem ei uim habet Thelypteris nominata.

Filicis utriusque historia.



Filicis utriusque uires ex Galeno.

ΠΟΛΥΠΟΔΙΟΝ. FILICULA. *Engelsfuss* CAP. CLXXX.

**FILICULA** nascitur in muscosis petris, & uetustis arborum caudicibus, præsertim quercuum, palmi altitudine, filiei similis, subhirsuta, non tenui perinde diuisura. Radix pilosa, in qua continentur cirri, ceu polyporum, crassitudine digiti minimi, coloris intus herbacei, austera aliquantum, & gustu subdulcis. Purgandi uim habet. Coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum soluendam. Aridæ farina aquæ mulsæ insparsa, detrahit bilem, & pituitam: trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus rimas, quæ inter digitos fiunt.

**POLYPODIUM** Latinis Filicula nuncupatur. Recentiores medici, atq; etiam officinæ Græcum nomen retinent. Eius duo reperiuntur genera. Alterum, de quo hic Dioscorides differit, omnibus notum est, quod ubiq; locorum frequens proueniat. Alterum uerò non nisi paucis cognitum esse reor, folio aspleni, sed longiore, uiridior, magisq; per ambitum laciniato: radice priori simili, graciliore tamen paulo. hoc plurimum nascitur in montium syluis. Nos copiosum uidimus, legimusq; quibusdam in montibus, per quos iter breue, ac compendiosum faciunt, qui Goritia Labacum contendunt. Prætulit Mesues filiculam, quæ in quercuum caudicibus gignitur, quod ea, quæ solo, aut muscosis lapidibus innascitur, suo quodam exuberante, inconcoctoq; humore maxime uentriculo sit noxia, quodq; ipsum statibus repleat, ac etiam subuertat. Id quod postea in uniuersum de omni Filicula subiunxit, dicens. Polypodium inter ea recensetur medicamenta, quæ uel maxime corpora exiccant, & extenuant: subuersionem, & nauseam facit.

Polypodij cōsideratio.



Polypodij ui  
res ex Actua-  
rio, & Gal.

In quo tamen Mesui refragatur doctissimus Manardus Ferrariensis, asserens, quod polypodium, cum imbecilliter leuiterque purget, corpora extenuare non possit: addens se certò scire, quod idem per se exhibitum, nullam stomacho inferat iniuriam. Proinde Auerrhoi in hoc magis adstipulandum censet, quam alteri: quandoquidem Auerrhoes autor est, Polypodium tutum esse medicamentum, & epitbymo præstantius. Polypodium (ut testatum reliquit Actuarius in libro de compositione medicamentorum) bilem, & præsertim atram, & pituitam extrahit. Dantur purgatæ radicis seni scrupuli adfusa aqua mulsa. Mediocriter uerò aluum ciēt, & citra molestiam, tum in gallinæco iure, tum in cremore ptisanæ cocta radix. Polypodio facultatem duntaxat assignauit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, ijs uerbis. Polypodium dulcem simul & austeram habet uincētem qualitatem, ut facultatis sit admodum desiccantis, citra morsum tamen. hæc Galenus. Ex quibus sanè satis constare posse arbitror, Mesui rectè dixisse, & in hoc immeritò à Manardo reprobensum fuisse. Nam quod Polypodium abundè exiccet, Galenus testis est grauius. Ex quo cur etiam efficaciter extenuare non possit (ut inquit Mesues) non equidem uideo. Quare potius adducor, ut in hoc opinio Manardi aliqui celebri, mihi planè reprobanda uideatur.

Δρυοπτερίς. DRYOPTERIS.

CAP. CLXXXI.

DRYOPTERIS nascitur in ueterum quercuum musco, filici similis, multò minore foliorum incisura: radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem uergentibus. Psilothrum est cum radicibus trita: illinitur enim primum usque dum sudorem euocet, mox sudor abluitur, & recens imponitur.

Dryopteridis  
consider.

NON aliud Græcis significat Dryopteris, quam filix in quercubus nascens, quod filix hæc in amosis, muscosisq; (ut Dioscorides inquit) quercubus proueniat, folijs filicem ad unguem referentibus. Nascitur etiam huiusmodi solo, & inter uesperes, circa quercuum caudices: eam siquidem ipse in Goritiensi agro pluribus in locis ueni extra quercuum caudices enatam, nullis repugnantibus notis. Dryopteris ijs, qui syluas ingentes frequentant, notissima est. Dryopteridis meminit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, eius facultates referens his uerbis. Dryopteris gustu mistam facultatem præfert, dulcem, acrem, amarā: in radice uerò item acerbam. Facultatem habet septican, proinde etiam pilis glabram cutem efficit.

Dryopteridis  
facul. ex Gal.

DRYOPTERIS. 558

ΚΥΝΟΣ. CNICVS. CAP. CLXXXII.

*Κυνόβατον ὀφθαλμίου*

CNICVS folijs constat oblongis, per ambitum diuifis, asperis, spinofis: caule sesquipedali: capitulo magnitudine grandis oliuæ: flore croci: semine candido, alioqui rufo, longo, anguloso. Huius flore in obsonijs utuntur. Seminis tusi, & expressi succus, cum aqua mulsa, uel iure gallinacei, aluum purgat: sed stomacho aduersatur. Ex eo autem fiunt offulæ, quas placentulas uocant, adiectis succo amygdalis, nitro, aniso, & melle decocto, quæ aluum emolliunt. Hæ in partes quatuor finduntur, quæ nucis iuglandis magnitudinem impleant: è quibus ante cœnam duas, uel tres sumpsisse satis est. Ratio temperandi hæc est. Cnici candidi sextarius, amygdalarum tostatarum & delibratarum cyathi tres, anisi sextarius unus, aphronitri drachma una, cum carnibus triginta caricarum. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluendæ alui facultate donat.

SUNT in Italia, qui Cnicum Crocum Saracenicum appellant, quod eius flore plerumque croci loco rura utantur: tamen si officinæ Mauritanos secute Cartanum uocent. Cnicus (ut auctor est Theophrastus libro VI. cap. III. de plantarum historia) duorum est generum, satium unum, alterum sylvestre, ut latius libro tertio in *Atractylidis* mentione retulimus. Porro in usum medicinæ semen tantum uenit. Quod (ut Mesues inquit) haustum superne, inferneque purgat. Pituitam, & aquas extrahit: quo fit, ut coli dolore affectis, & aqua inter cutem laborantibus opem mirifice præstet, non modo haustum, sed & clysteribus infusum. Seminis medulla à putaminibus repurgata, & saccharo eclegmatico modo excepta, pectus, & pulmones abstergit, uocem clarificat, prolificumque semen auget. Cnici uires paucis perstrinxit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit: Cnici semine duntaxat ad purgationes utimur. Tertius est ordinis excelsifacientium, si quis foris eo uti uolet.

Cnici consideratio.

384

Cnici uires ex Galeno.


*Κυνόβατον ὀφθαλμίου*  
 ΑΝΘΟΣΙΣ. MERCVRIALIS.  
 CAP. CLXXXIII.

LINOZOSTIS, aliqui parthenion, alij hermubotanion appellant, folijs constat ocimi, helxinæ cognatis, sed minoribus: ramulis duplici geniculorum modo cinctis, alarum cauis multis. fructu foeminæ, copioso, quandam racemorum speciem præbente: mari è foliorum sinu dependente, paruo, rotundo, ceu binis testiculis vnâ coherentibus: frutice dodrantali, aut maiore. Vtraque in oleribus manditur, ad aluum ciendam. cocta in aqua, epoto iure, bilem aquamque detrahit. Constat, ut mares gignantur, hunc facere: ut foeminæ, illam, si à purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoueantur.

MERCVRIALEM, quæ Græcis Linozostis appellatur, duorum generum esse constat: unum mas, alterum foemina. Vtraque non modo medicis, ac seplastijs uulgaris admodum est notitiæ: sed etiam mulierculis, et ferè omnibus, quod in clysteribus plerumque imponatur. Quare non est, cur de Mercuriali hic pluribus differamus. Subijciam tamen quæ de ea memoria prædidit Plinius lib. XXV. cap. V. ijs uerbis. Linozostis, inquit, siue parthenion,

Mercurialis confid. &amp; historia ex Pli.

222



CNICVS.





parthenion, à Mercurio inuenta est, ideo apud Græcos hermūpoan multi uocant eam, apud nos omnes mercurialem. Duo eius genera, masculus, et foemina, quæ efficacior: caule cubitali interdum, ramofo in cacumine, ocimo angustioribus folijs, geniculis densis, alarū cauis multis: semine in geniculis dependente, foeminæ copioso, mari iuxta genicula stante, rariore, ac breui, contortoq̃, foeminæ soluto, et candido: folia maribus nigriora, foeminis candidiora: radix superuacua, prætenuis. Nascuntur in campestribus cultis. Mirum est, quod de utroque eorum genere proditur: ut mares gignantur hunc facere, ut foeminæ illam. Hoc contingere, si à conceptu succus protinus bibatur in passo, edanturue folia decocta ex oleo et sale, uel cruda ex aceto. Quidam decoquunt eam in nouo fictili, cum heliotropio, et duabus, aut tribus spicis, donec decoquatur. Decoctum dari iubent, et herbam ipsam in cibo, altero die purgationis mulieribus per triduum, quarto die à balneo coire eas. Hippocrates miris laudibus in mulierum usu prædicaui illas: easq̃ ad hunc modum adhuc medicorum nemo nouit. Ille eas uulæ cum melle, uel rosaceo, uel irino, uel lirino admo-  
uit. Item ad ciendos menses, secundasq̃: Hoc idem præstare potu, fotuq̃ dixit. Instillauit auribus surdis succum, inunxitq̃ cum uino uetere. Aluo folia imposuit, epiphoris, stranguriæ, et uesciæ. Decoctum eius dedit cum myrrha, et thure. Aluo quidem soluendæ, uel in febris, decoquitur quantum manus capiat, in duobus sextarijs aque ad dimidias, bibitur sale, et melle admixto, necnon cum ungula suis, aut gallinaceo decoctum salubrius. Purgationis causa putauere aliqui utranque dandam, siue cum malua decoctum. Thoracem purgant, bilem detrahunt, sed stomachum ledunt. Hactenus de mercuriali Plinius. Eius quoque uires descripsit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Mercuriali utuntur omnes ad uentris purgationes duntaxat. Verum enim uero si quis eam facere periculum uolet in cataplasmate, sanè eam digerentis admodum facultatis esse experietur.

Mercurialis  
uires ex Gal.

Κυνόκραμβη. CYNOCRAMBE.

CAP. CLXXXIII.

CYNIA, aut cynocrambe, cauliculus binum dodrantum altitudine emittit, mollem, subalbidum: folia mercuriali, aut hederæ similia, certis interstitijs subalbida. semen folijs adhæret, paruum, rotundum. Folia cum caulibus pota, aluum cient. oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam, & bilem, aquamque detrahunt.

Cynocrâbes  
confider.  
Ruellij error.

VIDETUR Ruellius existimasse Cynocrambem eandem herbam esse cum Atriplice syluestri. Quia in re (si ita esse credidit) aperte errasse deprehenditur, quod præter syluestrem atriplicem, etiam comperta Brafica canina, quodq̃ de syluestri atriplice simul cum satina scripserit Dioscorides libro secundo. Cynocrâbe, quam nos Mercurialem spuriam appellamus, in Italia omnibus frè locis prouenit, in campis, in uis, in iis, nulla



CYNOCRAMBE.




nulla prorsus descriptioni reclamante nota. Differt hæc ab ægresti atriplice non modo folijs, & facie; sed etiam caulis proceritate. Siquidem atriplex sylvestris quandoque ad duum cubitorum altitudinem assurgit. Cynocrambe uerò binum palmorum longitudine contenta est. Huius nusquam, quod inuenerim, meminit Galenus in libris simplicium medicamentorum. nam ea Cynocrambe, cuius ipse Galenus, & alij rei herbarie scriptores mentionem faciunt sub nomine Apocym, alia est ab hac, de qua hic agitur.

*Ἡλιότροπον μέγα*

Ἡλιότροπον μέγα. HELIOTROPIUM MAIUS. CAP. CLXXXV.

HELIOTROPIUM magno flos est effigie scorpionis caudæ, unde scorpiuro ei nomē: & quoniam folia cum sole circumagat, heliotropion dicitur. Folia octimi habet, hirsutiora, candidiora, & maiora: ramuli à radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliunt, multis uocatis concavi: flos in cacumine cæcidus, aut subfultus, incuruatur ut scorpionis cauda: radix tenuis est, & inutilis nascitur in asperis. Decoctum herbæ ex aqua, fasciculo manus plenæ, potu pituitam, bilēque per caluum extrahit: contra scorpionum ictus in vino potum, & illitum prædest. ad alligatur ad conceptus accendos: Aiunt per horā vnā ante accessiones, seminis grana quatuor cum vino quartanas finire, tria uerò tertianas. Illitum semen formicantes verrucas, penfilesq; & thymos, & epinyctidas exiccāt. Folia infantium destillationibus, quas syriacis vocant, podagricis, luxatisq; utilissimè illinitur, menses cient: partus trita, & imposita pellunt.

HELIOTROPIUM MAIUS.



HELIOTROPIUM MINUS.

*Ἡλιότροπον μικρόν*



Ἡλιότροπον

Ἡλιοτρόπιον μικρόν. HELIOTROPIUM MINUS. CAP. CLXXXVI.

HELIOTROPIUM paruum nascitur in palustribus, iuxta lacus, folijs antedicto proximis, rotundioribus: semine acrochordonum verrucarum modo, pensili, rotundo. Herba cum suo semine pota, adiecto nitro, hyssopo, nasturtio, & aqua, latas tineas, teretesque excutit. Pensiles verrucas, quæ acrochordones vocantur, cum sale illita tollit.

Heliotropij  
utriusq; consi-  
deratio.

HELIOTROPION maius, licet in asperis nasci Dioscorides tantum prodiderit; tamen in Hetruria, & in comitatu Goritienſi, ubi frequentissimum uisitur, passim ferè provenit, in campis, secus uias, in oppidorum plateis, & circa ædificiorum areas, aridis item, & sabulosis locis. Herba hæc apud Hetruscos officinis Verrucaria appellatur, 10 quod uerrucas, myrmecias, & thymos affricata ualenter adimat. Quare mihi, ut Ruellio quoque doctissimo, plurimum errare uidentur, qui censent Calendulam officinis dictam, quæ & neotericis Caltha existimatur, esse Heliotropium maius. namque omnes prorsus illius notæ huic reclamare deprehenduntur. Neque eorum opinioni illud quicquam addit, quod huius Calthæ semen quadantenus scorpionum caudiculas reſerat, quoniam Dioscoridi Heliotropij flos, non semen scorpionis caudæ effigiem repræsentat. Porro Ruellius heliotropium hoc uocari ait herbam cancri, quod eius flores in caudæ cancri (qui nobis astacos esse putatur) similitudinem inslectatur. Verum hæc nominis ratio à Ruellio assignata mihi non planè satisfacit, quod scorpionum, & astacorum caudæ forma inter se maxime differant. Vnde potius crederem, hoc Heliotropium herbæ cancri appellationem traxisse, quod efficacissimum sit aduersus car- 20 cinomata, & ulcera gangrenosa, ad quæ magno admodum successu eo utuntur chirurgici, qui & plantam, & eius uires compertas habent. Ceterum Heliotropium minus uidimus, ac sæpe legimus in Tridentino agro, in palustribus quibusdam locis, idque compluribus ostendimus, ut quod picturæ satis respondere mihi uideretur. Quod autem huius Heliotropij, aut alterius mentionem fecerit Galenus, non inuenio in simplicium medicamentorum censu. Paulus ta- 30 men utriusque meminit, sed non plura de his tradidit, quam quæ Dioscoridi accepta referre potest. Sunt & recentioribus (ut supra diximus) qui Calendulam uocatam, Virgilij & Plinij CALTHAM existiment, hoc argumento nixi, quod flores aureos luteosque proſerat. Quorum equidem sententiæ non ausim omnino subscribere, aut refragari. Ea in Hetruria à florum colore uulgò Fior rancio nominatur. Hanc inibi passim acetarijs adhibent. Gustu est adstringenti, cum quadam leuiscula amaritudine. Ex quo non uideo, quomodo hæc, ut quidam scriptis tradiderunt, menses ciere possit. nisi id fortasse fiat ab occulta quadam facultate. Siccata pulvis ead- 30 uis dentium immisſus, dolorem leuat.

Calthæ con-  
sideratio, & ui-  
res.

#### SCORPIOIDES.

SCORPIOIDES herbula est, folijs paucis: semine caudæ scorpionis effigie. Illita scorpionum icibus præsentaneo est auxilio.

Scorpionis herba  
Σκορπιόειδης. SCORPIOIDES.  
CAP. CLXXXVII.

SCORPIOIDES herbula est, folijs paucis: semine caudæ scorpionis effigie. Illita scorpionum icibus præsentaneo est auxilio.

SCORPIOIDIS speciem Calendulam nominatam Paulus 40 dubiè esse censerem, si folia, sicuti semen, Scorpioidi responderent. Verum, cum hæc folijs paucis, illa uerò multis, longisque proſt- liat, ij aperte falli deprehenduntur, qui in hac opinione uer- santur. Equidem ueram, ut arbitror, Scorpioidem uidi pri- mum superioribus annis in Foroiudiensī agro in Ciuitate Austrie quodam in hortulo clarissimi medici Iuliani à Marostica Teru- siensis. Hanc eandem, cuius hic effigiem pictam damus, dum hoc tempore diligenter curarem, ut singulis plantarum descriptioni- bus, quarum cognitionem habemus, pictura accederet, ad me mi- 50 sit Augustinus Alpagus nobilis Bellunensis, artis medicæ, reſq; herbarie peritus. Quam sanè suis notis ueram Scorpioidem re- ferre putamus: etsi non desint uiri doctissimi, qui aliter sentiunt. Scorpioidem breuissime perstrinxit Galenus lib. VIII. simpli- cium medicamentorum, sic inueniens. Scorpioides excaſcit qui- dem ordine tertio, desiccatur uerò secundo.

Scorpioidis  
consider.

Scorpioidis  
facul. ex Gal.



563

# PETRI ANDREAE MATTHIOLI MEDICI Senensis Commentarii,

## IN LIB. QVINTVM PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA.

**S**UPERIORIBVS quatuor libris, amicissime Aree, tradidimus de aromatibus, oleis, unguentis, arboribus, & earundem lacrymis, ac fructibus: item animalibus, melle, lacte, adipe, cerealibus, oleribus: necnon de omni radicum, herbarum, succorum, seminumque ratione. In hoc autem totius operis quinto differemus de uinis, & metallicis à uite nostram commentationem auspicati.

### COMMENTARIVS MATTHIOLI.



**Q**UONIAM non difficile tantum, sed quasi etiam impossibile esset, ut cuiuscunque scientie, aut facultatis principiis, ac fundamentis uniuersalibus ignoratis, sciri perfecte possint illa, quæ deinceps speciatim in ea consideranda ueniunt; ideo non minus necessarium, quam utile fore existimaui, si hic in uniuersum fossilium, ac metallorum materia tractaretur. Nam etsi in hoc quinto libro nonnullorum fossilium medicamentorum cum historiam, tum facultates tradiderit Dioscorides, et ipsum secutus Galenus in libris simplicium medicamentorum; cum tamē eorum neuter originem, materiam, causas, ac alia plura in his estimanda, ac cognoscenda explicuerit, illa quidem hoc loco silentio inuoluenda non duximus,

ut quantum per nos fieri potest, nihil quod ad absolutam rerum simplicium cognitionem, et communem usum faciat, à nobis intactum relinquatur. Cum itaq; plures tam antiquos, quam recentiores, qui de fossilium, ac metallorum materia scripserunt, diligenter satis perlegerim, eos utiq; non modò inter se differentes reperi, sed in aliquibus etiam contrarios. Nam licet eorum quidam de ueritatis tramite parum deflectant; uidentur tamen non exacte ea omnia explicauisse, quæ hac in re maxime necessaria censentur. Fieri enim lapides, Aristoteles autor est, igne non liquecentes ex sicca ignescente exhalatione. Ex quibus deduci potest, exhalationem humidam materiam esse lapidum liquecentium, e quibus metalla constantur. quo fit, ut ex Aristotelis sententia, lapides igne non liquecentes fiant ex calido, & sicco uapore: liquecentes uerò ex humido halitu tantum. Sed opinionem hanc, quæ rem altius, diligentiusq; inuestigant, minime probandam existimant, cum lapides longè minus, quam terræ ex uapore fieri queant. Siquidem puluis, qui sic gigneretur, unum aliquod ex pluribus fieri nunquam posset, nisi humor illi commisceretur. & omnes pariter lapides non liquecentes absq; multa hominum opera, ac tundendi labore facile in arenam, uel puluerem transirent, si tantum ex ijs nullo accedente humore efficerentur. Quod profectò haud ita se habet: lapides namq; ferè immixtos admodum compactos, solidosq; uidemus: id quod haud dubie ostendit, ex illo tantum uapore eos nequaquam genitos esse. Quod si ex eo lapides eiusmodi procrearentur, magis omnino fierent in superiore aeris regione, ut quæ facile ignis contactu incendatur, quam intra terram. Quandoquidem omnibus liquidò constat, quam superior illa aeris regio ex uelocissima astrorum conuersione, citius accendatur. Ac certè si non aliàs, saltem quoties gignerentur cometæ, faces, flamme, clypei; ardentes, deciderent lapides è caelo, aut terræ. quod tamen fieri non uidemus. Et quæuis tradiderint prodigiorum scriptores pluuisse quandoq; lapides, ut Plinius, & alij quidam testantur; non tamen ob hoc opinatus est Aristoteles in aëre lapides gigni posse. Nempe is lapidem è caelo delapsum uentorum ui in aërem sublatum scribit. At si lapides in aëre fiunt (quod planè negare non ausim) quid obstat, cur dici non possit, hos ex eadem fieri materia, ex qua illi sub terra generantur: quam quidem materiam facile produxisse potuerint uiolentissime tempestates: utpote quæ repentino aliquo motu dum oriuntur, ex reliquorum elementorum mutatione terrena illa corpora genuerint. Theophrastus uerò non lapides solum, sed terras etiam constare scribit ex pura, ac equali materia, quæ confluxu quodam, siue percolatione sit effecta, alioue modo excreta. Quod etsi iure aliquo probari possit, non tamen ijs duobus modis tantum talis efficitur. Nec ea quanuis proxima sit materia terræ insignis, omnis etiam est lapis, uerum alijs quoq; modis fit pura, & equalis materia, ut cum succi nascuntur. Interdum quoq; necesse est, ut calor materiam ijs duobus modis genitam, prius coquat, ut inde efficiat succum, ex quo tandem lapis, qui liquecat ignis calore, fieri possit. Verum enim uero multò magis in hoc errasse Theophrastum deprehenditur, quòd scilicet omnes lapides etiam pretiosos terra abundare crediderit: is enim ita inquit. Eorum, quæ in terra consistunt, alia aquea sunt, alia uerò terrena. Aquea quidem sunt metalla, nempe aurum, argentum, & reliqua. Terrena uerò lapis, & lapidum

Varia de generatione lapidum sententia.

Aristotelis opinio.

Theophrasti opinio.

Auicennæ opinio cōpro-  
bata.

Plinij opinio  
explosa.

Varia de me-  
tallorū ortu  
sententia.

dum species pretiosæ, ac etiam terrarum species omnes, quæ colore, uel leuore, uel spissitudine, aliæ facili de se  
insignes. Quandoquidem si uera esset hæc Theophrasti sententia, nulla quidem inueniretur gemma, quæ transluce-  
ret, cum tamen uariæ, ac ferme innumera reperiantur, quæ maximè pellucunt. Hinc itaq; fit, ut citra inuersionem  
positum, non omnes pretiosorum lapidum species esse terrenas, sed aqueas, id est, ex humore quodam cōstitas, cuius  
pondus longè maius, quàm terre insit. Ceterum Auicennæ opinio, quam sequitur Albertus, multo magis uertan-  
ac rationi coherere uidetur, quàm aut Aristotelis, aut Theophrasti. Quippe quanquam non explicauerit ipse, quibus  
modis futura lapidis materia congregetur; dixit tamen lutum esse in primis lentum, et aquam non simplicem illam,  
sed cum terra permixtam. In qua permixtione si plus terre, quàm aque confluerit, lutum dicitur, sin aque, suc-  
cus. nihil enim aliud est lutum, quàm terra, quæ permaduerit aqua: nec succus aliud quidem explicat, quàm aquam,  
quæ sorbuerit terram, uel abarserit, tetigeritq; metallum. Lutum enim, ex quo lapis futurus est, lentum, ac tenax es-  
se oportet, cuiusmodi illud est, ex quo lateres, et fictilia fiunt: nam ab alterius generis luto, quod penitus lentore ca-  
reat, haud difficulter separatur, ac dissoluitur humor, tumq; non lapis ex eo efficitur, sed puluis. Lutum uerò tenax  
calor primum exiccando conspissat, efficitq; medium inter lutum, et lapidem: deinde quia diutius idem agit, uel a-  
crius, lapidem gignit. Quinetiam succus crassus, et lentus facili conuertitur in lapidem. quod in animalibus est e-  
uidens, præsertimq; in nobis, cum iam dudum ueteribus medicis, ac etiamnum recentioribus decretum sit, tum renem,  
tum uesicæ calculos non aliunde progigni, quàm ex lento, crassoq; humore temporis tractu à caloris nostri facultate  
coactio. Ob id igitur translucens gemmæ non ex aqua tantum fieri constat; sed ex puro, liquidoq; succo, qui aque  
multum, terre uerò tantillum referat. Siquidem si ex aqua tantum huiusmodi lapides efficerentur, non uirgines  
rentur in ea proiecti, sed ea supernatarent, non secus ac glacies, et grando. At cum omne lapidum genus demerga-  
tur aqua, ac etiam crystallus, et beryllus, quæ tamen, quoniam glaciem colore repræsentant, omnino uidentur ex a-  
qua constare, satis intelligimus, ex sola aqua non gigni lapides illos. Quapropter (ut in sequentibus suo loco dicitur)  
plane explodenda uenit Plinij, et aliorum quorundam sententia, quibus certum est, crystallum glaciem esse, quæ  
niue in algidissimis montibus concreuerit, cum aqua non supernatet. Generantur præterea lapides ex lapidibus ip-  
sis, cum fluuiorum, riuulorum, ac subterraneorum fontium aquæ per saxa excurrentes, ab eorum superficie aliquod  
lapidosum abarserint, quod cum resederit, solis calore siccat, ac lapidescit. Hoc enim euidentissimè apparet in ca-  
nalibus, ac soli patentibus aqueductibus, quibus nonnullæ aquæ calidæ ducuntur. Uirum lapideis quibusdam  
stis obliuuntur, quæ cum tenuissimis ramentis compactæ sint, ceteris molliores, infirmioresq; habentur. Hoc idem  
apertissimè conspicitur in quibusdam balneis aquarum sponte nascentium, præsertimq; in balneo sancti Philippi co-  
mitatus nostri Senensis. Quandoquidem ex huiusce balnei aqua, particula quedam gignuntur lapideæ, saccharum  
tum candore, tum etiam materia referentes, quæ usque adeo imitantur semina saccharo contexta, et alia id genus, quæ  
in officinis saccharo similiter conteguntur, nempe anisum, coriandrum, ac etiam plerumq; cinamomum, ut ijs cap-  
sule à quibusdam impleantur, itaq; aptentur, ut solatijs causa aliquos sacchari, cuiusq; confecturam audissimos de-  
cipiant. Fit hoc quoq; in his, qui huius aquæ stillicidio utuntur ad cerebri morbos curandos, illi quotidie caput subi-  
cientes. Siquidem lapidosa illa materia, capillis circumcisis continèe inherens, in granula quedam cogitur, ac co-  
lescit, ab aniso saccharo contexto nihil ferè dissimilia, quæ non nisi tractu temporis inde se explicant, et dissoluuntur.

Idem præterea euenit in montium concavitatibus, ac speluncis, quæ ex saxo potissimum calcario constant. quippe  
aquarum ex saxorum commissuris stillicidio lapideæ concrescit materia, quæ è cavitatum illarum cameris non aliter  
pendet, quàm stirie hyberno gelu è domorum nostrarum testis prominent. Ex eodem etiam saxo calcario oritur gy-  
psum, melitites, galactites, et alij quidam lapides. et ex succo, qui ex eodem saxo, et aqua contemperatur, lapis  
specularis, et gypsum, quod raro translucidum inuenitur. Eodem modo ex ramentis rubei lapidis fit hematites, et  
schistos: item in commissuris marmoris maculosi, aut eius, quod in candido cinereum colorem refert, reperiantur  
daityli Idei, lapides Iudæici, trochites, et consimiles. Verum enimvero succus lapidescens omnino differt ab aqua,  
quæ saxorum ramentis referta est, uel quod plus habeat sedimenti, uel quod calor talem coquendo aquam, eam densio-  
rem effecerit, uel quod aliquid is succus contineat, quod uehementer adstringat. Ex quo (ut opinor) corallum ma-  
ris planta, et antipathes oriuntur. Postremo materia lapidis erit quicquid habet meatus, per quos succus lapide-  
scens imbibere possit, siue is à terra contineatur, siue cum aquis mixtus ex ea effluerit. Quamobrem multoties arbo-  
res, frutices, animales, ossa, et alia in lapides uertuntur, ut Bobemi aperte testantur. Quandoquidem in eorum re-  
gno pluries in subterraneis fodinis (Georgius Agricola autor est) arbores inuentæ fuerint in lapidem conuersæ, stan-  
tibus adhuc ramis, cortice, medulla, ac radicibus. Equidem ipse quoq; ingenuè fateri possum, arboris ramentum ex la-  
cus cuiusdam litore mihi allatum esse, qui altera parte lapideus, altera uerò ligneus cernebatur. Venetijs item in ma-  
gno Germanorum emporio, quod uulgò uocant il Fondaco de Todeschi, equi testiculum lapidem factum, Antonius  
Golb mercator ibi pro Fucharis agens, iucundo omnium spectaculo, et admiratione ostendebat. Id quod animalium  
quorundam carnibus, et ossibus, tum etiam testaceis piscium operimentis euenisse compertimus. namque in Hetruria  
quàm plurimis in agris, buccina, cochleæ, conchule, et eiusmodi multa ex atro ab agricolis eruantur in lapidem cō-  
uersa. Quæ sanè omnia haud dubiam fidem faciunt, ita se rem banc habere, uti diximus. Sed ut ex prædictis omnem  
lapidum materiam paucis perstringamus, ea in primis est lutum, in quo multo plus sit tenacis terre, quàm aque. De-  
inde est succus, qui uehementi frigore congelascit, in quo aqua ipsa terram superat. Sunt præterea ramenta saxorum,  
quæ aquarum decursus abradit. Quinetiam succus lapidescens, qui cum in aërem effluxit, in lapidem concrescit.  
Omne deniq; quod habet meatus, in quibus lapidescens succus facili excipitur. Nihil secus in metallorum ortu  
et materia, de quo iam nobis differendum est, authores inter se dissentire inuenio. Alia etenim est philosophorum,

alia chymistarum, alia astrologorum sententia, quibus etiam accedit opinio imperitissimi vulgi, quæ tantum ab alijs  
 differt, quantum à ueritate, et à ratione prorsus abhorret. Is namq; certò credit, non modò saxa; sed etiam me-  
 tallis omnia, pretiosos lapides, et gemmas, ac terrarum uaria genera, in ipsa tantum mundi creatione Deum opti-  
 mum maximum talia finxisse, atque creasse, qualia nunc reperiuntur: nec medio temporis lapsu, ullam ex materijs  
 ad id dispositis esse natam, uel renatam, neq; aliquam uim nature, ad eorum perennitatem summum rerum opificem  
 tribuisse. Qui certè uulgius ita temerè pronuncians, non uidet quàm maximam nature inferat iniuriam, quæ nūquam  
 aliquo temporis momento quiescens, nil aliud agit, quàm ea semper regenerare, quæ alijs genuit, quæ etiam noua  
 multa producit. Vnde hæc uulgaris opinio prorsus explodenda, atq; exibilanda est. Quam insuper ut uanam ac ridi-  
 culam, illud maxime diluit, ac demolitur, quod in antiquis metallorum cuniculis sole clarius uisitur. Siquidem innu-  
 10 mere inueniuntur metallorum fodinæ, tanquam inutiles à fossoribus derelictæ, quòd inde omne metallum effoderint,  
 per quas etsi prius longè, lateq; patebat transitus, ita ut liberè, et absq; ullo impedimento non modò fossores ipsi, sed  
 uelicula, ac curricula per eas discurrerent; tractu tamen temporis factum est, quòd materia lapidescens in ipsis adeò  
 creuerit, ut fossoribus denuò ingredi uolentibus ob cavitatis angustiam denegaretur additus. Sed præterea metalla  
 continuè generari, ferrum indicio est. Id quod in Iluæ insule metallicis fieri (ea enim à maritimis nostris non longè  
 distat) non modò probatissimi scriptores memorie prodiderunt; sed fossores ipsi, qui diutius in ipsis uersati sunt, uera-  
 bis referunt. quippe quòd ferræ illæ fodinæ multis iam annis destitute, iterum, atque iterum ferrea materie im-  
 pleantur. Porro philosophi, et chymistæ aliter sentiunt. Aristoteles lapideam materiam halitum tantum existi-  
 mat. Chymistarum uerò nonnulli omnino asserunt, metalla in uisceribus terræ gigni ex sulphure, et argento uiuo:  
 dii ex quadam cinere aqua madescentia. Quorum sententia cum non solum suspecta, sed etiam planè falsa habeatur,  
 20 eos numerari omnes decipit, qui horum lubricis fundamentis nixi philosophantur, ut firmis tum rationibus, tum argu-  
 mentis probare non uererent, nisi id præter nostrum institutum esset, qui hic harum rerum capita tantum percurri-  
 mus. Verim si quis rem hanc fusius enarratam, atque exactissime discussam habere cupit, librū legat Georgij Agri-  
 cole uiri eruditissimi, à quo nos plura mutuatos esse ingenue fatemur. Ceterum illud omnibus, ut mea quidem fert  
 opinio, persuasionem esse debet, quòd nil aliud sit metallorum materia, quàm substantia elementaria, quæ tantò perfe-  
 ctius metallum efficit, quanto magis in equali proportionem tum qualitatis, tum quantitatis impensè depurata con-  
 stat. Quippe in metallorum materia aquam esse, maximo argumento est, quòd ignis calore liquentur, ac fluunt: fri-  
 gore uerò tum aeris, tum etiam aquæ rursum densentur, ac coeant. Id quod clarè ostendit, ea aquæ multum, terræ ue-  
 rò parum obtinere. Simplex enim aqua non est coram materia, sed mista cum terra: atque terræ quidem portio tan-  
 ta in missione existit, quanta aquæ perspicuitatem obscurat, fulgorem uerò non auferat. Quinetiam mistura quòd pu-  
 30 rior fuerit, eò pretiosius (ut diximus) metallum constat, idq; magis ignis patiens redditur. Sed quota terræ portio  
 insit cuique humori, ex quo efficitur metallum, nemo mortaliū unquam mente concipere potest, nedum uerbis ex-  
 plicare. Id tantum nouit Deus optimus maximus, qui certas, ac definitas quasdam leges nature tribuit, quibus res  
 inter se miscet, ac temperat. Succus igitur est, ex quo formatur metallum, quem pariunt uarij motus, quorum pro-  
 ximi sunt aquæ defluxus terram mollientis, aut secum rapientis: terræ cum aqua permistio: et uis caloris agens in  
 misturas, ut id genus succos gignat. Sed cum de metallorum materia satis dictum sit, iam causam efficientem pro-  
 sequamur. Ea autem nil aliud nobis esse censetur, quàm calor, et frigus, qui in ipsius terræ uisceribus recondun-  
 tur. Calor inquam is est, qui humoris metallici missionem coquit, ac purificat: frigus uerò, quo eadem densatur, et  
 dura efficitur. Hoc equidem experientia facile comprobatur, cum neminem lateat igni metalla liquefcere, ac etiam  
 tractu temporis post liquationem, ipsius ignis calore contabescere, atro excepto. Quamobrem detestanda uidetur  
 40 eorum opinio, qui tantum calore subterraneo metalla confici crediderunt. Sunt et qui putent, metalla omnino ef-  
 fici siderum errantium influxu. Soli namque auri generationem assignant, Lunæ argenti, Marti ferri, Mercurio ar-  
 genti uiui, Ioui stagni, Veneri æris, Saturno denique plumbi. Adduntq; quòd sicuti metalla ab errantibus stellis sui  
 ortus principium habent; ita pretiosi lapides, ac gemmæ, à fixis suam effectricem causam suscipiunt. Huic autem  
 sententiæ plerique non acquiescunt, quoniam has causas nimis remotas credunt, et propinquioribus causis inheren-  
 dum esse arbitrantur. Ego tamen insicias non eundem reor, quin omnia hæc inferiora terrena, ac finita regantur,  
 gubernentur, et producantur, à superioribus celestibus, ac sempiternis, quæ tandem diuturno orbem circumuolu-  
 tione, omnium causarum tam remotarum, quàm propinquarum causa existunt. Ita pariter dicendam existimo lapi-  
 dum gignendorum causam non semper à solo frigore, uel calore, sed modò ab hoc, modò ab illo prouenire. Nam la-  
 pides, quos aqua humectando dissoluit, calorem exiccando compegisse intelligimus. Contrà uerò, qui calore ignis  
 50 liquefcunt, ut fluidiorum, et torrentium silices, quibus igne liquatis uitrum conficiunt artifices, eos frigore concre-  
 uisse certum est. Concretio enim, eiq; oppositæ affectiones, resolutio scilicet, atque liquefactio, oriuntur à causis in-  
 ter se contrarijs. Etenim calor à materia humorem extrahens, eam efficit duram: at frigus eandem, aëre maxima  
 ex parte excluso, uehementer constringit, quemadmodum agit, cum aquam in glaciem uel niuem cogit. Hinc est,  
 quòd memorie prodidit Galenus, eam aquam corporibus prorsus inimicam esse, quoniam omne, quod in ea tenuissi-  
 mum erat, à gelu expressum fuerit. Duabus his causis tertia quoque accedit, quæ est succus ille lapidescens, de quo  
 superius diximus, qui uel solus, uel cum aquis permistus in stirpium meatus, aut in animantium particulas recipitur.  
 Nam præterquam quòd sit lapidum materia, causæ etiam efficientis partes subit: quando scilicet in corpus aliquod  
 per meatus penetrat, idq; totum secum in lapidem uertit. Quòd si in lapidem concreuerit guttatim cadens, aut in irra-  
 ceos diffusus, tunc materia tantum, non causa efficiens dici merebitur. Gignitur hic (ut supra dictum est) in locis qui-  
 busdam lapidosis, et interdum aquæ commistus, per uenas terræ manat, et effluit. Quapropter mirari non licet, si  
 Bb fontes, res

Causa metal-  
lorum effi-  
ciens.



Cur pauci,  
cur multi lapi-  
des fiant.

Lapidum co-  
lores unde ua-  
rii.

Metallorū dif-  
ferentia plu-  
res.

fontes, riuuli, lacus, ac putei reperiri possunt, qui stirpes, ossa, & alia multa in lapidem tractu temporis uertunt. Verum non est ignorandum, quod succus is lapidescens motu aliquo agitatus, non facile in lapidem densatur, nisi crassius admodum fuerit, sed simulatq; in meatus ligni, aut alterius rei receptus, dispersusq; quieuerit, frigore cogitur, & concrescit, mutatq; res illas, quibus continetur, in lapides, ut in quodam Gothiæ fonte euenire probatissimi auctores testantur. Cuius guttæ solo persusæ, cum moueri, aut agitari nequeant, ab ambiente aëre densantur, & lapidescunt. Quod si præterea uerum est, in montibus Pyrenæis esse loca, in quibus aquæ pluuiæ lapidescant, id ideo fieri posse uidetur, quod aquas cum terra permixtas uel solis calor paulatim concoquat, uel insignis propter calorem siccandi uis, quæ terræ insit, conspisset: utroque enim modo ex eis potest effici lapis. Neque necesse est confingere, aut comminisci aliam uim, quæ idipsum agat, quam quatuor qualitatum, aut eam, quæ ab ipsis inter se agentibus, & patientibus orta loco tribuitur. Sed hic nobis subit inquirendum, cur unus tantum quandoque gignatur lapis, cur uero plures uno loco efficiantur. Fit igitur, ut arbitramur, unus tantum lapis, cum locus, qui concepit materiam, solidus fuerit, ac meatibus carens. Quippe conclusus calor omnem tuam operationem, tuam facultatem undique in materiam conferens, unum duntaxat lapidem gignit, & ipsum quidem magnum, aut paruum, secundum materię quantitatem. Quapropter plerumque singulares à frigore efficiuntur, cum purissimi succi, ex quibus constant, rariius multi ac magni in locum unum congregentur. Verum contra plures gignuntur lapides, si locus non fuerit plane solidus, sed meatibus refertus, per quos calor ipse discurrere queat: nam si meatus pauci fuerint, calor materiam diuidens paucos efficit lapides, sin multi multos. Ad hæc plures generantur lapides non modo ex prædictis, sed etiam ex materie diuersitate. quandoquidem calor partem unius generis secernens ab alterius generis parte, plures efficit lapides. Item plures efficiuntur ex multis unius loci receptaculis, in quibus infusa materia in plures partes diuiditur: siquidem in ea frigus non minus, quam calor uires suas exercere potest. Qui lapides præterea pro diuersa materie mole magni, aut exigui redduntur. Iisdem modis quoque glarea, & silices fiunt: etsi ij sæpius aquarum impetu, qui saxa frangit, & comminuit, efficiantur. Hactenus causas explicauimus, quæ lapides, & metalla efficiunt. nunc ad eorum differentias progrediamur. Colorum itaque discrimina, quæ in lapidibus spectantur, materie, ex qua gignuntur, diuersitatem indicant. unde unus, & idem lapis sæpe uarios colores consequitur, quod fiat ex diuersi coloris materia. Deinde calor, cum ipsorum lapidum sit opifex, coloribus materiam inficit: nam obscuros ipsius colores illustrare, illustres uero obscuros reddere potest. Cuius effectus exemplum clarum habetur in coloribus ijs, quibus fictilia uasa pinguntur. namq; colores omnes, qui ad uasa fictilia pingenda, uel inficienda parantur, antequam in fornacem conijciantur, ab his plurimum distant, qui in fictilibus ipsis igne torrefactis, postea uisuntur. Quandoquidem etsi fictilia æris squama super porphyrite lapide læuigata, admixta aqua, infecta rufo colore, æris ferè modo, appareant; ignem tamen fornacis experta, uiridia efficiuntur. Sicut & color, qui ex ferri squama paratur, melius efficitur. Lapis etiamnum, quem figuli nostrates uulgo uocant zaffara, porphyrite lapide læuigatus, colore subnigro cruda adhuc fictilia tingit: sed igne percoctus, in cæruleum præstantissimum mutatur, ut nobis aperte declarat cæruleus, ac pulcherrimus ille color, quem uulgo pictores uocant Smalto: is enim ex ipso lapide zaffara nominato, cum uitro misto in uitriarijs fornacibus efficitur. Verum hanc colorum permutandorum facultatem in frigore non inuenias. quare lapides ab ipso coacti colorem eundem seruant, quo prius eorum materia infecta fuerat. Ex his adduci possumus, ut non temere credamus, quod plerique fluuiorum, ac torrentium silices coloribus in superficie tingantur, quoniam modo aquarum inundatione madefiant, modo solis calore siccantur. Solis enim calor, à quo silices ipsi æstate Siria ardente adeo incallescunt, ut uix tangi possint, ipsorum quidem colores (ut fictilium fornax) facile immutare potest, licet id magis euenire constet in eorum superficie, quam in centro. Differunt & metalla inter se colore, splendore, sapore, odore, pondere, & facultate. Color primum uariis in metallis conspicitur, nam unumquodque suam sortitur colorem. Aurum siquidem inter metalla ideo fului coloris est, quod calor uel terram in flauedinem quandam sinceram uerterit, antequam cum aqua misceretur, uel succum ipsum mox futuram aurum. Aes uero suum colorem habet, & eum quidem subrubrum, eo quod terram nonnihil impuram adusserit calor. Ferrum autem subnigrum est, propter terram ualde impuram, & adustam. Argentum porro candidum est, quod terra eius fuerit alba. Eadem in cæteris singulis colores inuestigandi ratio. Sequitur deinde eorum splendor, & nitor, qui ab aqua tantum (ut antè diximus) prouenit. Ex quo fit, ut quanto humor ipse tenuior, densior, puriorq; fuerit, eò metallum nitidius, ac splendidius efficiatur. quam ob causam reliquis hac in parte præstat aurum. Atq; hinc etiam saporem odoremq; sibi metalla asciscunt: dum enim aurum igne comburitur, terræ ipsius sinceritate, quæ optime cum aqua commista est, fumum præexiguum, & uix sensibilem emittit, & dulcem, ac suauem magis, quam foetidum. Argentum uero contra, quod terram impuram, licet combustu difficiliorem obtineat, plus fumi eructat, quam aurum, & subfoetidum quoque odorem exhalat. Sed tam ferro, quam æri multò maior fumi copia effunditur, atque una odor longe foetidior, quod scilicet adustam contineant terram. Plumbum denique ac stagnum, ob aquæ redundantiam, bebetes admodum odores promunt. Nec alia de causa tum ærea, tum ferrea uasa, qui rem hanc scire cognouerunt, ab usu coquinario abdicauere, quam quod adustæ terræ, quam possident, ualde amara qualitate cibi omnes, qui in huiusmodi uasis, uel coquantur, uel parantur, uel asportantur, uel reponuntur, facile infici possint. Id quod non modo gustum malè afficit, & exasperat; sed etiam in uentriculo nauseam, & subuersionem commouet. In hoc ergo admonitos seplasiarios uolumus, ut ab horum uasorum usu caueant: nam quandoque compertum est, quod acida medicamenta in cacabo æreo (quæ fuit pharmacopole uel ignaia, uel imperitia) decocta, sæus ac periculosa intulerant ægris symptomata. Præterea metalla omnia ponderosissima sunt: cuius rei causa est densitas ipsa, quæ sequitur bonam terræ cum aqua permissionem. Hinc fit, ut grauissima quæque pondera metallis liquefactis supernatent, modo maior sit

minor sit metallorum quantitas, quam rerum, quæ ipsis demerguntur. At huius rei experimentum quotidie facere licet, si argentum uiuum in aliquod uas infundatur, eique metallica pondera superponantur, auro excepto, quod solum inter cetera fundum petit, quoniam plus ceteris ponderet: argento enim uiuo ipsa pondera non aliter supernatare deprehenduntur, quam aquæ ligna. Ceterum aurum in ipso mergitur, non modò quòd ponderosius sit, sed etiam quòd cognationem quandam, et quasi consensum cum ipso habere uideatur. Metalla insuper, quæ liquescunt, ijs quæ attingunt, minime adherent, nec eadem humectant, neque etiam labiuntur, ut ceteri aq̃ui liquores tam fossitij, quam à plantis, aut animalibus producti: sed eorum partes inuicem coguntur, simulque coherent. Idq̃ non alia ratione fieri constat, quam quòd tam bona, firmaque mistio rei siccæ cum humida facta sit, ut sicca obiecti humide, ne adhaerescat, et humectet: humida uerò contrà impediatur, ne sicca prorsus conquiescat. Quæ quidem mistio quoniam in auro perfectissima reperiatur, ideo hoc igne nunquam absuntur. nam cum eius purissima terra sit optimè cum aqua permista, humorem stringit, et continet, ne ui ignis exipret: humor uerò contrà tueritur, ac defendit terram, ne accendatur. Idcirco nunquam comburitur aurum, ut cetera faciunt metalla. quæ quandoquidem impuriorem sortiantur terram, deterioremq̃ue mitionem; proinde ignis uiolentia facillè rapiuntur, et conficiuntur: cum enim terra flammis accensa fuerit, humorem celeriter deperdit. Attamen metallum unum diu magis, et citius comburitur, prout hoc illo plus terræ, eamque minus probè mistam obtinet. Etenim si libeat experiri, in primis ferrum deprehenditur igni consumi, propter nimiam, quam habet, terræ impure copiam. Mox plumbum, et stagnum, quòd ijs non satis firmum sit cum terra temperamentum. quam ob causam postquam humor rem exhaurit ignis, terram consumit. Deinde aes, quod cum terræ purioris, ac etiam paucioris particeps sit, quam ferrum, etsi ea non satis exquisitè mista sit cum aqua, diutius igni resistit. Postremo argentum, quod quia puriore terra constat, ac melius aquæ commista, non nisi longiori tempore flammæ cedit. Verum plumbum, ac stagnum non ob id igne tam facillè uincuntur, quòd multum impure terræ contineant, sed solam ob misturæ uitiam, quoniam in his imperfectior inuenitur. Sed ad lapides nostra reuertatur oratio. de quorum quoque luciditate, situe perspicuitate, ac nitore, uel horum oppositis obscuritate, ac squalore iam aliquid nobis differendum est. Ex prædictis itaque omnibus clarum esse arbitror, lapides aquam magis, ac terram participare, quam cetera elementa. Sed quoniam non terra, sed aqua cernitur esse perspicua, ac pellucida; ideo ab ea tantum perspicuitatem, luciditatemque ijs aduenisse constat. Vnde ex succis claris, et perlucidis constare lapides, quæ translucunt, affirmamus. quemadmodum ex terra eos, qui qualitatis perspicuitati oppositè reperiuntur: hi enim ex claris succis gigni nec queunt, sed ex impuris, ac turbidis uel luto, uel nigrore infectis. Quòd uerò alij lapides magis, alij minus pelluceant, non aliunde fieri certum est, quam è succorum diuersitate, cum scilicet alij alijs clariore, ac lucidiores existunt. Ex quo sequitur, quòd albæ gemmæ gignantur ex succo, cui aquæ color insit, atq̃ adeò ceteris clariore, ac illustriore appareant, ut crystallus, et iris, gemma sic ex argumento uocata: nam sub tecto percussa sole ob angulos, quos habet, colores ex opaco reddit, speciesq̃ arcus celestis in proximos (ut Plinij uerbis utar) eiaculari parietes. At alamus ex succo minus claro progignitur, ideoq̃ tam iride, quam crystallo obscurior est. Non dissimili uarietate notantur aliorum colorum gemmæ translucens, siue ortæ fuerint è succis uiridibus, ut smaragdi, ac prasij: siue è cæruleis, ut sapphiri, cyanei, et iaspidium quoddam genus: siue è rubris, ut carbunculi: siue è purpureis, ut amethysti, et hyacinthi: siue ex aureis, ut chrysolithi, et chrysopatii: siue ex misti coloris succis, ut opali. Hinc igitur colligi facillè potest, quòd cetera gemmarum genera, quæ perspicuitate carèt, è succis concreuant impuris, atris, et obscuris: quando nec aqua quidem limpidissima, cui ater succus infusus sit, clara ac pura perspicui possit. Nutent tamè gemmæ non translucens propter insignè leuorem, qui lucis continuitatem, et densitatem parit. Quem quidè Leuorem aut sibi natura comparant, aut artificum mangonio consequuntur. Iisdem de causis marmora quoq̃ radiant. Porro lapides, et gemmæ pellucens nonnunquam coloris labem, aut uitium aliquod contrahunt: sepe enim aut umbræ, aut nubeculis, aut capillamentis, aut sale, aut plumbagine uitiantur. Quæ sanè omnia non alia ex causa proueniunt, quam ex coloris succi diuersitate: Gignitur quidem umbra, cum succi color aliqua parte obscurior fuerit: nubecula uerò ob partem albidioris coloris. At capillamentum, quo præsertim sapphirus inficitur; sal, quo opalus; plumbago, quo smaragdus, ex alieno prorsus colore sunt, non autem proprio gemmarum. Quæ etiam sibi gemmæ scabritiem induunt, cum ob succi diuersitatem partes inæqualiter coalescunt. His ergo rationibus nixus, nemo non audebit dicere atq̃ asserere, lapides omnes, ac saxa, quæ neq̃ nitent, neque pellucens, ex crassissimo succo, et terrena materia fieri. Differunt præterea lapides spissitudine, et raritate, leuitate et grauitate: itaq̃ ponderosis, ac compactis lapidibus pauci, et admodum occulti sunt meatus: raris uerò, ac leuibus contrà multi, et patentes. Quapropter dicendum esse reor, quòd rari, ac leues efficiantur lapides, ubi eorum humor cum terrâ non probè fuerit mistus: is siquidem à calore ficcatus locum, in quo confederat, uacuum relinquit, ut in tophis, et similibus conspicitur. Adem quoq̃ euenit, cum sponte flagrant montes, ut Aetna in Sicilia, et Vesuius in Campania Plinij tempore, ac etiam hac nostra etate. nam cum ibi magnis incendijs terra cremetur, eadem ratione ex ipsa fiunt meatuum pleni, cauernosi, et leuissimi pumices. Contrarium planè fieri constat, si humor undiq̃ in terram penetret, et illi optimè misceatur: is enim hoc modo lapides graues, compactos, ac duos generat. Quod autem lapides duri, uel molles fiant, partim materia in causa est, partim uerò id, quod materiam fingit, et format. Nam si fuerit materia tenax, et calor tantus, ut ex ipsa humorem exhaurire queat, uehementer constringitur; et in se cogitur, fitq̃ ex ea lapis densus, et durus. Sin lentioris parum admodum, aut nihil habuerit, et calor fuerit multus, aquam etiam si probè terræ permista sit, absunt, et resoluit; terram uerò comburit. quo fit, ut lapis adeò mollis fiat, et friabilis, ut facillè in puluerem redigatur. Obscurescunt ad hæc lapides frigore, utpote quod succum ualidissimè cogat, et constringat. Atq̃ ij lapides, qui ex huius

Lapidum di-  
 uersa discrimi-  
 na.

modi succis coactis concreuerint, in fornaces ardentes coniecti liquefcunt, fluuntq; ob conclafos humores. Qui uero igni admoti franguntur, & difiliunt, non quidem tantum humoris in fe continent, quantum priores, ut eo terrae partes cobiberi poffunt. Quos autem ex luto genuit calor, ignis terit in puluerem, propter terrenam ficcitatē. Ceterum qui ex succis pinguibus, & bituminofis conftant, accenfi non fecus ac ligna ardent. Cuius generis eft gagates lapis, quo Cimbri, & alij pleriq; Germaniae inferioris populi paffim lignorum uice, quorum inopiam habent, ad ignem utuntur. Verum enim uero non ob id tanta eft ignium uis, ut adamantem uincat: quandoquidem huius humor ignis calore fortior exiftit. Eandem etiam ob caufam amiantus non modo non comburitur igni, fed ne quide diffoluitur. Vterque enim etfi ficcus, cum tangitur, effe fentitur; tamen humorem immiffum obtinet, non aliter atq; metalla. Porro lapides, qui corpora erodunt, ut in Lycia inuenti, uel abfumunt, ut Afius, in quo corpora defunctorum condita abfumi tradunt, unde illi farcophagi nomen, ex materia admodum acri gignuntur, ut in fodinis quibusdam cadmia quaedam inuenitur, quae fofforibus ipsis manus erodit, & exulcerat. Poftremo nonnulli lapides funt, qui ueluti praegnatæ lapillum, uel argillam, uel liquorem in utero gerunt. Cuius rei caufa eft & materiae diuerfitas, & quod eadem magna ex parte figuram globofam referat, aut quam proximè accedat. Materiae enim pars interior ab exteriorē differeens, aut calore cocta mox diuiditur, aut aliquo poft temporis fpatio feperatur, non fecus ac arefae nuci auellane nucleus a putamine. Quod fi fuerit fuccus, uel lutum tenax, ipfa etiam pars interior in lapidem cogitur, ut in aëte uifitur: fi uero lutum non tenax, uertitur in terram plerunque argillaceam, ut cernere licet in gæde: fin fuccus tenuis, uel aqua, liquor interdum remanet, ut in enhydro, in quo ad motum fluctuat intus, ueluti in ouis liquor, ut inquit Plinius. Ceterum cocleas in faxis repertas, calor conclufus, ex materia pingui, & lenta efficere uidetur, & ex eadem gignere mufculos, & conchyliā: fed terra quantum eft craffior, quam mare, tanto ea magis imperfecta gignit. Nec mirum cūpian effe debet, quod eiuſmodi conchyliā in lapidum medio orta, ibi diutius conclufa, ipsis cedente lapide, crefcant & uiuant. Siquidem ego certò teſtari poſſum, me uidiffe non longè à Timaſo fonte prope Diuina caſtrum in Adriatici litore ſitum, ubi maris alluit unda, lapides à ſocijs malleis ferreis frangi, atq; in illis plurima reperi conchyliā, quae dactylos à forma, & colore uocant: funt enim palmarum caryotis ſimilia. Haec eadem me diu quando comediffe memini in caſtro Goritiae in opiparis menſis illuſtris, ac clari comitis Franciſci à Turri noſtrorum ſtudioꝝ (quae eius eſt ſingularis humanitas) fautoris, promotorisq; maximi: quae ſcie non minorem quam oſtea, in cibis gratiam habere comperi. In ipſo quoq; Diuini caſtro iſdem uelci mihi contigit apud magnificum Matthiam Hoſſerium, uirum ſanè nobilitate & moribus uſignem. Neq; me fugit, his nuper elapſis annis uirum magnificum atq; praeclarum Didacum Mendozium Hiſpanum, lapideas quaſi tabellas mihi oſtendiſſe ex Veronenſi agro (ut aſſerebat) delatas, quae in longum ſeiſſe uarios intus piſces ueluti uſculptos habebant, cum omnibus ſuis particulis quamuis minimis, in lapidem uerſos. Tot tanq; admirabilia ſunt opera naturae. Verum quandoquidem Dioſcorides in hoc quinto libro ſcripſit tractauitq; etiānum de uarijs terrarum generibus, quae in medicum uſum ueniunt, non alienum fore iudico, quod de his quoq; uniuerſim aliquid differamus. Terram itaque aut ſimplicem, aut compoſitam eſſe oportet. Simplicem nunc eam intelligo, quae cum nulla re ſoſili, neq; cum aliquo liquido ſucco fuerit permixta: non autem eam, quae à cæteris elementis ſit penitus munda. quippe ob continuam elementoriam miſtionem uix ullam reperi poſſe putauerim, quae nonnihil aquae, aëris, uel ignis, non complectatur. Quamobrem eam ſimplicem dixerim, quae nullam prorſus aluminis, aut ſalis, aut nitri, aut chalcantibi, aut bituminis, aut cuiuſuis alterius rei metallicae miſtionem admiſerit. Contra compoſitam appellauerim, quae unum, uel plura ex his in ſe receperit. Simplex autem terra, de qua nunc ſermonem habemus, modò grauis, modò leuis conſtat, pro maiori, aut minori elementoriam miſtione, quae illi in eſt. quis enim dubitet, quin ea ſit leuior, ac rarior, quae plus aëris, aut ignis participat, quam aquae. Ad haec terra ipſa per ſe omnis exicat, ſed uarias ſortitur facultates pro uaria eorum, quae ei admiſcentur, qualitate. Nam illa, in qua ſit aqua frigida, adſtringit: quae ignem accepit, acris eſt: quae aërem, glutinoſa, & leuis: quae aërem & ignē, lenis, & acris. Illa uero, quae ſibi ſulphur adiunxit, aut alumen, aut chalcantibum, aut metallum aliquod uel ſoſilem ſuccum, facile quidem guſtu, ac etiam olfactu cognoſci poſſeſt. Nec de his plura dicenda ſunt. quod mihi plane perſuadeam huiusmodi qualitates nulli non cognitu faciles futuras, guſtu duntaxat iudice, qui tamen dulcia ab amaris, acris ab acidis, ſalfa ab inſipidis, acerbā à maturis, diſcernere ſciat. Terrae autem, quarum in medicina eſt uſus, ſua mutantur nomina partim à locis, ubi effoduntur, & aſportantur: partim à coloribus, quibus inſciuntur: partim à ſacultatibus proprijs. A locis enim denominantur Lemnia, quod ex Lemno inſula deſertur, Samia quod ex Samo, Chia quod ex Chio, Cimolia quod ex Cimo, Eretria quod ex Eretria Eubae ciuitate, & Prugitis quod ex Prugite Libyae pago. A colore appellationem trahunt rubrica, & aliae nonnullae. A facultate deniq; nomen accepit ampeſitis, quod eius ſit uſus ad uilinendas uites ſub germinationis tempus aduerſus erucarum iniurias. Et ut aliorum quoque ſoſilium colores percurramus, colore albo conſtant, creta, qua ſarcinatores utuntur, gypſum, alumen, amiantus, Arabicus lapis, Iudaicus, melitites, galactites, alabaſtꝛites, cryſtallus, argentum, argentum uiuum, ſtagnum, et ſinceriffimum marmor. Colore cinereo produntur melia terra, & Eretria altera. Cæruleo uero colore ſpectantur ſapphirus, cyanus, & lapis proprie cæruleus dictus. Virent ſmaragdus, praſius, chryſocolla, & chalcantibum. Elauo luteoſue colore ſunt aurum, ochra, chryſopatiſ, chryſolithus, & auripigmentum. Rubeo tinguntur ruboni, granati, ſandaracha, corallum, hematites, ſciſilis lapis, minium, cinnabaris, rubrica, & Lemnia terra. Quedam colore purpureo fulgent, ut hyacinthus, & amethyſtus. Alia cæruleo diluto uiſuntur, quemadmodum iſpis, quem boream dicunt. Nonnulla cæruleo uireſcente, ut erugo, & Armenius lapis. Alia albo ruſcente, ut apꝛodiffa. Quedam rufo candicante, ut xanthos. Quedam nigro ruſcente, ut tertia batrachitis ſpecies. Aliqua atro purpureaſcente, ut alabandicus lapis. Alia aureo candicāte, ut topatiſ. Sed plura ſeparatos colores habent, ut nigro albo, & quicunq;

Terrarū bre-  
uis enarratio.

et quous uersicolore, ut achates. Apliction uero nigran rubentes uenae distinguunt. Contra nasomones, cian sit sanguinis colore, nigris uenis decoratur. Venae autem, quae speciem prae se ferunt sanguinis intertextae, quodammodo sunt beliotropijs, corpore porracei coloris. At in caeruleo sapphiro aurea puncta collucunt. Quinetiam quaedam sunt, quae tres separatos habent colores: nam per album aegyptiellae corpus duae uenae permeant, altera nigra, altera rubra. Porro eupetalos, et orca quatuor habent colores: eupetalos enim caeruleum, igneum, minij, mali: orca uero nigrum, fulvum, uiridem, candidum. Versicolores postremo nonnullae habentur, non aliter, ac collum gallinae Numidicae, uel paxonis, aut columbae in sole apricantis, ut cristalis, et pederotum genera: ea enim ad inclinationem colores permutant. Ceterum sciendum est, quod ex fossilibus, quae in medendi usum recipiuntur, alia quidem corpora sanant, alia uero eadem affligunt, in cibis uel potionibus data: At quae remedia corpori sunt, medentur ei partim proprietate totius substantiae, partim qualitate aliqua, qua profligantur morbi. Quae autem proprietate ualent, earum quaedam resistunt uenenis, quaedam morbos sanant. Quibus natura dedit vires superandi uenena, eorum alia corpora, quae pestilentia sunt affecta, curant, ut smaragdus, sigillum Lemnium, gleba Armenia. Alia singulari ueneno medentur, sicuti scorpionum ictibus sapphirus potus, sulphur plagae illitum: fungis strangulantibus nitrum potum, ac pariter atramentum sutorum. Alia pluribus aduersantur uenenis, ut sal morsibus uiperarum, cerastis, ac crocodili. his enim emplastri modo imponitur: sed potum opio, et fungis praesidio est. Quibus uero fossilibus comparatum est, ut morbos proprietate fugent, eorum quaedam sanguinis profluvium sistunt, ut hieracites. alia os uentriculi gestatu et appositu roborant, uelut iaspis. alia sinistro mulieris brachio adalligata abortum prohibent, ut aetites. alia item ad femora pregnantis alligata partum accelerant, ut idem aetites, et iaspis. Sunt quae crassa e corporibus deiiciunt, ut magnes: alia atram bilem, ut Armenius, et caeruleus lapis: nonnulla uomitu faciunt, ut idem Armenius lapis, chrysocolle, et chalcanthum. Sed inter ea, quae elementaribus qualitatibus agunt, calefaciunt alumen, chalcanthum, chalcitis, misy, sory, melanteria. refrigerant terra Bretria, molibdoidea, stibium, argenti spuma, cerussa. Quae autem secundis qualitatibus operantur, quaedam molliunt quae dura sunt, ut gagates: quaedam contra indurant quae mollia sunt, ut lapis plumbarius, et stimmi. Sunt et quae insensibiles ferre poros aperiant, et quae claudant: aperit enim nitrum, spuma nitri: claudit terra Samia, et in summa omnis terra glutinosa. Alia, quae corpori coierunt, nempe glandulas, et nodos, discutunt, ut pyrites, molaris, bitumen. Aliqua cicatricem inducunt, ut chalcitis, misy, alumen scissum. Nonnulla carnem excrecentem minuunt, ut asij lapidis flos, aerugo, chalcanthum, chalcitis, misy, calx uiua, auripigmentum, sandaracha, chrysocolle. Non desunt etiam, quae diuersis uiribus praedita sint, ut cimolia, et sal: cimolia enim et reprimat, et discutit: sal abstergit, et adstringit. Sunt denique quae vires easdem habeant, ita ut deficiente una, altera eius locum suppleat. Siquidem chrysocolle, et lapis Armenius eundem effectum praebent: auripigmentum, et sandaracha: hematites, et schistos: atque haec quinq; chalcanthum, misy, chalcitis, sory, melanteria inter se uiribus consentiunt. Veruntamen ex his chrysocolle uim efficacior em obtinet, quam lapis Armenius: auripigmentum, quam sandaracha: hematites, quam schistos: chalcanthum, quam reliqua sibi cognata. Ceterum non pauca reperiuntur fossilia medicamenta (ut fusijs libro sexto dicitur) quae in cibo, aut potu frequentius, aut copiosius sumpta, uel maxime sumentes affligunt, uel ipsi mortem inferunt. Idque efficiunt, uel quod uiscera erodant, ueluti sandaracha, et auripigmentum: uel quod spirandi organa occludant, ut gypsum, et cerussa. Sed haec de fossilium facultatibus. Nam de concretis succis, cuiusmodi est sal, nitrum, alumen, chalcanthum, et cetera, quae cum eo cognitionem habent, sulphur, sandaracha, auripigmentum, chrysocolle, et alia nonnulla, in huius libri processu suis locis latius tractabimus.


Fossilium facultates.

### VITIS VINIFERA.

pigmentum, et sandaracha: hematites, et schistos: atque haec quinq; chalcanthum, misy, chalcitis, sory, melanteria inter se uiribus consentiunt. Veruntamen ex his chrysocolle uim efficacior em obtinet, quam lapis Armenius: auripigmentum, quam sandaracha: hematites, quam schistos: chalcanthum, quam reliqua sibi cognata. Ceterum non pauca reperiuntur fossilia medicamenta (ut fusijs libro sexto dicitur) quae in cibo, aut potu frequentius, aut copiosius sumpta, uel maxime sumentes affligunt, uel ipsi mortem inferunt. Idque efficiunt, uel quod uiscera erodant, ueluti sandaracha, et auripigmentum: uel quod spirandi organa occludant, ut gypsum, et cerussa. Sed haec de fossilium facultatibus. Nam de concretis succis, cuiusmodi est sal, nitrum, alumen, chalcanthum, et cetera, quae cum eo cognitionem habent, sulphur, sandaracha, auripigmentum, chrysocolle, et alia nonnulla, in huius libri processu suis locis latius tractabimus.

### VITIS VINIFERA. CAP. I.

Folia uitium, et triti capreoli, capitis dolores illitu mitigant: et inflammationem stomachi, ardoremque cum polenta. Folia etiam per se, ut quae refrigerent, et adstringant, imponi solent. Potus eorum succus, dysentericis, sanguinem excreantibus, stomachicis, et grauidarum malaciae medetur. Eadem efficiunt madefacti in aqua capreoli, et poti. Lacryma uitium, quae ueluti gummi in candidibus concreuit, ex uino pota calculos pellit: illita lichenas, et psoras, leprasque, nitro prius perfrictas, sanat: eadem cum oleo sapius pilis illitis, psilothri effectum habet: maximeque sanies, quam accensa farmenta uitium uitium



dia exudarunt: qua & perunctæ uerrucarum informicationes extrahuntur. Cinis sarmentorum, & uinaceorum, detractis in sede condylomatis, & thymijs, illitus ex aceto medetur: prodest luxatis, & uiperarum moribus; contra lienis inflammationem illinitur cum rosaceo, & ruta, & aceto.

Ἀμπέλως ἀγρία. LABRVSCA. CAP. II.

LABRVSCA duorum generum est. Alterius uua non maturefcit, sed florétenuis ornathan nominatam perducit. Altera ad frugem peruenit, paruis acinis, nigra, & adstringens. Folia, caules, & clauiculæ, quibus repunt, uim habent cultæ uiti similem.

Σταφυλή. VVA. CAP. III.

VVAE recentes aluum turbant, & stomachum inflant. innocentiores, quæ decerpitæ diu pendere, ideo quod in eis copia humoris exiccatur, utilesque fiunt stomacho, ægrisque, atque cibi auditatem excitant. In uinaceis, & ollis seruatz, ori & stomacho gratæ sunt, aluum sistunt, sed uesicam, & caput tentant: & sanguinem excreantibus conueniunt. Similesque, quæ in musto fuerunt. Sapa, aut passo conditæ, stomachum magis infestant. At quæ solem prius passæ, in aqua celesti conduntur, minus uinosæ sunt, siticulosis, ardentibus, & longis febribus salubres. Reconditi uinacei inflammatis mammis, rigentibus, ac præduris, cum sale illinuntur. Decoctura eorum dysentericos, cœliacos, & scæminas fluxione vuluæ laborantes iuuat infusa: ad defensiones, & foris assumitur. Nuclei acinorum adstringendi uim obtinent: stomacho utiles sunt. Inspargitur farina tostorum, polentæ modo, dysentericis, & cœliacis, & solutis stomacho.

Vitis uinifera, uuaq; consideratio.

VITIVM omnium genera, quæ non modò gratissimas, dulcissimasq; uuas ad cibos proferunt; uerum etiam ex his uinum præcipuum humane uitæ bonum, suauissimumq; potum largiuntur, quot & qualia sint, hic scribere superuacuum esse puto. Quandoquidem earundem dulcedine humanum genus allectum, adeo eas sibi conciliauit, familiaresque reddidit, ut nullus tam clarus quàm obscurus, tam nobilis quàm ignobilis, tam deniq; urbanus quàm rusticus inueniatur, qui de uitium generibus, earumq; historia non possit aptè, atq; etiam distinctè loqui. Ut autem & uites ipsæ, & uinum à quorundam uermiculorum erodentium uindicerentur iniuria, illud omnino silentio inuoluendum non duximus, quod si, dum à sarmentis repurgantur, ac putantur, falx hirci sanguine oblinatur: uel ea ipsa prius cotem experta, castorei corio affricetur, nuper emissæ gemmæ (si tanta rei agrariæ authoribus fides adhibenda est) ab erucis minime erodi possunt: neque etiam emissæ iam folia, ab alijs quibusdam uermiculis conuolui. Præterea non ignorandum est, quod magna admodum iniuria uitibus infertur, atq; uuis maximum detrimentum, si brasica seratur inter uites. siquidem perneciale uni cum altera odium intercedit. Quod cum animaduertent rei medicæ scriptores, præcipuum ebrietatis antidotum in brasica collocarunt. Ea enim si cruda præsumatur (ut apud plerasq; nationes in coenæ initio capitata brasicam minutim rescissam, lactucæ & intubi loco in acetarijs recipi obseruauimus) ebrietatem futuram mirum in modum arcet, quemadmodum etiam post sumpta crapulam discuit. Quo fit, ut Germaniæ populi uino admodum addicti, semper suis mensis brasicam interponant, uel recentem, uel muria asseruatam. Ad Elephantinem (ut Theophrastus est author) itemq; circa Memphim, uites perpetua fronde uirent: tametsi annuas tantum proferant uuas. In Italia uerò uites habentur, Plinio insanæ appellatæ, quæ ter in anno florent, sed primas tantum maturant uuas. Uuas sine uinaceis quidam prouenire affirmant, si propaginum ima pars, quæ terra in scrobe obrui debet, ante plantationem adeo secetur in longum, ut medulla utrinq; eximatur, ac deinde cõiunctis partibus, & ulneo cortice circumuolutis, propagines ipse suis scrobibus implantentur. Sed ut iam uuis suas reddamus facultates, Vuæ (ut Galenus libro 11. de alimentorum facultatibus memoriæ prodidit) quemadmodum inter fructus autumnales principatum obtinent; ita fugacibus omnibus magis nutriunt, minimumq; prauis succi habent, præsertim cum exactam maturitatem fuerint adeptæ. Porro quod ipse nutriant, maximo argumento sunt ij, qui uinearum fructum custodiunt: quippe qui tunc temporis uuarum esu admodum pinguescant. Cæterum non omnes uno quidem modo nutriunt, quoniam quæ dulces existunt, cæteris succum habent calidiorem: ob id sunt siticulose, ac uentriculum inflant, & aluum subducunt. Contrarium efficiunt austeræ: siquidem & uentrem cobibent, pariam nutriunt, egregè concoquantur. Acerbæ autem uitari prorsus debent, utpote quæ uentriculo aduersentur. Vuæ eò laudabiliores, quod castiores fuerint, præsertim cum probè maturæ à uite decerpuntur. At pensiles, si prius maturæ sint, & dulces, cæteris minus uentriculum inflant, & aluum conuenienter emolliunt.

Vuarum facult. ex Gal.

Σταφίς. VVA PASSA. CAP. IIII.

VVA PASSA alba adstringentior est. Prodest esitata caro earum tussi, faucibus, renibus, ac uesicæ. Estur in dysenteria per se cum nucleis: & decocta in patinis cum melle, admista milij, ac hordei farina, & ouo, valet ad purgandum caput: eiusdem gratia cum pipere commanducatur. Testium inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum, & cumini farina. Fauos, epinyctidas, carbunculos, enatas in articulis putredines, & gangrænas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita



posita sanat. podagra conuenienter cum panacis succo illinuntur: mobiles vngues illita, cele-  
nius extrahit.

VVAS PASSAS, quarum ubique vulgaris et frequens est usus, omnibus notissimas esse arbitror. Verum-  
tamen non est, meo quidem iudicio, credendum, quod cum de Vuis passis mentionem faciunt Galenus, et ueteres alij,  
paruas illas tantum intelligant, quae hoc tempore ex quibusdam Aegaei insulis, ac Peloponneso Venetias conuehunc-  
tur, et in quibusdam etiam Italiae locis insolantur. Siquidem Galenus nulla magnitudinis, uel paruitatis habita ratio-  
ne, omnes in uniuersum uuas solis calore siccatas, passas appellat. Id quod ipse Galenus libro secundo de alimentor-  
um facultatibus ijs uerbis declarat. Porro quemadmodum passarum differentia, quae a colore sumitur, nihil ad pas-  
sorum facultatem confert, ita nec magnitudo: sola autem qualitas, quae gustui inest, differentia potest omnia. Ex  
his numerum Galeni uerbis satis colligi potest, ipsum omnis generis uuas, quae solis seruore flaccescunt, nullo prorsus  
discrimine passas appellasse, nempe Damasceas ceteris grandiores (xibium officinae uocant) ac pariter his conge-  
neres, quae e Smyrnis (ut aiunt) Cypro, et Creta comportantur. Praeterea loco citato idem Galenus ita scribit.  
Nonnulli autem, et recte sane, e dulcibus, grandibusque, quales sunt scybelitides, priusquam mandant, semina exi-  
munt. quae et ipse inueterate, cutim duram, crassamque habent, easque prius in aqua coguntur macerare: nam et se-  
men ipsum facilius sic eximitur. Aliae quaedam sunt his contrariae, solidae, et crassae, quae nullum prorsus semen ha-  
bent. Crescunt haec in Cilicia, colore subflauo. In Pamphylia autem scybeliticae, et colore nigrae: quae, ut dixi, sunt  
maxime. haec ille. Ceterum sciendum est, non omnes Vuas passas eiusdem esse facultatis. alia namque facultas inest  
dulcibus, alia austeris, alia uinaceis habentibus, alia non habentibus. Quae itaque uinaceis carent, uel quod ita natu-  
ra producantur, uel quod ij arte fuerint exempti, si dulces sint, adstringente facultate usqueadeo priuantur, ut etiam  
mistic leniant. quomobrem pectoris angustiae, tussi, exasperatis faucibus, et renum, uesicaeque uitis maxime conue-  
niant. Id quod plane confirmat Galenus libro septimo, et octauo de compositione medicamentorum secundum locos,  
ubi uuas passas sine uinaceis leniendo pectori, ac iecinorosis plurimum commendat. Contra uero facultate omnino  
adstringente censentur, quae cum suis uinaceis manduntur. Quod cum non ignoraret Dioscorides, Vvam passam cum  
nucleis in dysenteria edendam esse tradidit. Hinc itaque fit, ut maximo in errore uersari existimem medicos alioqui  
etatis nostrae celebres, qui alui deiciende gratia, Vvam passam paruum uulgarem, quae ex locis supra dictis in  
Italiam defertur, simul cum uinaceis deuorandam exhibent. quippe cum aluum fluidum facere in animo sit, eam po-  
tius cobibent, quam leniant: idque potissimum, ubi uuae passe temporis tractu succi partem amiserint. Quae re perspe-  
cta in hanc sententiam deducor, ut ad aluum emolliendam aptiores censeam Damasceas, Cyprias, ac Creticas (qui-  
bus tamen prius nuclei exempti sint, uel ea sumantur, quae sine nucleis nascuntur) quam quae minute passim in officii-  
nis inueniuntur. quandoquidem haec succi longe minus, quam corticis, et uinaceorum continent, nisi sint omnino re-  
centes, et diligenter asseruate. Quapropter si hoc tenui uuarum passarum genere uti quandoque cogimur ad emol-  
liendam aluum, eas eligi praestat, quae sine uinaceis proueniunt: uel si haec desint, suppleant illae, quae a nucleis fuerint  
expurgatae. tamen si Damasceas, et Creticas longe bonitate cedant: de quibus sane intellexisse Galenum, easque ad pe-  
ctoris uitia laudasse plane suspicamur. In quorum genere haec etiam tempestate sunt, quae semine carent, quemadmo-  
dum quae Galeni etate ex Cilicia conuehebantur. Illud porro animaduertendum est, quod ubi quis aluum bonam fa-  
cere contendit, non debet passis uti, quae gustui acerbiteratem, uel austeritatem relinquunt: sunt enim tales frigidae, ac  
terrestres. quibus utique facultatibus cobibent, adstringunt, et roborant, praesertim si cum uinaceis nucleis come-  
dantur. Vnde scite Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus, haec prodidit. Vuae passe cum alijs uuis ean-  
dem habent rationem, quam carica cum ficibus. Multae enim sunt dulces, acerbae autem omnino paucae: plurimae  
uero ex dulci, et austera qualitate sunt mistae. quanquam dulces nonnihil quoque austera qualitatibus habent: et au-  
sterae, dulcedinis. Ceterum ut dulces temperamento sunt calidiores, ita austerae frigidiores. Ad hoc austerae stomachum  
roborant, et uentrem constipant, et his multo magis acerbae: mediam autem quodammodo inter ipsas constitutio-  
nem dulces obtinent, ut quae nec stomachum dissoluant, nec aluum subducant. Dulcibus tamen, ut uis quaedam semper  
inest contemperandi, ita et mediocriter detergendi: quibus duabus facultatibus exiguae mordicationes, quae os uenis  
triculi infestant, obtundunt. Et libro VIII. capite VII. de compositione pharmacorum secundum locos, idem Galenus  
sic inquit. Vuae passa contemptilis uideri possit, ob familiarem eius usum. At uero hoc ipsum eam facit utiliore: nam  
cum familiaris nobis sit, in tantum adstringens est, quantum opus habet uiscus affectum. Habet autem et uim conco-  
ctoriam crudorum humorum, et uim coercendi maligna, fitque ipsa baud facile putredini obnoxia: et ultra haec se-  
cundum totam substantiam, uisceri ipsi, hoc est iecinori, familiaris est, et propria. Item libro de attenuante uictus ra-  
tione, sic habet. Vuae passe si non sint adstringentes, lieni quidem, et hepatis tumetibus non conducunt, thoracis ta-  
men, et pulmonis affectibus conducunt. De uuis autem passis, ut cibus sunt, locutus est ipse Galenus libro secundo  
de alimentorum facultatibus, his uerbis. Alimentum ex passis uuis tale qualitate in corpus distribuitur, qualis ipsarum  
natura fuerit, dulce ex dulcibus, austerrum ex austeris, mistum ex ijs, quae utriusque qualitatibus sunt participes.  
Quantitate uero copiosius ex pinguibus, ac dulcibus: parcius ex austeris, et macris. Quod si passarum pinguium,  
ac dulcium, a quibus semina fuerint exempta, parem molem cum pari uuarum mole contuleris, passas ualentius nu-  
trire deprehendes. Huiusmodi sane, ut minus quam carica subducant, abstergeantque, magis tamen quam ille stom-  
achum iuuant.

Vuae passe co-  
sideratio.

Medicorum  
error.

Vuae passe ui-  
res ex Gal.

OENANTHE vocatur vitis sylvestris fructus, cum floret. Recondi debet fictili non picato, collectaque substrato linteo, in umbra siccatur. Laudatissima in Syria, & Cilicia, & Phœnice.

Vis ei adstrictoria: quare pota stomacho, ac ciundæ vrinæ utilis. aluum sistit, ac sanguinis excretiones. Contra fastidia, & acorem stomachi, sicca, & illita efficax est. capitis doloribus tam viridis, quam sicca ex aceto, & rosaceo perfunditur: sanguinolenta vulnera cataplasmate, & incipientes ægilopas, oris ulcera, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo ab inflammatione vindicat. Pessis miscetur ad sistendum sanguinem: contra oculorum delacrymationem, & stomachi ardores cum polline polentæ, & vino illinitur. Cinis crematæ in testa candentibus prunis, facit ad oculorum medicamenta: reduuias, & pterygia, abscedentes gingiuas, cruentasque cum melle sanat.

Oenanthes cōsideratio.

Marcelli Vergilij lapsus.

in Marcelli Vergilij lapsus.

OENANTHEN non illius labruscæ modo florem esse, quæ uvas ad maturitatem non perducit; uerum etiam alterius, quæ fructum perficit, asserere non dubitamus. Nam etsi superius scripsit Dioscorides, labruscæ duorum generum esse, atque alterius uuam non maturescere, sed floretenus Oenanthem nominatam perducere; nihil tamen propterea prohibet, quin alterius quoque labruscæ florentis uua Oenanthæ pariter dici queat, cum non aliud ueteribus significet Oenanthæ, quam uitis flos. Quod in presenti capite ipse Dioscorides manifestè declarat: quippe qui tradat Oenanthem uocari uitis sylvestris fructum, cum floret, nullius facta generis distinctione. Quin et idem in sequentibus confirmat, ubi uini oenanthini meminit, è feracis sylvestris uitis floribus fieri scribens. Ex his itaq; abunde constare arbitror, nō tantum infructiferæ; sed etiam fructiferæ labruscæ florem Oenanthem uocari posse. Adde quod id quoque aperte testatur Galenus libro VIII. capite I. de compositione medicamentorum secundum locos, his uerbis. At uerò quemadmodum omphacium, sic etiam absinthij succo admisceo, quandoque etiam anbo, et tertium insuper hypocistidis, et quartum Oenanthæ. sic autem appello uitium sylvestrium germen uia cum floribus, ex quo succedentibus diebus uua fit. Plinius libro XII. capite XXVIII. Oenanthem uuam, non florem esse censet, sic inquit. Eodem et Oenanthæ pertinet. est autem uitis labruscæ uua. Colligitur cum flore, eam optime olet. hec Plinius. In cuius ultimis uerbis suspicor mendum subesse, et fortè rectius legendum esse, cum floret; non cum flore. Non enim uideo, quomodo quis inquam uuam cum flore colligere possit. Ceterum ne aliquis fortasse decipiatur, hic non diximus silentio dissimulandum esse lapsum Marcelli Vergilij, alioqui doctissimi interpretis, et commentatoris Dioscoridis. Is autem ex eius uerbis, quæ nunc subiiciam, magis innotescet. Monemus, inquit, scribere in VI. sue medicinæ Paulum Aeginetam plurimum quidem ex labruscæ Oenanthæ usum esse, quoniam egregiè adstringit, stomachicamque, et aluum maxime firmat. Verum tamen traditis his, idem statim subiicit. Dioscorides autem aliam describit Oenanthem contrarias huic uires habentem. ideoq; secundis, stillicidio uesicæ, et fellis suffusionibus eam mederi ait. Quorum nihil in capite hoc legitur, neque in scriptore hoc alibi legisse me memini, et nihilominus non negligenda Aeginetæ autoritas, et testimonium est. quem credere oportet uera, et quæ aliquando legisset, testari. hec Marcellus. In quibus sanè uerbis euidentissimè deprehenditur hallucinatus; uel potius eorum oblitus, quæ de Oenanthæ herba uiribus huic contrarijs prædita, memoriæ prodidit Dioscorides libro tertio. Neque solium huius, quam tamen Latinam fecerat, non meminisse uidetur; sed neque eorum quoque, quæ ibidem in sua commentatione doctè satis scripsit. Sed aliquando etiam bonus (ut aiunt) dormitat Homerus. Illud postremo addiderim, quod etiam domesticæ uitis flos Oenanthæ dicitur. Verum quia sylvestris uitis ui multo magis adstrictoria pollet; is per excellentiam Oenanthæ appellatur.

OMPHACIUM.

CAP. VI.

OMPHACIUM succus est acerbæ uuæ nondum maturescantis; è Thasia vite; aut Amintra. Oportet autem ante Canis ortum, expressam melliginem in rubro ære, linteo cooperto, insolare, usque dum cogatur: semperque quod ceruici uasis concretum hæsit, reliquo humori permiscere: noctu uerò à subdialibus locis in tectum referri, quandoquidem nocturni rores ipsum concresecere non sinunt. Eligendum est flauum, friabile, vehementer adstringens, & linguam mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Prodest contra tonsillas, uiam, ulcera oris, humida gingiuarum vitia, purulentas aures cum melle, aut passo: item ad fistulas, vetera ulcera, nomasque ex aceto. dysentericis, & mulieribus fluxione uulvæ laborantibus. clystere infunditur: oculorum claritati, & scabritæ, & erosionibus angulorum conuenit. Bibitur ad recentem sanguinis excreationem, etiam si rupta parte aliqua contingat: sed pauco, & a quatiore est utendum, valde siquidem exurit.

Omphacij cōsideratio.

OMPHACIUM ex omni immaturarum uuarum genere parat Italia, cum Thasijs, et Amintris careat uitis, è quibus ueteres suum Omphacium conficiebant, ad medicinæ duntaxat usum, id in sole cogentes, ubi uidelicet adstrictione opus erat. Quæ tamen parandi ratio hoc tempore ferè prorsus exoleuit. Sunt qui ut maiorem omphacio adstrictionem comparent, è sylvestrium uitium uuis illud expriment, non ad medicamenta tantum, sed etiam ad ciborum condimenta. Verum omphacium nostrum sole non cogitur, etsi pluribus diebus ipsum insolari dimittamus suis cum uinaculis

aceris in cado, crasso lineamine cooperto, donec excrementa subleuētur, sex uerò subsidat, & inclarescat succus. Si-  
quidem hac parandi ratione absque sale per annum incorruptum asseruatur tam ad ciborum, quàm ad medicamentor-  
um usum. Omphacium ( ut Galenus memorie prodidit libro 1111. simplicium medicamentorum ) calidis morbis o-  
mnibus magno iuuamento adhiberi potest. quippe cū id omnino acidum sit, perfecte etiā refrigerat, uniceq; ardo-  
ribus prodest, siue ori uentris impositum, siue totis hypochondrijs, siue cuilibet alijs, quod refrigerare uelimus.

Omphacij ui-  
res ex Gal.

## Οἶνον φησιν VINI NATURA. CAP. VII.

VINO uetere nerui læduntur, & reliqui sensus, quod tamen gustu suauius est: quare cau-  
10 dum ijs, qui intestinæ alicuius partis imbecillitatem sentiunt: attamen in secunda ualitudine pau-  
cum aqua dilutum, innoxie sumitur. Nouum inflat, ægrè coquitur, insomnia parit grauiā, & uri-  
nam ciet. Aetate medium utraque uitia fugit: quare ad uictus sanorum, ægrorumque usurpatur.  
Album, tenue, stomacho utile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum uerò crassum est, &  
concoctū difficile, carnem alit, & ebrietatem creat. Giluum, utpote quod medium est, medias in-  
ter utrunque uires habet. In secunda tamen, & sinistra ualitudine, cū primis laudatur album.  
Quin & uina sapore distant. siquidem dulce crassis partibus constat, & difficilior a corpore expi-  
rat: stomachum inflat, aluum & interanea ut multum turbat, sed minus inebriat: renibus, & uesi-  
cæ aptissimum. Austerum per urinam celerius transit: sed capita dolore tentat, & temulentiam gi-  
gnit. Acerbum ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum: aluum, & cæteras flu-  
20 xiones cohibet, minusque urinam expellit. Nouum neruos minus tentat. Vinum aqua marina fa-  
ctum stomacho aduersatur, sitim stimulat, neruos infestat, aluo aptum, à ualitudine se recolligen-  
tibus inutile. Passum, quod uis sole siccatis in area, aut in sarmento torrefactis exprimitur, Cre-  
ticū cognomine, aut pramnion, aut protropon: & sapa, quæ sit musto igni decocto, Græci sirion,  
aut hepsēma appellant: nigra quidem, & quæ dicuntur melampsithia, crassa sunt, & corpora mul-  
tum alunt: candidum tenuius: & heluola inter hæc mediā, medias sortiuntur uires. Omnia tamen  
adstringunt, & pulsus reuocant, faciunt aduersus uenena, quæ exulcerando necant, ex oleo pota,  
& uomitionibus reddita: contra cicutas, meconium, pharicum, toxica, & concretum in grumos  
lac: item contra renum, & uesicæ pruritus, rosiones, exulcerationesque. inflat tamen, & stoma-  
cho aduersatur. Priuatim, prodest melampsithium, si uenter rheumatismum sentiat, Album ma-  
30 gis cæteris emollit aluum. Gypso conditum neruis officit, caput aggrauat, & incendit, ac uesicæ  
aduersatur: contra uenena cæteris aptius. Picata, aut resinata excalfaciunt, concoquunt: sangui-  
nem excreantibus inimica. Quæ uerò aparachyta uocant, ut quæ admistam sapam recipiūt, caput  
implent, temulentiam gignunt, ægrius in halitum expirant, stomachum malè habent. Inter Ita-  
lica uina Falernum principem locum obtinet: quod inueteratum perquam facile coquitur, pulsus  
exuscitat, aluum adstringit, stomacho utile: sed uesicæ nocet, atq; ijs qui uisus hebetudinem sen-  
tiunt, & ad potus crebros minimè idoneum. Albana crassioribus constant partibus, dulcia: sto-  
machum inflant, uentrem emolliunt, sed concoctionem non æquè adiuuant, & neruosa minus in-  
festant: uetustate eadem austerum saporem concipiunt. Cecubum, cū sit dulce, est & Albano  
40 crassius: corpus, & colorem alit: ægrè tamen coquitur. Surrentinum ualde austerum est: quare  
intestinarum, & stomachi fluxiones cohibet, & cū tenue sit, caput minus tentat: inueteratum  
suauius redditur, & stomacho utile. Adrianum, & Mamertinum in Sicilia æquè crassis partibus  
gignuntur: modicè adstringunt, & ocysimè inueterantur, minusque ob suam tenuitatem neruos  
tentant. Parætypianum, quod ex Adriatico sinu defertur, odoratum, ac tenuius est: quare libera-  
liter epotum fallit, diu seruat ebrietatem, & soporem adfert. Istricum Parætypiano simile est, sed  
urinam uehementius pellit. Chium tamen antedictis mollius, & aptum potui est. bene alit, &  
minus inebriat, fluxiones cohibet, oculorum medicamentis utile. Lesbium facile membra subit,  
Chio leuius, & aluo idoneum. Ephesium eandem uim habet, quod Phygelites nominatur. Ve-  
rū Asianum è Tmolo monte, Mesogites appellatū, capitis dolores ciet, & neruos lædit. Coum  
uerò, & Clazomenium, quoniam multam sibi maris aquam uendicant, facile corrumpuntur: fla-  
50 tus mouent, aluum turbant, neruis officiunt. Vinum omne (ut reliqua in commune dicatur) me-  
rum, ac syncerum, & sua natura austerum, excalfacit, facile in membra distribuitur, stomachum  
adiuuat, appetentiam ciborum inuitat: uires alit, ac robur auget: somnum conciliat, & commen-  
dat colorem. Potum liberalius auxilio est contra assumptam cicutam, coriandrum, pharicum,  
ixiam, meconium, argenti spumam, taxum, aconita, fungosve: contra serpentium morsus, & om-  
nium ictus, quæ refrigerando necant, aut stomachum in uomitiones effundunt. Facit ad longas  
inflationes, rosionesque præcordiorum, ac distentiones, stomachi resolutionem, & si uenter, aut  
interanea rheumatismum sentiant. Conueniunt sudatoribus, & quibus corpus immodico sudo-  
re digeritur, maximè alba, uetera, & odorata. Quæ tamen uetustate dulcescunt, renibus, ac uesicæ  
accommodatiora redduntur: vulneribus, inflammationibusque in succida lana imponuntur: te-  
tra ulcera, & phagedænica, & fluxionibus obnoxia commodè perfunduntur. Quæ marinam non  
receperunt,

receperunt, austera, & alba, ad sanorum uictus usurpantur. In his præstant Italica, Falernum, Sur-  
rentinum, Cecubum, Signinum, & permulta Campaniæ, & Parætypianum ab Adriatico sinu, &  
Siculum, quod Mamertinum appellatur. Ex Græcis Chium, Lesbium, & Phygelites ex Ephe-  
so. Crassa uerò, & nigra stomacho negotium exhibent, inflationem pariunt, corpus augent. Te-  
nuia tamen, & austera stomacho profunt, & minus carnes alunt. Vetera ualde tenuia, & candida  
uehementius urinam ciunt, & dolores capitis mouent, neruosque largius pota tentant. In media  
ætate, ut à septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autem pro ætate, & tempore anni, &  
consuetudine, & qualitate uini definiatur. Non sitire, & modicè cibos prolui, optimum est præ-  
ceptum. Nocet ebrietas omnis, & maximè assidua: siquidem obsessos neruos quotidie remittit:  
largiorque potius acutorum morborum adfert initia. Mediocris tamen uinolentia aliquot diebus, 10  
maximè post aquæ potus, utilis: nanque modo quodam ex alto euocat, sensilesque expurgat ex-  
cretus, & per cæca corporis ducit spiracula. Sed aquam post uinolentiam bibere oportet: liqui-  
dem ualitudinis alicuius gratia factæ temulentiaæ remedium adfert frigida.

Vini faculta-  
tes uariæ pro  
modo vsus.

Cum profectò Vinum sit liquor omnium suauissimus, præcipuum humane uitæ bonum, ac præstantissimum sub-  
sidium, uitalium spirituum regenerator maximus, ac omnium corporis tum facultatum, tum functionum instigator  
optimus, cor letificet tueaturque summopere, nulli mirum esse debet, quòd plantam, quæ fructum fert, ex quo uinum  
exprimitur, uitæ, quasi uitam, appellauerint ueteres. Verum non ob id gaudeant, iubilentque ij, qui uino nimis indul-  
gent, quòd ego ipsum tot laudibus extulerim. quippe eum omne extremum ( ut in communi proverbio est ) sit uitio-  
sum, si uinum immoderatè, & plus quàm deceat, bibatur, periculosos atque horrendos ( ut mox dicetur ) procreat 20  
morbos. Aliàs si in eius usu temperantia adhibeatur, tum ad alendum, tum etiam ad roborandum corpus omnium ef-  
ficacissimum habetur. quandoquidem purissimum generat sanguinem, ocysimè in alimentum uertitur, concoctionem  
in quauis corporis parte adiuuat, animum addit, cerebrum purgat, intellectum excitat, cor exhilarat, spiritus uni-  
ficat, urinam ciat, flatum discutit, innatum calorem auget, conualescentes impinguat, cibi appetentiam inuat, san-  
guinem turbidum clarificat, obstructions aperit, alimentum in uniuersum corpus defert, colorem conciliat, & omne  
in corpore excrementosum deijcit. Sed si modus absit, & sine ratione, ac temperamento sumatur ingurgieturque  
( quòd facere solent ebriosi ) ex accidenti totum refrigerat corpus. neque enim secus nimio eius potu ( ut Galenus in-  
quit ) innatus corporis calor suffocatur, atque paruus ignis magna lignorum stue extinguitur. Præterea cerebro,  
spinali medulla, ac neruis inde exorientibus obest. hinc fit, ut principe hac parte affecta, temporis tractu maximi, et  
perniciosi concitentur morbi, nempe apoplexia, epilepsia, paralysis, tremor, stupor, ephialtes, catalepsis, con- 30  
uulsio, uertigo, articularum contractio, lethargus, phrenitis, destillatio, surditas, cecitas, & oris laborumque de-  
stentio. Quinetiam uinum intemperatè haustum, bonos corrumpit mores. nam quòd homines contentiosi, loquaces,  
effrenesque fiant, quòd furant, mentesque moueantur, quòd denique alee, libidini, ac rei uenereæ semper ferè indulgeat, ac  
nonnunquam homicidia committant, nulli uerius ascribendum est, quàm uino immodicè sumpto. Adde quòd memo-  
riam, dissipat, sensus omnes perturbat, assiduos morbos parit, & repentinas mortes adfert. ne singula persequar,  
quæ recensere longum esset, & audire molestum ijs, qui nimium uino dediti sunt. Ceterum Vinum magis senectuti,  
quàm reliquis ætatibus conuenit. id siquidem frigidam senum temperiem, talem annorum multitudine redditam, tem-  
perat, ac mulcet. Verum pueris, ac adolescentibus ad uigesimum annum usque minimè concedi debet, si Galeni sen-  
tentia subscribendum esse putamus, qui libro secundo de tuenda sanitate, nil aliud asserit uinum esse pueris, & adole-  
scentibus exhibitum, quàm ignem igni additum. Cauendum quoque est, ne in ardoribus ætatis uinum niue, aut gla- 40  
cie, aut gelidissima aqua perfrigeratum hauriatur, quòd cerebro, neruis, pectori, pulmone, uentriculo, intestinis,  
spleni, iecinori, renibus, uesciæ, utero, dentibusque maxime noceat. Quare admirari non licet, si tempore uinum arte  
frigefactum bibentes coli, & uentriculi cruciatibus afficit, item conuulsionibus, resolutionibus, apoplexia, spirandi  
difficultate, urinae suppressione, calculo, uiscerum obstructione, aqua intercute, ac pluribus alijs grauius, & per-  
niciosis morbis. Proinde scitisimè Galenus libro de cibis boni, & mali succi, hæc producit. Qui non exercentur  
summa ætate, cum uehementi calore urgentur, fontis aquam bibant; niuisque & uini refrigerati usum ualent. Hæc es-  
nim quamuis protinus nullam iuuenum corporibus sensibilem lesionem inferant; sensum tamen, occulteque crescente ni-  
tio, cum iam ætas progressu temporis inclinauerit, articulos, neruosque, et uiscera ijs morbis uexat, qui uel difficulter  
admodum, uel omnino tolli non possunt. Ad hæc in tuenda sanitate diligenter procurandum est, ut uinum, quod in  
potu alimenti gratia quotidie sumitur, sit mundum, purum, clarum, odoratum, & sapore iucundum: nanque cor- 50  
ruptum, turbidum, impurum, odore graui, & gustu ingrato, nō modò toti corpori noxam infert; sed etiam sanguinem  
corrumpit. Quapropter felicissimè suam tuentur sanitatem, qui regiones incolunt, in quibus optima uina proce-  
dunt. quemadmodum in Goritienfi comitatu, ubi sanè generosissima uina nascuntur, nimium Pucinum illud antiquis  
adeò celebratum, necnon Vipacum illi bonitate proximum. Hæc quidem parçè modestèque pota, ad tuendam sanitatem  
mirificè conferunt. Id quod ipse experientia in me facta comperi, atque etiam omnibus ingenuè testari possum:  
nam cum multis antè annis diuturnus uentriculi dolor malè me habuisset, quem totius corporis imbecillitas consecrata  
erat, ex Pucini, & Vipaci tantum usu, me pristinam meam sanitatem, & integrum robur adeptum esse certò scio.  
Ob id ergo mirandum non est, si Plinius magnis laudibus prædicauit Pucinum libro XIII. cap. VI. ubi ita scripsit  
reliquit. Liuiæ Augusta octuaginta duos annos uitæ Pucino retulit acceptos, non alio usa. Gignitur in sinu A-  
driatici maris, non procul à Tōnauo fonte, saxeo colle, maritimo afflatu, paucas coquente amphoras. Nec aliud  
apertum

apertius medicamentis indicatur. Hoc esse crediderim, quod Græci celebrantes miris laudibus pystanum appellauerunt ex Adriatico sinu. hæc Plinius. Cuius certe testimonio plane subscribunt rustici lapidæ incolæ: quippe cum ij uinis Pucino cognatis in quotidiano potu utantur, rarissime egrotant, & longævam admodum vitam traducunt, adeo ut pueri reperiantur, qui nonagesimum, & centesimum annum attingunt. Est autem uinum hoc tenue, clarum, lucidum, colore aureum, odoratum, gustuq; gratissimum. Potum ualenter excofacit, nisi dilutum fuerit, facileq; in uniuersum permeat corpus. Quamobrem (ut libro tertio simplicium medicamentorum scribit Galenus) tale natura uitam, non modo perfrigeratorum omnium, sed eorum etiam, qui aut ex oris uentriculi, aut cordis dolore animi deliquam patiuntur, præsentaneum fuerit remedium. Ex quibus facile colligi potest, felicissimos esse eos, qui in regionibus, quæ uina optima ferunt, oriuntur, si tamen modeste (ut fieri decet) eis utantur. Ceterum quæ uina in uniuersum quotidiano usui magis conueniant, hic longiori sermone commemorare superuacuum duximus, cum hoc à Dioscoride latius sit proditum, atque etiam de omnium uinorum uiribus diligentius scriptum, quàm ut plura à nobis referri debeant.

## Οἶνος ὀμφακίτης. VINVM OMPHACITES.

## CAP. VIII.

OMPHACITES nomine, peculiariter fit in Lesbo, siccata sole acri uia, paulò ante maturitatem decerpta, triduo aut quadriduo, donec racemi in rugas contrahantur: expressumque vinum cadis insolatur. Vim adstringendi habet, prodest dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantibus: item prægnantium malaciæ, & crudis. in pestilentia quoque sorptum auxiliari dicitur. Humismodi uina non nisi post multos annos bibi possunt.

20 τὸ ἐν Λέσβῳ οὐδὲν ἄλλο οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἄλλο  
ἢ τὸ οὐδὲν ἄλλο οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἄλλο

## LORA.

## CAP. IX.

LORA, quam deuterian, alij potimon appellant, fieri solet adiectis metretis tribus aquæ in vinacea, quibus triginta vini metretæ extractæ fuerint: calcatis vinaceis, expressoq; decocto ad tertias partes, & additis in singulos congios modi eius qui remansit, binis salis sextarijs, post hyemem transfunditur in vasa. Lora intra annum vtendum: etenim celeriter exolefcit. Conuenit ægris, quibus timemus noxam vini, coacti sæpe desiderijs eorum obtemperare: item à longa ualitudine se recolligentibus. Fit & vinum, quod adynamon vocant, loræ vires habens, hoc modo. Pares aquæ, & musti mensuræ coquuntur molli igne, donec absumatur aqua, quod ubi refrigerit, 30 elutriatum picato vase reconditur. Alij marinæ, & cœlestis aquæ, mellis, & musti pares miscent portiones, decapulant, & quadraginta diebus insolant. quo ad annum vtuntur ad omnia eadem.

LORA aliaratione Galeni etate, quàm Dioscoridis parabatur. Ille siquidem loram faciendi modum libro 11. de alimentorum facultatibus, ijs uerbis tradidit. Vinaceorum quoque dilutum Græci τεύχα uocitant. quod rursus ab Atticis δευτερίαν, à nostratibus σεμφυλίτης, id est, lora appellatur. Coniectis nanque in parua dolia uinaceis, tantum aquæ super affundunt, quoad omnia permadeant. Quod ubi satis factum uidetur, in dolij fundo foramen aperiunt, ut dilutum effluat, idq; pro uino bibunt. Perspicuum autem est, quod pro racemorum copia aquam affundunt, experientia docti: quò uidelicet neque aquosa admodum, neque meracà sit lora. Deinde rursus aliam aquam, parcior tamen priori, uinaceis affundunt, sic ut hoc quoque potioni sit attemperatum: quod quidam Atticæ proprietatis curiosi propriè δευτερίαν dici uolunt, non ueluti prius illud. Vtraque lora capiti dolorem adfert, nisi dilutior bibatur, sed prior magis caput ferit. Dos una huic potioni concessa est, nempe quod oculus per urinam reddatur: sed non pauca subest diuersitas ex uaria uinarum specie, & quibus uinacei sunt relictæ. Etenim si dulces fuerint, potus multo erit suauior, citiusq; per urinas excerneretur: sin uero acerbæ, & acide fuerint, insuauior longè, ac minus ciens urinas. Porro dilutum hoc ualentius uinosiusq; efficitur, cum uinaceus ad uer, aut ætatem fuerit asseruatus. Hyemis autem tempore si quis utatur, ut caput minus tentat, ita & per urinas minus expellitur. Hæc de lora Galenus.

Loræ parandæ ratio ex Galeno.

## Οἶνος ἐκ τῆς ἀγρίας σαφύλης. VINVM E LABRVSCA. CAP. X.

VINVM è syluestri uia nigrum, adstringit: prodest alui, & stomachi fluxionibus, & cæteris, quibus constrictione, & contractione opus est.

NON desunt in Hetruria, qui uinum è Labruscæ uitis exprimant, colore admodum nigro, idq; giluo admiscant, ut rubicundius reddatur. Utuntur eo rustici in alterius uini penuria. siquidem constat dulce simul, & austerum: uerum tractu temporis dulcedinem facile deperdit, sitq; tunc gustui omnino insuauis, adeo ut tantum medicamenti uicem expleat, ubi adstrictione sit opus.

## Οἶνος μελίτης. VINVM MELITITES.

## CAP. XI.

MELITITES datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt. nanque aluum leuiter emollit, vrinam ciet, stomachum expurgat. prodest articulario morbo, renum vitijs, imbecillo capiti,



lo capiti, & mulieribus abstemijs : odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat à mulso, quod fit è uino vetere, austero, & melle exiguo. Melitites autem adiecto ad quinque congios austeri musti mellis congio, & salis cyatho. Cortinis magnis, quò magis ad efferuescendum locus pateat, fieri oportet, sensim asperso sale : cùmque efferuere desierit, in alia vasa transfunditur.

Οἶνόμελι. MVLSVM.

CAP. XII

MVLSVM è vetere vino, austeroque, & bono melle factum, præfertur : minus enim inflat, & celeriter id genus in vsum uenit. Vetus, corpus alit. media ætate, aluo prodest, vrinam pellit : à summo cibo sumptum, nocet : & inter initia potum, implet : dein appetendi auiditatem reuocat. Fit mulsum duabus vini metretis, admista vna mellis. Aliqui, quò celerius præberi possit, mel cum vino coquunt, & ita transfundunt. Alij vtilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruentis vnum mellis adijciunt : & vbi ferbuerit, vase recondunt. dulce autem permanet.

Μελίτης. AQUA MVLSA. CAP. XIII

AQUA mulsa easdem, quas mulsum vires possidet. Cruda vitumur cùm moliri deiectionem, aut vomitionem incitare volumus : vt ijs, qui venena-hauserunt, ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elanguescentis pulsus, quos illi dixerè microphyctos, tussientibus, peripneumoniacis, & ijs, qui immodico sudore digeruntur. Iam paratum, condituumque, quod aliqui hydromeli propriò vocant, media ætate adynamo vino, aut loræ in recreandis viribus respondet, & similem vim adipiscitur. quare inflammationibus alicuius membri plusquam lora prodest. Inueterati tamen vsus damnatur inflammatis, aut constrictis : sed laboranti stomacho, aut cibum fastidienti, sudatoribusve conuenit. Fit duabus pluuiæ aquæ veteris ad vnam mellis partem additis, & insolatis. Alij fontanam aquam adijciunt, & ad tertias partes decoquunt, & ita recondunt. Nec desunt qui hydromeli appellant, quòd à melle elutis aqua; fauis confici ac seruari soleat : sed meracius confieri conuenit. aliqui id coquunt, Aegrotantibus noxium est, quoniam plurimum ceraginis sibi vendicat.

Aquæ mulse  
ratio facien-  
dæ varia.

ALIA sanè Aquæ mulse ratio conficiende est apud Mauritanæ familiæ authores, ab hac quæ hic à Dioscoride traditur. Inter Arabas namque Mesues de ea ita scribit. Aqua mulsa, ex antiquorum sententia, magnis utique viribus prædita est. Sitim etenim arceat : frigidis affectibus, præsertim cerebri, & neruorum, & articulorum, auxiliatur. Loco vini pota, humida extusientibus prodest : quin & pus, & lentam, crassamque; pituitam è pectore trahit. Intestina, uiscera, urinariorumque; meatus purgat, terget, ac lauat : quapropter subuenit coli doloribus, aluum subducit, & calculum gigni prohibet. Fit è libra laudatissimi mellis, non tamen ueteris, colore pallido, odore iucundo, sapore cum dulcedine modicè acri, cum aquæ fontanæ libris octo, in uase lapideo, uel fictili uitreato, lento igni decocta, despumataque, & demum linteo percolata. Verum si aqua hæc paulò post bibenda erit, aquatior fiat, & statim à sublata spuma percoletur. Nam quæ longa coctione iulapii consistentiam acquirit, diutius quidem seruari potest, sed ægrius penetrat in remotas corporis partes, facileque; in bilem uertitur, ob suam exuperantem dulcedinem. unde sitim accendit, nisi plurima affusa aqua dissoluatur, adeò ut aquæ ferè modo reddatur insipida. Variant autem mulse facultates pro diuersæ coctionis ratione. quippe quæ breui coquitur tempore, status in uentriculo parit, aluum magis mouet, & minus nutrit. quæ uerò longiori coquitur tempore, status discutit, magis nutrit, minusque; aluum stimulat. Sunt qui mulse aromata etiam addant, nempe gingiber, crocum, cinnamomum, macin, & id genus alia. Alij gallam moschatam officinis uocatam, & agallochium adijciunt. Fit præterea ex parte una mellis, & aquæ fontanæ partibus octo, fermenti ( alias feni græci ) in his dissoluti uncijis tribus, & propriè ad centum mulse libras. Quæ denique omnia, musti modo efferuescenda in ligneum cadum coniiciuntur, non tamen ad summum repletum, ne feruescens reflat. Vbi uerò deferbuerit obturato uase, asseruetur uini modo ad potandum. ueruntamen non bibatur, nisi tertio mense transacto. Huic mulse aromata quoque admisceri possunt linteolo inclusa, & adalligata in cadum demissa. hæc Mesues. Cuius ultimam mulse parandæ rationem, Germani Medonem uocant. qui tamen fermentum addunt, non ex cerealium genere aliquo paratum, sed ex uini musti recremento, & lupi salictarij floribus; quibus etiam utitur ad zythum conficiendum, quod Ceruisian appellant. Medonis plurimum bibunt Poloni, ac Lituani, quòd melis plurimum abundant.

Υδρὸς. AQUA. CAP. XIII

CAP. XIII

DE AQUA in vniuersum decernere, propter locorum proprietates, & peculiare naturas, cælum, & alia pleraque, difficile est. Magna tamen ex parte optima est dulcis, syncera, nullius omnino qualitatibus particeps, & quæ ne minimo quidem tempore in præcordijs commoratur. ad hæc quæ & facili uia fertur, & citra molestiam, nec inflationes creat, & minimè computrescit.

PAUCISSIMIS quidem uerbis de potabili in uniuersum aqua differuit Dioscorides, ita tamen ut nullam place notam prætermiserit ex his, quæ in optima aqua requiruntur. Quare si nobis esset ijs tantum faciendum satis, quæ rerum naturalium periti sunt, non operæ pretium existimarem, hoc in loco plura de aquis commemorare. Verion quæ hosce commentarios in studioforum, & imperitorum potissimum gratiam condimus; ideo non solum aquarum omnium, quæ in communem tam cibi, quam potus usum ueniunt, tum qualitates, tum facultates hic breuiter perstrin- gam; sed etiam earum, quæ sponte nascuntur, & sibi metallorum, cæterorumq; fossilium uarias uendicant facultates. In primis itaque illa aqua ad potandum laudatissima censetur, quæ clara, pellucida, tenuis, pura, frustillorum, & saporum omnium expers, leuissq; reperitur: necnon quæ igni adnota citò calefit, remota uerò ocyssimè frigescit, gustu uicundo: quæ denique celeriter præcordia pertransit, & sine ulla uentriculi molestia labitur, & secedit. Talis autem ea esse solet, cuius fons ad orientem solem erumpit, curritq; super lapides, aut arenam, aut purissimam terram: quæq; estate frigida, hyeme autem calida manat. Omnium tamen præstantissima est pluuialis, eaq; præsertim, quæ estate media pluit, silente cælo. Huic ferè illa respondet, quæ eodem tempore cum tonitruis descendit, tonitruosa proprie appellata. At ea, quæ maxima aeris, ac uentorum procella, terrifico tonitruum, fulgurum, & grandinis impetu, ex uelociter concitatis nubibus cælo demittitur (ut in commentario libri sexti epidemiorum scribit Galenus) in humane uitæ usum admitti non debet. Porro aqua cisternarum non tot sanè laudibus commendanda uidetur, licet à quam plurimis medicis laudetur. Siquidem non modò noxia existit, quòd miscella quædam sit diuersarum aquarū, quæ in diuersis anni tēporibus inibi colliguntur ex pluuiâ, tum ex grandine, et niuibus hyemali tempore in tectis colligatis; sed etiam quòd aquæ omnes stationariæ putrefactioni facili sint obnoxie. Quo fit, ut aqua in cisternis collecta (si rem rectè expendamus) syncera pluuiali minime sit comparanda. Dicendum igitur erit, aquam sic asseruatam eò pluuiali sincera deteriore esse, quò magis fuerit niuium, & grandinum liquationibus commista. Quandoquidem (ut in libro de bonitate aquæ scribit Galenus) quæ à niuib; & glacie colliquescit, concoctionem impedit, urinam cohibet: pe- ctus, pulmonem, ac uentriculum malè habet: conuulsiones, laterum dolores, & flatus generat. Quod alia de causa non euenit, quam quòd cùm in glaciem, uel niuem concreuit, omne, quod tenue inerat, deperdit. Putialis præterea grauis quidem est, ægreq; conficitur; nec statui quidem potest, quòd sit putredinis omnis expers: ueruntamen tantò minus fuerit damnanda, quantò frequentius hauritur, uel si è subterraneo fonte scaturiat. Sequuntur lacustres, & palustres, quæ omnino sunt improbandæ, nisi coctæ, uel igne destillatæ fuerint. Fluuiatilis deinde probatur, uel im- probatur, pro concurrentiam aquarum, & rerum iniectionum qualitate, quemadmodum ijs omnibus euenit fluminibus, quæ magnas perluiunt ciuitates. Nam quibus animalia putrefacta, excrementa, & urbium sordes inesse sentiun- tur, eæ ab alimentorum usu abdicandæ sunt, nisi longo temporis tractu magnis fictilibus asseruatæ, ac defecatæ cla- rescant, & prorsus expurgentur. ut Romani faciunt cum sui Tiberis aqua, quæ præ cæteris hac facultate pollet, ut clara facta, ad centum, & plures annos perduret incorrupta. Ad hæc noxiæ sunt, quæ plurimam terræ mitionem consequuntur, quòd non modò uiscera obstruant; sed & calculos in renibus, & uesica procreent. Cæterum aquæ, quæ lapideum admittunt succum, de quo satis diximus in prima huius libri commentatione, prorsus uitandæ sunt, ut quæ potantes strangulare possint, eo sanè modo, quo epotum gypsum. quippe hæc arterias obstruentes spirituum trans- fectum intercipiunt: quin & alimentum in corpus deferri prohibent. Quocirca huiusmodi aquæ potabiles non sunt, neq; in ciborum coquendorum usum recipiendæ. Quemadmodum nec illæ sanis probantur, quæ sal, nitrum, chalcant- hum, alumen, & alia id genus concreti succi continent. quanquam omnes in medicinæ usum ueniunt. Nam quòd o- mnes prædictis excalfacientibus medicamentis refertæ sint, frigidis, & humidis morbis laborantibus utilissimè exhibe- bentur: ijs uerò noxiæ sunt, qui à biliosis uel acerbis proueniunt humoribus. Salsæ, si bibantur, pituitam eiiciunt, sanguinem in uentriculo concretum dissoluunt, aquam intercutem exiccant, & obesa corpora extenuant. Sed his consumptis potantes siticulosos reddunt, uentriculum ledunt, intestina abrasunt, & scabiem, & pruritum excitat, utpote quæ non obscure sanguinem acuant, & sua salsedine adurant. Clysteribus infusæ pituitam attenuant, & de- trahunt, & ex ea prognatos dolores mirifice tollunt. Factis ex ea balneis aquæ cutem subeuntes resoluuntur, si no- uus fuerit morbus: frigidi neruorum dolores mulcentur, pectoris fluxiones cohibentur, excalsitq; uentriculus frigidi- tati obnoxius, & humiditate languescens: quin & pituitosa scabies curatur. Tollitur quoq; uapore ex ijs calentibus accepto, tum capitis grauitas, tum aurium cruciatus: fetu uerò frigidi tumores, & totius corporis sugillata delentur. Nitrosæ, si bibantur, corpus perturbant, pituitam deiiciunt, scæminas prolificas reddunt, & strumas absiumunt. A' salis hæc facultatibus non disident, præterquam quòd in omnibus illis ualentiores sunt, nō adeo tamen adstringunt, sed ualenter abstergunt. quare & scabiosos mundant, & aurium ulceribus medentur, incertosq; earum sonos, atq; tumores discutiant. Aluminosæ admodum adstringunt. proinde mirum non est, si uentriculum robovent, qui crebris uomitionibus imbecillus efficiatur. Vteri fluxiones cohibent, abortum prohibent, & in his præsertim scæminis, quæ ante fœtus maturitatem plerunq; abortiri consueuerunt. uesicæ ulceribus medentur: & oris, gingiuarumq; infla- mationibus, si ex eis frequens collutio fiat. Gargarizatu non modò destillationes ad fauces inbibent, sed etiam conflu- xos resoluunt humores. Idem præstat balneum ex ijs paratum: confert enim magno iuuamento exterioribus totius corporis exulceratis particulis, ijsq; præsertim, quæ defluxionibus tentantur. Cruentis item exputionibus subuenit, quam procidentem reprimit, & sudorem superfluum cohibet. Nocet tamen tam in potu, quam balneo, ijs qui uiscer- rum infarctu laborantes in febres facile incidere possunt. Porro aquæ, quibus chalcantimum, aut misy, aut fory, aut melantheria immiscetur, cùm omnia eadem facultate consent, aluminosis sanè persimiles sunt: ueruntamen hæc ualen- tius suum obeunt munus, nempe quòd præter adstrictoriam facultatem, succum etiam admodum acrem obtineant. quamobrem serpētib; ulceribus, ac phagedenis opitulantur. Sulphureosæ excalfaciunt, ac efficaciter neruos emol- liunt.

liunt. proinde resolutis, conuulsis, tremulis, stupidis, contractisq; peridonea inueniuntur. Eadem compaginum tumores discutunt, & dolores mitigant: nam ubi quissiam coxendicum dolore, aut podagra, uel chiragra uexetur, sulphurea aqua balneo magnopere iuuatur. Præstant præterea ad iccinoris, lienis, ac uteri dolores, atque tumores in ijs genitos mirificè resoluunt: uentriculū tamen laxant, & infirmant. Bituminosa, etsi potest internis quibusdam morbis conueniant, & balneis adhibita aliquo temporis tractu neruos emolliant, ac excalfaciant; attamen caput replet, sensus hebetudine afficiunt, præsertimq; oculos. Quæ autem Armenij, aut cærulei lapidis, aut æruginis, aut chrysolæ aliquid admistum habent, si bibantur, uomitiones concitant, ablutionibus uero phagedænica ulcera sistunt. Quæ præterea auripigmentum, aut sandaracham continent, pectus dilatant, asthmaticis, & suspensiosis prosunt, & omnibus frigidis in uniuersum morbis opem ferunt, quibus respirandi facultas impeditur. Aereæ oris, et genitalium membrorum ulcera sanant: quin & faucium, & oculorum destillationibus auxiliantur. Quæ deniq; ferræ sunt, uentriculi, lienisq; uitij, seminis profluuium, & mensstruis albis utiliter adhibentur. Et ut rem hanc summam cōplectamur, aqua omnis, cui quoduis fōsile medicamentum admisceatur, eandem facultatem præbet, quam quod illi admiscetur. Quæ nimirum ratione ducor, ut superuacuum putem, reliqua sigillatim prosequi, ut taceam id nimis longū futurum.

Ἐλασσόμηλον

Υἷδαρ θαλάττης.

AQUA MARINA.

CAP. XV.

AQUA maris calida est, & acris. stomacho aduersatur, aluum enim conturbat: pituitam expellit. Si uero calida ad fots adhibeatur, elicit, & discutit: neruorum uitij, & permionibus, ante vlcera prodest. Miscetur cataplasmatibus ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus magmatibus. Ad mouendas deiectiones tepescita infunditur, & ad tormina, calida. psoras, pruritus, impetigines, lendes, & mamas rigentes, foueri utile est: liuores fots discutit. ad venenatos ictus, qui tremorem, & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur: maximè scorpionum, phalangiorum, aspidumque: etiam si quis in calidam descendat, auxiliatur. & malo habitu cōfectis iandiu corporibus, neruisque, balneæ ex ea utiles. hydropicos, capitis dolores, aurium grauitates, feruentis uapor leuat. Syncera, & sine potabilis aquæ mistione reposita, uirus deponit. Sunt qui etiam præcoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per sese, aut ex posca, aut cum uino, aut melle: uerum post deiectionem dant gallinæ, aut piscium iuscula, ad domandam morfus acrimoniam.

Θαλασσόμηλον. THALASSOMELI.

CAP. XVI.

QYOD thalassomeli vocatur, vehementer purgare constat. Temperatur autem æquis portionibus maris, mellis, & imbris ex alto, defæcatis, & picato. vase per Canis æstus insolatis. Alij ad binas marinæ coctæ singulas mellis adijciunt, & vase condunt. huiusmodi moderatius est aqua marina, & mitius.

Ὄξος. ACETVM.

CAP. XVII.

ACETVM refrigerat, & adstringit. Stomacho utile, appetentiam excitat: erumpentem undecunque sanguinem, potu in se sūue sistit. prodest alui fluxionibus coctum cū cibis: cruentis uulneribus inditur: inflammationes arcet, in succidis lanis, aut spongia impositum: reprimat procidentia sedis, vuluæque: item abscedentes gingiuas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, lepras, impetigines, pterygia, cū aliquo conuenienti efficax est: phagedænas vlcerum, nomasque fots continuo cohibet: podagricis calido fots, cum sulphure auxiliatur: fugillationes rapit, cum melle illitum. Contra capitis ardores cum rosaceo in succidis uelleribus, aut spongia imponitur. Ad aquam inter cutem, grauitatem aurium, & sonitus, fibilosq; feruentis vapor proficit: instillatum quoq; aurium vermes necat. Panos coërcet tepidi fots, aut si imbuta aceto spongia admoueatur: pruritus permulcet. Contra venenatos serpentū ictus, qui refrigerando nocent, calidum commodè fouetur: & frigidum ijs, quæ exurens uirus ei aculantur. Calidum potum, atque uomitionibus redditum, aduersus omnia venena efficax est, præsertim contra meconium, & haustam cicutam, conglobatum in ventre sanguinem, lac coagulatū, fungos, ixiā, taxumq; cum sale. haustu voratas hirudines, si sorbeatur, eiicit: tussim ueterem mitigat, & recentem lacepsit. In orthopnœa calidum commodè sorbetur: gutturis fluxiones gargarizatum inhihet: anginis, & uux procidenti conuenit. contra dentium dolorē, calidū colluitur.

Aceti mistæ facultatis consideratio.

QV ANVIS Dioscorides simpliciter pronunciauerit Acetum esse frigidum, quod fortasse in eo magis frigiditas exuperet, quàm caliditas; tamen Galenus qualitatum medicamentorum omnium indagator maximus, ex contrariis qualitibus, calidis scilicet & frigidis, acetum constare docuit libro primo de simplicium medicamentorum facultatibus, nec esse homœomeres similarē, quemadmodum nec lac uniuersum. Id quod ipse Galenus lib. VII. de eorumdem facultatibus, apertissime confirmauit his uerbis. Acetum primo horum commentariorum mistæ esse substantiæ, nempe

nampe frigide, pariter et calide, eiusque utriusque tenuium partium demonstratum est: ceterum calidam frigidam exuperat. Porro magnam desiccandi facultatem obtinet, adeo ut sit tertij ordinis desiccantium iam completi, utique cion ualidum extiterit. Et libro primo de compositione pharmacorum secundum locos, idem sic inquit: Atqui Acetum ex incidentiam ordine existens; ultra hoc quod discutit, precipuum quiddam in se habet, quod reprimat, ac quod insinit, et repellit: utpote quod substantia sua parum calidum est, plurimum uero frigidum, et partium tenuium: Idem quoque libro simplicium medicamentorum, ita scribit. At frigiditas, quæ ab aceto proficiscitur, tanto est ualidior, quanto et tenuior. Inest uero illi et acrimonia quædam excelsa faciens, quæ tamen satis non sit ad superandam ab aciditate prouenientem frigiditatem: uerum quæ transitus modo celeritatem promoueat. nam quanto calidum frigidum facilius penetrat, tanto acris succus aptior est, qui sensibilibus corporum meatibus transeat, quam acidas. Itaque ille, uelut precedens uiam sternit, hic uero haud ita tardè insequitur, quo tempore sensus perficitur minus, et quæ egrè exponi queat, utpote quæ nec planè frigidum esse acetum denunciet, quippe cion in eo ignea quædam percipiatur acrimonia, nec planè calidum. Nam perpetuo, quæ ex precedente sit acrimonia, calefactionem frangit ab insequente aciditate occupans, obscurat, protinusque extinguit: quo fit, ut maior multo ex frigore percipiatur sensus, quam ex calore. Hæc ad litteram Galenus. Ex quibus abunde liquet, quod acetum etsi ex contrariis qualitatibus constat; plus tamen frigiditatis, quam caliditatis particeps est. Quod cum rectè animaduertisset Dioscorides, acetum simpliciter (ut supra diximus) refrigerare pronunciauit. Veruntamen illud ignorandum non est, quod acetum tam nimirum eo calidius erit, quo uetustius, et acrius extiterit. Siquidem ex Galeni sententia, libro xi. simplicium medicamentorum capite de adipe, item tertio de compositione pharmacorum secundum locos, uinum, mel, acetum, oleum, adeps, uetustate calidiora fiunt. Ex quo facili fieri potest, ut reperiatur acetum adeo uetustate acerrimum, ut plus habeat caliditatis, quam frigiditatis.

OXYMEL. ACETVM MVL SVM. CAP. XVIII.

ACETVM mulsum, quod oxymel uocant, hoc modo temperatur. Aceti heminas quinque, salinis marini pondo, mellis minas decem, aquæ sextarios quinque pariter coquito, decies effervescente cortina: atque ubi refrigerit, diffundito. Sumptum crassos humores extrahere, & ischiadicis, comitialibus, & articulorum morbo conflictatis prodesse creditur. Contra morsum eius viperæ, quam sepa vocant, haustum meconium, ixiâmve auxilio est. Anginis utiliter gargarizatur.

TRIPLICEM oxymelitis componendi rationem posteritatis memoria tradidit Galenus libro iiii. de sanitatē tuenda. qui tamen sal nulli commiscuit, ut eius uerba loco dicto aperte testantur, quæ ita sequuntur. Vni aceti parti, mellis a quo detracta spuma sit, duplum est miscendum: deinde ambo in leni igni coquenda, donec eorum qualitates in unum coierint: ita enim nec acetum amplius crudum apparebit. Cum aqua uero statim ita facies oxymeli: Melli quadruplum optimæ aquæ misceris: dein coques modico igni, quoad spumare desinat. Ac malum quidem mel multam egerit spumam. quo etiam diutius coqui debet. Optimum uero, ut brevissimo tempore coquitur, ita minimum spumæ euomit, unde nec parci coctione est opus. Plurimum certe quartam partem eius, quod ab initio est inditum, amittit: post uero dimidio aceti adiecto, rursus coquendum, donec qualitatibus omnino sit unitas, nec acetum crudum etiam appareat. Conficitur sanè oxymeli etiam tribus statim ab initio mistis; ad hunc modum. Aceti uni parti additur mellis duplum, et aquæ quadruplum: atque hæc ad tertiam partem coquantur, uel etiam quartam, spuma interrim detracta. Quod si ualentius id facere studes, tantundem iniicies aceti, quantum mellis. hætenus Galenus. Quem secutus Mesues, ipse quoque de oxymelite sic scripsit. Oxymeli sit ex aqua, aceto, et melle. Aqua uero miscetur, ut longa coctione resoluitur id, quod in oxymelite status excitat, ut etiam promptius despumetur, ut denique medicamenti huius facultas, aquæ mixtione tenuior facta, facilius in corpus distribuatur. Mel uero additur; ad oppugnandam pituitam: Ex melle denique, et aceto mistis, facultas quædam tertia, quæ neutri eorum, inest tanta consurgit, ut efficacissima sit, atque certissima, ad attenuandum, incidendum, resoluendumque crassa, lentaque excrementa, quæ in uentriculo, et iecore existunt longo tempore genita: quin et ea, quæ ad articulorum compagines defluerunt, et diuturnas procreant febres: ea nanque et incidit, et coquit. Fit ex aceti parte una, mellis partibus duabus, aquæ partibus quatuor. Primum autem mel, et aqua simul coquantur, ubi despumata probe sunt, addito aceto percoquantur, semper quoque despumando. Datur ab uncia una, ad uncias tres. Hæc ille.

Oxymelitis  
confectio tri-  
plex Galeno.

Oxymelitis  
confectio ex  
Mesue.

ACIDA MURIA. CAP. XIX.

ACIDA muria, quam Græci oxalmen uocant, contra nomas foru, putrida ulcera, canum morsus, & uenenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si statim calida in vulnus iniiciatur: & prociduum sedem reprimat. dysentericis, si nomas sentiant, infunditur: oportet autem ex lacte instillare. Hirudines sorbitione, aut gargarizatu necat. furfures, & manantia capitis ulcera exterget.

ACIDAE murie, quæ Græci oxalme appellatur, usus etate nostra prorsus exoleuit. Parabatur autem ueteribus illis ex sale, et aceto: uel ex muria, et aceto.

Θυμοξάλμη. THYMOXALME.

CAP. XX.

THYMOXALME ueteres utebantur, dabantque laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quaternosve cyathos, aqua calida dilutos: item in articularibus morbis, & inflationibus. Crassos humores, atrosque trahit. Hoc modo facitatur. Thymi triti acetabulum, salis idem modus, rutæ, pulegij, polentæ, singulorum exiguæ portiones in uas coniiciuntur, aquæ terni sextarij, & aceti terni cyathi infunduntur, & circumposito linteo sub dio madescunt.

Σκίλλινον ὄξος. SCILLINVM ACETVM.

CAP. XXI.

SCILLINVM acetum hoc modo fit. Scilla, quæ candida fuerit, expurgata conciditur, traiectaque lino segmenta modicis interuallis, ne se contingant, siccantur in umbra quadraginta diebus: mina eorum in aceti boni sextarios duodecim immergitur, & uase diligenter operto septenis diebus in sole madescit: post eum dierum numerum scilla eximitur, & expressa abijcitur: defecatum acetum transfunditur, & reponitur. Aliqui scillæ minam quinque aceti sextarijs miscent. Alij citra exiccationem repurgantes, parem mensuram adjiciunt, & senis mensibus macerari patiuntur. Id multo magis humorum lentitias digerit. Gingiuas humore prægnantes collutione stringit, firmatque, & motos dentes stabilis. putredines oris, & graues halitus tollit. durat fauces forbitione, & callosas facit: vocem expedit, & lymphidam, canoramque reddit. Datur stomachicis, ægrè cibum concoquentibus, melancholicis, comitialibus, uertiginosis, mente captis: item vuluarum strangulationibus, lienis incremento laborantibus, ischiadicisque. Imbecillos admodum recreat, corpus sanum reddit, & bonum colorem præstat: oculorum aciem exacuit: tarditatem quoque aurium infusione purgat. In summa ad omnia efficax. Cauendum tamen intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut neruorum uitijs. Datur quotidie ieiunis: forbendum inter initia exiguam, paulatim adaugendo, ad cyathum usque. Nonnulli binos dant cyathos, aut largius.

Scillini aceti  
uires mirabi-  
les.

Quoniam satis superque de Scillino aceto à Dioscoride dictum est; non tamen alienum fore existimo commemorare hoc in loco, quæ de comitis laudibus scripsit Galenus libro XII. de medicinis paratu facilibus, sic inquit. Salubre optimum acetum Scillinum à Pythagora scribitur, quo omnes Imperatores usi sunt. Ab ipsius auctore fertur, quicumque hoc utatur longæ uitæ fore, et eius extrema integras usque ad finem permansura. Et ipse quidem Samius senex huiusmodi exitit: quantum enim temporis uixerit, haud ignoras. de ipso in libro traditum est, quod cum suis consanguineis hanc facultatem communicauit: cionque hoc medicamento uti incepit, quinquagesimum annum natus erat, & usque ad centesimum decimum septimum uitam produxit integer, & nulla unquam aduersa ualitudine tentatus. Hæc sane medicamenti auctor disseruit, quod fortasse uir philosophus erat, mentiri nescius. Nos autem uiri huius fidei periculum fecimus, ac firmam, constantemque huiusce medicamenti facultatem esse testamur. Oportet igitur sciens Scillam montanæ libræ iunius ponderis, & dura circuncidere, & mollia minutatim concidere, & aceti acerrimi sextarios octo in uitreum uas mittere atque obturare, ac per triginta dies in Caniculae caloribus, ut maceretur, permittere: deinde scillam extractam exprimere. Id genus aceti parum mane sorbeto: Tibi autem hæc euenient, ut ne facies orisque partes unquam remollescant, os uentriculi bene ualebit, facile spiritum duces, uox recte habebit, oculi acutissime cernent, aures in officio manebunt, nullusque flatuosus uapor in uentre unquam excitabitur, nullum uiscus suspensum erit, & bene spirans, bene coloratus deges. Ad ciuilia negotia recte affectus, non acidum, non salum rusticibus, si aliquid aceti huius assumpseris: & ieiunus ut assumas præcipio, septemque postea stadios deambules. ita enim dissoluetur. Hoc aceto qui utitur, in uictu quauis licentiosus esto: omnia enim cibaria conficiet, & à nullo unquam offensam patietur, neque ualde implebitur, sed in melius proficere uidebitur. nihil superuacui in corpore residet, non flatus, non bilis, non sterqus, non urina, sed omnia facile excernit, atque educit. Alius lubrica omnino est, totiusque corporis purgatorium medicamentum, etiam si in osibus sordes inhaereant. Item phthisicos ab omnibus deploratos, hoc medicamento sanitati restitutos nouimus. Morbo comitali diuturno efficaciter proficit, ut nisi post longa temporis interualla, non redierit: incipientem uero ac nouum perfecte discutit, neque reuerti amplius hunc affectum permittit. Ad podagras præterea, & articularum morbos, iecoris, lienisque duritias uehementer facit. & particulares quidem aceti scillini effectus hi sunt. Communes autem quam plurimi, quibus nos commoti salutare hoc medicamentum, sanitatis, integritatisque causa, tibi tradidimus. Hæc ille, quicumque fuerit. nam liber is inter notios, & Galeno adscriptos recensetur.

Σκίλλινον οἶνος. SCILLINVM VINVM.

CAP. XXII.

SCILLINVM vinum fit hoc modo. Dissectam, uti dictum est, scillam, & sole siccata con- tundito: minam eius tenui cribro incernito, & linteo raro illigatam in uicenos sextarios musti recentis, ac boni demergito. ubi trimestri spatio maduerit, elutriatum uinum, obstructo diligenter uase, recondito. Licet quoque sic humida scilla uti. In orbiculos, rapi modo, dissectam duplicato pondere, quadraginta diebus insolari oportet, & ualde inueterascere. Alia parandi ratio. Scilla dissecta,



la dissecta, & repurgata tres minas in Italicam metretam musti demittito, & fenos menses in uase obstructo macerari finito. post id tempus defecatum, & excolatum uinum recodito. Vtile est contra cruditates, & ciborum corruptiones: item ijs, qui reuomunt cibum, & si pituita in uentre, aut stomacho coierit. Prodest lienosis, male habitis corporibus, aqua inter cutem, regio morbo, difficili urina, torminosis, inflationibus, resolutioni neruorum, horroribus longis, vertiginosis, & vullis. menses pellit: minimè neruos infestat. Hoc uinum vetustate fit melius. Capendus in febre usus, aut si interanea ulcus sentiant.

10 **SCILLINI** uini meminit Galenus libro tertio de medicamentis paratu facilibus, his uerbis. Vinum hoc potuitatem, omnem sanitatem adfert. humores enim attenuat, sed maxime pituitam, neque ipsam in stomacho, aut uentre, aut capite, aut iecore, aut liene, aut neruis, aut ossibus consistere permittit, neque alium id genus tenacem humorem obstructions facientem: sed omnia dissoluit, & uentrem lenit, atque ita subducit, & urinam mouet, & per ipsam causas attenuat, excernitq. Adeo uero caput purgat, ut nares humiditate uacent. Commodum est podagrae, articulari, & comitali morbo: denique omnis sanitatis est author. Ex his constat. Scillam albam, montanam circiter Canis exortum accipito in libræ pondere, per dies decem in umbra refrigera: deinde scilla laminas refrigeratas in vitreum uas mitte, & uini albi ueteris sextarios duodecim superinfunde, & suspensum uas per quadraginta dies habeto: postea scillam exime, & abijce, & uino ad antedicta uitia utere, & eius uim percipies. Subinde ante cibum uini duas uncias exhibe: sin à cibo unciam mediam. Quod si ipsum potui commodum efficere uelis, ut magis delectet, mellis sextarios duos, aut tres admisceto.

Scillini uini vires ex Gal.

## **Οἶνος θαλασσίος. VINA MARINA.**

### **CAP. XXIII.**

**VINA** ex marina aqua, uariè faciuntur. Aliqui enim statim cum decerptæ sunt vuæ, aquam maris admiscunt. Alij in area vuas sole siccant, quibus calcatis marinam adijciunt. Alij passas prius vuas in dolijs marina aqua macerant, mox calcatas exprimunt. id magis passis generibus adscribitur. Quæ tamen austeriore gustu temperantur, contra febrium aduentatium indicia ualent, si modo meliora non adsint: alium subducunt: profunt purulenta extusiscentibus, & si dura alius exerceat. Quæ ex Aminæis uis fiunt, caput tentant, stomacho aduersantur, flatu creant. Verum quod plenior habeatur historia, ijs qui huius studio tenentur, non inutile existimamus uarias uinorum compositiones adferre, non quod frequens eorum, aut necessarius existat usus, sed ne quid omisisse uideamur, quod ad eorum rationem attinet. Sunt autem quædam ex ijs factitia, minoris curæ ac impendij, quæ cadunt in usus: uti quæ cotoneis malis, pyris, filiquis, item myrti baccis componuntur.

## **Κυδωνίτης οἶνος. VINVM CYDONITES.**

### **CAP. XXIII.**

**CYDONITES**, nomine alio melites appellatur, & ita fieri consuevit. Mala cotonea exemptis feminibus, frustatim rapi modo scinduntur, & duodecim minarum pondo, in musti metretam, triginta diebus macerantur: postea defecatum uinum reponitur. Alia faciendi ratio. Oportet ad singulos mellis sextarios denos succi cotoneorum tusorum pressorumque adijcere, & ita recondere. Vinum hoc adstringit: prodest stomacho, dysenteria, hepaticis, renum uitij, & urinae difficultati. Melomeli, quod & cydonomeli nominant, sic fit. Cotonea mala feminibus suis castrata, in quam plurimum mellis, quo penitus demersa contegantur, conijciuntur: id post annum mitescit, mulso non dissimile. Præstat eadem, quæ superior compositio.

## **Υδρομέλιον. HYDROMELVM.**

### **CAP. XXV.**

**Fit** hydromelon duabus mensuris aquæ coctæ, & sub Caniculæ sydus insolatæ, additis ad unam melomelitis facti ex cotoneis. Vis huius eadem est.

## **Ομφακομέλι. OMPHACOMELI.**

### **CAP. XXVI.**

**ΟΜΦΑΚΟΜΕΛΙΤΙΣ** faciendi ratio hæc est. Acerbæ vuæ adhuc immaturæ, & tribus diebus insolatæ exprimuntur, & ad ternas succi partes, mellis optimi despumati singulæ partes adijciuntur: & insolatur in vasa transfusum. Vim reprimendi, ac refrigerandi habet. stomachicis, celiacisque conuenit. Vfus post annum est.

## **Απὲρ πύρος οἶνος. VINVM EX PYRIS.**

### **CAP. XXVII.**

**Fit** & è pyris, perinde atque cotoneis, vinum, apijtes nomine, sed ita ut pyra non magnopere maturescant. Ex filiquis etiam, mespilis, forbis, simili modo temperatur. Omnia hæc genera acerbæ sunt, & adstringunt. stomacho utilia sunt, atque intestinas fluxiones cohibent.

## Οἶνός τινος ὀίνος. VINVM OENANTHIVM.

CAP. XXVIII.

**FIT** ē feraci uite syluestri, quod uocatur oenanthinum. Sicci flores minis duabus multi cado macerati, post triginta dies mutantur, mox colatum uinum reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, coeliacos, & dysentericos.

## Πόντος ὀίνος. VINVM EX PUNICIS.

CAP. XXIX.

**FIT** ē punicis malis maturis, quod rhoeten nominant, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, apyrena uocant, ac decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluuiio exortam. Stomacho utile, adstringit aluum, & urinam mouet.

Vini ē puni-  
cis uaria con-  
fectio.

**VINVM** ē Punicis malis multifariam conficitur in Italia. Aliqui enim repurgatos punicorum acinos prelo statim subiiciunt, & expressum succum uitreis amphorīs recondunt: ibiq; per se tandiu effervesce sinunt, quousque deferbuerit, & subsidet fex. deinde in alias transfundunt amphoras, quod à fecibus repurgatum eximunt, & oleum superinfundunt, ne euanescat, & corrumpatur, uel acefcat. Alij, qui magis punicis abundant, acinos in ligneum cadum altera parte patulum coniiciunt, & uuarum modo pedibus calcant, donec uniuersus exiliat succus: deinde per se in sole effervesce sinunt, cado linteo spissiore cooperto, usquedum fex uniuersa residat, nuclei supernatent, & uinum defecatum, ac pellucidum reddatur. Vbi autem hæc facta sunt, perforato paulo supra fecem uase, uinum eximunt, & cadis ligneis asseruant. Huic oleum superinfundere non opus est: seruatur enim sic paratum per se, modo uasis osculum pice uel cera obturetur. Sunt præterea, qui repurgatos punici acinos, cum pari mensura nigre uae austeriusculi saporis commisceant, calcant, & per se effervesce sinant, quoad uinum claritatem consequatur. Subinde in doliolis asseruant: siquidem hoc gustui plurimum arridet.

## Ρόδου ὀίνος. ROSACEVM VINVM.

CAP. XXX.

**RHODITES** sic fit. Rosarum siccarum, tufarumque minam lintheolo deligatam in sextarios octo multi demergito: & post tres menses defecatum uinum transfundens, recondito. Vitale ijs, qui febre carent: & ad stomachi coctiones, & dolores, à cibo potum: & contra humidas aluos, & dysenterias. Fit quoque ex succo rosarum addito melle, quod rhodomeli uocant: quod arteriarum scabritijs conuenit.

## Μυρτίτης ὀίνος. MYRTITES VINVM.

CAP. XXXI.

**MYRTITES** fit, baccis nigris, quæ maturitatem excefferint, tufis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole torrent, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aquæ heminas adiiciunt, & uini ueteris parem modum: postea exprimunt, & seruant. Magnopere adstringit. Stomacho utile: fluxionibus uentris, ac stomachi prodest, & contra intestinas ulcerationes, & profluvia. denigrat capillos.

## Μυρσινίτης ὀίνος. MYRSINITES VINVM.

CAP. XXXII.

**MYRSINITES** sic temperatur. Rami nigræ myrti cum suis baccis, & folijs tufi, decem minarum pondo, in tribus multi congijs feruescunt, donec duo supersint, aut certè dimidium. id uinum colatum ad usus reconditur. Contra furfures, ulcera in capite manantia, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas, & purulentas aures efficax est: sudores sistit.

## Σχίνος, καὶ τερεβινθίνος ὀίνος. LENTISCINVM, ET TEREBINTHINVM VINVM.

CAP. XXXIII.

**LENTISCINVM** similiter ut myrsinities temperatur. Nec secus terebinthinum. namq; baciferi eorum rami sumi debent. Similes insunt uires. adstringunt, stomacho accommodantur, & defluxionibus intestinorum, uesicæ, & stomachi, & sanguinis profluuiio. Ulcera omnia fluxionibus obnoxia, foru ad cicatricem perducunt: fluxiones vuluæ, ac sedis, infestatione cohibent.

## Φοινικίτης ὀίνος. PALMEVM VINVM.

CAP. XXXIII.

**PALMYLAS** maturas, quas uocant chydas in urceolum imo pertusum, & obstruatum picata arundine, demittito: lino foramen sit obturatum, & quadragenis sextarijs ternos aquæ congijs infundito.

infundito. quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinque congios infudisse satis est. post decem dies detracto ab arundine linteo, assumito uinum crassum, & dulce, & reponito. Suave illud quidem, sed capiti noxium, contra fluxiones propter adstrictoriam uim efficax: stomachicis, coeliacis, sanguinem expuentibus conuenit. Aliqui idem addita aqua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto, sextoque faciunt, quod tandem acore uitiat.

Καρχίτης οἶνος. VINVM EX CARICIS FACTVM.

CAP. XXXV.

CATORCHITES, aliquibus sycites uocatur, in Cypro fit, ita ut palmeum: sed hoc interest, quoniam pro aqua tantundem humoris adijciunt, in quo recenter pressa uinacea maduerint. Caricæ, quæ chelidoniæ, aut phœnicæ appellantur, præsertim nigrae macerantur, uti diximus: & post decem dies humor excipitur, atque iterum, aut tertio, idem modus aquæ, in qua uinacea maduerint, infunditur, simili modo intercedente spatio, quarto, aut quinto assumitur. Demaceratorum liquor non secus acorem contrahit, & acetum usum præbet. Id tenue est: flatus gignit, stomacho aduersatur, fastidium parit, aluo tamen prodest, urinam ciēt, menses trahit, lactis ubertatem facit, uitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, ut potio, quam zytho appellamus. Aliqui sex amphoris, decem salis sextarios adijciunt. Alij muria amphoram. quod non facile uitiat, & aluo idoneum fore censent. Alij thymum, & fœniculum imo subijciunt, & caricas superponunt: & ita uicissim, donec uas expleuerint. Fit & è sycomoribus eodem modo uinum, sed in ætate acere degenerat: quoniam non ita præualeat uis eorum, ut fluentis liquoris dulcedinem retinere possit.

Ρηνίτης οἶνος. RESINATVM VINVM. CAP. XXXVI.

RESINATVM uinum populatim factitari solet: copiosum in Galatia: quoniam uinum illic coacescat, uia non maturescere, ob cœli algorem, nisi picea resina temperetur. Resina autem cum cortice tunditur, & amphoræ dimidiata hemina permiscetur. Aliqui ubi efferbuit, excolant, separantes resinam: alij relinquunt. Hæc uina uetustate dulcescunt. Omnia capitis dolorem, & uertigines faciunt: coctionem tamen adiuuant, & urinam ciēt: tussientibus, ac destillatione uexatis conueniunt: item coeliacis, dysentericis, & hydropicis, & fœminis fluxione vuluæ laborantibus: alitis exulcerationibus infunditur. In hoc autem genere nigricans magis albo constringit.

Στροβιλίτης οἶνος. VINVM STROBILITES. CAP. XXXVII.

STROBILITES fit maceratis in musto nucibus pineis, recentibus, fractisque: præbetque resinati effectus. Siquis madefactas nuceis pini musto decoquat, porum affatim conuenit ijs, qui tabitudine conficiuntur.

Κεδρίνης, καὶ ἐκ τινῶν δένδρων, καὶ κάρπων οἶνος. CEDRINVM, ET EX ALIQ. VOT.

40. ΑΡΒΟΡΙΒΥΣ, ΑΚΡΥΚΤΙΒΥΣ VINVM. CAP. XXXVIII.

CEDRINVM, iuniperinum, cupressinum, laurinum, pineum, aut abiegnum, simili ratione fiunt: Diuisos recenter ramos, cum fructum edunt, aut soli, aut balneo, aut igni admouere oportet, uti confudent, congioque uini minam unam permiscere, & post duos menses transfundere, & antequam recondantur, insolare. Factitiorum uinorum uasa impleri debent: nanque non plenis uasis, uina in acorem corrumpuntur. Medicata autem uina recte ualentibus insalubria. Omnia exalfaciunt, urinam ciēt, & substringunt. Laurinum tamen uehementius exalfacit. Fit quoque è fructu cedri maioris uinum, congio musti, adiecta tusarum baccarum selibra. diebus quadraginta insolari debet, & defæcatum in uasa transferri. Fit etiam uinum è baccis iuniperi, non aliter quam cedrites, & ad eadem ualens. Cedrites hoc modo fit. Cedriam dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt, & ita musto replent. Hoc genus uini exalfacit, extenuat: tussi antiquæ utile sine febre, pectoris laterisque doloribus, torminibus, uentris, & interaneorum ulceribus, purulentis excreationibus, mulieribus vuluæ causarijs, hydropicisque: facit aduersus uentris tineas, & horrores. Contra uenenatos ictus auxiliatur: serpentes necat: aurium doloribus instillatum medetur.

Πισίτης οἶνος. PICATVM VINVM. CAP. XXXIX.

PICATVM exliquida pice, & musto temperatur. Picem autem primum marina, aut muria tantisper ehuere oportet, dum inalbuerit, & syncera maris aqua defluat: mox aqua dulci prolunda: con-

da: congijs octo musti uncia picis una, aut altera adiicitur: vbi efferbuerit, & constiterit, in uasa diffunditur. Hoc genus uini excoquit, concoquit, purgat, abstergit: vtile doloribus pectoris, alui, iecinoris, lienis, & vultur, si sine febre sint, ueteri rheumatismo, exulcerationibus in altum recedentibus, tussi, suspiriis, concoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, praesertim in succida lana impositum.

Αἰνιδίτης οἶνος. VINVM ABSINTHITES.

CAP. XL.

ABSINTHITES faciendi ratio euariat. Aliqui enim duodequingenta sextariis Italicarum amphorarum, admistam absinthii pontici libram decoquunt ad tertias: & ubi infuderint sex acetis sextarios, & absinthii selibram, ac diligenter permiscuerint, diffundunt in uas: dumque conqueuerit, defecant. Alii absinthii minam in amphoram demittunt, tusamque, & raro linteo deligatam, in eadē musti macerant binis mensibus. Alii absinthii quadrantem, alii trientem, & nardi Syriacae, cinnamomi, calisae, floris iunci odorati, calami, elaeae, palmarum singulos sextantes iniiciunt in metretam musti, & tundentes prius pila, obstructo uasis spiraculo, binis ternisve mensibus dimittunt: postea defaecatum uinum transfundunt ad vsus. Alii addunt in musti cadum Celticae nardi drachmas quatuordecim, & absinthii drachmas quadraginta, linteo inuolutas: & post quadragesimum diem elutriant. Alii in senos sextarios musti, absinthii libram, & siccae pini resinae sextantem immittunt: & post decem dies exeolant, & recondunt. Vtile est stomacho, urinam citet, tardam concoctionem accelerat: hepaticis, regio morbo, & renum vitis auxiliatur: fastidia discutit. iis prodest, quibus stomachus negotium exhibet: valet contra longam praecordiorum distentionem, & inflationes, teretesque uentris tineas, & remoratos menses. contra hausta ixiæ uenena quam plurimum potum, & uomitionibus redditum, auxiliatur.

Αἰνιδίτης οἶνος. VINVM HYSSOPITES. CAP. XLII.

HYSSOPITES ē Cilicio hyssopo maxime laudatur. Fitque similiter, foliorum hyssopi turforum libra in amphoram musti coniecta: linteolo raro cum quibusdam lapillis folia inuoluntur, ut degrauatus pondusculo fasciculus sidat: uinum post quadraginta dies defaecatum elutriatur. Contra pectoris, laterum, & pulmonis vitia, veterem tussim, & suspiria prodest: urinam citet: torminibus, & horroribus febrium circuitu repetentibus auxiliatur: menses mouet.

Οἶνοι ἐν τῶν ποικίλων φυτῶν. VINA EX DIVERSIS PLANTIS FACTA.

CAP. XLII.

Simili modo chamædryites fieri solet. Excoquit, discutit: conuulsis, regio morbo, vultur inflationibus, tardae concoctioni, incipienti aquae inter cutem subuenit. Inueterascens melius redditur. Stœchadites non secus temperatur. Congij sex stœchadis minam addere oportet. Crasitium, inflationes, laterum neruorumque cruciatus, & perfrictiones discutit. comitialibus commodè datur cum pyrethro, & sagapeno. Fit ad eadem acetum ē stœchade herba, ut paulo ante diximus, aceto macerata, quod eisdem implet effectus. Fit uinum ē betonica, quam cestron psychotrophon appellant. Herbarum semine maturo praegnantem, cum suis ramulis minz pondo, congijs duobus uini macerant, & post septimum mensem transfundunt. Ad multa interaneorum vitia, ut frutex ipse, pollet. Et ut in vniuersum dicatur, factitia vina sibi misturarum uires adsciscunt. quare non difficile fuerit ijs, qui illarum naturam norint, vinorum vires coniectura quadam consequi: veruntamen vinorum usus febricitantibus abdicandus. Fit etiamnum ē betonica acetum ad eadem vitia utile. Tragoriganites fit quaternis tragorigani drachmis linteolo colligatis, in quaternos musti sextarios coniectis, & post tertium mensem transfusis. Prodest torminibus, vultu, ruptis, laterum doloribus, spirituum discursationi, ægris concoctionibus. E' napsi fit uinum, nomine bunites, drachmis duabus tussi napsi in sextarios duos musti additis, & cæteris eodem modo factis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis. Dictami drachmas quatuor macerato quaternis musti sextariis. Facit aduersus stomachi fastidia: menses, & purgamentum à partu subducit. Marrubij adulti folia tundito, & sextarios octo in musti metretam demittito, & reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc uinum pectoris vitis, & omnibus, quibus marrubium. Thymi tussis, & cribrati uncias centum linteolo colligatas, in amphoram musti adjicito. Valet contra ægras coctiones, fastidia, dysenteriam, neruorum & praecordiorum dolores, hybernos algores, & venenata animalia, quorum morsus frigus insequitur, aut putrefcit locus.

Simili modo ē satireia uinum fit. quod eadem, quæ thymites praestat. Sic quoque origanites ex Heracleotico origano conficitur similiter cum supradicto. Facit eadem, quæ thymites. E' calamintha, pulegio, & abrotono vina fiunt eodem, quo thymites modo. Profunt stomachicis, cibum fa-

bum fastidientibus, & regio morbo; quod vrinam moueant. Fit item è conyza vinum contra venenata ante alia efficax.

Ἀρώματῖτες οἶνος. VINUM AROMATITES.

CAP. XLIII.

AROMATITES. ita fit. Palmæ, aspalathi, calami, nardi Gallici, singulorum quatuor sextarios sumito: postquam contriueris, passo subigito, coactis ingentibus offis, & in sextarios duodecim austeri musti deiectis, operculato vase, quadraginta diebus quiescere finito: deinde vbi fæce expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ratio. Calami vncia, phu drachmæ septem, costi drachmæ duæ, nardi Syriaci drachmæ sex, cæsiæ vncia, croci drachmæ quatuor, amomi drachmæ quinque, asari drachmæ quatuor. Omnia simul trita, & linteo colligata in cadum musti, demerguntur: & postquam vinum deferbuerit, transfunditur. Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores, difficili vrinæ, horroribus, retardatis mensibus, atque ijs qui per frigora iter faciunt, potum conuenit. pituitæ crassitiem extenuat, colorem alit, somnum conciliat, dolorem finit: renum, & vesicæ vitij auxiliatur.

Οἶνοι ἐκ τῶν ποικίλων ἀρωμάτων. VINA EX DIVERSIS ODORAMENTIS.

FACTA.

CAP. XLIII.

Fit & vinum ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, & si humor in stomacho coit. Myrrhæ duæ drachmæ, piperis candidi drachma vna, iridis drachmæ sex, anisi drachmæ tres: omnia plenius tusa, & linteolo inuoluta, in sex vini sextarios conijciuntur: vinum post triduum colatur, & in lagena reconditur. Datur post deambulationem meraculum, cyathi vnus mensura.

Fit quoque nectarites ex helenio herba, radice sicca pondo quinque drachmarum linteolo colligata, & in congios sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi, & pectoris vitia: vrinam pellit. E Syriaca nardō, & Celtica, malabathroque vinum facitatur, hac ratione. Singulorum selibram in binos musti congios mittito, post menses duos colato. Datur cyathus vnus cum tribus aquæ. Hoc vinum efficax est contra vitia renum, hepaticos, regium morbum, & vrinæ difficultatem. prodest stomachicis, atque ijs quos pallor decolorat. Alij vnciam, aut sextantem acori, & Celticæ nardi quadrantem in musti amphoram adijciunt. Asari quadrantem in senos musti sextarios itidem demittito. Id vini genus vrinam ciet: hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisque conuenit. Radicis sylvestris nardi recetis, & tritæ, cribratæque besslem in congiū musti conijcito: duos menses quiescere finito. Vtile est hepaticis, difficili vrinæ, inflationibus, stomachicis.

Οἶνοι ἐκ τῶν ποικίλων πόνων. VINA EX DIVERSIS HERBIS FACTA.

CAP. XLV.

RADICIS dauci contusæ drachmas sex in musti amphoram imposito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & vuluæ: menses pellit, ructus ciet, & vrinam: prodest tussi, ruptis, vullisque. Saluiæ vnciam in musti amphoram, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet contra renum, vesicæ, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, vulla, & suppressos menses. Panacis vnciam in musti congiū mittito, & transfundito. Prodest ruptis, vullis, contusis, orthopnæ: lienis crassitiem extenuat: contra tormina, coxendicum dolores efficax est: tardas concoctiones accelerat: menses, & partus extrahit: aquæ inter cutem, & serpentū ictibus auxiliatur. Vina ex acoro, & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorum uncias octo in senos congios mittere, tribus mensibus macerare, mox in vas transferre. Faciunt ad pectus, & latera, & vrinam mouent. Seminis apij recentis, maturi, & cribrati vnciæ nouem in linteo colligatæ in musti amphoram demittantur. Appetitum excitat: stomachicis, & difficili vrinæ auxiliatur: faciles spiritus facit. Ex fœniculo, anetho, & petroselinō, vina eodem modo fiunt, & ad eadem efficacia. Fit & è flore falis vinum, multò ad purgandum efficacius, quàm vinum aqua marina temperatum. Fauces, vesicam, renes, & stomachum infestat: quare neque infecunda, neque aduersa valetudine prodest. Fit etiam vinum, quod phthorion vocant, quoniam partus necat, & abortus facit, ueratro, aut scamonia, aut sylvestri cucumere, iuxta radices vitium facto: siquidem vires sibi illorum vires adiscunt. Id vinum partus enecat: datur ieiunis mulieribus, quæ antè vomuerunt, cyathorum octo mensura, dilutum. Ramorum thymelææ cum suis folijs, & fructu triginta drachmas mittito in congios tres musti, & leui igne coquito, donec congiij duo supersint, defecatumque recondito. Aquosa purgat excrementa, & lienem absumit. Chamelæa dum floret, cum folijs tusa, & cribrata decem drachmarum pondere, in musti congiū additur: post duos menses vinum in vas transfertur. Aquæ inter cutem, hepaticis, & lassitudinæ contractis,



contractis, efficax est: item mulieribus, quæ à partu ægrè purgantur. Chamæpitynum simili modo fit, ad eadem conueniens: urinam quoque ciet. Librum radicis mandragoræ concidito, segmenta lino traijcito, quod selibram æquat, in musti cadum demittito, ibique esse finito ad menses tres, deinde transfundito. Media portio, heminæ dimidiū bibitur, passo in duplum addito. Aiunt heminam vini congio mistam, potu soporem adferre. cyathus vnus cum sextario uini potus, enecat. Mediocris usus eius doloris sensum auferit: fluxiones incrassat. olfactu, potuque, & cum inditur, idem præstat. In congium musti aqua marina diluti, drachmas duodecim nigri veratri tripi in linteo mundo mittito: dumque efferbuerit, in marinæ aquæ congios quatuordecim, vbi pleniusculè frigeris, injcito: post aliquot dies colato, & vititor. Dato cyathum unum ex aqua balnei, in potu ad aluum soluendam, ijs qui euomuerunt à cœna. Alia ratio. Veratri drachmas viginti, iunci odorati vncias duodecim, spicæ Syriacæ vncias tredecim, tribratas, & linteo colligatas, in septem vini Coi sextarios, diebus quadraginta macerandas indito, postmodum colato. dabis in potu sesquiheminam. Aliter. Decoctæ marinæ aquæ ex alto petiæ sextarios duodecim, veratri candidi libras sex, in musti amphora quadragesimo die quàm madefeceris, colato, & vititor. Alia ratio. Veratri drachmas duodenas, & aphronitri quaternas in senis musti sextarijs diebus quinisdenis macerato, mox colato: & semestri exacto, vititor. Id uini genus abortus facit, & partus necat. Aut vvas in sole siccatas imposito in musti metretam (implet autem metreta congios duodecim) & gypsum in vinum mittito pondo drachmarum viginti, & biduo residere finito: conijcito veratri nigri drachmas triginta, iunci odorati, calami, singulorum drachmas triginta, baccarum iuniperi sextarios duos & trientem, myrrhæ, & croci singulorum drachmam: inuolvens linteo, diebus quadraginta appendito, postea colato. dabis heminas tres, aut duas dilutas. Purgat à partu, & abortu scæminas: foetus extrahit: contra strangulatus vultus efficax. Scammonites sic fit. Radicis scammonia per melle effossæ, trita, & linteo colligatæ drachmas quinque in musti congium mittito ad dies triginta. Aluum purgat: bilem, & pituitam extrahit.

Vinorum factitiorum consideratio.

VINUM factitia parandi ratio diuersa, quam superius ab initio propè huius libri ad hunc usque locum pluribus capitibus diffusè diligenterq; tradidit Dioscorides, nobis quidem clarior, & euidentior uisa est, quàm ut operæ pretium esset, stogula eorum capita nostris commentationibus prosequi: præsertim cum omnium ferè iam usus apud nos exoleuerit, quanquam non equidem dubitauerim, quin essent huiusmodi uina: si eo modo parata in promptu essent, ijs morbis profutura, quibus prodesse produntur. Vnde pluribus adhuc rationibus nixus, primus ego, ut arbitror (quod etiam lib. 1. in Ebeni mentione diximus) è ligno Guaiaco uinum confeci, & alijs quoq; conficiendū esse scriptis tradidi. Cuius postea usu innumeros Gallica lue correptos, nos, & alijs medici sanitati restituerunt. Videmus enim Euphrasiam ad oculorum claritatem efficacissimam esse, Myrricinum lenis morbos sanare, & quod ex sena paratur, atrabiliarijs morbis, & cuticulis exulcerantibus, nempe scabiei, lepris, uiriliginibus, lichenis, & id genus alijs, continuissimum esse medicamentum. Quod cum animaduertisset magnus philosophus, & medicus non spernendus Arnaldus de Villa noua, de factitijs uinis, quæ medicinæ usui conueniunt ad uarios corporis morbos, copiosissimum edidit libellum. In quo qui uinis medicamentosis delectantur, & hæc conficiendi modum, & eorum facultates, facile adipisci poterunt. Nam apud Germanos, & alios illis conterminos, medicamenta uinis commista in frequentissimo habentur usu; quod magis, quàm nos odoratis, & concinnatis delectentur potionibus.

## De Metallicis Lapidibus.

Καδμεία. CADMIA.

CAP. XLVI.

EX CADMIAE generibus optima est Cypria, botrytis nomine, densa, modicè grauis, & in leuitatem magis declinans, racemosa facie, colore spodij, quæ fracta cinerulenta est, & z-ruginosa. Proxima habetur foris cærulea, intus candidior, internatis venarum discursibus, onychitæ lapidi similis, cuiusmodi sunt quæ è veteribus metallis effodiuntur. Quædam etiam placodes, id est, crustosa dicitur, segmentis quibusdam perinde quasi zonis cincta, ob quod eam zontin appellauere. Alia ostracitis nominatur, gracilis, & magna ex parte nigra. Sed quæ testaceam faciem habet, terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamenti botrytis nomine, & onychitis, vtiles: reliquæ ad emplastra, & farinas, quæ cicatricibus inducendis inspargantur. Ad eadem Cypria prodest. Ex Macedonia verò, Thracia, & Hispania delatæ improbantur. Cadmiæ effectus adstringere, caua explere, sordes expurgare, exiccare, corporis meatus infarcire, excrescentia in carne coërcere, crustas creare, & vlcera, quæ cacoëthe vocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur cadmia ex ære in fornacibus candente, fuligine egesta flatu, & lateribus, camerisque fornacum inhærente. Prægrandes autem, ac ferreæ sunt rudes, ab officinis appellatæ acestides, per summa fastigia connexæ, & concameratæ, vt quæ ab ære iactantur sursum corpuscula, cohæreant, & inibi detineantur: quæ cum spissius insident, in corpus con crescunt, & modò

## 587

<sup>20</sup> omob eġ. No tneq għat-tneqet zing C, mteqna awtillio' b'itnjo' mteqet stablizzazjoni; - omob eġ.

*p* = nos in

Historia ex  
Galeno.

Cadmia historia ex Plinio.

pæ nos in pluribus Germaniæ locis, ubi æs, argentum, & aurichalcum conficitur. Sed speciatim botryitum apud Perzenum quinto à Tridento lapide, & apud Sbozium in Tirolensi comitatu, ubi in quàm plurimis fornacibus æs, ac diu metalla funduntur. Botryitis cadmiæ frustulum sanè pulcherrimum nouissimè ad me misit Sagabria Dalmatiæ urbe clarissimus medicus Iosephus Salandus Bergomensis, quæ adeò in racemi modum congesta est, ut planè uix speciem referat. Porro officinæ omnes Tutiam, quæ pompholyx est, Cadmiam perperam nominant. Quandoquidem Tutia illis uocata (nisi mea me fallit opinio) Cadmia est & botryitis genere. Neque enim mirum esse debet, quòd Cadmiæ proprio amisso nomine, in pompholygis locum successerit, cum etiam Dioscoridis tempore spodij loco uterentur medici.

Πομφόλυξ, σπόδον, ἀντίσποδον. POMPHOLYX, SPODIVM, ANTI-

SPODIVM. *capitulum XLVI.* 10

**POMPHOLYX** specie sola, non genere à spodio distat. Siquidem spodos nigricat, & plerumque ponderosior est, palearum pilorumque plena, quasi purgamentum quoddam, quod ab ærariarum officinarum pauimentis, & fornacibus eueritur. Pompholyx uerò pinguis est, & candida, usque adeò leuis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerunt genera. vnum ad æris colorem uergens, subpingue: alterum magnopere candidum, summamque leuitatem nactum. Candida fit pompholyx, quoties in perficiendo ære, fabri præstantiorem facere volentes, detritam cadmiam cumulatius insperferint. nanque tenuissima fauilla, quæ effertur, in pompholygem coit. Cæterum pompholyx non ex æris modò materia, & fabrilis industria factitatur, sed ex cadmia quoque, ad gignendam ipsam eximiè foliibus proflata. Cuius faciundæ ratio hæc est. In domo 20 gemina contignatione operta, fornax extruitur, iuxta quam mediocris fenestra, ad tabulatum à supernis partibus pateat. domicilij paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacem usque perforetur, ad excipiendam follis narem: ostium mediocre habeat, pro exitu ingressuque artificis fabricatum. domuncula altera huic coniuncta sit, in qua & folles, & flator suo munere fungantur. deinde carbonibus in camino succensis, assidens artifex cadmiam particulatim fractam inspargit, à locis supra infurnibulum extructis. idem negotium obit infernè artificis minister, simulque carbones adijcit, usque dū indita cadmiæ copia prorsus absumatur. Itaque egesta suffitu tenuis pars, & lenis materiæ in summam domum euolat, & parietibus, tectis, fornacique adhærescit: constitutum autem inde corpus, inter initia erumpentibus aquarum bullis simile prodit, postea maius incrementum capeffens, glomusculis uellerum simile redditur. Ponderosius autem in ima loca se 30 recipit: sed hoc fornacibus offunditur, illud domus pauimento cohæret: quod tenuiore deterius existimandum est, ideo quod multum terræ collegerit, & spurcicia in aceruatiōe referciatur. Sunt qui hoc modo tantum fieri spodium arbitrantur, de qua antè dictum est. Optima creditur Cypria, quæ accepto aceto halitum æris præstat, colore aliquantum piceo, sapore cœni horrido: et si fraudem non experta, flagranti carbone inferuescit, aëreum colorem contrahit. Antedictis autem notis diligenter attendendum est. Siquidem à nonnullis adulteratur taurino glutine, ouillo pulmone, aut marino, aut crematis grossis, & quibusdam consimilibus. quod facile cognitu fuerit: quippe nihil in ijs probandis inuenietur eorum, quæ antè dicta sunt. Pompholygem in commune ita 40 lagari oportet. Ligatam linteo mundo, modiceque raro, aut siccam, aut aqua respersam in labelum demittito, quod imbrem contineat, & huc atque illuc fasciculum deferens, immergito: ita enim limosa pars eius, ac utilis effluet, & omne sedimentum in linteolo remanebit. postea residere finens aquam cum cinere colis incernito, & nouam infundens, agitato, & effundito: mutata tantisper aqua, & colata; dum arenosi nihil fidat. demum aquam exprimito, & siccatur cinerem recondito. Alij quantum maximè fieri potest siccant, manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imitetur: deinde linteo faucibus excepturi vasis obtento, aut laxius illigato, colant, & quò facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem conturbant: mox spumofum, quod 50 traiectum est, & supernat vasi, concha excipiunt, & fictili nouo ad vsus recondunt. Quod uerò resedit, sensim cribratum, in aliud vas transfundunt, relicto areoso, quod postmodum ierat: rursus lapidosa sidere patiuntur, & in vas aliud excolant: hoc identidem faciunt, donec cinis merus, & arena expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua respergunt, arbitrati arenas, lapillosque suopondusculo degrauatos, pessum ire: pilos autem, & paleas leuitate sua in sublime attolli. Cæterum cinerem medium separant, & in pilam coniectum, ut cadmiam, eluunt. Quinetiam lauatur vino Chio marina aqua diluto, modis quos suprà diximus: & ita redditur adstringentior, quàm aquis elota. Vis pompholygis adstringere, refrigerare, explorare, purgare, obstruere, & aliquantum exicare. Inter medicamenta numeratur, quæ leniter crustas obducunt. Quòd si spodon torere libet, diligenter tritam, & irrigatam aqua colliges in pastillos, fictilique nouo, subiectis leuib. prunis, orbiculos continuò versabis, dum assicati fuluescant. Neque ignorandum ex auro, argento, plumboque fieri spodium: uerum post Cyprium, plumbeum maximè commendatur. Quoniam spodos sæpenumero desideratur, necesse est ostendere, quæ simili virtute polleant, ut in spodij locum suffici possint, antispora vocant: quoque modo sumi debeant. Folia itaque myrti cum floribus, & immiaturis

immaturis, in fictile crudum coniecta, indito operculo continua foramina habente, vruntur for-  
nacibus, donec figlinum percoquatur. iterū in fictile aliud crudum transferantur, quod vbi peras-  
satum fuerit, exempta lauantur ad vsus. Idem quoque fit ē termite syiuestris oliuæ, si habeatur:  
sin secus, satiuæ cum suis floribus, aut malis cotoneis dissectis, & detractis ofsibus, aut gallis, aut  
laceratis linteolis: item ex moris immaturis, id est candidis, in sole prius arefactis, aut terebintho,  
aut lentisco, cœnanthe, aut mollibus rubi folijs, vel ē buxi coma, vel ē pseudocypero cum flore.  
Alij ficulneas frondes in sole antea siccatas, eodem modo parant: alij taurinum gluten: alij succi-  
das lanas asperas, pice aut melle irrigatas. Quæ omnia in spodij vicem vsurpantur.

- <sup>10</sup> **POMPHOLYGE** officinæ Mauritanos secutæ Tutiam dicunt. Ita enim pompholyx appellatur Serapioni, Pompholy-  
& Auicennæ. Verū quam seplasiarij Tutiam existimant, legitima non est, sed cadmiæ potius species. Siquidem cū  
hec lapidis modo crustosa, prædurāq; sit, pompholygem, siue tutiam dictam prorsus mentitur. Pompholyx nanq;  
Dioscoride, & Galeno authoribus, ex eris, uel cadmiæ fauilla in glomusculos uellerum similes coit, & farine modo  
contacta dispergitur. Id quod recentiorum nullus, quod sciam, animaduertit, fortasse quod omnes rei herbariæ inda-  
gande magis insudauerint, quā in inuestiganda fossilium materia. Quamobrem Manardum Ferrariensem, medi-  
cum et atq; nostræ clarissimum, hac in re deceptum satis reperio. Quippe qui, dum Auicennam redarguit, quod spo-  
dium ē combustis arundinum radicibus conficiat, sedulo nos admoneat, ut secuti Galeni sententiam, in spodij defectu,  
tutia potius utamur, qua seplasiæ abundant, quā Auicennæ antispodio. Sed in hoc Manardus planè hallucinatus de-  
prehenditur, quod procul dubio crediderit, uulgarem officinariam tutiam legitimam Dioscoridis, & Galeni esse pom-  
<sup>20</sup> pholygem, cū tamen legitimæ Tutie nullis in officinis sit usus, quod (ut iam diximus) omnes pompholygis loco cad-  
mia tantum utantur. Porro legitimam tum pompholygem, tum spodium, quæ à Dioscoridis, & Galeni historia nullis  
dissent notis, ego ab ærarijs, argentarijsq; fornacibus pluries mecum detuli, tam ab his, quæ Perzeni, & Laisij  
in Tridentino agro habentur, quā ab illis, quæ Sbozj in Tirolensi comitatu Germaniæ inueniuntur, ubi certè cele-  
berrimæ sunt metallorum ferè omnium fornaces, ac fodinæ, ē quibus non modò pompholygis, & spodij quantum satis  
fuerat, accipiedi nobis fiat facultas: sed etiam cadmiæ, pyritis, diphrygis, floris eris, helcysinæ, molybdene, cœru-  
lei, & Armenij lapidis. Quorum ne minimam quidem particulam apud Italiæ seplasiarios reperi unquam, prætera  
quam apud eos, qui uel à me, uel ab amicis meis admoniti, legitima hæc metallica medicamenta, adulterinis ex suis ofe-  
ficinis abdicatis, in medicum susceperunt usum. Nunc uerò amicos intelligo (quos tamen uerius fratres amantissimo  
appellare possem, ut qui & etate, & longa consuetudine, & studiiorum communione mihi coniunctissimi sint) claris-  
<sup>30</sup> simos medicos Tridento oriundos Andreæ Gallum, & Iulium Alexandrinum, qui iandudum ob suam tum doctrinam,  
tum integritatem à Serenissimo Ferdinando Romanorum, Vngariæ, Bohemiæq; Rege in sui, & suæ prolis commo-  
dum in medicos honorificè recepti sunt. Hoc itaq; pacto cadmia seplasijs pompholygis uicem explet: quibus etiam  
antispodia quædam ex arundinum radicibus, & boum ofsibus concrematis facta, spodium falsò referunt. Quod tamen  
non omnino fuerit reprobandum. nam, Dioscoridis testimonio, ubi legitimum desideretur spodium, antispodij uti sa-  
nè licebit: nempe quæ fieri possint ē myrti folijs, floribus, baccisq;: ex oliuæ frōdibus, cydonijs malis; quercuum gal-  
lis, attritis linteaminibus: item moris nondum maturis, terebintho, lentisco, buxo, pseudocypero, fici frondibus, tau-  
ri glutino, succida lana, pice aut melle perfusa. Quo fit, ut mihi planè immeritò à Manardo reprehensus uideatur Auic-  
ennæ, qui ex combustis arundinum radicibus sibi spodium confecit, medicinis commiscendum, quæ ad cordis robur  
parantur, & intus in corpus sumuntur. His enim longè melius, ac consultius fuerit arūdinaceum admiscere spodium;  
<sup>40</sup> quā eius uice tutiam seu pompholygem imponere. licet hæc quoq; sit Brasauoli sententia. Sed equidè hæcenus min-  
quam me legisse recorder, pompholygem seu spodium ijs medicamentis tantò admisceri posse, quæ intus in corpus su-  
muntur: cū neq; Dioscorides, neq; Galenus, nec qui post ipsos diuersis temporibus claruerūt, tam ex Græcis, quā  
Mauritanis, usquam, quod inuenerim, memoriæ prodiderint, citra uitæ periculum hæc hauriri posse. Nam fieri non  
potest, quin tam pompholyx, quā spodium uentriculo, & cæteris uisceribus, mirum in modum noceant, cū ex te-  
nuissima eris substantia uehementissima ignis ui conficiantur, & ob id deleterij aliquid habeant. Quod maiori quidem  
diligentia expendere potuisset Brasauolus, cū interrogatus à suo sene pharmacopola, quid spodij loco in compositis  
medicamentis imponendum foret, inconsultè satis respondit, pompholygem, ut faciebat Galenus. Quæ in re duplici,  
meo quidem iudicio, notatur errore. Primum quod respondens non distinxerit, an hoc uel alio modo agendum fuerit cū  
medicamentis, quæ ore sumuntur, quibus myropolæ spodium quandoq; commiscant, omnino hac in re concludere ui-  
<sup>50</sup> detur, pompholyge indifferenter pro spodio utendum esse, tam in hauriendis, quā exterius ad mouendis medica-  
mentis. Deinde uerò cū pompholygem, siue (ut ipse habet) tutiam spodij loco sumendam statuit, in eodem uersari erro-  
re deprehenditur, in quo Manardus eius ciuem uersatum ostendimus. Quandoquidem si rectè nouisset tutiam commu-  
nis usus, legitimam non esse pompholygem, omnino (ut semper in cæteris tam adulterinis, quā supposititijs medica-  
mentis facere adsolet) errorem hunc suo sene pharmacopolæ indicasset. Nec obstat, quod dixerit Galenus in spodij de-  
fectu, pompholygem supplendam. Siquidem is in ijs tantum medicamentis id faciendum uoluit, quæ exterius illumi-  
nuntur. Nam Galeni etate nullus spodij uel antispodij extitit usus ad medicamenta, quæ intus in corpus sumuntur, ut lon-  
go post tempore à Mauritanis factum esse reperio. Meminit tum Pompholygis, tum etiam Spodij Galenus libro 1x.  
simplicium medicamentorum, sic inueniens. Pompholyx sit in eris fornace, uelut & cadmia: sitq; & dum in fornaci-  
bus cadmia uritur, ut in Cypro. Cū enim præfectus ad eris fornacem instructas res non haberet, præcepit ex ipsa  
cadmia præparari (presensibus, atq; inspectantibus nobis) pompholyga, uidelicet minutis cadmiæ fragmentis in igne  
coniectis,

Pompholy-  
gis confid.

Manardi erra-  
tum.

Brasauoli du-  
plex error.

Pōpholygis,  
& spodij histo-  
ria, & uires ex  
Galeno.

coniectis, qui ante ararium iacebat follem. Camera erat incurua, nusquam pertusa, sed integra, quæ egest. an ab ista cadmia fauillam excipiebat: quam ubi collegissent, habebant pompholyga. At quod reflectens infra in paumentum recidebat, spodos est quam uocant, quæ plurima, ubi æs in fornacibus uritur, colligi assolet. Quidam eam spodium nostro genere pronunciant: cui uidetur similem habere facultatem quod uocant Antispodium. At ego illo usus sum nunquam, cum largè mihi semper pompholyx suppeteret. Nec enim quisquam, ubi hæc adsit, spodio uti uelut, nedum antispodio. Est autem pompholyx medicamentum propè omnium, quæ citra morsum desiccant, si elota fuerit, præstantissimum. quamobrem ad ulcera cancrrosa idonea est, & ad alia omnia maligna. Itaq; inditur collyrijs, quæ ad oculorum inponuntur fluxiones, quæq; bullas, seu pustulas in eis natas curant. Præterea ad pudendorum, ac sedis ulcera optimum est medicamentum, nimirum sine morsu desiccans. Sed non est huius negotij in istis diutius immorari. Idem libro IIII. de compositione pharmacorum secundum locos de pompholyge ita scribit. Pompholyx lota nulli pharmacorum mordacitati expertum inferior est: atq; ob id ea utimur ad acres, & tenues fluxiones, capite uidelicet prius simulq; uniuerso corpore euacuato. At uerò manifestum est, quod per uene sectionem, ac purgationem totum corpus euacuamus, per apophlegmatismos uerò caput à pituita uindicamus. Potest enim pompholyx lota, quemadmodum etiam spodium, atq; amyllum simul, & moderatè humores resiccare, simulq; ne per tuniculas euacuetur ea, quæ in magnis ipsorum uenis, superflua humiditas continetur, prohibere. Quare si quis prius, quàm caput ab humoribus ad oculos defluentibus expurget, obturantibus pharmacis utatur, uehementem dolorem ex distentis tunicis efficiet, & ex multitudine influentium humorum aliquando rupturam, aut corrosionem inducet.

Χαλκός κεκαυμένος. AES VSTUM.

CAP. XLVII.

AES ustum probatur rubrum, & quod contritu colore cinnabarim imitetur: nigrum uerò plusquàm deceat, exustum est. Fit autem è clauis solutarum nauium, fictili crudo compositis: subperfo sulphure cum sale pari, omnibus uicissim insparis, fictile, circumlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec figlinum percoquatur. Quidam pro sulphure, & sale alumen insparunt. Alij sine sulphure ac sale, fictili multos dies urunt. Alij sulphure solo utuntur, fuliginem tamen excutiant. Alij oblitos fictili alumine clauos cum sulphure & aceto, fictili crudo cremant. Alij in ænea olla aceto resperfos urunt, & iterum ac tertio idem efficiunt, postea recondunt. Principem locum tenet, in Memphide combustum: proximum in Cyprio. Adstringit, exiccat, reprimat, extenuat, attrahit: vlcera purgat, & ad cicatricem perducit: vitia oculorum emendat, excrescentia in carne consumit, nomas cohibet: vomitus ciet cum hydromelite potum, aut cum melle delinctum, illitumve. Lauatur ut cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. Aeris recrementum, stercusve, quam scoriam uocant, eodem modo lauatur: & eandem uim, sed imbecilliolem, habet.

Aeris vsti consideratio.

Vires ex Galeno.

AES VSTUM, quod in officinis passim habetur, pauci sanè ualoris esse existimauerim, cum nigrum sit, & plusquàm oporteat, igne exolutum. Verum facile quispiam huic malo mederi poterit, si Dioscoridem secutus, ipsam conficiendi laborem subierit. Quod si ærei clauis nauigijs solutis exempti non adsint, æs aliud omne uetustate expurgatum, commodè assumi poterit. Vsti æris meminit Galenus libro IX. simplicium medicamentorum, his uerbis. AES ustum habet & acrimoniam quandam, sed & adstrictionis est particeps. Proinde si lauatur, pulcherrimum est medicamentum cicatrici ulceribus inducendæ: quanquam id ipsum præstare & antequàm lauatur, posuit, potissimum in carne duriore: alioquin in molliore commodius est, quod ablutum est.

Χαλκός αἰθρῶς. FLOS AERIS. CAP. XLVIII.

FLOS æris, quem nonnulli clauorum veterum psegma, quasi resegmen aut segmentum, nominarunt, optimus est friabilis, in attritu fuluescens, milij effigie, & numero, breuis, ponderosus, modicè splendens, atque constringens; qui delimatam æris scobem non recepit, qua sæpe adulteratur. Sed id facileprehenditur, cum dentium illisu dilatantur ramenta: Fit autem, cum æs fornacibus fustum, in receptacula delabitur, per cola fistularum ad ea pertinentium. tum huic negotio addicti ministri, sordes expurgantes, aquam clarissimam infundunt, refrigerandi proposito: itaque repentino concretu, ac addensatione, velut expuitur, & erumpit antedictus flos. Adstringit, & excrescentia coërcet: offusam oculis caliginem emendat, sed magnopere mordet. Quaternum obolorum pondere datus, crassum humorem extrahit. carnosa narium, & sedis vitia absumit: eruptiones papularum cum vino cohibet. Candidius contra diuturnas aurium grauitates tritus, in eas per fistulam flatu impellitur: vuam, tonsillasque reprimat, farina eius cum melle admota.

Floris æris historia.

FLOREM AERIS uerum ac legitimum in fornacibus, ubi æs ipsum funditur, in Tridentino agro, sepius collegimus, in hunc modum. Cum æs fornaci liquatum, in paratum receptaculum extra fornacem diffunderetur, antequàm omnino coiret in massam, frigidam super ipsum adhibere ignitum infundebam: statimq; uapor magnus excitabatur, sub quo mox ferream laminam, & eam quidem amplam, subiciebam, tandiuq; tenebam, donec cessabat uapor.



utque denum æris flos, qui super lamina illa ferrea deciderat, mihi sese ostendebat granulis milio proximis, minoribus tamen, sed colore rubicundo splendentibus. Quandoquidem tenuissima æris pars, quæ à uapore in sublime fertur, æris frigiditatem experta, facile in eiusmodi exigua grana concrevit. Is nusquam, quod sciam, in officinis reperitur. quapropter eius uice erugine perpetuo utuntur. Florem æris paucis perstrinxit Galenus libro 1x. simplicium medicamentorum, sic de eius uiribus differens. Flos æris tenuiorum partium facultatis est, quam aut æsustum, aut squama. Merito itaque ex eo factis collyrijs, extergunt, auferturq; superciliorum magnas asperitates, quas uocant sycosas.

Vires ex Galeno.

*Supra scriptum*

Λεῖψις χαλκοῦ. SQVAMA AERIS.

CAP. XLIX.

10 SQVAMA æris excussa ex Cyprijs officinarum clauis, crassa quidem ipsa præstantior, quæ helitis, id est, clauaris nominatur. sed ex vili promiscuoque ære, aut candido, vitiosa intelligitur: quam, utpote tenuem, & inualidam, damnamus, maximè approbantes crassam, rufam, præsertim si acetum resperfu æruginem contrahat. Vim habet adstrictoriam, extenuantem, reprimentem, & erodentem: nomas coercet, vlcera ad cicatricem perducit. pota ex aqua mulsæ, aquam trahit. Alii qui farina subactam, dant in catapotio. Additur ad oculorum medicamenta: genarum nanque scabritiam absumit, & fluxiones exiccat. Lauatur hoc modo. Siccæ æris squamæ expurgatæ felibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturbatur, quousque pessum ierit: abijcitur, quod subsidit, & effusa aqua; hemina cœlestis imbris adijcitur, & distenta manu, squama, quasi destringenda sit, vehementer confricatur: dumque lentorem emittere cœperit, aqua sensim ad sex heminas usque superinfunditur, terendo validè: squama ad latus mortarij colligitur, ibique apprimitur. quo facto, expressus humor pyxide ex ære rubro facta, excipitur. Hoc est enim velut flos squamæ, valens viribus, & ad ocularia medicamenta cum primis efficax. Inutile, imbecillumque quod superest, lauatur donec nullam prorsus lentitiam excernat: & linteo opertum biduo conquiescere finitur, effusaque extante aqua, ubi siccatum erit, reconditur pyxidicula. Alij ut cadmiam lauant, & reponunt.

Λεῖψις στοματός. SQVAMA STOMOMATIS.

CAP. L.

10 SQVAMAE ex acie, aut mucronibus decussæ, quam vocant stomoma, eadem vis. Lauatur modo simili, & reconditur: sed ad moliendam alui deiectionem inefficacior est.

AERIS SQVAMA malleis ex eo decussa, res sanè vulgaris notitiæ est: tametsi ea præstantior sit, quæ ab ære excutitur, quo clauus fuit, helitis propriè dictæ. Siquidem cum huiusmodi æs rude impurumq; sit, crassius, uegetiusque squamam reddit, quam id quod pluries ignem expertum, in uaria uasorum genera conformatur. Eius præterea abluendæ ratio adeo Dioscoridi clara distinctaq; traditur, ut nihil addendum si persit. Squamæ omnis in uniuersum munit Galenus lib. 1x. simp. med. ubi ita scriptum reliquit. Squama alia est æris, medicamen ad multa utile: alia ferri, et stomomatis. Quidam uero nominant & belutin lepida, siue squamā. Omnes sanè uehementer desiccant. At inter se diuerse sunt, tum quod alia magis, alia minus exiccat: tum quod alia crassioris, alia tenuioris sit essentia: quodq; plus, minusue adstrictiōis sint participes. Helitis certè principem in desiccando locum obtinet. nam & tenuiorum partium, quam alia est, nimirum quæ et eruginis nonnihil assumperit. Maiorē obtinet adstrictiōem squama ferri, & hæc etiam maiorē stomomatis. quamobrem ad contumacia ulcera, meliores sunt, quam squama æris. Detrahit, & liquat carnem potentius squama æris, & hæc etiam ualentius helitis. Omnes autem squamæ non instrenuè mordaces sunt. Ex quo clarum est, quod essentia ipsarum consistentia non admodum tenuis est, sed potius crassa: siquidem inter quæ eandem vim obtinent, minus est mordax, quod est tenuius, ut superioribus libris ostendimus. hæc Galenus. Ex quibus utiq; liquet quid constet stomomatis squamam, æris squamam esse nequaquam: etsi contrarium memorie prodiderit Plinius errore ductus, atq; etiam idem affirmauerint recentiorum quidam, eius fidem magis fortasse secuti, quam quod altius rem hanc inuestigauerint. Quandoquidem non desunt, qui stomomatis squamam, æris squamam omnium tenuissimam esse contendunt, ut Marcellus Dioscoridis interpret. Sunt etiam qui putent eandem modò æris, modò ferri squamam tenuiorem designare, ut Brasauolus. quanquā hæc nullis, quod equidem sciam, rationibus, nullisq; autoritatibus probent. Brasauolus tamen, ut suam tueatur sententiam, Dioscoridem in medium citat. Sed qua ratione ego profectò ne sciuerim, cum nusquam repererim scripsisse Dioscoridem, quod stomomatis squama promiscuè, æris & ferri squama esse possit. Verum ne quispiam forte putaret, me hæc meo tantum arbitrio proferre, id sanè quod sentio, primum non obscuris, ut puto, rationibus aperiam: mox probatissimorum authorum testimonio illud apertissime confirmabo, quod scilicet stomomatis squama nec æris, nec simplicis ferri sit materia, sed chalybis tantum. In primis itaq; dicimus, quod cum scribat Galenus æris squamam principem locum in desiccando inter ceteras obtinere, ferri uero maiore adstringendi ui, quam hæc polleat, & hæc etiam maiore stomomatis, manifestum præbet indicium, stomomatis squamam nec ab ære, nec à simplici ferro esse decussam, sed à duriore ac terrestriore metallo, nempe ab ipso chalybe: quippe cum stomomatis squama longe magis adstringat, quam ferri, huius uero plus adstringat quam æris, rationi minime consonum uidetur, stomomatis squamam esse aut æris, aut simplicis ferri scobem, sed potius (ut dictum est) purissimi chalybis.

Squamæ æris, & stomomatidis consider.

Plinij, & recentiorū quorundā error.

Stomomaeffe  
chalybis squa-  
mam confir-  
matur autho-  
ritatibus.

lybis. Ad hæc cum Galenus in capitis fronte scribat, Squama alia æris est, alia ferri, alia stomomatis, omnibus scæ palam facit, stomoma aliud esse metallum ab ipso ære, et à simplici ferro omnino diuersum. Nam si sensisset Galenus, quod stomoma in æris genere, non autem ferri, fuisset reponendum, dixisset haberi squamam æris-stomomatis, ac ferri, neq; ita speciem à suo genere disiunxisset. Sed quoniam recte nouerat stomoma genus esse ferri arte facti, et id suo illud adscripsit generi, quæadmodum et Paulus ipsum secutus. Ceterum præter rationes adductas, stomomatis squamam à chalybe tantum decussam esse, nihilq; aliud Græcis stomomatis nomine indicari, quàm chalybem, confirmatur Aëtij et probatissimi, et Græci authoris testimonio. quippe qui libro ix. cap. xlviii. de ijs agens, quæ in corpora sumpta dysentericos iuuant, quidnam Græcis esset stomoma, his uerbis aperte declarauit. Deinde uinum purum uetus, quantum satis uidetur, in nouum uasculum infundito, et laminam ignitam ex ferro, quod stomoma uocant, non minorem libra in uino extinguito. Item libro x. cap. xi. ubi indurati lienis curam agit, sic inquit. Sit autem ferrum, quod in ipsis extinguitur, stomoma. Ipsius autem stomomatis ferri squama, quam in fabrilibus officinis ferrum, dum igitur, et malleo tunditur, abijcit. Postea agrestioribus hominibus utiliter exhibetur. Et lib. xiiii. cap. xxiiii. idem ait. Squama ferri, præsertim stomomatis, amplioris adstrictionis particeps est. hæc Aëtius. Ex quibus scæ perspicuum fit, nil aliud Græcis esse stomoma, quàm Latinis sit chalybs, qui è puriore ferri substantia, arte fit in fornacibus. Quo factum est, ut omnes in uniuersam medici Aëtium, et reliquos uetustiores sectati, ad dysentericos, et aliosq; effectus id expetentes, chalybem igne candentem, magis quàm ferrum, modò in aquam, modò in austrium uini, modò in lac extinguant, quod chalybs maiore adstringendi ui polleat, quàm ferrum. Hinc itaq; omnino affirmare licebit, nil aliud extitisse uetustioribus, ac recentioribus Græcis stomomatis squamam, quàm quæ à chalybe decutitur, eiusq; præsertim, qui malleo ferrarijs in officinis acuitur, dum gladijs, ac telis aciem, uel mucrones coaptant artifices: quinetià dum alia fiunt instrumenta materiarijs fabris, et terre cultoribus expetita. Porro hanc rem quoq; Aëtius abunde expresit suo de compositione medicamentorum libro in Aegyptia Andromachi, dum inquit. Multò red-detur utilior, si squamam acie, aut mucronibus decussam, quam appellant stomomatis, pari pondere sibi adsciscat. Id quod etiam idem paulò inferius repetijt. Hoc insuper confirmari potest ex Galeni scriptis libro primo, ac tertio de compositione medicamentorum secundum locos, ubi diuersis medicamentis, præsertimq; ad alopeciam facientibus, stomomatis ferri squamam immiscet. Sed si fortè reperiretur aliquis adeò ceruicosus, et peruicax, ut tot clarissimorum uirorum autoritatibus non acquiesceret, audiat quæso Aristotelem philosophorum omnium principem, qui libro quarto Meteororum, chalybis siue stomomatis conficiendi rationem scitissime docuit ijs uerbis. Τίκεται δὲ καὶ ὁ εἰργαζόμενος σίδηρος, ὥς ἐν ὑγρὸς γίγνεται, καὶ πάλιν πύρρυνθαι, καὶ τὰ σωματά αὐτοῦ σκιδναίνεσθαι, ὥς ἵσται καὶ ἀποκαθαίρεται κατὰ τὴν σκαρίαν. ὅταν δὲ πολλὰς πάλιν, καὶ καθαροὺς γένηται, τὸ σῶμα γίγνεται. ὃν ποιῶσιν δὲ πολλοὺς αὐτὸ, ὥς τὸ ἀποουσίαν γίγνεται πολλὴν, καὶ τὸν σαρμὸν ἐλάττω, ἀποκαθαίρομενον. ἐστὶ δὲ ἀμέκων σίδηρος ὁ ἐλάττω ἔχων ἀποκαθαίρειν. Quæ Latina redduntur in hunc modum. Porro et ferrum elaboratum liquefit, ita ut fluxum reddatur, et rursum concreseat, atq; in hunc modum faciunt stomomata: siquidem scoria in fundum subsidet, et defecatur ferrum. Cum uero id sepe factum est, et purum euasit, stomoma efficitur. Hoc autem non sepe faciunt, eo quod repurgatum multum deperdat, et pondere imminuatur. Atqui ferrum illud melius est, quod minus excrementi retinet. hæcenas Aristoteles. Cuius nimirum doctrinam sequuntur in hunc usq; diem, qui ferrarijs fornacibus, et officinis è ferro prius elaborato, chalybem conficiunt in Italia, et in alijs uniuersæ Europæ regionibus. Quapropter eos prorsus hallucinari euidentissimum est, qui aliter sentiunt: nempe inter antiquos Plinium, et inter recentiores Marcellum, et Brasauolum. His omnibus accedit Serapionis autoritas, magni inter Arabes Dioscoridis interpretis: quippe qui quadragesimo tertio sui operis capite de simplicium medicamentorum historia et uiribus, id totum quod à Dioscoride productum est de squama stomomatis, de ferri squama posteritatis memoriæ prodidit, ferrum tanquam genus, chalybis loco accipiens. Nec obstat, quod in Dioscoridis codice scriptum reperitur, stomomatis squamam uiam eandem esse, quæ æris squamæ, quanquam non adeò ualenter aliam deijciat. Siquidem ego planè suspicor, codicem Dioscoridis hoc in loco esse deprauatum, ut in alijs quoq; pluribusprehenditur, præsertim cion nec à Galeno, nec ab alijs uetioribus recentioribusq; Græcis productum sit, stomomatis squamam æris squamam uiribus esse similem: hæc nanq; alium deijcit, illa uerò contrà eam cohibet. Ad hæc nusquam memini apud quenquam legisse, alio metallo roborari posse ferrum in aciem uel mucronem elaboratum, nisi chalybe, qui Græcis stomoma dicitur. Quo fit, ut illorum pertinaciam mirari non desinam, qui aliter sentiunt. Ex his itaq; haud dubie credendum arbitror, non aliud esse stomoma, quàm chalybem, qui cum à primordijs semper fuerit expetitus ad ferreorum instrumentorum aciem roborandam, quam aciem Græci σῶμα uocant, pariter chalybem stomoma uocarunt. Quapropter dicebat Aëtius, sit ferrum, quod in ipsis extinguitur, stomoma. Hoc autem uocabulum putauerim ego ortum esse à σῶμα, quod Latinis os sonat. Accies enim, itemq; mucrones, gladijs, et telis, alijsq; ferreis instrumentis usum nullam alium præbent, quàm oris. unde Latinis quandoq; dici solet, eos, quibus ob malefacta caput abscinditur, in ore gladij perijsse. Plinius quoq; licet ignorauerit, quid Græcis significaret stomoma; chalybem tanen aciem, quæ Græcis σῶμα dicitur, appellauit libro xxxiii. cap. xiiii. sic inquit. Ex omnibus autem ferri generibus Serico palma est. Seres hoc cum uestibus suis, pellibusq; mittunt. Secunda Parthico, neq; alia genera ferri ex mera acie temperantur: ceteris enim admiscetur. hæc Plinius. Ex quibus palam est, id hoc loco Plinio aciem uocari, quod chalybem etiam Latini appellant, quodq; nos corrupto nomine ab acie, uel ab acuendo uulgò uocamus accisio, quemadmodum et Galli acier, et Hispani acciel suo idiomate dicunt. His igitur tum rationibus, tum autoritatibus freti, σῶμα potius à σῶμα, quàm à uerbo σῶμα ortum habere putamus: quanquam etiam eorum opinio, qui à σῶμα σῶμα dictum existimant, non sit

non sit omnino improbanda, quod id uerbum roborare, durum facere, aciem & mucronē inducere Græcis designet. Sed neq; illos quoq; prorsus aberrare crediderim, qui scobem ab acie, & mucronibus, dū super lapide rotante acuum-  
tur arma, derasam, stomomatis squamam esse censent. ueruntamen hæc, quod sit lapidis illius ramentis admixta, non  
perinde ac sincera probanda uidetur.

Ἰὸν ἔρυσον. *AERUGO RASILIS.*

CAP. LI.

**AERUGO** rafa fit ijs modis. In cadum, aut aliud consimile uas, acetum quàm acerrimum in-  
funditur: superponitur inde inuersum æneum uas, presertim concameratum: sin minus, planum:  
sitq; obstructum, nullumq; habeat spiramentum: exempto, quo doliolum obturaueris, oper-  
culo, decimum post diem insidens ærugo deraditur. Aut æris lamina in cadis super acetum ita su-  
spenditur, ne ipsum attingat, & totidem post dies raditur. Aut massula æris, aut lamina una plures-  
ve uinaceis non recentibus, sed iam acescentibus condutur, & simili modo uersantur. Quinetiam  
ex delinata æris scobē æruginem facere licet: necnon è laminis, quibus bractæ auri cōclusæ mal-  
leo ducuntur, si quis eas acetō respargat, & ter aut quater uerset, donec æruginē contrahant. Tra-  
dunt æruginē in Cyprijs metallis gigni, lapidibus quibusdam nonnihil æris habentibus, quibus  
ærugo efflorescit: adduntq; per Caniculæ ætus è quodam specu manare: sed illam paucam, & o-  
ptimam esse: hanc speluncis effluentem, copiosam quidem, & boni coloris, sed uitiosam, quod la-  
pides multos collegerit. Pluribus autem modis adulterant. aliqui pumice admisto, alij marmore,  
alij atramento sutorio. Sed deprehendemus pumicē, aut marmor, dum pollice sinistrae manus ma-  
defacto, æruginis portiunculam altero atterimus: siquidem eam diffundi constat: marmoris au-  
tem, pumicisque partes coeunt non dissipatæ, demumq; tractatione crebra, & humoris comple-  
xu dealbescunt. quin & dentium appressu: siquidem syncera cedit, læuis, & sine asperitate. Atra-  
mentum uerò sutorium igne coarguitur: nanq; si fictile, aut lamina adulterata æruginē illinatur,  
& feruenti cinere, aut carbonibus incalescat alterutrum, mutabitur, rubescetq; id, quod atramen-  
tum sutorium acceperit: quod id uisum suapte natura talem fortitur colorem.

Ἰὸς σκώληκος. *AERUGO SCOLECIA.* CAP. LII.

**AERUGINIS**, quam uocant scoleciam, duo sunt genera. quædam fossilis est, altera factitia  
ad hunc modum. In mortario Cyprij æris dimidiam heminam aceti albi acrisq;, pistillo cupreo  
conterito, donec strigmenti crassitudinem imitetur: deinde aluminis rotundi drachmam unam,  
cum salis fossitij translucentis, aut marini quàm albissimi, solidique, aut certè cum nitri pari pon-  
dere teritur in sole æstuosissimis diebus, sub syduz Caniculæ, donec colorem æruginis contrahat,  
& concretu strigentosum fiat: ubi autem se in uermiculorum Rhodiæ similibus speciem coe-  
gerit, recondito. Efficax, & ualde boni coloris redditur, si duas partes urinæ ueteris, cum una aceti  
adieceris, & alia, quæ dicta sunt, peregeris. Sunt qui æruginem rasilem, quæ in apparatu non re-  
spondit, gummi misto digerant in formas, & ita uendant. quod genus, ut uitiosum, improbat.  
Fit & quædam ærugo ab aurificibus, mortario, & pistillo Cyprij æris, cum urina pueri impubis,  
qua aurum ferruminant. Antedicta æruginum genera uisio æri omnino respondent, sed magis effe-  
ctu ualent. Sciendum fossilem scoleciam præstantissimam esse: derasam sequi: postremo loco fa-  
ctitiam. mordacissima tamen est hæc, & magis adstringens. Aurificum autem ærugo rasæ respon-  
det. Aerugines omnes adstringunt, extenuant, excalfaciunt. oculorum cicatrices emendant, la-  
crymas cient, nomas sistunt, vulnera ab inflammatione tuentur. vlcera ex oleo ceraq; ad cicatri-  
cem perducunt: callos, & sordida ulcera purgant, cum melle coctæ: callum fistularum erodunt  
cum ammoniaco, collyrij modo in eas adaptæ. ad gingiuarum autem excrescentias, & extubera-  
tionem utiles. Magnopere extenuat genarum crassitiem, cum melle illitæ: verum post illitionem  
spongia ex aqua calida locus fouendus est. resina terebinthina exceptæ, cum ære & nitro lepras abi-  
gunt. Vritur ærugo, quancunque uelis, minutissimè fracta, comminutaq; in fictili patina, fla-  
grantibus prunis superposita: versaturq; donec se mutet, & colorem cinereum concipiat: postea  
refrigerata reponitur ad usum. Sunt qui cruda olla eam urant, uti dictum est: sed non prorsus eun-  
dem colorem cremata reddit.

**AERUGINEM**, quod colore sit uiridi, officinæ, ac medici in Italia æs uiride nuncupant, & uulgari sermone  
uirde rame. Verum quauis officinæ eo in uniuersum abundant; sinceri tamen parum ostendunt. Scolecia ærugi-  
ne, ac fossitia destituimur: quod aliter, quod sciam, hoc tempore non paretur, altera uerò ab ærarijs fodinis, ubi for-  
tas plurima reperitur, à fossoribus non deferatur. Proinde ciam harum copia non sit, ea tantum utimur, quæ ære in  
acetarijs cadis demisso, aut uinaceis iam acescentibus obruto, conficitur. Hallucinantur, qui credunt æruginem, &  
æris florem unum, & eandem rem esse, ut superius de æris flore differentes latius ostendimus. Aeruginum uires  
reddidit Galenus libro ix. simplicium medicamentorum, sic inquit. Aerugo gustantibus acrem qualitatem offert:

Aeruginum  
confider.

Aeruginū ui-  
res ex Cal.

digerens, detrahens, & liquans, non teneram modò, sed & duram carnem. Porro suprà dictum est nonnullos eius generis medicamenta, epulotica, hoc est, quæ cicatricem inducant, appellare, cum ijs in tenuissimum pollinem tritis per specilli cuspide contigerint ulcera excrecentia, ac postmodò contracta reperiant, tametsi illos haud lateat, si paulò plus impositum foret, sese ulcus non contractum, sed erosum inuenturos. Siquidem colliquat, & digerit carnem: cum medicamenta epulotica contrahant, constipent, cōstringant, & calli in morem illam indurent. Quin & gustum mordicat ærugo, non tantum ipsa ulcera. quòd si pauculum eius ceraso non pauco admisceas, id quod ex ambobus mixtum est, citra morsum exterget. Dictum uerò suprà est de talium medicamentorum natura, tum ut sese quidam salunt ex talibus compositionibus, aut sarcoticam, aut epuloticam adscribentes facultatem medicamenti, quibus minime oportet: utpote cum ipsa id præstare nequeant, uerum ea, quæ ex ipsis composita sunt.

Ῥύσ σιδέρου. RVBIGO FERRI.

CAP. LIII.

RVBIGO ferri restringit: sistit scæminarum profluvia admota, potuque præstat ne concipiant. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papularum eruptionibus medetur. Perquam utilis ad scabritias genarum, reduuias, & pterygia. Condylomatis prodest, gingiuas firmat, podagras illita lenit, alopecias replet. Vinum aquaue, in qua candens ferrum sit restinctum, potu celiacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur.

Σκωρία σιδέρου. STERCUS FERRI.

CAP. LIV.

STERCUS ferri, quam scoriam uocant, eadem potest, quæ rubigo, sed inefficacius. Aconito ex aceto mulso potum, opitulatur.

Rubiginis, & scoriz ferri consider.

Scoriz vires ex Galeno.

FERRUGO, quæ est ferri rubigo, vulgaris notitiæ est. Eius similiter scoria, quæ Latinis & stercus, & recrementum ferri, & nostris uulgò spuma di ferro appellatur, omnibus notior est, quàm ut maiore indigeat declaratione. hæc nanque prope ferrarias officinas passim in acervum congesta spectatur ab omnibus. Veruntamen ne aliquis fortasse decipiatur, illud nobis indictum non abibit, quòd ferri, aut æris, aut argenti scoria non est squama, quæ malleo decutitur. Siquidem hæc ferrarijs fornacibus, quibus ferri metallum funditur, indita liquefcit, & iterum in ferrum coit. Scoria uerò, quòd inutile sit ferri recrementum, inane, & spongiarum modo spumosum, nunquam ferrum effici potest. Scoriz meminisse Galenus libro 1x. simplicium medicamentorum, sic inquit, Scoriz omnis rescicatorium admodum medicamentum est, potissimum autem ferri. Siquidem ad leuiorem redigens ipsam in aceto quàm acerrimo, posteaq; decoquens, ad aures, quæ longo iam tempore pure fluxerunt, ea uitor, medicamento maxime excicatorio, adeò ut mirentur, qui præparantē me uident, & ante rei periculum fidem non habeant, aures tale posse ferre medicamentum. Porro argenti scoriam propriè helcysma appellant, Verim emplastris, quibusdam rescicatorie facultatis commiscetur.

Μόλυβδος πεπλυμένος. PLUMBVM ELQTVM.

CAP. LV.

LOTURA plumbi sic fit. In mortarium plumbeum aquam iniiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut lutulenta reddatur: linteo deinde colato, 2-40. quam superinfundens, quòd facilius quicquid est resolutum incerni possit. hoc iterum facito usque dum satis tibi habuisse uideatur. ubi confederit priore aqua effusa, nouam adiiciens, ut cadmiam lauato, donec nulla extet nigritia: postea in pastillos cogens reponito. Quidam scobem mundi plumbi lima quæsitam, mortario pistilloque lapideis terunt, aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat: mox ubi id pessum erit, effusa aqua, colligunt in pastillos. nam tritum vehementer, cerussæ simile redditur. Alij elimatæ scobi modicam plumbaginem adiiciunt, affirmantes ita elotum plumbum præstantius esse. Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire, explere caua, sistere oculorum fluxiones, & vlcera excrecentia. Sanguinem supprimit: prodest contra sedis vlcera, condylomata, & hæmorrhoidas, ex rosaceo: item ad ea, quæ ægrè cicatricem ducunt: & in totum spodij effectus præbet, nisi quòd non obducit cruftas. Syncerum 50 plumbum affrictu, marini scorpionis, draconisque plagis auxiliatur.

Μόλυβδος κεκαυμένος. PLUMBVM VSTVM.

CAP. LVI.

VITRUM plumbum sic. Super quàm tenuissimas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur inspargito: additisque aliis rursum laminis, interiecto semper sulphure, usquedum vas expleueris, succendito. flagrante autem plumbo, ferrea rude versato, donec perfecte redigatur in cinerem, nihilque è plumbo non vstum hæserit. tum demum obstructis naribus eximito: alioquin halitus plumbi noxius sentitur. Aut elimatam plumbi scobem in olla sulphure vrito. Alij laminas in fictili crudo, ut dictum est, imponunt fornaci, aut foco, & circumlinentes operculum, dato exili

exili spiramento, vrunt. Alij pro sulphure cerussam, aut hordeum inspargunt. Alij integras laminas imponentes, acri igne vtuntur, & radícula ferrea continuè mouent, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis huiusmodi vstio, & si vehementius vratur, contrahit spumæ argenti colorem. Magis tamen nobis placet prima vrendi ratio. Plumbum vstum lauatur vt cadmia, & reconditur. Eisdem effectus habet, quos plumbum elotum, sed multò acriores.

*Plumbum elotum*

Σκαγία μόλιβδου. RECREMENTVM PLVMBI

CAP. LVII.

RECREMENTVM plumbi, quod scoriam vocant, optimum est, densum, fractu contumax, cerussam planè repræsentans, nihil plumbosi habens, quod ad luteum colorem accedit, & vrit splendorem imitatur. Eadem, quæ plumbum exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infusa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ luteum colorem duxit: idque sæpius, dum recrementum absumatur. Dein vbi confederit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos.

*Plumbum vstum*

Μολυβδοειδής. MOLYBDOIDES, SIVE LAPIS PLVMBARIVS.

CAP. LVIII.

MOLYBDOIDES lapis à plumbi similitudine dictus, respondentem recremento vim habet, & eodem modo lauatur.

PLVMBI abluendi, atq; etiam comburendi ratio, adeò lucidè constat à Dioscoride prodita; ut operæpretium non sit plura de ea referre. Veruntamen animaduertendum est, plumbi recrementum, quod Dioscoridi scoriam vocatur, non esse plumbaginem, quæ excrementi instar, ubi plumbum igne liquefcit, ab eo secedit. Quippe quòd hæc nil aliud sit, quàm purissimum plumbum, quod ignis vstione, cineris speciem induit. Hæc enim in plumbarijs officinis in purissimum plumbum facillè redigitur, quemadmodum & argenti spuma. Plumbi itaq; scoriam fit tantum in fornacibus, ubi plumbi lapis metallicus funditur. Siquidem hoc probè fuso, artifices plumbum, quod inde effluxit, in scrobiculam extra fornacem delabi sinunt. Vbi uerò adhuc calens concreuit, aqua frigida perfunditur, quousq; scoriam exuat, quæ (ut Dioscorides inquit) densa admodum est, & fractu contumax, colore in luteum uergente, & uitri splendorem præ se ferens. Huius complures uidimus acervos in Tridentino agro, ac etiam in comitatu Tirolensi, ubi innumeræ metallorum fornaces, die noctuq; ignibus aguntur. namq; in ijs locis metallorum recrementa, extra officinas abijciunt, monticulos ex his struentes. Quòd si accidat metallicos lapides agrè igne in fornace liquefcere, scoriam huiusce partem admiscet, quoniam huius adminiculo citius metalla ignibus cedunt. Reperi ego sæpius plumbi, argentiq; scoriam adeò uersicoloribus lineis intersectâ, pellucidanq; ut id uitri genus, quod uulgò Venetijs appellant Smalto, omni ex parte referret. Quare oportet eos, quibus in animo est, certam et exquisitam harum rerum cognitionem assequi, metallorum fodinas, & fornaces adire, nò autem ea in pharmacopolijs querere, ubi omnia ferè metallica medicamenta spuria, & adulterijs uitata reperiuntur. Ceterum qui Lapidem plumbarium, siue molybdoidem hodie legitime ostendat, habeo profectò neminem, ni fortè fossilis quoddam cadmiæ genus demonstrent, quod plumbum colore imitetur, qualis illa, quam uulgò uocant Marghesita di stagno: quanquam hanc equidem molybdoidem esse non auctus affirmare, quòd nullum latius Molybdoidis historiam scriptis mandasse compererim, quàm ipse fecerit Dioscorides. qui tamen eius historiam tam paucis perstrinxit, ut difficile admodum sit discernere, quinam lapis nobis legitimam molybdoidem repræsentet. Et si fortasse non aberrarent, qui dicerent, plumbi lapidem ignem in fornacibus non expertum, ueram esse molybdoidem. quippe quòd hic colore, & pondere plumbum maxime referat. De plumbo diffusè satis disseruit Galenus libro 1x. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. Plumbum facultatis est refrigeratoriæ. Siquidem non modò multam habet substantiam humidam à frigore cōgelatam; sed et æream, paucam autem terream. Igitur quòd plurimum habet essentiæ humidæ à frigore coactæ, indicium tibi esto, quòd ubi admotum est igni, celeriter fundatur, fluatq;. Quòd uerò & ærea sit particeps, hoc habeto signum omnium, quæ nouimus, unicum plumbum tum mole ipsa, tum pondere augetur, si condatur in ædibus subterraneis, ærem habentibus turbidum, ita ut quæcunq; illic ponantur, celeriter situm colligant. Tum etiam plumbea statuarum iuncula, quibus earum pedes annectuntur, sæpenumero creuisse uisum est, & quedam adeò intumuisse, ut ex lapidibus dependere crystalli modo. Atq; hæc probabiles quidè sunt humiditatis eius, frigiditatisq; notæ, priusquàm experimentū fiat: ceterum scientificæ, & certæ per experientiam cognoscuntur. Præparato igitur mortario, simulq; pistillo, utrisq; ex plumbo, infunde quemlibet liquorem: itaq; tertio, ut & pistillum, & plumbeum mortarium succum quandam reddat. Id quòd ex utroq; constabit, multò erit frigidius facultate, quàm liquor ipse fuerat. Licet autem & aquam, & uinum tenue aquicum, & oleum iniicere, aut quiduis eiusmodi. At si etiam plus efficere succum uoles refrigeratoriū, oleum omphacinum sit, aut rosaceum, aut melinum, aut myrrinum. Porro si succo, qui proueniet, uti uoles, optimum habebis remedium & ad phlegmonas in sede cum ulcere, aut rugis, & ad eas, quæ in pudendis, testibusq;, & uberibus consistunt: similiter aduersus cæteras omnes fluxiones incipientes, quæ aut in inguina, aut in pedes, aut in aliam quémuis articulum decumbunt. Sed & ulceribus rebellibus utile est. Nam & ad cancrofa eo utens, uirtutem medicamenti mirabere. Quòd si celeriter multum plumbei succi colligere uoles, conare in sole terere, aut quocunq; certè modo ære excalfacto. Ad multa autem utile habebis medicamentum, si aduso refrigerantium succorum quopiam te-

Scoriam plumbi consider.

Lapidis plumbarii confid.

Plumbi facultates ex Gal.



ras, seu semperuiui, cotyledonis, intybi, lactuce, chondryllæ, psyllij, omphacis, portulacæ. Porro si qua horum non facile in succum soluantur, uelut portulacæ, misceto illis aliorum succorum quempian, uelut omphacis, quæ et ipse per sese prædicto mortario inditus, medicamentum efficit refrigeratorium longè pulcherrimum. Qui et in laminam diductum plumbum absq; alio ullo, ipsum per sese athletarum sese exercitantium lumbis insternitur, ubi ueneris somnijs uexantur scilicet: nimirum haud obscure eos refrigerans. Sed et bractea ex plumbo tenuis facta, probè ganglio illigata, planè ipsum dissipat. Illigabit autem probè quisquis ab Hippocrate didicerit, in ipsam noxam potius frmandum, quàm hinc uel inde. Mirum ergo non est, si plumbum crematum, ac rursus ablutum, refrigerantis efficiatur facultatis, cum ante lotionem mistæ fuerit. Et hoc ipsum medicamen, nempe plumbum combustum, bonum est ad ulceræ rebellia. Vbi uerò lotum fuerit multò optimum medicamentum est, et ad ulcerum impletionem, et ad eadem cicatrice obducenda. Conuenit et chironæis quæ uocant ulceribus, et cancrofis omnibus, et putredinosis, tam ipsum per sese, tum medicaminum ad cicatricem perducentium quibusdam commistum, quale est, quod ex cadmia conficitur. Ceterum soluendum est principio, si copiosa sit sanies, quotidie: sin minus tertio, aut quarto quoq; die. Verum foris spongiam imposito aquæ frigide, quæ si desiccetur, rursus mergatur. Sed hæc fusius, quàm pro instituto diximus, plusculum sermonis affinitate prouecti. At tempus iam est sequentia deinceps persequi.

Στίβιον

STIBIVM.

CAP. LIX.

**STIMMI** optimum, quod splendidissimum est, modoque nitèdularum emicat, confractu crustosum, nihil terræ, aut sordidi habens, friabile, quod stibi appellant, alij platyophthalmon. Vis eius adstringere, meatus obstruere, refrigerare, excrescentia in carne cohibere, ulcera ad cicatricem perducere, sordes, & ulcera oculorum expurgare: sistit & sanguinem è cerebri mèbrana profluentem. & ut in uniuersum dicatur, uis usto plumbo similis est. Priuatim, ambusta igni in pustulas erumpere non patitur, cum adipe recenti illitum. crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cera, & exigua cerussa. Torretur pinsita farina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec carbunculetur crusta, exemptumque restinguitur mulieris lacte, quæ marem peperit, aut uetere uino. Vritur etiam carbonibus succensis efflatum, quoad igni deflagret: si enim paulò magis concremetur, plumbum fit. Lauatur ut cadmia, & æs. Sunt qui ut plumbi recrementum eluant.

Stibij consideratio.

Brasauoli erratum.

Stibij uires ex Galeno.

**STIMMI**, siue Stibium, recentioribus medicis, chymistis, ac seplasiarijs, qui Mauritaniorum doctrinam sectantur, Antimonium dicitur, quod hoc nomine Serapio, et Auicenna Stibium appellauerint. Huius fodinæ pluribus locis habentur in nostro Senensi agro, sed præstantissimum foditur in maritimis nostris Massano solo, ac Suanensi: quinetiam in comitatu sanctæ Floræ prope Syluenam oppidum. Venetias adfertur ex Germania, fornacibus prius fustum, et in massas concretum. Aiunt artifices, qui campanas constant, has edere sonitum magis concinnum, magisque auribus gratum, ac sonoriæ, si stibij nonnihil ceteris admisceatur metallis, dum una in fornace liquantur. Vis etiam expetitur, qui uasa è stagno conficiunt: item ijs, qui metallica faciunt, et poliunt specula: ijs præterea, qui chalcographis characteres, et typos effingunt. Id tantam differentiam esse inter plumbum, et stibium ait Brasauolus Ferrariensis, quod plumbum ignium ui liquecat, stibium uerò nunquam, sed facile teratur in puluerem. Sed eius opinionem falsam esse deprehendit experimentum. quandoquidem stibium igni admotum, perinde ac plumbum colliquescit, et fluit. Cuius rei nos sæpius periculum fecimus, dum oleum nostrum ex stibio conficeremus, quo quidem magno successu utimur ad contumacia, sinuosq; ulcera sananda. ad id siquidem stibium pluries fundere oportet, ut syncerus, puriusq; reddatur. Ceterum admonitos lectores uolumus, oleum hoc nostrum è stibio paratū, non illud esse, quo chymiste argentum in aurum mutari fabulantur, sed aliud ab eo longè diuersum: tametsi hoc nostrum ex sese plus auri fundat, quàm illud chymistarum. Sed ut ad institutionem nostram reuertamur, mihi planè uanū uidetur asserere stibium igne haudquaquam liquecere. Nam cum quolibet metallo, siue ferrum sit, siue chalybs, in fictili fusorio permixtum, ea celerius eliquandi præbet materiam. Quam ob causam qui ferreos, sphericosq; globos bombardis immittendos è fuso ferro conformant, nisi stibium ferro admiscerent, nunquam sanè (ut pro certo affirmant) id fluxum facerent.

Stibij mentionem fecit Plinius lib. xxxiii. cap. vi. ubi ita scribit. In iisdem argenti metallis inuenitur, ut proprie dicamus, spumæ lapis candidæ, nitentisq; non tamen translucens, stimmi appellant, alij stibium, alij alabastrum, alij larbason. Duo eius genera, mas, et fœmina. magis probant fœminam. Horridior est mas, scabriorq; et minus ponderosus, minusq; radians, et arenosior. Fœmina contra nitet, friabilis, fissurisq; non globis debescens. hætenus Plinius. Stibij uires retulit Galenus libro ix. simplicium medicamentorum, his uerbis. Stimmi ad facultatem desiccantem adiunctam habet hoc medicamen adstrictionem: quonobrem et ocularibus medicinis commiscetur, et illis scilicet, quæ conformantur in collyria quæ uocant, et siccis, quæ utique sicca collyria cognominant.

Μολύδαϊνα. MOLYDAENA, SEV PLUMBAGO. CAP. LX.

**MOLYDAENA** optima est flaua, argenteæ spumæ æmula, modicè splendens, cum teritur rufa, cocta cum oleo iecinoris colorem trahit. Vitiosa est, quæ aërem, aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro, & argento. Est etiam quædam fossilis, ad Sebastiam, & Corycum inuenta. Quo

11. Quo in genere probatur, quæ lapidosa non sit, aut recrementosa, sed nitens, & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut recremento plumbi similem. Vritur, lauaturque eodem modo. Miscetur conuenientissimè medicamentis, quæ liparas vocant, atque emplastris minimè mordentibus. Carnem recreat, & vlcera ad cicatricem perducit: glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conuenit.

**MOLYBDAENA**, ut Dioscorides testatum reliquit, factitia est, & fossilis. Factitia fit in fornacibus, ubi auri, & argenti metallum funditur. quandoquidem ubi auri, uel argenti uena, siue materia, plumbi tantum sibi admixtum non habet, quantum ad eius liquationem moliendâ satis esset, qui operi præsumt, aut lapidem, à quo plumbum elicitur, aut plumbum ipsum superaddunt, quod tamen ignium ui partim cum admistis metallis coit, partim uerò argenti spumæ modo fornacis folio cobaret, & in molybdenam uertitur. Hoc itaque cum probè nouisset Plinius, libro xxxiii. capite xvi. de hac Molybdæna disseruit ijs uerbis. Plumbi nigri origo duplex est: aut enim è sua prouenit uena, nec quicquam aliud ex se parit: aut cum argento nascitur, mixtisq; uenis conflatur. Eius, qui primus fluit in fornacibus liquor, syncerum appellatur plumbum: qui secundus, argentum: qui remansit in fornacibus, galena, quæ portio est tertia addita uenæ. Hæc rursus conflata dat nigrum plumbum, deductis partibus duabus. Idem præbet argenti spuma, quæ Græcis lithargyros dicitur. hætenus Plinius. quoniam facile asserere ausim, nil aliud esse Molybdenam, quam lithargirij speciem, quæ postquam è fornace fluxerit metalla, in ipsius fornacis fundo concreta, perustaq; residet. Proinde non ab re dixisse uidetur Galenus, quòd Molybdæna iisdem polleat uiribus, quibus & argenti spuma. Quæ autem in terræ uisceribus fossilis nascitur, nil aliud sanè fuerit, meo iudicio, quam metallicus ille lapis, qui plumbum, & argentum simul continet. Hunc equidem testari possum uaria se facie ostendi: quippe quòd alius sit colore luteo; alius cinereo, alius ceruleo, alius uerò scintillans cernatur, atque nitorem præ se ferens, pro uarijs, ac diuersis terræ uaporibus, qui in metallicos lapides feruntur. Quòd autem eiusmodi sit Molybdæna fossilis, testis est Plinius libro xxxiii. capite xvi. ubi sic inquit. Est & Molybdæna, quam alibi galenam uocauimus, plumbi, & argenti uena communis. Et libro xxxiii. capite vi. ita scribit. Argenti metallum terra est, alia rufa, alia cinerea. Excoqui non potest, nisi cum plumbo nigro, aut cum uena plumbi, quam galenam uocant. hæc Plinius. Caterum palam est, molybdenam factitiam nihil à lithargyro differre. Hoc non latuisse Galenum, eius uerba declarant libro ix. simplicium medicamentorum, dum ait. Molybdæna similem lithargyro uim possidet, tantum à media temperie ad frigidum paululum quid recedens. Sed nec abstergentis facultatis est particeps. Vtrique autem hæc medicamina liquari possunt: ac non ut lapides, & cadmia, & arena liquationem respuunt, sed celerrimè liquantur, ubi oleo additum nonnihil aceti est: liquantur tamen etiam admista aqua, sed diutissima coctione. Porro & ceu in Cypro cadmiam, quæ in montibus, & riuis nascitur accipiebant, quæ & ipsa lapidis, ut dixi, species est; ad eundem modum molybdenam multam, cum alijs proiectam lapidibus conspexi in uia, quæ ad Ergasteria ducit à Pergamo. Vocatur autem Ergasteria pagus quidam, in quo & metalla sunt inter Cyzicum, & Pergamum quadringentis, & quadraginta stadijs distans à Pergamo.

Molybdænæ consider.

Molybdænæ uires ex Gal.

## Αργύρου κρημνία. ARGENTI RECREMENTVM. CAP. LXI.

12. **RECREMENTVM** argenti, quod scoriam vocant, aut helcysma, aut encauma, molybdænæ vim habet. quare emplastris, quas phæas appellant, additur, ac medicamentis, quæ cicatricem obducunt, utpote cum adstringat, extrahatque.

**COMPLURES** argenti scorie acervi, quam uulgò Loppa uocant artifices, extra fornacum domos iusuntur in agro Tridentino prope Perzenum, & Lauisum, & in comitatu Tirolensi, ubi perpetuò argenti metallum in fornacibus uritur, ut in præcedentibus diximus de plumbi scoriam differentes. Facie hæc utrum, quod Veneti ab inditis quibusdam uulgò Smalto dicunt, adeò refert, ut perdifficile sit alterum ab altera dignoscere. Varijs hæc coloribus conspicitur, pro admistorum (ut opinor) fossilium uarietate: nigricat tamen cum plurimùm, & quibusdam exaratur lineis cum ceruleis; tum etiam uiridibus: Nec deest etiam quæ uiridi tantum, & quæ solam ceruleo spectetur colore. Huic uires reddidit Galenus libro ix. simplicium medicamentorum, his uerbis. Argenti scoriam propriè helcysmam appellant. Emplastris quibusdam resicatorie facultatis commiscetur.

Argenti scorie considera tio.

## Λιθαργύρος. SPUMA ARGENTI. CAP. LXII.

**SPUMA** argenti quædam gignitur ex arena, quam molybdein vocant, in fornacibus conflata; donec perfectè igni incandescat: altera ex argento: tertia ex plumbo. Probatissima est Attica: secunda Hispaniensis: has sequitur, quæ fit Dicæarchiæ, id est Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia. plurima enim hisce locis è flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, chrysitis appellatur, omnium optima: quæ in Sicilia, argyritis: quæ ex argento, calabritis. Vis autem adstringere, mollire, explere caua, excrescentia in carne reprimere, ad cicatricem ducere, refrigerare, & occludere. Vritur argenti spuma, confractis partibus ad magnitudinem iuglandium prunæ superpositis: ita accensa tollibus, ut conflagret, abstergitur infidens spurcicia, & reconditur.

reconditur. Aliqui ter aceto, aut vino restinguentes, rursus vrunt, & eadem profecuti, reponunt. Lauatur vt cadmia. Vt argyritidi nominatæ, aut, si desideretur, alteri candor detur, ea in partes magnitudine fabarum confracta, chœnicis Atticæ mensura, fictili nouo superfusa aqua, addito candi tritici pari pondere, priuatimque pugillo hordei, linteolo puro, raro, ansulis vasis alligato, coquitur, donec hordeum fractum dissiliat. deinde omnia in nouum craterem oris ampli transfunduntur: triticū abijcitur, spuma argenti vehemēter manibus affricando, infusa aqua lauatur, assiccataque in Thebaico mortario teritur, affusa feruente aqua, donec soluta fatiscat. Excolata aqua, iterum tota die teritur, & vesperi infusa calida aqua finitur: mane colis excernitur, alia infunditur, atque ter die excolatur. Id septem diebus fieri solet: postea additis ad singulas minas spumæ argenti, quinis salis fossilis drachmis, infusaque calida aqua, ter die teritur, & addita aqua excolatur: cumque inalbuerit, calida infusa, idem facito, dum nullam prorsus falsedinem respiciat. demum ardentissimo sole siccata, eiecto prius humore reconditur. Sin minus mina spumæ argyritidis diligenter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile nouum conijcitur, aqua infunditur, ita vt superemineat: mouetur quotidie mane & vesperi, aquaque superinfunditur, priore nequaquam effusa. hoc fit triginta diebus: nanque nisi moueatur, crassescit vsque ad duritiem testæ. Post hæc effusa leniter muria, in Thebaico mortario spuma argenti teritur, coniectaque in fictile aquam continens, manibus diligenter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum falsuginis indicium præbeat. deinde quod ex argenti spumæ candidum apparet, in vas aliud transfertur, & reductum in pastillos, plumbea pyxide conditur. Alij spumam argenti in fabarum magnitudines confractam, in ventre suillo crudo ex aqua coquunt, dum viscus eliquescentis contabescat, exemptamque cum sale pari terunt, & vt suprâ dictum est lauant. Sunt qui salis libram vnâ, & spumæ argenti tantundem, in sole terant, aqua continuè mutata, dum candor ei detur. Alia ratio. Sumito quantam vis argenti spumam: vbi lana candida inuolueris, fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum recentium, repurgatarumque decoquito: cumque fabæ disruptæ dehiscant, lanaque non denigretur, exemptam argenti spumam, & altera lanâ inuolutam, iterum coquito, cyathum aquæ, & parem fabarum modum adijciens. eadem tertio, quæ suprâ, facito: in summa tantisper, dum lana iam non inficiatur. Insuper transfundens in mortarium, ad singulas salis fossitij libras, adijcito octogenas spumæ argenti drachmas Atticas, & terito: intermittensque nitri quàm albisimi cum aqua diluti drachmas quadraginta septem indito: iterum terito, donec satis candoris contraxisse videatur. Ita autem fundens eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, vbi considere desierit, colato: tum nouam superadijciens aquam, manibus probè versatam, finito vt confidat, ac rursus per colum traicito. Alternis eadem prosequere, dum pura aqua, dulcisque effluat, & nullam falsedinem præ se ferat. Postremò in fictile nouum translata, colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus sub Caniculæ sydus exponito, & siccata vtitor. Enotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum sceditates tollendas, ad rugosas facies, & cicatricosas, laceratasque, & macularum plenas.

Spumæ argenti  
consider.

**Fit plerumque** Argenti spuma, quam Greci lithargyrum uocant, ea inquam, cuius hodie apud seplasiarios est usus, in metallorum fornacibus, ubi repurgatur argentum, è plumbo argenti recrementis admisto. Sic quidem cum artifices argenti massam à sua uena defluxam à commistis metallis, nempe plumbo, æreque, repurgare uolunt, in alueum è cinere suo more paratum, plumbi multum conijciunt, adeo ut ui subditi ignis colligatum, balnei speciem referat. In hoc demum argentum repurgandum immittunt, quod plerumque (ut diximus) aut plumbum, aut æs habet admistum. Dum autem hæc perficiuntur, uisitur plumbum in liquecentium metallorum superficie, ignis ui folium flatu continuè excitata, olei modo supernatans. quod tandem postquam æs, aut plumbum, quod prius argento fuerat admistum, in se contraxit, eorundem folium flatu ad cinerei alui oras pedetentim expellitur. Hoc cum uident artifices, alueum in latus secant, labique sinunt in humum: fitque hoc modo lithargyrum, coctionis diuturnitate, & metallorum aliorum mistione, ea forma concepta. Huic, postquam refriguit, quandoque aureus; quandoque argenteus emicat splendor. Quo factum est, ut hunc argenteum, illum aureum passim seplasiarijs ac medicis dicatur, omnino existimantes, alterum ex auro, alterum ex argento consilari. Ceterum coloris huiusce uarietatem lithargyrum haudquaquam ex auri, uel argenti spuma contrahit, sed quod plus, minusue ærei uaporis ab argento detracti, intra se receperit. Siquidem (ut ego pluries experientia comperi, & ipsi quoque testantur artifices) argentum depurandum si plurimum fului æris contineat, huius & plumbi mistione, lithargyrum aureus redditur: sin minus, argenteus efficitur. Quare nobis affirmare licebit, nil aliud esse lithargyrum, quàm plumbum æris uel argenti uaporibus commistum. Non itaque temere prodidit Dioscorides fieri argenti spumam aut ex arena, quàm molybdium uocant, aut ex argento, aut ex plumbo. Cui subscribit Plinius libro xxx. cap. vi. Meminit argenti spumæ Galenus libro ix. simplicium medicamentorum, sic de eius uiribus scribens. Lithargyrum desiccatur. quidem, uelut alia omnia metalla, lapides, terrenaque medicamenta, uerum omnium id efficit moderatissime: & secundum alias tuas qualitates, tam facultates, quodammodo in medio est, neque manifestè exalasciens, neque refrigerans: modica tamen adstringendi, abstergendique facultas ei inest. quamobrem inferior est & sarcoticis medicamentis, quæ mediocriter extergentia ostendimus, & contrahentibus, atque adstringentibus. Ceterum ad intertrigines femorum utilis medela est: quandoque

Lithargyri uires  
ex Gal.

striusque iam dictæ facultatis leuiter est particeps. Iure itaque medij ordinis in metallicis habebitur. Proinde ea frequenter utimur ceu materia ijs miscentes, quæ ualentem facultatem obtinent, siue mordicantem, siue adstringentem, uel aliud quippiam efficientem; sicut in liquecentibus ad pleraque medicamenta ceram adhibemus tanquam materiam, quia scilicet & ipsa quodammodo medium tenet eorum, quæ ualentem facultatem possident.

Χρυσοκόλλα. CERVSSA. *Styracis* CAP. LXIII.

CERVSSA fit hoc modo. Infuso in urceum oris lati, aut fictile labellum quàm acerrimo aceto, laminam plumbeam supra fictilis spiraculum, subiecta prius arundinea tegete, firmato: superiectisquæ velaminibus, ne halitum expiret acetum, ubi resoluta fuerit, defluensquæ deciderit, humorem purum ad summa delatum colato, crassamentumquæ transfundito. debet quoque ficcari in sole, mox trusatili mola teri, aut aliàs tritum cribrari. postea quod superest duri, in tennes partes redigendum, cribrandumquæ. vicissim eadem tertio, quartoquæ faciendâ. Melior, quæ primò cribrata est, & medicamentis oculorum. assumenda. Secundum locum tenet sequens, & reliquæ suo ordine. Nec defunt, qui ligneas rudes in medio vase appendant: & derafo ceu situ imposito, ita ut acetum non contingat, inditoquæ operculo circumlinentes dimittunt. Post dies decem laxato obturamento visunt: cùmquæ resoluta materia fuerit, reliqua, ut suprà diximus, exequuntur. Si autem quis in pastillos uelit digerere, aceto acri subacta, diuiditur in pastillos, qui in sole ficcantur. Aestate tamen supradictum opus obeundum est: ita enim candida, atque efficax redditur.

Quinetiam hyeme paratur, urceis suprà furnos, balnea, aut fornaces impositis: ascendens enim calor idem, quod sol præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut Lacedemone: proximam Puteolis. Torretur hoc modo. Flagrantibus igni carbonibus, fictili nouo, maximè Attico, tritam cerussam imponito, & assidue versato: cùmquæ cinereum colorem traxit, eximens refrigerato, & utitur. Est & aliud vrendi genus. Trita patinis nouis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec colore similis sandarachæ fiat, extracta quæ ad vsus ministratur. Quæ verò ita parata est, Sandyx à quibusdam dicitur. Lauatur cerussa cadmiæ modo. Vis ei refrigerare, occludere, emollire, explere, extenuarequæ: insuper excrescentia leniter reprimere, & ad cicatricem perducere. Miscetur ceratis, & emplastris, quæ liparæ vocantur, pastillisquæ. Est autem lethalis eius potus.

CERVSSA medicamentum est omnibus notum. Fictitia tamen res est. Venetijs plurima conficitur, sicuti & in alijs compluribus Italiæ locis: quod non solum in medicamentorum usus expetatur, seplasiarjs, ac medicis; sed etiam pictoribus, qui ea frequentissimè in suis operibus utuntur. Paratur ex cerussa (ut Dioscorides inquit) Sandyx, quod officinæ Scrapionem secutæ miniûm appellant, non autem Sandarachæ, auripigmenti genus, ut libro de compositione medicamentorum existimat Euchsus. Siquidem Sandarachæ, ut suo loco dicitur, fossilis res est, non autem fictitia. Cerussæ meminit Galenus libro ix. de simplicium medicamentorum facultatibus, ita scribens: *Psimumythium, id est Cerussa, & hoc medicamen testimonium præbet modò dictæ facultati. Nam si ex acri aceto soluatur, gustu tamen neque acre erit, neque mordax, neque discussorium, sed emplasticum, & refrigeratorium: facultatis erugini dissimilimæ, tamen si & illa conficiatur aceto æs dissolvente. Porro cerussa adusta in Sandycæ, quam uocant, transit, medicamentum seipso tenuius, nodum tamen excofaciens. hæc Galenus. Ex quibus liquido patet, Sandycem, & sandaracham maximè inter se facultatibus pugnare. hæc nanque Galeni, & Dioscoridis testimonio arsenici modo carnem excutit, & crustas sua uebementi uredine, ac caliditate morsuquæ uiolento excitat: illa uerò nulla sui parte excofacit, sed potius refrigerat. Id quod in uulgari officinarum minio facile deprehenditur. Sandycis meminisse uidetur Vergilius in Bucolicis, dum his uersibus cecinit.*

*Ipsæ sed in pratibus aries iam suauæ rubenti*

*Murice, iam croceo mutabit uellera luteo*

*Sponte sua Sandyx pascētes uestiet agnos*

Χρυσοκόλλα. CHRYSOCOLLA.

CAP. LXIIII.

CHRYSOCOLLA laudatissima Armeniaca, colorem porri quàm simillimè reddens. Secundum locum sibi vendicat Macedonica: & proximum Cypria. quo in genere præfertur pura: damnatur, quæ terram, aut calculos collegerit. Ratio lauandi hæc est. Tufam infusa aqua, mortario expassa manu ad pilam vehementer fricato, & statim quàm confederit, colato. Alteram infundens aquam, rursum terito. hæc vicissim prosequere, donec pura, synceraquæ spectetur. dein ficcato in sole, & ad vsus recondito. Quod si vtere uolueris, ex ea terens quod satis esse videbitur, patinis supra carbones adponito: & alia facito, quæ suprà diximus. Dos chrysocollæ ad purgandas cicatrices: excrescentem carnem coërcet, adstringit, purgat, excofacit, & modicè corpus mordendo exest. Inter medicamenta intelligitur, quæ vomitiones concitant, & necem inferre possunt.

Chrysocolle  
historia.

CHRYSOCOLLA, ut Plinius est author libro xxxii. capite v. naturalis historie, humor est in puteis, per uenam auri defluens, crassescens limo rigoribus hybernis, usque in duritiam pumicis. Laudatorem eandem in ararijs metallis, et proximam in argentarijs fieri compertum est. Inuenitur et in plumbarijs, uilius etiam auraria. In omnibus autem ijs metallis fit et cura, multum infra naturalem illam, immixtis in uenam aquis leuiter byeme tota, usque in Iunium mensem. Dein siccatis in Iunio, et Iulio, ut planè intelligatur nil aliud chrysocolle, quam uena patris. Natiua duritia maxime distat, luteam uocant. Et tamen illa quoque herba, quam luteam uocant, tingitur. Natura est, quæ limo læuè ad succum bibendum. Tunditur in pila, deinde tenui cribro secernitur, postea molitur, ac deinde tenuius sic cribratur. Quicquid non transierat, reperitur in pila, dein molitur. Pulvis semper in catinos digeritur, et ex aceto maceratur, ut omnis duritia soluiatur. Ac rursus tunditur, dein lauatur in conchis, siccaturque. Hactenus de chrysocolle Plinius. Ceterum seplasiarij, quemadmodum aurifices, Chrysocolle uulgò Borracc uocant, Mauritanos secuti: cum tamen pauca admodum in officinis reperiatur, quæ syncerissima dici possit, et quæ colore sit uiridi, porraceoque, ut Dioscorides inquit, et præstantissima exposcit. Siquidem subnigricat hæc, nec ulla ex parte uirescit. Quæ saturato colore uiret (ut mea fert opinio) in ararijs tantum metallis foditur: quæ nigricat, in plumbeis: quæ albicat, in argenteis: et quæ pallefcit, in aureis. Vnde mihi facile persuasum est, Chrysocolle sibi uarium colorem uendicare, pro metallorum, in quibus foditur, ratione. Porro factitiæ ex alumine rupeo, sale nitro, ac etiam alijs quibusdam admixtis, copia non deficit. Idcirco aurifices, qui ea ad aurum ferruminandum frequentissime utuntur, ipsam magna quidem diligentia seligunt. quanquam et ipsi plerumque decipiantur: tanta in omnibus est impostorum astutia. Præferunt auro ferruminando illam, quæ lutea est: tanetsi in medicamentorum usu, præstantior sit uiridis. Fit etiamnum chrysocolle (ut Dioscorides prodidit libro secundo in urina mentione) ex puero-  
rum urina in æreo mortario, pistillo item æreo sub cæmenti sole tandiu ducta, ut unguenti modo crassescat. Quod pariter literis memorieque mandauit Galenus libro ix. simplicium medicamentorum, sic inquit. Chrysocolle, et hoc medicamentum ex ijs est, quæ carnem liquant, non tamen ualenter mordicat, quanquam sit facultate admodum digerente, desiccanteque. Igitur quidam id modò, quod in metallis inuenitur, ita nominant: alij uerò id, quod in æreo mortario, pistilloque æreo, ex pueri urina præparatur: id quod quidam inter æruginum differentias numerant. Satiùs uerò est ipsum præparare tempore æstiuo, aut certe ære prorsum calido, urinam in mortario terentes. Præstat autem es, ex quo mortarium pistillumque conficias, rubrum sit. Nam quo es tenerius fuerit, eo plus circumagendo pistillo deteritur. Hoc medicamentum aptissimum est ulceribus contumacibus, tum per se, tum alijs mistum, ut in opere de componendis medicamentis referetur. Nunc autem id nouisse sat est, quod quanto plus quam Chrysocolle metalla ca desiccant, minusque mordicat, tanto etiam ipsam excellit tenuitate. Ipsam tamen Chrysocolle illam si uis, multo tenuiorem efficies.

Chrysocolle  
uires ex Gal.

# ALDOS APUENOS LAPIS ARMENIUS CAP. LXV.

ARMENIUS lapis præfertur læuis, colore cæruleo, perquam æquabilis, calculo carens, et friabilis. Eadem, quæ chrysocolle præstat, sed inefficacius. Quinetiam usum habet ad pilos in palpebris alendos.

Armenij la-  
pidis consi-  
deratio.

ARMENIA, ut libro xxxv. capite vi. testatum reliquit Plinius, lapidem mittit, qui eius nomine appellatur. Lapis est hic quoque chrysocolle modo infectus: optimumque est, quod maxime uiride est, communicato colore cum cæruleo. Plinio subscribit Auicenna, sic inquit. In lapide Armenio est aliquantulum azuli coloris, non tamen est in colore azuli, et non est in eius soliditate, sed est in eo arenositas quedam: et quandoque utuntur eo pictores loco azuli, et est lenis tactus. Ex horum sanè uerbis perspicuum fit, lapidem Armenium colore esse uiridi, ad cæruleum inclinante. Talis autem esse comperitur, qui in argenti fodinis, in compluribus Germaniæ locis foditur: et ex quo colorem illum ad pictorium usum parant, quem uulgò uocant uerde azzurro, ac si diceret uiride cæsum, uel uiride cæruleum. Nanque is colore chrysocolle refert, sed duritie præcellit. Quamobrem crediderim ego, eos non longè abesse à ueritate, qui dicerent, Germanicum hunc lapidem illi congenerem esse, quem Armenia mittit. siquidem patrum Armenij nomen genus non immutat. neque etiam obstat, quin et in alijs regionibus, lapis hic gigni possit. Quippe Phrygius lapis à Phrygia regione dictus, optimus in Cappadocia foditur, ut Dioscorides est author. Id quod facile ostendit, Armenium præter Armeniam, alias quoque regiones gignere posse. Nec refert, quod scripserit Manardus Ferrariensis libro iii. epistola iii. Armenium lapidem hodie non facile inueniri posse. Quandoquidem cum certò sciam, multa in officinis ferè omnibus deesse medicamenta, eaque præsertim, quæ ex metallorum fodinis expetuntur, quæ tamen suo natali solo, ubi proueniunt, copiosa reperiuntur, mirum certè non fuerit, si Armenio etiam lapide careant seplasiarij. Hac itaque ratione ductus, haudquaquam dubitauerim affirmare, quin et hic in Germaniæ metallis proueniens, in Armenij lapidis genere legitime recenseri queat. quemadmodum in Gagatis, Phrygijs, Asijsque genere nobis recipiuntur, qui alibi, quam in Gaga fluuio, in Phrygia, et Aſſo inueniuntur. præsertim cum notis omnibus ac uiribus Armenio per omnia similis hic habeatur. Notis quidem, quod summè uireat, et ad cæsum colorem proximè accedat. Viribus autem, quod (ut equidem testari possum) atra bile uexatis maxime conferat, ijs uomitum, et aliam ciens. Porro seplasiæ (ut omnibus constat) non modò multis destituuntur fossitijs medicamentis, sed continuè alterum alterius loco supponunt: nempe cadmian pompholygis loco, spodij uice complura antispodia, et pro flore eris rasilem æruginem subijciunt: cum tamen et pompholyx, et spodium, et flos eris copiosa, legitimæque reperiatur omnibus



omnibus in fornacibus, ubi argentum, & aes funduntur. Nam ex hoc, quod in officinis non reperitur Armenius lapis, quemadmodum alia complura, haudquaquam colligere licet, quod hæc omnia suis in fodinis fornacibusq; non habentur. Præstat mirum in modum Armenius lapis (et si id Galeno, Paulo, alijsq; ueteribus incognitum existimetur) ad atram bilem deiciendam, ut testis est Alexander Trallianus clarissimus auctor, libro primo capite de melancholia, ubi sic inquit. Quod si hiera data melancholice imaginationes nihilominus infestare uideantur, tunc sine ulla cunctatione lapidem Armeniacum dare festinato. Noui enim ex ueteribus antiquiores ad ueratum album properasse, ubi effectum ab alijs purgationibus nihil penè immutui conspicerent. Verum ego lapidem Armeniacum ueratro albo præfero, atq; licet utentem ipso experientia cognoscere, quomodo præterquam efficaciter, etiam sine molestia, & periculo purget. quorum nihil album ueratum habere nouimus. Si igitur res postulat, non modò infra per aluum, sed etiam per uomitum purgationem fieri, lapidem illotum exhibere conuenit. Sit autem modus ipsius scrupuli tres, aut quatuor, aut paulò amplius, minusue, pro uirium simul, & copię humoris noxi ratione. At si eger purgatione per uomitum non admodum indigere uideatur, sed per inum uentrem totum uitiosum humorem exire conducat, tunc lapidem eluere oportet usque ad duodenas (uetus legit quinquagenas) uices. Vbi enim sic fecerimus, neque turbationem stomachi, aut compressionem lapis excitare potest, sed etiam minori cum molestia nigrum terreſtreſq; humorum uacuabit, ut paucis præteritis diebus adiumentum ex eo nobis accessisse percipiamus. Dato autem ex eo scrupulos quinque, aut sex, ut plurimum ex aqua tepida, semper ex cognatis dictis coniectura deprehendens an plus, minusue exhibere debeas. Quod si egrum etiam his adhuc requirere suspiceris, cum fiducia rursus exhibeto: neque enim calorem habet, aut siccantem admodum, aut aliam quam ipsi insidentem, amarum, & uenenosam qualitatem; ut eger ideo medicamentum bibere detrectet. Sin autem nonnulli humidum aliquod medicamentum sumere aduersentur (multi enim in totum non sistent liquidum medicamentum assumere) in catapotia lapidem redigere oportet. Si uero libet, etiam picre aliquam insignem partem admisceto, aut etiam ex alijs quibusdam, quæ purgationem magis promoueat, & non renitentur. Ne autem is, qui parare uelit horum confectionem, inquirendo laboret, uisum mihi est ea de causa etiam horum compositionem meminisse. Habet autem in hunc modum. Picre semuncia, epithymi semuncia, agarici scrupuli quatuor, scammonie uncia, garyophyllorum grana uiginti. Contusa excipiantur rhodomelo, aut succo citrij, aut rhodomelite. Dentur scrupuli duo, plurimum quatuor. Notandum uero est, præterquam quod uentriculum corroborant, simul etiam uarios humores, præsertim terreſtreſ, & melancholicum, citra molestiam purgare posse. hætenus Alexander. Caterum Armenium lapidem deiectoria facultate pollere in atrabiliarijs morbis, nouit etiam Aëtius. quippe qui libro 11. capite XLV 11. ex Nichessonis medici auctoritate, sic de eo scriptum reliquit. Armenium, quo pictores utuntur, duodecima drachmæ parte melancholicis, & crassum sanguinem habentibus dato. Datur & pueris pectoris morbo infestatis: reuomunt enim, nam uomitorium existit. Datur & morbo sacro obnoxij, ac furiosis, hoc modo. Centaurij fasciculos manipulares tres in aquæ marinæ heminis tribus coquito, donec una supersit, & cum excolato decocto, Armuthei lapidis, quem Græci Armenium uocant, tertiam drachmæ partem terito, ac confidenter exhibeto. nihil enim periculi est. Itaque nosse operæpretium est, quod Armenium penitus reuomitur, nihil memorabile sursum efferens, sed & inferne modicum quid paulatim, & in pluribus secessibus effert. hæc Aëtius. Nouit præterea Armenij uires deiectorias inter recentiores Græcos Actuarius, ut uidere est in suo de compositione medicamentorum libello. Verum alias ab illis Armenio lapidi uires reddidit Galenus libro 1x. simplicium medicamentorum, his uerbis. Armeniacum uim habet extergentem, cum leuicula acrimonia, & leuissima adstrictione. Itaque tale cum sit, ocularibus miscetur facultatibus. Et ipso per sese quoque ad pollinis leuorem redacto, utimur sicco ad pilorum in palpebris incrementum: nempe ubi præ humorum acrimonia partim excidunt, partim uero nec crescunt, nec aluntur. Siquidem depastis his acrimonijs, in bonum naturæ habitum pars reductur: cuius cum alia sint munera, tum etiam producendi, incrementum præbendi, ac roborandi, qui in palpebris sunt pili. quippe cum prima, & ex professo quædam sint medicamentorum opera: quædam uero mediante natura, quæ animantium corpora dispensat, eduntur, uelut quæ in his ipsis calliblephara nuncupant. Ipsa enim partes moderate lasas mediocriter desiccant, pilos corruptentem humiditatem absumendo. quæ ubi abolita est, tum natura ad proprias redit actiones, nimirum sublatis, quæ hætenus ipsi impedimento fuerant.

Armenij lapidis vires ex Alexandro.

Vires eiusdē ex Aëtio.

Armenij lapidis vires ex Galeno.

#### ΚΑΥΡΟΣ ΛΙΘΟΣ. COERULEVS LAPIS. COERULEVS LAPIS. CAP. XLV 11.

COERULEVS origo ex ærarijs metallis in Cypro. copiosior ex arena litorali secundum quosdam subcauatos specus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur ut chalcitis. lauatur ut cadmia. Vim habet reprimentem, & modicè erodentem. crustas gignit, & exulcerat.

COERULEVM officinæ Auicennæ doctrinam secute, lapidem Azuli, uel Lazuli uocant. Probatissimus, qui scintillis aureis emicat. Lapis hic (ni fallor) cum Armenio non obscuram habet cognationem, quod non modò utriq; simul in iisdem proueniant metallis, promiscueq; oriuntur; sed quod etiam iisdem ferè uiribus præditi sint ad atram bilem deiciendam. quo factum est, ut Mauritanorum quidam alterum cum altero ineptissime confuderint. Ceterum quoniam tradidit Auicenna, cui subscribit Mesues, coeruleum siue (ut eorum nomine utar) Azulum septicæ, ac putrefacientis esse facultatis, non desunt e recentioribus, qui eum detestentur, quemadmodum & catapotia, quæ ad atrabiliarios effectus ex lapide ipso coeruleo passim in pharmacopolijs parantur: e quorum numero est Fuchsius medicus nostræ ætatis celebris, in suis paradoxis. Verum quanuis confusè satis de Coeruleo, & Armenio scripta uerint

Coerulei lapidis confus.

Mauritanorum  
tutela.

uerint Mauritani; non tamen obstat, quin ij bilem atram pellere queant. Id quod priores ueteresq; Græci, uel ignorauerunt, uel silentio dissimulauerunt. Porro Galenus, etsi non explicauerit cœruleum atrabiliaris humores ducere; tamen scripsit deijcientem habere facultatem. Quod cum fortasse perpenderent Arabes, qui multorum medicamentorum, quæ Græcis incognita fuisse uidentur, diligentissimi fuisse indagatores, inuenere tandem facto pluries periculo, cœruleum atram bilem peculiariter deijcere. Sed si (ut in præcedenti capite ostensum est) usq; ad Alexandri ætatem è ueteribus nemo nouerat Armenium in detrabenda, citra noxam, atra bile facultatem habere albo ueratro parum mirum quidem non fuerit, si etiam longo post tempore id scripserint Arabes, uel quod ab eo fortasse acceperint, uel quod ex se ipsis id facultatis Armenio inesse adinuenerint. Præterea cum Armenium, & Cœruleum non modò in iisdem proueniant metallis (ut in pluribus Germaniæ locis nos ipsi uidimus) sed simul, promiscueq; oriantur, adeò ut Cœrulei frustum, Armenij non modicum contineat, sicut è conuerso, rectè quidem existimari potest, pari ferè facultate, uel non admodum dispari hosce lapides esse præditos. Hinc itaq; fit, ut mihi planè Mauritani à Fuchsij, & aliorum calumnia uindicandi uideantur. Quippe cum cernerent naturam hos lapides promiscue, indistincteq; progignere, quid mirum si ipsam imitati, eorum historiam & facultatem indifferenter tradiderunt? cum pro certo ex his existimandum sit, nil aliud esse Armenium, quàm cœrulei materiam, nondum à calore in terræ uisceribus ad summum perfecteq; coctam. quemadmodum chalcitis, misy, sory nil aliud esse creduntur, quàm chalcantibi materiam. Hæc igitur cum accuratè perpendifset clarissimus Manardus Ferrariensis, ubi in simplicia medicamenta à Mesue conscripta diligentissimè adnotauit, eorum sententiam refellit, quæ cœrulei usum sua tantum ducti opinione tam acriter uituperant, his uerbis. Cœruleo Græci nullam uiam deiectionis adscribunt, sed uidentur hæc uires ab Armenio deriuatæ. Arabes enim utrunque confundunt. Serapio quidem, & Auerroes sub lazuli nomine de Armenio tractantes, Auicenna de Azulo scribens, ferè ei omnes uires attribuit, quas Græci utriq;. De Armenio uerò ea scribit, quæ Græci: solum addens, quod atram bilem magis purgat, quàm cyaneus. Quæ omnia licet uera sint, non tamen ego his accefferim, qui nõ secus ac perniciosissimum uenenū hunc formidant. Experientia enim certa scio, quod si benè abluatur, multum uiuat, & uel nihil, uel parum ledit. hæc ille. In cuius certè sententiam unusquisq; medicus facillè deueniet, qui potius rationalis sit, quàm pertinax. Nam etsi dixerit Auicenna cœruleum exedentis esse facultatis, hoc quidem non impedit, quin haustum atram bilem deijcere possit absq; noxa, si diligenter fuerit ablutum. quandoquidem eius peracuta septicaq; facultas pluribus lotionibus ab eo facillè tollitur. Præfertur in hunc usum quod aureis maculis pellucet: namque id, quo seplasiæ abundant, & quo in Germania pictorios colores parant, tum facultate imbecillius, tum ignobilius habetur. Memini me ad nonnullas tam eris, quàm argenti fodinas acceffisse, in quibus & cœrulei, & Armenij in æceruos congesti plurimum uidi: attamen nullum mihi in ijs locis cœruleum repertum est, quod aureis fulgeret scintillis, eo quod non proueniat hoc nisi tantum in auri fodinis. Idcirco cœruleus ille color, qui uulgò nobis dicitur Azurro oltramarino ab omnibus magno æstimatur pretio. Fit enim is ex cœruleo lapide, qui tantum in auri metallis in orientalibus regionibus foditur, omnium præstâtissimus. De illo autem, qui ex arena in maris litoribus inuenta conficitur, quid plura dicam non habeo, quàm scripserint Dioscorides, & Plinius. Cœrulei uires retulit Galenus libro ix. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cyanos medicamentum acri facultate est, tum detrabendi, quam καταδαγκτην uocant, tum digerendi, potentiore quàm cinnabari. Inest quoq; ei nonnulla adstrictio.

Cœrulei uires  
ex Gal.

### Indicis color

INDICIVM. CAP. LXVII.

Indicis color.

Indici confectio.

INDICI duo genera. vnum sua sponte nascitur, tanquam spuma, germinatione Indicis arundinibus exiens. Alterum infectoriæ dant officinæ: & est spuma purpurea innatans cortinis, quam detractam artifices siccant. Optimum existimatur, quod cœrulei speciem præbet, succum suum sorbet, & læue. Inter medicamenta est, quæ leuiter adstringunt, & inflammationes, tumoresque rumpunt. purgat, & reprimat ulcera.

INDICVS color, quo hodie pictores utuntur, tametsi in seplasijs ubique uenalis habeatur; fit tamen in infectorijs officinis ex glasti recremento, & spuma, cum lanæ glasto ipso inficiuntur. Quod autem sponte nascitur, tanquam spuma germinatione arundinibus exiens, quod sciam, ad nos non defertur. Plinius libro xxxv. cap. vi. factitium Indicū in purpurarijs officinis fieri ait ex purpure spuma cortinis innatante. Quæ in re Dioscoridis uerba nõ rectè accepisse uidetur Plinius. Siquidem author non ex purpurarum spuma fieri Indicum scribit, sed ex purpure spuma (talis etenim est quæ ex isatide prouenit) innatante cortinis in infectorijs officinis. Nulla namque, quod mihi compertum sit, ex purpurarum sanguine, quo regum uestes olim tangebantur, spuma proferebatur.

OCHRA. CAP. LXVIII.

OCHRAM leuissimam, & omnino luteam eligere oportet, saturatam, non lapidosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare. Excrescentia in carne reprimat, caua cum cerato explet, & articularum tofos comminuit.

**OCHRA** fossilis, qua pictores utuntur, cur legitima non sit, quid obset non uideo: quāquam hæc (quod sciam) ex Athenis laudatissima non adferatur, quemadmodum nec Vtruuij tempore, qui ochra Atticæ usum in Italia iam excoluisse scribit. Est itaq; Ochra terra, quæ in plumbi fodinis aureo colore reperitur. Quamobrem qui rerum causas perscrutantur, arte etiam ochram ex plumbo ipso conficiunt, quæ coloris nitore fossiliam superat. Præstantissimam ochram non longè à Tridento effossam, misit ad me hoc anno Martinus Guidottinus Tridentinus, seplasiarius harum rerum diligens inquisitor, qua nullam hactenus uidimus meliorem. Ochra in libris simplicium medicamentorum non reperio meminisse Galenum: tametsi eius mentionem fecerit commento 11. in Hippocratis prognostica de uomitione agens, cum inquit. Ochra enim genus quoddam terræ est, cuius potissimum Attica probatissima est.

Ochra consideratio.

Κιννάβαρις. CINNABARIS.

CAP. LXIX.

**HALLUCINANTVR** qui cinnabarin minio eandem esse existimant. Minium enim in Hispanijs ex lapide quodam argentæ arenæ permisto, temperari solet, alioqui non dignoscitur. Fornacibus autem in florentissimum, flagrantissimumque colorem permutatur. In metallis uerò strangulanti halitum eructat. itaque facies incolæ uescis obuelant, ut per illas spectent, nec respirando noxium aërem attrahant. Eo pictores ad sumptuosa parietum ornamenta utuntur. Cinnabaris uerò ex Aphrica defertur, & magno constat. hactenus inuenitur, ut uix uersicoloribus pictorum lineis satisfaciatur: intento colore, nec diluto præditum: quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt. Vim habet cinnabaris hæmatitæ lapillo eandem. Conuenit ad oculorum medicamenta, uerum efficacius: magis enim adstringit, & sanguinem cohibet. Ambustis igni, & papularum eruptionibus, cerato excepta medetur.

**CINNABARIS**, qua officinæ, & pictores utuntur, longè sanè differt (ut planè constat) à Dioscoridis Cinnabari. quandoquidem nostri usus cinnabaris res factitia est ex sulphure, & argento uiuo diu arte quadam igne torrefactis. Est & aliud cinnabaris genus fossilè, et sponte per se nascens, ut postea dicitur: uerum non ut factitium copiosum, nec adeò colore præcellens. Quæ autem à Dioscoride describitur, ex Aphrica defertur, eadem facultate pollens, qua hæmatites lapillus, quem non modò prætulit ipse foris appositum ad plures oculorum morbos; sed etiam intus assumptum, ad urinæ angustias, muliebrium locorum defluxiones, & cruentas exspuitiones. Quibus utique affectibus uulgaris usus cinnabaris nullo pacto competere potest, quòd propria ui erodat, exulceret, & haustum perniciem adferat, & proinde sit oculis, & internis uisceribus inimica. Cæterum quidam inter ea, quæ hac ætate in usum medicum ueniunt, Dioscoridis cinnabaris esse possit, non equidem ausim decernere, sed potius quod sentio, adducor, ut coniecturis quibusdam assequar. quippe quòd Dioscorides Cinnabarin nullis notis descripserit, neque tradiderit an factitia res sit, aut fossilis, an ex plantarum materia proueniat. Sed antequàm coniecturas eas afferam, quibus cõstare uidetur Dioscoridis cinnabari seplasis nostrates non destituta, Plinij sententia cognoscenda est, qui lib. xxxiii. cap. vii. affirmanter scribit, nil aliud esse cinnabarin, quàm draconis saniem, elisi elephantorum morientium pondere, permisto utriusque animalis sanguine: quòdque nullus alius sit color, qui in picturis propriè sanguinem reddat: & quòd ea etiam antidotis medicamentis sit utilissima. Id quod pariter affirmat Iulius Solinus in uaria historiarum lectione. Ad hæc scire conuenit, gummi cuiusdam arboris in Aphrica nascentis ad nos deferri, quod etiam hoc æuo sanguinis draconis lacrymam officinæ uocant, colore sanguinis, pellucidum, leue, & fractu minime contumax. Hoc nostrates officinæ uulgò uocant Sanguine di drago in lagrime, alterius differentia, qui pluribus imposturis passim in orbiculos coactus uenditur. Priorem itaq; non ab re lacrymam appellant, quòd scribat Aloisius Mustus patritius Venetus in suis in Aphricam nauigationibus, ex arbore quadam hoc gummi collacrymare, colore, & substantia, sanguini simili: inciso tamen ab incolis prius arboris cortice, ut fusius inde effluat. Hoc (ut idem subdit) eneis cacabis excipiunt, & igni resinæ modo decoquunt, quousque consistat, draconis sanguinem, nescio qua ratione ducti, ipsum appellantes: nisi id eueniat, quòd fortasse sua lingua plantam, à qua defluit, draconem appellant. Ex his itaq; nobis iure coniectare licebit, gummi hoc Dioscoridi faciliè cinnabarin esse, quòd primùm non aliunde, quàm ex Aphrica deferatur, nec inde copiosum. quòd item pictoribus expetatur, ut intento eius colore, purpureas, rubentesque concinnent umbras, ubi prius picturas rubro, uel purpureo infecerint. quòd deinde ob raritatem, etiam hoc tempore, quo frequentius in Aphricam nauigatur, non uili ueneat pretio. quòd denique (ut Dioscorides inquit) uiribus hæmatitæ lapillo per omnia respondeat. Nam, ut periculum facientibus liquidò patebit, adstringendi ui pollet, & maiore quidem quàm hæmatites. quo fit, ut felicius eo utantur medici ad muliebres, & dysentericas fluxiones, ad cruentas excretaiones, ad firmandos commotos dentes, & roborandas gingiuas. His accedit, quòd si Dioscoridis ætate non deerant, qui Cinnabarin esse draconis sanguinem existimarent, mirum sanè non fuerit, si per plures ætates producta hæc falsa opinio ad hæc usque tempora inualuit. At ipse, ne simplicium medicamentorum doctrinam sectantes hoc tenerentur errore, inanem eorum sententiam silentio inuoluendam non duxit, qui cinnabarin draconis sanguinem appellabāt, cum inquit. Hactenus inuenitur cinnabaris, ut uix uersicoloribus pictorū lineis satisfaciatur, intento colore, nec diluto præditum: quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt. Ex his igitur cum coniecturis, tum rationibus colligendum esse putauerim, hanc lacrymam, colore sanguinem præ se ferentem, legitimam esse Dioscoridis cinnabarim. Cæterum uidetur hac in re manifestè aberrasse Plinius. quandoquidem etsi asserat is cinnabarim nil aliud esse, quàm draconis ferocissimæ belluæ sanguinem, elisæ elephantorum morientium pondere; cum tamen dixerit nullum aliud

Cinnabaris consider.

Plinij error.

Obiectionis  
diluio.

Fuchsij opin.  
reprobat.

Minium Dio-  
scoridi quid  
nobis.

reperiri colorem, qui in picturis magis ad uiuum sanguinem reddat, quam cinnabaris, facile deprehenditur error. Quippe necessarium sane fuerit, ut de hac lacryma omnino intellexerit, putaritq; falsus uelgari appellatione, lacrymam hanc illum draconis sanguinem esse, ab elephante (ut referunt) collisi. Nam consentaneum minime uidetur, ut huiusce belluæ sanguis extra uasa in terram diffusus, puluere & lapillis commistus, situ & putredine obductus contabefactusq; uiuum, ac uerum sanguinis colorem referre possit. quemadmodum nec ille sincerum sanguinis colorem præbet, quem impostores suo arbitrio factitant, ex hircino sanguine, rubrica Sinopica, uel fabrilis, contusis lateribus & sorbis, diutius insolatis, illius pro posse colorem, & substantiam imitantes, qui ex collis simul draconibus, & elephantibus (si tamen uera narrant) emanare solet: quiq; iam longo tempore ad nos aduehi desiit. Quo postea factum esse opinor, ut in eius defectu factitium supposuerint impostores, & hanc fraudem excogitauerint: neq; solim ea ratione, quam modo diximus, ipsum parant; sed etiam modis alijs compluribus, resinas, rubie infectorie radices, brachij decoctum, tragacanthæ lacrymam, rubricas, & alia permulta immiscentes, quæ ne longior sit sermo, quam series ipsa exposcat, silentio duximus inuoluenda. Verum hic fortasse illud quispiam nobis obtrudet, quod cum hoc loco scribat Dioscorides de metallicis tantum, ac fossijs tum coloribus, tum medicamentis, consentaneum minime uidetur, ut his inseruerit arborum lacrymas, quarum historias, & facultates, diffusius libro primo pertractauit: & ob id omnino credendum sit, cinnabarim fossile esse medicamentum. Hæc obijcienti ita responsum uolumus, quod cum ea hoc loco recenset Dioscorides, quæ ob colorum nitorem, in pictorium ueniunt usum, nempe cerussam, chrysocolam, Armenium, cœruleum, Indicum, ochram, & alia pleraq; non mirum, nec præter institutum mihi sane uidetur, quod his etiam cinnabarim adiunxerit, quanquam arboris fuerit lacryma. Videmus enim inter hæc Indicum quoq; à Dioscoride connumeratum esse, quod tamen nec fossile, nec metallicum est, sed in India spumæ instar, ex arundinum quæ-  
rundan germinatione sponte prouenit: atq; etiam arte quadam fit ex isatide herba in infectorijs officinis. Ex his uero  
que omnibus palam fieri arbitror, quod communis usus cinnabaris, quam Dioscoridis Minium, quod in fornacibus stat,  
& florentissimo, flagrantissimoq; colore spectetur, esse mihi semper persuasi, ab ea longè diuersa sit, de qua auctor  
noster hic mentionem facit. Est enim, ut supra dictum est, nostri usus cinnabaris fossilis, & factitia: nota hæc omnibus,  
& frequens: illa uerò rara, nec multis cognita. Fossilem (ut proxima commentatione latius dicetur) uidimus  
frequenter nos in argenti uiui fodinis, Hydria monte, qui una tantum dieta à Goritia distat, circa Carniole fines. Lapis  
est purpureus ad rubedinem declinans, hæmatitæ lapidi æmulus, non admodum durus, impense tamen grauis, tantoq;  
plerunq; argento uiuo pregnans, ut per sese, nulla ignium ui guttatim exiliat. Factitiæ eodem loco plurimum etiam  
paratur ex argento uiuo & sulphure, fictilibus quibusdam conclusis, & flagrantissimo igni admotis, donec ad  
saturitatem rubescant. Id quod fieri à natura crediderim in ea, quæ fossilis fuerit, in terræ uisceribus. Nullus huius  
usus in medicamentis, quæ intus in corpus sumuntur, quod perniciose sint; & uenose. Hinc forte factum est, ut  
existimauerit Fuchsius medicus clarissimus, in Nicolai Myrepsici codice in Damasonij antidoto ab aliquo imperito  
additam esse cinnabarim. Sed in hoc alia planè à Fuchsio opinio nostra est. quippe quod putem Nicolaum eo in loco  
non de fossitis, uel factitijs cinnabari intellexisse, sed de ea arboris lacryma, de qua scripsisse Dioscoridem, iam euidentis-  
simum, ni fallor, à nobis factum est. Nam cum cinnabaris hæc, Dioscoridis testimonio, hæmatitæ lapillo pares habeat  
uires, probaueritq; is hæmatitæ ad urinæ difficultatem, dubitandum sane non est, quin consulto antiquorum cinnabarim  
ea in antidoto addiderit Nicolaus, quam speciatim ad difficultatem, & stillicidium urinæ commendat. Ceterum  
quauis communis usus cinnabaris in medicamentis, quæ sumuntur in corpus, omnino letalis, & perimens sit;  
constat tamen ijs utiliter admisceri posse, quæ exterius adhibentur, nempe suffimentis, quæ sunt ad delendam Gal-  
licam luem, ubi cetera non profuerint remedia, unguentis item nonnullis ad idem facientibus, & ad contritiua ule-  
ra, alijsq; medicamentis, quorum uires longum esset in præsentia recensere. Porro cum dicat Dioscorides hallucinari  
eos, qui cinnabarim minio eandem esse existimant, cumq; etiam scribat sequenti capite argentum uiuum ex minio  
fieri, quod abusuè cinnabaris dicitur, omnino mihi persuasum uolui, nil aliud Dioscoridi esse minium, quam fossile hoc,  
quod diximus cinnabarim fossitiam hodie appellari, à quo argenti uiui plurimum eliciunt in Hydrie fodinis. Auxit præ-  
terea opinionem ipse Dioscorides, quippe qui asserat Minium in metallis strangulantem halitum eructare, ob idq; fos-  
sores uescis sibi faciem obuolare, ut per illas spectent, nec respirando noxium uaporem attrahant. Quandoquidem  
ubi cinnabaris in Hydria monte foditur (ut ego uidi, & testari possum) artifices eam decoquentes fictilibus quibus-  
dam ad id conflatis, & conuerso simul ore argilla circumluis, ut inde argentum uiuum eliciant, nares, & os linteis  
sibi obstruunt, ne noxio uapori liber pateat aditus: quod non modo huiusce halitus noxa, anhelosi fiant, qui hær-  
runt, sed plerunq; dentes uniuersos amittant, putrescentibus circumquaq; gingiuis, ut quidam apertissime testantur,  
qua spreto narium, & oris uelamento, ut ceteris uiderentur fortiores, edentuli prorsus facti sunt, continuo tremore  
concussi. Accedit huc Vitruuij autoritas, quæ sententiam nostram maxime tuetur. Ipse enim septimo uolumine suæ  
architecturæ, ita de Minio disserit. Ingrediar minij rationes explicare. Id autè agris Ephesiorum Cilibian primum  
memoratur esse inuentum, cuius & res, & ratio satis magnas habet admirationes. Foditur in gleba, quæ arripit  
dicitur, antequam tractationibus ad minium perueniat, uena uti ferro, magis subrufo colore, habens circa se rubrum  
puluere. Cum id foditur, ex plagis ferramentorum crebras emittit lacrymas argenti uiui, quæ à fossoribus statim  
colliguntur. hæc Vitruuius. Nos equidem hoc idem uidimus in Hydrie montis fodinis: ubi plerunque cernit, ut uide-  
nerata ferramentis uena, argentum uiuum fonticuli instar, in substratam defluat humum. Ceterum Plinio minium di-  
uersorum est generum, ut loco superius citato legitur, ubi cuncta eius genera retulit his uerbis. Inuenitur in argen-  
tarijs metallis minium quoq; & nunc inter pigmenta magnæ autoritatis. Theophrastus tradit inuentum minium à  
Callia Atheniense initio superante aurum: posse excoqui arena rubente in metallis argenti: hanc fuisse originem eius.

Reperiri autem iam tum in Hispanijs, sed durum et arenosum. Item apud Colchos in rupe quadam inaccessa, ex qua iaculantes decuterent: id esse adulterium. Optimum uero supra Ephesum Cilbianis agris. Arenam cocci colorem habere, hanc teri, dein lauari farinam, et quod subsidat iterum lauari. Iuba minam nasci in Carmania tradit. Hermogenes et in Aethiopia. Sed neutro ex loco inuehitur ad nos, nec ferè aliunde, quàm ex Hispania. Sed adulteratur multis modis, unde praeda societati. Namque est alterum genus in omnibus ferè argentarijs, itemq; plumbarijs metallis, quod sit exusto lapide uenis permixto, non ex illo, cuius uomicam argentum uiuum appellauimus, sed ex alijs simul repertis. Steriles etiam plumbi suo colore, nec nisi in fornacibus rubescentes, exustiq; tunduntur in farinam. Et hoc est secundarium minium perquam paucis notum, multum infra naturales illas arenas. Syncero cocci nitor esse debet. Probat auri modo. Auro candente fucatum nigrescit, syncerum colorem retinet. Inuenio et calce adulterari. Ac  
 10 similitudine ferri candentis lamina, si non sit aurum, deprehendi illico. haecenus de minio Plinius. Hinc igitur palam est antiquis minium et fossile, et factitium extitisse. Nec sanè dubitauerim, quin in factitij genere acceperint ipsi cinnabarin factitiam, quæ passim in seplasiariorum officinis inuenitur. id minium hodie appellant pharmacopole, tam etiam pictores, quod ueteres Græci Sandycem uocauerunt, ex plumbo, aut cerussa in fornacibus perustis paratum. de quo etiam uidetur intellexisse Plinius.

*Quintus silius*

Υδράργυρος. ARGENTVM VIVVM.

CAP. LXX.

ARGENTVM uiuum fit ex minio, quod abusiue cinnabaris dicitur, patinis fictilibus imposita, ferrea concha cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt. siquidem deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in argentum uiuum coit. Quinetiam inuenitur in argenti fodinarum tectis stillatim concretum. Alij per se in metallis inueniri tradunt. Seruatur in vitreis, aut plumbeis, aut stagnis, aut argenteis uasis: siquidem aliam materiam omnem exedit, & defluere facit. Potum vim perniciosam habet: suo enim pondere interna exest. Remedio est lac multum subinde potum, & vomitionibus reiectum, aut vinum cum absinthio, aut apij decoctum, aut semen hormini, aut origanum, aut hysopum cum vino. Auri limata scobs, id est, ramentum quàm tenuissimum eporum mirabili est auxilio.

ARGENTVM uiuum omnibus notissimum, corpus est et fossilium genere, liquidum, et aque modo fluidum, colore argenteo, liuescente, pellucidumq;: substantia uero lenta, tenui, in qua tam frigiditas, quàm humiditas exuperat. Hæc igitur symmetria (ut chymistarum, qui se philosophos existimant, fert opinio) res est sanè admodum disposita ad metallorum omnium generationem. quamobrem ipsorum tum originem, tum semen argentum uiuum appellauerunt. Quinetiam non addensari putant, quod ei non insit caliditas, et siccitas tanta, quæ ad id muneris obeundum sufficiant. Addunt temporis defectu id etiam euenire: ideoq; immaturum, indigestum, imperfectumq; reddi. Ceterum relictæ chymistis disceptandi materia, an ipsum metallorum quorumcunque prima fuerit materia, an aliter se res habeat, dicam, philosophorum tantum, qui de eo scripserunt, sententiam secutus, facile Argentum uiuum esse materiam ad metallorum generationem proximam. Quippe cum facillimè omnibus se coniungat metallis, palam nimirum sit, ijs generandis aptissimam esse materiam, ijsq; præsertim, quibus facilius contactu inherescit: quandoquidem in habentibus symbolum (ut uulgata propositio est) et in consimilibus facilis est transitus. Hanc itaque ob causam eos hallucinari putauerim, qui dicunt, quod si argentum uiuum in terræ uisceribus usque adeo decoctum esset, ut in aliquod fixum, firmumq; uerteretur metallum, in ferrum potius, et in plumbum uerti deberet, quàm in argentum, uel in aurum. Si quidem certum est, quod id facilius argento, auroq; contactu inheret, quàm ceteris. Hic autem est chymistarum ludus, qui tempus conterunt, et oleum et operam perdunt, id arte reficere existimantes, in quo natura ipsa defecit, quam (ut liquido constat) nemo unquam ita ad unguem imitari potuit, quin ab eius mira solertia aberrauerit. Omnia metalla in argentum uiuum coniecta, supernatant, ut lignum in aqua; præter solum aurum, quod si iniiciatur, statim petit fundum, quod hoc magis amplexetur, quàm cetera. Amplissima argenti uiui metalla (ut etiam in superiori capite diximus) uisuntur in Hydria monte, qui quadraginta millia passuum à Goritia distat; ubi continuo copiosum elicitor è lapide quodam fragili, potius quàm duro, colore ex nigro rufescente, et ad purpuram quadantenus uergente, ponderoso plumbi instar, et argento uiuo scintillante. Hanc uenam postquam effoderunt, conterunt, et in fictilia quædam angusti orificij coniungunt, et recenti arborum musco obturant: deinde fictile alterum huic simile, latioris tamen oris, in terram sepeliunt, et alterius pleni inuersum orificium, in illud inserunt, et argilla circumquaque muniant obturantq; oscula, et uasa simul connectunt, et firmant, adeo ut uacuum fictile totum sub terra sudat, plenum uero totum superemineat. Itaq; in aperta area quàm plurima seriatim collocant fictilia, et deinde ignem in ambitu succendunt, cuius ui calefacta uena, argentum uiuum guttatim distillat in substratum fictile. Hinc suo tempore exiunt, et in utriculos quosdam reponunt, quod uasa ferè cuncta exedat, ac dilaceret, præter vitrea, uel fictilia uero circumlita. Quo fit, ut Dioscoridem mirari subeat, qui argentum uiuum in argenteis, aut plumbeis, stagnisue, aut vitreis tantum uasis seruari posse scribit, quod aliam materiam omnem erodat, nisi codex hic deprauatus sit. Si quidem id falsum deprehenditur: nam argentum uiuum exest, ac destruit omnia metalla; quibus inheret. Ex quo potius, cum hæc à Serapione non scribantur, qui tamen Dioscoridis omnia ferè scripta bona fide reddit, planè suspiciandum fuerit, huic capiti plura subesse menda. id quod etiam uaria in hoc loco Oribasij lectio confirmare uidetur.

Argenti uiui consider.

Quorundam error.

Reperiuntur autem in argenti uiui fodinis inter ipsius uenam peculiare quædam lapidis illius rufi zone, quem foss-



fores fossitiam cinnabarim vocant, de quo etiam in precedenti capite diximus. Hic adeo argento uiuo scaturit, ut sepius absque alio igne, inde per sese guttatum defluat. Euenit præterea dam fossiores mucronatis instrumentis, necnon efodiunt, ut purum profiliat argentum uiuum, decurratq; celerius, ueluti e fonticulo quodam. Porro rari admodum sunt fossiores, et huiusce materie artifices, tametsi robustissimi fuerint temperamenti, qui eo in opere ad quartum usque annum incolumes perdurare ualeant: quippe ob noxiam metalli halitum, partium omnium tremore concutuntur.

Galenus notatur.

Argenti sublimati cōfectio.

Ceterum Galenus libro 1x. simplicium medicamentorum scribit, contra illud quod experimento comprobatur, Argentum uiuum ex sponte nascentibus non esse, sed ex ijs, quæ præparantur, uelut cerussa, ærugo, psoricum, lubargyros: fateturq; se nullam huiusce medicamenti fecisse periculum, an interimat, si deuoretur, uel ubi foris fuerit admotum. Fit ex argento uiuo, et sale, quod ammoniacum uocant, lethale illud medicamentum, quod officine chymistas secute Argentum sublimatum appellant, utrisque simul admixtis, et in uas uitreum coniectis, ac inde in fornacem deductis, ut hæc ignium ui in uasis sublime tollantur, ubi salis modo concreuerint, lapidescuntq; sacchari colore. Fit etiam ex Argento uiuo, et aqua, quam ex chalcantibo, alumine, et sale nitro cōficiunt chymiste, arte quadam, et ignium ui, id quod recentiores quidam Præcipitationem uocant. Cui facultas inest sanè admirabilis ad consummacia ulcera sananda, eaq; præsertim, quæ à Gallica lue emerferunt. Sunt etiam qui dimidij scrupuli pondere deuorandum propinent admixtis margaritis, alijsq; quibusdam, quæ cor tueri non ambigunt, ubi quis Gallicis doloribus circa articulos consistitur. Datur etiam melancholicis, Armenij lapidis modo, ut libello, quem de morbo Gallico scripsimus, abunde dictum est: namque eosdem præbet effectus, uomitionibus expurgans. Sunt præterea qui purum sinceramq; Argentum uiuum hauriendum præbeant non modo adultis, sed pueris, et infantibus etate tenellis. Siquidem Brasauolus Ferrariensis uir sanè hac etate clarissimus, suo de stirpium examine pro certo scribit, sepius se dedisse Argention uiuum infantibus deuorandum ui uermium semimortuis, qui illico sanati sunt: idq; fecisse ait in ultima desperatione. Sed quomodo, uel qua mensura, uel pondere dandum sit, silentio inuoluit. At Goritienfes obstetrices, ubi grande diu in partu laborauerint, statim Argentum uiuum scrupuli pondere nullis incommodis potandum exhibent. Quo fit, ut facili mihi persuaserim, Argentum uiuum potantes haud necare, nisi pondus, uel mensuram exceßerit. Non tamen crediderim, quod solo pondere interimat, ut quidam putant Dioscoridem tantum secuti, ut latius libro sexto disse-

Auri historia, et præstantia.

remus. Sed quoniam Argentum uiuum nobis in mentem reuocauit A V R V M omnium metallorum pretiosissimum, præstantissimumq; cum eius nusquam, quod extet, meminerit Dioscorides, crederem profecto non paucam naturæ rerum iniuriam à me illatam iri, si huius tam pretiosi metalli, cuius inextinguibili siti uiuersus æstuat mundus, historiam, et facultatem silentio præterissem. Quandoquidem ob ipsius splendescentem coloris nitorem, opinati sunt naturæ operum indagatores, admirabiles auro inesse facultates, quibus homines non modo incolumes tueri possit, sed et longæuos reddere. Quapropter mirum non est, si ipsum tanti faciat mundus, et ante cetera extollant homines. Auri itaque materiam nil aliud esse scribunt, quam substantiæ elementariæ sibi inuicem proportionem respondentes. Hæ autem simul commixtæ, cum pari sint uirtute conformate, aliud sanè gignere nequeunt, quam amicabilem quandam, et optimam mitionem, quæ fermentatione, et coctione perficitur. quo fit, ut inde tam indissolubili nexu uniantur, ut permanentes, et ferè indissolubiles fiant, adeo quod, siue id eueniat coelestium corporum influxu, aut temporis ui, aut sagacissimæ naturæ opere, aut his omnibus unâ concurrentibus, conuertuntur eadem substantiæ in hoc metallicum corpus, quod uocant aurum. Hoc enim (ut diximus) ob sui tum ingentem temperiem, tum unitatem, tum optimam mitionem, adeo densum euadit, quod non modo quandam communem consequitur permansionem, sed incorruptibilem ferè temperiem, et causam quandam, ob quam super sua nihil continere possit. Hinc igitur est, quod quanquam longioribus seculis aurum in terra, uel in aqua sepultum permaneat, nunquam rubiginem cōtrahit: sicuti in igne diutius permanens, non modo aliqua ex parte non comburitur; sed et depuratus, et splendidus efficitur. Ad hæc ob optimam sui unitatem, nullo phlegmate, nulloq; pingui redundat: ita ut perpetuo fulgeat, splendidissimumq; perduret. Quinetiam tractantium manus nullo colore tingit, nempe croceo, aut nigro, quemadmodum cetera faciunt metalla. neq; etiam aliquo odore, aut sapore gustantum, aut olfactantium tum nares, tum palatum inficit. Aurum intus in corpus sumptum, siue ex industria, siue inscijs deuorantibus, nullam penitus infert noxam, ut complura faciunt metalla: sed mirum in modum cor, et uitalem facultatem roborat. quod solis influxui acceptum pleriq; sapientes retulerunt. Quamobrem iure quidem dici potest, aurum omnium metallorum præstantissimum esse, ductile, colore lucido, illiq; persimili, quo cuncta à sole illustrantur. Insuper propria quadam attractrice ui pollet, qua respicientium animos allicit, et disponit, ut ab ipsis illico desideretur. unde quidam existimauerunt auro proprias quam plurimas inesse dotes. In Italia propriæ synceri auri fodinæ (quod sciam) nullibi extant. Atqui in Germania, Pannonia, ac Transyluania eæ pluribus in locis habentur. Auri uerum us omnibus locis crediderim gigni, ubi cælum id causæ elementariæ insuat, ac disponat, de quibus antea differimus. Huius uena uarijs lapidibus impacta uisitur in asperiorum montium uisceribus. Verum ea omnium præstantissima auri uena censetur, cui corruleus lapis fuerit admixtus: tanto enim melior hæc, quanto ponderosior, et colore iageator: adeo ut illa ceteras præcellat, quæ pluribus auri guttis scintillet, uel in qua plures auri lineæ intercurstantes conspiciantur. Est etiam auri ferax diuersorum fluminum arena. Siquidem procul dubio constat in Hispania Tagum, in Thracia Ebrum, in India Gangem et Pactolum, in Pannonia Istrum, in Germania Rhenum, in Italia Padum et Ticinum, aureas ducere arenas, à quibus arte quadam aurum omnium probatissimum elicatur. ueruntamen non omnibus eorum litoribus aureæ eadem sunt arene. Auri uires prodidit Auicenna secundo sui operis uolumine, sic inquit. Aurum in omnibus suis partibus equale est. Insuper medicamentis, quæ atrabiliarijs competunt morbis. Ad hæc ubi actuali cauterio sit opus, ignitum aurum ceteris præstat metallis, quod ulcus inde exortum citius confanescat. In ore

Auri uires ex Auicenna.

contenitum,

contentum, anibellitus graueolentiam tollit. Auri scobs porphyrite lapide leuigata in ea medicamenta additur, quæ ad alopecias, & lichenas parantur, tam intus in corpus sumptum, quàm extrâ medicamentis exceptum. Hæc item eodem modo diutius leuigata, adeo ut tactum ferè effugiat, oculis immittitur ad roborandam eorum aciem. Bibitur autem & ad cordis affectus, & animi moerores.

## ΜΙΛΤΟΣ ΣΙΝΩΠΙΚΗ. RVBRICA SINOPICA. CAP. LXXI.

RVBRICA SINOPIS maximè probatur grauis, densa, ad iecinoris imaginem uergens, calcolorum expers, concolor, cum diluitur, impendiò fusilis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibusdam, expurgataque defertur in Sinopem urbem, in qua uenditur: vnde cognomentum accepit. Vim habet exicatoriam, quasi inducèdo obstruentem, & adstrictoriam. quapropter vulnerarijs emplastris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs commisceri solet. Aluum sistit, in ovo sumpta, aut clystere infusa. datur iecinoris uitio laborantibus.

HODIE profectò neminem inuenio, qui doceat, & explicet, quæ nobis legitima sit Rubrica Sinopica. Sed quantum ego conijcere potui (etsi id pro certo asserere non ausim) nullum è fossilium genere occurrit, quod magis Sinopicam rubricam nobis representet, quàm uulgarissimus bolus Armenus uocatus, is nimirum, qui in quadratas defertur massas, quiquè maximè uulnerarijs medicis expetitur ad sanguinis profluuuium cohibendum, & fracta ossa ferè ruminanda. Hæc rubrica (ut Georgius Agricola maximus fossilium indagator inquit) etsi iandudum ex Sinope Cappadociæ urbe, unde nomen inuenit, tantum importabatur; constat tamen alibi etiam reperiri, non modò in proprijs uenis, sed in aurarijs, argentarijs, ærarijs, ferrarijsq; metallis. Hanc omnino mihi opinionem illud auxit, quòd certò sciam plurimum pseudoboli Armenij ex ferrarijs Iluæ Tyrreni insulæ fodinis ad nos quotidie conuehi: quòd deinde colore sit iecinoris, pondere grauis, substantia densus: quòd etiam in aquam coniectus facillè dissiliat: quòd deniq; sua uiciètiè, adstringat, & cogat. Hæc enim gleba, cum uerus bolus Armenius non sit, nil aliud (meo iudicio) esse poterit, quàm rubrica Sinopica, quanquam à Sinope non deferatur. Species Sinopidis (ut Plinius est auctor libro xxxv. cap. v.) tres, rubra, & minus rubens, & inter has media. Quæ sanè differentie uisuntur pariter in uulgari Armenico bolo. Porro Manardus Ferrariensis libro tertio epistola quarta, Sinopice rubricæ meminit, quæ albo sit colore. Sed in hoc utrum alioqui celebrem mirari subit, quòd non animaduertit non posse albam quàmuis terræ glebam Rubricam appellari.

Rubricæ Sinopice consideratio.

Manardi lapsus.

## ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΚΣΟΝΗ. RVBRICA FABRILIS. CAP. LXXII.

RVBRICA fabrilis ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegyptia, & Carthaginensis, lapidum expers, friabilis. Gignitur etiam in Iberia, quæ ad occidentem spectat, ochra exusta, & degenerante in rubricam.

RVBRICAM hanc ideo fabilem appellauere ueteres, quòd ea plerumq; uterentur materiarij fabri ad lineas protrahendas infectis in ea funiculis. Nasci fabilem rubricam in Lemno memoriæ prodidit Galenus, cum libro nono simplicium medicamentorum, tum etiam primo de antidotis, sed à Lemnia sphaeragide plurimum differre. Verum an communis usus rubrica, quæ uulgò Italij propriè dicitur Terra rossa, ea sit fabrilis rubrica, de qua hic meminit Dioscorides, cur pro certo affirmem non habeo.

Rubricæ fabris confid.

## ΛΕΜΝΙΑ ΓΗ. LEMNIA TERRA. CAP. LXXIII.

LEMNIA terra cuniculoso in specu nata, è Lemno insula, palustri loco defertur, inibi electa, & caprino sanguini permista. quam incolæ cogunt in pastillos, & imagine capræ signant: vnde & sphaeragida ægos, hoc est, sigillum capræ appellauere. Vim antidoti habet contra perniciosà uenena singularem: pota cum uino, & præsumpta euomi uenena cogit. Contra ictus morsusque animalium, quæ exitiale uirus ei aculantur, prodest. Antidotis familiaris. Sunt qui hanc ad sacrificia utantur. est & dysenteriz utilis.

LEMNIAE terræ amplam in Italian notitiam suo tempore attulit Galenus medicamentorum omnium diligentissimus inquisitor. quippe qui, ut hæc sincerissima tandem potiretur, atq; ut omnè impostorum fraudem detegeret, qui eam adulteratam uendebant, bis in Lemnum insulam nauigauit, ut eius uerba testantur libro ix. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. At aliæ sunt terræ differentie ex diuersi generis corporum natæ commistione, quæ ratione lapidose, & arenose habentur: atque admistam talium substantiam segregant largæ aquæ effusione ac maceratione, dum totum humidum efficiatur. Cùm enim id effectum est, id quod defertur, atque inest lapidosum, atque arenosum, id omne subsidit, & terra exacta supernatat. Tale quiddam & in Lemnia terra uisitur, quam cognominant quidam milton Lemniam, id est, rubricam Lemniam, & alij quidam sphaeragida Lemniam, hoc est, sigillum Lemnium, ob impressum uidelicet illi sigillum Dianæ sacrum. Siquidem hanc terram sacerdos cum patrio quodam bonore

Lemniz terre histor. ex Galeno.

honore sumens, haud mactatis animalibus; sed tritico, atque hordeo piamenti gratia loco redditis, in urbem comportat: quam deinde aqua maceratam, atque in lutum humidum redactam, ubi ualenter conturbauit, paulumq; inde quiescere sinit, primum aquam, quæ supernatans aufert, et mox quod sub ea est lutum tollit, ac reliquum duntaxat, quod ad inum subsedit, lapidosum scilicet, et arenosum relinquit, ut inutile, ac superuacaneum. Porro lutum illud purgue usque eo desiccet, dum mollis ceræ consistentiam accipiat: huiusq; exiguis acceptis particulis, sacrum Diane signum imprimat. Ac postea rursus in umbra siccandam reponit, donec omnem planè humiditatem amittat, fiatq; illud medicis omnibus cognitum medicamen Lemnia sphragis, siue sigillum. Sic enim quidam illam cognominant, ut dixi, ob impressam illi sphragida, hoc est, sigillum: ceu etiam nonnulli ob colorem Lemniam multon siue rubricam appellant: eundem enim, quem rubrica, colorem habet. Verum ab ea differt, quod contactu non contaminet atque illa: et secundum collem in Lemno, qui totus colore fuluo est, et in quo neque arbor, neque saxum, neq; planta nascitur, tantum huiusmodi terra uisitur. Porro tres eius signantur differentie: una quam posuimus terræ sacræ, quam alij nemini præter unam sacerdotem contingere fas est: altera uero eius, quæ reuera multos est, siue rubrica, utuntur autem eam potissimum fabri: demum tertia eius, quæ extergit, qua utuntur, qui linteæ, et uestes lauant, quibus utique collibitum est. Ceterum cum et apud Dioscoridem, et alios quosdam scriptum legissem, Lemniæ terræ hircinum misceri sanguinem, atque ex luto, quod ea mistione conficiebatur, sacerdotem quas uocant Lemnias sphragidas tum conformare, tum consignare, cupiebam profectò et ipse mistionis modum inspicere, atque symmetriam. Itaq; quemadmodum in Cyprum nauigaueram uidendorum, quæ in ea sunt, metallorum gratia, et in cauum Syriam Palestinæ partem profectus fueram, bituminis et aliorum quorundam inspiciendorum causa; ita nec in Lemnum enauigare piguit, ut quantum sanguinis terræ admisceretur, conspicerem. Nam cum iterum ex Asia Romanæ pedestri peterem itinere, per Thraciam, et Macedoniam, prius à Troade Alexandræa in Lemnum adnauigauit, nactus illic nauem, quæ ad Thessaloniam cursum destinabat. Conueniebam autem cum nauclero, ut in cursu Lemno appelleret. Et sanè ille præstitit; sed non ad eam ciuitatem, ad quam oportebat. Antea enim nesciueram duas esse in insula ciuitates, sed credebam, ut Sænus, Chius, Cos, Andrus, Tenuis, et omnes adeo, quæ in Aegeo sunt mari, unam duntaxat ciuitatem habent, toti insulæ cognominem; ita et Lemnum unam nominis sui habere ciuitatem. Porro ut ex naui descenderam, intellexi ciuitati nomen esse Myrinæ, nec in regione ciuitatis illius aut Philoctetis templum esse, aut sacrum Neptuni collem, sed in altera, quæ uocatur Hephestias, nec ciuitatem eam Myrinæ esse propinquam. Cionq; me nauclerius expectare non posset, distuli, ut cum Romæ in Asiam redirem, tunc Hephestiada uisèrem: id quod feci, prout speraueram, et proposueram. Nam ubi ex Italia in Macedoniam traiecissem, eamq; penè totam pedestri itinere pertransissem, peruenissemq; Philippos, quæ ciuitas est finitima Thraciæ, inde ad mare descendi, quod proximum aberat centum uiginti stadiis: primumq; Thason transiis, distantem plus minus ducentis stadiis, atque illinc in Lemnum septingentis, ac rursus ferme septingentis in Alexandræam Troada traieci. Ac proinde sanè ex industria tum de nauigatione, tum de stadiis adscripsi, ut si quem eadem, quæ me caperet Hephestiada uisendi cupiditas, cognito eius situ, sic nauigationem institueret. In tota namque insula Lemno orientem spectat Hephestias, occidentem uero Myrina. Et quod à poëta dictum de Vulcano est, qui Græcè dicitur Hephestus, Decidit in Lemnum, propter collis naturam occasionem sumpsisse fabulæ crediderim. Apparet enim combusto simillimus, tum colore ipso, tum etiam quia nihil in eo nascitur. In hunc itaq; collem sacerdos, quo tempore ego ad insulam accesseram, egressa, certo quodam tritici, hordeiq; numero in terram cōiecto, alijsq; quibusdam pro religione patriæ perpetratis, plaustrum totum terræ impleuit. Atq; ubi in urbem conuenisset, quo dixi modo, illas fama hominum adeo celebratas Lemnias sphragidas præparabat. Visum ergo mihi erat percontrari, nunquid unquam antea hircinum, aut caprinum sanguinem huic terræ misceri solum, memoriæ proditum accepisset. Quo audito, omnes in risum soluti sunt, nec ij sanè quiuis ex uulgo, sed uiri oppido quàm eruditi, cum in alijs, tum præcipue in uniuersa patriæ historia. Quin et à quodam librum accepi, quondam ab incolarum quopiam descriptum, qui omnem Lemniæ terræ usum edocebat. Quamobrem nec me quoque piguit huius medicamenti periculum facere, acceptis sphragidum uiginti millibus. Sed et his, à quo librum dono accepi, inter principes habitus, ad multa hoc utebatur medicamine: siquidem ad uulnera tum uetera, tum cicatrici inducendæ contumacia: ad hæc ad morsus uiperæ, atque adeo omnes ferarum morsus, necnon aduersus medicamenta lethalia, non antè modò exhibere, sed et post sphragide uti consueuerat. Addebat porro sese periculum fecisse medicamenti, quod quia fructum iuniperi accipit; διὰ τὸν ἀγρευθίδων nuncupatur, cui utique indabatur et terra Lemnia: uomitionque ciere aiebat, siquis cum etiā in uentre lethale uenenum hereret, alexiterum siue amuletum ebibisset. Et sanè nos quoque huius secimus periculum in lepore marino, et cantharidibus, cum sese tale quippiā accepisse homines suspicarentur: ueriam hausto, quod Lemniam sphragida habebat medicamentum, protinus omne euomuerunt, nec postea ullum illis accidit symptoma eorum, quæ ad leporem, et cantharides comitari consueuerunt: tanetsi conuicta esset perniciosorum medicaminum exhibitio. Ceterum an ad alia mortifera medicamenta, hæc inquam, quæ uocant deleteria, eandem uim habeat medicamentum, quod ex fructu iuniperi, et terra Lemnia conficitur, mihi utiq; ignotum est. At ille ab Hephestiade profectò assererat, adeo ut et rabientis canis morsum eam sanare diceret in uino diluto epotam: at ulceri ex aceto impensè acri impositam. Sed et aliarum ferarum ictus, ex aceto sanare referebat, extrinsecus folijs herbarum insuper impositis, quæ putredini resistere didicimus. In primis uero prædicabat scordium, deinde centaurium exile, inde marrubium. Porro si quando nos sanè ad ulcera cacoëthe, et putrida terram Lemniam adhibuimus, magnificè profuit. Vsus autem est, pro prauitatis ulcervis magnitudine. Quippe id, quod grauiter olet, impendiq; laxum, molleq; est, ac sordidum, sustinet ut uel per acerrimum acetum Lemnia terra in lutosam soluatur consistentiam, aliorum more pastillorum, quorum alius alio utitur: dico et

Lemniz terræ  
uires.

tem Polyide, & Prasionis, & Andronis, & qui nunc dictus est, quem Betinum uocant. Siquidem hi omnes ualenter desiccantes profunt ulceribus contumacibus, soluti interim quidem in uino dulci, interim sapa, interim œnometite, nonnunquam etiam alborum uinorum quopian, aut fuluorum, aut flauorum, prout nimirum usus postulat. Nam de talibus alibi definitur. Similiter uero quandoque soluiuntur aut ex aceto, aut uino, aut aqua, aut oxymelite, aut oxycrato, aut mellicrato. Porro Lemnia terra ex aliquo comprehensorum soluta, medicamentum fit idoneum tum recensibus glutinandis uulneribus, tum medendis inueteratis, egrè ad cicatricem uenientibus, & contumacibus. Hactenus de Lemnia terra Galenus. Ex cuius quidem uerbis facile conijci potest, Lemniam terram, quam ad nos hoc tempore conuehunt mercatores Turcicis characteribus obsignatam, illegitimam esse, & minime sinceram. Quandoquidem constat Galeni testimonio, Lemniam sphragidem impensè rufescere, non autem subrufescere, qualis hæc uisitur, que passim pro legitima, sinceraque circumferunt impostores. Quamobrem eorum sententiam minime improbandam censuimus, qui nil aliud esse Lemniam terram putant, quam bolum Armenium, qui officinis seplasiariorum Orientalis cognominatur: præsertim quod certò compererim, bolum hunc nō aduehi ex Armenia, ubi legitimū sincerissimūque Armenium lutum nascitur, sed tantum ex insula Lemno, ex eodem sanè colle, cuius meminit Galenus. Siquidem Armenium lutum, quod bolum quidam uocant, præterquam quod ex Armenia adferri debeat, si Galeno medicorū principi credimus, colore est pallido ochræ instar, non autem impensè rubro. Id quod ipse Galenus libro nono simplicium medicamentorum in Samiæ terræ mentione testatur, his uerbis. Ceterum durante hac immani, & graui pestilentia, ex Armenia ea, quæ Cappadocia finitima est, data nobis est terra, etiam siccantior, colore pallido. Lapidem qui donat, non terram appellabat: promptissimeque in leuiorem soluitur, eeu etiam calx: sic enim uidelicet nuncupo petram combustam. Verum uti nec in illa arenosum quippiam admistum est, ita nec in Armenia. Nam posteaquam in mortario pistillo comminuta est; adeò est leuis, nec plus est lapidea, quam aut calx, aut Samius aster: tametsi non æque ut aster leuis est. Itaque illo etiam magis conspissata est, minusque aëria: quāobrem opinionem, ac phatiasiam præbet ijs, qui negligentius intuentur, quasi lapis esset. hæc Galenus. Ex quibus sanè perspicuum fit, quod Armenia terra, siue lapis, uel lutum, ab Armenio bolo orientali uulgò uocato, quā maxime disidet. Atqui, ut fraus, & impostura detegatur; atque palam fiat, non est silentio dissimulandum, quod qui Lemnum incolunt mercatores, cum sciant Armeniam terram ad nos non aduehi, lucri proinde dulcedine allecti, ex una tantum terra duas faciunt. Quippe sincerissimam terram Lemniam extra insulam Constantinopolim comportant, et pro Armeniaca uendunt, emptoribus suadentes eandem eò ex Armenia comportari. Quam uero in Lemno pro Lemnia exhibent, ut colore ab altera differat, eam euidem albæ terræ inibi nascentis admiscunt: quo fit, ut longè minus quā sincera rufescat. Hanc itaque legitimæ sphragidis loco supponunt, hisce adulterijs permixtam: quam etiam sigillis obsignant, ut inde impostura maius lucrum accedat, signo magis, quā medicamento fidentes. Ceterum cum hæc impostura à pluribus modo deprehensa sit, qui fraudem non ignorant, relictæ uulgaribus medicis, quæ obsignata conuehitur, ubi Lemnia sphragide sit opus, Armenium bolum falsò uocatum sumunt, præstantissimum scilicet, quod pro certò habeant, hunc legitimam esse sphragidem Lemniam, quam miris laudibus extulere ueteres ad uenena, & uenenosorum animalium ictus. Quare inuigilent diligentissimi medici, quibus cordi est hominum salus, ne hac in re decipiantur, cum perdifficile sanè sit (ut libro primo de antidotis memoriæ prodidit Galenus) sinceram sphragidem cognoscere ab adulterina. Verum quandoquidem in ARMENIÆ terræ sermonem deuenimus, non alienum fuerit, eius etiam uires referre ex Galeno, qui eas loco nuper citato in simplicium medicamentorum censu subdidit, sic inquit. Armenia terra, quod summe desiccet, ad dysenterias, & uentris profluvia, tum sanguinis expuitiones, & catarrhos, ad hæc ad putrescentia oris ulcera in primis competit. Quin & eos magnificè iuuat, quibus ex capite in thoracem fluxio decumbit: quamobrem illis, quibus ex tali occasione assidua difficilis est anhelitus, ualide prodest. Sed & eos, qui phthoe laborant, adiuuat: ulcus enim eorum desiccatur, ut haud etiam tussiant, nisi in uictu peccetur non leuiter, aut ambiens de repente ad intemperiem recidat. Ac mihi uidetur, quod sicut in fistulas sæpe conspeximus, non in alijs partibus duntaxat, sed in ipso etiam ano, ut citra collyrii immisionem, quod sordem, aut callum auferret, ipso duntaxat exiccante medicamento, contraheretur, ac clauderetur; ita quoque in pulmonis eueniat ulcere. Siquidem & ipsum ab exiccantibus iuari medicamentis perinde conspicitur, utique cum mediocre est, non admodum magnum. Itaque nisi sunt quidam eorum, qui talia habebant, prorsum esse liberati. Ac quidam, qui Roma in Libyam talem ob causam profecti sunt, plane se sanos esse credidere: & sanè usque ad annos aliquot inculpate transigebant: postea uero cum non pari degerent cura, & cautione, reditus morbi apparuit. Hos ergo, ut dixi, bolus Armenia euidenter adiuuit. Quin & eos qui Romæ agunt, qui assiduo difficultate spirandi discruciantur, magis etiam. Porro in magna hac peste, cuius eadem facies fuit, atque eius, quæ Thucydidis memoria grassabatur, quotquot hoc medicamen bibere, celeriter curati sunt. At quibus non profuit, omnes interiire, scilicet cum nec alio quouis iuuarentur. Vnde colligitur, quod ijs duntaxat non fuerit auxilio, qui plane erant incurabiles. Ceterum bibitur ex uino consistentia tenui, modice diluto, si aut plene febris careat, aut leuiter ea teneatur: sin grauius febriat, admodum aqueo. Non tamen calore uehementes sunt febres pestilenciales. Porro de ulceribus resiccati postulantiibus quid attinet dicere, quantam uim habeat bolus hæc Armeniaca? Liberum est autem utcumque appellare uelis, siue lapidem, ut is qui mihi donauit: siue terram, ut ego; quandoquidem humidis rigari patitur. Hactenus de Armenia bolo Galenus. Sed quoniam Lemnia sphragis, & Armenia terra, quod uenenis maxime resistent, mihi in mentem redegerunt lapidem, quem Arabes suo idiomate Bezahar uocant, & contra deleteria medicamenta miris admodum laudibus celebrant, hic locus opportunus nobis uisus est, in quo de huius lapidis historia, ac uiribus aliquid disseramus. Lapis itaque BEZAHAR, Mauritanorum testimonio, antidotus est omnium præstantissimus, sua speciali dote, contra omnia in uniuersum uenena: utpote qui non modo

Lemnia terra  
quid censeatur.

Fraus, & impostura  
detecta.

Armeniæ  
terre seu boli  
uires ex Gal.

Lapis Beza-  
har historia,  
& uires.

haustus; sed etiam adalligatus, ita ut nudam sinistri lateris carnem contingat, omnia superet uenena. Lapis hic plerumque est generum, nempe flauus, puluerulentus, qui ex albo uirescat. Præstantissimus est flauus, deinde puluerulentus. Verum enimvero diligenter inspicere oportet, ne impostorum fallacis decipiantur, qui hos lapides inquirunt. Sunt enim nonnulli alij lapides, qui hos facie representant, sed uiribus nullis præditi. Hunc Rasis experimento ductus, miris extulit præconijs, ita de eo scribens. Lapis Beza-har est mollis, colore flauo, sapore nullo. Cuius peculiaris uis est, ut uenenis omnibus aduersetur. quandoquidem ego contra haustum napellum hoc lapide usus sum felici admodum successu. Erat autem hic colore flauo albicante, levis, et luminis modo splendens. Equidem certo testari possum (hoc enim pluribus experimentis compertum habeo) lapidem hunc longè magis præstare aduersus deleteria uenena, quam cetera non modò simplicia huiusce facultatis medicamenta; sed etiam theriaca dicta, et alia quæuis antidota. Subdit præterea Abdalanar ach. Lapidem, quem uocant Beza-har, iam ipsi uidimus apud filios Almirama custodis legis Dei: pro quo lapide is magnificam, ac propè regiam ædem Cordubæ reperiit, initio belli. Lapis hic (ut diximus) ita uiribus contra uenena omnia pollet, ut non solum haustus duodecim granorum pondere; sed uulneri impositus à mortiferis quibuscumque feris ictos, statim liberet, ueneno sudore expulso. Idem pariter iuuamenti adfert, si ore aliquo tempore sugatur. Verum lapis hic inuentu difficilis fuerit, quòd non desint paribus notis lapilli, qui tamen nullam iam habent aduersus uenena. Sunt etiam, qui memoriæ prodiderint, in ceruorum oculorum angulis lapidem gigni, uiribus Beza-har prædicto haud absimilem. Aiunt enim in orientali plaga ceruos longo senio confectos serpentes deuorare, quorum esu (si uera scribunt) reuiuescunt. At ueneni superandi causa, serpentibus deuoratis, in fluminum aquis ceruos illos mergi tradit, capite tantum extra aquas exerto. Iis autem sic permanentibus, humorem quandam lentum ab eorum oculis deflui, qui tandem solis ardoribus in lapillos inibi concrefcit, glandis imaginem referentes. Hic itaq; lapis ipsis è fluminibus egredientibus, ab eorum oculis (ut aiunt) statim decidit in humum: ubi ab ijs facile reperitur, qui rem omni diligentia obseruauerunt. Sed an hæc historia uel fabula dici mereantur, rerum naturalium studiosis, et peritioribus iudicandum relinquimus.

Χαλκανθόν.

ATRAMENTVM SUTORIVM.

CAP. LXXIII.

ATRAMENTVM sutorium genere quidem vnum & idem est, molle, & concretum: sed in specie differentias tres habet. Vnum nanque humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatis, concrefcit: quare ab ijs, qui Cypria metalla conficiunt, stillatitium appellatur. Petesius ipsum pinarion vocat: alij stalacticon, id est, stillatitium. Alterum simplici ratione fit in speluncis: postea transfusum in excauatos scrobes, concrementum capefcit, quod pecton, id est concretitium, propriè nominatur. Tertium dicitur coctile, & in Hispania fieri solet: sed inutile, ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi hæc est. Aqua madefactum decoquunt, mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus coalescit, in complures formulas digestum, tesserarum speciem reddentes, quæ racematim inter se cohærescunt. Optimum esse creditur cæruleum, graue, cōcretum, translucens: cuiusmodi stillatitium est, ab alijs lonchoton nominatum. Proximum concretitium. Coctile uerò ad insectus, & denigrationes, aptius cæteris esse compertum est: sed ad medicinæ usum inualidius esse, experimenta docent. Valet adstringere, calfacere, & crustas inducere. latas uentris tineas necat, drachmæ pondere deuoratum, aut cum melle linctum: uomitus ciet. aduersus hausta fungorum venena, ex aqua potum auxiliatur. purgat caput aqua dilutum, & in vellere naribus instillatum, Vritur, ut paulò post in mentione chalcitis ostendemus.

Chalcæthi ge-  
nera, & histo-  
ria.

CHALCANTHVM, quod Latini Atramentum sutorium uocant, quoniam uetri modo pelluceat, Itali Vitreolum nominant. Duo eius genera in Hetruria. Vnum fossile, per sese in terræ uisceribus concretum, quod uulgò appellant Coppâ rosa. Alterum factitium, cuius passum est usus, insectoribus expetitur. Præstat hoc plus, minusue tam pro regionum, locorum, ac cæli dispositione, quam ipsius fossilis materiæ, à qua arte conficitur. Veruntamen compertum est, Romanum cognomento (quanquam colore constet dilutiore) cætera factitij genera præcellere. Secundum locum obtinet Cyprium, tametsi huic apud antiquos palma. Quod autem è Germania adfertur, omnibus in Italia infirmis habetur: sed quòd sit colore cæruleo, nonnullos fallit. Cæterum chalcæthi materiam, quoniam gustantibus linguam uellicet, aspero, adstringentiq; sit sapore, putauerunt quidam sulphureis, ferreis, ac æreis constare qualitatibus, quinetiam aluminis, nitri, salisq;. Chalcæthi uena, quæ foditur in agro nostro Senensi pluribus sanè locis, præsertim maritimis in syluestribus plerumque uallibus, terrea potius, quam saxeâ uisitur, colore subcinereo, maculis nonnullis respersa, quarum aliæ ferri rubiginem, aliæ æruginem, colore referunt. Hæc dum foditur, fretidum, graueolentemq; halitum eructat, sulphuris ferè instar. quam ob causam in conclusis, concameratisq; cuniculis nusquam foditur, sed aperto undique cœlo. Quippe si in subterraneis foderetur speluncis, metallorum modo, ob acerrimum, foetidissimumq; uaporem, fofores noxio concluso spiritu facillè interirent. Effossam itaq; chalcæthi uenam in acerrum in longitudinem protractum, quandam super aream exaggerant, ubi aperto cœlo sex ad minus mensibus, imbribus, roribus, pruinis, solibusq; die noctuq; macerandam relinquunt: quo tempore statutis quibusdam diebus legonibus, et rastris acerrum dilacerant, subuertuntq; et iterum in eandem congerunt acerrationem, ut facilius hæc imbribus maceretur, coquaturq; solis ardoribus. Post hæc tectum acerrum superponunt, ne amplius in posterum pluujs dilutur, neque solibus plusquam par sit, inarescat: et ita alijs sex mensibus materiam hanc fermentari patiuntur. Eligunt



gunt deinde locum, quò facilius è propinquis fluuijs, uel fontibus ducantur aque: ibiq; sub constructo tecto foditur alueus, qui ligneis asseribus, uel lateribus, et calce adeò stipatur, ut indita intus aqua nullo pacto prolabi possit. In hanc igitur alueum purissimam aquam deducunt, cui demum tantum illius chalcantibi materie addunt, quantum huic negotio addicti ministri satis esse censent: postea miscent aliquo tempore ligneis quibusdam instrumentis ad id paratis, quousque aqua in se omne quod inest chalcantibi receperit: deinde excrementa subsidere sinunt, donec aqua chalcantibo pregnans claritatem concipiat. His peractis foramina quædam prope aluei fundum in latere facta, recluduntur: et inde exiliens aqua in magnam excipitur receptaculum. Hanc itaque sumunt, et in plumbeos alueos conijciunt (cætera enim metalla ab ea eroduntur) fornacibus quibusdam superpositos, et igne subdito feruorem excitant, statutis horis. Demum ferri frustum immittunt, uel æris: siquidem aiunt chalcanthum nunquam concrescere, nisi huiusmodi imponantur metalla, quæ iniecta paruo tempore colliquefcunt in aquam. Postquam autem debito tempore coxerint, ignem quàm primò è fornace extingunt, permittuntq; quiescere decoctum, quousq; egelidum reddatur, ne plumbeus alueus, eo sublato, fornacis calore colliquefceret. Omnibus itaq; tepesactis, decoctam materiam eximunt, et in alueolos quosdam ligneos digerunt, ubi tandem concrefcit, aluminis rupei modo, fitq; chalcanthum. Si uerò aliquid superfit decocti, quod concrefcere nequeat, id totum iterum recoquunt, eadem seruata ratione. Sed longè aliter olim fiebat Cyprium chalcanthum, de quo Galenus libro nono simplicium medicamentorum, in hunc modum scribit. Forte fortuna et chalcanthum in chalcitin transire conspexi. Assortau enim ex Cypro et huius medicamenti ingentem copiam. Extinui enim omne post annos plus minus uiginti chalcitis effectum est, intima eius parte chalcantibi speciem seruante. Quamobrem et usque in hunc diem quod sic mutatur, asseruo, obseruans dum ad inum usque uno quoque anno procedat mutatio, ceu chalcitidis in misy, ut est ante positum. Ceterum mixari subit de hoc medicamento, quo pacto uehementissimæ adstrictioni admista est caliditas non instrenua. Constat ergo quòd omnium maxime condire, seruareq; carnes humidæ potest, nimirum caliditate humiditatem absorbens, atq; adstrictione substantiam contrahens, atq; constipans: hoc enim opere nonnihil etiam humiditatis ipsius exprimit. Constringit uerò, desiccatur, atq; contrahit in sese totius substantiam carnis. Porro quo tempore in Cypro diuersabar, hunc in modum medicamentum hoc colligi conspexi. Domus erat magna quidem, non tamen alta, ingressui in metallum obiecta. Ad parietem autem domus sinistrum, qui erat ingrediētibus ad manum dextram, effossus erat specus in continentem collem, ea latitudine, ut tres sese uiri in eo contingerent, tanta uerò altitudine, ut uiro summe procero recto liceret incedere. Specus hic decliuus quidem erat, sed non planus, et multis locis præruptus. Porro ad finem eius quasi in stadium porrecti, lacus erat aque uiridis, et crassæ tepentis plenus. At in toto descensu calor similis, qualis in primis balnearum adibus percipitur: quas, quòd in eis corpora præmolliri soleant, promalacteria appellare consueuerunt. Aqua uerò quotidie guttatim ex pertuso colle destillans, quatuor et uiginti horis diei, ac noctis colligi assolet ad amphoras Romanas quasi octo. Eam aquam uincti quidam in urnas quasdam quadratas fictiles in domo ad ingressum posita stant, efferebant, in quibus paucis diebus concrefcebat fiebatq; chalcanthum. Mihi uerò ubi ad terminum effossi specus descendissem, ubi uidelicet tepida hæc, uiridisq; aqua colligitur, æris odor uisus est suffocans, et toleratu difficilis, chalcitin, æruginemq; redolens. Hæc aqua quoq; gustu præferebat qualitatem eiusmodi. Ea propter et nudi, et cum festinatione amphoras uincti exportabant, nec longiorem illic moram perferre poterant, sed celeriter recurrebant. Accensi autem erant mediocribus in specu interuallis lychni, qui nec ipsi longo tempore durabant, sed celerrimè extinguiebantur. Hunc ergo specum pedetentim excauation multis annis ab ijs tunc audui. Hæc enim, inquiebant, aqua uiridis, quam uides ex colle in lacum manantem, sensim se ipsa minor effici solet. At ubi prope adest ut definat, rursum uincti, quod continens est ipsius collis, perfodere pergunt: euenitq; aliquando olim, ut subito quicquid perfossum esset, concideret, omnesq; ad inum occideret, ac totam uiam corrumpere. Id ubi fit, alio foraminis fodiendo eousque insunt, quoad rursum aqua illis adsit. Hæc habui, quæ tibi de chalcantio exponenda censerem, et sanè fortasse non necessaria, ceterum quæ scire præstaret, quàm ignorare. Memineris autem, quòd ad sinistram manum ingredientibus conspectum nobis dixerim metallum foreos, chalciteos, et misyos, ut ex his conijcere liceat, aquam pluuiam totius collis terram illam colluere, atque abluere, ex qua sponte quidem fiebat sory, misy, et chalcitis: et per fornaces æs, cadmia, pompholyx, spodium, et diphyrges. Hæc de chalcantibi historia Galenus. Ex quibus palam fit, aquam uirescentem illam, quæ è monte in speluncam continuo stillicidio defluebat, nil aliud extitisse, quàm aquam, annuis imbribus in montem illum delapsam. Quandoquidem cum ob sulphureos, metallicosq; uapores, uniuersa montis moles rara effecta, undiq; innumeris meatibus scateret, non sanè mirum uidetur, si tractu tēporis laberetur in inum, secumq; deferret tenuiores chalcitis, misyos, foreos, tum etiam ærariæ materie partes: ibidemq; calefieret, ac decoqueretur, sulphureis, bituminosis, alijsq; metallicis ignibus in terræ uisceribus conclusis: adeò ut tandem in cauernam illam descēdens, naturæ opera id fuerit assecuta, quod factitum chalcanthum arte consequitur. Eam igitur ob causam in quadratis uasis extrà paratis proiecta ea uiridis aqua, in chalcanthum coibat nulla adhibita coctionis ratione. Quinetiam opus non erat ferrum, uel æs in eam iniicere liquandum, ut concrefceret, quemadmodum in factitio fit chalcantio. quippe quòd dum per ærarij montis meatus laberetur, æris innumera ramenta secum deferebat, quæ chalcitidis, et misyos, uel ab ipsa aqua contracta, in eandem liquebant, argumento quòd æruginis modo uiridi esset colore. Ob id itaq; statuendum fuerit, Cyprium chalcanthum concretum esse medicamentum ex chalciti, misy, sory, et ære conflatum. Id quod manifestè declarat Galenus, cum ait. Memineris autem, quòd ad sinistram manum ingredientibus conspectum nobis dixerim metallum foreos, chalciteos, et misyos, ut ex his conijcere liceat, aquam pluuiam totius collis terram illam colluere, atq; abluere, ex qua sponte quidem fiebat sory, misy, et chalcitis: et per fornaces æs, cadmia, pompholyx, spodium, et diphyrges. Hoc ego quoq; maxime obseruau in quibusdam chalcantibi fodinis in Tri-

Chalcitidis uires, & historia ex Gal.

Brasauoli uana accusatio.

dentino agro, ubi chalcitin, misy, soryq; nō ambigimus reperiri copiosa. Sed cum hæc non animaduertisset Brasauolus, uir alioqui huius ætatis clarissimus, dum imprudentiæ Galenum accusare contendit, eius sanè seipsum magis accusat. Quandoquidem ubi Galenum sibi examinandum proponit, eo scilicet loco, in quo scribit chalcanthum è Cypro à se aduectum, tractu temporis consensescens, factum esse chalcitin, dicit et factitium uulgare nostrum illud idem efficere: ueruntamen si in aqua resoluitur iterum in chalcanthum concreescere, quod manifestè indicat in ueram non transiisse chalcitin: asserens hoc non expēdisse Galenum. Verum in hoc uidetur Brasauolus Galeni uerba haud rectè percipisse cū inquit, quòd aqua, ex qua Cyprium fiebat chalcanthum, terram uniuersam diluebat, è qua chalcitis, misy, soryq; fiebant in terræ uisceribus. Siquidem nil aliud dixisse uoluit Galenus, quàm quòd chalcanthum esset chalcitis aqua dissoluta. Nam si chalcitis sponte proueniens in aqua resoluta chalcanthum efficitur, mirum sanè non est, si ea quæ tractu temporis sit ex chalcantho, eundem præbeat effectum. Neq; his obstat, quòd quis dicat Cyprium chalcanthum non solum ex chalciti fieri, sed ex misy simul, et sory. Quandoquidem (ut in proximo commentario dicamus) tria hæc chalcitis, misy, sory, ex ipsius Galeni sententiâ, eiusdem tum generis sunt, tum etiam facultatis. Chalcanthum sponte, et per se in terræ uisceribus conflatum, misy sanè pulcherrimum misy nuper ad me Tridento Martinus Guidottinus diligens peritusq; pharmacopola, in plures laminas per uniuersam massam dissectum à misyos laminis aureis scintillis fulgentibus, quæ illas unam ab altera diuidunt. Quod sanè maximum præbet indicium, chalcanthum hoc nil prius extitisse, quàm chalcitin, quæ Galeno teste, misy semper superstat. Cæterum illud nil miri nobis adfert, quòd commendauerit Dioscorides chalcanthum potum ac deuoratum ad latus alui tineas, et ad fungorum uenena, etsi medicamentum erodens, et septicæ facultatis habeatur. Siquidem ad eosdem, et alios usus hoc tempore non modò chalcanthum ipsum quidam potui exhibent in pestilentia; sed etiam eius oleum, quod chymistæ uitreis organis magna ignium ui ab ipso chalcantho eliciunt, nullo sanè incommodo. Qui illud in peste propinant, quod uulgò uocant Coppâ rosa, in aqua rosarum dissolunt, et iterum cogunt, reiteratis tribus, aut quatuor uicibus: dantq; obolum, nonnumquam concitantes.

ΧΑΛΚΙΤΙΣ. CHALCITIS. CAP. LXXV.

CHALCITIS præfertur similis æri, friabilis, nec lapidosa, nec inueterata, intercurrentibus oblongis venis, splendentibusque. Hinc absterforia vis inest, excalfaciens, & crustas ulceribus obducens: purgat; quæ oculis, & eorundem angulis hærent. In genere leuiter erodentium est. Ad ignem sacrum, & ulcera, quæ serpunt, efficacis est. Sanguinem è vulua, & naribus erumpentem, cum succo porri sistit. Gingiuarum vitia, depascentia ulcera, tonsillasque eius farina comescit. Vsta, & cum melle trita oculorum medicamentis longè utilior redditur. Callum genarum, & scabritiam absumit, abstergetque. Fistulas tollit, collyrij modo in eas adacta. Fit ex chalcite medicamentum, quod Psoricon uocant, duabus eius partibus, cum vnâ cadmiæ additis, & ex aceto tritis. oportet autem in fictili obruere fimo diebus quadraginta, per Caniculæ ardore: sic enim fit actius. idem quod chalcitis potest. Alij pares vtriusque portiones in vino terunt, & eadem prosequuntur. Vritur chalcitis fictili nouo, viuis carbonibus superposito. Modus autem vstionis in humidioribus est, dum ipsa chalcitis bullas excitare deserit, & perfectè inaruerit: in reliquis verò, dum mutata in floridum colorem fuerit, & sanguineum aut miniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda est. Insidens autem spurcitiâ statim expellenda, mox reponenda. Torretur etiânum perflatis carbonibus, usquedum luteo colore palleascit: aut fictili subditis candentibus prunis, subinde versata, donec igni conflaret, & colorem mutet.

ΜΙΣΥ. MISY.

CAP. LXXVI.

MISY assumendum natione Cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet, & vstionem, cum chalcitide eandem, præterquam quòd psoricum ex eo non conficitur, excessus, defectusque ratione tantum differens. Aegyptium autem cæteris præstat, utpote quod efficacius habeatur, sed ad ocularia medicamenta multò superadicto inferius.

ΜΕΛΑΝΤΕΡΙΑ. MELANTERIA.

CAP. LXXVII.

MELANTERIA geminæ est originis. quædam in faucibus cuniculorum, quibus æs eruitur, salis modo concreuit. Alia uerò in summa facie supradictorum locorum coit, quæ terrena est. Quinetiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdam regionibus, fossilis quædam. Præstat quæ sulphuris colorem trahit, læuis, pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. Vim causticam eam obtinet, quam & misy.

SORY existimarunt aliqui melanteriam esse, aberrantes: liquidem sui generis est sory, ei non ab simile. verum forei uirus inest graue, & nauseam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibusdam regionibus, ut in Libya, Hispania, & Cypio. Præfertur Aegyptium, quodque frianti nigrius apparet, in multa foramina dehiscens, suppingue, insuper adstringens, & oisactu deuorationeque magnum uirus olens, ita ut stomachus in uomitiones effundatur. Quod autem friatum scintillas misyos modo non emittit, & alterius generis esse, & inualidum, censendum est. Vim, & uestionem supradictis similem habet. dolori dentium cauernis inditum medetur, eosque labantes  
 10 firmat: ischiadicis ex uino infusum auxiliatur: illitum cum aqua, uaros extinguit. Medicamentis admiscetur, quæ capillos denigrant. Hæc autem ferè omnia, & alia, quæ uestionè experta non sunt, perustis ualidiora esse existimantur: præter salem, & uini sæcem, nitrum, calcem, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt, combusta enim uiribus efficaciora redduntur.

CHALCITIS. Misy, & Sory, longis iam seculis latent, adeò ut perpauci, uel potius nulli sint in Italia, qui hæc legitima se uidisse affirmant. Et quanuis ego iamdudum pluribus in specubus, cauernisq; ubi æris uena foditur, diligenti ssimè inuestigauerim, atq; nullum ex his, præter melanteriam, fuerim consequutus; hoc tamen anihò Misyos frustum sanè pulcherrimum, aureis emicans scintillis, quin & Chalcedidis, & Soryos, quibus etiam chalcantum adiunctum erat, misit ad me Tridento Martinus Guidottinus pharmacopola rei herbariæ, & metallicæ studiosus. Inuenta  
 20 autem hæc sunt in quibusdam chalcantibi fodinis in Tridentino agro, quibusdam montibus non longè à Leuigo pago. Verum legitimam Melanteriam iandiu inuenimus, in compluribus metallorum tumulis. Porro putat Musa Brasauolus, medicus nostri temporis celebris, chalcantum nobis Romanum uocatum, uerum esse Misy, quod tamen ueritati, & rationi maxime repugnare uidetur. Quandoquidem præter id quòd aurum colore minime refert, minusq; cum frangitur, aureis fulget scintillis, sed uitream tantum refert substantiam, palam certè omnibus est, Galeni testimonio; Misy factitium non esse medicamentum, sed sponte, & per se factum in terræ uisceribus. Ipse enim libro nono simplicum medicamentorum, de chalcantibo scribens inquit. Memineris autem, quòd ad sinistram manum ingredientibus conspexit in nobis dixerim metallum foreos, chalciteos, & misyos: ut ex his conijcere liceat, aquam pluuiam totius collis terram illam colluere, atque abluere, ex qua sponte quidem fiebat sory, chalcitis, & misy: & per fornaces æs, cadmia, pompholyx, spodium, & diphryges. Præterea idem de sory, chalcitide, & misy differens testatur (ut latius  
 30 inferius patebit) dum in eorum ingrederetur metallum, quasdam intus se conspexisse ueluti zonas, alias super alias in longum porrectas, numero tres: quarum infima erat ipsius foreos, super quam erat altera chalciteos, suprema uerò misyos. Id quod manifestè ostendit, tria hæc spontè in terræ uisceribus fieri, non autem ullo artificum ingenio, ut Romanum chalcantibù fieri nemo non intelligit. Constat præterea nullam factitij chalcantibi speciem esse posse misy, quòd scripserit Galenus chalcitin transire in misy, non autem misy in chalcitin. Idcirco eim Galeni testimonio, & uulgaris experientia omnibus perspicuum sit, non tantum Romanum chalcantum, sed omne, cuiuscunque generis tractu tēporis degenerare in chalcitin, nullo pacto fuerit censendum, Romanum chalcantum esse misy. Vnde rectius fortasse dicere potuisset Brasauolus, chalcantum foreos magis speciem referre, quam misyos. Nam si tantæ auctoritatis apud doctissimos quosq; medicos fuerit Galenus, quemadmodum chalcitis uertitur in misy, ita & sory transit in chalcitin.

Sed ut omnibus huiusce facultatis studiosis hæc admiranda naturæ uis clarius innotescat, audiant, quæ se, Galenum de  
 40 re hac differentem lib. ix. simp. med. bis uerbis. In metallo Cypri, cuius modò mentionem feci, in montibus Solorū, do-  
 mus erat ingens, cuius ad parietem dextrum, sed ad nos utiq; qui ingrediebamur sinistrum, introitus erat in ipsum metallum, in quo quasdam conspexi in longissimum porrectas ueluti zonas, alias super alias numero tres: infima erat ipsius foreos, super quam erat altera chalciteos, suprema misyos. Ceterum id tēporis præfectus metalli his cōmostratis: Sicut, inquit, nunc aduenis in cadmiæ fornacariæ uopia, ita horum trium admirandas has uides diuitias. Itaque ego eim eius multum accepi, primum quidem in Asian, deinde Romam attuli, & usque modo habui, elapsis iam annis plus minus triginta. Et forte quædam absolutum fuit hoc opus ad usque octauum librum, ante annos uiginti, nec adiectus fuit nonus hic, partim quòd lapides quosdam nondum conspexissem, partim ob alia negotia, quæ mihi interea temporis obuenerunt. Nunc autem cum nonum hunc librum cæteris addere pararem, interea fortè fortuna mihi accidit res spectatu longè pulcherrima, ac si quissiam eo studio, ac industria magno cum artificio effecisset. Nam cum misy opus:  
 50 haberem, ad medicamen quodpiam præparandum, bolum eius accepi, quam ferè plena manu tentas, qualem sanè consistentiam misy non admodum solet habere, eim in parua frustula diuidatur. Miratus itaq; insolitam eus condensationem, bolo facta extinum quidem misy circumquaq; reperi, eius quod intus erat, uelut efflorescentiam. Porro sub eo inter chalcitin uidelicet, & misy, quiddam erat medium uergens ex chalcite ad misy, ex dimidio iam commutatum: principio enim bolus fuerat chalciteos: cæterum quod in alto erat, perfecta erat chalcitis, nullam dum alterationem experta. Hoc igitur ubi uidissem, cogitatione repetens, & in metallo ita super chalcitin nasci ipsum misy, ut ærugo super æs, in mentem subiit inspicere, quod seruabatur adhuc apud me reliquum ipsius foreos, nanquid & ipsum ullam accepiisset mutationem in chalcitin: & nonnihil certè apparuit suspicionis, ut uideretur & ipsum fortè longo tempore mutationem in chalcitin posse accipere. Itaq; mirum non est tria hæc medicamenta eiusdem genere facultatis esse, sory dico, chalcitin, & misy, tenuitate, & crassitudine partium inter se diuersa. Crassissimum enim est inter ipsa sory, tenuissimum misy, medium utriusq; facultatem habet chalcitis. Adyunt uniuersa hæc tria, & escharas quas no-

Chalcitis, misyos, foreos, & melanteriam consider.

Brasauoli error.

Misyos, & cognatorum historia, & uires ex Galeno.

cant, efficiunt. Attamen etiam si urant, nonnihil quoque adstringunt. Ceterum misy admotum carnibus duris, minus chalcite mordicat, tametsi ea non minus sit calidum: uerum id habet, quod tenuum partium essentia sit. Porro clem utraq; hæc in decoctionibus fundantur, & magis chalcitis, quam misy; sory tamen non liquefit, nimirum quod lapidosius sit, ac uehementius compactum: sicut rursum misy, quia à congenito calore elaboratius est, ac prouide siccius chalcite, idcirco merito quoque ægrius liquefit. Et libro quarto de compositione medicamentorum per genera, idem Galenus ita scribit. Misy, & sory, ut didicistis, chalcitidi genere cognata sunt, ex una ut dicam radice producta, tenuius tamen apparet misy, ac minus mordax & urens, crassius sory est, & utroque siccatur imbecillius.

Διφρυγες. DIPHRYGES.

CAP. LXXIX.

DIPHRYGIS tria genera esse creduntur. Quoddam enim metallicum est, quod in Cypro sola gignitur: lutosum nanque extrahitur, ex luto cuiusdam inibi specus: extractum sole siccatur, mox circumpositis sarmentis vritur. diphryges ideo uocatum est, quod & à sole, & à sarmentis vritur, arescat, & ferme torreatur. Alterum perfecti æris quasi subsidens sæx est: siquidem post frigida aquæ offusionem, ut supra retulimus, cum de flore æris differeremus, sublato ære, fornacum ima parte cohærens id genus inuenitur, & adstrictionem, & gustum æris habens. Tertium sic fit. Lapidem pyriten, ut calcem multos dies cremant in camino: cumque colorem rubricæ contraxerit, eximentes recondunt. Quidam tradunt hoc ex sola materia, quæ lapidem æris gignit, fieri: quando in dictis areis assata, & in scrobes tumulata peruritur. tunc enim ambientem scrobis locum comprehendit, & exemptis lapidibus nihilominus inuenitur. Præfertur, quod saporem æris reddit, æruginisque, adstringens, & vehementer exiccans linguam: quod sibi exusta ochra non vendicat, quæ cremata diphrygis vice uænit. Vis eius adstringere, perpurpare, extergere, ficare, excrescentia consumere, vlcera serpentia, & quæ cacoëthæ vocant, ad cicatricem perducere. Suppurationes terebinthina, aut cerato exceptum discutit.

Diphrygis cōsideratio.

DIPHRYGIS genus illud, quod perfecti æris quasi subsidens sæx est, post frigida aquæ offusionem, ut Dioscorides inquit, sæpe ac sæpius uidimus in æriis fornacibus, Tridentino agro, & comitatu Tirolensi, ac inde etiam nobiscum detulimus. Sed quod è luto in Cyprio illo specu foditur, uriturque sarmentis: quod item è pyrite lapide calcis modo exusto constatur: quod demum ex sola æris materia fit; cum in æreis assatur, & in scrobes translata peruritur, hæcenus mihi uidere non licuit: nec eorum, quod sciam, speciatim meminit Galenus. qui libro ix. simplicium medicamentorum de Diphryge in hunc modum disseruit. Diphryges mistam habet tum qualitatem, tum facultatem: habet enim in sese quiddam & mediocriter adstringens, & mediocriter acre. quonobrem ulcerum rebellium optimum medicamentum est. Conuexi autem & huius medicamenti uim ingentem ex Cypro Solis, ubi metallum ab urbe abest, quasi triginta stadiis. Proiectum erat enim in medio spatio ædium, quæ ante metallum extructæ erant, & uici, qui ei subiacer. Ceterum præfectus, ac procurator metalli, id quod post cadmiæ reperiretur, esse dicebat inutile: itaque abiici, non secus atque ustorum in foco lignorum cinerem. Verum hoc mihi ad multa utile factum est medicamentum, tum ad putrescentia oris ulcera; siue per se, siue cum melle, cui detracta sit spuma: tum ad anginam, uidelicet ubi iam per adstringentium medicaminum auxilium constitit, quod influebat. Præterea columellam ubi præsecuissim, ipso solo, & statim, & usque ad cicatricem sum usus: ac frequenter exacte oclusam effecit cicatricem tum huius particula, tum omnium adeo exulceratorum: sic in ulceribus omnibus pudendorum, atque ani. Usus autem similis est in oris ulceribus: siquidem eæ partes eisdem frere medicamentis gaudent, nimirum calida similiter, & humide. Et libro quarto de compositione medicamentorum secundum genera, sic inquit. Porro diphryges appellatum pharmacum, ulceribus ægrè humiditatis uitio ad cicatricem uenientibus aptissimum est: ualide nanque siccatur, etsi modice mordeat. Enimvero id quoque præter acrem tum qualitatem, tum potentiam uim habet adstrictoriam.

Historia, & uires ex Gal.

Αυριπίγμα. AVRIPIGMENTVM.

CAP. LXXX.

AVRIPIGMENTVM in eisdem metallis, quibus sandaracha gignitur. Optimum existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli materiæ permistum, in squamas fissile: quale in Mysia Helleponti nascitur. Huius duo genera fluxerunt. vnum supra dictum est. Alterum glandis effigie, pallidum, & colore sandaracham imitans, glebosum ex Ponto, & Cappadocia defertur: quod etiam secundum locum tenet. Torretur in testa noua, uiuis carbonibus subiectis, assiduoque versatur, donec igne flagret, & mutet colorem: deinde refrigeratum, tritumque reconditur. Vim habet adstrictoriam, & erodentem. Crustas cum uehementi vredine, & uolento morsu excitat. reprimat quæ excrescunt, & capillos euellit.

Σανδαράχη. SANDARACHA.

CAP. LXXXI.

SANDARACHA probatur rufa, & saturatior, & aliena materia vacans, friabilis, cinnabaris colore, sulphuris uirus redolens. Dos eadem, & vltio, quæ auripigmento. Explet alopecias, resina excepta:

na excepta: & scabros vngues cum pice eximit: contra phthiriasin ex oleo efficax est: tubercula cum adipe discutit. Prodest ad narium, orisque vlcera, & cæteras papularum eruptiones cum rosaceo: item condylomata. Datur ex mulso, purulenta extussientibus. suffitur quoque cum resina, aduersus veterem tussim, rapto per fistulam nidore: vocem expedit cum melle delincta: suspensio cum resina in catapotio optimè datur.

**AURIPIGMENTVM, & Sandaracha, medicamenta sunt eiusdem tum generis, tum facultatis, nec inter se in alio differunt, quàm quòd alterum magis, alterum uerò minus excoctum fuerit in terræ uisceribus, ubi gignuntur. Vnde etiam sequitur, quòd alterum altero tantum uirium tenuitate præstet. Quandoquidem nil aliud est sandaracha, quàm auripigmentum, quod maiori naturæ coctione colorem rubrum contraxit, & tenuius effectum est. Id quod periculo arte factò uerum deprehenditur. quippe si fictili, uel uitreo uase uratur auripigmentum, substratis candentibus prunis, breuè (ut nubi pluries experientia compertum est) flammæ, & summe rubens contrahit colorem, perinde ac sandaracha: eoq; magis, quò plus calorigini ignis arte fuerit expertum, quàm ipsa sandaracha naturæ uis fuerit affecta. Sandaracham summe rubens uidimus primum Venetijs in officinis, ubi auripigmentum, & ceteri ueniunt colores pictoribus expetiti. Veruntamen animaduertendum est (ut superius libro primo diximus) quòd hæc illa uulgaris Sandaracha non est, quam Vernicem scriptoriarum officinæ appellant: siquidem nil aliud hæc est, quàm gummi iuniperi. Errorem autem fecere neoterici illi, qui Mauritanorum nomina secuti (ijs enim gummi iuniperinum sandaracha dicitur) idem gummi sandaracham nominauerunt: ita nomina turpiter confundentes, ut imperitis sæpe grauiter in rebus ipsis errandi præbeant occasionem. Quamobrem ubi in Arabum monumentis, uel eorum, qui Arabicam factionem in omnibus sequuntur, medicamentum aliquod repertum fuerit, quod Sandaracham excipiat, de iuniperi gummi perpetuò intelligendum erit: ubi uerò id in Græcis codicibus inuentum fuerit, ea quidem sine controversia erit assumenda, de qua hic differit Dioscorides. Vocauerunt præterea recentiorum nonnulli Sandaracham quoque Sandycem, quàm è combusta cerussa conficiunt, quòd fortasse hæc colore admodum rubescat. Sed hæc ab illa (ut supra retulimus, cum de cerussa sermonem haberemus) uiribus, & qualitatibus plurimùm disidet. Est & Sandaracha ceruginosi mellis genus, si Plinio credimus, qui libro xi. capite vii. eius meminit. Ceterum illud non est silentio prætereundum, quòd Arsenicum officinis crystallinum uocatum, ideo quòd crystalli modo pelluceat, non fit per sese, nec sponte nascitur in auripigmenti fodinis, ut scribit Vannoccius cuius meus in sua pyrotechnia, qui nos alias eius fidem secutos, in hunc suum errorem deduxerat, sed arte ex auripigmenti scobe admixto sale. Sumunt enim artifices auripigmenti scobem, & cum pari salis pondere miscent, teruntq; simul, & subinde operculatis fictilibus huic operi inservientibus, ignium uis tandiu coquunt, quousque id omne in sublimem feratur, & operculo adhæreat, con- crescatq; in lapidem: idq; toties repetunt, donec adeò purum efficiatur, ut crystallum referat. Auripigmenti uires reddidit Galenus lib. ix. simp. med. sic inquit. Arrhenicum, siue arsenicum facultatis est causticæ, siue urentis idq; tam combustum, quàm uestionis expers. Ceterum id constat uestione reddi tenuiorum partium. Utuntur porro eo, ceu adurente ad denudandam pilis partem quàmuis. Verum si diutius inhaereat, nec cuti etiam ipsi parcat. Idem de sandaracha eodem libro scribens, inquit. Sandaracha urentis est facultatis, ceu arsenicum quod uocant. Merito itaque que eam digerentibus facultatibus commiscant, atque extergentibus.**

Auripigmenti, & Sandarachæ consideratio.

Auripigmenti, & Sandarachæ uires ex Galeno.

## ΣΤΥΡΤΙΡΑ. ALUMEN. *Alum* CAP. LXXXII.

**ALUMINIS** omne ferè genus in Aegypto, & in eisdem metallis inuenitur: etenim scissile quoddam, quasi flos glebosi intelligitur. Gignitur & in alijs quibusdam locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli Phrygiæ, Aphrica, Armenia, & plerisque alijs regionibus, sicut & rubrica. Plurimæ eius species: verum ad medendi usum scissile, rotundum, & liquidum expetuntur. Optimum est scissile, præsertim recens, candidissimum, gustu perquam adstringens, graue olens, calculorum expers, nec glebulosè aut asulosè compactum, sed sigillatim in capillamenta quædam canescentia dehiscens: quale est, quod trichites, quasi capillare nominatur, in Aegypto natum. Reperitur quoque lapis huic alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, quòd non adstringat. Damnatur in rotundi genere, quod manu confectum est: sed ex figura deprehenditur. Assumendum autem suapte natura rotundum, bullis turgens, albo propius, & 30 atque ualidius adstringens, præterea nonnihil palloris cum quadam pinguitudine præ se ferens, sine arenis, friabile, natione Aegyptium, aut ex insula Melo. Liquidum probatio, ut sit lymphidum, lacteum, æquale, & semper succo madens, sine lapidibus, atque quendam coloris igniculum expirans. Vim habent excalfaciendi, stringendi, & expurgandi, quæ caliginem pupillis oculorum offundunt. genarum carnem, cæterasque excrescentias extenuant. Scissile rotundo efficacius intelligitur. Vri, & torreris chalcitidis modo debent. Putrescentia ulcera compescunt: sanguinis fluxiones inhibent: gingiuas humore prægnantes comprimunt: motus dentium cum aceto, & melle firmant. Profunt cum melle ulceribus oris, eruptionibus papularum, & fluxionibus aurium, cum sanguinalis herbæ succo. Lepris conueniunt cum brassicæ folijs, aut melle cocta: item pruritui, & unguium scabritijs, pterygijs, & pernionibus, aspersa cum aqua. Valent cum aceti facie, & galla, pari pondere cremata, ad phagedænas ulcerum: & cum salis duabus partibus, ad uitia, quæ pa- 30 ff scunt.



scunt. furfures, cum eruo, & pice illita abstergunt: ad lendes, pediculos, ambusta, cum aqua illita auxilio sunt. Contra tumores, & graue alarum, inguinumque uirus illinuntur. Ex Melo autem aduectum, mulieribus præstat ne concipiant, ante coitum ori vuluæ inditum: partus quoque extrahit. gingiuis, si caro excreuit, uuis ac tonfillis accommodantur: ori, auribus, & uerendis, cum melle illinuntur.

Aluminū con-  
sideratio.

Braſauoli o-  
pinio repro-  
bata.

Aluminis ru-  
pei faciendi ra-  
tio.

T A M E T S I scripserit Dioscorides plurima esse Aluminis genera; non tamen plura, quam tria hoc loco sta-  
tuit recensenda, nempe scissile, rotundum, & liquidum: quod fortassis suo tempore ijs tantum uterentur medici. Ve-  
runtamen hac etate officinae complura habent genera, quanuis rotundo, & liquido careant: nimirum Rupeum,  
quod uulgò uocant Alumine di rocca: squamosum, quod uulgò dicunt Alumine scagliolo: item è uini fece confectum: 10  
necnon illud, Catinum iisdem uocatum: quibus accedit, quod plumum appellant. quod tamen legitimum scissile non est,  
etsi iandudum cum cæteris rei metallicæ studiosis crediderim scissile alumen nil aliud esse, quam quod uulgò officinis  
uocatur Alumine de piuma. Sed hoc (ut postea dicitur) nil aliud nunc esse censemus, quam lapidem amianum: quod  
gustu non sit adstringenti, sed acri, quodq; igne nunquam comburatur, quod est amianti lapidis proprium. Legitimum  
alumen scissile Pisis misit ad me hoc anno clarissimus medicus Lucas Ghinus, notis omnibus refertum, quas illi reddidit  
Dioscorides, & gustu admodum adstringens. Quo postea factum est, ut diligentius exploratis plumei aluminis tum  
notis, tum qualitatibus, facile deprehenderim plumum hoc non esse scissile. Cæterum Braſauolus de alumine disse-  
rens in suo simplicium medicamentorum examine, nil aliud liquidum esse contendit, quam rupeum. Sed ab eo, licet  
uero eruditissimo, uariat opinio nostra. Nam quod ego in Alumerijs Pontificis maximi in Romano agro prope Tol-  
sam per biennium moram duxerim, eo nimirum tempore, quo Augustinus Chisius opulentissimus mercator cuius meus, 20  
illas aluminis fodinas à Pontifice emerat, ampla sanè mihi fuit facultas tum uidendi, tum etiam discendi, quo artificio,  
quæue ratione, rupeum conflaretur alumen. Quamobrem facile testari possum rupei aluminis materiam liquidam,  
fluxilemq; non reperiri, sed lapideam: quinetiam non exponi æstiuis solibus exiccandam, ut putat Braſauolus, quod  
sic (ut ipse inquit) scripserit Plinius liquidum fieri & addensari. Fit itaq; Rupeum alumen ex durissimo quodam la-  
pide, cuius duo obseruauimus genera: alterum durius, & rufescens: alterum uerò mitius, & candicans. Quod au-  
tem è candido sit lapide, albedinem seruat & crystalli instar translucens conspicitur. Alterum uerò contrà rufescit,  
& maiore acrimonia pollet, uisiturq; sordidius. Expetitur candidum sericeorum staminum insectoribus: item ijs, qui  
præstantiora lanarum uellera coccineo colore tingunt, quod altero nitidius, minusq; acre habeatur. Foditur aluminis  
lapis è rupe quadam aperto undique cælo, non autem in concameratis cuniculis. Ingens ibi fossum caterua perpe-  
tuò commoratur, qui partim mucronatis ligonibus ex ualidissimo chalybe temperatis, partim ferreis malleis, ipsiq; 30  
ingentibus, partim acutissimis cælis, cuneisq; hunc lapidem frangunt, lacerant, scindunt, conterunt, ac diducunt, ea  
demum ratione, qua lapideæ operantur in ingentibus lapidum, marmorumq; fodinis, quæ ad magna effodiuntur ædifi-  
cia. Transferuntur deinde confracti lapides in fornaces calcarijs similes, ubi ualidissimis ignibus, eo sanè modo, quo  
calx, nocturno præsertim tempore inuertitur duodecim, aut ad summum quatuordecim horarum spatio: quippe si du-  
tius urerentur, cuncta aluminis materia inaresceret. Postquam autem refrixerint, plaustis in amplissimas areas sub  
dio, & solibus eos comportant, ibiq; in planos componunt acervos, hortorum toris per similes, sed longè, lateq; gran-  
diores, latiore fundamento, quam uertice. Compositis igitur hoc modo in areis acervis, aquam quæ utrinq; continuo  
excurrit, in lapidum acervos mittunt, quibusdam excauatis instrumentis, è ligno conflatis, ijs perquam similibus, qui-  
bus nauæ suis è scaphis aquam eximunt; id tribus, aut quatuor uicibus quotidie repetentes, donec diuturna aquæ af-  
fusione, perusti lapides usque adeo macerentur, ut in terram quandam lentore madidæ argille similem, permittentur: 40  
quod tamen non fit, nisi aqua perluantur, ad trigessimum sextum, aut quadragesimum usque diem. Excavat præterea  
ligonibus terram hanc, & ad fornaces cortinasq; quas caldarias uocant, curribus item conuehant. Sunt autem calda-  
rie sic dictæ cortinæ admodum capaces, & super amplissimum æneum fundum patinæ instar, suppositam fornacem  
prius extructam undiq; operientem, ex lateribus, & calce fabricatæ, & crusta quadam pertinaci undiq; circumlitæ.  
Hæc itaq; aqua replent, aqueductibus eò deducta: deinde in subsidentem fornacem, ualidissimum succendunt ignem, ut  
demissa ferueat aqua. Hoc cum factum fuerit, comportatam ex areis terram in feruentem aquæ alueum conijciunt.  
Astant utrinq; bini robustissimi artifices, qui ueluti remigantes, magnis quibusdam ligneis instrumentis (palas uocat)  
continuo immissem terram aquæ commiscant, quousq; aqua omnem aluminis materiam in se conceperit. Subinde ter-  
re recrementum, instrumentis iam dictis trahunt ex aluei fundo, & per propinquam ibi fenestram in quandam aque  
riuulum projiciunt aliò deducendum. Quo facto iterum nouam superindunt terram, modo quo diximus commiscantes, 50  
& recrementum auferentes. quod tandiu prosequuntur, quousque intelligant aquam tantum aluminis materie sibi æ-  
sciuisse, quantum sat fuerit. Demum parumper quiescere dimittunt, ut si quid recrementi sit, in immum descendat.  
Mox calentem aquam alumine refertam extrahunt, & suis aqueductibus ad id paratis in magnas quasdam capſas  
ex querna materie factas transferunt. Ibi enim octo dierum termino alumen conficitur internis parietibus mure-  
scens adamantinis mucronibus simile, & crystalli instar pellucidum, ad quatuor, aut quinque digitorum crassum.  
Alumine porro ita concreto, lixiuij reliquum (sic enim uocant decoctum) à quo secessit alumen, iisdem aqueducti-  
bus è capſis illis eximentes, ad caldarias ita eis uocatas, remittunt, id scilicet, quod clarum defæcationiq; sit: nam tur-  
bidum, & recrementitum, aperto foramine in receptaculi fundo, tanquam inutile per riuulum deferri, & delabi fi-  
nunt. Post hæc aluminosum recrementum, quod minutis particulis granorum tritici instar ad fundum resedit, ad corti-  
nas illas magnas iterum discoquendum comportant. Demum capſe fundo scopis omni ex latere mundato, quibusdam  
ferreis,

ferreis, ligneisq; instrumentis concretum in parietibus alumen diducunt, diductumq; eximunt, & exemptum in uini-  
 neas fisceilas conijciunt; & in quodam aquæ alueo lauant, fisceillis in aquam demersis. Eximunt postea, & aqua ex-  
 colata in acervum domibus asseruant, salis modo. Ex his itaque omnibus apertissime cognosci potest, rupeum alu-  
 men nullam habere cum liquido cognationem. Quandoquidem asserit Plinius libro xxxv. capite xv. fieri liquidum  
 ex aqua limoq; hoc est terræ exudantis natura: corruatum hyeme, æstiuis solibus maturari. probari autem quod  
 hymphidium lacteumq; sit, sine offensis fricantium, cum quodam igniculo caloris. Si uero adulteratum sit, deprehendi  
 succo mali punici: quod sincerum ea mistura nigrescat. Sed hæc non inueniuntur in rupeo, ut quod magis glaciem,  
 crystallumq; referat, quam lac: fiat item ex durissimo lapide, non ex limo: nec affuso punici succo nigrescat, sed lon-  
 ge magis pelluceat. Hinc igitur fit, ut non modo à Brasauolo dissentiam; uerum etiam à Fuchsio uiro alioqui citra  
 10 controuersiam doctissimo, necnon à Cornario, quod hic in commentarijs in Galeni libros de compositione medicamen-  
 torum secundum locos, ille uero primo de compositione medicamentorum libello, quem nuper edidit, Brasauolum for-  
 tasse utrique secuti, nulla dubitatione scripserint. Rupeum alumen, quod uulgò uocant Alume di rocca, esse liquidum  
 Grecis uocatum. Verum enunero liquidum Alumen, quin & scissile, rotundum, placites, & plinthites nuper ad me  
 misit Bartolomæus Maranta Apulus, medicus apprime eruditus, & medicæ materiæ studiosus, atque diligentissimus  
 inquisitor, qui ex sese Putcolis Campaniæ iam pridem hæc omnia aluminum genera comperit, quæ sanè nullis, ni me  
 fudit iudicium, notis à legitimis disident. Huic ergo uiro eorum aluminum cognitionem libentissime acceptam refero,  
 & quas possum ego gratias. Scio tamen ijs ingentes deberi, qui ut ipse sua inuenta cum alijs quoque communicare  
 non grauatur. Liquidum item Alumen ex illa Tjrrheni insula aduectum, quodq; manibus ductum lentescit, antea ad  
 me miserat clarissimus medicus Lucas Ghinus, Pliniani descriptioni notis omnibus respondens, adeoq; adstringens,  
 20 ut nunquam meminerim medicamentum aliquod degustasse, quod gustui tantum adstrictionis relinqueret. Porro quod  
 rotundum Greci uocant, tamen si non desint, qui sibi persuadeant, id esse quod officinæ à sacchari effigie zucarinum  
 appellant; ex crudo alumine rupeo, ouorum albo, & stillatitia rosarum aqua paratum; cum tamen non inueniatur.  
 rupeum ueteribus cognitum fuisse, cur eorum iudicio subscribam non habeo. præsertim quod legitimum nunc apud  
 me sit. Quod præterea Catinum appellant, ex cuiusdam plantæ cinere, chali Mauritanis uocate, conficitur ad uitæ  
 in fornacibus expurganda. Plantam hanc nos uulgò uocamus Soda. Prouenit hæc (ut alibi scripsimus) in litoribus  
 maris, falso admodum sapore. Cæterum quod ex uini fece paratur, fit conformatis è fece panibus, deinde sole sicca-  
 tis, & igne tandiu perustis, quousq; candorem conceperint. Postremo Squamosum (sic enim uoco alumen illud, quod  
 uulgò dicitur Alume scagliola) ex squamoso quodam sit lapide, & uitri modo pellucidum, quem quidam falsò specu-  
 larem appellauit, quod fortasse selenitis modo speculi præbeat effigiem. nos Asini speculum dicimus. Hunc itaque in  
 30 ignem conijciunt, aut ferri laminis igne candentibus superimponunt. Incensus enim illico claritatem deperdit, dissi-  
 litq; in tenuissimas laminas, & gypsi modo albescit, cuiusq; induit speciem. Quamobrem maxime falluntur, qui sibi  
 persuadent, inter lapidem specularem, & Talcum uocatum nullam intercedere differentiam. Quippe (ut mihi qui-  
 dem experientia compertum est) non sine magno labore, & flagrantissimo fornacis igne, Talcus inuri potest. Spe-  
 cularis lapidis puluis nōdum ignem experti, miris laudibus quibusdam effertur ad dysentericos, in uino austero potus:  
 exustum enim non probauerim, quod gypsi specie induta, sumentes strangulet. Aluminum uires paucis perstrin-  
 xit Galenus libro ix. simplicium medicamentorum, sic inquires. Stypteria, huius medicamenti nomen ab adstrictione  
 deductum est: nam adest illi uehementissima. Cæterum cum sit crassarum partium, tenuior quodammodo est alijs alu-  
 minum generibus, quod uocatur schiste, hoc est fissilis: proxima est strongile, id est rotunda, & astragalote. Admo-  
 dum autem crassa est tum liquida, tum placites, & plinthites appellata. Et libro quarto de compositione medica-  
 40 mentorum secundum genera, idem ait. Omnes aluminis differentie ulcera satis exiccant generose adstringentes: qua-  
 re nemo solis ijs ad ulcera utatur. hæc Galenus. Sed non desunt, qui Dioscoridem secuti, alumen omne non parum  
 excalfacere opinentur: contra uero qui contendunt id omnino esse falsum, potius frigesfacere ipsum existimantes,  
 Galeni auctoritate freti. quippe qui libro iiii. simplicium medicamentorum scripserit, omnia quæ adstrictoria sunt  
 facultate, esse frigida, ac terrestria. Veruntamen si recte diligenterq; expendantur aluminum quoruncunque effe-  
 ctus, & facultates, quibus in corpus nostrum agunt, nemo quidem inficias ire poterit, quin aluminis omne genus non  
 obscure excalfaciat, quemadmodum chalcanthum, chalcitis, & misy: quæ cum ualenter adstringant, non tamen re-  
 frigerant, sed maxime excalfaciunt, ut idem testatur Galenus libro primo de simplicium medicamentorum facultati-  
 bus, dum inquit. Quin uero & Asclepiades Metrodorus tanquam illum etiam superare contenderet afferendis de  
 sensu mendacijs, cum alia quedam, tum resinam, & bitumen excalfacere nos denegat, atque adstringentia omnia re-  
 50 frigerare distitit, cum si nihil aliud saltem chalcitis, chalcanthos, & misy, quæ ualenter adstringunt, tantam affectuta  
 sint caliditatem, ut nos etiam exurant. Nihil est ergo mirandum si proluxa quedam nugentur, seipsosq; nonnulli fal-  
 lant, cum de manifestis apparentibus, uerum fateri non audent. Et libro iiii. de compositione medicamentorum per  
 genera capite primo illud idem affirmauit, his uerbis. Porro dipbryges appellatum pharvacium ulceribus egrè hu-  
 miditatis uitio ad cicatricem uenientibus aptissimum est: ualde namque siccatur, etsi modicè mordeat. Enimvero id quod  
 quæ præter acrem tum qualitatem, tum potentiam um habet adstrictoriam, quas tamen ambas fortiores, & chalcis  
 tis cruda, & chalcanthum representat. Quin & alumen quodlibet ulcera satis exiccatur generose adstringens. Ex  
 quibus locis citatis palam est, etsi Galenus libro iiii. de simplicium medicamentorum facultatibus, scribit omnia ad-  
 stringentia esse frigida; non tamen eum inter ea recipisse chalcanthum, chalcitum, misy, dipbryga, eruginem, & alia  
 quedam, ut alumen omne genus: præsertim quod facile compertum habeam, aluminis cuiuscunque stillaritiæ aquam  
 maxime rupei, non modo carnem exedere, sed etiam metalla.

Alumina cog-  
nita.Aluminū ui-  
res ex Gal.Opinio quæ-  
dam diluta.

**SULPHVR** optimum existimatur uiuum, quod apyron uocant, nitedulz modo splendidum, perlucens, minimè lapidosum. Probatur in genere sulphuris ignem experti, quod uiret, ac præpigne spectatur. Plurimum in Melo, & Lipara gignitur. Supradictum sulphur calfacit, discutit, & celeriter concoquit. Prodest tussibus, suspiriosis, purulenta extusisientibus in ouo sumptum, aut suffitum: præterea partus usti nidore extrahit. Lepras, lichenas, scabros ungues, cum resina terebinthina mistum aufert: cum aceto autem illitum, ad lepras efficax est: vitiliginis tollit. Scorpionis ictibus, addita resina, medetur: cum aceto uerò, draconis marini, scorpionisque plagas sanat. Pruritus toto corpore erumpentes, cum nitro deterfum sedat: regium morbum emendat, insparfum fronti cochlearis mensura, aut in sorbili ouo sumptum. Facit ad grauedinem, & destillationes: sudores quoque conspersum inhibet, podagricis cum aqua & nitro illitum, conducit. grauitatem auditus, suffiti nidorem raptim per fistulam hausto, sanat. Lethargicos suffitu excitat: erumpentem vndecunq; sanguinem sistit, Contusis auribus, cum vino & melle illitum, medetur.

Sulphuris consideratio,

**SULPHVR** tam sponte & per se nascens, quod uiuum appellant, quàm arte in fornacibus factum, frequentissimum habetur in Italia: sed non omnibus unus tantum color. quippe aliud uiride, aliud lutecum, aliud cinereum, aliud pallidum spectatur. Quod autem sponte fit, uiuum appellatum, exterius colore est subcinereo, interius uerò cum frangitur, subluteo, nitedula modo splendens, ut Dioscorides inquit: iisdemq; oritur locis, ubi factitij uena foditur. Est autem Sulphur fossitum medicamentum è pingui quadam terre substantia prognatum, ut in compluribus uisitur locis, quæ impensè calida sit, & sicca: adeo ut à chymistarum authoribus, igni natura simile Sulphur dicatur. Vocant id ij masculinum semen, & primum naturæ agens ad omnia metalla procreanda. Cùm autem calidum sit, & siccum, quinetiam pingue (ut diuturna constat experientia) maximam cum igne trahit cognationem: siquidem non flammæ ignium modò; sed prunis quoque admotum, statim accenditur, nec unquam accensum extinguitur, quousq; pinguis, & oleosa eius substantia in uniuersum igni absumatur. Verùm enimuero est præ se ferat Sulphur temperamentum non obscure calidum, & siccum; non tamen credendum fuerit tam purum, sinceramq; id esse materiam, ut per se tantum consistere queat. neque etiam cogitandum, ei non esse necessarium, ut sibi humiditatem asciscat, qua formam congruam suscipiat, quemadmodum mista quelibet exposcunt. Id enim nobis indicat eius uelocissima, ac facilissima diffusio, cùm statim igni admotum colliquescat, metallorum modo. Foditur aperto undique caelo, non autem in cuniculis, & subterraneis specubus. In his nanque tum uehementi calore, tum foetidissimo terre halitu, fossiores illico deperirent. Porro effossa Sulphuris uena, fictilibus quibusdam magnis imponitur Romanis hydrijs non absimilibus, longo ab ore dependente rostro, intus uacuo, ac in bimum spectante, uitrei pilei instar, quo stillatitiae aquæ consuecuntur. His itaque fictilibus sulphurea uena repletis, fictilibus pariter operculis ad id diligenter conflat, conteguntur, stipanturq; tenacissimo luto, creta, & equino stercore composito, ne tantillum quidem exspirare possit sulphureus uapor. His peractis in fornacem crates duas ferreas intus habentem fictilia deferuntur, & in superiore cratem firmanitur, eodem luto undique stipata, adeo ut ignis flamma, qui in infima accenditur crate sub fictilium fundo, nullo pacto in sublime ferri possit. Ad hæc fictilium rostrum in aliud uacuum fictile inserunt, per quoddam in latere orificium, & eadem creta quàm diligentissimè circumlinunt, obducuntq; maximè. Denum ignem succendunt sub fictilium fundo, cuius uì depuratum sulphur in sublime fictilium fertur, & per rostri concauitatem in uacuum sibi annexum descendit receptaculum: à quo tandem fluens eximitur, aperto in fundo foramine, & alijs uasis excipitur, ubi in magnos coit globos. Hac sane ratione Sulphur fieri conspeximus in agro nostro Senensi in montibus non longè à balneis diui Philippi, & in maritimis apud Petriolum. Sulphuris uires memorie prodidit Galenus libro ix. simplicium medicamentorum, sic inquit. Sulphur omne trahendi uim possidet, estq; temperamenti calidi, atque essentie tenuis, adeo ut ad multa uenenatorum animalium resistat. Siquidem ego aduersus pastinacæ marinæ, & draconem sepemnumero eo sum usus, & cùm id piscatores quosdam docuisssem, reuerso post aliquantum temporis magnificè medicamentum hoc commendarunt. Vtus eius est, ut et siccum ictui inspergatur medicamentum, & cum salua mistum: nam cùm & hoc excogitasssem, ab experientia comprobari reperi. Sed & urina maceratum idem effecturum excogitauì. Docebam enim piscatores medicamenta maximè parabilia, dixiq; pulchrè illos & cum oleo ueteri, & melle, & resina terebinthina usuros. Et sanè horum omnium experientia iudicium præstitit. Quin & psoras, & lichenas, & lepras, non rarò hoc medicamento cum resina terebinthina sanauì. Extergit enim omnes id genus affectus, absq; ut in profundum repellat, cùm alia multa medicamenta, quæ illos curant, mistam habeant potentiam, nempe ut digerant pariter & repercutiant. Præterea, ut idem Galenus inquit libro vi. capite ii. de compositione medicamentorum per genera, in compositione emplastri ὁ δὲ σιλλας, Sulphur tanto calore præditum est, ut ubi diutius inbaeat, procul dubio exulceret.

Sulphuris uires ex Gal.

*Synonyma Stru.*  
Κίονις. PVMEX. CAP. LXXXIII.

**PVMEX** probatio, ut magnopere leuis, spongiosus, scissilis, nec arenosus, item teri facilis, & candidus. Crematur flagrantissimis carbonibus obrutus, & ubi canduerit, extractus, uino restinguitur odorato: iterumque incensus, restinguitur: & tertia uestione exemptus, & per se refrigeratus,

# In Lib. quintum Dioscoridis. 619

ratus, ad usus conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abstergere. purgat cum calfactione, quæ pupillis caliginem offundunt: explet ulcera, & ad cicatricem perducit: excreſcentia cohibet. Fit ex farina eius dentifricium. Corpori cruſtam obducit: auellendis capillis aptus. Theophrastus author eſt, ſi quiſquam in bullientem urceum uini pumicem iniecerit, feruorem ſtatim ſedari.

PUMICEM ambuſtum eſſe lapidem in montium concauitatibus, omnes ſerè fatentur nature operum exploratores. Ob id enim pumices ſæpius eructat mons Aetna in Sicilia, & in Campania Veſuuius, qui hoc tempore, annis nuper elapſis, non ſecus quàm Plinij ætate, ingentibus flammis exarſit, cum magno Puteolorum, & adiacentium locorum detrimento, igne in terre uisceribus genito, è ſulphureis uaporibus, & bitumine, quo quàm plurimi reſerti ſunt montes, eoq; præſertim, quod Græci piſſaſphaltum dicunt. Pumicis uires duobus locis reddidit Galenus libro nono ſimplicium medicamentorum, ubi de eo primùm ita ſcribit. Si pumex inter lapides recenſeri poteſt, et ipſe eiusdem eſt facultatis, quod certè ad abſterſionem attinet, uelut etiam figulina teſta, ac multò magis ea, quæ fornacium eſt. Sed ſmiris acrimoniæ quiddam obtinet: proinde cauſticis, & deſiccantibus facultatibus quidam ipſum miſcent, eiſq; quæ curant gingiuas laxas, ac molliſſie fluidas. Pumex autem ſi comburatur, haud erit inferior eoſdem ad uſus ſmire. Secundo autem loco idem de pumice diſſerit his uerbis. Pumicem ſi inter metallica recenſeas, calumniabuntur, quibus animus prurit accuſandi libidine: eſt inter lapides ponas, lapidem eſſe negabunt: ac multò minus terram eſſe concedent, nec marinorum haberi quodpiam. Atqui alicubi tamen de illo dicendum eſt: quippe qui in ſarcotica indatur medicamenta, & ea quæ dentes extergunt, partim uſtionem non expertus, partim etiam uſtus, quando uidelicet alijs omnibus combuſtis ſimiliter ſubſtantia efficitur tenuioris. Ceterum uſtione quiddam acquirit acrimoniæ, quam rurſus lotionem exiit. Videri autem poterit ſplendorem conciliare, non tantum facultate; ſed etiam aſſeritate, uelut etiam ſi ſmirin, aut teſtam, aut hoc genus quippiam tritum admoueas. Quæ certè & ipſa ſplendorem aſſerunt, fortè utroque, tum quia detergendi habeant facultatem, tum quia aſſeritatem. Eundem in modum cornua deuſta dentes ſplendidos efficiunt.

Pumicis conſideratio.

Pumicis uires ex Galeno.

## ΣΑΛ. S A L. CAP. LXXXV.

SAL. foſſilis efficacior eſt. communiter, ſi eſt candidus, calculis uacans, & perſpicuus, denſus, æquali compage. Peculiariter Ammoniacus natione laudatur, ſi modò ſindi facilè poſſit, & in reſta ſegmenta diduci. In marino ſale eligendus eſt candidus, æqualis, denſus. Probatiffimus in Cypro fit, & Salamine Cypri, & Megaris, in Sicilia, & Aphrica. Sed inter dicta ſalis genera lacuſtris præfertur: ſed multò ualidiſſimus eſt Phrygius nomine tapeus, aut tritæus, aut gantæus. Salis natura in commune perquàm utilis eſt: adſtringit, abſterget, expurgat, diſſipat, reſprimit, extenuat, & cruſtas inducit. ſed hoc intereſt, quòd alius alio ſit præſtantior. Quin & à putredine vindicat. Admiſcetur medicamentis pſoras abſtergentibus. excreſcentia in oculis reſprimit, & pterygia conſumit, cæterasque carnis extuberationes tollit. Clyſteribus infunditur: diſcutit laſſitudines ex oleo illitus. Contra hydropicorum tumores auxiliatur: dolores in ſaccis ſotu mitigat: & pruritus ſedat, ex oleo & aceto inſrictus ad ignem, donec fudent: item lichenas, lepras, pſorasque. Anginam ex melle, aceto, & oleo illitus leuat: tonſillis, uiaque cum melle toſtus. Vlceribus in ore manantibus, gingiuis, quas humor vexat, & phagedænis ulcerum, cum polenta crematus illinitur. Aduerſus ſcorpionum ietus cum lini ſemine: contra ſerpentium morſus, cum origano, melle, hyſſopo: aduerſus ceraſten cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur: contra ſcolopendræ morſus, cum melle, & aceto: aduerſus veſparum ietus, & teredines, albidasque capitis puſtulas, thymos, & tubercula, cum ſeuo vitulino: furunculos, cum uia paſſa, aut ſuillo adipe, aut melle diſcutit: teſtium tumores, cum origano & fermento maturius concoquit. Crocodilorum morſibus auxiliatur, tritus in linteolo, & intinctus aceto, ita ut uinculis loca conſtringantur. Prodeſt ad beſtiarum morſus, & ad ſugillationes in facie ex melle. contra hauſtum opium, & fungos, cum aceto mulſo bibitur. Luxatis imponitur cum farina, & melle. ambuſtis igni cum oleo impoſitus, puſtulas erumpere non patitur. Podagricis itidem imponitur, & aurium doloribus, cum aceto. ignes ſacros, & ulcera, quæ ſerpunt, cum aceto, aut hyſſopo illitus ſiſtit. Vritur ſicili, diligenter opertus, ne exiliat, conditusque prunis, uſquedum efferueſcat. Aliqui foſſilem ſubacto polline obliniunt, & carbonibus ſubijciunt, uſquedum eius cruſta exuratur. Solet & ſal communis hoc modo vri. Aqua ſemel abluitur, & ſiccatus in ollam coopertam mittitur ſubdito igne, moueturque, donec iam non exiliat.

## ΣΑΛΟΣ Ἀῶν. SALIS SPUMA. CAP. LXXXVI.

SPUMA ſalis ſpumofi maris lanugo, ſiue ramentum eſt, in exilibus petris inuentum, cui uis eadem, quæ ſalis.

ΣΑΛΥΣ.

ΑΛΥΣ ΜΥΡΙΑ. CAP. LXXXVII.

MYRIA effectus salis præbet, abstergitque: dysentericis infunditur, etiam si nome intestina corripit: & ischiadicis veteribus, Ad forus, aquæ marinæ usum præstat.

ΑΛΟΣ ἄνθος. FLOS SALIS. CAP. LXXXVIII.

FLOS salis flumine Nilo defluit: lacubus tamen quibusdam innatat. Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato, ceu gari. interdum longè magis uirus olet, gustuque mordacior, & pinguitur lentus. Fucatus autem rubrica, aut scrupulosus, improbatur. Præterea syncerus non nisi oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte, etiam aqua, diluente factitium colorem. Ad ulcera, quæ cacoëthe uocantur, & phagedænas, genitalium nomas, & purulentas aures, efficax est: oculorum hebetudines, cicatrices, albuginesque tollit. Emplastris, unguentisque coloris causa, ut rosaceo, miscetur. Sudorem cit, aluum turbat, in uino aut aqua sumptus: stomachum malè habet. Additur acopis, & smegmatis, quæ albandi capilli gratia componuntur. Et in uniuersum acris est, & feruentis naturæ, ut sal.

Salis omnis  
generis con-  
sideratio.

SAL, quo frequentissimè in omnibus frè cibis utimur, & sine quo uiuere nescimus, quo item ad annos asseruantur carnes, pisces, aliæque complura, nullis sanè non cognitus est. Plures tamen in salis genere sunt differentie: quædoquidem præter marinum, fluuiatile, lacustre, fossileque reperitur. Marino utitur uniuersa frè Italia, exceptis Calabria, qui fossilio quàm pulcherrimo abundant. quo etiam utitur uniuersa Pannonia. In Germania hauritur è salis quibusdam fontibus, quorū aqua diu ignium uel excocta in salem cogitur. Fositium officinæ Arabes secute salem geminæ uocant. Huius fodinas uidimus apud Calabros agentes, loco, qui uulgò dicitur Altomonte, ubi lapidum modo exciditur, translucidus crystalli modo. Hic in ignem coniectus præter cæterorum naturam nec dissilit, nec crepitat, sed ut ferrum ignescit. Lacustrem hætenus non uidimus, nec fluuiatilem. quanquam Plinius libro xxxi. cap. vii. tradit plures haberi lacus, ac fluuios, qui salem copiosum reddunt, ut eius uerba, quæ subiiciam, aperte testantur. Sal omnis, inquit, aut sit, aut gignitur. Vtrunq; pluribus modis, sed causa gemina, coacto humore, aut siccato. Siccatur in lacu Tarentino estiuis solibus, totumque stagnum in salem abit, modicum alioquin, altitudine genua non excedens. Item in Sicilia in lacu, qui Cocanicus uocatur, & alio iuxta Gelam. Horum extremitates tantum inarescunt, sicut in Phrygia, Cappadocia, Aspendi, ubi largius coquitur, & usque ad medium lacum. Aliud etiam in eo mirabile, quod tantundem noctu subuenit, quantum die auferas. Omnis est talis sal minutus, atque non gleba est. Sunt etiam naturalis differentie tres. Namque in Bactris duo lacus uasti, alter ad Scythas uersus, alter ad Arios, sale aestuant, sicut ad Cittium in Cypro, & circa Mempsin, extrahunt lacu, dein sole siccant. Sed & summa fluminum densantur in salem, amne reliquo ueluti sub gelu fluente, ut apud Cassias portas, quæ salis flumina appellantur, item circa Mardos, & Armenios. Præterea apud Bactros annis Ochus, & Oxus ex appositis montibus deferunt salis ramenta. Sunt & in Africa lacus, & quidem turbidi, salem ferentes. Ferunt quidem & calidi fontes, sicuti Pagasei. Et hætenus habent se genera ex aquis sponte prouenientia. Sunt & montes natui salis, ut in Indis Oromenus, in quo lapicidinarum modo ceditur renascens, maiusque regum uestigal ex eo est, quàm ex auro, & margaritis. Effoditur & è terra, ut prælam est, humore densato, in Cappadocia. Ibi quidem ceditur specularium lapidum modo, Pondus magnū glebis, quas micæ uulgus appellat. Carrhis Arabie oppido muros, domosque massis salis faciunt, aqua ferruminantes. Inuenit & juxta Pelusium Ptolemæus rex ciam castra faceret. Quo exemplo postea inter Aegyptum, & Arabiam etiam squalentibus locis coeptus est inueniri, detractis arenis. qualiter & per Africæ sitientia, usque ad Ammonis oraculum. Is quidem crescens cum luna noctibus. Nam Cyrenaici tractus nobilitantur Ammoniaco, & ipso, quia sub arenis inueniatur, appellato. Similis est colore alumini, quod schiston uocant, longis glebis, neque perlucidis, ingratus sapor, sed medicinæ utilis. Hætenus de sale Plinius. Cæterum Ammoniacus sal, qui legitimus sit, ad nos conuehi desit: quippe factitius, adulterinusque est, qui passim in seplasiariorum officinis uenditur, plerumque è Germania allatus, nigricantibus exterius glebis. Non desunt tamen, qui credant conflari hunc ex camelorum urinis, artificio quodā concretis. Sed cur his adstipulari debeam, non equidem uideo, præsertim ciam Germania, unde Venetias conuehiuntur factitius, camelos non habeat. Seplasiarij, pariterque chymistæ Sal Armeniacum appellant, quod fortasse existiment ex Armenia adferri, ubi innumeri sunt camelorum greges. Sed isti, mea quidem sententia, hallucinantur. Serapio (Isach Arabici testimonio) scribit Sale Ammoniacum fieri è lapidibus durissimis, & translucidis. Sed & is falsatur, meo iudicio: siquidem Ammoniacy nomen non aliunde sibi comparauit, quàm ab arena, quæ æppos Grecis dicitur, sub qua in laminas concretus, inuenitur in Cyrenaica regione. Venit præterea in medicorum usum Sal, quem Arabes Alchali cognominant, item Alumen catinum, de quo superius in aluminediximus. Sal autem Indus appellatus (ut libro secundo retulimus) nil aliud antiquis extitit, quàm saccharum in sacchariferis arundinibus in India gummi modo concretum, cuius nunc loco utimur suppositio, quod seplasiæ zuccharum canditum uocant. Verumamen animaduertendum est, quod quanquam Paulus, & Auicenna eum fortasse secutus, concretum naturæ saccharum salem Indum appellant; non tamen fuerit putandum, quod Indi legitimum salem non habeant. Quandoquidem (ut Plinius est autor) in Oromeno Indiæ monte lapicidinarum modo foditur ingentibus glebis. proinde dicebat Mesues de sale Naphthicum, & Indicum, cæteros sales præcellere. Quod autem Salnitrum uocant, tormentorum bellicorum pulueribus



pulueribus expetitur, vulgaris notitiæ est, de quo tamen latius sequenti capite sermonem faciemus. Ceterum salis spumam pluries legi quibusdam in scopulis Tyrrheni maris. Cuius enim procella exoritur, intumescitque pelagus, spumantes aquæ in altum sublatæ, scopulorum cavitates replent. quo fit, ut ibi sub dio remanentes solibus, et rore, et suis caloribus, in salem album concrecant. Muria porro, quæ innumera afferuntur edulia, nota omnibus res est, ut quæ sale tantum, et aqua conficiatur. Sed quidnam veteribus flos salis fuerit, discernere non ausim, neque plus quod scribam habeo, quam quæ à Dioscoride produntur. Eius tamen meminit Plinius loco supra citato, sic inquiring. Salinarum sinceritas summam facit suam differentiam. Quædam enim fauilla salis, quæ leuissima ex eo est, et candidissima flos salis appellatur. Et flos quidem salis, in totum diuersa res, humidiorisque naturæ, et crocei coloris, aut rufi, ueluti rubigo salis. Odore quoque ingrato, ceu gari, dissentiens à sale, non modò à spuma. In Aegypto inuenitur, uideturque Nilo deferri. Et fontibus tamen quibusdam innat. Optimum ex eo, quod olei quandam pinguitudinem reddit. hæc Plinius. Porro color rufæ rubiginis instar pictoribus expetitur, è Germaniæ salinis aduectus, qui fortasse flos ipse salis fuerit: nam colore, et sapore illi non obscure respondet. uulgo appellant Morelio di sale. Salis meminit Galenus tum inter fossilia medicamenta, tum etiam inter ea, quæ in mari nascuntur libro ix. et xi. simplicium medicamentorum, sic inquiring. Sal eiusdem genere facultatis est, siue fossilis sit, siue marinus: uerum hoc differunt, quod salis è terra effossi substantia magis sit compacta: ac proinde in hoc maior est, et partium crassities, et adstringendi potentia. Itaque marinus affusa ipsi aqua protinus liquecit, at fossili hoc non euenit. Porro eiusdem speciei cum marino est, qui in stagnis quibusdam salsedinem habentibus nascitur, æstate uidelicet aquis æstu exiis absumptis, cuiusmodi est Tragasius non procul à Sminthio. Confluit enim illuc ante aquas spontaneas, quæ admodum sunt calidæ, copiosa aqua stagnans, non amplo in loco: et ea æstate omnis absumitur, à sole uidelicet arefacta. Porro quoniam locus ipse salsedinem nativam continet, quod reliquum est eius omne, sal est, cognominationem à loco pariter et aquis sortitus. Nam spontaneæ et ipsæ illis in locis aquæ Tragasiæ nuncupantur, potentia summè exicatoria: et sanè, qui in ea regione sunt medici, ad hoc illas accommodant. Porro dictum est et de Sodomis in mari mortuo prouenientibus in quarto libro, quem si quis librum diligenter perlegerit, illi tantum refricare memoriam nunc opus est, ut exposita gustus qualitate, ipse medicamenti facultatem cognoscat. Igitur cum qualitas salsa digeratur, simul et contrahat contractam ab ipsa substantiam, uocatum aphrolitron in hoc differt, quod in ipso unum modò saporem exuperantem expresse sit uidere, quem uocant anarum, uim habentem digerendi, haud etiam contrahendi, uti sal. Nam hic quicquid in corporibus humidum inest, id totum quodammodo absumit: et quod reliquum est substantiæ solidæ, adstrictione contrahit: ac proinde etiam conditura sua corpora siccatur, et à putredine tuetur. Quippe quæ putrescunt, excrementitium continent humorem, substantiamque tum dissolutam, tum minimè compactam.

30 Quibus ergo corporibus nulla prorsus est humiditas superflua, ceu melli optimo, et corpus solidum, et compactum est, ceu lapidibus, ea ut putrescant est impossibile: ac proinde in his salis non probatur usus, uerum in ijs, in quibus suspecta est putredo. Spumosa autem salis efflorescentia multò tenuioris naturæ est, quam sal ipse. quare et extenuare, et digerere multò plus ipso potest: uerum quod substantiæ est reliquum, contrahere ut sal nequit. Ceterum flos salis medicamentum liquidum est, tenuius etiam quam sal ustus: tum acris qualitatis, et admodum digerentis facultatis. hæc Galenus.

Salis uires ex Galeno.

*Nitrum salis*

ΝΙΤΡΟΝ, αἰφρόνιτρον. NITRUM, SPUMA NITRI.

CAP. LXXXIX.

PRAEFERTUR nitrum leue, roseo colore, aut candido, in foramina dehiscens, perinde quæ si spongiosum quiddam, quale ex Bunis adfertur. Humores euocat, qui in alto concreuerunt.

Spuma nitri optima esse putatur leuissima, glebosa, friabilis, colore penè purpureo, aut spumosa, & mordens, qualis ex Philadelphia Lydiæ defertur. secunda est Aegyptia. quin & in Magnesia Cariz gignitur. Vim, & uestionem salis habet, tam nitrum, quam spuma eius. Præterea nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino bibatur in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus, quæ inflationes discutere possunt, uti ruta, uel anetho. Febribus circuitu redeuntibus illinitur, ante suspectam accessionem. Miscetur emplastris, quæ extrahunt, & discutiunt, extenuant, & lepras abstergunt. Cum aqua autem calida, aut uino infusum, inflationes, purulentas aures, & sonitus earundem sanat: fordes expurgat, cum aceto instillatum. Canum moribus ex asinino adipe, aut suillo medetur. resina terebinthinæ admistū furunculos aperit: aquæ inter cutem cum fico illinitur: oculis ad claritatem uisus cum melle succurrit: & uenenis fungorum, ex posca potum: aut si buprestis momorderit, ex aqua: ijs uerò qui taurinum sanguinem biberint, ex laserpitio: ijsque qui cibum non sentiunt, utiliter obducitur: opisthotonisque iam remissioribus, & luxatis cum cerato: in linguæ resolutione, pani commodè permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus urunt, subiecta prius testa noua, donec incandescant.

NITRUM, et nitri spuma, quorum antiquis maximus fuit in medicamentis usus, diu sanè est, quod ad nos conuehi desierunt. Proinde hallucinantur, mea quidem sententia, qui putant Salnitrium uocati, quo ad tormentorum bellicorum pulueres utuntur, et ad fortissimas aquas conficiendas, quibus argentarii fabri aurum ab argento separant, uerum ac legitimum esse nitrum, cuius meminere Theophrastus, Dioscorides, Galenus, Plinius, et antiquorum alij. Siquidem id manifestè demonstrat Plinius lib. xxxi. cap. x. ubi de nitro ita scriptum reliquit. Non est differenda et

Nitri, & spumæ nitri consideratio.

nitri

nitri natura, non multū à sale distans, & eo diligentius dicenda, quia palam est & medicos, qui de eo scripsere, ignorasse naturā, nec quenkūq; Theophrasto diligentius tradidisse. Exiguū sit apud Medos, canescentibus siccitate conuallibus, quod uocant balmirhaga. Minus etiam in Thracia iuxta Philippos, sordidum terra, quod appellant agrum. Nam quercu cremata, nunquam multum factitatum est, & iam pridem in totum omissum. Aquæ uerò nitrosæ pluribus locis reperiuntur: sed sine uiribus densandi. Optimum copiosumq; in Clytis Macedoniae, quod uocant calastriacum, candidum, purumq; proximum sali. Lacus est nitrosus exiliente è medio dulci fonticulo. Ibi fit nitrum circa Canis ortum nouenis diebus, totidemq; cessat, ac rursus innatat, & deinde cessat. Quo apparet soli naturam esse, quæ gignat: quoniam cōpertum est, nec soles proficere quicquam, cū cesset, nec imbres. Mirum est & illud, scabiebra fonticuli semper emicante, lacum nec augeri, nec effluere. Iis autem diebus, quibus gignitur, si fuerint imbres, salis nitrum faciunt, aquilones deterius, quia ualidius commouent limum. Et hic quidem nascitur. In Aegypto autem conficitur multo abundantius, sed deterius: nam fuscum, lapidosumq; est. Fit penè eodem modo, quo sal, nisi quod salinis mare insundunt, Nilum autem nitrarijs. Excedente Nilo siccantur, decedente madent succo nitri quadraginta diebus continuis, non (ut in Macedonia) statis. Si autem imbres adfuerint, minus de flumine addunt, statimq; ut densari est cōceptum, rapitur, ne resoluatur in nitrarijs. Sic quoq; olei natura interuenit. Ad scabiem animalium utilis. Ipsum autem conditum in acerbis durat. Mirum in lacu Ascanio, & quibusdam circa Chalcida fontibus, summas & quas dulces esse, potariq; inferiores nitrosas. In nitro optimum, quod tenuissimum, & ideo spuma melior. Ad diuina tantum sordidum, tanquam ad inficiendas purpuras, tincturæq; omnes. Magnus & nitro usus, qui dicitur suo loco. Nitrariæ egregie Aegyptijs: nam circa Naucratin, & Memphin tantum solebant esse. Circa Memphin deteriores: nam & lapidescit ibi in acerbis, multiq; sunt tumuli ea de causa faxei. Faciunt ex ijs uasa. Necnon frequenter liquatum cum sulfure coquentes in carbonibus. Ad ea quoq; quæ inueterari uolunt, illo nitro utuntur. Sunt ibi nitrariæ, in quibus & rufum exit à colore terræ. Spumam nitri, quæ maximè laudatur, antiqui negabant fieri, nisi cū ros cecidisset, prægnantibus nitrarijs, sed nondum parientibus. Itaq; non fieri incitatis etiam si caderet. Alij operimentorum fermento gigni existimauere. Proxima ætas medicorum Aphronitrum tradidit in Asia colligi in spelæis mollibus distillans, specus eos Calycas uocant: dein sole siccant. Optimum putant Lydum. Probatio, ut sit minimè ponderosum, & maximè friabile, colore penè purpureo. hoc in patellis affertur. Aegyptium in uasis picatis, ne liquefeat. Vasa quoq; ea sole inarescentia perficiuntur. Nitri probatio, ut sit tenuissimum, & quam maximè spongiosum, fistulosumq;. Adulteratur in Aegypto calce. Deprehenditur gustu: syncerum enim facile resoluatur: adulteratum pungit. Calce aspersum, reddit humorem uehementem. hæc Plinius. Ex quibus liquò constat, nostri usus Salnitrum, antiquorum nitrum non esse, etsi inficias eundem non sit, quin aliquas nitri habeat qualitates. Verum tamen nemini unquam persuasum uelim, ut medicamentis, quæ intus in corpus sumuntur, nitri loco Salnitrum absque noxa imponi possit. Et quanuis contrarium asserant, scriptisq; tradant Monachi illi reuerendi, qui Mesuem commentati sunt; non tamen credo, hoc id prius in se ipsis expertos esse. Quod nihilominus eos facere decebat, si fraternæ charitate ducti sunt, ut alijs suaderent salnitrum tutò assumi posse, cū prima charitas (quod dictum frequenter usurpant) incipiat à se ipso. Nitri meminit Galenus libro nono simplicium medicamentorum, sic inquit. Nitrum dictum est supra in medio esse aphronitri, & salis uirium: ceterum ustum propius ad aphronitrum accedit, utpote exustione tenuius redditum. Desiccat itaq; & digerit, & si intro in corpus sumatur, secat, & extenuat crassos lentosq; succos potentius multo quàm sal. Aphronitrum uerò nisi grauis urgeat necessitas, nemo deuorabit, nimirum inimicam stomacho: quandoquidem plus etiam litro incidit. Sanè ad fungos suffocantes, rusticus quidam eo uti assolet, & semper profuisse probatum est. Ceterum nitro usto, simul & non usto, & multo etiam magis eius spuma, & nos in talibus uti consueuimus. hæc Galenus. Qui tamen uidetur ijs, qui codicis mendam non animaduertunt, maximam facere differentiam inter Aphrolitrum, & Aphronitrum, licet hæc re diuersa non sint. Nam ubi de Aphrolitro libro citato differit, uulgata exemplaria habent. ἀφρόλιτον ἀφρονίτρον διαφέρει. hoc est. Aphrolitrum ab aphronitro differt. Verum in altera dictione latet uitium, ut quæ ἀφροῦ νίτρον, hoc est, à spuma nitri, duabus uocibus legenda sit. Ita fiet, ut Galeno non aphrolitrum ab aphronitro, sed utrumq; à spuma nitri aptè distinguatur. Id quod & Augustinus Ricchus Lucensis, & Leonardus Fuchsius, medici ætatis nostræ celebres, doctissime adnotarunt. Ceterum cū Galeno aphrolitrum, siue aphronitrum spuma nitri non sit, quid aliud sit, ingenue fateor me ignorare: neque id alius, quod sciam, hæcenus explicauit.

Monachorū  
error.

Nitri, & aphronitri uires ex Gal.

ἡν ἄρτι non ἔστιν ὁμοῦ μετὰ τὸν ἀφρόνιτρον, ἀλλ' ἐν τῷ ἀφρόνιτρον. F A E X. C A P. I X. C.

**ELIGENDA** Fax maximè à uino uetere, Italico: sin minus, ab alio consimili. Fax aceti uiribus longè acrior est. Crematur, ut alcyonium, antè diligenter siccata. Sunt qui noua testa igni largo urant, usquedum penitus incendatur. Alij uiuis carbonibus faxis glebam obruunt, & idem opus prosequuntur. Experimentum est legitimæ ustionis, ut aërio nitore inalbescat, linguamque tactu urere uideatur. Eadem urendæ faxis aceti ratio. Vis ei supra modum urens, & abstergens. vlcera ad cicatricem perducit, adstringit, uehementer exest, siccaturque. Sed recenti utendum est, quoniam celeriter exanimatur: proinde non nisi in reconditorio, & vase aliquo reponi debet. Lauatur ut pompholyx. Quæ ustionem experta non est, tumores & per sese, & cum myrto cohibet. ventris, stomachique fluxiones illita sistit: muliebre profluuium imo uentri, aut genitalibus imposita mitigat: panos discutit nondum exulceratos, & tubercula: rigentes mammas, siuque lactis impatientes,

impatientes, cum aceto peruncta extinguit. Cremata uerò, ungues scabros cum resina aufert. Ad-  
dito lentiscino oleo, illita nocte tota, rufat capillum. Elota oculorum medicamentis, ut spodos,  
adjicitur: cicatrices eorum, & caligines eadem abstergit.

**FAEX** uini uulgaris notitiæ est, quin & ipsius adurendæ ratio nota, ijs præsertim, qui ex hac alumen, quod uo-  
cant facis, conficiunt. Porro uini recrementum, quod uinarijs cadis agglutinatum, crustæ lapidosæ instar inuenitur,  
officinarum uocabulo Tartarum uocatum, aluum non obscure subducit. Proinde nō desunt, qui sibi adstrictam aluum  
euent, hausto tartari puluere ex gallinaceo ure, addito mastiches momento, & saccharo: nihil enim incommodi ad-  
fert hac ratione paratum. Additum in dieictoria diluta, quæ ex sena, uel polypodij radicibus, uel epithymo paran-  
tur, uim eorum dieictoriam adauget. Sunt qui album Tartarum faciant, dum ipsum in aqua decoquentes, atque sub-  
inde despumantes.

Facis, & tar-  
ri dicti cōsid.  
& uires.

Ἀσβεσός. CALX VIVA. *Kalk* CAP. XCI.

**CALX** uiua hoc modo fit. Marinorum buccinorum testas igni condito, aut feruenti clibano,  
nocte dimittito: postera die, si candidissimæ fuerint, extrahito: sin aliter, iterum urito, usquedum  
uehementer inalbuerint. Dein ubi in aquam frigidam demersæ fuerint, in fictile nouum conijci-  
to, & exacte pannis operiens, noctem unam conuiescere sinito: mane eam extrahens, ubi perfe-  
cto omni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & è litoralibus calculis igne crematis, necnon  
30 è uili, & fusaneo marmore, quæ cæteris præfertur. Vis omni calci in commune ignea, mordens,  
adurens, & crustas inducens: quibusdam alijs immista, ut adipi, oleo, concoquendi uim assumit,  
molit, & dissipat: ulcera ad cicatricē perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

**CALX**, cuius passim usus ad ædificiorum muros struendos, nota omnibus est. Præter hæc fit etiam priuatim  
ad uaria medicamenta è purpurarum, buccinorum, cochlearum, ostreorum, ouorumq; testis. Non desunt tamē, qui  
etiam eam, quæ fit ex calcario lapide, unguentis, & emplastris admisceant, eam primum demergentes in aquam, us-  
quedum prorsus dissiliat, ac subinde lauantes diebus pluribus, affusa sæpius recenti aqua pluuiali, uel fontana. Valet  
enim sic elota ad contumacia ulcera, quod absq; morsu ualenter siccet. Ob id itaq; unguentis expetitur, quibus utun-  
tur ad pudendorum ulcera, eaq; præsertim, quæ ueneræ luc contrahuntur. Quinetiam prodest ad ambusta, & alia,  
30 quæ non facile curationem admittunt. Sunt etiam qui extinctam prius calcem, lauent deinde diutius rosarum stillati-  
ua aqua, ita ualentius effici medicamentum existimantes. Calcis uires descripsit Galenus libro nono simplicium  
medicamentorum, his uerbis. Calx, uiua quidem, quæ Ἀσβεσός Græcè dicitur, uehementer urit, adeo ut crustam  
efficiat: extincta uerò protinus etiam crustam molitur & ipsa: at post diem unum, aut alterum minus urit, minusq;  
inducere crustam potest. At uerò temporis progressu prorsum nec crustam quidem gignere queat, tametsi etiamnum  
calfaciat, carnemq; liquet. Porro si lauetur in aqua, suam mordacitatem exuit, efficitq; nuncupatam ῥοιῶν, hoc  
est lixiuum: at ipsa absque morsu resiccat. Ac si bis, terq; aut amplius abluta fuerit, planè mordacitatis expers con-  
stituitur, ac strenuè absque mordacitate exiccat.

Calcis confi-  
deratio.

Calcis uires  
ex Galeno.

Γύψος. GYPSUM. *Gypso* CAP. XCII.

**GYPSUM** uim habet adstringendi, obstruendi: sanguinis eruptiones, sudoresque cohibet.  
sed potum, strangulationis modo iugulat.

**GYPSUM** quid sit, nemo est qui nesciat. Abundat gypso uniuersa ferè Hetruria, ibique commodè frequen-  
terq; expetitur cementarijs ad ædium fabricas. Fit gypsum è quodam candido lapide, in laminas facile scissili: qui ta-  
men non longa ignium ui torretur, & excoquitur. Quandoquidem in calenti furno coniectus, quatuor, aut ad simi-  
lum quinque horarum spatio perurit. Tunditur deinde in puluerem, & incerniculis excutitur. Præstantissimum  
est recens: nam diu asseruatum, aquæ immistum ægrè lapidescit, ac coit. Fit etiam Gypsum è speculari lapide, qui  
Græcis σελανίτης dicitur. Item ex alio quodam lapide niuei candoris, è quo in Hetruria torno patinæ, & alia ua-  
30 sorum genera conficiuntur. Hunc alabastrum appellant, sed perperam. Gypso uires reddidit Galenus libro nono  
simplicium medicamentorum, ita differens. Gypsum & ipsum ad communem omnium terrenarum, lapidosarumq; cor-  
porum facultatem, qua desiccare dicta sunt, insuper hoc adiunctum habet, quod est facultatis emplastice. Vnitur e-  
nim ipsum ad sese, & cogitur, lapidescitq; maceratum. Quamobrem siccis medicamentis, quæ ad sanguinis eruptio-  
nem accommodantur, commiscetur. Nam ipsum per sese lapidosum fit, & durum coactum, ac congelatum. proinde  
rigare, diluereq; illud excogitauit, tenui alboq; oui liquore, quod ad ophthalmias utile est, admisto quod in farina tri-  
ticea est puluilli tenuissimi, qui in parietibus molendinorum residet. Excipere uerò, quod sic subactum est tenellis le-  
poris pilis, aut qui perinde sunt molles, expedit. Gypsum combustum non æquè emplastice uim habet: ceterum te-  
nuiorum est partium, & ualentius desiccet. Quin & reperiensorium est, maxime si maceretur oxycrato.

Gypsi histo-  
ria.

Gypsi uires  
ex Galeno.

## Τέφρα κληματίν. SARMENTITIVS CINIS. CAP. XCIII.

SARMENTORVM cinis vrendi uim habet: cum axungia autem, uel oleo illitus, fractis neruis, articulorum collisionibus, & neruorum nodis prodest: cum nitro, & aceto excrescentias carnis in scroto reprimat. Serpentium, canumque moribus illitus ex aceto medetur. crustas obducentibus medicamentis admiscetur. Fit ex eo lixiuium contra præcipitationes, & fungorum uenena, cum aceto, sale, & melle.

Cineris omnis uires ex Galeno.

CINIS omnis quid sit notius est, quam ut pluribus explicari debeat. Quare ad eius uires properemus: de quibus in uniuersum differens Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cinis combustorum lignorum reliquæ sic nuncupantur, compositæ ex contrarijs tum qualitatibus, tum substantijs. Habet enim in se partem terrenum, partim uelut fuliginosum, quod Græcè dicitur æthalodes, siue lygniodes, siue quomodocunque quis appellare uolet: atque hæc sanè partes sunt tenues, & quæ maceratis aqua cineribus, & percolatis, unà asportantur, & que abeunt. Quod uero reliquum est, terrenum est, infirmum, & morfu carens, calida facultate in lixiuium deposita. Sed non omnis cinis eadem temperatura præditus est, sed pro combustæ materiæ diuersitate uariatur. At nescio quo pacto Dioscorides omnes cineres adstringendi habere uim prodiderit, cum ficulneus eiusmodi omnis qualitatis sit expers, utpote cum & ipsa arbor nulla sui parte acerbam qualitatem præferat, ceu quercus, ilex, arbutus, fagus, lentiscus, hedera, & hoc genus alia: uerum plena succo ualido tota sit, eoque acris & calido. Ergo ex acerbis utique lignis factus cinis, non parum adstringit: meminiq; me quandoque, cum aliud ad manum non esset medicamen, per hunc sanguinis suppressisse eruptionem. Verum nullius unquam ad tale uti ficulneo audeat. Siquidem hic acrimoniæ multum, adurentisq; facultatis obtinet, mistæ absterfioni: & utroq; differt ab eo, qui ex quercinis lignis conficitur, tum quod in eo fuliginosum multo est acrius, tum quod in illis terrenum quodammodo subadstringens est, in hoc abstergens, uelut in cinere thymalorum. Est & calx cineris quedam species, ceterum tenuioris essentie, quam qui ex lignis fit: nimirum quanto lapides exactius torrerentur, ut cinis fiant, postulant: non tamen multum reliquum in se habet, uelut nature igneæ, quod uocant ἐμπύρευμα. Proinde elota medicamen est citra morsum desiccans, magisq; si bis terue lauetur. Ceterum si marina aqua abluta sit, admodum digerit. Dicitur porro de ea, ubi de metallis sermo habetur.

## Αλκυονίον. ALCYONIVM.

## CAP. XCIII.

ALCYONII quinque esse genera compertum est. Vnum enim spissum, acerbis saporis, spongiosa facie, item tæti odoris, ponderosum, & pisces olens, quod plurimum in litoribus inuenitur. Alterum pinnulæ oculorum, aut spongiæ simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens. Tertium vermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Milesium quidam uocant. Quartum succidis velleribus non dissimile, multis inanitatibus hiens, leue. Quintum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodammodo pumicosum, foris læue, acris, quod plurimum in Propontide iuxta insulam Besbicon appellatam gignitur, patrio nomine halos achnen uocant. Duo priora in foeminarum smegmata assumuntur, contra lentigines, lichenas, lepras, vitilignes, nigritias, & maculas in facie, reliquoque corpore. Tertium ijs, qui difficili vrina uexantur, aut arenulas in vesica colligunt, idoneum est: item renibus affectis, aquæ inter cutem, lienj. Vltimum autem, & ex uino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est. in alia smegmata, psilothraque assumitur, cum sale mistum. Si quisquam alcyonium cremare velit, cum sale in crudum fictile mittat, & oblinens vasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum figlinum percoctum fuerit, extrahens ad vsus recondat. Lauatur ut cadmia.

Alcyonij historia, & consideratio.

ALCYONIVM (ut Plinius est auctor libro XXXII. capite VIII.) fit in mari ex nidis, ut aliqui existimant, alcyonium, & cæicum: alij ex sordibus spumarum crassescens: alij è limo, uel quadam maris lanugine. Quatuor eius genera. Cinereum, spissum, odoris asperi. Alterum molle, lenius, odore ferè algæ. Tertium candidioris uermiculi. Quartum pumicosius, spongiæ putri simile, penè purpureum: quod optimum, hoc & Milesium uocatur. Quod autem candidius, hoc minus probabile est. hæc Plinius. Qui tamen quintum fungi figura, cuius meminere Dioscorides, & Galenus, silentio præterijt. Sunt præterea, qui Alcyonium ita appellari tradant, non quod ex alcyonium nido fiat, ut Plinius scribit, sed quod alcyones super illud marinis undis simul congestum nidificent. Quorum sententiam magis probandam censemus. Alcyonium officinæ spumam maris uocant: quod sic idem uocent Arabes, Dioscoridem secuti. quippe qui scripserit quintum Alcyonij genus in Besbico halos achnen, hoc est, maris spumam uocari. Ceterum rursus Alcyonium corallij instar, coaceruatis in globum ueluti uermiculis, lapidosaq; materie, Venetjs primum uidimus. Quartum uero reperimus copiosum in Tergestino litore uelleribus similitimum, album, ac leuissimum. Piscatores hoc cochlearum marinarum, quæ aculeis rigent, & uulgò appellantur Garuse, nidum esse affirmant. Primum, & ultimum genus pluribus in seplasijs inuenitur. Porro in hoc capite in uulgatis Dioscoridis exemplaribus nonnulla (ut plane suspicor) uerba desiderantur, cum de uiribus quarti alcyonij nihil in ijs scriptum legatur. Augest suspicionem Oribasius, cuius lectio hoc loco habet. τὸ δὲ τέταρτον, καὶ ὕστατον, hoc est. Quartum, & postremum &c. Idem confirmat Serapio, qui ex Dioscoride transcribens, utriusque speciei meminit. De Alcyonijs differat

Locus Diosc. suspectus.

differunt Galenus libro xi. simplicium medicamentorum, his uerbis. Alcyonia omnia detergunt, ac digerunt, qualitate habentia acrem, & calidam facultatem: uerum aliud alio non parum plus minusque, & in his ipsis, quæ diximus, secundum partium essentiae totius tenuitatem. Est autem eorum unum densum, & graue, odoris prauum: olet enim pisces putres, spongiae in specie simile. Secundum uero aliud figura longiore, leue, & rarum: odorem habens similem phycijs. Aliud tertium uermi simile est specie, colore purpureo, consistentia molli: uocant id Miletum. Post quæ quartum secundo quidem iam posito similiter & leue, & rarum, uerum lanis succidis simile. Denique & quintum extrema superficie leui, ceterum interna substantia asperum, nullius odoris, gustu tamen apparens acre: & sanie omnium alcyoniorum est calidissimum, adeo ut & pilos urere possit. Itaque cum duo prima lichenas, alphas, psoras, leprasque adiuuent, praeterea cutem splendidiorē competentia uirium efficiant, idem praestare non potest hoc ultimo loco positum. Nec enim perinde ut illa, cutem duntaxat summam extergit, sed etiam excoctat, usque in profundum cutis penetrans, ut etiam ulcera molliatur. Porro quod tertio ordine recensuimus, omnium est tenuissimum. Itaqueustum alopecias curat illitum cum uino, colore quidem fuluo, tenui tamen essentia. Quartum autem eiusdem cum hoc speciei uires obtinet, uerum haud parum imbecilliores.

Alcyonij uires ex Gal.

Αἰδάρες. ADARCES. CAP. XCV.

**FIT** in Cappadocia, quod adarces appellatur. Est autem tanquam concreta falsilago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, & arundinibus, ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Asij similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantum cauo proxima, ut uideri possit lacustre alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & uitia cutis in facie, & similia, accommodatur. Et in summa uis ei acris. Humorem euocat, qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

**LEGITIMAM** Adarcem, quæ Dioscoridis, & Plinij placitis respondeat, hactenus non uidimus, etsi in Italia nasci tradidit Plinius libro xvi. cap. xxxvi. Quam postea libro xxxii. cap. xii. uocauit calamochnum, sic inquit. Inter aquatilia dici debet & calamochnus Latine adarca appellata. Nascitur circa arundines tenues, & spuma aquæ dulcis, ac marinæ, ubi se miscet. Vinum habet causticum, ideo acopis additur contra perfrictionum uitia. hactenus Plinius. Porro uero eos hallucinari crediderim, qui sibi persuadent id esse Adarcem, quod uulgò Italis dicitur Palla marina. Siquidem hæc in mari tantum nascitur, non in paludibus aquæ dulcis: & ibi non arundinibus, neque herbis inherens uisitur, sed in sicco reperitur litore, undis simul cum alga proiecta; pile omnino similis, quæ in lacertium hædorum uentriculis, ex exuētis una cum lacte pilis, plerumque reperitur. Adde quod hæc, quantum gustauerim, nec acris, nec caustica (ut Plinius inquit) deprehendatur: neque etiam, quod sciam, in paludibus inueniatur. Huius tamen meminit Galenus libro primo de compositione medicamentorum secundum locos, referens quæ Crito ad conseruandos, augendos, itemque a defluuiis praeseruandos capillos scripsit. Vbi cum interpres Cornarius uir alioqui doctissimus, ignorasset quid Critoni & Galeno intelligeretur per σφαίραν θαλασσίαν, forte suspicatus, locum hunc in Galeno esse deprauatum, spongiam marinam perperam interpretatus est: quandoquidem lectio illa uera est, & uertendum erat pilam marinam. Id quod etiam Fuchsius doctissime adnotauit in suis de compositione medicamentorum libris. Marinam pilam addit Nicolaus Myrepsicus in quodam unguento ad lumbricos, ubi sic habet. Pile marinæ, quæ reperitur in mari rotunda, ut lana congesta. Ceterum Adarcæ uires retulit Galenus lib. xi. de simplicium medicamentorum facultatibus, ita scribens. Adarcion aliqui masculino genere adarcon, alij foemino adarcen dicunt, essentia quidem sua uelut spuma est aquæ salis concreta, circa arundines, & farragines concrescens. Acerimū hoc est, simulque calidissimum medicamentum. proinde & per se inutile est, uerum commiscetur ijs, quæ uim eius retundunt, itaque fit admodum utile in ijs affectibus, qui excalescere possunt. idque foris impostum, nam intro in corpus ipsum sumere est impossibile, nimirum ob uirium uehementiam, hæc Galenus. Ex quibus liquido apparet, Adarcium a marina sphaera plurimum facie, & uiribus differre.

Adarcæ consideratio.

Cornarij lapsus.

Adarcæ uires ex Galeno.

Σπόγγια. SPONGIAE.

CAP. XCVI.

**ES** SPONGIIS alias mares appellauere, tenui fistula, spissas: quarum duriores tragos nominarunt. Foeminas autem, quæ contrarias dotes habent. Vruntur eæ, ut alcyonium. Recentes sine pinguitudine vulnerariæ sunt, & tumores reprimunt. recentia vulnera ex aqua poscæve cōglutinant: veteres sinus ex decocto melle iungunt. Vetusæ autem inutiles. Aridæ ligatæ lino, si penicilli modo adigantur, occlusa ulcera, callosque laxant. Siccæ recentes, & uacuae, senilia uicera, & quæ fluxione laborant, aut cuniculatim exedunt, impostu siccant. sanguinis profluuia sistunt. Crematarū cinis ex aceto, aridæ lippitudini auxiliatur: & ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius in oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum, profluentem sanguinem sistit. Candidæ cura fiunt, & mollissimis recentes per æstus tinctæ salis spuma, quæ petris coheret: insolantur inuersæ, hoc est, parte caua sursum spectante, & qua abscessæ fuerunt, deorsum. Si uero æstiuā serenitate ad lunam sternantur, perfusæ salis spuma, aut maris aqua, maximum candorem referent.



Spongiarū hi-  
storia ex Ari-  
stotele.

**SPONGIARVM** genus (inquit Aristoteles libro v. capite xvi. de historia animalium) triplex statuitur: nam alie rare, alie spissae, alie quas nominant achilleas. Tenuissimum genus id tertium est, & spississimum, & usque diffusum, quod galeis ocreisq; inseritur, eoq; minus ciere strepitum posse notatum est. genus hoc inuentu perquam rarum est. Quae autem in genere illo spisso praedurae sunt, atque asperae, nomine birci nuncupantur. Quae quidem omnes aut ad saxa nascuntur, aut iuxta litus, lutoq; aluntur. Cuius rei argumentum est, quod capite limo refertae ocrenes cernuntur. quod certe indicat ceteris quoque adhaerentibus cibum per ipsum adnexum hauriri. Imbecilliores propterea sunt spissae, quam rare: quia minus albo radice haesu innituntur. Sensum etiam spongijs esse aiunt: argumento quod ad euulsoris accessum contrahuntur, ita ut euelli difficile sit. quod idem etiam faciunt, quoties flatus, tempestasq; urget, ne sua de sede pellantur. Sed sunt, qui de hoc dubitent, ut qui Toroniam incolunt. Narrant tamen procul dubio bestiolas quasdam uelut tineas, lumbricosue, & eiusmodi alias consistere intra spongas, atq; ali: quas & euulsis spongijs, pisciculi saxatiles deuorent, qui uel radices absument totas, quae inhaerentes saxis remanserunt. Si euenerit forte, ut spongia abrumptatur, residuo item renascitur, et completur. Magnitudine amplissima solute illae, & rare spongiae, augentur plurimae, quae circa Lyciam sunt. Sed mollissimae quae spissae: nam achilleae torosiores ijs constant. Omnino quae altis, tranquillisq; insunt gurgitibus, mollissimae sunt: flatus enim, ac tempestates spongas quoque, ut cetera altitia reddunt duriores, & incrementum impediunt. Quamobrem spongiae Hellefonti spissae, ac durae sunt, & omnino quas mare ultra Maleam promontorium, citraq; fert. Differunt inter se mollitie, duritieq; nec calorem inmodicum spongiae patiuntur: fit enim eo, ut more pullulantium putrescant. Quocirca optime iuxta oras comperiuntur spongiae, si gurgite alto demersae sunt: commodè enim temperantur propter altitudinem gurgitis. Color illotis, uiuisq; nigricans est. Adhaerent nec parte, nec toto: intersunt enim fistulae quaedam inanes, sed pluribus passim particulis haesitant, & quasi membrana extenta subesse radicibus earum uidetur. supernè autem ceteri meatus concreti propemodum latent: at uerò quaterni, aut quini patent, per quos pasci existimantur. Hastenus de spongijs Aristoteles. Cui quidem Plinius suam de spongijs historiam acceptam referre potest, quam libro ix. cap. lxxv. scriptis tradidit. Spongiarum uires memoriae prodidit Galenus lib. xi. simplicium medicament. his uerbis. Spongia iusta acris est, & digerentis potentiae. Vtebatur ea praceptorum meorum quidam ad sanguinis eruptiones, quae manuali opera indigent. In quem usum semper eam paratam habebat siccam, & exarescentem: cion uerò res posceret, bitumine in primis imbuebat, sin eo careret, pice. Porro admovebat eam partibus sanguine profluentibus etiamnum ardentem, ut & crusta parti induceretur, & ipsum spongiae usae corpus, seu operculum quoddam acciperet. Ceterum spongia ipsa noua per se, non sicut lana, aut linamentum (quod  $\mu\omicron\tau\omicron\nu\ \tau\iota\lambda\tau\omicron\nu$ , id est, carpinatum uocant) materia duntaxat est, quae humores infundendos excipiat, sed etiam manifestè desiccet. Id quod scies, si ea sola utaris in uulnere, cum aqua, aut oxycrato, aut uino, pro diuersitate uidelicet corporum, uti est ante dictum. Glutinabit si quidem ea similiter atque medicamenta, quae uocant enema. At si non noua sit, sed usui accommodata, palam cognosces, quantum à noua superetur, siue uulneribus eam imponas siue aqua proluens, siue oxycrato, siue uino. Nec mirum est, cum in spongia noua seruetur etiamnum ea, quam à mari accepit, facilius modicè corpora exiccandi. Atq; haec quidem praestare potest, cum etiamnum seruat maris odorem. Nam temporis spatio, etiamsi nunquam usui accommodata sit; tamen & odorem maris amittit, neque aequè desiccare potest.

Spongiarum  
uires ex Gal.

### Κοράλλιον. CORALLIVM. libro lxxv. cap. xcvii.

**CORALLIVM**, quod aliqui lithodendron appellarunt, marinum esse fruticem constat, qui alto extractus, duratur statim atq; emergit, tanquam offuso aëre protinus concresecat. Plurimum inuenitur ad Syracusas, in promontorio, cui Pachyno nomen est. Laudatissimum rubens, colore antherici, aut sandycis saturatae, nec secus terenti faciliè cedens, æquabili usquequaque concremento, rursus algæ, aut phuci marini odore, quam ramosissimum, forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod autem in lapidis duritiam coit, scrupulosum, inane, & lacunosum, uitiosum existimatur. Adstringit, & refrigerat mediocriter: excrecentia coercet: oculorum cicatrices abstergit: ulcerum caua, & cicatrices explet. Contra sanguinis reiectiones magnopere efficax est: urinae difficultati auxiliatur. quin & potum ex aqua lienem absunit. Quod antipathes uocant, corallium esse arbitrantur, specie tantum distans. Est autem colore nigro, arboris figura, ramosum magis. Vires supradicti habet.

Corallij con-  
sideratio.

**CORALLIVM**, quo usque adeo abundat Italia, ut ferè nulli ibi reperiantur infantuli, nullaeq; puellae, quibus non gestentur Corallij monilia aut collo, aut brachijs suspensa, quo item utuntur foeminae in templis ad suas preces numerandas, in Tyrrheno, & Siculo expiscantur mari. Ceterum etsi rubri tantum, & nigri meminerit Dioscorides; reperitur tamen quod niuci sit candoris in iisdem pelagis, non autem ut rubrum compactum, ponderosumq; sed leuius ac rarius, & spongiarum modo inane. Creditur hoc rubro longè magis refrigerare: proinde eo utuntur medici, ubi opus est maiore refrigeratione. Corallij meminit Plinius libro xxxii. cap. ii. ubi de eo ita scriptum reliquit. Quantum apud nos Indiciis margaritis pretium est, tantum apud Indos in Corallio: nanque ista persuasione gentium constant. Gignitur quidem et in rubro mari, sed nigrius. In Persico uocatur lace. Laudatissimū in Gallico sinu, circa Stcecbadas insulas, & in Siculo, circa Heliam, & Drepanum. Nascitur et apud Grauisacas, et ante Neapolin Capanae, maximeq; rubens, sed molle, et ideo uilissimū Erythris. Forma est ei fruticis, color uiridis. Baccæ eius caduæ sub aqua & molles.

et molles. exemptæ confestim durantur, et rubescunt, quasi corna sativa, specie, atq; magnitudine. Aiumt tacta protinus lapidescere, si uiuat. Itaq; occupari, euelliq; retibus, aut acri ferramento præcidi. hac de causa corallium uocatum interpretantur. Probatisimum quàm maximè rubens, et quàm ramosissimum, nec scabrosum, aut lapideum, uel rursus inane, aut concavum. Auctoritas baccarum eius non minus Indorum uiris quoq; pretiosa est, quàm faminis nostris unioes Indici. Aruspices eorum, uatesq; in primis religiosam id gestamen amolendis periculis arbitrantur. Itaq; et decore, et religione gaudent. Galli gladios, scuta, galeas adornabant eo. nunc tanta penuria est uenabili merce, ut perquam raro cernatur in suo orbe. Surculi infantie adalligati, tutelam habere creduntur. hæc Plinius. Quem tamen mirari subit, quod tam facile sibi persuaserit, corallum per se baccas ferre, quasi corna sativa specie atq; magnitudine, perinde ac ceteræ arbores suos proferunt fructus. Quandoquidem, ut fatentur ij, qui corallia expiscantur, et in ijs mercaturam exercent, nullas per se baccas edunt. Baccæ enim, quæ in coralliorum monilibus cornis, ac cerasis similes uisuntur, ex ipsorum truncis torno, et lima prius parantur: mox smyridis lapidis puluere, et terra quadam, quæ è Tripoli Aphricæ adfertur, expoluntur, et lucidum leuorem contrahunt, cum ijs diutius fricantur. Ad hæc Corallia è mari circumquaque muscosa eximuntur, nec tunc ulla ex parte rubescunt, uerum inde artificibus tradita, deraso cortice rubent, et perpolita nitescent. Nigrum Corallium, quod Dioscorides Antipathes uocari ait, primum uidi ego Neapoli eburnum colore referens. Corallium comitalibus comitodè adalligatur, haucuridumq; præbetur. Corallium ædes (ut aiunt) à fulminum iniuria tuetur. Idem mensum abundantiam cohibet, dætes commotos firmat, desquamatas gingiuas emendat, itemq; oris ulcera sanat. Potum dysentericos iuuat, seminis profluuium in uiris, nocturnasq; pollutiones, et in mulieribus albos uteri fluores reprimat. Recensetur inter ea (Auicenna teste) quæ cordi hilaritatem adferunt. Auxiliatur præterea (ut Plinius inquit) contra torminum ac uesticæ calculi mala in puluerem igne redactum, et cum aqua potum. Simili modo ex uino potum, aut si febris sit, ex aqua somnum conciliat. ignibus diu repugnat. Sed eodem medicamine sæpius poto, tradunt lienem quoq; absumi. Sanguinem reijicientibus, aut excreantibus medetur. Cinis eius miscetur oculorum medicamentis: spissat enim ac refrigerat, ulcera caua explet, cicatricesq; extenuat. Corallij meminisse Galenum in libris legitimis de simplicium medicamentorum facultatibus, hæcenus non reperi: tamen si libro septimo de compositione medicamentorum plura describat medicamenta ad incipientem phthisin, hæmopticos, et suppuratos, quæ corallium excipiunt.

Plinij lapsus.

Corallij facul  
tates.

## Δίος Φρύγιος. LAPIS PHRYGIUS. CAP. XCVIII.

PHRYGIUS lapis, quo infectores in Phrygia utuntur, à qua nomen accepit, nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, non solida corporis compage, intercedentibus albis segmentis, ut in cadmia. Vritur autem uino optimo perfusus, uiuisque carbonibus obrutus: perficitur assidue folibus, donec mutato colore rufescat: rursus extractus eodem uino restinguitur. Hoc iterum, & trinis uicibus faciendum: attendendum tamen ne minutim confringatur, & in fuliginem euanescat. Vis crudo, ustoq; adstrictoria, expurgans: ulceribus crustas quodantenus inducit: ambustis cum cerato medetur. Lauatur, ut cadmia.

QUI mihi Phrygium lapidem ostenderit in Italia, hæcenus neminem inueni. quippe cum nec nostratibus medicis, nec lanarum infectoriis, ullo sit usui, ex Cappadocia ad nos deferri desiit. Plinius cum ignorasset, Phrygium lapidem medicamentis etiãnum expeti, tingendis tantum uestibus commendauit. De huius lapidis uiribus disseruit Galenus libro ix. simplicium medicamentorum, his uerbis. Pyritæ facultatem habere existimatur et Phrygius, quem uocant. Sed eo semper uitor combusto quidem ad ulcera putrida, idq; aut ipso per se, aut ex aceto, aut ænomelite, aut oxycrato: ad oculos uerò medicamentum siccum efficiens: quod multi nunc acceptum à me obtinent. Miscetur ei et alia quæpiam. Dicitur autem de ipso in opere de componendis pharmacis. Nunc satis est de generali eius facultate explicuisse: ualidè enim desiccât, habens quiddam adstrictionis, simul et mordicationis. Dictum uerò superius est, ea esse omnia optima medicamina, plurimiq; usus, quæ mista in sese hæc duas facultates habent, nempe repercutientem, et digerentem.

Phrygij lapi-  
dis confid.Phrygij lapi-  
dis uires ex  
Galeno.

## Δίος Ασίας. LAPIS ASIUS. CAP. XCIX.

ASIUS lapis assumi debet pumicis colore, leuis, fungosus, item friabilis, scissiles uenas lutei coloris ad imum actas habens. Eius flos salugo subflaua est, summo lapide insidens, compage tenui, colore in aliquibus albo, in alijs pumici simili, ad luteum uergente: admotus lingue aliquantum mordet. Vim habet uterque adstrictoriam, & modicè erodentem. admixtus liquidæ pici, aut terebinthinæ, tubercula discutit. Longè ualidior flos existimatur. De cætero siccatus flos uetera ulcera, & cicatrici repugnantia sanat. excrecentia cohibet: tetra ulcera, & fungis similia, cum melle expurgat: ulcerum caua explet, & expurgat cum melle: depascentiaque cum cerato fistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto fabæ lomento: & lienosis ex aceto, & uiua calce. Prodest flos ex melle phthysicis linctu. Podagrici iuuantur, pedibus in folio ex eo lapide excuato inditis. Fiunt quoque ex eo loculi, qui corpora erodunt: & luxuriantem carnem, & corporum crassitiem absumunt, cum uice nitri in balneo sparguntur. Si lauare libet, cadmiæ modo lauatur.

Asij lapidis  
consider.

**T A M E T S I** in commentarijs nostris superioribus annis Italica lingua conscriptis, *Asium* lapidem mihi incognitum esse ingenue confessus fuerim; legitimam tamē nuper Tridento ad me misit Martinus Guidotinus septisarius diligens aequē ac peritus: qui quidem lapis, ni fallor, nullis prorsus notis ac uiribus Dioscoridis descriptioni redamat. Foditur in Tridentino agro quibusdam chalcantibi fodinis, quodam in monte non procul à pago, quem *Leuizam* nominant. Est enim hic pumicis instar leuis, fungosus, friabilis, lutei coloris intercurrentibus uenis. Hoc, quod carnes assumat, utebatur antiquitas ad defunctorum sepulcra, ut absumptis ab eo carnibus, corpora non computrescerent: ob idq; Græci appellauere sarcophagum. Quod manifestē declarat Dioscorides, cum inquit, *καὶ τοσοῦτο καὶ οὐχὶ γινώσκουσι*, id est, loculi defunctorum carnes absumentes ex eo sunt. Hunc locum nullus, quod sciam, ex interpretibus ita ut nos accepit: sed omnes ad aliud respicientes uocem *τοσοῦτο* puluerem uerterunt. In quo mihi planē non uidentur mentem Dioscoridis affecuti. Quam probē affecutus, nostrēq; sententiā ad stipulari cognoscitur Plinius libro xxxvi. cap. xvi. ubi de lapide *Asio* sarcophago ita scribit. In *Asso* Troadis lapis sarcophagus fissili uena scinditur. Corpora defunctorum condita in eo assumi constat intra quadragessimū diem, exceptis dentibus. hec Plinius. Ceterum *Asij* lapidis historiam, & uires descripsit Galenus libro nono simplicium medicamentorum, sic inquit. Est & alius lapis in *Asso* proueniens, quem ob id ipsum *Asion* cognominant, non durus ut petra. Siquidem color illi est, pariterq; consistentia ceu topbi, friabilis, & laxus. Innutritur ei quiddam farinæ tenuissimæ adsimile, qualis in pistrinorum parietibus adherere uisitur. Appellat hoc medicamentum petra *Asie* flos. Est uerō & subtilium partium, ut sine morfu nimis molles carnes, ac fluidas eliquet. Petra uerō, in qua nascitur, tamen si uim habeat illi similem, actionis tamen uehementia inferior est. Hoc enim ea potior est flos, non tantum quod magis colligat, ac digerat, & uelut sale condita seruet; sed & quia hæc præstet absque uehementi mordicatione. Habet & falsedinem quandam in gustu hic *Asie* petrae flos: ut coniectura sit illum nasci ex eo quod ros ex mari in petram residens, postea à sole desiccetur.

Asij lapidis historia, & uires  
ex Galeno.

Λίθος πυρίτης.

LAPIS PYRITES.

CAP. C.

**PYRITES** lapidis genus est, à quo æs conflatur. Eligi debet æris similitudine, facile scintillas edens. Vritur sic. Melle irrigatus, molli pruna continuē flatur folliibus, donec rufescat. Alij in multos carbonēs igni candentes, lapidem copioso melle perfusum deiciunt, & ubi ad fuluum colorem vergere coeperit, extrahunt: efflatoq; cinere, rursus madefactū cremant, donec æquabiliter assiccatus, friabilis reddatur: siquidē sæpe facies summa solum vritur. ita crematus, siccatusq; reconditur. Si eloto opus sit, lauari debet, ut cadmia. Tam crudi, quam usti uis est exalfacere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duritias concoquere, & concoctas discutere. Refina exceptus exfrescentia in carne cohibet; sed calorem quandam, & adstrictionem parit. Ita uisum nonnulli diphryges appellant.

Pyrite lapidis  
confid.

**LAPIDEM**, quem Græci *Pyriten* dicunt, officinæ cum *Mauritanis* *Marchesitan* uocant. Verum quanquam uniuersi lapides, à quibus ignis chalybe excutitur, *pyrite* appellari possunt; cum tamen *Marchesita* appellata ceteris magis scintillet chalybe aut ferro percussa, per antonomasiam ipsa sola uocatur *Pyrites*, tanquam ceteris præstantior. Foditur hæc in omnium metallorum ferē fodinis, genere, & colore diuersa, plerumque tamen (ut Plinius inquit libro xxxvi. capite xix.) aureis scintillis, uel argenteis respersa. Gignitur, ut rei metallicæ periti tradunt, ex impuro metallorum halitu. quo fit, ut ferē semper reperiatur in montium cacuminibus, ubi auri, & argenti uena, in profundo delitescit. Sterilis hæc magna ex parte, quod (ut chymistæ existimant) ex impurissimo sulphure, alijsq; inconcoctis partibus metallorum sit conflata: quamobrem fossores in Germania, extra cauernas *Pyriten* tanquam inutilem proijciunt. Veruntamen quandoque *Pyriten* inueniunt, qui aurum, argentum, uel æs intra se continet. Idcirco rectē prodidit Dioscorides, *Pyriten* lapidis esse genus, ex quo æs conflatur. Quod cum ignorasset Albertus, omnem *Marchesitan* inutilem esse asseruit. *Pyrite* uires reddidit Galenus libro ix. simplicium medicamentorum, his uerbis. Vnus eorum, qui ualidam facultatem possident, est & *pyrites* quem uocant. quo utimur. digerenti emplastro admisto: adijcitur ei & schistos. Ab hoc medicamine, & pus sæpenumero, & consistentia grumosa in spatijs intermedij musculorum nata, per halitum digesta sunt. Ceterum ubi in usu uocantur lapides omnes admodum uehementer contusi, atque ad leuiorem redacti sint oportet, similiter atque ea, quæ in ophthalmicis facultates adfiscuntur. Etenim nisi pollinis instar comminuantur, adeo ut in profundum corporum, quibus applicantur, subeant, asimiles manent istis marinis, & fluuialibus arenis, quæ & ipse communem omnium lapidum uim possident. Siquidem exiccant timentem ex hydropē carnem, uidelicet laborante in eis exalfactis decumbente. Non tamen ad aliud quippiam eis utimur, tanquam prædictis, ad ophthalmicas, & sistentes tum sanguinem, tum muliebrem profluium facientes, præterea ad glutinanda ulcera, cicatrice claudenda, carne implenda. Nam qui ex eis acres non sunt, ad hæc omnes sunt utiles, uelut & acres, quorum posterius mentionem faciam, ad detergendum, abstergendumq; tum detrahendum, extenuandum, digerendum, ualenterq; siccandum, & colliquandum.

Pyrite uires  
ex Galeno.

Λίθος αιματισ.

LAPIS HAEMATITES.

CAP. CL.

**HAEMATITES** optimus habetur friabilis, saturato colore niger, durus, & suo pte ingenio æqualis, nulla forde admista, nulloque zonarum discursu. Vim habet adstringentem, & exalfac-

diorem aliquantulum, extenuantemque. Oculorum cicatrices, & scabritiam cum melle purgat: cum lacte autem muliebri, lippitudini, fractis, & oculis cruore suffusis conuenit. Bibitur contra difficultatem vrinæ, & fluxiones mulierum in vino: & ab ijs, qui sanguinem reiecerunt, cum succo punici mali. Fiunt ex eo coticulæ, & collyria oculorum vitijs apta. Vritur ut Phrygius, sine vino duntaxat. Modus vſtionis eſt, ut modicè leuis fiat, & bullis quibuſdam intumeſcat. Sunt qui hæmatiten ita adulterant. Denſam glebam, rotundamque ſchiſti lapidis, cuiuſmodi ſunt, quæ eius radices vocantur, in urceum figlini operis, qui feruentem cinerem contineat, condunt: paucaque interiecta mora eximunt, experiunturque ſi trita ad cotem hæmatitæ colorem reddat. quod ſi ita res ſe habet, reponunt: ſin minus, iterum obruunt, & ſubinde conſpicientes, periculum faciunt: ſiquidem in cinere diu dimiſſus, colore mutato diffunditur. Coarguitur malè conſectus, primùm ſciſſilibus venis: quippe in rectos uenarum diſcurſus refringitur. At hæmatites longè ſecus ſe in colore habet: nanque hic floridum reddit, hæmatites verò ſaturatiorem, atque cinnabarin imitantem. Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & è magnete lapide, vehementer ambuſto. In Aegypto ſponte naturæ cum metallis enaſcitur.

20 **HÆMATITES** lapis, quo omnes in uniuersum medicæ officinæ abundant, quoq; pictores, & lignarij ſibi utuntur, uulgo uocatus Lapis, legitimus non eſt, de quo meminerunt Dioſcorides, & Galenus. Quippe hic ſa-  
diutius eſt, ex uiliſſimo uulgari Armenio bolo, alijsq; admiſtis impoſturis. Legitimus enim ſiſilis eſt, & ſponte natu-  
ra naſcens in metallorum cuniculis: qui fractus, ſanguinem colore imitatur; unde & nomen, cùm Græcis ſanguis α-  
20 **μα** dicatur. Huic perſimilis eſt, quem Schiſtum uocant, cuius hitoriam, & uires ſtatim poſt hunc ſcribit Dioſco-  
rides ob cognationis uinculum. Foditur hæmatites non modò in Aegypto, ſed in pluribus Germaniæ, & Boemiæ mō-  
tibus, præſertim in Hercynia ſylua: quin & in Italia Brixienſi agro, ſed peregriniſ bonitate cedentes. Variat ta-  
men huic lapidi color, quoniam & niger, & flauus, & ferruginis inſtar, quibuſdam inſit, ut peritiſſimus æquè ac  
doctiſſimus Agricola in ſuis de ſoſilium natura libris diligenter adnotauit. Hæmatitæ uires memoriæ prodidit Ga-  
lenus libro 1x. ſimplicium medicamentorum, ubi ſic inquit. Porro talium quoque unus eſt hæmatites, quem uocant, à  
coloris ſimilitudine id appellationis ſortitus: ſicut & galactites, quando & ipſe in ſuccum ſolutus, lacti ſimilis con-  
ſpicitur. Habet lapis hæmatites tantum frigiditatis, quantum habet adſtrictionis. Merito itaque auſi ſunt medici o-  
cularibus facultatibus lapidem miſcere hæmatiten. Ac ſolo eo uti poſſis palpebris exaſperatis: ſi quidem cum phleg-  
mone aſperæ ſint redditæ, ex ouo ipſum diluens: ac ſi magis etiam, per ſæni græci decoctum. Sin uerò citra phleg-  
monem, ex aqua. Incipito uerò ſemper à modicè humidis, per ſpecillum inſundens. Vbi autem, quod uires eius ferat,  
30 conſpexeris, magis ac magis craſſum efficies, ac tandem adeo craſſum facies, ut ſpecilli nucleo inungas, ſecundum ſub-  
iectionem, aut euerſionem palpebræ. Hic idem lapis ſimiliter in cote contritus, ſanguinis expuitioni conuenit, omni-  
buſq; ulceribus. Porro ſiccus, ſi ad tantam redactus fuerit leuorem, ut puluillum reſerat, reprimat excreſcentia, atq;  
eo nullus ſolo, atque per ſeſe utitur. Ego uerò ad ea, quæ dixi, uſus ſum facultate eius ex guſtu qualitate comperta,  
cùm mox experientia periclitari uellem, nunquid rectè conieciſſem. Et ipſa quidem oculorum ulcera, ſolus per ſe ci-  
catrice includit (ut paulò antè comprehenſum eſt) attritus, cæterum aut affuſus, aut inunctus. nam & id experientia  
exploratum habeo. hæcenus Galenus. Miris item laudibus extulit hæmatiten lapidem Alexander Trallianus, ſic in-  
quiens. Ego ſanè noui frequenter me ſine theriaca, alijsq; pretioſis antidotis multos cur aſſe, lenibus uſum medicame-  
tis, & præſertim lapide hæmatite. Uſus autem eo ſum in hiſ, qui largius ſanguinem reiiciebant, cum ſucco punici  
40 mali, & granis, uel cum ſucco polygonij: in quibus autem ſanguis non copioſe euacuabatur, etiam ex aqua ſola ege-  
lida. At leuigare ipſum curioſe oportet, ut in tenuiſſimum puluerem redigatur, ſitq; æreus, & uento perſimilis.  
Dedi ego ex eo ſcrupula quatuor, & paulò amplius minusue. Exhibui etiam ijs, qui pus expui inceperant, ac mirum  
eſt, quomodo ulcus exiccarit ſanaueritq; ut non amplius pus generaretur, neq; æger tuſſi inſtaretur. Spectaui au-  
tem & alium quendam ex hiſ, quibus uſus exeſum erat, non modò particulas quasdam ex faucibus, ſed etiam aſperam  
arteriam expuentem, ac mirum quomodo in hoc quoque lapis hic maximam efficaciam indicauerit. Nam & hic cu-  
ratus eſt nobis non admodum etiam ſpernentibus. Exhibui autem ægro potui medicamentum frequentius, ut commo-  
dius diſtribueretur. Quare cùm crebrò ipſum biſſet, tandem ſumere ipſum ſaſtidiuit. Excogitaui autem huiusmodi  
rationem, redactum in tenuiſſimū puluerem panniculo lineo impoſui, & diligenter ipſum undiquaq; conſtrictum, col-  
ligatumq; in poculo, quod uinum odoratum modicum haberet, ſuſpendere permiſi, idq; per totam noctem iam inde ab  
50 ipſo ueſpere: extraxi autem tenuem, æreamq; eius partem, ut æger ſolam uini qualitatem perciperet. Ex hoc bibere  
quantum mane libenter habebat, ei præcepi, atque hoc ſanè agendo, bibendoq; continuè, ſanitatem recepit. Hoc au-  
tem morbo liberatus, idem præſeruationis cauſa facere pergebat, bibebatq; donec etiam corpore probè permutato,  
conſueſta agendo uiribus ſe conſtare ſentiret. Hæc de lapide hæmatite à me uifa, & uſu comprobata conſcripſi. Hæ-  
cenus Alexander libro ſeptimo capite primo.

Hæmatitæ la-  
pidis confide-  
ratio.

Hæmatitæ ui-  
res ex Gal.

Hæmatitæ ui-  
res ex Alexan-  
dro.

Αἰδός σχιστός. LAPIS SCHISTVS. CAP. CII.

**SCHISTOS** lapis in Iberia Hiſpaniæ gignitur. Probatum maximè, qui croci colorem æmula-  
tur, friabilis, ſuapte natura ſiſilis, concremento, & alterno cohærentium venarum diſcurſu, pe-  
ctinum modo, Ammoniaco ſali ſimilis. Vim exhibet hæmatitæ, ſed ad omnia infirmiore. quia  
Gg 3 & caua

& caua replet muliebri lacte perfusus. ad procidentia, rupta, item genarum crassitiem, & vnas o-  
culorum, magnopere efficax est.

Schisti lapidis  
consideratio,  
& vires.

**SCHISTVM** lapidem, quem tradidit Dioscorides gigni in Iberia, hactenus allatum in Italiam non vidimus. Fodi tamen hunc in pluribus Hercyniæ sylvæ locis in Germania, quin & in Boemia author est clarissimus Agricola. Ceterum cum de viribus cum hæmatite certet, hic eius vires nobis supplere poterit. Meminit Schisti lapidis Gale-  
nus libro 1x. simplicium medicamentorum, sic de eius viribus differens. Lapidis hæmatite persimilem vim obtinet, ve-  
rum infirmiore, is qui vocatur schistus, ac post eum galactites. At meliutes caliditatis etiam nonnihil, ut dixi, adian-  
xit. Ut itaque unusquisque ipsorum leuiter, ac sensim ab hæmatite facultate recedit, ita ad oculos similiter in usum  
ducitur: est tamen mitior. Porro mitiora remedia partibus etiamnum phlegmone afflictis semper gratiora sunt, atq;  
iucundiora: ceterum liberis iam phlegmone partibus infirmiora, quam quæ persanare ualeant.

Λίθος γαγάτης. LAPIS GAGATES.

CAP. CIII.

**IN GAGATARVM** lapidum genere, præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bitu-  
minis reddit. Niger est plerumque, & squalidus, crustosus, perquam levis. Vis ei molliendi, &  
discutiendi. deprehendit fonticum morbum suffitus: recreatque vuluæ strangulationes: fugat  
serpentes nidore. podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, quæ influens  
amnis in mare effunditur, proximè oppidum, quod Plagiopolis dicitur. vocatur autem & locus,  
& amnis Gagas, in cuius faucibus ij lapides inueniuntur.

Gagatæ lapi-  
dis conside-  
ratio.

**LAPIDEM**, quem Gagaten uocant, in comitatu Tirolensi Germaniæ non longè ab Aeniponte (Germani  
Ispruch dicunt) in quodam torrentis alueo repertum, ostendit mihi primum clarissimus medicus Ioannes Petrus  
Merenda Brixianus, nullis prorsus notis à Gagatæ historia disidentem. Nam præterquam quod igni admotus conse-  
ssim accenditur, flammamq; contrahit, ac bitumen redolet, squalidus est, & niger, crustosus, & perquam levis.  
Hoc sciat in uniuersum Flandria, Cimbriaq; ubi lignorum penuria incolæ hoc tantum lapide ignem sibi comparant.  
Foditur hoc tempore etiam in Italia Brixiano agro, & eius fodinis nuper ingentem glebam misit ad me Tridenti San-  
tus Santinus diligens pharmacopola ad Corallij insignium. Fuchsius uir alioqui eruditione clarus putat (ut libro  
primo retulimus, cum de pissasphalto differeremus) Gagaten in Tirolensi comitatu repertum, esse pissasphaltum. Ve-  
rùm ego ab eo dissentio, ut citato nuper loco latius ostendimus. Sunt qui existiment fossiles quosdam carbonēs, quos  
in pluribus locis effodi in Germania tradidit Georgius Agricola uir doctissimus, & in fossilibus medicamentis indagandis  
hodie facile princeps, esse lapidem Gagaten, quod carbonēs ij non aliter quam è ligno parati igne accendantur.  
Veruntamen cum hi flammam non edant, nisi follibus excitentur, nec ullum bituminis odorem spirent, eorum opinio  
planè refellenda uidetur. Siquidem Gagates adeo bitumine prægnans est, ut accensus picis fere modo flagret, & ni-  
gerimum emitat fumum. Quin & oleum copiosum reddit, ubi uitæis organis conclusus, ignem uir perurit. Hoc  
commendauit Mesues demoniacis, epilepticis, paralyticis, spasmodicis, tetanicis, arthriticis, ab utero suffocatis,  
& conceptum non admittentibus. Quod tamen à carbonibus ijs elici non potest, cum omni penitus humore desti-  
tuantur. Gagatæ historiam, & vires tradidit Galenus libro 1x. de simplicium medicamentorum facultatibus, his  
uerbis. Est & alius lapis colore atro, qui ubi igni admotus fuerit, persimilem bitumini odorem exhibet. quem Dio-  
scorides, nonnulliq; alij in Lycia inueniri prodiderunt, ad fluuium nomine Gagatem, unde & ipsi lapidi nomenclatu-  
ram inditam dicunt. Ego tamen cum fluuium non uidi, tamen si parua nauicula totius Lynciæ litora legerim, quò uide-  
licet, quæ in ea sunt, inspicerem. Crustaceos uerò lapides nigros, & qui in ignem additi exilem flammam ederent,  
complures Cœle Syria affortauit, natos in colle, mari mortuo, quod uocant circumdato, quæ orientem spectat, ubi &  
bitumen est: eratq; lapidum odor similis bitumini. Vtebarq; eis ad flatuosos tumores in genu diuturnos, & egre cu-  
rabiles, mistis uidelicet facultatibus, quæ ad hoc symptoma probatæ fuerant. Planèq; uisum est mihi euidentem ea-  
rum facultatem reddidisse. Miscui uerò ipsam & Barbaro quam uocant, & palam medicamentum effectum est exi-  
cantius, adeo ut & sinus contraheret, nedum cruenta uulnera glutinaret, ad quæ competere maxime creditur. hæ-

Gagatæ histo-  
ria, & vires ex  
Galeno.

Plinij lapsus.

Athenus Galenus. Ceterum Plinius lib. xxxvi. cap. xix. existimasse deprehenditur, quod quemadmodum in medica-  
mentis sibi uiribus mutuis respondent Thracius lapis, & Gagates; ita uterque in aqua demersus accendatur, &  
conflagret, restinguatur uerò in oleo. Quod tamen falsum est: quandoquidem Dioscorides ubi memorie prodidisset  
Thracium lapidem iisdem uiribus esse præditum, quibus & Gagates; subdidit Thracio illud peculiare adscribi, quod  
aqua demersus accendatur, & oleo restinguatur. quod tamen in Gagatæ non accidit. Vim Gagatæ admirandam ef-  
se Aëtius testis est libro 11. capite xxiii. quippe si igne inflammetur, meroq; restinguatur, exhibeturq; id uinum  
cardiacis potandum, confestim leuantur, represso sudore, excitatoq; articularum pulsu. Nonnulli Gagaten ad polli-  
nis tenuitatem terunt, septemq; continuis diebus colicis è uino propinant drachmæ unius pondere, & integram resti-  
tuunt ualitudinem: poculum interim, quo laborantes bibunt, eiusdem uapore sufficientes. Sed quoniam Gagates ob  
quandam nominis similitudinem, lapidem **ACHATEN** ita ueteribus appellatum, mihi in mentem redegit, cum is  
laudetur ad uaria humani corporis incommoda, meritò hic aliquid de eo nobis dicendum esse duximus. Repertus pri-  
mum Achates est in Sicilia, iuxta Achaten fluuium, à quo nomen sibi uendicauit. Lapis hic uarijs constat coloribus,  
& se inuicem incurfantibus zonis, lineisq; adeo ut quandoque uarias effingant imaginum formas, naturæ tantum  
penicillo

Achatæ lapi-  
dis historia, &  
vires.



penicillo. Id quod maxime testatur Plinius libro XXXV. capite primo, ubi sic habet. Post hunc anulum regia fama est gemmæ Pyrrhi illius, qui aduersus Romanos bellum gessit. Nanque habuisse traditur Achaten, in qua nouem Musæ, et Apollo citibaram tenens spectarentur, non arte, sed sponte naturæ, ita discurrentibus maculis, ut Musis quoque singulis sua redderentur insignia. Hinc igitur creditum est antiquos uocasse Achaten uarijs, ac diuersis nominibus. Vocatur enim phassachates, cerachates, dendrachates, leucachates, hemachates, corallachates, et id genus alijs, quod quidam columbos, quidam cornua, alij arbores, alij sanguinem, nonnulli corallium coloribus præ se ferant: Prodest Achates (ut Plinius est author) contra scorpionum ictus. Quod in Siculis utique crediderim, quoniam primum eius prouinciæ afflatu scorpionum pestis extinguitur. Et in India inuenti contra eadem pollent, et alijs magnis miraculis. Spectasse etiam prodest oculis. Sitim quoque sedant in os additi. Leoninæ pelli similes, potentiam ceteris ualidiorem habere contra scorpiones dicuntur. In Persis uero suffitu, earum tempestates auerti, et præterea flumina sisti. Argumentum esse, si in feruentes cortinas additi, refrigerent. Sed ut profint, leoninis iubis alligandos. Abominantur byænæ pelli similes, quod donibus discordiales sint. Sed qui unico tantum colore notatur, inactos abletas reddit. hætenus Plinius.

Λίθος θρακίας. LAPIS THRACIVS. CAP. CIIII.

LAPIS Thracias dictus, nascitur in flumine quodam Scythiæ, cui Ponto nomen est. Vis ei gagatæ. Traditur aqua accendi, & oleo restingui: quod in bitumine accidit.

QUI THRACIVM lapidem ostenderet in Italia, hætenus profecto neminem inueni: nec qui illum alijs in regionibus se uidisse, aut inuenisse testetur, compertum habeo. Eius mentionem fecit Galenus una cum gagate libro nono de simplicium medicamentorum facultatibus, ubi ita scribit. Est et alius lapis, cuius meminit Nicander hunc in modum.

Thracij lapidis mentio ex Galeno.

Si lapis iratur candenti Thracius igne, et  
Post madesiat aqua, flagrat totus: at idem  
Mox oleo affuso, penitus restinguitur, adferet  
Thracius hunc ad nos pastor de flumine, nomen  
Cui Pontus.

Verum nullus eius in medicina usus: neque Nicander præter graueolentiam, quæ suffitu feras fugat, quicquam ei adscripsit. hæc Galenus. Ceterum nos Thracij lapidis historiam potius fabulosam, quam ueram censemus.

Λίθος μαγνητική. LAPIS MAGNES. CAP. CV.

MAGNES lapis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad cæruleum vergente, densus, nec admodum grauis. Datur cum aqua mulsæ trium obolorum pondere, ut crassos humores eliciat. Sunt qui magnetem crematum pro hæmatite vendant.

MAGNES lapis Heraclius, et Sideritis quoque dicitur. Magnēs quidem ab inuentore (ut Nicander est author) nomine Magno, qui primus in Ida monte lapidem hunc adinuenit: aut à Magnesia regione, ut Lucretius suis in poematibus scribit. Heraclius uero, uel ab Heraclia urbe, uel ab Hercule: ut enim Hercules immanes domuit beluas, uiribusque subegit; ita Magnes ferrum uicttricem rerum materiam ad se trahens, subigit, et tenet. Quas ob uires Sideritis quoque dicitur. quippe ferrum Græcis σίδηρος appellatur. Nos autem uulgari idiomate appellamus Pietra Calamita. Foditur in Cantabria Hispaniæ, et in uarijs Germaniæ, ac Boemiæ locis, etsi sæpe casu inueniatur in ferri fodinis. Præstat, qui ex Macedonia, et Magnesia illi contermina conuehitur: sed omnium præstantissimus est indicus, et Aethiopicus. Differunt Magnetes colore, qui in ijs aut niger est, aut cæruleus nigricans, aut in nigro rufus, aut contrā. Optimus est mas, qui non modo celerrimè trahit ferrum; sed etiam uim suam in id adeo transfundit, ut possit alterum inherens ferrum ad se trahere. quo fit, ut sæpius acus acum trahat, adeo ut altera alteri subpendeat, nullis appositis adminiculis, ad duodenum usque numerum. Quod item ferreis fit anulis, qui alter alteri inherentes catenæ instar dependent. tametsi postremus non tam pertinaciter inhereat, uti primus, et secundus. Ratio autem cur Magneti tantum facultas insit trahendi ferrum, nulli sanè, quod sciam, adhuc comperta est, nec ulla eam philosophorum inuestigatio unquam assequi potuit. Proinde necessarium fuerit dicere, illi uim hanc peculiarem tribuisse cælum, et rerum omnium parentem naturam, ut Rhabarbaro uim detrahendi bilem, et Torpedini marinæ stupidam reddendi manum, quæ ipsam uiuentem tetigerit. Nec sanè aliud quicquam inueniri putauerim, quod uiribus Magnetem magis emuletur, quam Torpedo piscis. Quandoquidem ut Magnetis admiranda facultas ex una pendente acu in aliam transit acum, et ex anulo in anulum; idem similiter efficit Torpedinis uirtus. Quippe hamo capta, obstupesciens eius facultas adeo confestim per setas uirgamque excurrit, ut statim piscatoris manum miro sanè stupore corripiat. Idemque efficit retibus comprehensa, ut per finem auræ instar excurrente. Ceterum Dinocrates Alexandrinus (Plinius author est libro XXXIII. capite XIII.) Arsinoës de Magnete lapide templum conconerare inchoauerat, ut in eo simulacrum eius è ferro pendere in aère uideretur. Cuius forsitan rationem secuti Arabes, Turcarumque sacerdotes (si tamen uera referunt, qui talia scribunt) Mahumeti sacellum è præstantissimo Magnete con-

Magnetis lapidis historia.

canerari

Theamedes  
lapis.

Magnetis uis  
ex Galeno.

cauerari iusserunt, ut imposita in eo Mahumeti arca è purissimo ferro conflata, tanquam diuino quodam miraculo in aëre penderet, ita deceptis populis. Trahit itaque magnes propria ui ferrum, excepto eo, quod rubiginem contraxerit, uel ubi lapis is alio fuerit confricatus, aut ubi adamas propè adferatur. Magneti uim sanè contrariam habet Theamedes lapis in Aethiopia montibus nascens, non procul à monte magnetis: quippe quòd appositum sibi ferrum confestim abigat respuatq;. Quo fit, ut qui calceis ferreis per magnetis montem pergunt, pedes submouere nequeant: per alium uerò ambulantes, nunquam pedibus consistant, & ueluti tripudiantes fiant. Magnetis breuiter meminit Galenus libro ix. simplicium medicamentorum, sic inquit. Ex lapidibus unus est & magnites, & heraclea, quam uocant, adsimilem hematitæ uim obtinens.

*Arab. ابيض* LAPIS ARABICVS. CAP. CVL. 10

ARABICVS lapis maculoso ebori similis. Is tritus illitus hæmorrhoidas exiccat. Eius cinis dentificio optimus.

NULLVM hætenus uidi, nec reperi lapidem, qui eburneam mihi ostenderit faciem. quapropter non crediderim Arabicum lapidem hoc tempore conuehi in Italiam.

*Arab. γαλακτίτης* LAPIS GALACTITES. CAP. CVII.

GALACTITES appellatur, quod lacteum succum refudet: cinerei tamen est coloris, & gustu dulcis. Ad oculorum fluxiones, & ulcera conuenienter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pyxide plumbea recondere, propter uim glutini, quod ei obhæret.

*Arab. μελίτης* LAPIS MELITITES. CAP. CVIII.

MELITITES omnia galactitæ similis, hoc tantum interest, quòd dulciorem succum remittit. Eiusdem ut galactites effectus.

Galactitæ, &  
melinitæ histo-  
ria.

GALACTITEN, item Melititen qui mihi ostenderet, hætenus non reperi. Alter tamen (ut Galenus inquit libro nono simplicium medicamentorum) Galactites uocatur, quòd in succum solutus lactis speciem reddat. quem admodum alter melitites, quòd succi dulcedine mel gustu representet. Galactitæ meminit Plinius libro xxxvii. capite xii. sic inquit. Galactites ex uno colore lactis est. Eandem dicunt leucam, & leucographiam appellant, & synnephiten: tritam lactis succo, & sapore notabilem. In educatione nutricibus lactis fecunditatem: infantium quoque adalligata collo, saluam facere dicitur: in ore autem liquefcere. Eandem memoriam adimere dicunt. Mittit eam & Achelous annis. hæc Plinius. Ceterum, ut testatur Agricola, non solum reperitur Galactites in quibusdam Saxonie montibus, in Germania; sed etiam in quorundam fluminum aluicis, pariterq; Melitites.

*Arab. پورقوس* LAPIS MOROCHTHVS. CAP. CIX.

MOROCHTHVS lapis, quem aliqui galaxiam, aut leucographida uocauerunt, in Aegypto nascitur. quo, utpote molli, & facile liquefcente, linteones dealbandis uestibus utuntur. Spiracula corporis obstruere uidetur: conueniens ijs, qui sanguinem expuunt, cœliacis, & uescæ doloribus, cum aqua potus. itidem fluxionibus vuluæ, & impositus uelleri. Mollibus oculorum collyrijs miscetur: explet enim caua, atque delacrymationes fistit. Idem cerato exceptus, ulcera, quæ fiunt in teneris partibus corporis, ad cicatricem perducit.

Morochthila-  
pidis uires ex  
Galeno.

MOROCHTHVM lapidem nonnullis galaxiam uocatum nasci, fodiq; in Saxonia Germaniæ testis est Georgius Agricola maximus fossilium indagator. Veruntamen cum nec inde, nec ex Aegypto, quod sciam, in Italiam deferatur, cur plura de eo dicam, non habeo. Morochthi meminit Galenus una cum scissili lapide libro nono de simplicium medicamentorum facultatibus, sic inquit. Sunt & alij lapides in succum solubiles, ut qui in Aegypto nascitur, quo utuntur ad splendorem linteis conciliandum. Est autem omnium dictorum minimè qualitatis particeps, nec adstrictionem, nec morsum, nec abstersionem præ se ferens. quocirca hoc ipsum duntaxat lapidi huic inest, quòd deficit uidelicet: proinde cerato eum miscentes ad cicatricem ulceribus inducendam in mollibus corporibus usurpant. Sed & ocularibus miscetur facultatibus, perinde ut modò dicti. At quantò est maiore emolliendi ui, quam prædicti, quòd nullam uidelicet effectricem qualitatem habeat, tantò etiam moderatior est, magisq; dolorem leuat. Hunc lapidem quidam moroxum, nonnulli leucographida nuncupant. hætenus Galenus. Sed certè nescio qua ratione, aut auctoritate ductus sibi persuaferit Plinius libro xxvii. cap. ii. hunc non esse lapidem, sed herbam, ubi una cum leuca de leucographide differuit. nisi fortasse fuerit uocabulorum similitudine deceptus.

*Alabastrites*  
 Λίθος ἀλαβαστρίτης. LAPIS ALABASTRITES. CAP. CX.

ALABASTRITES uocatus onyx, crematus, refina aut pice exceptus, duritias discutit. stomachi dolores cum cerato leuat: gingiuas comprimit.

ALABASTRITES notissimus lapis est ijs, qui Romana inuaserunt aedificia. Hallucinantur tamen, qui credunt lapidem illum Alabastritem esse, e quo hac tempestate torno uaria finguntur uasa, quibusdam subnigricantibus uenis discurrentibus, pellucido laeuore, materie uero adeo imbecilli, ut parum collisa facile frangantur. Quandoquidem lapis hic Alabastritis species non est, sed potius gypsi materia. Alabastrites enim, quem antiqui ad uasa unguentaria ce-  
 30 uabant, quo diutius unguenta à rancore uindicarent, nascitur (ut Plinius inquit lib. xxxvi. cap. viii.) circa Thebas Aegyptias, et Damascus Syriae. Hic ceteris candidior. Probatissimus uero in Carmania, mox in India, iampridem et in Syria, Asiaq. Vilissimus autem, et sine ullo nitore in Cappadocia. Probantur quam maxime mellei coloris in uertice maculosi. haec Plinius. Huius facultates memoriae prodidit Galenus libro nono simplicium medicamentorum, sic inquit. Et alabastrites uocatus unguis in medicinae usum ingreditur combustus. Quidam eum bibendum dant stomachicis.

Alabastrites  
 consider.

Alabastrites ui  
 res ex Gal.

Λίθος θυίτης. LAPIS THYITES. CAP. CXI.

LAPIS nomine thyites, in Aethiopia gignitur, subuiridi colore iaspidem imitatus: cum di-  
 20 luitur tamen, lacteum succum reddit. Vehementer mordet: tenebras, quae pupillis obuersantur, expurgat.

THYITEN lapidem neq. ipse hactenus inueni, neq. ab alio compertum scio. Qui fortasse ex Aethiopia tantum petendus est, ubi eum gigni prodidit Dioscorides.

*Iudaicus*  
 Λίθος Ἰουδαϊκός. LAPIS IUDAEICVS. CAP. CXII.

IUDAEICVS lapis in Iudaea nascitur, glandis effigie, candidus, scita admodum configuratione, lineis aequaliter inter se distantibus, quasi industria detornatis. Solutus nullam qualitatem manifestam gustui repraesentat. Potest cicoris magnitudine tritus ad cotem, ut collyrium, cum calidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati urinæ auxiliari, & calculos in uesica comminuere.

LAPIS e Iudaea allatus, unde et illi nomen, passim in officinis habetur. Utuntur eo medici non modo ad uesicae calculos; sed etiam ad eos, qui in renibus sunt, Galenum secuti, qui libro nono de simplicium medicamentorum facultatibus, eius faciem ac uires descripsit, his uerbis. Est et alius lapis uiribus ualentioribus in Palestina Syria proueniens, colore candido, specie concinna, lineas habens ceu torno ductas. Appellat eum à loco, in quo nasci consueuit, Iudaicum, utunturq. ad uesicae lapides in cote soluentes, et ex aqua calida tribus cyathis potui praebentes. Sanè in quibus nos experti sumus, profecit nihil, quod ad lapides uesicae pertinet: uerum ad eos, qui in renibus haerent, efficax est.

Lapidis Iudaei  
 ci uires ex Galeno.

*Amiantus*  
 Λίθος ἀμιάνθος. LAPIS AMIANTVS. CAP. CXIII.

AMIANTVS lapis in Cypro nascitur, scisso alumini similis. quo, utpote flexili, telas & uela tantum spectaculi gratia texunt, quae ignibus iniecta ardent quidem, sed flammis inuicta splendoriora exeunt.

LAPIDEM Amiantum (ut in alumine retulimus) officinae ac medici Alumen plumeum uocant, id esse existimantes, quod Graecis scissile dicitur. Sed, meo quidem iudicio, falluntur, cum plumeum alumen ijs uocatum nulla adstringenti ui polleat, sed acri, nec in ignem coniectum comburatur, quod Amianti est proprium. In hac uulgari opinione, ego quoq. una cum plerisque rei metallicae studiosis iampridem uersatus sum, donec clarissimus medicus Lucas Gbinus legitimum alumen scissile Pisis ad me misit, facie adeo Amianto simile, ut nisi adstrictoria uis, qua pollet, ipsam ab Amianto plurimum differre gustui indicasset, alterum sanè ab altero discernere nesciuissem. Nihilominus et ex eo discrimen cognoscitur, quod hoc in ignem proiectum statim exurit, ille uero nequaquam. Hinc itaq. fit, ut haud dubie credendum sit Alumen plumeum uocatum legitimum esse Amiantum. Ceterum non desunt impostores (ut autor est Brasauolus Ferrariensis) qui lapidem Amiantum simplicibus mulierculis ostendant, uendantq. se penumero pro ligno Crucis Seruatoris nostri. Id quod facile credunt, cum igne non comburatur, quodq. ligni modo plurimis constet lmeis intercurrentibus. Meminit Amianti Plinius libro xxxvi. cap. xix. ubi sic inquit. Amiantus alumini similis nihil igni deperdit. Hic ueneficijs resistit omnibus, priuatim magorum.

Amianti lapidis  
 confid.

Fraus impostorum.

*Sapphirin*  
 Λίδος σάπφειρος. LAPIS SAPPHIRVS. CAP. CXIII.

SAPPHIRVS lapis percussis à scorpione, potu prodesse existimatur. Contra intestinas exulcerationes bibitur. Excrecentia in oculis, vusq; & pustulas inhibet, & ruptas membranas cogit.

Sapphiri consideratio.

SAPPHIRVS gemma colore constat cyaneo, perquam translucido. Lapis est omnibus notus, quod anulis, & torquibus, quæ collo gestantur, frequenter inferatur. Plinius Sapphiros aureis punctis collucere scribit libro XXXVII. cap. IX. Veruntamen hac ætate nullum hæcenus uidi Sapphirum, qui aureis colluceret scintillis, sed colore tantum cyaneo, adamantis modo translucido. Quo fit, ut putandum sit aut nostri usus sapphiros esse cyanos gemmas sapphiri æmulas: aut hac in re errasse Plinium satendum, quod fortasse coeruleum lapidem peculiariter uocatum, quæ Mauritanii azulum, uel lazulum dicunt, pro Sapphiro acceperit. Nam nullus præter hunc inter gemmas aureis emicat scintillis. Sapphiri uires perquam breuiter perstrinxit Galenus, cum tantum ad scorpionum ictus haustum prodesse scripserit. Ceterum adduntur hoc tempore in medicamenta ad cor facientia, & in antidota, quæ aduersus uenena, & pestiferos affectus parantur, non modo sapphiri, sed smaragdi, carbunculi, granati, sardonij, hyacinthij: tametsi præter medicorum spem, potantes plerumq; fallant, quod rare admodum sint seplasia, quæ huiusmodi gemmas agnoscant, & legitimas habeant. Caueant itaq; medici, ne decipiantur. Idem fiet, si ubi ijs opus fuerit, peritissimos probatæq; fidei consuluerint gemmarios. quippe gemmarum ramenta, quæ in seplasijs habentur, adulterijs, & imposturis non uacant. Adde, quod plerumq; alterum alterius uice supponunt. Putant enim chrysopaios aureo colore nitentes hyacinthos esse, qui tamen anethystum colore referunt. Præterea obseruandum est, ut gemmarum ramenta, siquæ legitima, præclaræq; inueniuntur, quin & margaritæ, & corallia super lapide porphyrite tandem atterantur, usque dum redigantur in puluerem tenuissimi pollinis instar. Et sanè aduertant medici, quibus curæ est, ut plus honoris, quam auri lucrentur, ne corallia in æneis mortarijs, conterantur. Nam si id inconsulte fiat, derasis delictisq; æneis mortarijs, ferreisq; pistillis, æris, & ferri scobs corallijs admista, noxium & uenensum reddet medicamentum, magna ægrotantium iactura. Quandoquidem uidi ego sæpius mulierculas, quæ corallia & margaritas in æneis mortarijs contriuerunt, & subinde suis ægrotantibus propinarunt, qui ijs degustatis in maximum deducti sunt discrimen. *Lapis sapphirinus*

Cautiones quedam.

Λίδος μεμφίτης. LAPIS MEMPHITES. CAP. CXV.

MEMPHITES in Aegypto iuxta Memphin inuenitur; calculorum magnitudine, pinguis, uerficolor. Tradunt trito, & illito, quæ urenda, aut secanda sunt, sine periculo obstupescere, ita ut non sentiant cruciatum.

*Memphitis*

Λίδος σελενίτης. LAPIS SELENITES. CAP. CXVI.

SELENITES lapis, quem aliqui aphroselenon appellarunt, quoniam noctu inuenitur lunæ imaginem reddere, quæ cum ea quidem augetur, & decrescit. Nascitur in Arabia, candidus, translucens, leuis. Huius ramenta comitialibus in potu dari iubent. Eo ceu gestamine ad amuleta mulieres utuntur. Arborea adalligato eodem frugifera redduntur.

Memphitis, & Selenitis consideratio.

MEMPHITES lapis hodie, quod sciam, ad nos ex Aegypto non adfertur, tametsi uulnerarijs medicis sæpius sine desideretur, ubi integra partium sectio sit opus. Seleniten uerò etsi antea non uideram; emi tamen hoc anno à peregrino quodam, qui è Galitia Hispaniæ, ubi diui Iacobi templum inuaserat, in patriam reuertebatur. Hic lapis utri modo translucet, & facile in tenues finditur laminas. quo fit, ut ijs in locis, ubi frequentissimus habetur, utri uices expleat, ad concludendas ædificiorum fenestras. Quidam, quod speculi imaginem reddat, Specularem lapidem uocant. Ceterum quoniam hic translucidus lapis Crystallum nobis in mentem redegit, cum expetatur id sæpius in medicum usum; silentio inuoluendum non duximus. CRYSTALLVM itaq; (ut Plinius inquit libro XXXVII. cap. XI.) gelu uehementiore concrescit, nec aliubi certè reperitur, quam ubi maximè hybernæ niues rigent, glaciemq; esse certum est, unde & nomen Græci dedere. Hæc Plinii de crystallo sententia. Nos uerò contrà rationibus non obscuris innixi (quod etiam peritissimus Agricola sentit) Crystallum censemus nec glacie, nec niue fieri unquam: sed eo ipso humore, quo in terræ uisceribus gignitur beryllus, adamas, & alij id genus lapides. Gigni autem crystallum ex humore omnium purissimo sanè constat, quod omnium gemmarum clarissimum, translucidissimumq; sit. Probatum sic gigni, non autem (ut Plinius inquit) ex glacie, uel niue: quoniam unaquæq; glacies quantumuis longo tempore concreta in algidissimis montibus, à quibus nec hyeme, nec æstate nix unquam recedit, etiam si è profundis partibus eruatur, liquefcit tamen in calidis locis reposita, non modo ignis, sed solis etiam calore. Namq; id ipsum Crystallo eueniret, igni uel solibus admoto, si è niue aut glacie concrefceret: reperireturq; tantum in montibus perpetuo uiuosis. Verum enim uero cum reperitur etiam in marmorum, aliorumq; lapidum, & metallorum fodinis in Hispania, Germania, Scythia, Cypro, Carmania, & in Nerone, & Chiti rubri maris insulis, quin et in agris, ubi seges feritur, ubi aratro sæpius magnas crystalli glebas fodere bubulci, liquidò sanè constabit, ex alia materia gigni crystallum, quam glacie. Siquidem id, quod in præruptis montium scopulis inuenitur, superficie tenuis coherens, ex purissimo lapidefciente humore in uisceribus terræ concrefcere non dubitauerim: quod tamen tractu temporis à pluuiarum impetu, que

Crystalli historia.

Plinii sententia explosa.

que in præruptis montium universam deradunt terram, denudari crediderim. Quapropter non temerè dixit Plinius, liquidò se affirmare posse in cauitibus alpium nasci adeò inuajs, ut plerunque fune pendentes id extrahant homines. Huic alia accedit ratio, quòd glacies per aquas innatet, crystallum uerò illico subfidit. Præstantissimum illud existimant, quod album et aquæ clarissimè modo pellucidum uisitur. Vis crystallo ascribitur: proinde datur in puluerem tenuissimum tritum utiliter dysentericis ex uino austero. Alba uteri profluvia sistit, lac uerò nutritibus augeat. quod à Tridentinis mulieribus didicimus. Fiebat quondam antiquis è Crystallo pila, qua aduersis solis radijs exposita medici corpora urebant, igne inde concitato. Sed ijs tantum id cauterij genus admovebant, qui candente ferro perterriti curari reformidabant. Sed et nos huiusce cauterij periculum fecimus, non siue egrotantium, et astantium admiratione.

Cryſtalli ui-  
res.

**Lapis Iaspis.** CAP. CXVII.

**I**ASPIDVM quædam smaragdum imitatur: alia crystallum, colore similis pituitæ: alia non dissimilis aëri, ob id uocatur aërizufa: alia ueluti fumo infecta, quæ capnias ex argumento uocatur. quædam lineis albis resplendentibus præcingitur, Assyrios appellata. alia terebinthinæ similis, quæ terebinthizufa dicitur. alia colore callaida gemmam æmulatur. Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partium femoribus appensæ. *IASPIDVM* *ASPIDVM* *ASPIDVM*

10 . IASPIDUM genera longe plura recensentur, quàm quæ à Dioscoride describuntur. Quandoquidem. quædam uisitur cœruleo cōpioso, aut glauco pingui similis, id est uiridis lacte suffusa. Alia purpurea, qualis nascitur in Phrygia. Alia rosca, et quasi floribus tineta, qualis in Ida monte profundissimis specubus foditur. Alia ex purpura cœrulea, qualis inuenitur in Cappadocia. Alia ex rubro nigra. Alia iecoris imitatur colorem, quæ si saturatiore colore reperiatur, lineis eiusdem coloris diluti, et nigri cingi solet. Quædam niuem imitata rutilis punctis respergitur. Quædam onyche pungitur, aut ex altera parte iaspis est, ex altera onyx; proinde iaspionyx uocata. Alia cuius altera parte sit purpurea, altera uiridis, nec utrinque pellucens, sed qua parte uirescit. In summa uaria est iaspidium natura. Suspensas ad plura ualere aiunt, nempe ad omnem sanguinis fluorem, ad protegendum conceptum, et partum inuandum, ueneremque, inbibendam, et febrem, et hydropem fugandam. Nec desunt superstitiosi, qui dicant Iaspides homines reddere gratos, potentes, ac tutos, si quibusdam magicis uerbis admurmurentur, priusquam suspendantur.

Aspidum ge-  
nera plura, &  
vires.

30. *Lapis aetites. Lapis aetites. Schynstein* CAP. CXVIII.

**Asteres** lapis est ueluti prægñans, cùm quatitur, alio in utero sonante. Grauidis continet partus; cùm lubricæ sunt vuluæ, & parum tenaces, sinistro brachio adalligatus: sed parturientibus è brachio amouetur, & feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant. Furem deprehendit, si quis in pane conditum offerat: fur enim mansum deuorare non poterit. Quinetiam concoctus furem coarguit: quippe decocta cum eo deuorare non poterit. Tritus, & cerato exceptus, cypri-  
no, aut glucino, aut alio excalfaciente, comitiales magnificè iuuat.

40 **AETITEN** *Græci, Latini Aquilæ lapidem dicunt, quod aliquando in earum reperiatur nidis. Variat lapis hic tum colore, tum magnitudine. Meminit huius Plinius libro xxxvi. cap. xi. his uerbis. Aëtite lapides ex argumeto nominiis magham samam habent. Reperiuntur in nidis aquilarum, sicuti in decimo uolumine diximus. Aiunt binos inueniri, marem, et feminam: nec sine ijs parere, quas diximus aquilas, et ideo binos tantum. Genera eorum quatuor. In Aphrica nascentem; pusillam, et mollem intra se, ac uelut in aluo habentem argillam suauem, candidam: ipsum friabilem, quem femineæ sexus putant. Marem autem, qui in Arabia nascitur, durum, gallo similem, aut subtilum, in aluo habentem durum lapidem. Tercius in Cypro inuenitur, colore illis in Aphrica nascentibus similis, amplior tamen, atq; dilatatus ceteris enim globosa facies. Habet in aluo arenam iucundam, et lapillos: ipse tamen mollis, ut etiam digitis frietur. Quarti generis Taphiusus appellatur, nascens iuxta Leucadem in Taphiussa, qui locus est dextra navigantibus ex hac ad Leucadem. Inuenitur in fluminibus candidus, et rotundus. Huic est in aluo lapis, qui uocatur callimus, nec quicquam tenerius. Hactenus de aquilinis lapidibus Plinius.*

Aënte lapi-  
dis historia,  
& uires.

Λίθος ὀφίτης. LAPIS OPHITES. *Natrum stann.* CAP. CXIX.

**OPHITAE** genera multa. quidam ponderosus, & niger. alter cinereo colore spectatur, punctis distinctus. tertius lineis quibusdam candidis intercinctus est. Omnes alligati contra capitis dolores, & serpentium ictus profunt. Feruntur, qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus auxiliari.

OPHITAE lapidis meminit Plinius libro xxxvi. cap. vii. sic inquit. Ex ophite columnæ, sed parvæ admodum inveniuntur. Duo eius genera, molle candidum, nigricans durum. Dicuntur ambo capitis dolores sedare adalligati, et serpentium ictus. Quidam phreneticis, ac lethargicis adalligari iubent candicantem. Contra serpentes autem

Ophire lapidis historia.



Ophites marmor.

autem à quibusdam laudatur, præcipue ex his quem tephrian appellant à colore cineris. hæc Plinius. Verum Ophites marmor, quod uulgo uocamus Serpentino, porphyritæ ferè lapidis instar durissimus est, colore minime nigricante, nec candido, nec cinereo, ut in suo requirunt Dioscorides, & Plinius, sed uiridi saturato dilutis eiusdem coloris maculis resperso. Ex quo sanè constat antiquorum Ophiten à nostrate maxime fuisse diuersum.

Λίθοι ἐν τοῖς σπῳγγαῖς. LAPIDES IN SPONGIIS. CAP. CXX.

LAPIDES in spongijs inueniuntur, qui uesicæ calculos rumpunt, in uino poti.

Lapidū spongiarum uires ex Galeno.

LAPIDES in spongijs reperti, omnibus notissimi sunt: quippe quòd rarissime sint spongiæ, quæ bisce lapidibus uacent. Horum uires retulit Galenus libro nono simplicium medicamentorum, his uerbis. Lapidès, qui repertiuntur in spongijs, frangendi uim obtinent, non tamen ita ualidam, ut lapidem in uesica comminuant, unde qui id scriptum reliquerunt, mentiti sunt: uerum qui in renibus consistunt rumpunt, uelut qui ex Cappadocia conuehiuntur, quos in Argeo nasci aiunt. Soluuntur autem hi in succum colore lacteum, ex quo liquet, quòd extenuandi uim obtinent, absque ut insigniter exars faciant.

Λιθοκόλλα. LITHOCOLLA. CAP. CXXI.

LITHOCOLLA glutinum, quo lapides coniunguntur. conflatur autem ex marmore, lapide Pario, & taurino glutine. Potest candente specillo admotum, incòmodos oculis pilos replicare.

Λίθος ὀστρακίτης. LAPIS OSTRACITES. CAP. CXXII.

OSTRACITES testæ similitudinem habet, crustosus, & in lāminas fissilis. quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumice utuntur. Menfes drachmæ pondere potus ex uino ficit. Si quatuor diebus à purgatione bibatur sicilici pondere, foeminis præstat ne concipiant. Cum melle autem impositus, mammarum inflammationes lenit, & nomas cohibet.

Ostracitæ lapidis confid. & uires.

OSTRACITEN lapidem, quo pumicis uice usa est antiquitas, hæcenus mihi uidere non licuit, quanquam reperiri hunc in Hildesheimio circa antrum à nanis appellatum, colore subrugeo, & ostracorum testis similem, libro quinto de natura fossilium scribit Agricola. Eius uires tradidit Galenus lib. nono simplicium medicamentorum, sic inquit. Porro ostraciten uocatam lapidem prædicare quosdam audio, quasi desiccandi ualenter facultatem obtineat, temperatam ex adstrictione, & acrimonia, uelut & Geoden nomine, pupillas expurgare, & uerberum testiumque phlegmonas sanare, ex aqua uidelicet inunctum.

Σμύρις λίθος. SMYRIS LAPIS. CAP. CXXIII.

SMYRIS lapis est, quo anularij scalptores lapides expurgant, ad erodendum, & urendum utilis: gingiuis, quas humor uexat, prodest: dentifricio commendatur.

Ἀμμος αἰγιαλίτης. ARENA LITORALIS. CAP. CXXIII.

ARENA è litoribus sole feruefacta, hydropicorum tumores exugit, si capite tenus in ea obruantur. Torreris solet ad aridos fatus, pro milio aut sale.

Smyridis confid. & uires ex Galeno.

SMYRIS uulgo nobis Smeriglio, notissimus est lapis, præsertim quòd eius puluere expoliantur gemmæ, & armorum omne genus. Vitrum quoque Smyride lapide finditur, quemadmodum & adamante, tanta inest ei durities. Huius uires Galeno libro nono simplicium medicamentorum, his uerbis describuntur. Sed & Smyris uocata, quòd multum abstergentem habeat facultatem, clarum est uel ex eo quòd dactylioglyphi, hoc est, qui anulos exculpunt, eum in usum illo utantur. Quinetiam quòd dentes puros efficiat, experti sumus.

Ἀκόνιον νάξια. LAPIS NAXIUS. CAP. CXXV.

ECOTE Naxia, quod exacuendo ferro deteritur, illitum alopecias ad pilum reducit. uirginum mammas cohibet, nec incrementum patitur. Potum ex aceto lienem absumit, & comitialibus prodest.

Λίδος γεώδης. LAPIS GEODES.

LINO 2 CAP. CXXVI.

GEODES lapis adstringit, siccāt, caligines oculorum discutit. Illitus autem ex aqua testium, mammarumque inflammationes sedat.

NAXIVM lapidem, itemq; Geoden, nullus est, quod equidem sciam, qui hodie cognoscat ostendatq; in Italia, uel ibi inuentos, uel aliunde allatos: tamen si in Misnia, & Saxonia nasci hos scribat Agricola. Naxius autem, Galeni testimonio, non solum uirginibus mammarum incrementum prohibet; sed & pueris testes crescere non patitur, tanquam uidelicet particeps facultatis refrigeratoriæ.

Γῆ πᾶσα. TERRA OMNIS.

CAP. CXXVII.

OMNIS terra, ad medendi usum recepta, summam & primam uim habet refrigerandi, meatisque obducendi, occludendiq;: sed specie distat, cum alia adiunctis quibusdā ad alia sit utilis.

Γῆ ἐρετρία. TERRA ERETRIA. CAP. CXXVIII.

ERETRIADES duæ sunt, una uehementer alba est, altera cinericia. Optima habetur ad cinereum colorem uergens, perquam mollis, quæ si per æramenta tractim ducatur, lineam uiolaceam refert. Lauatur, ut cerussa, aut hunc in modum. Teritur seorsum, & cum aqua, & ubi pessum ierit, humor leuiter excolatur: siccata solibus, iterum teritur interdum, adiecta aqua, ut uespere confidat: antelucanis colo excernitur, & demum in sole trita, si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desideretur, pastilli magnitudine ciceris in fictile perforatum coniiciuntur, oreque uasis diligenter obturato, supra carbones candentes continenter folliis perflantur: ubi uerò cinis in fauillas se conuertit, aut aereum colorem contraxit, exempti reconduntur. Vim habet adstringentem, & refrigeratorem, leuiter mollientem: caua explet, & sanguinolenta conglutinat.

Γῆ σάμια. TERRA SAMIA.

CAP. CXXIX.

SAMIA præfertur candida, leuis, tangenti linguæ glutinis modo adhærescens, mollis, succosa, friabilis: cuiusmodi est, quam aliqui collyrion uocant. Duæ enim species eius: vnam antè diximus: altera aster appellatur, crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur, ac lauatur, ut eretria, uimque consimilem habet. Sanguinis reiectiones sistit: sceminis fluxione vuluæ laborantibus, cum flore syluestris punice datur. Testium, & mammarum inflammationes, illita ex rosaceo, & aqua, refrigerat: sudores arcet. contra serpentium morsus, & uenena pota ex aqua auxiliatur.

Λίδος σάμιος. LAPIS SAMIUS.

CAP. CXXX.

SAMIUS lapis in Samia terra inuenitur, quo aurifices utuntur poliendo auro, ut resplendeat. Probat candore, & duritia. Vis ei adstrictoria, & refrigerans. prodest stomachicis potus. sensus hebetat: verum ad fluxiones oculorum, & ulcera, cum lacte efficax est. Partus, ut tradunt, adligatus accelerat, & conceptus sceminarum custodit.

TERRA, quam Samiam uocant, an ex Samo deferatur in Italiam, non equidem ausim affirmare: tamen si hæc usum in medicina maximum præstiterit Galeni tempore, qui ea, quæ aster appellatur, tanquam præstantiore semper usus est: huic tamen Dioscoridi præfertur illa, quam aliqui collyrion uocant. Sunt qui putent Samium astra illum esse lapidem, quem seplasia Talchum nominant. Sed ij, meo quidem iudicio, hallucinantur. quandoquidem Talchus linguæ contactu nunquam glutinis modo adheret, attritu contumax est, nec cotis instar prædurus uisitur. Adde quod Talchus non sit crustosus, sed squamosus, translucidus, ut uitrum, ac leuis: & quod non nisi magno labore, & diutino igne comburi possit: nec id quidem per se fieri potest, nisi quibusdam admistis. quod tamen Samio astra non euenit, utpote qui facile, teste Dioscoride, eretria terre modo comburatur. Ad hæc sciant medici Talchum ebibitum strangulare, non secus ac gypsum: cum tamen Samius aster perinde atq; Lemnia terra, contra uenena, & uenenosorum serpentium ictus maxime auxiliatur, & ut illa labijs & linguæ inhercat. Id quod aliquando animum traxit ad credendum, eam terram uel Samiam, uel Samie similem esse, quam magnificiunt circulatores, qui serpentes circumferunt, à Melita insula allatam: quancumque uulgo uocant Pietra di san Paolo. Siquidem hæc colore candida spectatur, linguæ tangenti pertinaciter adhærescit, mollis est, & succosa, facileq; friabilis: & aduersus uenena, & serpentium ictus Lemniæ uicem explet. Ceterum neq; illud ausim asserere, quod lapis Samius uocatus ad nos conuehant mercatores, quo aurifices aurum, & argentum antiquitus poliebant: etsi hunc quoque in Germania reperiri scribat Agricola.

Terra Samiæ consider.

Γῆ χία. TERRA CHIA.

CAP. CXXXI.

CHIA eligi debet candida, uergens ad cinereum, Samiæ similis. Est autem crustosa, albaque, sed fictitijs formis differens. Vis eadem, quæ & Samiæ. extendit faciem, & erugat, atque splendendam reddit: colorem in facie, & corpore toto commendat. in balneis pro nitro deterget.

Γῆ σελινουσία. TERRA SELINUSIA.

CAP. CXXXII.

EADEM præstat Selinusia, maximè laudatur, quæ uehementer resplendet, candida, friabilis, & humore dilui celerrima.

Γῆ κίμωλ'ια. TERRA CIMOLIA. Creta

CAP. CXXXIII.

CIMOLIAE duo genera, candida, & ad purpureum inclinans. Optima existimatur, quæ innatam habet pinguitudinem, tactuque frigida sentitur. Vtraque aceto diluta, parotidas, & alia tubercula discutit. Ambusta igni, si statim cimolia oblinantur, pustulas non sentient: testium duritias, & totius corporis collectiones cohibet: igni sacro imponitur. In summa, utraque multum in medicina commendatur, si incorruptæ originis, nec spuria assumatur.

Γῆ πνιγίτις. TERRA PNIGITIS.

CAP. CXXXIII.

QUAE pnigitis dicitur, colore ferè eretriæ similis est, grandioribus tantum glebis: manum si quis admoueat, refrigerabit: tactu linguæ usque adeo glutinosa, ut pensilis hæreat. Cui effectus idem, qui cimoliæ, paulò tamen infirmior. Hanc aliqui pro eretriade uendunt.

Ὀστρακα τῶν ἰπνῶν. TESTAE FORNACEAE.

CAP. CXXXV.

FORNACEAE testæ uehementer tostæ, crustas ulceribus obducunt: quare prurigini, & pularum eruptionibus, medentur. Podagricis prosunt: strumas discutiunt, cerato exemptæ.

Γῆ ἐκ τῶν κάρλων. TERRA FORNACVM.

CAP. CXXXVI.

FORNACVM terra, quæ retorrda fuluescit, eiusdem cum testa effectus.

Γῆ μέλια. TERRA MELIA.

CAP. CXXXVII.

MELIA colore cineream eritream imitatur, aspera tactu: ea digitis friata, dersi pumicis modo crepitat: Vim habet aluminosam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur: modicè linguam ficit: purum corpus reddit, & colorem commendat: pilos extenuat: vitilignes, & lepras abstergit. Pictoribus usum præbet, ut colores diutius perennent: Emplastris uiridibus, quæ chloræ dicuntur, efficaciter inseritur. Ex omni melia terra, & omni alia in uniuersum, eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit, facile resoluatur.

QUANVIS terra Eretria, Chia, Selinusia, Cimolia, Pnigitis, & Melia antiquis notissima fuerint, & in usu medico frequentissima, ut author est Galenus; tamen ab his, qui nos præcesserunt, adeo neglectas fuisse constat, ut nulla amplius, quod sciam, ad nos adferatur. Quamobrem non operæpretium duxi, ut in singulis moram traheremus, ac de earum historia & uiribus latius differeremus.

Γῆ ἀμπελίτις. TERRA AMPELITIS.

CAP. CXXXVIII.

EX AMPELITIDE terra, quæ pharmacitis nomine in Seleucia Syriæ nascitur, laudatur in primis nigra, piceæ longos carbones referens, modicè assulosa, æquabili splendore, quæ detrita, accepto oleo, statim eliquescit. Vitiosa censetur candida, & cinerea, quæ in liquorem non resoluitur. Vim dissipandi, & refrigerandi habet. ad calliblephara additur, tingendis capillis idonea. Vfus eius ad illinendas uites, sub germinationis tempus, utpote cum innascentes uermiculus enecet.

Ampelididis  
terre confid.

AMPELITIS, ut author est Galenus libro nono simplicium medicamentorum, hoc sibi nomen iure uendicauit, quod antiquis in frequenti haberetur usu, ad præseruandas ab erucis uitium gemmas prima earum germinatione, quemadmodum

quemadmodum nos iusco circumlito nostras tuemur in Hetruria. Pharmacitis uero dicitur, quod medicamento sa-  
xime sit. Siquidem non modo uermiculos ad uites ascendere inhibet; sed etiam eos interficit. Hæc usque adeo bitumine  
referta est, ut Plinius, et Posidonius, bitumini similem ipsam fecerint. Cuius experimentum est, si facili in oleo im-  
posita, liquecat. Quamobrem credidere nonnulli Ampelitim terram crustosum illum fuisse lapidem, quem scribit  
Galenus se inuenisse in Lyciæ litoribus, et in Cœle Syria, qui in ignem coniectus leuiusculam edebat flammam. Hoc  
argumento nixi, quod idem scripserit se reperisse lapidem illum in quodam colle omni ferè ex parte circumdato ab A-  
sphalite lacu, quem Sodomæum uocant: ex quo bitumen in ipsam labitur lacum. Quapropter non desunt, qui dicant,  
Galenum haudquaquam nouisse, eos lapides nil aliud esse, quam terram ampelitim. quæ cum picem refrat carbo-  
nem, ut Dioscorides ipse testatur, non mirum, si potius lapidis, quam terræ speciem præ se ferat. Non ab re itaque  
10 credendum fuerit, Ampelitim terram non admodum à Gagat lapide differre. quippe quod utræque ex terra et bitu-  
mine suam traxerint originem. Ampelitis nuperrimè è Carniola, ubi foditur, ad me allata est, nullis reclamanti-  
bus notis.

Ασβόλη ζωγραφικὴ. FVLIGO PICTORIA. CAP. CXXXIX.

FVLIGO, qua pictores uruntur, ex uitrijs officinis colligi solet; siquidem ei palma tribui-  
tur. Vis ei ad adstringendum, & erodendum efficax. fracta, cum rosaceo cerato ad cicatricem  
perducit.

20 Μέλαν γραφικόν. ATRAMENTVM LIBRARIVM. CAP. CXL.

ATRAMENTVM, quo scribimus, fuligine è tedis coacta colligitur. In singulas libras gum-  
mis, ternæ fuliginis uncia adijciuntur. Fit etiam è refinarum, & pictoria fuligine, de qua paulò  
antè diximus. Assumitur autem fuliginis mina, gummi sesquilibra, glutinis taurini, atramenti fu-  
torij, singulorum fescuncia. Additur conuenienter erodentibus medicamentis. ambustis, ex aqua  
commodè crassius illinitur, sed non antè soluat, quàm cicatricem induxerit: sanatis siquidem  
ulceribus, sua sponte decedit. Cæterum habes, amicissime Aree, ferè quæ tradenda duximus pro  
operis modo, quem destinaueramus, & materiæ, auxiliorumque medicinalium copia.

30 DE FVLIGINE pictoria, atque etiam de Atramento librario. latius et apertius à Dioscoride scriptum  
est, quàm ut de his plura nobis supersint dicenda, uel declaranda. Quare iam unà cum authore nostro, huic quinto  
libro finem imponamus. atque insuper DEO, cui omnia, quæ à nobis fiunt, aut dicuntur, accepta ferre par est,  
inmensas agamus gratias.

LIBRI QVINTI FINIS.

# PETRI ANDREAE MATTHIOLI MEDICI Senensis Commentarii,

IN LIB. SEXTVM PEDACII DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE LETHALIBVS VENENIS,

eorvm QVE PRÆCAVTIONE,

ET CVRATIONE.

## Præfatio Dioscoridis.



UPERIORIBVS; amicissime Aree, libris tradidimus de aromatibus, 20  
oleis, vnguentis, arboribus, & earundem fructibus, lacrymisque: item  
animalibus, melle, lacte, seuo, frumentis, oleribus, herbis, radicibus, li-  
quāmentis, vinis, metallisque. In hoc verò totius operis vltimo; faculta-  
tes medicamentorum recensēbimus, quæ prodesse nobis, aut officere pos-  
sunt. Vitata igitur orationis prolixitate, opus institutum prosequamur:  
Huiuscemodi autem tractatus cum bifariam distributus sit, in partem ve-  
nena præcauentem, ita vt ne fallant sumentes, aut si quando per impruden-  
tiam dentur, vt tum quoque innoxia fiant, irritaque: & in rationem ijs succurrendi, qui iam no-  
xam sentiunt: primùm disseram de præcauendi modo, quem esse difficillimum plerique maiorum  
arbitrantur, quòd dantes clam venena ita insidias temperant, ut peritissimum quēque decipiant. 30  
Siquidem venena sua amaritudine, permistis dulcibus, spoliānt, & graue odoris virus mixtura  
odoramentorum eximunt. Aut medicamenta immiscent, quæ tuendæ sanitatis gratia dari putan-  
tur, & præsertim in valetudine, vt absinthium, tragoriganum, satireiam, aut hyssopum, quine-  
tiam thymum, irim, origanum, abrotonum, castorium, aut si quid medicamentis purgatorijs co-  
gnatam habere qualitatem videatur. Aut potionibus inserunt, vt uinis asperis, iuribus, passio,  
mulsa aquæ, musto: succis, ut in cremore lentis, polentis: aut medicaminibus, aut alijs, quæ assu-  
muntur, edulij speciem referentibus. Quare qui in ea suspitione sunt, conditos cibos vitare de-  
bent, omniq̃ intenso sapore dulcium, aut salforum, aut acidorum abstinere: nec sitibundi affa-  
tim bibere, aut esurientes voraciter comesse, semperq̃ ad saporem horum diligenter attendere,  
præsertimq̃ potu frigidam aquam præsumere. Satiato enim appetitu, qualitates ægerrimè postea 40  
concoquuntur. In ægris quidem faciliè cauemus potiones auxilij prætextu dari solitas, quas offe-  
runt improbi veneficiorum artifices: itaque ob id laborantes morbo non perinde audentium in-  
iurijs patent. Et hæc quidem ne faciliè incauti seductique homines capiantur dolis veneficorum,  
ratio est, & facultas. Sed alia superest expeditior, vt suspiciosi aliqua præsumant, quæ veneno-  
rum vires hebetent, & inefficaces irritasque reddant: cuiusmodi caricæ sunt cum iuglandibus nu-  
cibus manducata, & quæ cedromela vocat, id est citria, seminisque napi drachma cum vino. Item  
folia calaminthæ, aut creta, quæ Lemnia sphragis appellatur, pondere pari cum vino: aut ruta folia,  
& nucis iuglandis nucleum: aut caricæ duas, & salis callum ieiuni sumant, & nullo veneni ge-  
nere læduntur. Antidota ex vino sumpta, eundem effectum præbent: inter quæ intelligitur ma-  
gnum Mithridatium, & quod scinco, & quod sanguine temperatur. Quin & sæpe venenis obfi- 50  
stunt peculiares quidam corporum affectus certo quodam modo constitutorum, cum quadam ci-  
bi, potusque qualitate, tum vini copia ita temperaturum, vt cum uenenis dissentiant. Siquidem  
ingesti veneni vires frangunt, atque iam priore alimento factis, præclusisque meatibus, obstant,  
ne membratim per digestionem insinuetur. Verùm enimvero, quoniam fortunæ necessitas inter-  
dum similia discrimina peregrè agentibus adfert, absque vllis insidijs hominum, nonnihil disse-  
rendum mihi de hac re necessarium duco. Iam primùm igitur culinam apparare loco subdiali con-  
uenit, cibosque & potus in huiuscemodi loco struere. Si id fieri commodè nequit, secunda erit  
conditio hæc, apparandi, apponendique sub tecto. Sed tum diligenter laquearia animaduertenda:  
frequenter enim à superioribus contabulamentis animalia decidunt exigua quidem, sed quæ non  
modicam perniciem moliantur, vt phalangia, stelliones, & alia quædam reptilia. Porro uinaria  
uasa dili-



vasa diligenter intueri oportet: nanque reptilia odore vini illiciuntur, quæ interdum forbendo, noxium virus eructarunt, interdum uerò delapsa immerfaque expirant, & exitij causas haurientibus attulerunt. Sed hæc hæcenus dicta sint, ne cauti, & prouidi insidijs pateant. Quod si qui sua sponte, aut ex quorundam insidijs sumpserunt, auxiliari primo quoque tempore oportebit. siquidem dum comites singulorum venenorum notæ expectantur, immedicabile fit venenum, & paulisper neglectum, medicamentis ægrè cedit. Quare si qui pro comperto se uirus sumpsisse intelligunt, & fateantur, aut eorum, qui aderant, testimonio constet, protinus ad idonea remedia transeuntes, faciliè peculiari, nativæque constitutioni restituemus. Neque enim ijs assentimur, qui prorsus auxilia in huiusmodi frustra adhiberi contendunt. Quo enim modo morbi,

10 quorum causæ cæcæ, latentesque corporibus insident, medicinam admittunt, & quæ forissecus incurrunt venena, medendi rationem aspernantur? Aequè verò omnes morbi pro causarum ingruentium magnitudine, proque antecedentibus affectionibus, qualitatibusque, quibus sit opportunum corpus, vel medicabiles sunt, uel nullis cedunt medicamentis. Quod si qui forsan obmutescentes, aut tremuli, aut nolentes alioqui venenum à se egeri, nullam nobis eius cognitionem præbeant, tum protinus accedendum ad ea, quæ communiter epotis quibuscunque venenis opitulari consueuerunt. Atqui nullum magis in omnia ualens auxilium dari potest, quàm ut proximo loco uirus foras exhauriatur, priusquam inualescat. Quare sine mora calidum oleum ex aqua, aut seorsum, ut uomitare cogantur, dari conuenit. Aut si oleum natura loci negat, butyrum cum aqua calida, aut malua, aut lini semine, aut trago, vrticæ, scæno græco, aut halicæ decocto, vicem

20 eius exhibebit. Hæc enim non modò uomitionibus exigent vi illa sua laxatrice, aut nauseam ciente; sed aluum quoque subducent, & corporum inanitione ita aduersabuntur, ut acrimonias venenorum hebetent. Id quod euidenter huiusmodi argumento deprehendere licet. Esto, ut quisquam uiua calce, vel fæce, aut cantharidibus, aut alio quouis acri, corpus exulcerare statuerit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulcerationem non accipiet. Atqui neque vehementer adstringi corpus, neque refrigerari poterit, si antea perungatur. Quinetiam uomitus non ob id modò, quod vacuet, & noxium humorem excernat, iuuamentum adfert; sed quod assumptum uirus nonnunquam odore, coagulatis grumis, aut colore prodat. quippe cum odore, & amaritudine, meconium: colore, cerussam, gypsūve: grumis, lac aut sanguinem animalis recens iugulati ostendat. Nam grauis odor regestorum, leporis marini, aut rubetæ veneficia deprehendit: ita ut

30 nonnulla ab ijs remedia peti possint, ad idonea singulorum auxilia transeuntibus. Oleo etiam maluæ decoctum admiscetur, aut glaucium, aut adeps anserinus, aut pinguium carniū iura, aut lixiuium lignorum cinere factum. Vbi verò uomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in uentre coierit, quæ hæserunt intestinis reliquiæ, clystère acri deuocentur. Facit & nitrum tritum cum hydromelite sumptum, & vina vetera liberalius epota, gallinacea iura, præpingues pisces, vetustæ carnes pinguesque, & quæ adipè aut recenti butyro parantur. Aluum nanque subducunt, uti diximus, & stomachum resoluunt, proniorem ipsum ad vomitum reddunt: & venenorum acrimonias hebetant, atque meatūs obstruentia, celerem virium penetrationem inhibent. Quinetiam medicamenta dantur, quæ communi dote profunt, ut Lemnia terra, agaricum, abrotonum, irio, radix eryngij, semen pastinacæ, & calaminthæ, nardum Gallicum, castorium, ferulæ virentis medulla, flos rhododendri, succus marrubij, laser, aut laserpitium, sagapenum, peucedanæ succus, aut panacis, & radix, quam magadarim appellant, aristolochia longa, syluestris rutæ semen, & betonicæ; quam cestron nominant, folia. singula cum vino drachmæ pondo sumi debent. Effectum præbet polij decoctum, & seseli, & liquida pix linctæ. Magnificè ferunt opem antidota, quæ in calce operis scripta reliquimus. Communis ratio præstandi auxilij ita se habet. Cæterum ab ijs, quæ consueuerunt euenire, communia remedia sumptitari possunt. Ferè enim vires venenorum quàm plurimorum in affectus consimiles corpus tandem redigunt. Quam ob causam plerisque communia conducunt auxilia. varia etenim sunt venenorum genera, communes tamen, nec multi iidem affectus oriuntur. Neque fieri potest, ut omnes concurrentesque casus, quæ symptomata vocant, vnum uenenum sequantur. alioquin superuacanea fuisset uenenorum

40 singulorum traditio, cum suis remedijs ab authoribus descripta. Neque verò in vno eodemque promptum est inuenire, ut quis stomachi, alui, intestinorum, iecoris, renum, & vesicæ dolore vehementer crucietur, ut singultiat, erodatur, contremiscat, refrigeretur, obmutescat, conuellatur, pulsus elanguescat, spiritus difficilis fiat, veterno prematur, vertigo obuersetur, caligent sensus, stranguletur, sitiatur, sanguis erumpat, febre confluetur, ægrè lotium reddat, torminibus uexetur, crebrò vomitet, nausea prematur, rubescat, liuore sugilletur, palleascit, desipiat, stertat, uiribus deficiatur, & pleraque alia faciat, patiaturque. singula enim in generales affectus deducta, pauca numero, & communia ea demonstrant, quæ euenire consueuerunt. Quare in singulis, quæ suprà diximus, faciliè fuerit deuoratum uirus cognoscere. Nam oris & linguæ erosio, stomachi, ventris, vesicæ ac renum inflammatio, vehemens vrinæ difficultas, & interdum cruoris cum eo exitus, lancinatio, & in pluribus partibus quidam adustionis sensus, non in cantharidibus modò.

potis reperiuntur; sed in erucis quoque pinorum, & bupreste, & salamandra. Porro non modò eos, qui meconium hauserunt, veterno, aut sopore premi, stertere, liuore fugillari, torpere, refrigerari, stupefcere, toto corpore pruritum sentire, sensu priuari constat; sed eos etiam, qui mandragoram, aut cicutam deuorant. Delirium non hyoscyamus tantum infert; uerum etiam, quæ toxica appellantur: itidem aconitum, & mel, quod in Heraclea Pontica gignitur. Strangulatio non minus in fungis, quam in sanguine taurino, lacte, aconito, cerussa, gypso conspicitur. In summa, difficile vnum uni veneno proprium inuenire signum, quod haustum, gustatumque uirus prodere possit: maximè, quòd hæc cæterorum etiam vitiorum, quæ in corpore exoriuntur, communia sequi solent. Cæterum in his, quæ celeriter enecant, noxam signis forsitan indicare possis, si ad ea respexeris, quæ sumus dicturi. Sed in ijs, qui ad longas ægritudines spectant, nihil ad medendi rationem difficile, duntaxat quod pertineat ad indicia noxæ, utpote cum uenena statim, atque præsentaneam vim illam perdiderunt, transmutata in longos affectus, communia reliquorum vitiorum remedia, compositionesque flagitent, cum venefica proprietas non amplius insit. Si uerò longa sit affectio, in aliquod diuturnorum morborum genus recidet, à quibus facile fuerit medendi rationem assumere. Sed de ijs, quæ generaliter auxiliantur, hætenus. Consequenter quæ priuatim singulis profunt, scriptis mandabimus, si prius sigillatim exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem, aut maleficam vim sortiuntur, ut medicinæ studiosi ea cautè obseruent, quæ ad rationem salutis scripta inueniuntur: quòd nonnulla eorum, quibus utuntur, venenis sint commista. Incuria enim magnas adfert noxas, & sæpe continuo usu eorum, homo in perniciem agitur. Proinde animalia, quæ exitiosam uim habent, hæc sunt: cantharides, buprestis, salamandra, pinorum erucæ, lepus marinus, rubeta, & rana palustris muta, deuorata hirudines. Semina sunt, hyoscyamus, coriandrum, cicuta, gith, psyllion. Liquamenta, meconium, opocarpafon, thapsiæ succus, elaterium, mandragoras. Radices, quas mittit chamæleo, aconitum, thapsia, ueratrum, ixia, agaricum nigrum, ephemerum, quòd aliqui Colchicum uocant, quod in Colchide nascitur. Arbores, herbæ, oleraq;: smilax, quam aliqui tithymalum appellant, Romani taxum: solanum manicum, quod & dorycnium dicitur: sardonias herba, quæ ranunculi genus est: corniculatum papauer, pharicum, toxicum, ruta syluestris, fungi. Ab animalibus, taurinus sanguis recens, lac intus coagulatum, mel Heracleæ in Ponto genitum. Metalla, gypsum, cerussa, calx, auripigmentum; duo sandarachæ genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentum viuum dicitur. E' liquoribus domesticis, uinum abunde post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

## COMMENTARIVS MATTHIOLI.

Beneficium à Diosc. in posteros collatum.



AGNVM SANE, & immensum beneficium acceptum referre debent sapientissimo Dioscoridi non solum medici orbis uniuersi: sed etiam uniuersa simul humana natura. quippe quòd is artem medicam illustrauerit quinque superioribus libris, in quibus infinitorum simplicium medicamentorum historiam, ac facultates miro ordine tradidit: sine quibus nullo quidem pacto ægritudines propelli possent, nullaq; earum noxa deleri, quibus uita nostra conflictatur, ac tollitur. Sed longe plura adhuc beneficia eidem accepta referri debent, quòd deinceps in hoc sexto uolumine, exactissima scientia, mirabilis doctrina, ac ratione explicauerit, & quo modo quisque lethalia omnia uenena præcauere possit, & qua etiam ratione succurrat, ne eadem perniciem, uel aliquam inferant noxam, quæ prius per imprudentiam, aut malitiam, uel dolum intus in corpus assumpta fuere. Nam etsi medicamenta tam ad uniuersales, quam ad particulares morbos, qui quotidie inuadunt, affliguntq; humanum corpus, necessaria plurimum semper extiterint, apertèq; utilia; innumeri tamen habentur morbi, qui seruata tantum uictus ratione, naturæ duntaxat ope pelluntur. Secus autem euenit ijs, quibus uenenum exhibitum sit. quandoquidem nisi prius haustis præstantibus admodum antidotis ueneno præuenerint, uel post ipsam assumptum remedia non admiserint, rarissime uel nunquam naturæ uiribus seruantur. Quin potius eos plerumq; uita deficit, qui uenenum hauserunt, nisi quam primum succurratur remedijs. de quibus ita abunde, accurateq; scripsit Dioscorides, ut Galenus & grauissimus author, & medicorum facile princeps, necnon tota posteriorum Græcorum, & Mauritanorum schola, ipsum in hoc adeò diligenter sint imitati, ut ab eo omnem huiusce facultatis doctrinam didicerint. Cuius rei amplissimus testis est Galenus libro primo de antidotis. Quamobrem omnibus perspicuum esse potest, Dioscoridem in hac uenenorum, æquè ac in illa medicamentorum facultate, omnium facile principem, & magistrum extitisse. Itaq; cum in alios eius quinque superiores libros, commentarios (ut puto) non inuites conscripserim, me equidem operæpretium facturum putauim, si libro quoque sexto commentarios adderem: præsertim cum nouerim quam utile sit, ac necessarium homines in uniuersum assequi tum modum, tum rationem tam præcauendi, quam curandi uenena, non solum ea, quæ intus in corpus sumuntur; sed etiam quæ uenenosorum animalium morfu, uel ictu eiulantur, & relinquuntur. Siquidem malefica uenenorum uis, adeò grauis, & potens humanæ naturæ semper extitit inimica (huic enim magis, quam cæteris aduersatur) tantaq; uelocitate suum exequatur munus, ut sæpenumero eundem præstet effectum in corporibus nostris, quem præstat uoracissimus ignis,

Ratio commentariorum in librum sextum.

mus ignis, si quando ad aridissimas peruenit paleas. Fit enim, ut plerunque uenena, dum iubent qui sumpserunt, uel isti languent, medicos accersiri, eoque corporis humores inficiant, atque etiam principes partes, ut subinde nihil, uel parum prosint remedia, et quam præstantissima antidota. Quapropter rectè Galenus libro 111. de simplicium medicamentorum facultatibus capite 221. scriptum reliquit, quod quando uenenum putredine, et erosione enecans, grauem corpori intulerit noxam, fieri quidem non potest, ut amplius uincatur, supereturque, uel uictus ratione, uel generosorum medicaminum ope. Ex hoc itaque accepi, clareque cognoui, quod si in hunc quoque librum sextum commentarios non scripsissem, præstantiorem, magisque uitæ humanæ necessariam medicamentorum partem, intactam silentio præterissem. Quæ quidem pars, cùm præterea à nobis ex Dioscoride pluribus antè annis in Italicam linguam uersa habeatur, ac etiam his nostris commentarijs enarrata, causa nimium erit, qua potissimum innumeri homines, non modò à mortiferis se tueantur uenenis; sed à morte quoque liberentur. Nam quicumque in hos nostros incidit commentarios, qui Italici, aut Latini sermonis non fuerit prorsus ignarus, quanquam non fuerit medicus, non tantum sibi ipsi; uerum etiam alijs adiumento esse poterit. Nempe quod usus medicamenti tum simplicibus, tum compositis ad uenenorum noxam facientibus, quorum inferius præstantiora, ualentioraque referam: quinetiam conuenientibus usus cautionibus, facillè aliquando ueneno prorsus medebitur, aliquando autem tandiu ægros uiuos traducet, quandiu diligentissimis medicis accersitis, qui non semper præsto sunt, sed magna ex parte uel longè distant, uel absumunt, integrum medendi locum relinquet. Sed antequàm modum, ac rationem præcauendi uenena in medium afferam, non alienum duxi ad ampliorem huiusce rei doctrinam, nonnulla in uniuersum præmittere scitu, ut arbitror, necessaria, ut sine quibus tractatio hæc diminuta, et imperfecta uideri posset. Primum itaque dixerim (ut etiam Conciliator inquit in libro, quem de uenenis edidit) uenenum omne intra corpus nostrum assumptum omnibus suis facultatibus prorsus opponi cibo, quo nutrimur. Nam quemadmodum cibus in nostri corporis sanguinem uertitur, fitque in omni sua parte membris, quæ præcipuè nutrit, similis, locum illius, quod continuo in nobis exoluitur, subintrans; ita uenenum contrario modo se habens, corpus, ac membra, quibus primò adhaeret (ut infra latius dicetur) in sibi peculiarem uenenatam naturam transfert. Vnde quemadmodum animalia omnia, omnesque fructus, quæ terra parens gignit, quæque in nutrimentum uerti possunt, si à nobis edantur, in nostrum transeunt alimentum; sic per oppositum modum, uenenata intro in corpus sumpta, uniuersa corporis nostri membra uenenata reddunt. Quippe cùm omne agens suo passo sit fortius, uenenum uero sua agendi ualida, nostram uincit substantiam, uertitque in suam uenenatam naturam, ea sanè ratione, qua ignis sua ui agendi potentissima paleas celerrimè in se ipsum conuertit, et conficit. Ob id itaque dixere antiqui rerum naturalium exploratores, quod uenenum homines interficit corrupta corporis temperie, et compositione. Id quod maxime comprobatur Galenus libro 111. de simplicium medicamentorum facultatibus, ubi in hoc, inquit, differt alimentum à medicamento, quod hoc nostrum corpus alterat suis qualitatibus, illud uero conuertitur, fitque substantiæ corporis simile. Porro scire conuenit (ut Auicenna, et Auerroes posteritatis memoriæ prodiderunt) uenena in uniuersum trium esse generum: ut enim aut à plantis, aut ab animalibus, aut à metallicis exitiosam uim habent; ita inde discrimina sortiuntur. In plantis igitur ea omnes inter uenenata recensentur, quæ ciborum naturæ omnino repugnant, et aduersantur: quæ natura non eiusmodi sunt, ut esitate in alimentum conuertere possint. quinimo contrariam obtinent facultatem, ita ut membra iam nutrita in se ipsas conuertant. Cuiusmodi est elleborus, aconitum, cicuta, napellus, Sardonias herba, nerium, et alia quam plurima plantarum genera, de quibus in processu pluribus seorsum agemus. In animalibus ea omnia ueneno inficiunt, cuius natura humanæ prorsus aduersatur. Patet id in uiperis, aspidibus, basiliscis, lepore marino, rubeta, scorpio, phalangio, salamandra, rabidis quadrupedibus: item in morticinis carnibus, aut à fulmine occisis, aut à uenosis, et rabidis animalibus. Ceterum hac in re, licet nonnulli dicant uenenum cum uita animalis consumi, eo ducti exemplo, quod cerui, lupi, apri, et reliquæ ferae, quæ uenenatis sagittis conficiuntur, innocue comedantur; scire tamen oportet, hanc regulam desinere in his, quæ pestis, aut rabies, aut fulminis ictus, aut uenenosorum morsus enecat. Quandoquidem complures uideri mortuos esse, qui tantum boues peste confectos excoxiuerant, haud aliter toto corpore tumentes, ac si in hydrope incurrissent. In metallicis denique illa omnia produunt uenenata, quæ malefica, ac lethali constant facultate. Qualia sunt argentum uiuum, auripigmentum, sandaracha, magnes, et similia. Ad hæc sciendum est uenena non solum interficere per os sumpta, sed interdum etiam extrinsecus applicata, uarijs ac diuersis rationibus. Porro quæ per os sumpta uenena uitam adimunt, sub ciborum, aut medicinarum specie plerumque propinantur. Quæ uero exterius tantum admota inficiunt, ut plurimum à uenenatis, et mortiferis animalibus desumuntur. Siquidem hæc homines non morsu modò, uel ictu necant; sed uisu quoque, sibilo, et tactu (ut quidam scribunt) interimunt. Quinetiam non desunt uenena, quæ gustatu, olfactuque tantum statim hominem in perniciem agant nulla temporis mora. quæ quidem inter cætera malitiæ, et atrocitatis principem locum obtinent: quippe quod secum deferant presentaneum interitum, ex quo nullum subinde fiat reliquum infelicibus moribundis succurrendi tempus. Ceterum morsu, ictuque interficiunt uiperæ, aspides, scorpiones, phalangia, pastinacæ pisces, rabidi canes, et alia id genus plura. Visu autem, et sibilo (ut auctor est Galenus libro de theriaca ad Pisonem, si tamen Galeni legitimus sit liber) statim inficit basiliscus. Tactu alius serpens enecat, de quo agens Auicenna libro 111. fen 71. narrat, quod is à milite quodam hasta infixus uirulentam uim per hastam transmisit ad manum, quam primùm infecit, et deinde totum corpus corruptum. Ad huiusce rei probationem illud sanè compertum habeo, quod in agro Tridentino euenisse scio. Nempe cùm rusticus quidam suis esset in uinetis, paruum quendam collem sepius ascendebat, ut ibi uuarum custodiam ageret. Hinc quadam die ad collis pedem magnum, et horrendum uidit serpentem, cuius capiti supernè hastam satis longam infixit: at dum fixam se hinc inde fortiter contorquentem, et hastæ circumuolutam, pro uiribus teneret, magno statim tremore correptus est.

Veneni operatio qualis.

Venenorum genera unde.

Venena quorū modis mortē adferant.

reptus est, quo maxime deterritus uociferans, uiatores, & circumstantes colonos ad se ire rogabat. Quam uociferationem audientes, qui non longè aberant rustici, eò cursu uelociter contenderunt, & ipsum ferè semimortuum inueniunt. Cognita tamen ex occiso serpente sui infortunij causa, ad theriacam, & alia antidota confugerunt, quibus eum ad uitam reuocarunt. Veruntamen duobus annis postea is uniuersi ferè corporis stupore in lecto semper decubens egrotauit, & eo præsertim brachio, quo perniciosum animal hasta occiderat. Nec admodum mirari rem hanc nobis licet, cum uideamus (ut etiam literis mandauit Galenus libro vi. de locis affectis) torpedinem marinam derepentè piscatoris manum obstupescere, ac torpidam reddere, ubi primum is tridente eam tetigerit. Id quod similiter efficit, transmissa per funem retis qualitate, dum trahitur in litus. Proinde id experientia docti piscatores, si dum retia trahunt, manus torpescere, tremereq; præsentiant, certò torpedinem captam sciunt, etsi longo admodum fune trahatur. Vnde illud perspicuum est, quòd si huiusce piscis qualitates per tridentis hastam, & retis quàm longissimum funem transmissæ ad manum, insciant & corrumpunt homines, eò magis id ipsum fieri poterit, si animalia ipsa, aut nuda manu, aut alia corporis parte tangantur. Idcirco manifestè constat nullam esse brachium tam ualidum, & robustum, quod torpedinem adhuc uiuentem diutius sustinere possit. Quare admirandum sanè non erit (ut testatur Galenus libro nuper citato) quòd sputum canis rabidi, si humanum corpus contigerit, perinde ipsum rabie afficiat, ac si ab ipso cane esset demorsum: nam & huiusce effectus hac nostra etate plura afferri possent exempla. Neque etiam alicui mirum esse debet, quòd sputum aspidis cognomento Ptias, omnes ueneno insiciat, quos contigerit. Hoc idem similiter efficiunt quedam seuissima uenena arte conflata, tanta permeandi & penetrandi ui prædita, quòd illis (ut ferunt) sellarum pediferis, infessorum ocreas penetrant, donec ad nudas pedis plantas peruenta, & inde per cutis spiracula in corpus ingressa, uniuersa eius membra corrumpunt, & absument. Horum usus (ut audio) frequens apud Turcas, et alias ferinas gentes. Ex hac autem re nullam quis capiat admirationem oportet. siquidem arteria corporis nostri (teste Galeno libro tertio de simplicium medicamentorum facultatibus, ac alijs in locis) ad se intus trahunt quodcunque proximè circumdat eas, dum continuè dilatantur. Id quod quotidie liquet ex inunctionibus, ac suffitijs ad morbum Gallicum paratis. quippe eadem ab arterijs attractæ, ubi argenti uiui, cinnabaris, uel sublimati officinis uocati plurimum admiserint, seuissima sepe pariunt symptomata. Sunt & alia uenena, quæ olfactu tantum (ut quorundam fungorum meminit Rasis) præsentaneam afferunt mortem ijs, qui ea naribus admouerint. Huius summe malitiæ sedem illud sanè tenere debebat, quo florem recentioribus uetonicum uocatum, Senis quidam circumforaneus infecerat, ex his qui innocuè uenenum deuorare profitentur. Quem cum olfaciendum exhibuisset suo concurrenti in publico Senensi foro, is ex solo olfactu derepentè concidit mortuus. Præterea uenena quedam sunt, quæ solo gustatu, quanquam non deglutiantur, perimunt: idq; præstat aspidis surdi sputum. Quo memini quosdam imprudenter infectos esse. Inter quos uidi ego rusticum in ualle Anania, qui dum fornem secaret in pratis, feram falce per medium secuit, & cum postea capitis truncum manu cepisset, ut socijs astantibus ostenderet, utpote qui iam feram demortuam fortasse censebat, suspensus manu truncus caput retorfit, & rustici manum seniens momordit. At ille credens suctu uulnere succurrere, os statim morsui admouit. Quo facto derepentè in terram cecidit, ubi illico mutus factus deperiit. Insuper sciendum est, quòd uenena non uno eodemq; modo, neq; ab una eademq; causa suos parum effectus. Si quidem (ut sapientes quidam memoriæ prodiderunt) quedam agunt excessu qualitatum elementorum, quarum mixtione constant. Quedam uero propria tantum qualitate aut forma, quam occultam proprietatem medicorum quidam appellant, in mistis inferioribus introducta ex influxu linearum rectarum radicalium, quæ ex syderum fixorum splendore proueniunt, pro materiæ mistorum proportionem seu constitutionem. Alia denique utroq; modo simul agunt, nempe & qualitate elementari, & propria, quam formam specificam nominant. Porro uenena, quæ excessu tantum suarum qualitatum operantur, suas uariant actiones, pro uarietate ipsarum qualitatum. quippe quòd unum sit calidum, aliud frigidum, aliud siccum, aliud humidum. Quæ igitur caliditate excedunt, duobus modis perimunt. Vno, quòd intus in corpus sumpta, excalfaciant, urant, corrodantq; usq; ad cor. Alio, quòd extrinsecus apposita corrodant, & exedant carnes usque ad ossa: id quod lepori marino adscribitur. Vel quòd summe calefacientia tam intus, quàm extra corpus adurant, quemadmodum euphorbium, & elleborus, donec inflammato tandem corde interuant. Frigida similiter bifariam necem adferunt. Vno modo, quòd exuberante frigiditate sua, usque adeò corpus gelidum, stupidumq; reddunt; quòd simul etiam cor congelascit, ut ijs euenire sepius compertum est, qui opium deuorant. Altero, quòd obstructis ingenti frigiditate meatibus, anhelitum intercipiunt, & proinde suffocant, & strangulant: id quod præstant exustum plumbum, & fungi uenefici. Duplicem & siccum uenenum habet operandi modum. quandoquidem uel humidum sanguineum cordis absument, ut calx uiua: uel separent ac diuidant partes abinuicem, quousque omnia membra ad cor usq; in minimas diuidantur partes: quem effectum præbet risagallum uocatum. Humidum postremo, etsi aliqui tradant non inueniri, quoniam nullum sit humidum reperire, quòd ad quartum humiditatis excessum peruenerit; oppositum tamen declaratur exemplo illius, qui nocte dum dormiret, à serpente quodam demorsus (ut Gilbertus Anglicus narrat) mortem obiit: cumq; mane à puero per brachium traheretur (sic enim arbitrabatur dominum à somno excitare) caro iam uniuersa putredine confecta, tractu illo concidit, ossibus remanentibus carne prorsus exutis. Quod certè non alia de causa contigisse potuit, quàm ab excedente ueneni humiditate, quæ summa sanè inerat feræ illius dentibus. Eundem effectum præstat etiam salandra, si in puluerem redacta bibatur, ut in processu suo loco docebit Dioscorides. Nec secus illi accidit, quem cenebris serpens momordit. Quocirca rectè proditum est à Galeno ex autoritate Hippocratis libro primo de temperamentis, quòd cum anni constitutio pluuialis, humida, et australis fuisset, ea potissimum humiditas fecit, ut succedente ætate carbunculi oriretur: quibus ob corruptam uenenatamq; humiditatem eousque in aliquibus brachia putruerunt, quòd deniq; tota hac ipsa putredine corripia,

Venenorum  
effectus à di-  
uersis causis.

A qualitati-  
bus excedentibus.

correcta, à cubitis diuisa deciderunt. In alijs uerò tantam coxarum, crurum, & pedum caro putredinem sensit, quòd planè ossa carne destituta remanserunt. In alijs denique non caro solùm computruit; sed simul etiam nerui, ossa, eorum compagine, nexuq; contabuerunt. Ex hoc itaque apertè ostenditur reperiri uenena, tanta humiditate exuberantia, ut homines interuenire possit, ut pote quæ membra putrida efficiunt: sicut argentum uiuum, quod sua humiditate modum excedente, insitum cordi natura humidum sepe corrumpit, ut quotidie uidemus in ijs, qui eo unguentis excepto se inungunt ad lucem Gallicam delendam. in quibus præterquàm quòd semper gingiuas, dentes, palatum, aliasq; uicinas partes putredine afficit; sepe etiam ubi uberius quàm par sit, inunctum fuerit, eos in perniciem ducit: quippe quod uniuerso sanguini putredinem inferat. Idq; extrinsecus duntaxat adhibitum. quanquam & id ipsum intus assumptum occidit, si modum quendam excefferit, ut libro superiore tradidimus. Siquidem præ nomia sui frigiditate ut ales  
 10 spiritus, cordisq; substantiam congelat. quod ciuidam seplasiario, qui illud imprudenter biberat, euenisse narrat Consiliator Petrus Aponensis. Hoc igitur modo, alijsq; prædictis suos uenena præstant effectus, quæ suis modum excedentibus qualitatibus mortem hominibus adferunt. Ceterum uenena, quæ propria sui facultate, uel (ut dicunt) propria forma enecant, id non efficiunt, quòd caliditatis, frigiditatis, humiditatis, aut siccitatis modum excedant, sed quòd id peculiare à natura habuerint ex influxibus à radijs (ut suprà diximus) quorundam syderum fixorum prouenientibus, quæ ea humane nature prorsus aduersa genuerunt. Hæc propterea etsi tam pauca quantitate sumentur, ut uix sentiantur; tanta tamen est eorum malefica, atroxq; uis, ut breui tempore tantum augeantur, in se ipsa corporis humiditatem conuertendo, quòd postea quasi horæ momento dissolunt, & ad mortem trahunt homines, à quibus hausta fuerint, quemadmodum aconitum, napellus, & toxicum facere consueuerunt. Id quod optimè nouit Galenus libro primo de semine, ubi rem explicauit his uerbis. Quæ ratione etiam minima particula humoris lethaliu uenenorum,  
 20 quæ deleteria appellant, ubi in animalis corpus ingressa fuerit, totum id momento temporis immutat, sibiq; simili affectione alterat. Nec secus fit curatio, quæ per uenenorum remedia, & antidota adhibentur, quæ alexipharmaca nuncupant, quæ contraria lethali bus alteratione totum etiam ipsa corpus immutant, non sanè quòd substantia ipsorum per totum penetret corpus (neque enim potest tam paucus succus tam breui tempore corporis interdum maximam molem replere) sed qualitatis diffusionem, qualis & extra nos à solis fulgore in ambientem aërem, & in nobis tum à corde in arterias, tum à cerebro in neruos fieri conspicitur. Et lib. v. cap. xix. de simp. med. facult. idem inquit. At medicamenta sunt quæ tota essentia nobis contraria sunt. proinde si uel minimum eorum assumptum fuerit, omnino ledat necesse est. hæc Galenus. Ex quibus facillè constat, ipsum uelle quòd antidota nō secus atq; uenena agant in corpora nostra. Idem Galenus tertio simplicium medicamentorum censu cap. xxi. in prædictorum testimonium ita scriptum reliquit. Medicamenta erodentia, et putrefacientia etiam si quantitate minima sumentur; omnino tamen corrumpunt, quia uidelicet, quæ putredini obnoxia sunt, calore, humiditateq; putrescere solent. Atqui calidus, humidusq; sanguis est. Itaque putrescere nunquam cessare possunt. Proinde longo etiam post tempore, à quo sumpta sunt, nonnulla intermunt, potissimum quæ crassa, terrenaque essentia sunt. hæc Galenus. Sed ad antidota redeamus. Vbi sciendum est, quòd ex his ea tutius operantur, quæ præcauendi gratia antea assumentur, quàm quæ post: nam ut uenenum, quanquam efficax, nihil aut parum nocet ijs, qui prius se antidotis munierunt (ut contigit Mithridati) ita pari ratione nullum, aut paucum adferunt auxilium, quæ postea exhibentur, nisi sepius, maioriq; quantitate sumantur, ut in corporibus maius eorum uis capiat incrementum. His adstipulatur Galenus libro primo de antidotis à principio, sic inquit. Mithridatica antidotus, itemq; theriaca non eam uim habent post uenenum accepta, quàm ante sumpta habuissent. nam portio antidoti quæ prius, & semel hausta tutum à morte quempiam præstitisset, ea uenenum subsecuta nisi ob quadruplam, quincuplamue aucta, non iuuabit: neq; id semel tantum, sed bis, singulis quibusq;  
 40 diebus hausta, faciet. hæc Galenus de his differens. Ceterum uenena, quæ & manifestis, & occultis simul litatibus agunt, id præstant utroque modo, quo prædicta duo. quemadmodum agit euphorbium, quod licet ueneficam, quàm ab excessu caliditatis obtinet, inficiat; inscit tamen & ui alia, quæ à propria sui forma, & latente qualitate procedit. Cuius rei illud indicium est, quòd exhibita theriaca, cuius proprium est ea omnia superare uenena, quæ propria forma & tota specie operantur, efficacissime ualet aduersus euphorbium haustum. Quòd si sola excedente caliditate euphorbium noxam inferret, tantum abest, ut theriaca, quæ non parum caliditatis obtinet, auxilio futura sit, ut etiam illius noxam foueat, & augeat. quod tamen non facit. Scire etiānam conuenit nō omnia uenena cor primū petere, & illi noxam inferre. Siquidem reperiuntur, quibus ita natura comparatum est (id enim claret experientia) ut intus assumpta separatim noceant uno tantum corporis membro; alia uerò alteri. quemadmodum etiam sunt medicinz, quarum alie præcipuè cordi opitulantiur, ut crocus, hyacinthus: alie cerebrum, & caput iuuant, ut smaragdus, stoechas, betonica. alie uentriculo præcipuam operam ferunt, sicuti corallium, cinnamomum, gingiber. alie deniq; alijs corporum membris auxiliantur. Idcirco Galenus libro de theriaca ad Pisonem: Sunt (inquit) plura medicamenta, quæ quibusdam corporis partibus eximie curandis sunt idonea. Patienti igitur ieciniore sepe eupatoria herba auxiliata est: glans unguentaria (myrobalanon uocant) lienem aduuat: sarxifragon, & betonica renibus pulchre faciunt: similiter alia aliarum (ut experientia obseruauimus) propria sunt medicamina. Tales igitur proprietates in uenenis quoq; reperiri affirmauerim. quandoquidem planè constat cantharidas præcipuè noxam inferre uesticæ, cicutam cerebro, leporem marinum pulmōni, & alia item alijs corporis membris particularibus, ut in hoc libro melius, latiusq; ostendemus, ubi de singulis seorsum agemus. Id quoq; non latuit Galenum, ut loco iam citato eius uerba apertè testantur, dum ait. Sunt nonnulla uenena, quæ partes etiam quasdam corporis priuatim uitiant. Nam lepus marinus pulmonem exulcerat, cantharis uesticam peculiariter afficit. Porro non ignorandum, quòd etsi uenena hæc (ut adnotat Gentilis) natura insitum habeant, ut seorsum uuumquodq; membrum determinatum ledant; non tamen

A forma propria.

Antidotorum actio.

Ab utrisque simul.

Venena diuersa membra petunt.



Vtrum uenena in statum diē interimere possint.

men propterea sit, quin noxam etiam cordi communicent. nam si secus esset, neminem sanē interimere. Quamobrem haud mihi difficiet eorum sententia, qui ideo uolunt omnia uenena pernicioſa eſſe, quod cordis facultatem opprimant. Siquidem parum refert, an illud efficiant, quod primo cor ipsum opprimant, aut aliquo alio mediante. Huius rei manifestam fidem facit Galenus libro v. cap. i. de locis affectis, ubi sic habet. Quenam ipsi cordi proprie uel primario affecto superueniant accidentia: quenam uero ipso ceteris partibus consentiente, id ex his intelligi potest, quae prius in alijs libris demonstrauimus, ubi iam declaratum est innati caloris cor uelut fontem eſſe, neque animal mori omnino posse, ni cor afficiatur. haec Galenus. Ceterum illud etiam in disputationem uenit, nunquid fieri possit, ut uenena in diem exhiberi possint, et certis occidere temporibus, hoc est, quod certo, et praefixo tempore moriem deferant: exempli gratia in uno mense, uel pluribus, uel ad annum usque, non celerius, neque tardius determinato tempore. Quia in re in primis auscultandus est Theophrastus grauissimus, et antiquissimus author, qui libro ix. cap. xvi. de historia plantarum de aconito differens, ita scriptum reliquit. Componi autem ita ferunt, ut certis occidere temporibus possit, uidelicet bimestri, trimestri, semestri, anno completo, nonnullum etiam biennio. Personae illos de uia discedere uolunt, qui plurimum temporis resistere possint: paulatim enim tabescat corpus, et languiore pereat duratius esse necesse. Facillime illos, qui confestim obeunt. haec Theophrasti sententia. Veruntamen omnes ferē rei medicae studiosos in hanc conclusionem conuenire reperio, quod quauis in uenenorum numero inueniantur (ut Theophrastus inquit) quae celerius, et quae tardius interficiant; non propterea tamē praesciri potest terminus certus, et dies, quo mortem inferre debent, ut quidam existimant. Nam quod uenena citius, aut serius occidant, non tantum ex innata et propria eorum ui prouenire censent; sed etiam quod magis, uel minus resistat eius natura, qui uenenam assumpſit. Id autem planē docet experientia: siquidem constat idem uenenum eodem pondere, uel eadem quantitate diuersis natura exhibitum, alios in hora tantum perimere, alios in quatuor horis, alios in die, et nonnullis nisi parum afferre noxam. Id quod etiam quotidie experimur in medicamentis, quae ad deiiciendam aluum exhibentur. quandoquidem idem medicamentum eodem pondere, uel quantitate a diuersis hominibus acceptum, in aliquibus suum celeriter praestit effectum, in alijs tardē, in aliquibus parum efficit, in alijs plurimum, in alijs nihil, in aliquibus citra omnem molestiam deiicit, in alijs uero magno cum labore. Neque tamen id aia de causa accidere manifestum est, quam ex uario, diſpari; egrotantium temperamento: quod non ita ad unguem deprehendi potest, ut certō sciri possit, quando uinitus eorum calor ueneno resistere ualeat. At quauis concedi possit, quod quis adeo peritus ueneficus reperiatur, ut ex longa experientia, ac pariter scientia tam exacte naturam, et robur uitalis facultatis calleat in unoquoque homine, ut conijcere possit, quousque perdurare ualeat, ubi uenenum illi sua arte praeparatum exhibuerit; non tamen propter hoc is determinatē scire poterit diem, neque horam mortis illius, qui uenenum assumpserit. non enim fieri potest, nisi diuino iudicio, aut afflatu, ut aliquis medicus, uel philosophus adamuſim expendere possit, ac metiri, quantum humidi substantifici, quantumque caloris innati in quocunque sit corpore, praesertim quod non semper in eodem statu persistant principes facultates: quo sit, ut quissiam modō plus, modō minus fortis appareat. tum etiam quod corporis temperamentum plurimum immutent causae extrinſecae, quas Graeci τροπαταρχειν uocant. Adde etiamnum quod antidota, quae a medicis huiusmodi uenenatis continūe propinantur, etsi ueneni uim ob sui contumaciam superare nequeant; impediunt tamen, ne id tam breui tempore perimat. Vanum igitur crediderim eſſe, quod internas nostri corporis facultates, ac functiones possint (ut quidam rentur) iudicio duntaxat ita exquisitē expendi, ut lance expenditur crocus. Atqui scire etiam oportet, quod etsi hoc magna ex parte euenire possit naturae ipsius robore, in hoc magis, in illo minus existente; eo etiam tamen prouenit, quod aliqui consent arterijs, quibus uenenum in cor fertur, admodum angustis, alij contra admodum amplis. Namque uenenum ubi uias latas expeditasque inuenit, non solum celeriter permeat; sed longē etiam facilius una cum aëre prouebitur, qui cordis refrigerio continūe ingreditur. Id quod his minime contingit, qui propterea quod cor minus calidum obtineant, arterijs potiuntur longē angustioribus, quin et spirituum uitalium facultatem ualde imbecilliore habent. Quocirca Galenus tum tertio simplicium medicamentorum censu, tum libro secundo de alimentorum facultatibus, tradidit cicutam hominibus in cibo lethalem eſſe, sturnis autem nutrimentum. Quandoquidem hi arterijs adeo angustis praecclusisque constant, ut nullo pacto per eas ad cor lethalis cicutae uis, progredi possit. quanquam hoc de frigidis potius, quam de calidis uenenis intelligi debeat. Huc illud scitu dignum accedit, quod persuasum difficillimum est, uenena, quae ab impijs ueneficis in diem exhibentur, alterius generis eſſe ab his, quae suarum tantum qualitatum excessu perimunt. Nam quae propria forma ac ui necant, in minima etiam quantitate exhibita (ut Galenus inquit) difficilē cobibentur, quin breuissimo tempore lethale munus obeant suum. Non desunt tamen, qui pro certo affirmant, quaecunque uenena adeo reperari posse, ut illa celerius, haec tardius interficiant. quibus equidem refragari non ausim, cum sciuerim admiranda admodum eſſe secreta naturae.

Vtrum quis assueſci possit, ut uenena innocuē sumat.

Queri praeterea solet, num fieri possit, ut quis ita ueneno assueſcat, minimū quidē de eo quotidie assumens, ut eo tantum innocuē nutriatur, quemadmodum Ruſi testimonio scribit Auicenna, olim puellam nutritam eſſe ueneno, ea tantum ratione, ut reges quosdam, et principes (quod formosissima eſſet) qui secum rem haberent, inficeret. Quia in re dixerim ego, quod etsi non desint, qui hoc fieri posse asserant; nunquā tamen ipse adduci potero, ut credam humanum corpus nutrirī posse ueneno, et praesertim napello, quo plerique rem exponentes eam puellam nutritam eſſe interpretantur. Siquidem ea historia Arabicis potius fabulas imitatur, quam rem aliquam, quae omnibus naturalis philosophiae rationibus comprobari possit. Quamobrem constat Gentilem Fulginatam in hoc Auicennae loco aduocam quidem fuisse, ut hanc opinionem seruaret integram. quod nimirum fidelis cuiusque expostitoris eſſe debet. Nam postquam eam sententiam ualidis, uerisque rationibus primū improbaſſet, denuo (ut assolent) Auerrois, Diniq; auctoritate innixus Auicennae, et Ruſi opinionem probare non dubitauit quibusdam argumentis, quauis nudis, et infirmis.

Quorum

Quorum illud uidetur fortius esse, ubi authoribus magis, quàm rationibus addictus inquit, Aequum non esse, quòd auctores tam graues, tamq; sapientes, mendaces uocentur, uanq; habeantur. quippe quòd certo crediderit ipse Gentilis Rufum, itemq; Auicennam in ueram historiam hanc rem recepsisse, non autem in fabulam. Sed quoniam superuacaneum duco in hoc contere tempus, longa contradicendi oratione, præsertim quòd uenenorum medela ea nullam aut parum afferat utilitatem; ideo relictis alijs in Galeni sententiam facili deuenio. Qui tertio simplicium medicamentorum censu cap. xviii. tradit uenena calida, & sicca (qualem esse napellum, quo puellam illam nutritam uolunt, non ambigo) nullo modo posse in nutrimentum redigi, etiam quòd in quantitate minima sumantur: tametsi frigida uenena quandoq; in alimentum uertantur. Quandoquidem hæc (ut idem author est exemplo cicuta, papaueris, hyoscyami, & mandragoræ) non sui natura interficiunt, sed qualitate duntaxat frigida. Quibus adiicit ipse Galenus historiam anis cuiusdam Atheniensis, quæ cicuta in cibo sumebat nullo sanè detrimento accepto. Ea enim (ut idem scribit) modicæ primùm quantitati assuevit, mox indies pluri, donec ex magna etiam quantitate, quæ illi in nutrimentum conuertebatur, nullam percipiebat noxam. Ex quo palàm fit, Galenum non admittere, quòd uenena calida nutrimento esse possint. Id quod minus etiam illis concedit, quæ propria specie, aut occulta causa, ueneri naturam sortiuntur. Inter quæ principem locum obtinet napellus. Quare longè aberrant nonnulli interpretes, utpote qui illud napello tribuant, quod planè cicuta reddidit Galenus: itaq; fit, ut (quæ eorum inscitia est) historiam hanc confundant, Galeni uerba peruertant, atq; rem malè interpretentur. Quo etiam in errore deprehenditur Auicenna: nisi interpreti error fuerit adscribendus. Quòd postremò ueneri facultas (ut quorundam opinio est) iam concocta, & in illius adolescentule substantiam conuersa, potuerit ex anhelitu in alios transire, ac eos subinde inficere, sanè perridiculum uidetur, atque euidentius falsum, quàm ut pluribus explodi mereatur. Ceterum quoniam non desunt animalia, quæ natura cibis uictitant uenenosis, atq; ex eis nutrimentum capeffunt, sicut (Galeno auctore libro xi. de alimentorum facultatibus, & xiii. simplicium medicamentorum) sturni cicutam depascuntur, & coturnices ueratrum, & ut nos quoq; quotidie uidemus, anates, quæ in stagnis, & paludibus uiuunt, bufones aquaticos deuorant, & iisdem nutriuntur, ciconiæ uenenosis, & mortiferis serpentibus, & gallinæ interdum scorpionibus, araneis, serpentibus, & alijs id genus uenenatis animalibus; ideo inutile non fuerit scire nunquid huiusmodi animalia, quæ uenenosis uescuntur, ab hominibus cibo accepta, inde uenenum inferant, eoq; inficiant. Hac in re plerosq; inuenio, imò ferè omnes recentiores, qui de ueneris scripserunt, firmè asserere, quòd si huiusmodi animalia edantur, non modò ueneno non inficere possunt, sed nullam prorsus inferre noxam: quin potius corpus nutrire, non secus atq; alia. quippe quòd constat (ut dicunt) ea in suam naturam uenenatos cibos reddere. Quæ ratio, & opinio etsi non absurda, neq; incongrua uideatur; tamen crediderim, quòd licet uenenum concoquatur, et transmutetur in eorum animalium substantiam, quorum id perpetuus cibus est, non tamen esse possit, quin caro quæ ex eiusmodi fit alimento, si edatur, omni prorsus careat nocumento. Quinimo putauerim, quòd si ea in frequentiore cibum uenerint, possint quandoque morbos seuissimos excitare, & subinde necem inferre. Siquidem huius rei nobis testimonium præbent Dioscorides, & Galenus. quippe qui pariter affirmant hac, quòd nil aliud est, quàm sanguis his coctus, ex animalibus emunctus, quæ scammoniam, aut ueratrum, aut tithymalum depascantur, potum mirificè uentrem deijcere. Ex quo omnibus perspicuum est, quòd omnes in uniuersum plantæ, quibus uis deiectoria, & perniciosa inest, quanuis sæpius concoctæ fuerint, non prorsus tamen suam deijciendi, ac necandi facultatem deperdunt. Id quod similiter manifestum deprehenditur in turdis, qui iuniperi bacis uescuntur: item in gallinis, quæ deuorant absinthium. Quandoquidem illorum caro iuniperum non mediocriter redolet gustatu: harum uerò non parum absinthij amaritudinem refert. Ab his itaque edocti medici diligentissimi mandant nutriendas esse capellas herbis accommodatis, ubi animus fuerit earum lac exhibere hæticis, aut alijs alio morbo affectis, quibus tamen conueniat. Hoc quoq; testatur Galenus de uipera sermonem habens libro xi. de simplicium medicamentorum facultatibus. Ibi enim de dipsade differens, se non ignorare memoriæ prodidit, animantium carnes alterari à cibo, & alimento, quod capiunt. Quare ut summam quod sentimus dicamus, nullo modo huiusmodi animalia in cibos admittenda esse putauerim, quanuis à nonnullis frequenter recipiantur. Illud porro sciendum relinquitur, quòd nonnunquam uenena, quin & medicamenta uenenata tam interius sumpta, quàm exterius apposita morbis succurrunt, qui aliud curationis genus non admittunt, interdum etiam aduersus alia uenena theriacæ uiscem suppleunt. Nanq; aperte uidemus, quòd ubi quispiam afficiatur diuturnis uigilijs, aut suffocanti destillatione, aut mensium profluuio, aut dysenteria, aut coli dolore, aut renum, aut uteri, ubi alia non contulerint medicamenta, si opium, mandragora, hyoscyamus, uel antidota aliq; composita medicamenta, quæ hæc exceperint (sunt enim talia in officinis semper parata) exhibeantur, sæpenumero egros à morte uindicant. Quemadmodum etiam si scammonium, colocynthidis, turpetum, ueratrumq; & alia id genus deijcientibus pharmacis addantur. Nam quanuis hæc omnia malefica qualitate polleant; in contumacibus tamen morbis & curationi refragantibus, tantam afferunt utilitatem, ut ægris deperditam ferè salutem reuocent. Cantharides præterea ad morsus canum rabidorum utilissimè exhibentur. euphorbium scorpionum ictibus medetur, & scorpiones ipsi suis ictibus remedio sunt. Sicut etiam uipera, dempto capite, & cauda, contusa, & imposita suos sanat morsus, ut latius infra suis locis dicemus. Sed priusquàm ad particulares curationes descendamus, differemus Dioscoridem secuti, quomodo, quòue artificio à ueneno ij præseruari possint, qui perpetuò ueneri timore premuntur. Quin & rationem docebimus succurrendi ijs, qui iam uenenum hausissent. Atq; hæc omnia præstantiora remedia asseremus, tam quæ simplicia sunt, quàm quæ composita, non solum à ueteribus inuenta, atq; experimento comprobata, sed etiam à clarissimis quibusdam recentioribus. De quibus probatis antidotis, etsi pollicitus sit Dioscorides se omnino traditurum in ultima huiusce uoluminis parte, pollicitis tamen non stetit, ut xxxiii. huius libri capite conspiciatur, ubi excusatione usus, mutati consilij rationem reddidit. Verum ut iam

Vtrum animalia, quæ cibis uenenosis uictitant, exitio suam uim reuocant.

Veneri quandoq; morbis, & alteri ueneri no remedium est.

Modus præca-  
uendi uenena-

Præcautio vul-  
garis explosa.

Absurda quo-  
rundam opi-  
nio.

Quæ res ve-  
nena prodit,  
quæq; suspen-  
se eisdem ad-  
uerſentur.

iam ad rem nobis propositam accedamus, primò modum aperiam, quo homines suspiciosi ueneficia præcauere possent. Pleriq; igitur sunt, qui putant, non paruam esse principibus cautionem, mandare ministris, ut edulia, quæ præponuntur edenda (mos iste hodie frequentissimus est) prius degustent. Quæ tamen res in suspitione ueneni tribus manifestis de causis nihil, aut parum æstimanda uidetur. Siquidem si pincerna, siue qui cibos suis dominis apponunt, ueneficium committere decreuerint, se ipsos faciliè prius præparare possunt ualentissimis antidotis, ueneno illi accommodatis, quod exhibere in animo est. Vnde sibi ipsis præcauebunt, dominum autem interficient. Ex quo satis liquet nihil prodesse ad præcauendum, quòd pocillator in seruatu fidei signum domino præbeat, et eduliorum dissector præcomedi. Adde deinde, quòd quauis ille, qui edulia ministrat, mensæq; apponit, à coquo ueneficium faciente deceptus, cibos uenenatos prægustando assumat; eorum tamen adeò modicam quantitatem prægustat, ut nullam, aut paruam eo temporis momento possit molestiam percipere. Vltima accedit ratio, quòd ferè omnia uenena, quæ ut interimant cibarijs admiscantur, ea arte, eoq; ingenio parata sunt ab impijs, et scelestis ueneficis, ut non nisi temporis intervallo suum triste perficiant opus. His igitur de causis illud liberè proferre non dubitauerim, quòd nullam meliorem, ac tutiorem præcautionem sibi comparare possunt principes, quàm curare, ut uitam christianam, et integram ducant, iustitiamque regant, ita ut populi eos uenerentur, pariter et timeant. Current deinde, ut ministros habeant, quorum manibus edulia administrantur, non ignobiles, nec obscuro loco natos, sed præclara è stirpe genitos, fideles, nec auaritiæ addictos, neque inuidos, et qui diu antea uita ac moribus probati sint. In quos præterea debent frequenter non paruam conferre beneficia: ita enim semper gratos et fideles ministros habebunt. Quin et medicos sibi adiungant, qui medicæ materiæ peritissimi habeantur, ut antidota, quæ contra uenena parantur, quemadmodum sunt theriaca, et antidotus Mithridatica, ex legitimis, non ex adulterinis simplicibus medicamentis, per se ipsos (ut ipse faciebat Galenus) componere ualeant: nam si hæc legitime parata fuerint, haud dubie poterit unusquisque faciliè uenena præcauere. Ex his certè maius percipient emolumentum, quàm si mille alijs præcautionibus uterentur. Nec minor sanè cautio adhiberi debet, ut uasa ex auro et argento conflata, munda, nitidaq; seruentur, et hominum fidelium manibus committantur. quandoquidem in eiusmodi pretiosis uasculis, quorum apud principes quosque præcipuus est usus, uenena facilius abduuntur, quàm in uitreis aut fictilibus uino circumlitis. Sunt nonnulli ex recentioribus, rerum prorsus imperiti, qui (si uerum fateri liceat) eò dementiæ deuenerunt, ut præceperint in liquatione igne aurum, uel argentum, ex quo uasa confici debent, theriacam, aut Mithridaticam antidotum, et alia adiungi debere, ut ascita inde antidoti facultate, uenenis repugnent. Sed quàm absurda, ridendaq; sit horum opinio, ij diiudicent (ea enim est, quæ non indigeat clariori reprobatione) qui mediocrem etiam rerum naturalem, ac metallorum præcipuè peritiam sunt affecuti. Ceterum suppellectilium non negligenda cura, ut scilicet uasa, quibus ciborum condimenta reponuntur, clausa, et cooperta seruentur, ut neq; aranei, neq; scorpiones, nec aliquid vitulentium reptile, uel insectum ingredi possint. Admonet Dioscorides, ut etiam uasa uinaria diligenter clausa custodiantur. namq; uiperæ summo uini anore alliciuntur, quæ si uasa aperta offenderint, eò faciliè contendunt. Quo fit, ut interdum bibendo exitiosum uirus eructent, interdum uerò in uino immerse expirent. Quamobrem Aristoteles libro VIII. capite IIII. de historia animalium, quosdam uiperas uino in fictilibus ad sepes disposito uenari, et eas ebrias capere, memorie prodidit. Galenus item libro XI. simplicium medicamentorum, eam narrat historiam, quam nos libro secundo in uiperarum mentione retulimus. nempe de illis uiperis, quæ sponte se uino immerſerunt, unde etiam sibi mortem conscuerunt. Quo uino duos homines elephanto affectos sanitati restitutos esse, idem est author. Quibus ex uerbis palam est Galeni testimonio, uinum in quo sint extinctæ uiperæ, noxium non esse. quin potius adeò salutiferum, ut efficacissimè elephantiæ sin curet. Quod tamen Dioscoridis sententiæ refragari uidetur. nisi dicamus uiperarum uenenum elephanto laborantibus præstans esse auxilium, cæteris autem exitium. Qui item in ueneni suspitione uersantur, cibos uitare debent, qui candido, uel oleraceo colore fuerint: necnon etiam ab his abstinere, qui ex animalium sanguine parantur. Siquidem albedine, uenena quedam metallica faciliè occultantur: cibis herbaceo colore, uaria lethales plantæ commodè admiscantur: sanguini etiam animalium, quibus uescimur, commodissimè uenenatorum sanguis inseritur. Illud etiãnum apprimè utile atque necessarium esse duco, ut coqui, et reliqui culinae inservientes, non modò fideles sint, et incorrupti; sed etiam mundi, cauti, ac providi, ne ullus ueneficorum insidijs relinquatur locus: tam etiam ut sciant rectè diligenterq; custodire cibaria, uel aliud unumquodq; quod in ciborum usum reponitur. Sed præcipuè diligenter animaduertant, ne in culinaria uasa, quæ super, uel circa focum edulij reserta resident, uenenatum aliquod animal à tecto per caminum decadat, ut quidam exigui aspides, qui sub tectorum tegulis, et contabulamentis se recipiunt, phalangia, stelliones, scorpiones, et similia. Namq; Florentiæ (ut Nicolaus est author) cœnobium monachorum ueneno infectum est, quòd araneus niger admodum in olla decidisset, dum coquerentur iuscula. Ad hæc principes maxime current oportet, ut per quàm fideles habeant cubicularios. Nam (ut superius dictum est) quodam ueneni genere cubilia, interulæ, cæteraq; uestimenta infici possunt. Quare nonnulli facere solent, ut diu, priusquàm uestes induant, eas manibus pertractent serui. Quin et pueris similiter iubent, ut sæpe equis insideant, ijs super sellis, quibus ipsi uti consueuerunt. Tum etiam stabuli præfectis mandant, ut tam cautè sellas, habenasq; recondant, ut ignotis, et his quibus fidendum non sit, eas non intueri, ne dum tangere liceat. Insuper illud scire conuenit, quòd quedam res simplices sunt (ut pleriq; inculpatæ fidei medici fatentur) quæ sua peculiari naturæ dote præſens uenenum signis manifestant. Inter quas cornu, seu lingua, quam serpentis linguam uocant, refertur, quæ (ut Conciliator Petrus Aponensis tradit) præſente napello, aut uipera, aut pardi felle, exudat: quod tamen non prodit, cæteris uenenis præſentibus. Sunt alij, qui pro certo tradunt, præſium lapidem, quem Plasma uulgus appellat, statim splendorem amittere, ubi in præſentia ueneni cuiusq; fuerit. Addunt præterea, quòd si lapis raneæ terrestris anulo aureo inseratur, ita ut is digiti

in is digiti carnem contingat, quàm primum præsenserit adesse uenenum (si credimus his, qui hoc scriptum reliquerunt) tantum digitum afficit caliditate, ut carbonem accensum, ipsumque digitum urentem prae se ferat. Quibus sane etsi parum, mea quidem sententia, sit adhibenda fides; ea tamen, quò omnibus satisfiat quantum potest, non duci silentio desimulanda. Non desunt etiam, qui contra lethalia uenena pollere contendunt sigilla quaedam, siue characteres, siue imagines, quomodocumque eas appellare libeat, præcipue si collo suspensa gestentur, uel digitorum anulis inserantur. Quocirca prodidit Albertus libro imaginibus dicato, quòd si Serpentarij imago cum suis stellis cuius lapidi pretioso insculpatur, eam utilissimè gestari aduersus omnia uenena, eaq; præsertim, quæ uenenosorum animalium ictu uel morsu relinquuntur. Proinde Petrus Aponensis scriptum inuenisse tradidit in quodam libro, quem reges Persarum olim habuisse refert, quòd si in hematite lapide sculpatur homo genibus flexis serpente cinctus, cuius caput dextra teneat, caudam uerò sinistra, et lapis ille anulo ex auro purissimo confecto inseratur, gestu hominem à quocumque ueneno tueretur. Quæ imago si modò aliquem præberet effectum (non enim hac in re cerui quicquam proferre ausim) mea fert opinio, quòd tempore, quo sculpitur, necessaria sit quarundam stellarum observatio, à quibus ea uis insinuat in sculptam imaginem. Porro tradidere sapientum ueterum nonnulli, reperiri pretiosos lapides, quibus solis à natura largitum est, ut uenenorum malitiam efficacissimè dissoluant, et destruant. Ob id uaq; scriptum reliquit Albertus cognomento Magnus adamantum orientalem gestatum brachio sinistro inter humerum, et cubitum adnexum, omnium uenenorum uim demoliri. Id quòd etiam tribuit achate, hyacintho, et sapphiro orientali. Alij eandem facultatem assignant smaragdo, alijs lapidi, quem in capite draconum inueniri tradunt, unde draconitis nomen accepit. Ceterum (ut ingenue fatear quòd sentio) parum fidendum esse crediderim his suspensionibus. quippe quòd nunquam uiderim huiusce rei experimentum tam clarum, ut sincera fides adhiberi possit: quanuis illud facilius persuaderi possum, quòd smaragdus, hyacinthus, achates, sapphirus lapides in tenuissimum puluerem redacti, possint per os sumpti ueneno infectos sepe liberare: utpote qui eam sortiuntur naturam, ut cordis uiribus subueniant. Sed quòd gestati lapides ueneni assumpti uim, atq; actionem uibere ualeant, non ita facile adduci potero, ut credam, sicut credunt aliqui, et ita imaginantur esse; nisi prius notabile ex his experimentum uiderim. Nemo præterea non poterit (ut in hac præstatione scriptum reliquit Dioscorides) innoxia irritaq; uenena reddere, si medicamenta tam simplicia, quàm composita presumpserit: quæ uiribus præstantissimis polleant, quibus post assumpta uenena facile ualeant superare. Simplicia autem medicamenta Dioscoridi comprobata, sunt caricæ cum uiglandibus nucibus esitate, citris mala cruda manducata, napiq; semen ex uno potum. Item calaminthæ folia, et Lemnia sphaeragis, quam summis laudibus extulit Galenus: sed quæ pro singula uice drachmæ pondus non excedant. Idem similiter summis laudibus commendauit rutæ folia, cum nucis uiglandis nucleo accepta, quin et duas caricas, salisq; momentum. Ex compositis autem non immeritò ceteris antidotis Mithridatum antecellere scribit. quandoquidem ex frequenti eius usu (ut ex antiquorum monimentis accepimus, atq; etiam à Galeno libro primo, et secundo de antidotis memoriæ proditum est) usque adeò se innoxium præbuit ueneno Mithridates Ponti rex, ut cum uellet sibi necem ueneno consciscere, ne se Romanis dederet, nullum ex assumpto ueneno percepit incommodum. Quam in re postea Galenus theriacam præstantiorem esse tradidit, asserens fieri non posse, ut ijs uenenum ullum noceat, qui eam quotidie fabæ Aegyptiæ pondo sumere consueuerint, quo modo suo tempore Aurelius Antoninus Imperator facere solebat. Ceteri posteriores, qui Dioscoridem, et Galenum secuti sunt, præsertim Arabes, et ipsi ad idem castaneas plurimum ualere tradiderunt: quin et mespila, pistacia, alium, raphanum, et nuces Ponticas addiderunt, omnibus his tamen optimam theriacam preferentes. Et hæc hactenus dicta sufficiant de modo præcauendi uenena. Reliquum est, ut curandi ordinem, ac rationem ineamus, qua ijs succurrere possimus, qui cibo aut potu uenenum sumpserint. Primum igitur (ut paucis etiam superius dictum est) scire conuenit, quòd ingestum intus uenenum, non statim, ut quidam uolunt, ad cor ipsum contendit, quin prius alias internas partes percurrat, et ledat, et sanguinem inficiat. Sed quia maxima pollet agendi uia ob propriam sui formam, uel temperamentum, quam obtinet atrocissimam, quancunque corporis humani partem contigerit in suam uirulentam conuertit naturam, et ita eousq; procedit multiplicando, inficiendo, atq; sanguinem cum reliquis humoribus in uenenum uertendo, quousq; accessoria quantitate adauctum, cor ipsum attingat, quòd tandem breui tempore in uenentam speciem transmutat. Hinc deinde fit, ut spiritus uitæ fontes, loco proprio ac naturali expulsi, suam sedem cedant ueneno: atq; ita subinde corpus spiritibus, et uita simul destituatur. Illud præterea non ignorandum, quòd arteriæ unà cum cordis uentriculis (quibus natura datus est motus dilatationis, et constrictionis, ut ex illo quidem attrahatur aer circumdans, quo indiget cor ad refrigerandum summum spirituum uitalium calorem: ex hoc autem pars aeris fuliginosa expellitur, pro cordis item refrigerio) quemcunque flatum extrà offenderint, intus attrahunt, ita ut arteriæ, quàmuis minutissimæ, quæ per totum corpus disperguntur etiam sub cute, per meatus quos habent, aerem nos circumdantem attrahant, ipsumque prouehant ad cor, quòd quidem postea per easdem uias calorem fumumque superfluum reiecit. Quo fit, ut si nos circumdans aer fuerit infectus, uenenatus, et perniciosus, ea ratione dicta cor ipsum inficit, atq; corrumpit. Idq; non euenit propterea quòd arterijs atq; cordi natura insitum sit, ut uenenum attrahat, sed quòd aerem continuo inspirent, quo mediantem natura etiam repugnante sua, uenenum quoque trahunt. Hinc itaque est, quòd quidam, dum (ut contingit) somnum caperent sub arboribus uenenatis, ceu taxo ac nerio; uel huius cubaret super plantis noxijs, uelut napello, et aconito; uel propter uirulentorum serpentium specus quiescerent, imprudenter uenenum contraxerunt, non alia de causa, quàm ex aere loca illa ambiente, plantis illis uenenatis infecto, et specu uirulento spiritu. Ceterum iam tempestuum erit ad generalem eorum curationem accedere, qui ueneno infecti sunt, eorūque præcipue, in quibus non adeò manifesta signa conspiciuntur, ut quòdnam sit assumpti ueneni genus, dignosci possit. Nullus itaq; medicus ingenio præditus est, qui non protinus uideat et intelligat ex seuis accidentibus

Præcautio ex medicamentis.

Ratio curandi uenena.

Indicia in  
comune veneni  
sumpti.

tium incommodis, quæ sequuntur, cum quis uenenum cibo, aut potu sumpserit. Siquidem ijs, quæ propria forma agunt (quam etiam proprietatem occultam appellare liceat) statim semper succedit uirium & roboris totius corporis prostratio: ægri ex magna cordis molestia frequenter animo deficiunt: facies liuescit: quin & lingua, & labia nigricant: item extrema corporis, præsertim ungues, plumbeo colore liuescunt. Ad hæc qui hauserint, uertiginosi fiunt, uocem edunt cum murmure, & oculos toruē mouent. His frigidus accedit sudor circa frontem, & temporales erumpens. Quæ omnia assumpti ueneni manifestissimum præbent indicium, maxime autem si statim sequantur post assumptum cibum, ijsq; contingant, qui sibi rectam quotidiani uictus rationem adhibeant. Quandoquidem tam mala esse posset in aliquo uictus ratio, quod humores inde geniti, tractu temporis usque adeo corrumperebuntur, ut contracta ueneni natura, uim nature inferrent, & eadem iam dicta cicerent symptomata. Id quod maxime testatur Galenus libro sexto de locis affectis, tum etiam libro de cibis boni ac mali nutrimenti. Quapropter medicos cautos, ac prudentes esse oportet, quo in huiusmodi accidentibus diligenter singula perquirant. Sua similiter accidentia inferunt, quorum etiam manifesta præbent indicia, uenena illa; quæ suis manifestis qualitatibus agunt. Nam quæ caliditate excedunt, omnia membra interna celeriter inflammant, sitim ingentissimam excitant, oculos inflammatione male habent, inquietudinem continuam inducunt, & continuum sudorem cient. Si uero præterquam quod calido excessu poleant, excellent etiam uim erodendi, tum putrescendi, ut arsenicum sublimatum, auripigmentum, sandaracha, & id genus alia, punctione, atque dolore intolerabili uentriculum & intestina afficiunt, in quibus etiam frequenter murmura sentiuntur. Hæc autem accidentia sæpe sequuntur uomitus, fastidia, sudores modo calidi, modo frigidi, uarie deniq; coloris mutationes. Quæ uero nimia frigiditate excellunt, plerumq; somnum inferunt adeo profundum, ut sæpe non sine magno labore excitari possint affecti. Nonnunquam uero cerebrum obstupesciunt, ita ut affecti cogantur quam plurimos incompressos edere motus, tum corpore toto, tum etiam oculis, ore, manibus, reliquisq; corporis partibus, non secus ac si stulti facti essent, uel temulenti. Huc illa præterea accedunt, frigiditas scilicet totum corpus occupans, frigidi sudores, & color in facie luividus admodum, & terrificus. Ad summum totum corpus torpidum efficitur.

Ex siccis autem uenenis lingua arefcit, guttur siti inextinguibili afficitur: aluius adstricta redditur, ægre redditur urina: omnia deniq; membra fiunt arida, & uigilie instant longissime: Postremo hionida inexpugnabilem somnum adferunt, alui fluxiones, articularum, neruorumq; luxationes. Ita quod quandoq; oculorum nerui, ac nexus in tantum laxantur, ut sponte sua e cavitatibus exeant, capitiq; propendant. Plerumque etiam extremæ corporis partes putrescant, ut in precedentibus dictum est: Porro & illud adnotandum est, quod uenena quæ & manifesta, & occulta qualitate agunt, si fuerit hæc uiribus altera imbecillior, in fine sue actionis eadem pariunt accidentia, quæ proueniunt ab his, quæ occulta duntaxat proprietate munus suum obeunt: Vis etenim qualitatum elementarium, quæ illis inest, uim illam propriam occultamq; quam hæc pariter fortiuntur, antecellit. Proinde primum qualitatis elementaris excedentis effectus præbent, eosq; subinde, qui propriæ eorum formæ attribuuntur. Sed huius rei clariore notitiam trademus, ubi speciatim singulorum meminerimus. Hæc igitur sunt omnium uenenorum indicia uniuersalia, cæteris quæ explicari possint, certiora, ac manifestiora: quibus peritissimi medici tuto diiudicare possunt. Nam cum constet accidentia prædicta non solum perdurare; sed etiam augeri, ac continue in deteriora labi, nulloq; modo accilijs cedere, neq; nature repugnanti obsequium præstare, clarum profecto mortis indicium est. Contra salutis, si quando remitti accidentia, & ægri melius habere uidentur: Cæterum eorum, qui uenenum sumpserint, cibus esse debet (ubi tamen remedia, quæ postea dicentur adhibita fuerint) ex his rebus quæ non solum uim habent nutriendi corpus, sed quæ etiam uenenorum noxiæ resistere ualent. Quo in genere lac asinum summopere laudatur: item caprinum, ouillum, bubulum; atq; etiam humanum, præsertim si recentem emunctum bibatur. quanquam lac omne efficacius exhibetur contra uenena calida, & erodentia, quam ad reliqua ueneni genera. Ad hoc & butyrum facit. Faciunt & iuscula tum caninum pinguium, tum piscium, quibus addi possunt; ut pinguiora reddantur, butyrum crudum, & pinguedo animalium, quorum est usus. Siquidem pinguia hæc ideo conueniunt, quod uias obstruant, ex quo ueneni transitus inhibetur. Quinetiam ubi uenena excalfaciunt, & erodunt, pinguia hæc acrimoniam eorum bebetant. Idcirco hoc in casu, animalium cerebrum, atq; osuum medullæ aptissime pariter censentur. His similiter herbe quam plurimæ opem ferre possunt cibis admixtæ: e quarum numero probatur calaminta, origanum, serpyllum, sisymbrium, ruta, buglossum, echium, filipendula, sonchus, pimpinella, aliæq; quam plurimæ: quarum uim uenenis, superioribus libris, aduersari retulimus, quarum etiam catalogum paulo infra recensebimus. Locus deinde, in quo residere debent, qui uenenum sumpserint, lucidus sit oportet: ubi aer quoq; sit nulla mala qualitate affectus. Pareatur autem eorum cubiculum odoramentorum suffitu, quibus uis inest propulsandi uenena. Id enim præstant santalum omne, myrrha, styrax, aloë, laserpitij lacryma, agallochum, scordium, cassia odorata, citrei mali cortex, iuniperi bacca, eiusq; lignum siccum, &

Victus ratio  
eorū, qui uenena sumpserunt.

Remedia contra uenena.

id genus plura. Insuper affecti ueneno (Galeno auctore libro secundo de antidotis) nihil aut parum dormire sinantur. Somnus namq; uenenum retinet in internis partibus, et facilius ad cor deducit. Contra uero uigilie, quippe quæ id à centro ad corporis superficiem, nempe ad externas partes, retrahunt. His ita institutis in primis omni industria, ac diligentia curandum est, ut deuoratum uenenum foras exhauriatur. Quia in re nullum sanè ualentius auxilium perhibetur, quam ut sine ulla mora ægri uomitum ciere cogantur: si tamen uenenum adhuc in uentriculo resideat. Quod si iam in intestina descenderit, illud quam primum clysteribus infusis extrahatur. Atqui in hoc omni diligentia ordinem ac modum inire debemus, quem in huiusce uoluminis præfatione nobis reddidit Dioscorides. Siquidem is de hac re ita exquisitè disseruit, ut posteriores omnes omnia ferè quæ de ea scriptis tradiderunt, illi accepta referre possint. Verum hoc unum ipse addiderim, quod si forte is, qui uenenum sumpisset, ex omnibus uomitum cientibus auxilijs uocem nequiret, tunc (ut Rasis auctor est) medicamentis soluentibus, itemq; clysteribus erit procedendum. Medicamentis



menta autem, quæ dieictoria potiuntur facultate, ad hoc idonea sunt agaricum & rhabarbarum. Quandoquidem utrunque præter quàm quòd dieictoria ui præditum est, facultatem etiam uenenis maximè repugnantem sortitur. Id quòd etiam quidam minori centaurio attribuant. Neque prorsus ab re esset ad idem Aegyptiæ filiquæ atram medullam, aloemq; usurpare. hæc namq; præter dieictoriam facultatem, seorsum plurimum pollet aduersus humorum putredinem, quæ semper, uel plerumq; ingesta sequitur uenena: illa uerò quòd aluum mirificè emolliat, uenenum uentriculi tunicis adherens abluat & abstergit. quin & erodentium acrimoniam obtundit, et ea deniq; per aluum secum educit. His autem peractis, ea certè clysmata competere uidentur (ut Dioscoridi placet) quæ acris sunt & trahendi ui prædita. Quibus si ea successerint, quæ è iuribus pinguibus, adipe, aut pinguedine, aut butyro, aut lacte parantur, ne ulterius uenena penetrent, ut in dysenteria fieri solet, nequaquam ea inutilia fore putauerim, præsertim ubi

10 compertum haberetur, uenenum intestina exulcerasse. Quamobrem lac copiosius epotum post uomitiones, & clysteria utilissimum esse prodidit Auicenna: nempe quòd ueneni noxiam frangat, & sanet. Quinetiam summopere prosunt, præmissis tamen uomitionibus, & clysteribus, fortes, ac ualide diuersiones: utpote quæ non mdo prohibeant ne uenenum petat cor; sed etiam ipsam trahant à membris nobilibus internis, ad ignobilia externa. Ob idq; plurimum prodesse crediderim cucurbitulas, si ex igne natibus, & crurum pulpæ applicentur. Ferunt similiter opem frictiones ex asperis linteaminibus, quin & fibula stricim factæ, ita ut dolorem excitent, manuum, pedumq; digitis, item brachij, & cruribus. Mirificè etiam uenenum auertitur à partibus intrinsecis, si patientes in balneo aquæ calidæ ex medicamentis accommodatis confecto, uel in laconico sicco sudorem ciente imponantur. Quandoquidem huiusmodi calor extraneus efficacissimè uenenum ad cutem trahit. Balnei ac laconici uicem illud sanè supplere poterit, si dissectio uiui muli, aut equi alio exertis statim intestinis, eger in animalis cadauer intromittatur: & cum refrixerit cadauer, idem etiam de alio fiat, quousq; sat fuerit. Ad hoc autem muli, mulæq; (ut uulgi fert opinio, fortasse quòd hæc animalia plurimum caloris habeant) ceteris præpollent animalibus. Hoc enim auxilio à ueneno liberatum narrant Valentinum Alexandri sexti summi Pontificis filium. Is enim (ut ferunt) cum in quadam cœna aliquot Cardinalibus uenenum exhibere uellet, sibi ipsi, ac patri id imprudenter exhibuit. Ceterum scire etiam conuenit, quòd quamuis prædicta remedia omnia communiter uenenis opitulentur, non propterea est dimittendum, quia continuè infectis propinentur omnia probata antidota, tam simplicia, quàm composita, quæ cuiuscumq; ueneni noxam auferre possunt. Simplicia quidem medicamenta, quæ ad hoc idonea Dioscoridi, reliquisq; Græcis posterioribus celebrantur, sunt uinum uetus copiosius epotum, Lemnia sbragis, agaricum, abrotonum, irio, eryngij radix, napi & pastinacæ semen, calamintha, nardum Celticum, castorium, ferule uiuentis medulla, flos rhododendri (quanquam is Galeno, alysq; ipsum secutis in antidotum minimè recipiatur, sed potius inter uenena annumeretur) succus marrubij, laserpitij, & panacis, sagapenum, aristolochia longa, semen rutæ syluestris, betonica, pix liquida delincta, polij, et fefelis decoctum, pbu, cinnamomum, cassia, iuniperi baccæ, citria mala, & quæ limonia, & aurantia uocant, & corum semen. Item glandes, præsertim quernæ ex humano lacte epotæ, quinquæfolij radice succus, leporis coagulatum: mustellæ caro sale inuncta, & in umbra siccata, cum uino pota, lac canis ex primo fetu acceptum, capparis, chamæleonis albi radix, apij decoctum, polemoniæ radix, tribuli terrestris succus, smilacis asperæ acini, scordium, thlaspi, & Cretense dictamnium. His Arabes, & recentiorum nonnulli castaneas addunt: item ponticas nuces, messila, pistacia, zedoariam, lauri baccas: gentianæ radicem: quin & dictamni albi, tormentillæ, iridis Illyricæ, hastulæ regie, helenij, & millefolij, rhabarbarum, hederæ corymbos, bolum Armenium, hypericum, sabinam, muoniam, pimpinellam, Imperatorium, centaurium maius, angelicam, uerbenacæ succum: mures, qui napelli radices depascuntur, & muscas grandiores, quæ eius folijs uiscitant, filipendulam, carpobalsamum, muscum odoratum, ambarum, os in corde cerui reperi-

40 tum, & ceruinum cornu, quin & monocerotis, ursi testes, & arietis, origanum, smaragdum, lapidem bezabar, & carduum, quem sanctum, uel benedictum appellant. Et hæc de censu omnium simplicium medicamentorum, quæ contra uenena pollent, quæ nobis tum ueteres, tum recentiores scripta reliquerunt, dixisse sufficiant. De compositis autem medicamentis illud proferre non dubitauerim, quòd si theriaca legitime parata reperiretur, non essent aliunde petenda auxilia contra uenena. Sed quoniam mihi planè difficillimum esse uidetur, ut ea reperiatur, quæ quemadmodum eius exigit apparatus, confecta sit, cum nobis desint cinnamomum, balsamum, petroselinum Macedonicum, myrrha, folium, chalcitis (quam tamen iam nobis compertam putamus) anomum, aspalathus, & calamus odoratus, quæ omnia per quàm maximam sunt momenti; idcirco nunquam adducar, ut credam uenalem theriacam posse sibi locum & usum illius antiquæ legitime uendicare: præsertim cum constet tempore usq; Galeni, quo Romani summo imperio potiebantur, theriacam omnibus numeris absolutam confici non potuisse (ut ipse Galenus testatur libro primo de antidotis) nisi ab Imperatoribus. quanquam non deessent tempore Antonini Cesaris diuites primates, qui eam conficerent, etiam quòd multa eis desiderarentur. Quare illud dixerim, quòd si ulla theriaca ex ijs, quæ nostra etate conficiuntur, in usum admitti debet, dent operam medici diligentissimi, ut illa saltem utantur, quæ omni studio ac diligentia parata sit, clarissimorum & peritissimorum uirorum testimonio: quæq; eo modo experientia comprobata sit, quo docet Galenus libro quem ad Pisonem scripsit: quin & alio, quem Pambiliano dicauit. Hoc item faciant de Mithridatio, quod nihil minus quàm theriaca præstat aduersus uenena, quodq; & facilius parari potest. Quia in re caueant homines ab adulteratis theriacis, quas in publicis foris uendunt circulatores, etsi plerumq; ab his, quos eorum adulteria fraudesq; latent, ceteris meliores, atque efficaciores habentur: quippe quòd nihil ultra uideant astantes, quàm quòd ij frustum integrum arsenici, uel risagalli officinis uocati, deuorent: quodq; subinde deuorata theriaca, quam postea circumstantibus uendunt, nullum ueneni incommodum sentiant. Quod cum Galenus optime nouisset, libro Pisoni dicato, ita scriptum reliquit. Multæ à subdolis improbisq; in hoc quoq; fraudes sunt, ac uulgus sola an-

Simplicia medicamenta, quæ pollent aduersus uenena.

Cōposita medicamenta.

Fraudes, quibus vritur circumforanei, qui venena innoxie sumere possint.

Altera impostorū fraus.

Historia fraudis.

tidoti opinione deceptum, ab ijs quibus ars est mercenaria, plurima pecunia medicamentum, uel prauè confectum redimit. Ceterum ut quisq; flagitiosorum impostorum fallacias, et dolosas merces evitare possit, et debeat, nunc mihi in animo est ad commune rei publicæ beneficium eorū ingens, ac scelestum facinus posteritati prode. Nam cum isti suggesta ascendunt coram populo, quem doli capere intendunt, ostensuri quod uenenum aequè ac panem innoxie sumunt, multis cauillationibus, atq; insidijs utuntur. Inter quas has duas habent fraudes, quas modò omnibus aperiam, quasq; retinent illi in suos chariores (ut ita dicam) lenones. Primus itaq; dolus, quo nituntur huiusmodi fraudulentis impostores, est quod cum sciant uenena non posse nisi parum nocere, ubi uenterculus fuerit cibus ualde repletus (ut in præfatione huius libri tradidit Dioscorides, et libro quarto sen. sexta retulit Auicenna) priusquam suggestam ascendant, ad saturitatem usq; præsertim æstate, lactucas crudas deuorant sale, aceto, et oleo conditas: uerum olei tantum imponunt, ut fere in eo inuolent lactucæ. Et quia hyeme, maxime urgente bruma, tcnellæ lactucæ difficile passim inueniri possunt; ideo earum uicem his præbent interanea bouum præpinguium, quorum tantam comedunt copiam, quoad uenterculus ueluti tympanus extendatur. Id autem eo consilio faciunt, ut hæc quidem iurium pinguedine, eorumq; substantiæ crassitudine, illæ uerò frigiditate sua, oleiq; multitudine, quam illis adijciunt, præterquam quod ueneni penetrationem inhibent, cum internas uias obstruere possint, erodentem quoq; ingestis arsenici, uel risgalli seplasijs uocati, acrimoniam obtundunt, et hebetant. Cum igitur uenenum sumpserint, quod illis ob præassumpti alimentum uim, nullam, aut paruam noxam adfert, nempe quod uenterculus sit tensus, et pinguedine imbutus, mox suam adulteratum antidotum, quod omnino legitimam theriacam mentitur, assumunt, idq; impune. Quo fit, ut facile postea populo astanti persuadeant, id esse antidotum omnium præstantissimum contra omnia uenena, quod in uniuerso orbe reperiri possit. His leues uulgi animi persuasi accensiq; maiori multitudine, ac impetu feruntur, ut adulteratam, inualidam, ueramq; mentientem theriacam emant, quam ij qui in maxima annonæ penuria eò cateruatim concurrunt, ubi plurimum panis gratis omnibus exhibetur. Itaq; cum temporis momento capsulam hac impostura exhausserint, statim è suggesto descendunt circumforanei, seseq; in hospitium recipiunt, ubi cum primum fuerint, arsenicum paulò ante sumptum unà cum lactucis aut bubulis interaneis arte quadam euomunt, neq; aliud illa die assumunt, quam lac, quod tamen sæpius alternatim potant, uomuntq; et reuomunt. tantum potest in improbis hominibus auri cupiditas; ut sponte consultoq; in manifesta uite discrimina ferantur. Fraus altera, quam isti facinorosi perpetrant, ita se habet. Si una, aut duabus horis anteaquam suggestum ascendant, in foro pharmacopolium petunt, illudq; foro, in quo sermonem populo habere uolunt, propinquius eligunt. Atq; ubi iusserint pharmacopolæ sibi arsenici capsulam adferri, cuius duo aut tria frustra seligunt, prout sibi magis expedire uidetur. quæ postea charta inuolui, et in eadem capsula reponi mandant. Quo facto pharmacopolam rogant, ut cum in suggestum ascenderint, arsenicum illud repositum dare uelint puero, quem ad eum miserint. Porro in forum abeunt uerba facturi, ubi eorum furiam theriacam, ad cælum usq; miris laudibus efferunt admentientes. Ad hæc ut rem magis uerisimilem reddant, puerum uel è circumstantibus quempiam ad pharmacopolium mittunt, qui uenenum antea ab ipsis selectum deferat. Interea ingentem capsulam in suggesto stantes aperiunt, quam habent uasculis prauæ illius theriacæ plenis refertam, cuius operculo intus adherent cera subposita, uaria cuiusdā miscellæ frustra ex saccharo, quod candidum uocant, amylo, diijsq; umocijs medicamentis miro quodam artificio confectæ, quæ prorsus et facie, et magnitudine referunt illa ueri arsenici frustra, quæ prius ij in pharmacopolio selegerant. Leuant autem isti hominum proditores operculum à capsula, quò fraudem melius occultent, in suggesto stantes. siquidem summo cum artificio internam operculi partem, cui adherent illius miscellæ frustra arsenicum mentientia, uersus se trahunt, ne quis suam fraudem deprehendere possit. Deinde statim in manus socij, aut pueri, quos doli ministros habent capsule operculum collocant: quod eorum alter aperta manu perquam eleganter sustinet, parte pseudoarsenicum continente cælum uersus respiciente: idq; ne quis dolum intueri possit. Interea redit nuncius arsenicum legitimum à pharmacopolio deferens. Atqui istud accipiens artis captiosæ magister, statim illud populo ostendat longa atq; mendaci oratione. Qua perfectæ ad experimentum transit, perpetuò dolose procedens. Quandoquidem simulans sibi opus esse expeditis manibus, manicas ex murice, uel serico proditore, quo plerunq; uestiuntur, ad cubitum usq; conuoluit, ea tantum ratione, ut arsenicum uerum, dum hæc agit, super operculo prædicto pseudoarsenicum continente, reponat, abdatq;: quod ob operculi circuli altitudinem nullo pacto infernè à circumstantibus uideri potest. Obuolutis itaq; manicis, brachijsq; denudatis, ac tenui linteolo humeris imposito, iubet aquæ uel uini poculum adferri, et relicto in operculo arsenico uero, factitium innoxium fraudulentum manu capit. quod gladio minutim incidit, et uino, uel aquæ parati cyathi commiscet, et deniq; tutissimè bibit. Atque ita fraudem hisce coloribus exornatam spectantibus persuadet, ut nullus dubitet, quin ille mortiferum arsenicum hauserit, quod ex medica officina delatum fuerat. Memini me olim unum ex his uidisse, qui uenenum simili modo adulteratum puero exhibuerat suo: et cum simularet se ei opem ferre nolle, donec pulsus amississet, et in mortis discrimine uersaretur, ut suæ falsæ atq; adulterinæ theriacæ maiorem compararet existimationem: cum præterea prius uersutum puerum admonuisset, ut anhelitum comperceret, idq; ut facies eius colore mutaretur, quin et interim oculos obuerneret, et os ac ceruicem contorqueret; ad se uocauit astantem medicum haud acris callidq; ingenij in ea ciuitate, ubi id mihi contigit uidisse, receptum habentem, qui pueri pulsus tangeret, ut omnibus testaretur, quod pulsus amississet. Quod cum fecisset bonus ille medicus iam imprudenter factus circulatoris leno, omnibus testimonium perhibebat, se nullum pulsus in eo inuenisse: quippe qui nusquam fortè legerat, quod arte etià possit intercipi pulsus, cum tamen id scriptum reliquerit Galenus libro sexto de placitis Hippocratis, et Platonis, ubi sic inquit. Eadem natura in arterijs cernitur, non etiam ipse perinde ac nerui, aut incisæ, aut laqueo interclusæ pulsus omni micatoneq; orbantur. Ex quibus sanè uerbis tunc comminisci potuisset, quod faciliè huic puero laqueata essent brachia, et promde interceptus

interceptus arteriarum pulsus, quæ per brachium ad manum excurrunt. Siquidem adstringentes laquei ab ijs nebulonibus adeo callide subdoleq; aptantur, ut uersato quodam ferreo globulo supra cubitum extra manicas latente, stringantur admodum, ac relaxentur. Id quod facile ab eo fieri potest, qui puerum semimortuum se simulantem, brachijs ad spectaculum sustinet. Tali igitur fraude adstringebantur fibule, ubi pulsus interciperet animus esset, laxabantur autem lentè, cùm iam uersutissimus puer ex theriaca illa assumpta, in pristinam suam cõstitutionem restitui simulasset. Hactenus de fraudibus horum carnificum, quas pluribus prosequi libuit, ut quisq; eas euitare sciat, ac possit. Quæ de re morbo Gallico quàm plurimùm certè debeo: siquidem unus, isq; insignis, ex his qui uenenam innocuè deuorare profitentur, cuius ossa lues illa non immeritò depascebatur, cùm à me in sanitatem redigi exoptaret, inter curandum, mihi id ab eo expetenti, omnes has fraudes, quibus hoc flagitiosum hominum genus utitur, ut pecuniam extorqueat, libentissimè patefecit. Ceterum fraudes, ac mendacia, quibus ij pariter utuntur, qui è diui Pauli profapia ortos se prædicant, quæ tamen de re mentiuntur, hic consultò dimittam. uerum intactas eas non relinquam, ubi in processu de ijs differemus uenenis, quæ morsu, uel ictu relinquunt inuenera exitiosa animalia. Sed ne aliquod præstans antidotum desideretur in his nostris commentarijs, me probi, ac fidelis medici munere functum existimauerim, si hoc in loco quedam antidota mihi longo labore comparata, magni ad uenena momenti, descripsero. quæ non modò ijs, quæ per os assumuntur; sed ijs etiam, quæ animalium morsu, uel ictu eiiciuntur, summo, ac presentaneo fuisse remedio compari. Licet autem hac ætate rari admodum habeantur medici, qui sua pandere arcana uelint, si quod nacti sunt pulchrum et singulare auxilium; tamen cùm mihi consilium ab initio fuerit, mea opera quantulacumq; sit omnibus generatim prodesse, alienum quidem inhumanumq; foret, si modò uel inuidia uel auaritia compulsus, aliquid silentio inuoluerem, quod in arte medica usui futurum putem. Primum igitur antidotum, cuius admirandas in uenena uires sæpius expertus sum, hoc modo conficitur. Recipit enim rhubarbari, rhapontici ex Ponto aduecti, radicis phu, acori, quem falsò calanum odoratum uocant, cyperi, quinquifolij, tormentillæ, aristolochiæ rotundæ, pæoniæ, helenij, costij, iridis Illyricæ, chamæleontis albi, cuiusq; drachmas tres. Item galangæ, Imperatorie, dictamni albi, angelicæ, millefolij, filipendulæ, doronici, zedoariæ, gingiberis, singulorum drachmas duas: agarici drachmas tres. Ad hæc seminis citrei mali, uiticis, cocci insectorij, fraxini, oxalidis, pestinacæ syluestris, napi, nigellæ, pæoniæ, ocimi, irionis, thlaspis, fœniculi, ammi, singulorū drachmas duas: præterea baccarum lauri, iuniperi, hedere, asperæ smilacis, cubebæ, singulorum sesquidrachmam. Foliorum scordij, chamædryos, chamæpitios, centaury minoris, stachadis, nardi Celtici, calaninthe, rutæ, menthæ, betonicæ, uerbenacæ, scabiosæ, cardui benedicti, melissophylli, singulorum sesquidrachmam: dictamni Cretensis drachmas tres. sanpsochi, hyperici, iunci odorati, marrubij, galegæ, sabinæ, pimpinellæ, cuiusq; drachmas duas. Caricarium, nucum iuglandium, pistaciorum, singulorum uncias tres: myrobalanorum empetricorū drachmas quatuor. Florum utriusq; buglosi, rosarum, lanendulæ, saluie, roris marini coronarij, cuiusq; scrupulos quatuor: croci drachmas tres. Cassiæ odoratæ, quæ hodie cinnanomum uocant, drachmas decem. Caryophyllorum, nucis myristicæ, macis, singulorum drachmas duas et semis. Piperis nigri, ac longi, santalorum omnium, egallochi, singulorum sesquidrachmam. Cornu cerui crudi drachmas quatuor: unicorni drachmam unam. osis cordis ceruini, ranentorum eboris, urgæ ceruinæ, castorij, singulorum scrupulos quatuor: terre Lemniæ drachmas tres: opij sesquidrachmam. margaritarum orientalium, ranentorum smaragdi, hyacinthi, corallij rubri, singulorum sesquidrachmam: caphuræ drachmas duas. mastiches, thuris, styracis, myrrhæ, gummi Arabici, resine terebinthinæ, sagapeni, opopanax, laserpitij, singulorū drachmas duas et semis. moschi odorati, ambari, cuiusq; drachmam: olei è chalcantho confecti unciam mediam. Pulueris cordialis temperati, diamargariti, diamoschi, diambari, electuarij è gemmis, pastillorum caphuræ, uiperæ, scillæ, singulorum drachmas duas et semis.

40 Succo oxalidis, sonchi, scordij, echij, buglosi, melissophylli, singulorū selibram: hypocistidis drach. duas. Theriacæ electæ, Mithridatij optimi, cuiusq; uncias sex. Vini ueteris albi odorati libras tres: sacchari è Medera insula, uel optimi mellis libras octo et uncias sex. Ex omnibus his summa diligentia, et ratione inquisitis, atq; selectis fiat electuarium, eo modo quo theriaca, aut Mithridatis antidotū conficiuntur. Sumendi quantitas est à drachma una usque ad tres pro ætate, et constitutione patientis. Atq; ita omnibus persuadere poteris, antidotum hoc non solum præstantissimum esse (ut antè diximus) contra omnia uenena, quæ per os sumuntur, itemq; aduersus ea, quæ morsu uel ictu relinquuntur; uerum etiam in pestilentia, cui mirificè opitulatur, quotidie assumptum, et præcipuè ad præferuandos sanos. At si cui in animo fuerit, ut præsentaneum adferat auxilium, hæc faciat oportet. Antidoti præscripti libram accipiat, libram item syrupi è citrei mali cortice parati, et libras quinque aque uitæ uocatæ, ex optimo, odoratoq; uino confectæ, totiesq; uitreis organis repurgatæ, ut quintæ essentia speciem præ se ferat. Deinde omnia

50 hæc in uas uitreum iniiciat duplè à rebus inditis capacitatis. postea uasis ore ita obturato, ut nullus spirandi meatus relinquatur, magna cum dexteritate aquam in uase cum electuario tandiu agitet, donec totum dissoluatur. Atq; tum uas ore cera, uel pice obducto in mensam integrum reponat. Quod tamen bis in hebdomada agitari conuenit eo modo, quo antea dictum est: fit enim, ut electuarium facile residat in fundo, si dimittatur. Exacto denique mense claram et quam aureoq; colore nitentē, electuario supernatare inueniet, et quæ iam omnē illius uim in se cõtraxerit. Tum itaq; uas ipsum aperiat, et in uas aliud item uitreum limpidam aquam paulatim effundat, cuius os cum cera, et membrana accuratissimè obturet. Nam si illud diei spatio apertum sineret, omnis conclusa aqua in aerem euanesceret. Tanta hæc aqua uirtute pollet (quod millies expertus sum) ut quatuor drachmarum pondere pota uel per se, uel cum pari odorati uini quantitate, uel stillatitiæ cuiusuis aquæ ad cordis robur facientis, ubi quis ictus, uel demorsus à quocunque ueneno animali, in tanto mortis discrimine uersaretur, ut uocem, uisum, ac reliquos ferè sensus amisisset, egrum ingenti adstantium admiratione à longo ueluti somno excitat. Quin et uomitione plerumq; plurimam insecto-

Antidota nostra præstantissima cõtra uenena.

Primi antidoti descriptio.

Potio ex prædicto antidoto.

Alterius antidoti descriptio, & uires.

Antidoti & sanguinibus descriptio.

rum humorum copiam exhaurit. Cuius rei exemplo (preter alia innumera) nuper mihi fuit prefecti oppidi Vipaci uxor, quam à uipera in dextra manu demorsam, & iamian de naulo rationem cum Charonte inituram, hæc aqua in uitam à morte reuocauit. Id quod etiam paulò post contigit cuidam miseræ. Sclauæ ab alia non dissimili uipera in manu demorsæ. Hæc idem similiter præstat contra uenena, quæ per os sumuntur: siquidem ea adeò tenuis essentia, efficaç, & penetrans est, ut momento ui sua in omnes corporis uenas permeet. Quin & eosdem præbet effectus in alios quàm plurimos morbos, quos breuitati studens prætereo. quandoquidem prudentes, & periti medici, habuimus hæc uirium exacta ratione, eam adhibere poterunt, ubi legitime conuenire censebunt. Porro antidotum alterum generosum, pariter & singulare, oleum illud est, cuius superius libro secundo capite de scorpionibus, item quarto capite de aconito à nobis facta fuit mentio. Id pulvis extrinsecus, patientibus illitum, nempe temporum, manuum, ac pedum, quinetiam extimæ cordis parti ad sinistram mamillam, repetita alternis tribus horis illinitione, efficacissimè succurrit omnibus uenenis per os sumptis, quæ tamen ex erodentium genere non fuerint. Similiter uiperarum, aspidum, & cuiuscunq; deniq; uenenati animalis moribus singulari auxilio est, ut in processu latius explicabimus. Ut autem omnes intelligant quàm maximum sit in me iuuandæ posteritatis studium, modum, quo illud conficitur, hic describere non grauabor. Sumantur itaq; ineunte mense maio, quo tempore confici debet, olei communis centum annorum, sin minus sui temporis uetustissimi libræ tres: foliorum hyperici uirentis manipuli tres. Oleum in uas uitreum duple à contento capacitatis imponatur, in quo hypericum aliquantulum antea contusum infundatur. deinde uas cerra, & membrana obturetur, & medium in tenuissimam arenam condatur, loco ubi tota die insolari possit, atq; ibi sinatur ad decimum, uel duodecimum diem usq;. Quo exacto tempore, mergatur uas in calentis aque balneo ad uiginti quatuor horas: mox oleum ab herba exprimitur. Hoc factò sumatur hyperici, chamædryos, calaminthæ, cardui benedicti, singulorum manipulus. Quæ omnia prius diligenter contusa oleo admisceantur, ac subinde uas in prædictum mergatur balneum tribus continuis diebus. Extrahatur deinde, & ab incoctis herbis exprimitur. Post hæc accipiantur florum hyperici manipuli tres, qui à caulibus probe repurgati, & contusi in prædictum oleum infundantur, ac in idem balneum per triduum reponatur. Post id tempus eximantur, & ut prius exprimantur. Idem fiat ter, aut quater, usque dum oleum sanguineum colorem referat. His peractis sumatur hypericum quod iam destituerit, & ab eius cacumine grana illa uiridia excerpantur, quæ hordeaceis granis similia deprehenduntur, in quibus semen continetur. Ex ijs itaq; tres confertim manipuli decerpantur: qui postea tusti, & uino meraco albo aliquantulum perfusi in oleum prædictum infundantur, & cum eodem uitro, in arena sepulto octo diebus continuis insolentur. Quo tempore transacto tridui spatium in balneum immittantur, post colentur, et modo prædicto exprimantur: tertio, aut quarto similiter dictum semen in oleo macerari debet, donec id obscuri sanguinis colorem repræsentet. Ad hæc sumatur scordij recentis, calaminthæ, centaurij minoris, cardui benedicti, uerbenacæ, dictamni Cretensis, singulorum medius manipulus: tundantur omnia, mergantur in oleum prædictum, & uas in balneum iterum imponatur per biduum continuum, dein colentur, & exprimantur, ut supra. Postea sumantur zedoariæ, radicum dictamni albi, gentianæ, tormentillæ, aristolochiæ rotundæ, singulorum drachmæ tres, scordij manipulus. Tundantur item omnia, infundantur, & immittantur in balneum, ibiq; permaneant tribus diebus continuis: colentur deinde, & exprimantur. Infundantur denuo styracis calamiti, laseris, cuiusq; drachmæ sex, baccarum iuniperi drachmæ quatuor, melanthij drachmæ due, cassiæ odoratæ (cinnamonum officinæ uocant) drachmæ nouem: iunci odorati, cyperi, singulorum sesquidrachma: santalorum alborum semuncia. Tundantur omnia (ut pluries de alijs dictum est) & in idem oleum infundantur, & per triduum continuum in balneum macerentur, demum colentur, & exprimantur, modo quo antè dictum est. Postremò adsint oportet trecenti scorpiones uiui diebus canicularibus collecti. si in uase uitreo conclusi, cineribus calidis superponantur, & cum eos præ calore sudare, atq; irasci constet, omne iam dictum oleum calidum superimiciatur. Sed aduertendum est, ne id adeò feruens sit, ut uas disrumpat. obturato statim uasis ore in balneum tribus continuis diebus contineatur: deinde coletur, & exprimitur. Proiectis interea scorpionibus, rursum in oleum infundantur rhabarbari laudatissimi, myrrhæ communis usus, aloës hepaticæ, singulorum drachmæ tres: nardi indici drachmæ due, croci drachma una: theriacæ electæ, electiq; Mithridatij, cuiusq; semuncia. Quæ ex his tundenda sunt, terantur, mox ultimo infundantur in oleum, quod per triduum continuum contineatur in balneo. Quo factò oleum non amplius percoletur, sed deinceps recondatur, perinde ac opobalsamum. quippe quod mirandum sit remedium ad iam dicta uenena, & præcipuè contra napellum, quo infecti fuere, ut experimentum fieret, Corsi illi duo uisum obsessores, quorum historiam supra retulimus libro quarto in aconiti mentione: ad cuius lectionem, ne idem bis repetamus, eos reijcimus, qui eius desiderio capiuntur. Preter autem Mithridatium, antidota alia duo generosa Dioscoridi probantur in presenti præfatione, unum scilicet quod escinco, alterum quod è sanguine nuncupant: sed quod is eorū conficiendorum rationem tradiderit, nusquam hactenus reperi. Quamobrem illa duo in multorum gratiam hic adscribere, non alienum fore duximus, eo tamen modo, quo lib. 11. de antidotis à Galeno seriatim describuntur, ubi hæc scripta reliquit. Antidotus ὁ γ' τῶν αἱμάτων, id est, ex sanguinibus, ad uenena, uenenatorumq; omnium morsus idonea, sic habet. Piperis longi, piperis albi, acori, croci, pbi, mei, dictamni Cretici, ammoniaci, agarici, singulorum drachmas duas: anomi, opobalsami, seminis rutæ syluestris, cymini Aethiopici, anisi, sanguinis anatis maris, & foeminae sicci, sanguinis bedini, sanguinis anserini, seminis napi syluestris, singulorum drachmas tres: gentianæ, trifolij, florum iunci odorati, thuris, rosarum siccarum, singulorum drachmas quatuor, petrosilini drachmas quinque, polij Cretici tantundem, cinnamomi drachmas sex, florum scordij drachmas octo: myrrhæ, nardi, singulorum drachmas decem, croci drachmas duodecim, cassiæ drachmas octo. Omnia hæc diligenter contusa, ac per excussorium cribrum traiecta melle Attico despumato, commiscebis, commistaq; in argentea pyxide repones, atq; hac ut maximo medicamento

dicamento uteris. Ceterum quæ e scinco temperatur antidotus, à Galeno hunc in modum redditur. Antidotus Nutri-  
 datis Eupatoris ὄζις ἐν ἰγχοῦ cognominata, faciens ad uenena, omnemq; uenenatorum materiam mortem inferentem,  
 omniumq; uenenosorum animalium ictus, conficitur hac ratione. Scinci, sagapeni, acori, pbi, hyperici, acacie, iri-  
 dis, mei, gummi, sing. drachmæ duæ: rosarum siccatum, gētianæ, cardanomi, sing. drachmæ quatuor, opij oboli duo,  
 styracis drachmæ octo: polij, cassiæ nigrae, seselis, bdellij, balsami, piperis albi, singulorum drachmæ quinque et  
 oboli duo: succi hypocistidis, opopanax, myrrhæ, thuris masculi, castorij, piperis longi, cyphæos, foliorum malaba-  
 thri, singulorum drachmæ sex: scordij, costi, florum iunci odorati, galbani, resinae terebinthinæ, singulorum drach-  
 mæ sex et oboli duo: nardi Syriacæ, opobalsami, thlaspi, dauci Cretici, singulorum drachmæ sex et oboli tres: cro-  
 ci, cinnamomi, zingiberis, singulorum drachmæ sex et oboli duo: succi glycyrrhizæ, agarici, singulorum drachmæ  
 10 septem et oboli tres. Construitur autem hoc modo. Cyphi, hypocistis, sagapenum, gummi, opium, styrax, opopa-  
 nax, uino Chio macerantur die noctuq; quoad penitus dissoluta sint. Reliqua uero interim contusa tenui cribro excu-  
 tiuntur, illisq; iam maceratis, ac dissolutis commiscantur, commistaq; Attico melle ad crassitiem usque despumato ex-  
 cipiantur, opobalsamoq; superimisso. denum in uas argenteum transferuntur, atque ad multos usus reponuntur.  
 Datur autem ex hac antidoto quantum aeger tolerat. Hæc de duabus antidotis, quas non immerito quidem probauit  
 Dioscorides, quasq; ut efficacissimas in aliarum censum retulit Galenus, atque descripsit. Sed quoniam (ut supra in  
 tberiacæ mentione dictum fuit) multa nobis desunt simplicia medicamenta, quæ in eis expetuntur; idcirco non uideo  
 quomodo possint legitime confici, nisi ijs uti uelimus, quæ eorum uicem supplent, ita ut unum simplex medicamentum  
 in alterius locum succedat. Id quod medicorum, ac seplasiariorum plerisq; fieri adsolet. Quorum sententiæ etsi cui-  
 20 piam uideretur Galenus adstipulari, quippe quod scriptis tradiderit in cinnamomi defectu duplum cassiæ subijci posse;  
 non tamen propterea inde colligi potest, quod idem fieri possit de quocunq; alio simplici medicamento, quod desidere-  
 tur, ut quidam existimant, non recte, meo quidem iudicio, Galeni mentem affecti. Siquidem is secus de hac re differt  
 libro primo de antidotis, ubi sic inquit. Quod ad cassiam uero attinet, ea me commemorare nunc opus est, quæ in mul-  
 tis de medicina libris scripta sunt, duplum cassiæ si quis cinnamomo egeat, iniiciendum. Hoc dictum irridens Satyrus  
 magister meus, unam ex Quinti facietijs ipsum esse dicebat, assueuerans eos, qui duplum cassiæ imponere iubent, si cinna-  
 momo careamus, similia illis facere, qui nos censent, si quando Phalerno caruerimus, illius quod in cauponis uenditur,  
 duplicata mensura bibere: siq; panis siligineus desit, furfuracei duplum comedere. Mihi uero hæc Quinti facetia, si de  
 re una quapiam, qua per se sola uti uelimus, asseratur, uera irreprehensibilisq; uidetur: sin de re, quæ in societatem  
 multorum ueniat, non est eodem pacto uera. Nam cuiuscunque, quod solum corpori admoueri debet, ut puta rhus,  
 absinthium, iris, gentiana, uel id genus alia aliqua medicina, si quis minus boni duplum loco præstantissimi accipiat, et  
 30 corpori uel extra, uel intra admoueat, duplicato etiam nocet: at si multis aliquod optimum commiscendum fuerit,  
 quod se aucturum aliorum uires spondeat, si præstantissimum desit, peius nihil erit uti duplo illius, qui proprietates  
 eiusdem generis habeat, etiamsi deterius hoc illo uideatur. Cassia quidem cinnamomo genere proxima usque adeo est,  
 ut ex ipsa quandoq; cinnamomum oriatur, spectenturq; nonnunquam cassiæ arbores integræ, in quibus aliqua cinn-  
 momi uirgulta e cassiæ ramis prodeat. Simile autem istud est non uino aut pani, sicuti Quintus dicebat, sed uitæ functio-  
 nibus in extruenda domo, in fabricanda naui, in tollendis, et transponendis oneribus, in omnibus deniq; uitæ actioni-  
 bus, in quibus quod peragendum erat ab uno homine robusto, si absit, à duobus imbecillioribus perficiatur. hæc Ga-  
 lenus. Ex quibus uerbis omnibus palam est, Galenum non assentire, ut in compositis medicamentis unum simplex pro  
 alio supponatur, nisi ex ijs sint, quæ eandem naturam sortiuntur, ut cassia, et cinnamomum. Quare illud inde collig-  
 endum esse putauerim, quod perperam faciunt ij, qui rem hanc aliter intelligunt. Porro et illam antidotum, quæ  
 40 iuniperi baccas, terramq; Lemniam recipit, summopere laudauit Galenus, eamq; lib. 11 de antidotis memorie prodia-  
 dit, hisce uerbis. Antidotus, quæ exhibita accipientem tutum à uenenis reddit, sic habet. Baccarum iuniperi drach-  
 mas duas, terræ Lemniæ drachmas duas et obolos duos. Hæc ubi in puluerem redegeris, oleo, aut melle commisce-  
 bis, et repones: atque cum opus fuerit, ex aquæ mulsæ cyathis duobus quantum est auellana dabis. Hæc antidoto Ni-  
 comedes rex utebatur, si quando suspectos habuisset, qui se uocarent. Nam si uenenum non subsit, quæta manet: sin  
 adsit, nauseam concitat, et euomere cogit, ita ut uenenum quoq; cum antidoto reijciatur. Sed hæc hætenus dicta suf-  
 ficiant, quantum ad uenenorum omnium in uniuersum rationem. quandoquidem de ijs priuatum, eorumq; auxilij, et  
 antidotis in singulorum mentione diffusius agemus.

Antidoti e  
scinco descri-  
ptio.

Succedanea  
quâdo admir-  
tenda.

Antidotus ex  
terra Lemnia.

# Κανθαρίδες. CANTHARIDES. CAP. I.

50 QVIBVS datæ sunt cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad uesicam usque  
 cuncta erodi sentiuntur: picem, aut simile quiddam cedrix resipiunt: dextra præcordia inflaman-  
 tur. urinam ægrè reddunt, & subinde cum lotio sanguinem emittunt: strigmenta non secus atque  
 dysentericis, aluo deferuntur: fastidia urgent: animo linquuntur, oborta q; uertigine concidunt.  
 postremo mente abalienantur. Ergo antea quàm tale nonnihil accidat, dato oleo, aut supradicto-  
 rum aliquo, uomere cogantur. mox ubi uomitione plurima reiecerunt, halicæ aut oryza, tragi  
 aut ptisanæ cremor, aut decoctum maluæ, aut seminis lini, aut fœni græci, aut radicum althææ;  
 quam Latinus sermo ibiscum appellat, clystere infundatur. Præterea nitrum eisdem dandum, ex  
 hydromelite, ut quæ stomacho adhuc, aut intestinis adhærent, eluendo excernantur, ac descendât.  
 Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in aluum ex nitro aqua mulsâ, uacuari debent. Detur deinde ui-  
 num,



num, aut passum; in quo pineoli nuclei, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsâ, aut anserinus adeps in passo liquefactus. Inflammatae autem partes, hordei farina cum mulsâ decocta perungantur. Ab initio admota cataplasmata nocent, quod citatus ab eis calor, illapsum uirus ita remoratur, ut in principes se partes insinuet: ipsa tamen interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulantur, utpote quæ dolores & permulceant, & leniant. Tum ubi corpus calfaciente oleo inunctum fuerit, in solum descendere oportet, ac lauare, ut per cutem summam, quæ corpori noxia inhæserunt, etiam excernantur. Et deiectiones multifariam moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capessat. Gallinaceis carnibus, & hædinis, aut suillis catulis, maxime pinguibus, & tenerimis, ac cum lini semine coctis, uesci debent: siquidem aluum cient, atque uenenorum acrimonias hebetant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest thuris cortex, & Samia terra, quæ asper appellatur, si quaternæ singulorum drachmæ cum passo sumantur. item pulgium ex aqua tritum: irinum, aut rosaceum, cum rutæ decocto: recentes uitis ramuli, cum passo detriti. Longè omnium potentissimè antidota auxiliantur, cum aqua mulsâ, drachmis quatuor pota.

Cantharidū  
malefica & no-  
xia uis.

Symptomati  
causæ.

Cantharidū  
veneni cura-  
tio.

CANTHARIDVM tum historiam, tum etiam facultates superius libro secundo, ubi et earum picturam exhibuimus, adeo diffusè lateq; tradidimus, ut superuacuum ducerem hoc in loco plura de eis rememorare, nisi nunc de earum malefica et noxia uis nobis differendum esset. Cum igitur Cantharides excalfaciunt recessu quarto, et exiccant secundo, nil sanè mirum fuerit, si erodant, ulcerent, et denique sumentes interimant. Nocent priuatiu uesciæ, omnibusq; urinae inferuentibus membris, non modò haustæ; sed quandoque etiam exterius illitæ, ubi exulcerare sit opus: præsertim cum amplis admiscetur cataplasmatibus, locisq; illinuntur uesciæ propinquioribus: nempe coxendicum articulis dolore diutius tentatis, uel pubi, uel renibus, uel testibus. Quo fit, ut qui has hauserint, exulcerata inde uesciæ, magnis in urina reddenda excrucientur doloribus. quanquam præter id omnia in uniuersum ledant uiscera, quod suapte natura erodant, et postremo necem inferant: nanque sua uenefica, et perniciosa ui deradunt internos meatus omnes, quibus obuiant. Proinde nec mirum si cum lotio sanguinem extrahunt, erosio ab eis uasis: neque si quando (ut recentiorum quidam dixere) penis ipse, testes, pubes, et uesciæ ceruix intolerabili inflammatione uexentur. Hinc enim plerumque euenit, ut qui hauserint, urinae stillicidio afficiantur non sine intolerabili ardore angustiatq;. Ceterum picis, et cedriæ odor, quem à cantharidibus malè affecti gustu, et olfactu percipiunt, aliunde, meo quidem iudicio, non provenit, quàm à uaporosis humoribus in uentriculo, et iecinore adustis, intensa huiusce ueneni caliditate. Ab ea siquidem dum exuruntur humores, quædam inuicem fit commistio, quæ propriam tum gustum, tum odoratum inficiendi facultatem adipiscitur. Inflammantur præterea dextri lateris præcordia. quippe cum ueneni uis in iecur facilius, quàm in lienem excurrat, mirum utiq; non est, si concitatis ibi inflammationibus, potius dextrum, quàm sinistrum egrotet latus. Nec alia ratione fit inde fluxio dysentericæ similis, secum deferens intestinorum ramenta, quàm quod cantharides ipsæ ad intestina descendentes acerrima sua ui, ea exulcerent, et abradant. Defectus uerò animi, ingens anxietas, cordisq; angustia partim eueniunt, doloris, ardoris, intolerabilisq; inflammationis exuperantia: partim uerò deleteria ui pharmaci, quæ usque adeo resoluit uitales spiritus, et imbecillos reddit, ut inde affecto corde, hæc tam seuia oriantur symptomata. Quin et ob id uertiginosi fiunt, delirio, amentiaq; capiuntur, qui eas sumpserint, quod uenenoſe exhalationes, quæ à colliquatis humoribus in inferioribus membris sursum in cerebrum feruntur, adeo ipsum inficiunt, ut faciliè animales facultates corrumpantur, ratioq; ipsa pereat. Sed ut his omnibus succurratur incommodis, primum sanè necessarium fuerit (ut etiam Dioscorides inquit) cantharidas ipsas extra corpus ducere, crebris excitatis uomitionibus, ijs nimirum medicamentis, quorum in huius libri præfatione meminuit Dioscorides, atq; etiam nos mentionem fecimus in nostra in eam longa commentatione. Quinetiam acribus chylomatis opus est, ut per hæc deuocentur, quæ ad intestina descenderunt. Fit enim ut exhaustis è corpore cantharidibus, non magno postea negotio accidentibus, incommodisq; præsidia adhibeantur. Quandoquidem exulceratæ uesciæ, cui suapte natura plus nocent cantharides, quàm cæteris internis uisceribus, succurritur refrigerantibus, lentis, et pinguibus simul mistis medicamentis. frigida nanque inflammationes extinguunt, mulcentq; earum dolores: pinguius ueneni acrimoniam obtundunt: lenta uerò, ac uiscosa cum internis partibus pertinaciter inhereant, non modò diu medicamenta in exulceratis retinent locis; sed etiam sanas partes muniunt, ne ueneni uitam admittant. Idcirco ad hoc mirificè præstat lac humanum ab ipsius uberibus exuctum, crudum, recensq; butyrum eclegmatis modo linctum: psyllij, cydoniorum malorum, et maluæ seminis spissamentum: item serapium ex nymphææ floribus, et purpureis uio-  
lis, quin et quod ex papaueribus conficiunt: necnon lactuæ, et portulacæ, et cucumeris, et cucurbitæ succus: præterea cremor, lactis speciem referens, qui è papauerum, melopeponum, cucurbitæ, cucumeris, angurie, et lactuæ semine exprimi solet, affusa uiolarum aqua, aut radicis althææ, aut solani, quod uesciariam, et haliacabam uocant. cuius etiam rubentes bæccæ decem, uel duodecim numero fractæ, et ex aqua portulacæ, uel ptisana bordeacea potæ, hoc in negotio præsentaneo remedio prosunt. Facit ad hoc et amygdalinum oleum, quod scilicet ex dulcibus elicitur nucibus, unciarum sex pondere haustum. Huic autem præfertur, quod è recentibus pincis nucibus exprimitur. Sed omnium præstantissimum est, quod è semine albi papaueris eximitur. quandoquidem hoc præter id quod tanquam pingue plurimum conuenit, potest suapte natura inflammationes extinguere, ueneni acrimoniam retundere, et dolores quantūuis uehementes sedare. Sunt etiam qui præferant aquam, quæ feruentis balnei calore uitreis instrumentis elicitur è maluæ folijs, ibisci radicibus, et recentibus cucurbitæ ramentis: quod propria ui urinae ardori-  
bus opem

- bus opem ferat, & intestinorum inflammationes repellat. Porro succurritur exulceratis intestinis, iisdem sane medicamentis, quibus ad dysenteriam utimur: nempe pinguium carnum iuribus clystere infusis, addito hirci, ceruiq; adipis: & omphacino rosaceo, plantaginis aut portulacæ aqua prius eloto. Prohibentur halitus cerebrum petentes, dissoluanturq; assumptis antidotis, quæ uenenis resistunt, & humores putrescere non sinunt. Quinetian cataplasmatibus ex frigidis, repellentibusq; succis, sincipiti, & coronali suturæ illitis. In summa frangitur, atq; demolitur uenenu uis, Dioscoridis testimonio, ualentibus antidotis, ueluti theriaca, aut Mithridatio, aut (ut scribit Galenus libro 1x. simplicium medicamentorum capite de terra Lemnia) eo antidoto, de quo & nos superius locuti sumus, quod sit ex ipsa Lemnia sphafragide, & iuniperi baccis. Pro sunt insuper epithemata cor roborantia, itemq; inunctiones, quæ ex odoramentis constant ualentioribus: præsertim oleum nostrum de scorpionibus superius descriptum aduersus uenena:
- 10 Refert Galenus libro secundo de antidotis Asclepiadis autoritate, cantharidas proprio ueneno remedium & antidotum esse, si earum pedes, & alæ tritæ cum melle eclegmatico paulatim assumantur. Id quod etiam asseruit libro xi. simplicium medicamentorum, ut superius libro secundo in earum quoq; mentione retulimus. Hoc idem scribit Aëtius à Galeno fortasse mutuatus libro xlii. capite xlix. sic inquit. At uero contrariæ affectionis ratione, quantum nihil aliud his auxiliatur cantharidum alæ, & pedes cum passo pota: hæc Aëtius. Veruntamen cum huiusmodi remedium suspitione non uacet (non propterea Galeni testimonium reiiciendum putauerim) cumq; à multis improbetur, atq; ipse nullum adhuc eius periculum fecerim; ideo nec ipsum damnare, nec probare ausim. Arabes namq; pro certo habent, omne uenenum, quod cantharidibus insit, earum tantum alis, pedibus, & capitibus inesse: Quare cum cantharidas suis immiscet medicamentis, tam intus sumendis, quam extra adhibendis, iubent contra Græcorum sententiam, ut capita, alæ, ac pedes abscindantur. quanquam credendum arbitror Arabas Hippocratem perperam intellexisse, ut ultimo commentario de ratione uictus in morbis acutis scribit Galenus. Sed quoquomodo res se habeat, ambarum partium placita in medium attulimus, ut unusquisq; suam in hac re sequatur sententiam. Nos tamen suspecta medicamenta semper dimittenda iudicauimus, atq; his utendum, de quibus inter probatos auctores, & doctos uiros conuenit. Sunt è uulgaribus, qui ad epotas Cantharidas acetum commendunt. Sed id equidem probare non ausim, quod antiquorum, recentiorumq; repererim neminem, qui scriptis tradiderit acetum contra cantharidas auxiliari. Quinetian medentur urinæ ardoribus, & pudendorum inflammationibus, non tantum ea medicamenta, quæ per os sumuntur; sed ea quoq; quæ exterius illinuntur. Præstant igitur ad hoc rosaceum; omphacinum oleum, niolaceum, & quod sit ex nymphææ floribus: item quod ex papauerum semine conficitur, quodq; ex ijs paratur fructibus, quorum plantam appellant aliqui Balsaminam, alij uero Caranzam, cuius historiam, ac facultates superius libro quarto descripsimus, cum de uite nigra differeremus. In quem usum hæc non modò exterius illinuntur pubi, peni,
- 30 & testium; sed etiam in pudendi meatum clystere iniiciuntur, præsertim addito oui albo diutius rudicula agitato, aut sedi succo, aut hyoscyami, aut portulacæ, aut lactucæ. Maxime etiam prodesse compertum est, si ad umbilicum usq; duabus aut tribus horis sederint patientes in aquæ tepentis balneo, cui ibisci radices, malæ folia, & semina, niolarum flores, psyllij, cydoniorum malorum, fenugreci, & lini semen, hordeum, & hyoscyamum, & id genus alia fuerint incocta. Postremo ad omnes huius ueneni reliquias, quæ corpori hæsisserint, eradicandas, læsaq; membra roboraanda, & ad pristinum temperamentum restituenda, probatissimum erit medicamentum bis in die mane; & uesperis, electarium mox describendum, uncie pondere ex humano, uel caprillo, uel asinino lacte potum. Fit autem hoc modo. Accipe nucleorum pineorum uncias tres: nucis Indicæ recentis uncias duas: pistaciorum fescunciam: seminum melopeponum, cucurbitæ, cucumeris, papaueris albi, malæ, singulorum uncie dimidium: corticis arboris thuris, drachmas tres: margaritarum, coralliorum amborum, santalorum alborum, singulorum sesquidrachmam: succi glycyrrhizæ drachmas duas: baccarum iuniperi drachmam unam: gummi Arabici fescunciam: terræ Lemniæ drachmas sex: succi baccarum balicacabi, portulacæ, singulorum uncias sex: diluti niolarum uncias octo: spissamenti è seminibus malorum cotoneorum, aqua niolarum maceratis, uncias sex: serapij niolacæ uncias quatuor: de floribus nymphææ, de papauere, cuiusq; uncias decem. Quæ terenda sunt, contrito, deinde commistis omnibus secundum seplasiariorum regulam, electarium facito: quo utitor, ut ante diximus.

Controuersia  
inter Græcos,  
& Arabas.

Electarij de-  
scriptio.

Πινωρύχου. PINORVM ERVCAE.

CAP. II.

- 11 s qui erucas pinorum hauserint, illico dolor in ore & palato exoritur: vehemens alui, linguæ, ac stomachi, inflammatio torquet: intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem sentire uideantur: corpus totum exæstuat: fastidium urget. Quibus est succurrendum remedijs, quæ deuoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simplici oleo & irino, melinum, quod è cotoneis pomis & oleo temperatur, accipiemus.

Βούρεστις. BUPRESTIS. CAP. III.

Qui buprestin biberunt, non dissimile nitro uirus sapiunt: stomachi, uentrisque uehemens dolor insequitur: tam uenter quam stomachus mirum in modum, ut in aqua inter cutem, diffusus, inturgefcit. vniuersa corporis facies contenditur: vrina supprimitur. Quibus eadem, quæ potis cantharidibus auxiliantur. Priuatim post uomitus, & uacuationes, quas clysteribus molimur, aridæ ficus profunt: item earum decoctum, ex uino. Vbi uerò iam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum

Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulso, aut lactis potu, iuuantur. Pyrorum etiánum omne genus esse, & lac humanum bibere, conuenit.

DE BUPRESTIBVS, & pinorum erucis superius libro secundo satis differuimus, quantum ad earum historiam attinet: nunc harum uim ueneficam prosequimur. Hæc igitur animalia etsi pota, aut aliis in uentriculum ingesta, quædam symptomata, & incommoda pariant, ab his planè diuersa, quæ ab epotis cantharidibus inferuntur; tamen & ipsa eandem expetunt curationem, eademq; postulant medicamenta, quibus in epotis cantharidibus utimur. Verum aduersus hæc quoq; nonnulla propria, peculiariaq; habentur antidota, quorum cùm latius meminerit Dioscorides, non est cur nos de ijs plura dicamus.

Σαλαμάνδρα SALAMANDRA. CAP. IIII.

SI SALAMANDRAM hauserunt, linguæ inflammatio consequitur: mens, & sermo præpeditur: tremor cum torpore, aut horróre quodam, ac exolutione accedit: partes nonnullæ corporis liuoribus circumquaque fugillantur: sæpeque, diutius immorante ueneno, putrescentes desinunt. Quibus præstabis cuncta, quæ potis cantharidibus. Peculiaria uerò remedia, resina pinus, aut galbanum ex melle linctum, & aiugæ decoctum, in quo nuclei pinei conterantur: urticæ quoque folia, cum lilijs & oleo decocta. Profunt etiam. oua testudinis marinæ, aut terrestris cocta: item ranarum ius, cum quibus eryngij radix incocta sit.

Salamandra uenefica natura.

NON solium ueneno inficit, & necem adfert Salamandra sicca, & in puluerem pota, uel clam cibis admista; sed etiam morsu, uiperarum modo, cæterorumq; serpentium uenenum ei aculantiū. Quin & fructus, & herbas inficit tum salua quadam, tum mucosa specie, quæ è toto eius corpore sudat, magno degustantium discrimine: siquidem plerique reperti sunt, qui hoc tantum ueneno periire. Proinde mirum non esse uidetur, si recentiorum quidam tradiderunt, integras quandoq; interisse familias: quòd aquas bibissent, in quorum puteos, fortè Salamandra ceciderat: uel quòd panem tantum comedissent furio incoctum, qui lignis ea infectis concaluerat: Quibus tamen non usquequaque credendum existimo, cùm ignium ui uenena omnia absumentur. Sed potius adstipulandum fuerit Plinio, qui libro **XXIX. cap. LIII.** non ex pane furnis incocto, in quibus ligna salamandræ ueneno infecta, accensa fuissent, quosdam iam fuisse necatos prodidit, sed ex panis crusta lignis inassata pede tantam salamandræ contactis, ut eius uerba testantur, cùm inquit. Inter omnia uenenata salamandræ scelus maximum est. Cætera enim singulos ferunt, nec plures pariter interimunt, ut omittam, quòd perire conscientia dicitur homine percusso, neq; amplius admitti ad terras. Salamandra populos necare improvidos potest: nam si arbori irrepsit, omnia poma inficit ueneno, & eos qui ederint, necat frigida ui, nihil aconito distans. Quinimo si contactu ab ea ligno uel pede, quo crusta panis incoquatur, idem ueneficium est, uel si in puteum cadat. Quippe cùm salua eius quacumq; parte corporis, uel in pede imo resperfa, omnis in toto corpore defluat pilus. hætenus Plinius. His igitur, qui hauserint (ut Aëtius est auctor libro **XIII.**) præter ea quæ à Dioscoride scribuntur, maculæ in totum corpus exoriuntur albæ; deinde rubæ, postremo nigre, quæ tandem putrescentes, uniuersum deglabrant corpus. Sic uenenatis succurritur (ut Dioscorides ait) iisdem remedijs, quæ ad cantharidas præstant: Quod tamen aliquibus minimè uidetur rationi consonum. quandoquidem cùm salamandræ uenenum maxime frigidum, humidumq; sit, cantharidum contra calidissimum, & exiccans, nullo quidem pacto consentaneum censent, quòd iisdem utrisq; succurratur medicamentis. Verum his illud rectè, mea quidem sententia, responderi potest, quòd ubi Dioscorides salamandris cantharidum commendat medicamenta, de generalibus, quæ in uniuersum fiunt, duntaxat intelligit, nempe ut quàm citò fieri possit, uenenum è uentriculo, & intestinis extrahatur crebris uomitionibus, & clysmatis acrioribus: in cordisq; præsidium dentur theriaca, Miibridatum, aliq; generosa antidota, quæ pota cor ipsum à uenenatis omnibus tuentur. Siquidem in cantharidum capite, quod omnium primum habeatur, generalis methodus Dioscoridi tradenda fuit, ne eadem per singula capita sæpe frustra & ineptè repeterentur. Quare scitè cùm ad cantharidum remedia legentes reiecit, de generalibus tantum intelligit. Auicenna eandem salamandris adhibet curationem, quam opio, quòd tam hoc, quàm illæ frigidissimo sint temperamento. præfertq; cæteris theriacam, Miibridatis antidotum, resinam terebinthinam, styracem, urticæ semen, & cupressi frondes.

Stellionu consideratione.

Ceterum quoniam salamandra sui corporis forma STELLIONES mortiferi etiam morsu animalia mihi in mentem reuocauit, cùm eorum peculiarem mentionem non fecerit Dioscorides, non alienum fore duximus, eorum primam historiam describere, deinde uenenati morsu remedia in medium adducere. Sed an lacertarum generi legitime stelliones adscribi possint, profectò non ausim decernere: quanquam non desunt, qui asserant, maiores lacertos, quos uulgo appellamus Ramarri, alij Liguri, alij uerò Lucerti, ueros esse stelliones. Quorum tamen sententiæ non possum subscribere. quandoquidem Plinius libro **XI. capite XXV. & XXVI.** Stelliones inquit esse lacertarum figura, & chamæleonum quodammodo naturam habere, ut qui rore tantum uiuant, præterquam araneis. Ex quibus fateri licebit, stelliones non esse nostrates lacertos. namq; hi coehleas, cicadas, locustas, & papiliones deuorant, & id genus animalcula. Ad hæc copiosum in uentis continent sanguinem, & amplo referti sunt iecinore; hominibusq; haudquaquam inimicantur, quin potius eos amant. Contrà uerò ijs aduersantur stelliones, Plinio auctore libro **XXX. capite X.** ubi nullum animal fraudulentius inuidere homini tradidit. Præterea (ut idem eodem loco scribit) stelliones hyemant in domibus, in locis hostiorum, & fenestrarum, aut cameris, sepulchrisue. quapropter uenatores obseruant cubile eorum

cubile eorum aestatibus. Ibi uere incipiente fisis harundinibus textas opponunt casus decipularum modo, quarum angustius etiam gaudent. Venantur autē eos, ut eorum senectam, qua ut serpentes quotannis exuuntur, facile consequantur: quod nihil ei remedio in comitialibus morbis praefertur: ex more enim exutam senectam illico deuorant. Hinc igitur sanē perspicuum fuerit, stelliones à maioribus Italicis lacertis differre: hi siquidem in campestribus, in fructibus, sepibus, et maceris degunt, illi uero in sepulchris, et domibus nostris oberrant. Proinde iubet Dioscorides, ut qui in uenenorum timore uersantur, et culinam subdiali loco apparare nequeunt, sub tecto apparent. Sed tum diligenter laquearia animaduertenda, quod frequenter à superioribus contabulamentis animalia decidunt, exigua quidem, sed quae non modicam perniciem moliuntur, ut phalangia, stelliones, et alia quaedam reptilia. Quod autem stelliones in Italia proueniant, testis est Aristoteles libro VII. cap. XXIX. de historia animalium, asserens in quibusdam Italicis locis stelliones morsu homines perimere. Sed qui sunt, nullam habeo historiam clariorem. Quanquam his coniecturis iandiu existimauerim ea lacertarum genera esse stelliones, quae in Hetruria in nostris morantur domibus, praefertim quibusdam prope terram foraminibus, à nobis uulgò Terrantola appellata, de quibus superius libro secundo latius diximus, de lacerta Chalcidica differentes. Quandoquidem hoc animal lacertis persimile uisitur, et araneos maxime uenatur, ut Plinius inquit, item Aristoteles libro IX. cap. primo de historia animalium. Dorso praeterea maculis quibusdam nitet stellarum modo radiantibus; unde et fortasse nomen. Quinetiam, quod uenenum morsu relinquant, cum è cauernis exeunt, statim in Hetruria necantur. His (ut audio) abundat Syria in caminis potius, quam à liubi commorantibus. Varia sanē sunt huiusmodi animalium genera, de lacertis, chameleombus, scincis, crocodilis, stellionibus, et salamandris loquentes: quippe quoniam in unoquoque horum genere habentur differentiae tum formae, tum coloris, tum magnitudinis. Obseruauit ego salamandras in quibusdam Germaniae syluis uniuerso dorso nigerrimas, pectore uero, et uentre admodum rubentes. Sunt et in Vtinentibus aquis degentes, cauda anguillarum modo lata, et rotundo rostro, aluo admodum rubente, nigricante dorso, nullis maculis repperso. Quod etiam scincis euenit: nam et hi in Italia habentur Vicentino agro, parui et nigricantes, ijs utiq; absimiles, qui ab Alexandria Aegypti Venetias comportantur. Sicuti et in Arabia lacertae sunt bicubitales. In Nisa Indiae monte XXIII. pedum longitudine reperiuntur. Et in ea fortunatarum insula, quae Capraria nuncupatur, magnae admodum, et copiosae. Sed ut ad stelliones iam noster redeat sermo, eorum morsibus succurrendum est theriaca, Mithridatis antidoto, et alijs, quae in uniuersum uenenosorum animalium morsibus opitulantur. Imponuntur priuatim maximo praesidio, demorsis iam locis contriti scorpiones. Proinde oleum nostrum de scorpionibus, de quo abunde in prima huius conmentatione diximus, ijs praecipuum fuerit antidotum. Si uero quis uenenum hoc in potu ciboue sumpsit, primion tum uomitione, tum clysteribus extrahendum erit: mox ualentioribus antidotis cordi succurrendum, illud postremo non ignorandum est, quod (ut Plinius inquit) ex stellionibus fit malum medicamentum: nam cum stellio immortuus est uino, faciem eorum, qui biberint, lentigine obducit. Ob id in unguento necant eum insidantes pellicum formae. Remedium est oui lacteum, et mel, ac nitrum.

Stellionū mor-  
sus remedia.

## ΕΦΗΜΕΡΟΝ. EPHEMERVM. CAP. V.

ΣΥΜΠΤΟ ephemero, quod aliqui Colchicon, aut syluestrem bulbum appellant, pruritus in toto corpore excitatur, non secus atque ijs, qui vitica, aut scilla laceffuntur: interna rosionem sentiunt: stomachus cum ingenti grauitate exaestuatur. ceterum inualecente morbo, cruor strigimentis admixtus, per aluum exigitur. Quibus, ut ijs qui salamandram hausērunt, uomitione aut clysteribus auxiliari conueniet: sed antea quàm uenenum inualescat, dandum est decoctum frondium quercus, aut glandium, aut malicorij: lac bibere prodest, in quo serpyllum fit decoctum: item succum sanguinalis herbae, aut ramorum vitis, aut rubi, aut medullae recentis ferulae, aut myrti cum uino. Baccae autem myrti tussae tritaeque, et aqua macerae, ut liquor inde fumatur, opem ferunt. Media castanearum tunica, similem effectum praebet, si cruda in aliquo supradictorum succo sumptitetur: origanum quoque cum lixiuio epotum, eximie iuuantur asininae lactis, aut bubuli calidi potu, etiamsi in ore contineant: ita ut quibus copia lactis huius adsit, non aliud consideretur.

COLCHICI Ephemeris historiam picturamque reddidimus libro quarto, ubi ea attulimus, quae in ipso confideranda nobis occurrebant. Eius autem ueneno medendi rationem hoc loco adeo diffuse tradidit Dioscorides, ut plura ab alijs, qui post ipsum elaruerunt, consequi mihi non licuerit. Danda igitur opera est, ut primion (quod in alijs quoque sepenumero dictum est) crebrae uomitiones, et clysteres suum praestent auxilium. deinde propria antidota exhibenda sunt, praefertim humanum lac, asininum, bubulumque. Nec tamen omittenda, quae in uniuersum omnibus uenenis resistunt, de quibus iam saepius diximus. Sed quoniam inter uenena recensentur Anacardia sic Mauritania uocata, forma ephemero quadantenus proxima, quanuis colore dissimilia: itemque Staphis agria, quae et perniciofa habetur, et eiusdem ferè cum anacardijs temperamenti; cum haec Dioscoridi praetermissa uideantur; sintque medicamenta, quibus quotidie ad uarios humani corporis morbos utuntur medici, ab instituto nostro defecisse putarem, nisi eorum quoque naturae ueneficae propria assignassem remedia. Praefertim cum saepe contingat, quod haec medicamenta (quae crassa quorundam circumforaneorum ignorantia est, qui non modo non mederi, sed uix etiam legere sciunt) propinantur, nullis seruatis ponderibus, nec mensuris, nullisque additis medicamentis, quae illorum uim maleficam frangant: unde

Ephemeris ue-  
neni curatio.

Anacardiorū  
ueneni signa,  
& curatio.

unde nonnunquam miseri egrotantes in tam magna incidunt discriminā, & tam seua sequuntur symptomata, ut nō postea à peritis medicis remedia & antidota adhiberentur, facile deperirent. id quod plurimis euenisse scimus. ANACARDIA igitur tam in potionibus hausta, quàm aliàs ingesta præter quàm quòd fauces, guttur, & uentriculum inurunt, & usque adeo uniuersum excalfaciunt corpus, ut inde febres oriantur, excitant & paralytici in quibusdam corporis membris, & ratiocinatricem facultatem corrumpunt, quòd sua calorifica uel atrium succum exurant. Quibus est succurrendum, factis antea uomitionibus ac clysterijs, oleo amygdalino dulci, aut è pincis nucis, aut è nucibus Indicis, aut è papaueris semine, aut recenti butyro, & bubulo lacte. Dantur hæc affatim in potu, magno sanè iuuamento. Quin & alia pingua medicamenta conueniunt: nempe pinguium carniū iura, suillus, & anserinus adeps liquefactus, quadrupedum, & uolatilium cerebrum, & osium medulla. quandoquidem his amplissima inest facultas (ut pluries diximus) qua uenenorum calidorum omnium feruor extinguitur, retardaturq; acrimonia. Præterea ijs auxiliantur omnia, quæ suapte natura refrigerant, uel quæ arte fuerint refrigerata. Proinde Auicenna Anacardiorum feruori extinguendo ceteris prætulit bubulum lac acefcens, uiolaceum oleum, & hordeaceam pifanam, prius tanè glacie, uel niue frigesactam. Veruntamen proprium Anacardiorum antidotum sunt iuglandes, & pinorum nuclei aliquantisper torrefacti. Ceterum STAPHIS AGRIAS, anacardijs (ut paulo superius diximus) temperamento respondet, quòd admodum calida sit, ac urens. Quare eadem sanè adfert incommoda, quæ anacardia, & cantharides. Adurit enim fauces, & palatum, uomitiones commouet, uentriculi erosiones facit, & dysentericos fluxus ciet, postremo stranguat, nisi statim succurratur. Sed cum hæc sua sponte & propria facultate uomitiones molitur, non aliter est prouocandus uomitus: Verùm animaduertendum est, an ipsa reijciatur, quod ubi non euenierit, dulce amygdalinum oleum in potu fuerit dandum, admisto hydromelitis plurimo: atque interim cogantur egri, ut continuo inambulent. nanque hoc tantum medicamento ualentissimè per uomitum exigitur. Nec tamen ob id negligantur clysteres, quorum pluries meminimus, ut si ramentum ipsius aliquod ad intestina descenderit, his extrahi possit. Reliquum uerò curationis sumatur è cantharidum curatione, non omisis uniuersalibus antidotis.

Staphidis a-  
griz noxa, &  
curatio.

#### Δορύκνιον. DORYCNIVM. CAP. VI.

DORYCNION, quod aliqui manicon solanum appellant, epotum, lactis saporem in gustu refert: continentes singultus ciet, humor linguam uexat, sanguis cõfertim reijciitur: mucosa quædam perinde quasi dysentericis, aluo egeruntur. Itaque antequàm aliquid ex ijs eueniat, auxilio sunt antedicta, uomitus, clyster, & quæcunque potum uenenum expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur, aqua mulsa, lac caprillum, aut asininum, dulce uinum, quod tepidum cum aniso bibatur, amygdalæ amaræ, gallinacea pectora decocta. quinetiam conchilia omnia, tam cruda quàm tosta esse, salutare est. conueniunt & locustæ marinæ, & gammari, & pota eorundem iuscula.

Dorycnij ue-  
neni confid.

DE DORYCNIO satis differuimus libro quarto, quantum quæ nostra esset de eo sententia, ingenuè dicendum erat. Hoc tamen loco non tacebo, quòd idem esse non arbitror Dorycnium, & manicum solanum. quandoquidè duobus capitibus libro quarto, de his tanquàm de diuersis differuit Dioscorides. Verùm cuius uero etsi hoc in loco dixeris is reperiri quosdam, qui Dorycnium manicum solanum appellant, non tamen id esse uerum asserit, sed aliorum tantum refert opinionem, quam nec probandam censet. Ceterum Solano manico ueneficam uim inesse constat, utpote quod eos, qui ipsum hauserint, maximis afficiat incommodis, ut ipse Dioscorides testatur loco citato, cum inquit. Solani manici radix drachmæ unius pondere pota ex uino, facit species uanas, imaginesq; non iniucundas obuersari: sed duplicatus hic modus, ad tres usque dies mentis alienationem adfert: quadruplicatus uerò interimit. Remedio est aqua mulsa copiosius pota, & uomitione reiecta. Hæc perniciosas facultates, earumq; remedia loco dicto reddidit Dioscorides Solano manico: cuius tamen hic inter uenenatas plantas postea non meminit. Ibidem libro quarto non aliam uim maleficam Dorycnio assignauit Dioscorides, quàm quòd copiosius haustum mortem adferat. Hinc itaque conijcere auiam, quòd eadem utrisq; medicamentis facile competere possint. Dorycnium Auicenna uiam uulpinam uocat, nec tamen plura de eo retulit, quàm scripserint Dioscorides, & Paulus. Idcirco hoc in negotio à Dioscoride minime discedendum erit, nec ab ijs præterea medicamentis, quæ à nobis inferius in opij curatione describentur.

Solani manici  
ueneni noxa,  
& curatio.

#### Ακόνιτον. ACONITIVM. CAP. VII.

ACONITIVM statim in lingua inter bibendum, cum adstrictione quadam dulcescit: & subinde, potissimum cum exurgere conantur, vertigines offundit: lacrymas ciet: grauitatem pectori, & præcordijs adfert, simulque crebri spiritus deflantur. Quare uenenum uomitione abigi, aut clystere per aluum egeri opus est. Utimur inter propinandum, origano, ruta, marrubio, uel absinthij decocto, cum uino absinthite, uel semperuiuo, uel abrotono, chamelzæ, aut aiuga. Prodest etiãnum opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum castorio, pipere, & ruta, æquis ponderibus ex uino. coagululum hædi, leporis, aut hinnuli cum aceto: ferri quoque stercus, item uinum in quo aurum, ferrum, argentum uel cadens restinguatur, potum: lixiuiæque cum gallina, & uino decocta, aut carniū bubularum præpinguium iura, cum uino sumpta. Fertur & aiuga priuatim ipsis subuenire.



- TAMETSI plura sint, ut superius libro quarto retulimus, Aconiti genera: nempe tria, quæ cynosiona, lycosionaq; appellantur, & quartum pardalianches uocatum, quæ omnia ueneficam uim sortiuntur; uiam tamen, & eandem exposcunt curationem. Refert Aëtius, præter Dioscoridem, eos qui hausere, post dulcedinem, & adstrictiorum amaritudinem percipere: adstringuntur deinde maxillæ, subsequuntur morsus, & erosiones stomachi. Quibus nisi illico succurratur, caligant oculi, & suberuenti uisuntur. Oboriuntur tremores, corpusq; inuersum intueres se, fiuntq; egri hydropicis similes. Medendi ratio à Dioscoride petenda: quippe qui usque adeo præstantia descripsit medicamenta, ut Aëtio, & Auicenna plura non reliquerit addenda. Attamen Conciliator Aponensis, qui inter recentiores de uenenis luculenter scripsit, aconitum bibentibus sphragidem Lemniam commendauit drachmarum duarum pondere ex calida potam: dein uomitum excitari iubet: à uomitu theriacam eodem pondere exhiberi, ex uino in quo incocta fuerit gentiana. Atq; adeo putat Aconiti præcipuum esse antidotum longæ aristolochiæ radicem. Cæterum dum hæc scriberem, mihi in mentem uenit nonnunquam inter uenenatas plantas haberi scillam, flammulam, urticæ, & dracunculi semen, quæ cum hic silentio prætermissa fuerint à Dioscoride, optimum institutum esse putauimus, nunc de singulorum ueneno, eiusq; remedijs nonnulla commemorare. Sunt igitur in SCILLARVM genere, quæ suapte natura uenenoſa proueniunt: sunt etiam contræ quæ nullo imbutæ ueneno in medicum ueniant usum. Hæ potest, uel aliàs ingesta, nullam pariunt noxam, nisi earum plus, quàm par sit, assumatur. Illæ uerò sua malefica uis, etsi quàm parce deuorentur; illico tamen hominem torquent, quemadmodam fungi. Venenosa autem scilla (ut Mæſues, ac cæteri Mauritanorum tradidere) sola nec alteri annexa prouenit, lociq; oboritur sædis, ac graueolentibus, ut apud thermas. Discant igitur diligentissimi seplasiarj ijs uti scillis, quæ simul conſeſcuntur, sapore amaro, acri, simul & dulci, splendentibus undiq; laminis. Quandoquidem nulla his facultas inest, qua corpus lædi possit: nisi fortasse, ut dictum est, plus earum assumeretur, quàm ferre posset natura. Quamobrem de his differens Auicenna inter uenenatas plantas feni septima quarti uoluminis, sic inquit. Scillæ malæ, aut probatæ longior usus, quàm par sit, uentriculum exulcerat, & intestina, ipsaq; mesaraicas uenas, aliòsque meatus, qui è uentriculo in iecur permeant. Quo fit, ut in uisceribus oriantur punctiões, acutiq; cruciatus, & inde dysenteria. Quibus incommodis succurritur lactis potu, in quo ferrum, quod Græci stomoma, nos uerò chalybē appellamus, pluries restinctum fuerit, deuoratisque ouorum uitellis, in aceto decoctis. Quinetiam ijs fixa cibaria conſerunt, pingua carniū iura, recens, crudumq; butyrum, & extrema iuuenum quadrupedum membra, aliq; permulta, de quibus latius egimus, cum de cantbaridibus sermo haberetur. Nec minora facit incommoda FLAMMULA uocata, cuius historiam scripsimus libro quarto in alterius clematidis mentione. Ipsa enim præter uenenoſam, quàm possidet facultatem, excalfacit ordine quarto, adeo ut ualentissime corpus exulceret, ubi fuerit imposita. Ingesta uerò fauces, guttur, uentriculum, & intestina magnis afficit ardoribus. Quin & intolerabilem excitat sitim, & aridam reddit linguam: intestina deradit, et ardentem pellit urinam. nam quandoque tam altè excoriat, ut erosio uasorum tunick, mictu sanguis reddatur, intolerabili sanè dolore. Ad hoc facit, auxiliaturq; excitatis prius uomitibus, et clysteribus infusis, lac bubulum suo cum butyro potum, aut alio recenti admixtum, item amygdalinum oleum, aut è pineis nucleis, aut Indicis nucibus, aut papaueris semine expressum. Quippe (ut iam sæpenuero diximus) huiusmodi acutorum curatio, non est aliunde petenda, quàm à pinguibus, & seminum quorundam crassamentis. Præstat hoc in negotio & iecur fouere, lactucæ, portulacæ, & intubi hortensis succo: item santalis aqua rosacea maceratis: quin et balicacabi baccas deuorare prodest. Quod si cruenta cum lotio reddantur, illinantur statim renes, pubes, testes, & ipsa demum uirilia, rosarium, polygonij, plantaginis, cynoglossi, papaueris, lactucæ, et hyoscyami succo. Opitulatur etiam clysteres è bubulo, aut caprisno lacte, aut è pinguibus carniū iusculis infusi, addito rosaceo, et uino è myrtinis baccis confecto, ut diffusius in cantbaridum curatione retulimus. Sequitur VRTICÆ SEMEN, id præsertim, quod lini semen refert, quo excitande ueneris gratia quidam utuntur. Sed cum & ipsum in medicum ueniat usum, ac etiam quorundam cibis admisceatur, animaduertendum est, ne largius ingeratur, præsertim solum, sed ijs adijciatur cibus, uel medicamentis, quæ eius acrimoniam excedentemq; feruorem obtundere, & extinguere queunt. cuiusmodi sunt pistacia, nuclei pinei, dulces amygdalæ, nuces Ponticæ, & priuatim deglubitum sesami semen. Nam cum urticæ semen affatim deuoratur, non solum (ut Auicenna est author) omnes scillæ malos præbet effectus; sed priuatim etiam continentem excitat tussim. Curatio eadem quæ scillæ. uerum ad finiendam tussim, quæ priuatim ex urticæ semine prouenit, ea non sunt omittenda, quæ suapte natura pectoris asperitates mulcent: qualia sunt amygdalinum oleum, serapium uiolaceum, & ex zizypho, saccharum quod candidum uocant, diatragacanthum frigidum, hordeacea ptisana saccharo inspersa, & id genus alia. Præstant præ cæteris (ut scribit Conciliator) ad epotum urticæ semen, malorum cydoniorum semina contusa, & ex calida aqua pota. Calidissime porrò, acerrimæq; facultatis est etiànum DRACVNÆ CVLI semen, utpote quod potum, aut in cibus sumptum, guttur asperitate afficiat, adurat, ac pungat: linguam itè, gingiuas, & dentes uexat: quin & corpori uniuerso ingentem calorem inducit. His noxis auxiliatur recens butyrum haustum. Priuatim tamen præcipuum remedium adfert hordeacea farina in pulcem conformata, additis pinidijs, aut saccharo, amygdalino oleo, uel. recenti butyro.

Aconiti ueneni consideratio.

Scillæ uenenoſe noxa, & curationo.

Flammulæ ueneni noxa, & curationo.

Vrticæ seminis noxa, & curationo.

Dracunculi seminis noxa, & remedia.

ΜΕΛΙ ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΑΣ. MEL HERACLIÆ. 662 CAP. VIII.

MEL IN Heraclia Ponti, ubi aconitum gigni solet, inuenitur. quod qui edunt, bibuntve, non secus affliguntur, quàm qui aconitum ebiberunt. Iis eadem, quæ poto aconito conueniunt. Adiuuantur in primis continuo uini mulſi potu, cui rutæ folia sint adiecta.

663

KL MELLIS

MELLIS Heracleotici historiam, & vires fusius libro secundo retulimus. Quo in loco tradidit Dioscorides (etsi id postea hic silentio inuoluerit) eos mente abalienari, ac sudore diffluere, qui illud comederint: remedio autem esse rutam esitatum, & salsamenta, aut epotum mulsim. Sed cum iandiu in Italiam non adferatur; ideo nec curae eius insistendum est, praesertim quod eandem cum aconito uenenatam sortiatur facultatem, & curationem.

Κόριον. CORIANDRVM. CAP. IX.

CORIANDRVM ob odorem latere non potest. epotum autem vocem exasperat: insaniam adfert, à temulentijs non abhorrentem. qui sumpserunt, pudenda dictu blaterant, totiusque corporis odore, venenum fatentur. Quibus post uomitionem irino oleo concitatum, uti retulimus, 10 merum & per fese, & ex absinthio potum auxiliatur: item oleum: nec secus oua in eodem exinata, si liquefacta in muria forbeantur: & epota muria, & ius. sal sum ex gallina, & anseri: passum quoque cum lixiuia sumptum.

Coriandri uenefica natura.

Mauritanorum error.

Coriandri ueneni remedia.

DE CORIANDRO libro tertio abunde disputauimus, atque ostendimus, quam aperte cecutiant in erroribus uersentur medici illi, qui Mauritanos secuti, eius semen saccharo contextu ad inhibendos uapores in caput ascendentes, & cerebrum roborandum, à prandio, & coena suis egrotantibus deuorandum exhibent. quandoquidem (ut Dioscorides est author) prorsus contrarium facit. Quare fuerit, mea quidem sententia, existimandum Mauritanos rem hanc perperam accepisse. Auicenna uirescenti tantum uim inesse uenensam putat, quae stuporem, & uertiginem inferat, & homines in furorem agat, inebriet, mentemque moueat: sicco uero contrariam. Id quod minime rationi consentaneum uidetur: nam etsi sicco coriandri semini humoris tantum non insit, quantum in eo uisitur, quod ultimam maturitatem non sensit, & in herba ipsa; non ob id tamen asserendum erit, eandem non habere facultatem, quamuis non adeo uehementem: siquidem in sicco semine uiridis vires non euanescent. quod in papaueris, hyoscyami, cicuta, & aliorum complurium semine, apertissimo exemplo cognoscitur. Vanum igitur fuerit credere, coriandri semen iam maturitate siccum, contraria illi facultate pollere, quae in uiridi reperitur. Quod si uerum esset (ut quidam opinantur) necessario sequeretur Coriandrum ultimam maturitatem adeptum, in aliam transire speciem, suo utique generi contrariam. Sunt praeterea recentiorum quidam, qui ut Mauritanorum sententiam tueri uideantur, asserunt deleri coriandri noxam, qua cerebrum tentat, & mentem turbat, si triduo semen aceto maceretur. Quod minime probandum censemus. quippe quamuis ea, quae ad medicamentorum uenenosorum acrimoniam hebetandam, noxamque tollendam adiunguntur, hoc aliqua ex parte efficere uideantur; non tamen eorum temperamentum, & vires usque adeo permutare queunt, ut contrarium illi praebant effectum, quae suapte natura, priusquam ea adderentur, in nostris corporibus exhibebant. Opitulatur ijs, qui coriandrum largius sumpserint, praeter ea quae à Dioscoride produntur, sibi iacata ipsa ex mero pota: quin & herba uincetoxicum uulgo uocata, de qua libro tertio scripsimus in Asclepiadis mentione: namque haec propriam coriandri antidotum est. Subueniunt praeterea raucedini, uocique exasperatae gargarizationes ad id expertae: item ea, quae pectori conueniunt. Ad cerebri uero noxam praestat diamoschum, & diambaram, & id genus alia, quae cordi, & cerebro auxiliantur.

Ψύλλον. PSYLLIVM. CAP. X.

PSYLLION epotum, corpori toti frigus, & torporem cum exolutione, & mœrore quodam 40 adfert, ita ut animus despondeant. Cui omnia, quae exhausto coriano auxiliantur.

Psyllij ueneni noxa, & curationis.

PSYLLIVM, & eius semen, cuius in pharmacopolijs frequens est usus (ut superius libro quarto diximus) notum omnibus est. Hoc in potionibus hausto praeter ea, quae à Dioscoride illi assignantur indicia, consequitur anbelitus difficultas, alui tumor, & tanta denique cordis anxietas, ut plerunque oborto sudore frigido commoriantur egri. Curantur qui hauserint, primam uomitionibus, & clysmatibus. Post haec antidota illa exhibenda sunt, quae in uniuersum omnibus uenenis aduersantur. Sed & ea omnia ijs maxime subueniunt (ut Dioscorides est author) quae & ijs, qui coriandrum exhauserint.

Κικύα. CICVTA. CAP. XI.

CICVTA pota uertiginem excitat, oculisque caliginem offundit, ita ut ne minimum cernatur: singultus ciet, mentem turbat, extremi artus gelantur: denique conuulsi, suppresso arteriarum spiritu, strangulantur. Quare inter initia, uti in reliquis, cicutam vomitu, excutiemus: postmodum deiectionem moliemur, ut quod ad intestina prolapsum sit, excernamus: tum demum in meracam potionem, quae maximo est auxilio, deueniemus. repetendum per interualla, in quibus proderit, lac asininum, aut bubulum potui datum, ut absinthium cum pipere & uino, castorio, ruta, mentha cum uino, aut amomi, cardamomi, aut styracis uncia, aut piperis, cum semine urticae & uino, aut lauri folia. Item laser ex oleo, & passo, & passum per fese largius potum proficit.

**CICUTAE** historiam, & facultates, quibusq; in locis magis exiis proneniat, ita copiose retulimus libro quarto, ut opus non sit, ea hoc loco repetere, nec plura nobis restent addenda. Sed iam ad uires eius ueneficas transeundum est. Potabz, uel in cibis sumpta ( ut Dioscorides inquit ) uertigines excitat, usum admittit, oculis caligine offusa, & mentem usque adeo perturbat, ut in furorem agi uideantur, qui hauserint. Quae omnia experimento nobis comperta sunt. Quippe cum rusticus quidam magnifici Ioannis à Turri uinitor non longè à Goritiae arce suas coheret uineas, ligone forte fortuna erutis cicute radicibus, secumq; domum delatis, pastinacae radicis loco decoxit, comeditq; in coena una cum uxore: mox statim ( quae rusticorum consuetudo est ) ambo iuere cubatum. Media autem nocte, à somno expergescens, omni penitus amissa ratione, buc atq; illuc per domum in tenebris uagabantur, amentia, & furore ducti: unde adeo caput, faciem, & oculos in parietes percusserunt, ut mane accurrentibus uicinis, partim percussionibus tumidi, partimq; effuso sub cute sanguine liuentes, tumentibus admodum oculorum palpebris, horrendam ac monstruosam ostenderent faciem. Vocor ego statim ad curam, percontatisq; domesticis, quibus edulys in coena uisitassent, reperi hos cicute esitasse radices, quas pastinacae esse crediderant. Quandoquidem mihi in propinquam uineam adiuuanti, ostenderunt alij locum, ubi rusticus ille radices effoderat, ibiq; inueni alias cicute radices, quae iam folia emittere incipiebant. Qua re perspecta celeriter ad agros redij, quos quidem non multo post tempore, Deo adiuuante, in pristinam mentem & sanitatem restitui. tamen si percussionum curatio multo longior fuerit, quam ueneni. Decepta quoq; hisce radicibus est superioribus annis quaedam nobilis matrona à Coloreto Vtinenfis, quae cicute radices proprio in horto effossas toti familiae decoxit, prebuitq; esitandas carotarium loco. Quinetiam monachum Franciscanum curauimus, qui pluribus mensibus modò amentia, modò furore agebatur, quòd cicute folia hortensis petroselini uice piscium quorundam iusculis imposita comedisset. Caueant igitur omnes, ne in hac ueniant discrimina.

**Exhibet Aëtius**, præter Dioscoridis antidota, cicutam haurientibus apij semen, ex uino potandū, aut iridis radicem, aut feseli Massiliense: item nitrum ex aqua copiosiore potum. Totum præterea corpus calefacere conducit, & præsertim præcordia. quamobrem ad uehementiorem motum, ac cursum ( ut ipse inquit ) cogendi sunt egrotantes. Conciliator tamen theriacam maximopere commendat, duarum drachmarum pondere, ex dictamni decocto potam: aut gentiane radicem ex uino. Namq; hoc cicute uerum esse antidotum putat.

Cicutæ uenefica uis.

Historia cuiusdam casus.

Cicutæ sumptæ curatio.

Σμίλαξ. TAXVS.

CAP. XII.

**SMILAX**, à quibusdam tithymalum, à Latinis taxus appellatur. frigus uniuerso corpori, strangulatus, & celere interitum infert. Cui eadem, quae cicutæ conueniunt.

**TAXVS** arbor, cuius historiam superius libro quarto retulimus, ubi & eius plantæ picturam adiecinus, non solum eos perdit homines, qui folia & fructus esitauerint, uel biberint foliorum succum; sed etiam ( ut aunt quidam ) quadrupedum omne genus, quod præsumptum pabulum non raminat: cuiusmodi sunt equi, asini, muli, & id genus alia. quanquam scribit Plutarchus, tertio symposiorum commentario, Taxum eo tantum tempore noxiam, quo iam florere inceperit, quòd succo sit maxime prægnans: Dioscorides libro quarto de taxo agens, inquit. Narbone tantæ presentis est ueneni, ut si qui dormiant sub ea, aut in eius umbra subsideant, ledantur, & sæpenumero moriantur. Id quod Sestius ( auctore Plinio libro xv. capite x. ) in Arcadia quoq; euenire scribit. Vasa etiam uiatoria ex ea unis in Gallia factis mortifera fuisse compertum est: & in Hispania lethales esse baccas. Prouenit arbor hæc frequens in Tridentinis montibus, præsertim Ananie uallis, & Flemarum, ubi ea inter ingentes abietum, picearum, pinorum, & laricium syluas, numerosa conspicitur. Iis in locis nobis compertum est, quòd non modò iumenta, quæ non ruminant, deuorata tæxto, moriuntur; sed etiam quæ ruminant. quandoquidem boues complures uidimus à rusticis deplo-ratos, qui taxum depasti fuerant. Quapropter cum in montanis, syluosisq; pascuis boues morbofi fiunt, conclamant rustici, animaduertendum esse, ne Naxum degustauerint: ita enim taxum corrupto uocabulo nominant. Nihil minus eius baccae iisdem in locis noxie ac perniciose deprehenduntur: quippe quòd curauerim ego pastores, aliosq; in syluis ligna cadentes, qui saporis dulcedine allekti, baccas ipsius comederant. ex quarum esu non modò in ardentes febres inciderant; sed & in alui profluium, adeo ut in maximo uersarentur discrimine. Cæterum non parum dubitandum uidetur, an inter plantas calidas, uel inter frigidas Taxus sit reponenda. Dioscorides quidem, & eius sequaces omnes existimarunt Taxum esse frigidi temperamenti, argumento quòd asseruerint, iisdem remedijs taxi uenenum superari, quibus & cicute. Quorum tamen sententia, omnium pace dixerim, mihi planè non probanda uidetur. namq; amaror, qui cortici, & frondibus inest: coma perpetuò uiuens, pinorum, abietum, & picearum modo, quibus fronde similis spectatur: baccarum tum dulcedo, tum acrimonia quædam: & quòd auicule eas depaste nigrescant; manifestè indicant insignem temperamenti caliditatem. Atq; hinc est, quòd & febribus, & alui profluvio tentantur, qui baccas esitarunt, inflammatis eo cibo spiritibus, & sanguine. Verum quanuis aliquis respondere posset, accendi in his febres, gigni q; alui profluium, ex humorum putredine, quemadmodum in æstate eueniunt hæc ex frigidorum fructuum esu: nigrum uerò colorem in auiculis contrahi posse non minus à frigido, quam à calido; ex eo tamen adhuc suspecta & improbanda relinquitur eorum sententia, quòd frondium, & corticis amaror, baccarum dulcedo, & acrimonia, perpetuò uirescens coma, nulla prorsus repugnantia contrarium præ se ferant, nempe quòd & febres, & alui profluvium oboriantur potius caloris primum exuberantia ( ut accidit deuoratis anacardijs ) quam humorum putredine. Neque præterea potest nigredo illa à frigido pabulo in auicularum pennis suboriri: nam si frigiditate nigrescerent, illico perirent. Quandoquidem nimis excedens frigus haudquaquam nigredinem inducit, nisi membris simul confectis ac de-

Taxi uenefica natura.

Taxus utrum calida, uel frigida.

Nerij malefica natura.

perditis. At non ita sit ea nigredo, quæ perustis humoribus gignitur, quemadmodum accidit Acibiopibus. Hæc sene dixisse uolumus, non ut quicquam tam celebratorum uirorum authoritati detraberem, neq; etiam quod ausum temere eorum sententijs refragari; sed ut meam in medium proferrem sententiam, atq; ut hæc à nobis proponerentur alijs discutienda, & studiosis diligentius æstimanda. Ceterum quoniam taxus **NERIUM**, quod Græci rhododendrum, & rhododaphnen uocant, Mauritani uerò oleandrum, mihi in mentem redegit, cum sciam scripsisse Galenum, & ipsum secutos, non modò brutis; sed etiam hominibus esse uenenum, cumq; eo quàm plurimis in locis referta sit Italia, prætereundum non duxi, quin hic de Nerio aliquid dicerem. Et quauis non absq; ratione fortasse scripserit Dioscorides libro quarto, itemq; in huius præfatione, quòd Nerij folia & flores, si deuorentur, hominibus contra mortiferos serpentium morsus præsidia sunt, atq; in hac re ideo possit ei fides adhiberi, quòd etiam cantharides dentur potande à cane rabido demorsis, & euphorbium ictis à scorpiione; cum tamen nec Galenus, nec qui eum sequuntur, nec Auicenna, ceteriq; posteri id probent, aut admittant, Nerium potius dimittendum putarem, quàm cuiquam exhibendū, præsertim quòd alia non desint antidota, quæ à serpentibus demorsis magnopere opitulantur. Nerium igitur, Galeni & Auicennæ testimonio, tam potum, quàm in cibis sumptum, quauis non largius ingeratur, homines & quadrupes interficit. Primian enim intolerabiles excitat angustias, intumescit inde aluius, & subsequitur uniuersi corporis inflammatio: quòd temperamento calidum sit, & siccum, diffecans, et exulcerans. Ob id enim non tantum noxam corporibus infert, intra corpus sumptum; sed etiā eos afficit, qui in eius umbra subsederint, taxi (ut antè diximus) modo. Quinetiam aque fluuiorum, & lacuum, in quorum ripis Nerium crescit, umbra, frondibus, floribusq; deciduis infestæ, nonnunquam in magnum discrimen bibentes ducunt. Succurritur noxæ epoto fœni græci decocto, aut deuoratis palmulis, aut uiticis semine, aut frondibus, aut hausto horum decocto. Conferunt et caricæ ex melle, aut saccharo aut iulapio sumptæ. Præterea defrutum, & pinguis, & quæ crassum dant alimentum auxiliantur, non omissum tamen clysteribus, & uomitionibus, ut in alijs omnibus sæpenumero dictum est. Conuenit & diacastoreum (ut Conciliator est author) potum duarum drachmarum pondere. Prosumt item iuniperi bacce eodem pondere. Porro illa quoq; lethifera est arbor, quam perperam quidam Sicomorum appellant, quæ fructus profert loti arboris instar, quorum ofisculis funiculo traiectis, suas preces Deiparæ uirgini numerant infimæ gentis mulieres, quæ illos uerticillos à monachis sæpe dono accipiunt, quòd in eorum monasterijs arbor ea frequens reperiatur. Hanc Auicenna uocat **AZADARACHT** sen VI. quarti uoluminis, sic inquit. Folia Azadaracht, quemadmodum & lignum, animalia necant. Tollitur noxa ijs medicamentis, quæ in uniuersum omnibus succurrunt uenenis. priuatim uerò ijs, quibus & nerij uis exitialis aufertur. Caueant itaq; omnes, qui hanc arborem suis in uiridarijs alunt; ne forte imprudenter se ipsos, & domesticos omnes in perniciem agant. Sed si aliquis fortasse dubitaret hanc arborem non esse Azadaracht Auicennæ, fidem illi manifestam faciet Andreas Bellunenſis, qui in Arabicorum nominum interpretatione, ita esse apertè declarat.

Nerij ueneni curatio.

Azadaracht arboris uenenum, & remedia.

### Καρπάσι ὀπός. CARPASI SVCCVS. CAP. XIII.

**EPOTVS** carpasi succo sapore, citamque strangulationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epotæ cicuta remedijs.

Carpasi, & opocarpasi consideratio.

**QVOD NUNC** hodie plantæ genus nobis Carpasium dici possit, omnino fateor me ignorare: nec quinquam reperiri crediderim in Italia, qui plura quàm nos de Carpaso referre possit. Quandoquidem etsi hic inter uenenas plantas illud descripserit Dioscorides; nusquam tamen in præcedentibus libris quicquam de Carpaso retulit, quemadmodum nec posteritatem Græci, quàm Arabes, ex quo coniectari possit, quādiu antiquis fuerit carpasium. Hoc Paulus Dioscoridem secutus lib. V. carpesiam uocat. Quamobrem credidere nonnulli carpasium, carpesiam, & carpesium, de quo primo libro latius diximus, unam ex eandem esse plantam. Sed uanam prorsus horum sententiam esse arbitror. Siquidem à nemine posteritatis memoriæ proditum inuenitur, deleteriam uim ullam carpesio inesse, uerum eandem (ut Galenus, & Paulus testantur) quæ ipsi phu. quinimo ita aduersus uenena commendari compertum est, quòd Quintus carpesium cinnamomi loco in theriacam addere non dubitauerit, quòd tantum id præstare existimauerit, quantum potest laudatissima cassia. Verum si quis fortasse assereret opocarpasium, de quo scribit Galenus, dum probatissima myrrha notas expendit, libro primo de antidotis, et opocarpasium hoc loco à Dioscoride descriptum unum ex idem esse medicamentum, is meo quidem iudicio, rem (ut aiunt) acutè tetigisset, quòd opocarpasium Galeno mortiferum omnino sit & lethale. Ceterum cum huius usus, & notitia apud omnes penitus exoleuerit, non est cur alia à nobis frustra de eo sit instituenda curatio.

Vana quorundam opinio.

### Σαρδονία ἄνθος. SARDONIA HERBA. CAP. XIII.

**SARDONIA** ranunculi herbæ generi assignatur, quæ uescentibus mentem adimit, & quadam neruorum distentione labia in rictum contrahit, ut risus speciem præbeant. à qua quidem affectione, de Sardonio risu adagium in vulgus infausito omine manauit. Post uomitum peculiariter conuenit aqua mulsa & lac, liberalius epota: irrigatio, perunctioque à pinguibus medicamentis, totum corpus excalfacientibus: in calidam aquam, oleumque descendant, sed tum multum perfricare, & inungere expedit. & in summa, curam omnem, quæ conuulsioni neruorum adhibetur, exequi oportet.

Quod inter Ranunculi genera ea annumeretur planta, quæ à Sardiniâ, ubi plurima nascitur, nonnullis vocatur herba Sardonîa, abunde docuit Dioscorides libro secundo. Tradidit huiusce curationem Aëtius libro xiiii. qui præter ea medicamenta, quæ huic curationi à Dioscoride redduntur, declarat quibus auxilijs hoc conuulsionis genus priuatim curari debeat. Quippe cum diuersa sint conuulsionum genera, diuersa etiam exposcunt remedia. Præsertim tamen castoreum in puluerem contritum aut per se, aut è dulci uino potum. Ceterum, ut Conciliator est author, adiuuantur qui hauserint Apium risum (sic enim Sardoniam herbam appellauerunt Mauritanî) uino dulci potensq; adeo largè epoto, ut inde ebrii facti diutius dormiant: item melissophylli succo, ex aceto sumptio: is enim, ut idem ait, Sardonie herbe uerum ac singulare est antidotum. Sed quoniam (ut Dioscorides prodidit) in hac cura, balnea, & laconica admodum profunt, ea utiq; paranda sunt medicamentorum decoctis, quibus uis insit exalfaciens, tum etiam desiccans, & quæ propria facultate nervos tum roborent, tum iuuent. Cuiusmodi sunt, stæchas, hyssopum, salvia, ruta, betonica, chamæpitys, amaracus, origanum, calaminiha, pulegium, dictamnium, anthemis, saturia, acorion, Syriaca & Celtica nardus, asarum, phis, cyperus, rosmarinus, & id genus alia. Ad hæc præstat iungere occipitium, ceruicem, & uniuersam spinalem medullam, fusino oleo, aut è castoreo, aut è terrestribus lumbricis, aut è costo, aut ex hyperico, aut uulpino, aut unguento aragone, aut agrippino, aut deniq; alijs his similibus.

Sardonie herba uenenum, eiusque curatio.

## ΥὢΟΣΚΥΑΜΟΣ. HYOSCYAMVS.

## CAP. XV.

Hyoscyamum potum, aut comesum, similem ebrijs ab alienationem mouet: sed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsa copiosè data, lacque, præsertim asininum: si id desideratur, caprillum, uel bubulum, uel aridarum ficuum decoctum. Faciunt ad id etiam nuclei pinei, aut cucumis semen ex passo sumptum, & uinum falsum, cum adipe suilla recenti, passoq;: itidem urticae semen, aut nitrum ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis, & nasturtium, radix, cepa, & allium: & hæc singula cum uino sumantur. Postea finendi quiescere, quemadmodum qui uinum biberunt, ut excoquant.

Succurritur facile Hyoscyami noxiæ, cuius historiam cum Dioscoride tradidimus libro quarto, ubi eius quoq; effigiem dedimus, si antea, quam uenosa uis inualescat, superetq; corporis uires, conferentia propinentur medicamenta. Sed præter indicia, quæ epoto, uel comeso hyoscyamo à Dioscoride assignantur, alia plura eidem reddidit Aëtius libro xiiii. nempe quod insequatur iactatio corporis cum distortionem: quibus succedit exolutio, animi deliquio similis, oculorum rubor, pruritus, deinde tremor: præterea omnino delirant ægri, & putant se flagris corpore cædi. Proinde merito Ananienfes hyoscyamum uulgò uocant Disturbio, utpote quod mentem, & omnes corporis sensus distorbat. Meminit utriusq; hyoscyami inter deleteria pharmaca etiam Auicenna, sic inueniens. Epoto hyoscyamo albo, osuam compagine luxantur, lingua in abscessus transit, spumat os, caligant & rufescunt oculi, spiritus difficulter redditur. Hinc fiunt uertigines, surditas, gingiuarum, & totius corporis pruritus: ebrietas, amentia, furor, comitialis morbus, uocisq; diuersitas: nam quandoque rudunt affecti, asinorum mulorumq; more, & equorum inodo hinniunt. A nigro autem corporis extrema confrigescunt, obtenebrantur oculi, oboritur delirium, atq; adeo constringitur pectus, ut impedita prorsus respiratione, suffocentur, conuellanturq; ægrotautes. Verum hæc omnia cicutam facere tradiderunt Dioscorides, & Paulus. Quo fit, ut suspicari liceat, in hoc cecutisse, errasseq; Auicennam, quemadmodum & in alijs quam plurimis simplicibus medicamentis, quorum nomina ab eo sæpenumero confunduntur. Ceterum in albi hyoscyami curatione idem Auicenna præfert ceteris medicamentis theriacam, & Mithridatis antidotum. Sed ijs, qui nigrum hauserint, post uomitum, & clysteres, meracum præbet potandum: quin & bubulum lac, absinthium, castoreum, rutam, laseris lacrymam, baccas & folia lauri, destitutum, urticae semen, magulæ ram, cardamomum, & styracem: sed quæ singula ex uino sumantur. His præterea addit mori radice decoctum, & opobalsanum ex lacte potum. Ad hæc insuper farinam triticam uino subactam, emplastri modo uentriculo utiliter imponi promittit. Sunt porro ex recentioribus nomine præclaris, qui longum piper in hoc magnopere commendat, atque etiam pistacia largius manducata, ceteris præferunt antidotis.

Hyoscyami uenosa uis.

Auicennæ erratum.

Hyoscyami utriusque curatio.

## Μανδραγόρας. MANDRAGORA.

## CAP. XVI.

Mandragora si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ac uehemens ueternus, nihil temerè distans à lethargo. Cui, antequam aliquid ex ijs accidat, uomitus & aqua mulsa proderit: postea nitrum, & absinthium, ex uino dulci, aut passo sumantur. caput rosaceo, & aceto perfundatur. Proficit excitatio, & motus corporis, & olfactus eupatorii, & piperis, sinapis, castorij, & rutæ, tritorum in aceto: & liquidæ picis, & odor è lucernarum exustione, & extinctu. Quod si ægrè ij reuocentur, sternutamenta mouere, alijsque communibus auxilijs uti conueniet.

Quandoquidem Mandragoræ historiam latius prosecuti sumus libro quarto, ubi utrunq; eius genus depinximus; ideo nunc tantum indicia primium, & accidentia referam, quæ ab epotis uel deuoratis eius tum radice, tum fructu euenire solent: deinde horum curationem aggrediar. quoniam si diutius malefica uis serpere, augeriq; negligenter dimittatur, nullis adhibitis remedijs, facile ij qui hauserint, emori poterunt. Quamobrem dixerim, Aëtium

Mandragoræ uenefica natura.



Mandragoræ  
noxæ reme-  
dia.

Rosaceum v-  
trum hic con-  
ueniat.

Metellarū nu-  
cū ueneficiū,  
& remedia.

secutus, eam uix fallere bibentem, aut comedentem posse, quod odore sit admodum graui, ac nauseabundo, amaro in-  
cundoq; gustu. Certa itidem copia, & mensura ad ledendum requiritur. De cætero uero molestias quidem facit, sed  
serius interimit. Huius potu facile egrotantes (ut Dioscorides inquit) in ueternum soporem delabuntur: quin &  
seignes, & languidi, & tristes, & exoluti fiunt, adeo ut clamoribus, ac torisionibus excitati, repente rursus tanquam  
amentes recidant. Remoueri noxam scribunt, præter ea quæ Dioscoridi produntur, coriandri semine, aut pule-  
gio ex calida aqua, aut alui deiectione cum deiectorio medicamento, quo ad ueternosos utimur. Quod si à uomitu, qui  
malè habent, non excitentur à somno, origanum potandum ex frigida, tanquam expertissimum medicamentum offerri  
uolunt. Prosunt item acria clysmata, frictiones asperis linteaminibus in totum corpus extensæ: cucurbitulæ ignis flama  
apposita tum occipitio, tum scapulis, tum etiam natibus: fibulæ extrema corporis membra torquentes: quin &  
sternutamenta, quæ ueratri albi puluere naribus indito cienda sunt: & septica medicamenta uesticis excitantia, ut  
cantharides, & ranunculus, occipiti, & post aures emplastri modo imposita, maximopere auxiliantur. namque hæc  
omnia ualentissimè reuocant, quæ cerebro officiant. Porro animaduertendum est, quod iubet Dioscorides egro-  
tantium caput ad repellendum uapores eò petentes, rosaceo, acetoq; persundi. Id quod etiam Galenus lethargicis cõ-  
mendasse uidetur libro xiiii. methodi medendi. Sed hoc certè, si quis rem accuratè expendat, rationi refragari de-  
prehenditur. Vnde nil mirum, si Paulus, Aëtius, Alexander Trallianus, & alij, qui Galeni uestigia sequuntur, ciam  
rectè nouissent ueternum morbum à frigidis tantum humoribus provenire, & rosaceum cum aceto illi haud quaquam  
conuenire, quod magis refrigerare ualeant, castorium, chamæpitum, pulegium, calamintham, serpyllum, thymbram,  
& thymum huic medicamento addiderint, ne eo solo admoto, morbum fouerent, atq; denum ægris mortem adferrent.  
Verum enim uero putandum est, Galenum rosaceum ex aceto tantum imponere, ubi frigidus humor, quo ueternus ex-  
citatur, bili (ut plerunque accidit) fuerit admixtus, quæ tamen bilis maxima ex parte in ipso duntaxat morbi princi-  
pio uexare solet: nam cum tenuis sit, facile resoluitur, & superatur à frigido. Hinc itaq; quisq; expendere & cogno-  
scere potest, an ijs, qui à deuorata mandragora ueternosi fiunt, purum illud medicamentum ex rosaceo, & aceto ad-  
mouere liceat, nullis additis excalfaciens, ciam (ni fallor) ab assumpta mandragora caput nullo officiat calore.  
Ad hæc tamen si mandragoræ poma matura comedantur à nonnullis detracto semine, citra ullam prorsus molestiã, im-  
matura tamen, et cum semine deuorata, mortifera sanè inferunt symptomata. Siquidem exoritur intolerabilis ardor,  
qui uniuersam corporis superficiem adurit: lingua, & os arescunt, quam ob causam ore perpetuo biante cernuntur  
affecti, frigidum trahentes aërem. Quibus nisi illico succurratur, conuulsi pereunt: contrà uero faciliè liberantur, si  
statim hauserint, quæ opem ferre possunt. Id autem commodè, & efficaciter præstat Andromachi theriaca, ex aqua  
pota: quippe hæc sola momento omnem aufert molestiam. Curantur (ut Conciliator inquit) qui huiusce radicem, uel  
pomum, uel succum sumpserint, unius tantum diei inedia, si tamen subinde præstantissimum meracum uinum largius  
bibant ægri, & acetum olfaciant, cui admixtum sit castoreum. Sed horum omnium peculiare scribit esse antidotum do-  
mestica radix triduo cum pane, & sale deuorata. Ceterum ciam mandragoræ poma METELLAS NVCES  
quas uocant, mihi in memoriam reuocauerint, quarum historiam superius libro primo descripsi, sciuerimq; non modò  
si edantur suapte natura canes necare, sed etiam homines, ciam nihil de his, quod extet, posteritatis memorie prodide-  
rit Dioscorides, nec antiquorum ceteri, non alienum duxi hoc loco earum indicia referre; atque etiam medicamenta  
commemorare, quæ harum ueneno opitulantur. Eæ nuces igitur cum intus in corpus sumuntur, uertigines, & faciei  
ruborem inducunt: quin & oculorum caligines, temulentiam, inexpugnabilemq; somnum: postremo oboritur frigi-  
dus sudor, uicinæ mortis præsagium. Auxiliatur noxæ excitatus pluries uomitus aqua calida, & oleo: post uomitum  
datur conuenientissimè butyrum, & uinum meracum copiosum, additis pipere, pyrethro, lauri baccis, cinnamo-  
nio, & castoreo. Prodest, & egrotantium extremas corporis partes, nempe manus, & pedes calida aqua fouere, ac  
inde frictionibus rudi linteamine factis calorem in uniuersum corpus excitare: cum eo tamen, ut subinde balatino, aut  
costino oleo perungantur affecti. Præstat item exercitatio, proinde ad celerem gressum cogendi sunt, ut uniuersum  
corpus incalescat: & pinguibus postea cibus, dulciq; uino refocillandi. In summa & his ea maxime conueniet cura-  
tio, quam epotum requirit opium, de quo proxima commentatione differemus.

ΜΗΛΩΝ. MECONIVM. CAP. XVII.

ΕΡΟΤΟ papaueris succo, quem meconion uocant, consequitur ueternus cum perfrictione,  
& pruritu uehementi, ita ut sæpe inualecente ueneno, tanta erumpat prurigo, ut hominem exci-  
tet: corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo uomitionem, acres clysteres auxiliantur,  
acerumque mulsu cum sale potum, aut mel cum rosaceo calido: merum cum absinthio aut cin-  
namomo copiosum, aut calidum per sese acetum: nitrum ex aqua, & origanum cum lixiua aut  
passo: & rutæ syluestris semen cum pipere, uino, & panace: piperque cum castorio, & aceto mul-  
so, uel cum satureiæ aut origani decocto cum uino. Hi olfactilibus excitandi: & ob enatam pruri-  
ginem in balneas descendant, & foueantur. Post lauacrum prodest iurium pinguium vsus, cum ui-  
no, aut passo: medulla etiam ex oleo pota.

ΜΗΛΩΝ ΚΕΡΑΤΙΤΥ. PAPAVER CORNICVLATVM. CAP. XVIII.

QVOD corniculatum papauer appellant, & potu, & cibo eadem inferre consueuit, quæ papi-  
ueris succus: nec alijs expugnatur auxilijs.

IN GRATVS Opii odor, perinde atq; mandragoræ facile obstat, ne in cibis, aut medicamentis inferi possit, quin ueneficium pateat gustantibus, præsertim cum necem non inferat, nisi certa quadam sumatur quantitate. Quam obrem raro contingit, ut homines uenefici opio utantur, ubi quenquam ueneno tollere uolunt, nimirum ueriti ne fraus odoris grauitate deprehendatur. Tamen si quandoq; accidat, aut fortè medicorum imperitia, aut pharmacopolarum negligentia, ut ebibitis medicamentis, quibus opium admixtum sit largius quàm par sit, sumentes in ea incurrant discrimina, quorum meminit Dioscorides. Atq; illa quoq; sequantur, quæ in suis alexipharmacis Nicander ijs uerbis representauit. Animaduerte, inquit, è sumpto papaueris in capite suo semina gerentis liquore dormientes: nam illi in summa corporis cute frigent: nec oculi eis aperiantur, sed enim palpebræ eorum immobiliter colligantur, eaq; labore eo, odoratus sudor distillat unâ collectus, adeoq; ipsum corpus pallefcit ac labia ardent, eaq; genis nexus demittunt, id est flaccide maxillæ sunt. Languidus item et frigidus è gutture anbelitus expirat: sæpe et luadus unguis, uel obtortus nasus mortem non procul abesse nunciant, ipsiq; oculorum, qui in caua recesserunt, radij. Nicandro subscribit Aëtius libro xiiii. ubi sic inquit. Quando uoluntarie meconium aliqui biberint, siue id manifestare uoluerint, siue uolentes non possint, his cognoscantur indicij. Sequitur enim eos, qui opium acceperunt, in somnum grauem colapsio cum frigidityte et pruritu intenso, ut aliquando ob ipsum excitentur: odorq; opij per totum corpus effertur, et exhalat: inferior maxilla laxatur, tumescunt labra, irruit singultus, distorquetur nasus, pallor adest, liuor unguium, præcordiorum diuulsio, respiratio parua, et frigida, oculorum offuscatio, et ad postremum mortifera conuulsio. Hæc de notis, quæ opium sumptum consequuntur. Quibus ualentissime illa remedia auxiliantur, quorum hic meminit Dioscorides. neq; enim plura apud posteriores Græcos reperi. Auicenna autem præfert laserpitij lacrymam, et castoreum. Sed præstantissimum dicit esse medicamentum, theriacam, sagzeneam, et Mibridatis antidotum ex uino potum. Excitandi etiã sunt egrotantes sternutamentis, fibulis, frictionibus, odoramentis, nempe moscho, castoreo, lasere, ambaro, naribus inditis, quin et sulphuris fumo. Succurritur conuulsioni, si uniuersum corpus perungatur susino oleo, ac etiam costino, alijsq; remedijs, quorum in præcedenti capite meminimus. Verum longè omnium potentissime proficit antidotus nostri usus, scilicet quinta essentia theriacalis, de qua superius in præfationis commentatione diximus, quod præsentaneo remedio non modò his omnibus opituletur; sed etiam omnibus in uniuersum uenenis, quæ frigidityte nimia intermunt. Nec aliter curantur, qui corniculatum papauer deuorauerint.

Opii uenefici  
natura.

Opii ueneni  
curatio.

Φαρίκων. PHARICVM. CAP. XIX.

QVOD Pharicon uocant, sapore syluestre nardum imitatur. Resolutionem neruorum potum adfert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem post uacuationes uinum absinthiten potui dare, cum cinnamomo, aut myrrha, aut nardo gallico, quod serinen aliqui uocauerunt: aut spicæ nardi duas drachmas, & myrrhæ totidem obolos, cum passo: aut irim cum croco ex uino: dera sumq; caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

NON equidem hætenus apud quenquam scriptorem consequi potui, quid Pharicum antiquis fuerit, an simplex, aut compositum medicamentum. Quin neq; etiam certò inuenire licuit, unde id nomen traxerit, cum uaria sit de nomine eius apud authores sententia. Porro is, qui in Nicandri alexipharmaca scholia scripsit, hæc protulit. Præxagoras memoriæ prodiit pharicum lethale medicamentum sic uocatum à Pharico uenefico quodam Cretensi, qui hoc reperit. Sunt qui primum Pharis Arcadiæ repertum uelint: appellant autem etiam Medicum. Nec desunt qui in Thessalia in Pheris, alij Lacedæmone, quòd ibi fortasse proueniat. hæc ille. Ceterum cum iam id meritò deperditum sit, neq; hoc tempore à nemine, quòd sciam, cognoscatur, superfluum sanè esset plura de eo scribere: nam institutum nostrum non est, in re incerta diutius immorari.

Pharici uene-  
ni confid.

Τοξικόν. TOXICVM. CAP. XX.

TOXICVM ex eo nominari uidetur, quòd barbarorum sagittæ eo illinebantur. Qui biberint, labiorum, & linguæ inflammatione torquentur. Incoercitus furor varias ijs imagines obuerset: quare uix medicinæ locus est, raroq; qui hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, aut uinū dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur: rapi semen bibendum cum uino. Priuatim ijs conuenit quinquefolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus: roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus: malaq; cotonea trita esse, aut cum pulegio, & aqua bibere, conueniet: amomum & balsami semen ex uino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decumbunt: & ubi surrexere, stupidi reliquum uitæ tempus degunt.

QVOD antiquis fuerit Toxicum, quo Barbari sagittas inficiebant, ut ijs uulneratos inimicos haud dubiè perderent, nec à Dioscoride, nec ab alio aut Græcæ, aut Arabicæ familie authore memoriæ prodiit esse, mihi hætenus compertum est. Ideoq; difficile admodum fuerit decernere an Toxicum hodie sit, uel cognoscatur in Europa, cum propriè bi Barbari antiquis dicantur, qui Troglodyticam Aethiopie regionem incolunt, apud quos fortasse tantum nascitur. Verum enim uero putauerunt quidam, ut Manardus Ferrariensis uir nostræ ætatis celebris, id antiquis fuisse Toxicum, quod Arabes Napellum uocant. Quæ quidem sententia non omnino ijs uidetur refellenda, quia plura de

Toxici confi-  
deratio.

Manardi opi-  
mio reprob.

Toxico

Toxico non inuestigant. quandoquidem ( ut Auicenna est auctor ) non defuere, qui sagittas napello inficerent: constatq; napellum haurientibus lingue, et labiorum inflammationem excitari, et raros admodum esse sumentes, qui euadant: id quod omnes Græci toxico adscribunt. Ad hæc cum asserat Auicenna, quod si qua cura toxico adhiberi possit, ea fiat uomitionibus, hausto antea rapi semine, et sumptis subinde glandium putaminibus, hoc omnino illorum opinionem auget. Siquidem Dioscorides quoque ijs, qui toxicum hauserunt, rapi semen ad ciendum uomitum ex uino potandum præbet, ac deinde quercus, fagi, aut ilicis corticem, arborum nimirum, quæ omnes glandes proferunt. Quæ sanè omnia facile ad credendum trahunt Græcorum toxicum, et Arabum napellum unum et idè esse uenenum. Sed diligenter rem expendentibus contrarie profectò sese offerunt rationes. etsi enim ex notis prædictis toxicum, et Napellum unum et idè esse uideantur; tot tamen aliæ habentur notæ, quæ alterum ab altero discriminant, et contrarium arguunt, ut aliter existimandum non sit, quàm quòd deleteria hæc medicamenta plurimum inter se discedant. Nam nusquam, quod legerim, tradidere Mauritanii eos, qui Napellum hauserint, in tantum furorem agi, ut uinculis sint coercendi, quemadmodum eos, qui toxicum deuorauerint. Equidem illud pro certo testari possum, quòd Corsi illi latrones, sicarij; nequissimi, quorum historiam libro quarto prodidimus, cum de aconito differeremus, quanquam ab assumpto Napello ea omnia dederint indicia, quæ ab Auicenna napello assignantur; in nullum tamen furorem adducti fuere, neq; ullum etiam sensere delirium. Præterea Auicennæ, nostròq; testimonio, qui experimentum uidimus, epoto Napello, oculi exteriorum prominent, oboriuntur uertigines, animi defectus, et ingens crurū imbecillitas. Quorum tamen symptomatum nihil de toxico agens meminit Dioscorides. Quinetiam ( ut ipse perhibet Auicenna ) qui Napelli pericula euadunt, plerumq; aut ad hecticam febrem, aut ad tabem, aut ad comitalem morbum desciscunt. id quod Toxicum sumentibus non euenit: horum siquidem qui superuixerint, stupidi tantum reliquum uitæ tempus ducunt. Ex his itaq; omnibus liquidò apparet, quòd hæc inter se maximè differunt. Longè enim seiora sunt Toxicum incommoda, quàm Napelli, ut abunde constat ex Nicandro in alexipharmacis, ubi Toxicum descripsit ijs notis. Protenus etiam lethalis toxici dolorem, et malum abigere discas, quando suis cruciatibus hominem comprehenderit. Lingua eius, quæ Toxicum hauserit, infernè crassior redditur. Sed labia intumescencia, os planè pondere suo degrauant, ac aridum prorsus sputum regerit, inferioriq; parte gingivæ diffunduntur, et è suis stationibus mouentur. Sæpe etiam cordi stuporem iniecit, omnisq; sensus consternatus est, fontico isto malo perturbatus. Ac laborans eo, et balat, et mugit; innumeras nugæ fabulasq; præ insaniam edens: ac sine intermissione dolens, uehementer uociferatur, instar hominis, cui caput, totum corpus compingens, ense amputandam sit. Vel quemadmodum craterifera sacras res tractans ipsa Rheæ sacerdos, nona mensis publico appropinquans itineri, longum ore suo rumorem, et clamorem edit, quem horrendum in montanis latratum audientes sibi metuunt. Sic ille rabie, mente sua turbatus errans eulat, ac lupi instar fugitiuè ululat, obliquisq; pupillis taurino more inspicieus, album dentem acuit, dentibusq; suis desumat. hætenus Nicander. Ceterum differunt toxicum, et napellus in curandi quoque ratione. Toxicum nanque Dioscoridi curatur rosaceo ex passo poto, quinquefolij radicibus, caprillo, et hircino sanguine, cotoneis malis, anomo, et balsami fructu. Auicenna uerò Napello succurrit cum uini potu, butyro, moscho, capparis radice, et eo denique mure, qui napelli ipsius radices depascitur. quæ utiq; medicamenta omnia ab ijs, admodum discrepant, quæ in Toxicum curatione commemorauit Dioscorides: quem tamen penè ad uerbum reddidit Auicenna in ceteris uenenoſiorum auxilijs. Hæc igitur apertissimè ostendunt, conuincuntq; Napellum et Toxicum esse diuersa uenena. Nec illa obstant sententia nostra, quæ superius in Manardi fauorem adduximus. quandoquidem ( ut facile colligi potest ) ex uniuerſa huiusce libri materia ) alia etiam habentur uenena, quæ quòd eadem excitent accidentia, et paribus curentur antidotis, uidentur unam, et eandem rem esse, cum tamen longè diuersa cernantur: cuiusmodi sunt mandragora, opium; hyoscyamus, corniculatum papauer, et id genus alia. Sed ut iam de Toxico meam in medium proferam sententiam, eum haudquaquam falli crediderim, qui dixerit, id esse Auicennæ Toxicum, quod idem Tusom appellat. Nempe quòd asserat eo epoto labra, et linguam inflammari, sequi delirium, et incoercitum furorem. quæ propria toxici sunt indicia. Attamen hoc uidetur illi omnino fuisse incognitum. quod nec minus fortasse Dioscoridem latuit. Nam si toxicum nouisset Dioscorides, eius certè historiam libro quarto silentio non dissimulasset, ubi de ceteris mortiferis descriuit medicamentis. Illud porro indicium quodammodo facit, Mauritanorum tusom esse Dioscoridis toxicum, quòd nomen illius licet corruptè, ab hoc Arabes traxisse uideantur, quasi toxicon tusom nominauerint. Verum cum toxicum de NAPELLO loquendi nobis occasione dederit, non alienum fuerit, ut nostrum sequamur institutum, hoc loco eius tum uenenum, tum remedia describere, præsertim cum nascatur in Italia. Napellus itaque, ut Mauritanorum testantur monumenta, et nostra ad stipulatur experientia, si potu uel cibo in corpus ingeratur, seu statim adfert discrimina: nempe illico labia inflammantur, et adeò intumescit lingua, ut exeri extra dentes, et oris amplitudine capi non possit: oculi item pariter intumescunt, ita ut promineant: uertigines, et animi deliquia frequentissimè inuadunt, et crura imbecillitate affecta immobilia redduntur: subinde uniuerſum liuescit corpus, intumescitq; et confestim malo occupatur habitu. Quo fit, ut breui temporis spatio, qui sumperint, miserabiliter intereant. Sed id mirum non est: quippe quoniam tanta est huiusce lethiferi ueneni uis, ut nisi statim proprijs antidotis succurratur, nullis subinde expugnatur medicamentis. Imò quauis etiam in ipso principio ualentiora dentur remedia; pauci tamen superuiuant, qui aut hectica febre ( ut diximus ) aut tabe, aut comitali morbo tandem non conficiantur. Succurrendum igitur illico fuerit, excitatis prius uomitionibus ( ut Auicenna inquit ) epoto rapi, aut rapi semine. Prodest deinde butyrum bubulum coctum, et sæpe ac largè cum uino sumptum: item glandium putaminum decoctum ex uino potum. Auxiliatur diambari, et diamoschi puluis: quin potius ambarum et moschus præ ceteris per se, et cum Lemnia terra, ex uino pota. Quòd si hæc non proficiant, nihil sanè præterea sperandum relinquitur, quòd parum, uel

Toxici notæ  
ex Nican.

Napelli uenenum,  
eiusque  
remedia.

ne nihil possint in huiusce ueneni noxa theriaca, et Mithridatis antidotus. Proinde dicebat Auicenna, theriacam Napello non prodesse, nisi certo tempore, et termino. Faciunt ad hoc et capparium radices, quod dixerint quidam antiquorum, has uerum Napelli esse antidotum. Conciliator smaragdi puluerem duarum drachmarum pondere magis remedio ex uino potandum pollicetur. Sed hoc dari tantum potest Pontificibus, Imperatoribus, Regibus, alijsque opulentis principibus. quandoquidem parua, uel nulla est adhibenda fides pretiosorum lapidum fragmentis, quibus hac etate seplasia utuntur. Ad hęc recentiores ferē omnes, qui uenenorum materiam pertractarunt, Auicennam secuti, uerum securumque Napelli antidotum putant murem quandam, qui Napelli radices depascitur. Hunc uidimus nos, cepimusque in quibusdam altioribus uallis Anauie montibus. Sed non omnibus datur ipsum inueniendi, uenandique modus: ad hoc namque multa patientia, et uigilantia opus est. Quamobrem mihi mirum non est, quod scripserit quidam recentiorum clarissimus, magnificum quandam uirum ac principem, philosophum tamen, et medicum, cum duos mures quęsuisset, neque eos inuenire potuisset, ut demum suum conficeret antidotum, horum uice magnas quasdam cepisse muscas, quas folijs, et floribus Napelli uisitare obseruauerat. Eo autem antidoto, quod constabat ex prædictis muscis numero uigintiquatuor, uncis duabus Lemnię sbragidis, et pari pondere haccarum lauri, atque Mithridatis antidoto, omnibus oleo et melle sufficienti exceptis, admirandos fecit effectus, non solum aduersus Napelli uenenum, quod ut periculum faceret, diuersis dederat animalibus, et ipsemet experiundi antidoti gratia sumpserat; sed etiam in omni alio ueneno. Sed quid dicam (si tamen licet sine uitio sua quęque laudibus efferre) de admiranda ui olei nostri de scorpionibus, cuius componendi rationem tradidimus in præfationis huius libri commentatione, cum à tam seuo exitiali ueneno, qui biberint, breui admodum tempore liberentur, eo tantum exterius inuncti: nihil certe aliud, nisi quod aduersus hoc uenenum, et cetera quę uiscera non erodant, sicut et uenenosorum omnium morsus et ictus, in uer omnia remedia (pace aliorum dixerim) id primum sibi locum uendicat. Vbi enim uehementissima, ferociasque fuerint uenena, singulis horis inungi postulat: ubi uero minus uehementia, minusque seua fuerint, interposito trium horarum spatium, pluribus continuis diebus. Inungi autem debet non modo cordi ad sinistram manillam; sed temporum quoque, manuum, et pedum arterijs.

Regles. **IXIA.** exp. abbas in theophrasto. **CAP. XXI.**

**IXIA.** quę vlophonon appellatur, inter potandum aliquid ocimo simile gustu & odore redollet: uehementem lingue inflammationem excitat: mentem mouet: omnes excrementorum exitus supprimit: strepitum cum animi deliquio ciēt: ijsque intestina latrant, nec egeritur quicquam. Post uomitionem aluumque resolutam, auxilium præstat aqua, in qua absinthium maduerit, ex uino largiore, aut aceto mulso pota: rutęque syluestris semen, aut laseris radix. item tragorigani decoctum, cum aliquo supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpitio, quorum singuli oboli conueniunt: quin & nucēs iuglandes ex uino, cum resina, castorio, & ruta tritę, ita ut singula drachmę pondus æquent. Idem chamelę, aut thapsię, aut absinthij succi ficilicus cum aqua multa, & acetum calidum potum.

**IXIA.** ut superius libro tertio retulimus, lentę, et uisci modo tenax est lacryma, quę in chameleonis albi radicibus agglutinata reperitur. Hęc (ut Nicander, quem Dioscorides est secutus, in alexipharmacis inquit) gustata ocimo similem saporem præbet: hausta extremum lingue tractum exasperat, interiora adurens. quinetiam corde suo turbatur ad insaniam usque qui sumpserit, ac linguam penitus dentibus lacerat. Porro mente attonitus redditur, aluiusque temere ambos utrinque meatus et liquidorum, et esculentorum obdurans, quę et intrinsecus spiritum suffocās, submurmurat, ac modico tractu uoluitatur. Qui item hoc malo angitur, ægrę magnęque difficultate respirat, adeoque uenena illa ixia potio protenus excrementa eiecit: quorum similitudine, hætenus Nicander. Ceterum Mauritanii ixiam aldabac uocant, quod proprie uiscum significat. Cuius nimirum incommodis in primis succurrunt, Auicenna teste, excitatę uomitiones, et infusi chylisteres, qui ijs maximopere auxiliantur: sed mitiores lenioresque esse oportet. Præstant deinde auxilium theriaca, et Mithridatis antidotus, ex absinthij Romani, aut santonici decocto pota. Præstant item episthemata, quę cordis imbecillitati dicantur: quin et utriusque buglosi flores saccharo asseruati, additis margaritis, corallis, pretiosorum lapidum fragmentis, moscho, ambaro, et alijs quę cordi opem ferunt. Conuenit insuper rosaceum aceto admistum, et sincipiti ubi sutura intersecat, linteis illitum. Quę sanę remedia non modo res morantur, franguntque ueneni uim; sed omnibus etiam incommodis ab eo excitatis mirifice subueniunt. Porro cum in frequenti recentiorum medicorum usu sit albi chameleonis radix ad arcendam pestilentiam, et ad interaneorū tinea necandas; ideo caueant qui ea utuntur, ne agglutinatam lacrymam, si qua forte fortuna inhaerit, præbeant deuorandam, quod facile cauere poterunt, si cum primum radix è terra fuerit effossa, eius corticem cultello deraserint, et uino subinde lauerint. Verum ego in radice albi chameleonis, qui in Italia prouenit, nullam hætenus ixiam reperi. At tamen quidā Cretensis rei herbariæ studiosus mihi pro certo affirmauit, e carlinę uulgò uocatę radice in Creta ixiam ab ijs colligi, qui sagittas conficiunt, ut pennas sagittis conglutinent. Nec modò eam reperi mihi retulit in eo Carlinę genere caule uiduo; sed etiam quandoque in albero, sed rarius. Quę certę omnia opinionem auerunt, ut hoc obiter dicamus, carlinas uocatas Dioscoridis esse chameleones. Quod autem plus ueneni insit CHAMELEONI nigro, quàm albo, ut Galenus scriptum reliquit, et post ipsum Paulus, et Aëtius eius doctrinam secuti (de qua re superius libro tertio disseruimus) non ita facile crediderim, cum albo tantum ixiam innasci scribat Dioscorides. Non ob id tamen

**IXIA** uenefica natura.

**IXIA** ueneni curatio.

Chameleonis nigri ueneni & remedia.

id tamen præteribo, quin hoc loco ea referam, quæ de Chamæleonis nigri ueneno, et eius remedijs memorie prodiderunt Paulus, et Aëtius: ita enim scribunt. A chamæleonis nigri potu morsus uentris, et lingue tumor, cum rugibus intestinorum sequitur: facies distorquetur, et uomitus spumofus, tremores, concussiones, et totius corporis concussiones, ac uocis interceptio concomitantur. Ceterum curantur ex his, quæ ad fungos sunt relata. Datur eis et thlaspis, et betæ succus, et triticæ ptisanæ cremor ex passo, absinthij dilutum, et nitrum cum aceto mulso. Vbi uero euomuerint, lac recens multum sæpe exhibeto, et aluum cum lubricis infusis eluito, uelut est samigraci et theæ decoctum. Præcordijs etiam fomenta, ac calfactoria adhibeto.

ϺϺϺϺϺ. CERUSSA. CAP. XXII.

CERVSSA suo colore proditur: sumpta enim, mox palatum, gingiuæ, lingua, & commissuræ dentium, candore quodam inficiuntur: singultus, tussim, ac lingue ariditatem excitat: ijs extrema frigescent, mens labat, membra torpescunt. Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut ficuum, aut maluæ decoctum, aut lac calidum, aut sesamam ex uino tritam, uel lixiuiam ex farmentis factam, amaracinum oleum, aut irinum, persicorum ossa cum hordei decocto: columbina oua cum thure, aut hordei decocto, aut prunis: aut gummi, quod ulmus plorauit: aut humor, quem ulmea folia reddiderunt, cum tepida aqua: sed tum quoque uomant. Conuenit etiam thapsiæ succus, aut scammoniæ, cum aqua mulsa potus.

Cerussæ lethalis natura.

CERVSSAE faciendæ rationem tradidimus superiore libro. Hæc tamen est ad ulcerum medicamenta, quæ exterius illuminantur, salubre plerumque sit medicamentum; si tamen sumatur intus in corpus, interficit, quemadmodum cetera deleteria pharmaca, de quibus iam plura retulimus. Epota cerussæ incommoda pluribus notis, quam fecerit Dioscorides, eleganter carminibus reddidit in alexipharmacis Nicander, quorum carminum hæc erit paraphrasis. Cerussa per omnia spumanti adhuc lacti, cum uerno tempore, pingue et recens in multam emulsum fuerit, colore similis est. Porro cerussæ spuma super gingiuas adstringente uis scandit, quæ spumosi medicamenti frigore arcescunt, et contrahuntur in rugas. Lingua, et fauces asperitate languent. Vexantur ob id, qui hauserint, arida tussis, oculisque nutantes grauitate, dum crebros ructus egerunt, non sine labefactione sui opplentur. Hinc fit, ut capite non parum turbentur: quinetiam animo suo nauseabundi præ tristis labore gemunt. At sepius in ipsa luce uanum phantasma, quod re ipsa nullum sit, cernunt. Alias somnolenti toto corpore frigent, neque ut antea membra, potissimum manus, et pedes, suum officium faciunt, adeo ut ni eis succurratur, eo tandem dolore lacerati, succumbant pereantque. hætenus Nicander. Ceterum Auicennæ testimonio cerussam haurientibus alia adueniunt incommoda; nempe animi deliquium, faucium asperitas, uentriculi, et alui compunctiones, præcordiorum tensio, anbelitus difficultas, præsecatio spirituum, et albedo totius corporis: quin et urina modo nigra, modo cruenta redditur. His auxilium præstant (ut ipse, et Aëtius tradidere) scammonium ex mulsa potum; aliæque medicamentis, quæ suapte natura urinam ualenter pellunt. Post hæc clysteribus uti conueniet, ac subinde providere, ne dormiant affecti, sed uigilantes sepius euomat potu prius hydromelite, susino, et narcisino oleo admixtis. Præferunt quidam uomitiones ab atriplicis, et rapi semine concutatas: item clysteres ex brasice decocto cum oleo, absque sale: insuper iheriacæ ex uino, et Mulbridatis antidotum, et album meracum uinum largius potum.

Cerussæ mali auxilia.

Muxætes. FUNGI. CAP. XXIII.

FUNGORVM alij genere, alij copia lædunt: omnes tamen strangulatus suspendio similes concitant. Quibus confestim succurrendum: communiter ex oleo uomere cogendi: mirifice iuuat lixiuia ex farmentis, aut pyrastrii furculis, epota cum sale, posca, & nitro. Fructus, aut folia pyrastrii cum fungis decocta, strangulantem illam uim auferunt, esitataque eisdem auxiliantur. Aduersus fungos gallinacea oua cum posca proficiunt, adiecta aristolochiæ drachma: item absinthium cum uino melleque sumptum, & ex aqua potum: apiastrum ex nitro: panacis radix, & semen in uino fæx uini cremata, cum aqua: atramentum futorium ex aceto: radix, uel sinapis, aut nasturtium esu profunt.

Fungorum uenefica natura.

NON modo nocent in uniuersum Fungi, quod in eorum genere aliqui habeantur lethales, et suapte natura ueneno imbuti; sed etiam quod ex his, qui perniciosi non sunt, plus quam uentriculi robur ferre possit, quandoque ingeratur, ita ut tunc non malefica ui, sed copia lædant. Quippe cum natura humidi admodum, et frigidi sint, et lentore non modico scateant, superato sua quantitate corporis calore suffocant, strangulant, et denique interimunt, nisi citius remedijs succurratur. Cognoscuntur qui mortiferi sunt (ut superius libro quarto tradidimus) si frangantur, quod illico uarios mutant colores, statimque computrescant. Proinde dicebat Auicenna, in fungorum genere eos esse lethales, qui uirides, et cæsi deprehenduntur. Sed certè magnopere admirari licet, quod tanta in hominibus inualuerit gula libido, ut etsi sciant fungos esse plerumque necis hospitium; tamen sui ipsius obliui, magno sanè apparatu eos in cibis auidiissime deuorent. Verum postquam tantam cum palato fungi inire gratiam, ut ab his abstinere homines non possint, saltem discant uelim, ut se ipsos à morte uindictent, fungos nunquam esse sumendos, nisi prius cum syluestribus

Fungorū præparatio.

tribus



fratribus pyris decocti fuerint. Quod si sylvestria pyra desiderantur, ex domesticis ea supplere poterunt, quæ cæteris æstiora habentur. in quem usum adhiberi possunt tam recentia, quam sole siccata. Præstant idem arboris tam folia, quam cortex, præsertimque sylvestris: siquidem fungorum antidotum pyra sunt. Dioscorides libro quarto præter medicamenta hic ad fungos assignata, prætulit origanum, & saturiæ decoctum, & gallinaceorum sinum, ex aceto aut melle potum: quod tamen (ut Philagrius explicat) album esse oportet. Sed primum medicamentis sæpius enarratis eliciendus est uomitus, & subinde acris infundenda clysmata, ut extra corpus trabatur virus. Cæterum ignorandum non est, eos incommoda asferre longè maiora, qui propria natura uenenati nascuntur. quandoquidem non modò suffocant, strangulantque comedentes, sed etiam intestina exulcerant, uentriculum inflant, singultum, & punctiones excitant, corpori uniuerso pallorem inducunt, & urinam remorantur. Præter hæc alia uerenda, & lethifera oruntur symptomata, nempe frigus, tremor, interceptio arteriarum, animi deliquium, perfrigidus sudor, & mors ad postremum immatura. His primum auxiliantur uomitiones omni celeritate excitatæ: quibus etiam conuenit epotus domestici raphani succus, aut deuorata ruta folia, aut origanum, aut mel. Prodest deinde murum in modum theriacæ, & Mithridatis antidotus ex acerrimo aceto pota, aut ex oxymelite, aut ex aqua uitæ uocata. quamobrem quinta essentia nostra theriacalis, in his fungorum malis mirificam fert opem. Prætulit ad hæc Auicenna calida quæcunque aromata: cuiusmodi sunt diapipereos, diacyminum, diagalanga, dyamoschum. Conciliator potandum exhibet magno iuamento uinum optimum, in quo conferbuerit piper, offertque subinde allium crudum deuorandum. Id quod facit uniuersa ferè rusticorum turba, qui (ut Galeus inquit) alio theriacæ uice plerunque utuntur.

Fungorū ueneni remedia.

### Πύρος. GYPSVM. CAP. XXIII.

**LAPIDESCENS** gypsum strangulationem creat. Quare eadem proferenda sunt, quæ manfis fungis, auxilia: & ad hæc malum decoctum, quod etiam olei uicem penfat: utpote cum pingue sit, euomendo lubricas uias, & faciles reddit, deradique corpora non finit. quod ubi duratur in lapidem, gypsum efficit: Quinetiam prodest oleum ex aqua mulsa, aut ficorum decocto: & lixiua è ficulneo cinere, aut sarmentis facta, cum uino copiosiore pota: & origanum, aut thymum cum lixiua, aut aceto, aut passo: hique decocto malum proluendi.

**GYPSVM** omnibus notum, si bibatur, aut comedatur, strangulat (ut Dioscorides inquit) quod respirationis meatus ualenter adstringat, & obstruat. Meminit huius inter uenenata medicamenta Auicenna, sic inquit. Eadem sunt gypsi indicia, quæ & cerussæ, præterquam quod illud citius, & atrocius strangulat. quamobrem ijs, qui hauserint, ea conueniunt medicamenta, quæ cerussæ, & fungis opitulari diximus. Postea lubrica danda sunt, cuiusmodi est malua, althæa, fœni græci, & lini seminis decoctum. Conciliator egelidam aquam cum butyro primum potandam iubet, & deinde uomitum excitandum, à uomitu calidam item cum melle præbet, ut iterum uomant: postremo Mithridatis antidotum uino meraco mistum, drachmarum duarum pondere. Quod si alius ab hoc adstrictus fuerit, citetur oleo, & anatis adipe clystere infusus, & illinatur uenter ricino oleo. Quin & murum stercus (ut ipse ait) ex uino potum, proprium est gypsi antidotum. Auicenna autem ultimò purgari iubet scammonio, & alijs pharmacis, quæ aluum deiiciendo ad rem faciunt.

Gypsi ueneficiū, eiusque remedia.

### Αἷμα ταύρος. SANGVIS TAURINVS.

### CAP. XXV.

**TAURI** recens iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem, strangulatūque concitat: faucium, tonsillarumque meatus cum neruorum distentione præcludit: lingua rubescit: dentes inficiuntur, & quædam concreti sanguinis uestigia, inter eorum commissuras restant. Quare uomitum uitabimus: sanguinis enim globi attractu illo in sublime relati, magis gulæ inculcantur. Dari ergo opus est quæ concretum sanguinem discutiunt, & aluum subducunt. Grosi lacteo succo turgentes ex posca, & nitrum per sese, auxiliantur: nec secus coagulum omne cum aceto, & laserpitij radice, aut lasere: itidem & brassicæ semen, & è cinere ficulneo lixiua: conyzæ folia cum pipere, & rubi succus ex aceto. alius resoluenda. Iis qui feruantur, stercoreosa, & fluida per sedem egeri consueuerunt. Stomachum, aluumque hordeacea farina ex aqua mulsa perungere oportet.

**NEMO** tauri sanguinem clam potandum exhibere potest: nam unusquisque sanæ mentis sanguinem cognoscet. quare, mea quidem sententia, fieri non potest, ut uenefici eo quenquam decipiant: quippe nisi largius bibatur, & adhuc calens ab ipsis defluens uenis, antea quam concreseat, noxam non infert, aut leuem. Quo fit, ut eos tantum taurino sanguine interire crediderim, qui aut atrabile tentati, aut cacodæmonibus irritati, uel ut aliquod seuum mortis genus ab legibus pro suorum facinorum pœna luenda institutum effugiant, uel ut immedicabiles & grauissimos morborum cruciatus finiant uitam pertæsi (quod Plinius libro xx. capite xviii. fecisse ait epoto opio Licinij Cecinæ patrem ciuem Romanum) mortem sibi uoluntariam consciscunt. Proinde scitè Nicander in alexipharmacis ita scriptum reliquit. Si ex insipientia quispiam atrum tauri sanguinem hauserit, mœrore adeò ingemit, ut nimio cruciatu tandem conficiatur. quando cordi appropinquans sanguis ille condensatur, ac in medio alui receptaculo in grumos coagulatur: hinc & meatus spirituum obstruantur, & balius suffocatur impleto gutture. Atqui tractibus, & singultibus iste

Sanguinis tauri uenenata natura.

Sanguinis mē-  
strui uenenū,  
eiusque cura-  
tio.

Pardi fellis ue-  
nenum, eius-  
que remedia.

Viperæ fellis  
venefica uis,  
& auxilia.

Canis piscis  
fellis uenenū,  
& cura.

Felis cerebri  
maleficiū, &  
remedia.

Caudæ cervi  
uenenum, &  
eius curatio.

bus iste affligitur, crebro humi spuma coinquatus alpitat. hæc ille. Caterum si forte fortuna euenit, ut quis tauri sanguinem potauerit, & ad eum domestici, quibus factum constet, medicos aduocent, tunc medici ijs uti poterunt remedijs, quorum hic abunde meminit Dioscorides. Sed quoniam taurinus sanguis menstruum sanguinem ubi in mentem redegit, atque etiam hic nobis occurrit fel pardi, uiperæ, & canis piscis: item cerebrum felis, quem Græci elatium uocant, cervi extrema cauda, quorundam quadrupedum sudor, & malum denique improbatumque castoreum, que omnia inter lethalia medicamenta annumerantur, cum hæc à Dioscoride in hoc uenenorum censu prætermissa deprehendantur, et nobis propositum sit, singulorum uires maleficas, earumque auxilia describere, hic locus opportunus uisus est, in quo de ijs differeremus, & nostrum institutum, quantum possumus exequeremur. Sanguis itaque MEN-  
STRUUS mulierum, præsertimque biliosarum, & facile rixantium potus, adeo bibentes effascinat, & inficit, ut laticos, & æmentes efficiat. Id autem detestabilis facinoris quandoque perpetrant maleficæ ueneficæque mulieres eodem monibus ductæ, ipsum exhibendo proprijs maritis, uel alijs, quos odio prosequuntur. Huius tamen noxæ succurritur contritis margaritis drachmæ pondere ex melissophylli aqua potis: auxiliatur & tepide balneum. Confert ad hæc (ut Conciliator inquit, si tamen id absque diuinæ legis iniuria fieri possit) ut affecti hilari frequentique mulierum consortio lætentur, cum eisque coeant, præcipue cum iuuenibus, quæ raro nuptias celebrent. Prodest & theriaca drachmæ pondere ex sumariæ aqua quotidie pota. Prosunt & uiperæ pastilli scrupuli pondere, additis tum margaritis, tum theriaca eodem pondere. Epoto autem PARDI felle excitatur uomitus, seu aloës amarore, os & nares inficiens: post uomitum uniuersum corpus flauescit, ictericorum modo: postremo ea omnia consequuntur incommoda, quæ ab assumpto napello, & à uiperarum morsibus eueniunt, cum tam seuum lethiferumque sit, ut tribus tantum horis potantes perimat. quod si hoc temporis spatio non interficit, prorsus desperandum non fuerit. Expugnatur primum uomitionibus illico excitatis, subinde ijs utique antidotis, quæ napello, uel uiperæ morsi infectis opitulantur. Auicenna huic ueneno peculiarem conficit theriacam ex Lemniæ terre, & lauri baccarum, singulorum drachma una: capreoli coaguli drachmis quatuor: myrrhæ, & rutæ seminis, cuiusque semidrachma. quæ omnia melle excipiunt. Hanc iuglandis quantitate exhibet, excitatis deinde uomitionibus, ductisque demum laborantibus in calide aque balneum, cui inferbuerint odorata medicamenta. Sed VIPERÆ fel adeo perniciosum existit, ut statim animi deliquium adferat: quare rarissime antidotis succurri potest, quod nullum detur ea præparandi spatium. Verumtamen si quid est, quod tam breui temporis momento quicquam opis ferat, id erit quam celerrime excitatus uomitus, epoto prius cocto butyro, igne colliquato: quo uomitiones iterum, atque iterum mouere oportet. Post uomitus nihil salubrius, quam theriaca, & Mithridatis antidotum, moschus, ambarum, & eorum composita medicamenta, quæ diamoschum, & diambarum appellantur. Vbi autem animi deliquia perseuerant, & corporis uniuersi angustia, uinum quidem offerendum est, aut caporum, & gallinarum carniuum succus ex aque feruentis balneo in uase uitreo distillatus. Huic equidem noxæ crediderim magnifice aduersari oleum nostrum de scorpiionibus, cuius componendi rationem tradidimus in huius libri præfationis commentatione: iidem & quintam essentiam nostram, quod ita oculi suis perquam tenuissimis partibus in totum deferatur corpus. Porro fel, quod à CANE pisce eximitur, lethiferum est. quippe quod potum, uel esatum lentum tantum quantitate, septenis diebus interficiat. Curantur tamen qui hauserint, epoto bubulo butyro cum gentianæ radice, cinnamomo, & leporis coagulo. Prodest & corpus uniuersum odoratis oleis illinire, & uisum tenuissimo uti. Caterum qui FELIS CEREBRUM in cibis ederint, crebris afficiuntur uertiginibus, fiuntque subinde stolidi, & æmentes. Quibus etsi subueniri possit, id tamen non nisi temporis tractu, & admodum difficulter fieri potest. His danda est Lemniæ spargis, & uomitiones inde sunt excitande, fierique id oportet ter, aut quater in mense. Præstat item auxilium, si quotidie mane sumant ægri diamoschi confectio, tribus uel quatuor horis ante cibum. Quinimo moschus per sese sufficienter auxiliatur: namque ut quidam tradiderunt, diamoschus tantum huiusce cerebri proprium est antidotum, si dimidij scrupuli pondere ex uino bibatur. Sed illud non est ignorandum, quod non modo Felis deuorato eorum cerebro homines inficere possunt: sed pilis quoque, respiratione, & oculorum intuitu. Nam etsi pili omnes imprudenter in cibis sumpti, præfocare possunt, anhelitus meatus obstruentes: tamen felium priuatim exitiales censentur. Eorum præterea spiritus tabifico quodam ueneno infectus deprehenditur: etenim noui ego quosdam, qui cum felibus adeo delectarentur, ut nunquam sine ipsis dormirent petere, atque ita inde diutius aeris uehiculo eorum spiritu, in tabem, & marasimum incidere. quibus postremo confecti diem suum obierunt. Nec diu est, quod in quodam monachorum cœnobio uniuersa perijt familia, magno felium numero, & contubernio. Ledunt item suo (ut diximus) oculorum intuitu, adeo ut quidam reperiantur, qui his uisus, aut auditus, prout quodam illico capiuntur, terreanturque maxime, quod non modo ex eorum ueneno prouenire existimauerim: sed etiam propria eorum natura, qui eos uel intuentur, uel audiunt. quandoquidem ij sua natura talem à cælo qualitatem influxam habent, quæ nunquam ad propriam mouetur actionem, nisi obiciatur id, quod natura sibi contraria fuerit. Horum plures in Germania duntaxat uidimus, & quosdam ex ea natione Goritiæ commorantes. Quod autem uerum sit id aliunde euenire non posse, quam à congenita qualitate, quæ paucis admodum inest, aperte sane ostenderunt eorum aliqui. Quippe cum huius gentis quidam hyemis tempore in hypocaustum nobiscum coenaturus intrasset, quo plurimum amicorum sodalitas conuenerat, mulier quædam huius uiri naturæ conscia, ne is, uiso felis catulo, quem educauerat, iratus discederet, illum in arcula quadam eodem in coenaculo concluderet. Sed quauis nec uidisset ille, nec audisset catulum, cum paucis post tempore aerem felis halitu infectum inspirasset, irritata statim ea temperamenti qualitate felium inimica, emisso sudore, pallida admodum facie, omnibus sane admirantibus, tremebundus clamare coepit, hic aliquo in angulo latet felis. His autem eadem opem ferre potauerim, quæ cerebrum comedentibus remedio esse diximus. Inuenitur etiamnum in CAUDÆ CERVI extremis partibus porraceus quidam humor

humor felles tali admodum similis, qui si forte deuoretur, presentaneum est uenenum. Adfert enim illico intolerabiles angustias, animi deliquia, & omnia tandem symptomata, quæ epotum napellum consequuntur. Succurritur his, ut ceteris, primis uomitionibus, epoto butyro excitatis. Postea dandus smaragdi puluis ex uino dimidij scrupuli pondere. Quin & pistacia prosunt, & pontice nuces in cibis largius sumptæ. Ad hæc uniuersum corpus inungi præstat, oleo è citri semine expresso. Item theriaca proficit ex uino pota duarum drachmarum pondere. Magna quoque infert incommoda quadrupedum quorundam **SUDOR**, præsertim equi, asini, & muli, quæ multis etiam ceterorum sit malus. Is igitur potus uiridem tiamidamq; reddit faciem: sudorem fetidum in uniuersum excitat corpus, præsertim sub alis. Perturbat præterea tum uentriculum, tum aluum uniuersam, genitis excitatisq; flatibus in intestinis. Quod si bibatur ex uino, delirium facit. His tepidam largius præbendam scribunt, ut concitato inde uomitu puluerulentus

10 sudor reiciatur. Post uomitum confert uinum cum rosaceo potum: item rhabarbarum semidrachmæ pondere sumptum, addito fossitij salis momento. tametsi propria huiusce sudoris antidotus ea sit theriaca (ut Auicenna est author) quæ ex Lemnia sphaagide, & lauri bacchi conficitur, cuius componende rationem paulo superius retulimus, de Pardi sele differentes. Venenosum æquæ ac lethiferum aiunt esse etiam **CASTOREVM**, quod iam putredine nigredinem contraxit, uel illud potius, quod è Ponto fuerit allatum. Hoc enim (ut Strabo inquit) uenenosum est propria sui natura. Animaduertant igitur tum seplasiarij, tum medici, cum plurimi usus sit medicamentum, ne malum exhibentes castoreum, aliquem interimant. Quandoquidem non modo furore aguntur, qui hoc medicamentum hauserunt; sed etiam intumescens linguam exerunt, atq; tam seua febre corripiuntur, ut uno tantum ferè die intereant. Aduersus hoc uenenum mirum in modum iuuant uomitiones, quas toties butyro, & hydromelite epoth citare conuenit, quod nullum ea, quæ reiciuntur, castorei odorem referant. Post uomitiones conducit diuronum potum, aut limonum, aut

20 citrei mali succus saccharo admixtus. Verim peculiariter huiusce castorei antidotum est coriandri semen tostum, drachmarum duarum pondere sumptum.

Sudoris animalium uirus, & remedia.

Castorei uirus læta uis, & curatio.

Γάλα ἐμπυτίασθὲν. **LAC INTVS COAGVLATVM.**

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ τοῦ ΓΑΛΑΤΟΣ. **X X V. I.**

**Eos QVI** coagulatum lac hauserunt, frequens illico strangulatio inuadit, quod in globulos quosdam lac coalescat. Quibus iuuandis pro antidoto, coagulum ex aceto damus, & bibere sæpius cogimus. Damus & calaminthæ folia arida, item succum: aut laserpitij radicem, aut laser cum posca: thymumque ex uino, & cum luto suo lixiuiam. Sed nulla salfilago obijciatur: quoniam magis lac coiret, & in caseum denfaretur. Neque illos vomere conuenit: liquidem concretum lac se

30 le in gulæ angustias insinuans, strangulat.

**CREDIDERÉ** quidam Dioscoridis interpretes, authorem hoc in loco de eo coagulato lacte differere, quo frequenter in cibis utimur. E quorum numero fuisse Ruellius, & Manardus Ferrariensis ea epistola, in qua uniuersam Marcelli interpretationem corrigit. Sed ij alioqui uiri eruditissimi, in hoc haud dubie falluntur, meo iudicio. Siquidem lac ea ratione coagulatum, nutrit, non autem strangulat, ut omnes in uniuersum homines testari possunt, sed præsertim ij qui in montibus degunt, cum Maio, & iunio mensibus huiusmodi lactis plurimum deuorent. Ideo nil aliud nobis asserendum esse putauerim, quam quod de eo tantum lacte intellexerit Dioscorides, quod cum admixto coagulo bibitur, antequam coalescat, ita ut intus, non extra coagulatum sit. Quo factum est, ut in hoc à Ruellij interpretatione in aliam descuerimus & hic, & in huius libri præfatione prope calcem. Magis enim Dioscoridis sententiam exprimi censuimus, si lac intus coagulatum, uel (ut Marcellus) lac cui coagulum admixtum sit, uertantur uerba illa γάλα ἐμπυτίασθὲν. Nam quod iam coagulationem estur, non magno labore coquitur, ac digeritur, transitq; in nutrimentum. Illud uero, quod ubi coagulum ei admixtum sit, subinde hauritur, priusquam coalescat, cum aliquantisper in uentriculo resederit, ut admixti coaguli illico inibi concrescit, sitq; concoctrici facultati adeo contumax, ut superato caloris robore strangulet, non secus ac taurinus sanguis. Proinde asserit Dioscorides, tauri sanguinem minime suffocare, nisi recēs calidusq; è iugulati tauri uenis defluxus bibatur, antequam concrescat. quandoquidem is non enecat aliqua propria ueneni facultate, sed concretionem tantum, quam in uentriculo consequitur. Id quod euidentissimum est in epoto lacte, cui admixtum sit coagulum: aut in eo quoq; quod sine coagulo bibitur, & per se alijs de causis in uentriculo coalescit. Euenit enim quandoq; hoc, cum lac bibitum crassius fuerit, & uentriculi, & iecoris temperatura calida, & sicca nimis. Nam ingens horum uiscerum tum caliditas, tum siccitas, consumpta breui lactis humiditate, reliquam quod crassum est, facile cogit, & conspissat. Quinetiam illud idem ingenti sit frigiditate: nimirum expresso ab ea, quod tenuius est partium, reliquam crassioris substantiæ facile congelascit, haud secus quam de glacie, & niue fieri libro quarto meteororum tradidit Aristoteles. Quamobrem est Galeni consilium libro tertio de alimentorum facultatibus, ut nemo lac potaturus ipsum bibat, nisi mellis, aut salis tantillum prius admisceat, ne in uentriculo concrescat. Sed non propterea mirari licet, quod Dioscorides scripserit, lac concretionem in uentriculo habentibus nihil salis falsiue esse offerendum. Quippe quemadmodum coagulum primo lac coagulat, contrariumq; deinde efficit, si iam concreto lacti superaspergatur; ita sal prius lacti commixtum, id concrescere prohibet, mox contrarium effectum præbet, si iam concreto aspergatur. recens enim caseus sale respersus, illico duritiem contrahit. Sed iam ad curationem accedamus. Eadem autem erit lactis in uentriculo coagulati curandi ratio, quæ sanguinis tauri, quando ijs tantum sit utendum medicamenti, quæ suapte natura concreta liquant, & discutunt. Quæ in re auxilium præ-

50

Lactis coagulati consideratio.

Quorundam interpretum error.

Lactis in uentriculo coagulati curatio.

Dioscoridis  
lectio castiga-  
ta.

stant ipsa coagula, acetum, praesertimq; scillinum, lixiuum, & ea omnia, quae incidunt, & disgregant. Porro illud non praetereundum esse arbitror, quod ubi in hoc capite legitur καὶ τὴν παλοποικτικὰν κοίαν, id est, et figlinam lixiuiam, non ut uertit Ruellius, & cum luto suo lixiuiam, Gesnerus in primo suo de animalibus tomo, de tanto aegre, legendum rectius putat καὶ τὴν παλοποικτικὰν κοίαν, hoc est, & pilopæorum lixiuiam: reprehenditq; in hoc Cornarium, quod putauerit figulos ad lutum lauandum sibi lixiuiam conficere. Sed mihi, ut ingenuè dicam, magis placeat Gesneri, quam Cornarij opinio. siquidem cum figlinum lutum nunquam lixiuia lauari aut parari audierim, uiderim, aut legerim, ueritati consonum non uidetur, ut de figlina lixiuia intellexerit Dioscorides: sed de ea potius, quae ad lanam expurgandam, ut infecturæ magis idonea reddatur, utuntur pilopæi, hi sunt, qui pileos conficiunt. Eorum namq; lixiuia, quod è combusta uini facie plerumq; fiat, ea quæ ad caput capillosq; abluendos communiter paratur, & erior, fortiorq; efficitur: & proinde ad lac dissoluendum in uentriculo coagulatum, est longè ualentior. Error præterea facilis esse potuit librarij, ex unius duntaxat literæ uariatione, & pro scribentium. παλ's enim per scriptum, lutum significat, unde παλοπλῶδον, & παλοῦργον aliqui figulum interpretantur: παλοποικ's autem per i, artifex est, qui pileos ex lana conficit. Hac itaq; ratione putandum fuerit, παλοποικτικὰν, non autem παλοποικτικὰν in Dioscoride hoc loco esse legendum. Caterum Fuchsius in suis doctissimis annotationibus in Nicolæum Myrepsicum ea sectione, in qua de unguentis tractat, capite xxviii. nil aliud hanc lixiuiam esse putat, quam aquam quæ lutum lauerit, uel per lutum transierit, non autem cum cinere, & calce factam. Sed cum figlinum lutum potius adstringat, contrahatq; quam laxet, ac digerat, nesciuerim profectò, qua ratione is eam lixiuiam è tali luto confectam, ijs potandam daret, quibus lac in uentriculo concreuisset.

### Αἰσάργυρος. ARGENTI SPUMA.

### CAP. XXVII.

20

SPUMA argenti pota, stomacho, uentri, & interaneis grauitatem cum magnis torminibus adfert, & nonnunquam pondere suo intestina vulnerat, urinamq; suppressit: corpus intumet, plumbeamq; deformitatem concipit. Quibus subuenit secundum uomitionem, potum syluestris homini semen, myrrhæ drachmæ octo, absinthium, hyssopum, apij semen, aut piper, aut ligustri flos ex uino: aridum palumbis finum, cum nardo & uino.

Spumæ argen-  
ti mala.

POTA argenti spuma, cuius historiam libro quinto tradidimus, letifera (ut Dioscorides inquit) adfert incommoda. Sed præter hæc, Aëtio, & Auicenna authoribus, alia etiam eueniunt mala. nempe compaginum, & articu-  
lorum incendium, seu ardor: alui suppressio, quauis quandoque ex accidenti alui ipsa deiciatur: sermo item præ-  
peditur, & sedis intestinum prominet: postremo inualecente malo ægri suffocati moriuntur. Nicandro uero in alexipharmaci auctore, ijs qui argenti spumam sumpserint, alui molestia accedit: quin & status sese reuoluentes per  
medium uentrem, & iuxta umbilicum murmurant, instar torminum curatu difficiliorum, quæ hominem affluant duri-  
is cum cruciatibus impetentes. Nec iam urinae eijciende patet exitus: membra totius passim corporis ardent, pla-  
neq; iam plumbeum, seu liuidum colorem induerunt. hæc ille. Caterum illud animaduertendum est, quod ubi in hoc  
capite legitur, dandam esse myrrham octo drachmarum pondere, non deest suspicio, quin ea lectio sit deprauata, quod  
hæc myrrhæ nimia uideatur esse quantitas. Augeat suspensionem Nicander, qui duos tantum myrrhæ obolos exhibet,  
totidem exhibet Aëtius, Auicenna uero tres drachmas non excedit.

Spumæ argen-  
ti curatio.

Curatio in uniuersum sit citatis primis uomiti-  
bus, & infusis deinde clysmatibus (ut Conciliator tradit) ex hydromelite, gallinarum, & anatum adipe. Post hæc  
prodest amygdalinum oleum potum è dulcibus nucibus expressum. Conferunt item carice in cibis sumptæ: præterea  
uentriculum apij succo, & aluum butyro illinire utile est. Proprium uero huiusce ueneri antidotum (ut idem ait) est  
lathyris semen duarum drachmarum pondere potum. Veruntamen cum hoc facultatis admodum deiectionis sit medi-  
camentum, drachmam ego non excederem. Eadem quoq; infert mala PLUMBEI SCOBIS tenuissime contrita,  
& ijsdem pariter curatur medicamentis. Siquidem argenti spuma nil aliud est, quam plumbum argenti, aut æris recre-  
mento commistum. Nec deleteria ui uacant (ut author est Auicenna). FERRI tum scobs, tum squama, tum  
recrementum. tametsi omnia hæc prius diutius aceto macerata nulla prorsus molestia in medicum ueniant usum, den-  
turq; potanda dysentericis, mulieribus uteri defluxione tentatis, & in eclegmate ad lienis infarctus, itemq; ad ente-  
rocelas. Sed de his uel non infrenatis, uel plusquam par sit sumptis, fortasse intelligit Auicenna. Itaq; excutatur ab his  
intestinatorum cruciatus, oris & linguae scabrities, aestuatio uniuersi corporis, capitis dolor, marasmus, & membra-  
rium omnium arefactio. Succurritur noxæ potu lactis recenter mulli, ac subinde datis aluum ualenter soluentibus medi-  
camentis. secundum quæ butyrum tandiu potandum dare oportet, donec intestinatorum dolores amoueantur. Hæc dum  
sunt, perfundatur eorum caput oleo rosaceo, uiolaceo, & è nymphææ floribus parato. Tollitur deinde adueniens  
marasmi intemperies, & corporis uniuersi arefactio, demersis in balneo laborantibus, in quo testudines, ranæ, &  
maluæ folia inferbuerint: quinetiam clysteribus ex pedum hedorum iure, aut althææ radicum decocto: item butyro  
largius in cibis sumpto, & epotis pinguium carnum iuribus. Sed (ut idem Auicenna scribit) proprium huiusce fer-  
rei pharmaci antidotum, est lapis magnes drachmæ pondere potus, ex mercurialis, uel betæ succo. Veruntamen hoc  
haudquaquam fieri posse uidetur absq; manifesto sumentium discrimine. quandoquidem etsi magnes suapte naturæ fer-  
rum trahat; non tamen affirmauerim, quod hanc ob causam eius quoq; destruat facultates, & impediatur noxa, sed  
potius quod eam augeat crediderim. Quippe cum is ferrum ad se traxerit, id sanè diutius in uentriculo retinebit, ex  
quo noxa fouebitur. Adde præterea, quod cum & ipse MAGNES deleteria sit facultatis, adeo ut eos, qui huius  
serint,

Magnetis ue-  
nifica uis, &  
auxilia.

serint, lunaticos, et melancholicos efficiat, eum haudquaquam ore sumendum esse duxerim. His itaq; qui Magnetem sumpserint, commendant quidam auri tenuissimam scobem ex uino potam, et smaragdorum tamenta eodem pondere. Laudant etiam clysteres ex lacte, et dulcium amygdalarum oleo infusos. Sed ceteris praeferunt smaragdum ter nouem diebus potam, tribus semper intermissis diebus. Lethifera et non parum formidanda est etiam AE 215  
S Q V A M A E uis. Ea siquidem pota, intolerabiles alui defluxiones mouet, aut noxias uomitiones concitat, obortis inde molestissimis alui, et uentriculi punctionibus. His auxiliantur citate primium uomitiones: deinde egri in balneum mittendi sunt, in quo hircorum conserbuerint capita, aut ingens cochlearum numerus. Prodest et menthae succus potui datus: insuper aluum, et uentriculum calido rosaceo perungere expedit. Verum ad hoc praeceteris potulent acori radices trium drachmarum pondere potae, aut earum succi tantundem. Sed nobis acori succum dare perdifficile fuerit, cum legitimum in nostris non proueniat regionibus, nec nisi siccum afferatur. Lituani tamen, et Tartari eo abundant, ut superius libro primo prodidimus.

Squamae aris  
 lethifera uis,  
 & remedia

## Υδραργυρος. ARGENTVM VIVVM.

## CAP. XXVIII.

ARGENTVM uiuum potum eadem quae spuma argenti infert, eidemque utendum auxilijs. Lac copiose potum auxiliari constat: sed postea euomant, qui hauserunt.

VERAM omnino et exquisitam argenti uiui cognitionem non habuisse Dioscoridem et Galenum, illud maximo indicio esse uidetur, quod hic paucis, ille uero perplexè eius historiam, et facultates tractauerit. Hoc, ut in praefationis huiusce uoluminis commentario tradidimus, interimit, si largius bibatur; excessu summè frigido et humido. Putrefacit enim hoc suo exuperante temperamento innatum cordis humorem, ac subinde congelat sanguinem, uirtutes spiritus, et ipsam denique cordis substantiam. quandoquidem id medicis experientia compertum est, ut Conciliator testatum reliquit. Nam cum seplasiarius quidam ardentissima febre correptus, siti intolerabili uexaretur, et delirio oberrans in pharmacopolium descendisset, ut aliquid ad potandum inueniret, forte fortuna in argenti uiui uas incidit; multumque ex eo potauit, aquae fortasse uice: postea statim in suum cubiculum se recepit; ubi paucis post horis congelatus interiit. At cum eius domestici sub cadauere magnam argenti uiui quantitatem inuenissent, iam per sedem egressi, aduocarunt medicos, ut eius rei, quam miraculum existimabant, diligenter causam inuestigarent. Ii statim ex pharmacopolio argenti uiui uas adferri iusserunt, quod ubi ferè uacuum reperissent, rem uti se habuerat deprehenderunt: auxitque fidem, quod euiscerato homine, adhuc argenti uiui libram in eius uentriculo inuenerunt: quin et sanguinem

30 circa cor concretum. Quo argumento palam fit, magno admodum recessu frigidum esse argentum uiuum. Verum enim uero in eius curatione illud inquirendum est, an purum sit quod potum fuerit, an salina alioue liquore extinctum, aut acerrima aqua, qua chymistae utitur, aut per se tantum praecipitatum, aut una cum arsenico, uel chalcantibo sublimatum. cum enim aliud alio perniciosius habeatur, proprium quodlibet exigit remedium. Pernicialis est sublimatum: secundum hoc praecipitatum: proximè sequitur quod salina, aut aliquo liquore fuerit extinctum: minus uero ceteris nocet, quod purum, uiuumque fuerit: ut pote cum fluidum admodum sit, et ponderosum, non difficulter clysteribus extrahitur. Id quod ceteris generibus non cuenit, quae cum uentriculo inhaereant, illum facile erodunt, et exulcerant. Argento uiuo puro, aut extincto, aut praecipitato epotis, eadem consequuntur symptomata, quae argenti spuma pota infert, sed cum magno anbelitus fetore, quem et ipsi respiciunt; qui Gallica luc affecti eo illinuntur. Quod maximum praebet indicium, quod sua exuperante humiditate, omnes humores, qui uentriculo alijsque circumstantibus

40 partibus haerint; computrescere faciat: Ceterum epotò sublimato, illico lingua, et fauces non aliter exasperantur; quam si quis immaturorum sorborum succum hauserit. Quod sanè incommodum nullo lenientium gargarizatu, nisi difficile, et longo tempore tolli potest. Id enim quam primùm in uentriculum descenderit, ei pertinaciter inhaeret. quare statim erodit, et exulcerat: tunc inextinguibilem sitim excitat, et inexplicabilem angustiam inducit. His succedit linguae tumor, animi deliquium, urinae suppressio, anbelitus difficultas, et uentriculi, et intestinorum tormina, tam uebementi erosione, ut nisi confestim succurratur, pereant affecti, erosio, perforatioque uentriculo, et intestinis. Purum curatur (ut Dioscorides, Aëtius, et Paulus memoriae prodidere) auxilijs, quibus argenti spuma: nam nisi copiosius ebibatur, non interficit, quod ob sui tum pondus, tum fluxilem substantiam facile per inferna secedat, nulla in uentriculo, et intestinis protracta mora. Ex quo nil mirum, quod scripserit Auicenna, non deesse qui bibant argentum uiuum, et nullam inde sentiant noxam, quod facile labatur e corpore, dummodo qui hauserunt, contineantur huc atque illuc deambulent. Goritienses mulieres egregie parturientibus ultimo remedio, argentum uiuum potandum praebent, scrupuli pondere. Nec desunt qui ad interimendas alui tineas, pueris etiam propinent, ad duorum granorum milij quantitatem, citra nullam molestiam. In aliorum autem curatione alia requiruntur remedia, nempe clysteres, uomitiones, pinguis in potu sumpta: et ut in uniuersum dicam, his opem ferunt omnia medicamenta, quae uenenis erodentibus conueniant, quorum latius superius meminimus in cantharidum curatione, ad quam breuitatis studio lectorem reuicimus: namque ipsa efficaciora non plura hactenus nobis comperta sunt. Nec alijs utendum est remedijs, ubi quis cinnabarin sumpserit.

Argenti uiui  
 pernicialis natura.

Argenti uiui  
 sumpti curatione.



Τίταρος, σάνδαρχα, αὐριπικόν. CALX, SANDARACHA, AVRIPIGMENTVM. CAP. XXIX.

**CALX**, sandaracha, & auripigmentum, pota aluum, & intestina cum vehementi erosione excruciant. Præbenda cuncta, quæ suo admistu illorum acrimoniam hebetant, ac soluunt, & facilem lubricamque aluum reddunt, cuiusmodi ibisci, & malux succus est: natura enim vtrique perlubrica. Dandum decoctum seminis lini, vel semen tragi herbæ, vel oryzae, lacque cum aqua multa copiosum, iura pingua, & boni succi.

Calcis, sandaracha, & auripigmenti uenefica vis, & curatio.

Non modo Calx, Sandaracha, & Auripigmentum, quorum historiam superiore libro tradidimus, hausta uenientissimos uentriculi, & intestinorum cruciatus, & erosiones excitant, ut Dioscorides inquit: sed etiam sitim inextinguibilem, faucium, & gulæ asperitatem, tussim, spirandi difficultatem, urinæ suppressionem, & dysenteriam. Ceterum hæc omnia adiuvantur (ut scite docet Dioscorides) pinguibus acrimoniam obtundentibus, & potionibus lenientibus, aluumque lubricam reddentibus, tum etiam cremoribus, atque seminum quorundam spissamentis, ut in cantharidum curatione latius, diffusiusque prodidimus. quandoquidem medicamentorum omnium erodentium curatio à cantharidum curatione non differt: neque ipsæ sanè ualentiora nobis sese offerunt remedia. Quare ex eo loco illa medicamenta petenda erunt ipsæ, quibus usui futura sunt. Eosdem quoque effectus malos, & noxios præbent ARSENICVM sublimatum, Aerugo, & quod officinæ Risagallum appellant: quin & Saponis lixiuium, quod uulgò uocant Itali la maestra, & Aqua ea omnium acerrima, qua aurifices, ac chymistæ aurum ab argento separant. Sed aquæ huius, & lixiuij difficilis est cura, quod illico in totum diffundantur corpus. Vniuersalis tamen curandi ratio eadem erit, quæ calcis, & auripigmenti, tanetsi alterum altero sit uehementius, & erodentius. Qui autem priuatim Arsenicum sublimatum hauserint, eos frequenter uomere oportet, pota semper prius butyro, aut per se tantum, aut addito rapî seminis decocto. Pro sunt his & clysteres ex pingui iure, aut ptisanæ alicuius cremore, aut spissamenti ex psyllij, malux, & cydaniorum semine factis. Auxiliatur amygdalinum oleum, & ius pinguium gallinarum in cibis sumptum. In præstantissimum uerò antidotum censetur sossile crystallum, in tenuissimum puluerem contritum drachmæ pondere, ex dulci amygdalino oleo patum. Porro: AERUGO, præter alia eius mala antè dicta, adeo spirandi meatus occludit, ut magna impetu suffocet affectos. Succurritur noxæ crebris cum butyro, & calida excitatis uomitibus, ut in arsenico, & infusis subinde clysteribus ex asinino lacte, & dulci amygdalino oleo. Prodest & Lemnia sfragis drachmæ pondere, ex uino albo pota. Præstat item in olei balneum laborantes ad uentriculum usque demittere. Sed proprium huiusce pharMACI antidotum (ut ait Conciliator) est, ut qui hauserint, bibant ex uino corallia rubra in tenuem puluerem contrita senorum scrupulorum pondere. Ceterum RISAGALLO uulgò dicto, quod quidam Realgal appellant, cum maxime extremèque siccet, & neruos contrahat, non alia conuenit curatio, quam quæ argento uiuo, & arsenico sublimatis, & ærugini adhibetur. quanquam priuatim non obscure iuuat uniuersum corpus dulci amygdalino illinire, & uolaceo iulapio, & ptisana hordeacea sitim extinguere. Proficit & pinorum nucleorum oleum, aut è magnis nucibus, quæ ex India aduehuntur, expressum, semilibra pondere potum. In summa ea omnia efficaciter adhibentur, quæ cantharidibus conferre diximus.

Arsenici sublimati, & aliorum quorundam venenum.

Arsenici sublimati curatio.

Aeruginis ueneni remedia.

Risagalli curatio.

Λαγώς θαλάσσιος. LEVVS MARINVS. CAP. XXX.

Quæ leporem marinum biberunt, piscium uirus olent: procedente tempore, aluius dolore afficitur, & urina sistitur: et si quando eam reddere contingat, purpureum colorem referet. omne piscis genus auersantur, & odio habent: foetido, ac graui sudore manant: biliosus vomitus, interdum sanguini promiscuus, subsequitur. His dandum lac asininum, vel passum continuè, aut radicis malux foliorumque decoctum, aut trita cyclamini radix cum uino, aut ueratri nigri, aut scammonij succi drachma, cum aqua multa, punicique mali acinīs. Cedria contrita cum uino efficax est: anserinus sanguis, ut tepebit, potus. Sed cum pisces omnes respuant, aspernenturque, folis fluuiatilibus cancris uesci possunt, bibuntque eos admisto uino, adiuti que ab his percoquunt. cumque appetere & comesse pisces cœperint, suæ salutis indicium habent.

Leporis marini ueneni signa.


DIXIMVS de Lepore marino libro secundo, de quo ita scribit Nicander in alexipharMACIS. Sin marini lepore male perdentis potionem deprehenderit, perniciem afferentem, odorem eius senties, qualis est squamarum, & piscium purgamenti. Porro gustus, & sapor eius piscosus est, qualis putrefactorum piscium esse solet: uel cum nondum ablutorum squamæ polluant corpus. Sequitur huiusce potionem uiridis fellis suffusio, cum obtenebratione uisus: & caro paulatim in homine contabescit. Accedit his ciborum omnium abominatio, malus habitus, & talorum ardor: oculi in concauum occultantur, & genæ ac maxillæ florido colore rubent. Urina egerime redditur: quæ tanetsi reddatur, purpurea apparet, & plus æquo sanguinea. Ad hæc si pisces egris offerantur, eos illico nauseabundi excruciantur. hæc ille. Cui subscribunt Aëtius, & Auicenna, qui præter relata indicia, alia adhuc lepori marino epoto assignant, his uerbis. Marinus lepus adeo icterum inducit, ut totius corporis habitus croceo admodum colore inficiatur. Postea facies liuens intumescit, pedum plantæ incenduntur, adest spirandi difficultas, pectoris & pulmonis angustia, rufescuntque oculi. Dehinc tussis emergit sicca, spiritus cruentus, renum dolor, uiriliusque inflammatio, adeo ut perpauci

per pauci euadant, qui non labantur in tabem. Quare Galenus libro de theriaca ad Pisonem, proprium marini leporis esse ait, ut pulmonem exulceret, & erodat. Succurritur noxæ (ut Dioscorides inquit) asinino lacte ex passo poto, & maluæ decocto. Neq; id aliam ob causam, ut Aëtius declarat, quàm ad eliciendum uomitum, & ueneni acuitatem retundendam, quemadmodum elleborum, cyclaminum, et scammonium exhibet, partim ad citandas uomitiones, partim ad aluum deiiciendam. Cetera uerò, ut incommodis subueniatur, quæ internis infert particulis. Præfertur quibusdam aduersus hoc malum humanus sanguis calens è uenis potus: humanum item lac, ab ipsis uberibus exuclum, & uulpis caro inassata: quin & theriaca diatesseron tribus diebus pota.

Φρύνος, καὶ βάτραχος ἑλαος. RUBETA, ET PALVSTRIS RANA.

CAP. XXXI.

RUBETA, aut rana palustris assumpta tumores ciet: pallor corpus uehementer decolorat, ut planè buxum spectetur: spirandi difficultas torquet: & gratis halitus oris, singultusque, inuita interdum genituræ profusio consequitur. Adiuuantur secundum uomitionem multo meri potu, & arundinis radicis binis drachmis, aut cyperi totidem. Breuiter, cogendi sunt ut uehementi ambulationi & cursui se credant, ob torporem, quo corripiuntur. quinetiam quotidie lauandi sunt.



RUBETAE Ranae, quam quidam bufonem uocant, diuersa reperiuntur genera. Terrestris tam:n, quæ Græcis phrynos dicitur, Latinis uerò rubeta, quod in frutetis & sepibus inter rubos degat, nocentior, magisq; lethifera est, quàm quæ in paludibus, & aquis scrobibus uiuit (id quod non rectè, meo iudicio, intellexit Aloysius Mundella; Brixianus octaua sui uoluminis epistola) tantoq; magis noxia, lethiferaq; fuerit terrestris, quantò in opacioribus, frigidioribusq; locis uitam duxerit. Quamobrem in hoc genere eæ omnium pessimæ creduntur, quæ in umbris conualum syluis, & in harundinetis morantur. Adultæ crassa tenaciq; conteguntur cuti, adeo ut acutissimo palo quandoque difficile à rusticis, qui ita eas interficere solent, perfodantur. Hæ cum circumnascens herbas, siue aliquod depascens animal, ueneno inficere uolunt, contrahunt sese in tumorem, ut uenenum per urinam longius eiaculentur in plantas, & circumstantes quadrupedes. Quare admirari non licet, si nonnunquam repente interinant homines, qui fraga, fungos, aliasq; plantas harum ueneno infectas in seipis deuorauerint. Quippe quod non modò ueneni mistu hæc omnia inficiunt; sed etiam salua ea sæpius consueunt: quæ sanè non minùs mortifera est, quàm napellus. quinetiam earum sanguis uiperco scatet ueneno. Proinde mirum non est, si in puluerem potæ mortifera inferunt incommoda; quemadmodum & morsu. Nam etsi dentibus careant; tamen compressa scabrâ gingiuis particula, et subinde ingressa per cutis spiracula salua, demorsos uenenant, ut in præfationis huiusce libri commentario tradidimus. Sicæ & in puluerem potæ, ut Auicenna refert, præter mala quæ à Dioscoride redduntur, faucium, & gutturis tum inflammatio, tum siccitas excitant: item oculorum caliginem, uertigines, conuulsiones, dysenteriam, fastidium, uomitus, animi deliquium, delirium, amentiam, & plerumque edentulos faciunt homines, quauis euadant, qui hauserint. Nec minora etiam pericula adferunt fructus, & herbe earum ueneno infectæ, & epotus eandem sanguis. Curantur ijs malis affecti theriaca, uel Mithridatis antidoto tribus cõtinuis diebus ex uino potis. Idem præstat testudinis marinæ sanguis, additis cumino, leporis coagulo, & uino. Datur potanda præsentaneo remedio quinta essentia nostra theriacalis. Quin & oleum nostrum de scorpionibus exterius commodè inungitur. Præfert Conciliator smaragdi puluerem ex uino potum scrupuli pondere, cum eo tamen, ut subinde intret æger nudus in mulum recenter exenteratum, inibiq; conclusus moretur, donec defruescat cadauer, totiesq; sic exenteratum mulum aut equam, si mulus non adsit, permutet, donec effuso diutius sudore cedat noxa. Aëtius mulis, & equis parcens, in clibano, quantum tolerari possit, calidissimo affectos, uel alio in loco arte calefacto detinendos ad sudandum iubet, quemadmodum curantur aqua inter cutem laborantes. Quorum medicamenta curatioq; ut Auicenna est author, hoc in negotio non parum

Rubetæ, palustrisquæ. ranæ uenenum.

Ranæ maleficæ signa, & curatio.

conueniant. Proinde prodest ijs maxime rhabarbarum, diacurcumæ, & dialacæ confectio: tametsi Conciliator lapidem his omnibus præferat, quæ in earum capite reperiri solet.

## ΕΒΕΛΛΑ: HIRUDO: CAP. XXXII.

DEVORATÆ cum aqua hircines, si ori uentriculi adhærent, tractione partium, nonnullam suctionis imaginem præbent: eo enim argumento hausta hircudo deprehenditur. Has muria forbitione excutit, & Cyrenaicus succus, aut laserpitij folia, aut betæ, cum aceto, aut pota niuis glebula, cum posca. nitrum ex aqua gargarizatur, aut atramentum sutorium aceto dilutum. Si faucibus hæreant, in aquam calidam ingressis, aqua frigida ore contineatur, & ad eam hircudines exiliunt.

Hircudinum  
deuoratarum  
noxæ.

Hircudinum  
curatio.

HIRCUDINES raro in alijs aquis inueniuntur, quàm in palustribus, lacustribus, & stagnantibus: quondam quidem in probatissimis fontibus, & arenosis, & saxosis fluuijs non nisi rarissime uiuunt, cum suapte natura cæno, ac limo delectentur. Quamobrem caueant, qui palustres, uel stagnantes aquas bibunt, ne hircudines simul ingerant, quæ admodum inexpertis uiatoribus nonnunquam euenit. nanque æstatis tempore calore, & siti defatigati, dum aquam, cuicunque in itinere obiauerint, auidè potant, sæpe imprudenter hircudines hauriunt. Quo fit, ut subinde non modò sibi sanguinem exugi sentiant (ut tradidit Dioscorides;) sed etiam (ut Auicenna inquit) cruenta expuant, ac præ timore melancholici fiant. Verùm antequàm aliquod offeratur medicamentum, inuestigandum est, an animal ori uentriculi, an gulæ adhæserit, an ipsis faucibus. Id quod facillè intelligi potest ex eorum, qui hircudines hauriunt, relatione: quoniam ubi suctionem sentiunt, nimirum ibi hircudinem fixam esse significatur. Quòd si ori uentriculi affixa fuerit, auxilium præstat muria leniter epota, foetida item laserpitij lacryma, quin & lixiuum cum sale & aceto, aut raphani domestici succus cum aceto, aut oleum crudum haustum, quod per se tantum hæc interficit animalia. conferunt insuper ea omnia, quæ alui tineas, et lumbricos necant. Si uerò guttur medium ab hircudine obsideatur, proderit acre lixiuum gargarizare, aut aquam, in qua alumen cum aceto inferbuerint, uel calceanthum, aut muriam cum lixiuo, aceto, & sinapi simul commistis. Sed si ea faucium ambitui hæreat, opem mirificam feret (ut Dioscorides docet) calidæ balneum, aqua frigida in ore contenta. Siquidem hircudo ab aquæ calore propulsata, ad frigidam in ore contentam decurrens, facillè unà cum ipsa aqua expuetur. Interdum contingit, quòd statim sub linguæ radicibus, uel in primis faucium partibus adhærescit, ita ut depressa lingua uideri possit: tunc rostratis forcipibus facillè extrahi poterit, uel quouis alio instrumento, quod cuique in promptu fuerit.

ΕΛΛΕΒΟΡΟΣ ΛΕΥΚΟΣ, ΘΑΨΙΑ, ΕΛΑΤΗΡΙΟΝ, ΑΓΑΡΙΚΟΝ ΜΕΛΑΝ. VERATRUM ALBUM,  
THAPSIA, ELATERIUM, AGARICUM NIGRUM.  
CAP. XXXIII.

PROVIDENDUM. etiam ijs, quæ etsi ferendi auxilij gratia tradantur; non minora tamen cæteris uenenis pericula sæpius adferunt: Qualia sunt album ueratrum, thapsia, elaterium, agaricum nigrum: siquidem ea strangulatus concitant, aut immodicas deiectiones mouent. Quibus ea medentur, quæ in fungorum mentione, & similibus retulimus. Nimios autem deiectionum impetus, medicamentis, quæ excrementa supprimunt, coercemus. Neq; negligenda quæ parum quidem nocere uidentur, interim uerò uitam in discrimina agunt. Quo in numero sunt syluestris ruta, gith, nouæ glacies, pappi recentes: flores autem sunt eius spinæ quæ cactos dicitur. Eos qui sumperint, sola uomitio recreat.

Diuisio capi-  
tis castigata.

EXTANT quàm plurimi Dioscoridis codices, in quibus caput hoc de Veratro albo, Thapsia, Elaterio, & Agarico nigro, à præcedenti capite seiunctum non legitur. Verùm cum antiquissimus manu scriptus codex, hæc proprio, & peculiari capiti dicauerit, uideaturq; absurdum de his differuisse Dioscoridem unà cum hircudinibus, cum quibus nullam habent cognationem, neque iisdem curantur remedijs, non temerè facturos duximus, si illa à nobis seorsum proprio capite ab hircudinibus distincto, tractarentur. Sciendum itaque est, quòd cum hæcenus scripsisset Dioscorides omnium uenenorum indicia, quæ pota, uel deuorata, homines necant, uel saltem ægros efficiunt, quin & uniuersalia & particularia antidota tradidisset, quibus illorum uis frangi, ac destrui possit, cum præterea sciret aliqua in medicum usum haberi medicamenta alium ducentia, quæ simpliciter pota, & nullis antidotis infrænata, uel maiori mensura, uel pondere, quàm par sit sumpta, non minus homines interimunt, quàm quæ propriè uenena uocantur, medicos illud hoc loco admonere uoluit, quòd in propinandis hisce medicamentis minime cæcutiant, sed in hoc omne suum studium, omnemq; diligentiam impendant. Verùm quauis, inter ea omnia, quæ in medicum usum ueniunt, paucorum tantum meminerit, nempe thapsiæ, albi ueratri, elaterij, & agarici nigri; non tamen ob id fuerit insimulandus, quòd nesciuerit præter hæc, alia plura esse medicamenta, quæ noxam inferre possunt, aut maiorem quàm illa, aut æqualem. Quippe quòd illi satis uisum sit, si tantum horum exemplo imperitos medicos discrimen, noxamq; docuisset, quæ omnia in uniuersum medicamenta alium cum labore ducentia plerumq; sumentibus adferunt, cum (ut modò diximus) uel largius quàm deceat, uel suis antidotis exuta sumuntur. Sed ut harum rerum studiosis in omnibus, quantum possint, satis

faciā facimus, præter ea, quæ à Dioscoride tradita sunt, nos alia quoque plura addere decreuimus, quibus quotidie passim utuntur medici. Cuiusmodi sunt cyclaminus, ueratrum nigrum, euphorbium, turpetum, tubymali omne genus, scammonium, colocynthis, bryonia, latbyris, ricinus, thymelæa, & chamelea. Quandoquidem cum hæc omnia medicis in frequentissimo sint usu, ad corporis excrementa exigenda, & ad uomitum quandoque ciendum, in quæ plures reus hominum affectibus, mihi sanè negligentie adscribi posset, si hæc prorsus silentio inuoluissim, præsertim cum sæpius eueniat quorundam circumsistorum imperitia, ac temeritate (pharmacopolas nunc prætereo, quod eorum errata sepe, ac sæpius improbauerim) ut uulgaribus, & rusticis, necnon & quandoque nobilibus, innumera propinentur pharmaca aluum ducentia, quæ plerumque sumentes in magnum discrimen ducunt, quoniam nec medicamenta ponderant, nec infrenata exhibent, nec ad egrotantium temperaturam, etatem, sexum, consuetudinemque respiciunt. Quo fit, ut egrotantes, qui in eorum manus incidunt, præcipue ij qui natura sunt imbecilles, magnis nonnunquam afficiantur incommodis, quibus nisi periti proprijs succurrerent remedijs, facile interirent. Albi itaque Veratri potionem, aut Thapsiæ, aut Elaterij, aut Agarici nigri, aut Cyclamini sequuntur uomitus, ingentia alui profluvia, intestinorum tormina, strangulationes, & respirationis angustia. quibus debinc tanta succedit principum facultatum imbecillitas, ut paruo temporis momento egri animi deliquio corripiantur, grauiter spirent, & frigido sudore madescant. Postremo, nisi citius succurratur, oborto singultu, illico uel suffocati, uel conuulsi intereunt. His primùm auxiliantur uomitiones (ut multoties diximus) crebro concitate, & infusa clysmata, quorum sæpius superius meminimus. Post hæc remedio sunt antidota, quæ in uniuersum omnibus aduersantur uenenis, præsertimque theriaca, cui (ut Galenus pluribus in locis testatur) uis peculiaris inest, modo adulterio uacet, ut sumpta post medicamenta deiectoria, adeo eorum superet uires, ut nibil per aluum exigant. Ceterum priuatim Albo ueratro confert aqua mulsæ largius sumpta, & nymphææ flores duarum drachmarum pondere poti, uel deuorati, traduntque hæc propria albi ueratri esse antidota. Cyclamino deinde conducunt lauri baccae, duarum drachmarum pondere, sed propria facultate nigrum piper in puluerem contritum, & eodem pondere potum. Elaterio præterea opem fert Andromachi theriaca ex baccarum lauri decocto, aut melle pota senum scrupulorum pondere: utrumque proprium eius remedium est menthæ succus. Thapsiæ denique & nigri agarici noxa tollitur, ijs medicamentis, quibus albo ueratro subuenimus, cum eadem sint huius, quæ illorum incommoda. Funt quoque à NIGRO ueratro (ut scribit Auicenna) interdum horrenda symptomata, nempe intolerabiles alui fluxiones, suffocationes, conuulsiones, animi deliquia, palpitatio cordis, lingue atrescilio, dentium constrictio, frequentissimi ructus, & uniuersi corporis inflammatio: & nisi illico succurratur, tremor consequitur, uniuersum occupans corpus, cum quo postremo commoriuntur egri. His auxilium præstat absinthium ex uino potum: quin & cumini, & anisi semen, nardus, castoreumque, æquis ponderibus in puluerem contrita, & ex uino pota: appositis, ubi intumuerit uenter, linteolis igne calefactis, itemque sacculis flatus discutientibus. Cibandi autem sunt egri recenti caseo, melle, butyro tam crudo quam cocto, pinguium carnum iuribus, ac etiam passo. Sed non propterea parcendum fuerit antidotis in uniuersum iuuantibus, nec etiam nymphææ floribus, utpote qui non modo albi ueratri uires demoliantur, sed etiam nigri. Porro EUPHORBIVM fauces, & guttur uehementi admodum incendio uexat. Corpus uniuersum inflamat, uentriculum, & intestina magno dolore erodit, singultum excitat, & continuas alui fluxiones. Quæ itidem omnia mala inducunt TURPETVM, Scammonium, Colocynthis, Bryonia, Tubymali omnes, Latbyris, & Ricinus. quanquam non tam acriter nocent, ueluti euphorbium. A THYMELÆA autem, & Chamelea pituitosæ spumantesque excitantur uomitiones, alui profluvia, intolerabiles intestinorum, & uentriculi erosiones, angustie, inflammationes, & uniuersi corporis cruciatus: quin & sitis implacabilis, singultus, conuulsio, præpedita locutio, & alia sæua accidentia, quæ quandoque ea excedunt, quæ ab epoto euphorbio proueniunt. His omnibus in uniuersum primùm opitulatur uomitiones & clysmata, seruata uniuersali methodo, ac etiam communis usus antidota. Priuatim uero prosunt oleosa, ac pingua: item quæ ualenter sunt frigida, ut hæc ingentem feruorem extinguant, illa uero ut exuperantem acrimoniam obtundant. Proinde prætulit Auicenna acidum lac, caphuram ex rosacea aqua potam, punicorum austerorum uinum, angurie, cucumeris, cucurbitæ, & acidorum malorum succum: item bordei pitisanam niue, uel glacie refrigeratam. Sed proprium (ut aunt) euphorbij antidotum est citri semen ex uino, in quo belenij radix inferbuerit potum. Scammonij uero lac, à quo demptum fuerit butyrum, malorum, cotoneorum, rhois, ribisque succus. Colocynthis deinde antidotum fuerit sanè bubulum lac, & butyrum recens, Lemnia sphragis, & smaragdi puluis, pluries pota. Turpeti præterea, & Tubymalorum omnium, Andromachi theriaca ex uino pota, in quo Cretense dictannum incoctum fuerit: item mumia sepulcrorum in puluerem ex uino meraco pota drachmæ pondere. Bryoniæ porro, theriaca ex uino hausta, in quo belenium conferbuerit, itemque nigrum piper contritum. Latbyris ad hæc, & Ricini proprium antidotum est hyperici succus, aut herba ipsa in puluerem pota. Thymelæa denique & chameleæ rosaceum serapium, ex bordei pitisana potum, & subinde organum Cretense igni tostum. Sed hæc omnia præstant tantum ad supradictorum medicamentorum uim delictoriam superandam. Ceterum cum plerumque eueniat, ut hæc, quæ modum excedunt medicamenta, uaria ac diuersa adferant incommoda, quæ etiam ob sui repentiam uebementiam præsentanea exposcunt remedia, nempe continentes uomitus, perpetua alui profluvia tam cæterorum humorum, quam puri sanguinis, cum uasorum oscula ueneni ui referantur, conuulsiones, suffocationes, animi deliquia, & utrumque omnium imbecillitatem; idcirco non modo attendendum fuerit, ut medicamenti uis antidotis superetur; sed etiam ut ipsis grauius symptomatis omni diligentia succurratur. Quandoquidem hæc sæpius tanti sunt ponderis, ut maiorem, celeriolemque expetant curationem, quam cetera. Inhibentur itaque uomitus modum excedentes (si tamen medicamentum cum humoribus reiectum sit) adstringentibus medicamentis, quæ uentriculum roborant, exterius præsertim illis: quin & uinculis, ac fibulis, extremis

Albi ueratri, aliorumque noxa, & auxilia.

Nigri ueratri noxa, & cura.

Euphorbij, & quorundam aliorum uenena potio.

Euphorbij, & aliorum omnium curatio.

Remedia ad varia symptomata.

membris obtortis. Faciunt ad hoc in corpus sumpta flaua myrobalana, tam sicca, quam saccharo asseruata: item naces cum putaminibus saccharo similiter conditæ, diacytonites, saccharum rosaceum diutius inueteratum, addita Lemnia sphragide: præterea cydoniorum, & punicorum malorum uinum, syluestrium prunorum succus, myrti bacca, rhus, rosa sicca, syluestrium rosarium semen, cornu ceruinum combustum, santala, corallia, omphacium, acetum, & id genus alia. Sed eorum quæ exterius illita prosunt, hæc sese offerunt, Indica uidelicet, & Celtica nardus, mentha, glandes, lentiscina, resina, thus, flaua myrobalana, myrti folia, & bacca, rhus, melinum, nardinum, lentiscinum, & myrtinum oleum. Nec tantum pollent hæc ad uomitiones compefcendas; sed etiam pari facultate ualent ad sistendas alui fluxiones, quæ modum excedant: uerum ijs uniuersa aluus est illinenda; ab ipso uentriculi ore ad pubem usque. Præstat & brachia ab scapulis ad manus, & crura à coxendicis articulo ad pedes usq; fascijs constringere, offusis subinde austeris plantarum succis. Confert item sudoris excitatio, aut detentis ægris in calido cubili, aut laconicæ arte calefactis, in quibus ægros caput emittere oportet, aut brachijs, & cruribus, in calide balneo demersis. Ab his dare conuenit, quæ adstringunt, & roborant. Principes in uniuersum facultates roborant odorata medicamenta, cuiusmodi sunt rosæ sicca, caphura, garyophylla, agallochum, styrax, laserpitij lacryma, iuniperi bacca, santala omnia, & id genus plura. Prætulit in huiusmodi alui fluxionibus Auicenna nasturtij semen tostum, trium drachmarum pondere, ac subinde in lacte decoctum, quousq; lac concreuerit, & postremo potum. Si uero hæc non profuerint, soporiferis uti licebit, nimirum Philonis medicamento, athanasia, requie, & alijs quibuscumq; quæ opium, aut meconium exceperint. Nam etsi hæc quoq; noxa haud uacent; tantum tamen adferunt iuuamenti (si tamen restitratione exhibeantur) ut ijs tunc in tam magno discrimine medici uti possint. In summa si optimam haberemus theriacam, quæ ex adulterinis & suppositiis non esset confecta medicamentis, omnibus præponeretur antidotis in superanda ui medicamentorum aluum ducentium. Siquidem testatur Galenus (ut paulo superius diximus) pluribus in locis, suis in libris de theriaca ad Pisonem, & Panphilianum, illud optime theriacæ indicium esse, ut à præsumpto deiectionis pharmaco pota humorum deiectionem impediatur, citra ullam ægotantium noxam. Id quod nobis experientia compertum est præstari ab antidoto nostro, cuius descriptionem tradidimus in præfationis huius libri commentario. Prodest non parum præter hæc uomitionibus, & fluxionibus prædictis etiam uictus regimen ex adstringentibus & austeris institutum, quæ deinde niue uel glacie refrigerari conuenit, aut in altum aque puteum fune suspendi. Adiuuantur conuulsiones, quæ ab ingentibus, laboriosisq; alui profluuijs eueniunt, ijs duntaxat cibus, quibus ad resocillanda exinanita corpora, iuresq; roborandas utuntur medici. Quò in negotio præfertur huiusmodi lac ab ipsis exustum uberibus: quin & dulcium amygdalarum cremor, & earum pariter oleum, ciborum condimentis admistum. Prosunt & nuclei pinei, pistacia; Indicae nuces, & melopeponum semen; omnia in mortario contusa, & caporum iure colliquata, addito candidiori saccharo. Opem similiter fert caporum, & phasianorum enteratorum carniū eliquatus succus, carniū ipsis tenuiter incisis, uitreo uase conclusis, & in aque balneo eodem in uase decoctis, quousq; uniuersus ab his exudauerit succus. is namq; frequenter potus cochlearis mensura (ut libello de uiribus cordis prodidit Auicenna) magis succurrit imbecillitati cordis, quam alius quicūq; cibus. Conducunt præterea recentium ouorum uitelli carniū iuribus admisti, & saccharo respersi: insuper caporum, phasianorum, perdicum, & attagenarum pulpa in mortario contusa, & iure, & saccharo temperata. Præfationibus porro subuenimus ijsdem tum auxilijs, tum medicamentis, quorum superius mentionem fecimus, cum de mortiferis fungis disse- reremus. Ceterum meminit hoc capite Dioscorides præter prædicta, melanthij, syluestris rutæ, & earum plantarum lanuginis, quæ in aculeatarum genere quibusdam casti uocantur. Quorum omnium historias, et facultates superius proprijs locis tradidimus, quæ tamen non semper nocent. At si noceant, curantur excitatis uomitionibus, ebibito prius malæ decocto, aut lacte, aut recenti crudo butyro. Post quæ proficiunt pinguia iura, & cetera, quæ aluum emolliunt. Dent igitur operam, diligenterq; animaduertant seplasiarij probi, ac fideles, ne in ponderandis hisce medicamentis, aut manu aut oculis imprudenter decipiantur. Quinetiam eos admonitos uelim, ut imperitos, ac temerarios circumsoraneos à pharmacopolijs suis excludant, reprehendant, & missos faciant: ac si opus fuerit, protomedicis & rectoribus ciuitatum eos denuncient, ne miselli ægotantes sub publica omnium fide ab hoc improbo ac pestimo hominum genere prodantur, atq; in perniciem agantur.

Remedia ad  
conuulsiones.

#### Οἰκῆα ἡμῖν. DOMESTICA NOBIS.

#### CAP. XXXIIII.

AQUA frigida abunde pota, aut meracum uinum liberalius epotum, aut passum, præsertim à balneo, aut cursu, aut uehementi exercitatione, strangulatus, & dolores infert. In quibus sanguinis missio protinus, & uacuatio, imminetia soluunt pericula. Sed de notis ueneficiorum, ac remedijs, & cauendi modo, hæcenus dicta sint. Subiungeremus etiam antidota necessaria, quæ præclare auxiliantur, quibus utimur, quale Mithridatium est præsertim, & quod sanguine, & quod scinco temperatur. Verum quoniam alijs in locis diligentissimè scripta sunt, hic ab eorum descriptione supersedemus.

Rerum domesticarum nota.

NON modo aqua frigida, & uinum meracum, aut passum inter ea, quæ nobis domestica sunt, & quotidiano usu alimentum præbent in humane uitæ subsidium, eo modo pota, quo Dioscorides scribit, maxima adferunt discrimina; sed etiam carnes, & pisces. Etenim hæc utraq; cocta, & adhuc feruentia humidis locis diutius asseruata, subindeq; frigida deuorata, eosdem malos pariunt effectus, quos à maleficis fungis creari tradidimus: tametsi quandoque non nisi duobus,



nisi duobus, aut tribus post diebus appareat noxa. Tostæ præterea carnes, uenenatorum subeunt naturam, si calidæ inter duas suffocentur patinas, obuoluanturq; linteis, ne exhalare possint. Eadem etiânum mala inferunt morticinæ carnes esitæ, quemadmodum et eæ, quarum animalia aut à uenenatis serpentibus, aut à rabidis brutis demorsa, aut fulmine icta interiire. Quandoquidem sæpius harum esu coli oritur inflammatio, mæror, alui profluvium, furor, obliuio, ueternus morbus, et ad postremum mors insequitur. Quamobrem hæc sanè negligenda non sunt, quin potius summa cura uitanda. quippe aliquos noui, qui his deuoratis nullo medicamento adiuti, intumescere inde toto corpore, tandem uitam misere finiuerunt. Nec minus euitare oportet oua barbi piscis: nam adeo uenenata sunt, ut si largius sumantur, eos qui hauserint, in magnum periculum adducant. Piscium curatio eadem est, quæ fungorum. quanquam non existimat Conciliator, ut piscibus sicut mortiferis fungis conueniant syluestria pyra. Carnium uero suffocatarum malis succurritur excitatis prius uomitionibus, et infusis clysteribus: mox uini optimi et odorati potu, admisto cydoniorum malorum succo. Præstat à uomitu Lemniam sphragidem bibere, unâ cum agallocho, et mastiche, quauis eadem sit harum cura, quæ coli affectibus adhibetur.

Piscium, & carniū noxæ remedia.

## De uenenatis animalibus.

Ἰοβόλα. VENENATA.

CAP. XXXV.

**D**E BESTIIS, quæ uirus eiaculantur, & exitalibus uenenis, ideo scribere aggredimur, ut tota curationis remediorumque ratio ad umbilicum perducatur. Siquidem pars hæc non minus quàm cæteræ aliarum, necessaria est ijs, qui artem medicam exercent, utpote cum adminiculo eorum, quæ inibi traduntur, doloribus, periculis, & cruciatibus, plurimisque alijs malis homines liberari conueniat. Hæc autem in summa fastigia duo, sicuti ab initio relatum est, distribuitur. Nam qui de feris uirus inspuentibus sermo disserit, theriacus dici solet: qui uerò de amoliendis ueneficijs, alexipharmacus: quo prius tradito, simul quæ sequi signa consueuerunt, præmonstrabimus: tum quæ nonnihil auxilij ferunt. Omnia autem in promptu, & ad manum habere artificem oportet, propter urgentem sæpenumero necessitatem. Siquidem pauca è uenenis & uirulentis animantibus, tarda & grassantia sensim pericula cient, ita ut dilationem admittant: pleraque uerò præsentaneam perniciem afferunt. Hominum autem partim malè alijs cogitantes, ingenita prauitate maleficium ita temperant, ut spatium curanti liberum non relinquunt: partim sceleris admisi cōscientia, aut tristi aliquo euentu oppressi, hausto sponte ueneno, mortem sibi consciscere conantur. qui postea deprehenfi, aut resipientes, & uitæ cupidi, præsentaneam opem poscunt. Non defunt qui hostiles sagittas illinentes, aut fontes aquasque puteanas hac labe polluentes, certam & ineuitabilem aduersarijs perniciem moliantur. In quibus ipsis etsi maleficium non subito, sed aliquantò post grassari natura sua comparatum est; tamen nisi primo quoque tempore coercetur, & remedijs subinde excipiat, frustra tandem succurritur, occupatis iam corporibus exitiali ui ueneni. Proinde non vulgari industria diligentiaque in ea re utendum est, ut quod in alijs incommodis ars consueuit, in his quoque salutem mortalibus præbeat. Quin & apud priscos genus hoc unum existimabatur esse eius partis, quæ medicamentis pugnat: sed recentiores id ipsum discreuerunt, nominantes præcautionem, & modum præcauentem, salubris sanantisque medium stantes, parua & leui supra modum persuasione decepti. Siquidem tres in humanis corporibus constitutiones esse contendunt. vnâ, qua sani degimus: alterâ, qua sinistra ualitudine corpora laborant: tertiam, quæ medium inter utrasque locum sibi uendicat. In qua positi, sanitatem specie mentiuntur, facileque in morbos & pericula concidunt; ob uim corruptricem, quæ corporibus nostris incumbit: quemadmodum in ijs uidere licet, quos excandescens rabie canis momorderit, necdum tamen aquam horrent: in ijs quoque qui cantharidas hauserunt, sed nondum urinae tormento cruciantur. Tripartitò igitur artem digeri, triplicique corporis constitutioni meritò respondere tradunt. Salubrem partem esse uolunt, quæ sanitatem tuetur: præcauentem, eandemque prohibentem; quæ obstat, quo minus in morbos incidunt: & sanantem, qua uitia discutuntur. Quibus ita responderi potest, quòd primùm ex ista ratiocinatione non tres corporis tantum, sed quatuor haberi constitutiones fatendum esset. quippe ut aliqui sunt, qui necdum morbo laborant, morbo tamen maximè ob impendentem causam sunt obnoxij: ita sunt, qui iam priore morbo defuncti, nòdum tamen secundæ ualitudini restituti sunt: id quod in ijs, qui à morbo proximè sese recolligunt, cernere licet, qui uirium recreationem & robur desiderant. Sed quemadmodum curandi ratio ad partem medicamentariam pertinet; ita præcautionem eidem subijci par est. Ad arcendas enim ualitudines uehementibus utimur auxilijs, altiore scarificatu, uisionibus; amputatione, derodentibus epithematis, potionibus perniciiei occurrentibus; & plerisque alijs. Verùm enim uero sunt usque eò rudes nonnulli, ut ne remedia quidem appellent, quæ morbos arceant. Cuius sententiæ inire rationem haud promptum est: etenim cum uerbum ipsum, præcauere, tum agendi modus, omnino auxiliarem remediariamque uim præ se ferunt. Mirum uerò nisi etiam

etiam sua illa distributione partium eos complectuntur, qui in pestilentis cœli statu morbo nondum correpti sunt: pesti tamen, propter obuersantes aëris occasionem, opportuni, & in morbum proni redduntur. Dicere forsitan quis posset, salubris institutionis præcepta non aliud esse, quam arcendorum morborum rationem: quippe cum firma reddere corpora, & minus uitij obnoxia nitamur, ut inoffensa ualitudine degant, nec morbis conficiantur. Neque id silentio prætereundum; quod maximè præcipuum, & tanquam caput rei est, non oportere medicinæ partium distributionem, totidem corporis constitutionibus respondere, sed naturas singulorum suis notis seorsum scrutari, ac explorare, ut suis locis ostendimus. Cum ijs igitur non pluribus agendum. Illud magis adnotare conuenit, affectus, qui à uirulentis animalibus, uenenisque contrahuntur, uocari cæcos, id est, quorum ratio minimè iniri potest. Quin & ea, quæ eisdem auxiliantur, nulli pariter sunt addicta causæ. quapropter quæstionibus obseruatoriæ artis, & eius quæ ratione fulciatur, annumerari solent. Neque prorsus uerum deprehenditur, affectus huiusmodi cæcos esse. nam quod semper se protrahit, & nullum in quibusdam necessarijs usum exhibet, haud facili coniectura colligi potest: etsi naturæ proprietate prorsus cæcos eos affectus concedimus, qui ab exitialibus uenenis, & animantibus; quæ uirulento morfu sæuiunt, contrahuntur. Nam quod ad opus nonnullum usum præbet, datque medendi occasionem, neque imperceptibile, neque cæcum, nulliue causæ obnoxium reputatur: sed magis ab ipso quis impulsus, demonstrationem se habere, & opinionem de abditorum cognitione confirmare poterit. Nam etsi sæpe minora sunt, quam ut sensibus percipiantur; euidenter tamen ex ipsis inter se collatis deprehenduntur. Diocles autem in eo commentario, quem Plinistarcho dicauit, satis modos perstrinxit, ad uerbū ita scribens. Nolle quis hoc potest cum in alijs non paucis, tum in uiperis, & scorpionibus, & reliquis id genus, secum animo reputans; ut quanuis exiguo sint corpore, uixque conspectui subijciantur; magnorum tamen discriminum ac dolorum causas inferunt: quorum nihil præter quandam corporis exiguitatem, uimque præ cæteris animantibus datam illis, facile fuerit spectare. Quanta enim ea moles corporis est, quæ à scorpij ictu, & aliorum id genus uenenatorum, quæ nos morfu conficiunt, attingitur? quorum aliqua uehementes cruciatus excitant, alia erodunt, & putredines cient, nec defunt quæ præsentaneam perniciem moliantur. Aut quantulum est quod à phalangij morfu ingeritur, & uniuersum corpus excruciat? neque enim quis magnitudinem ipsorum deprehendere posset, cum prorsus exigua mole consent. Ergo quod hæc ad affectus referantur, constitit inter omnes. Verum quod exactè deprehensum sit, uim quandam ipsis inesse mortiferam, quæ insinuata corporibus, molestiarum, quæ exoriuntur, nobis causa sit, in confesso est, & omnium cōsensu persuasum. Nec quisquam inuenietur usqueadè contentionis studio flagrans, qui aliunde exoriri molestias asseueret, quam à materia mortifera partem corporis attingente. Porro id erat, quod inter utilia artis opera in omni opere dicere oportuit, quænam res opus hoc efficiat, ut nihil prorsus nos lædat, incomprehensa communis causæ quæ proprijs inest ratio: quandoquidem tum euidenter indicari possit, cum deprehensa est. Ideo Erasistratus empiricorum pertinaciam graui cauillatione incessans, cæcis affectibus causas assignauit, inficiatus his communem, & supremam morborum causam incomprehensibilem esse; & hanc in eo, quem de causis scripsit; commentario aptissime prodidit, candido signatam lapillo. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in quibusdam, ut in uenenis, serpentium ictibus, & cæteris id genus trita medendi ratione contentos esse: neque satisfacturam sibi obseruationem eam, quæ à causarum comprehensione separata est: primum enim genere comprehendi facile possunt. Quod autem sit lethifera uis, corporaque permutans, ita ut perimat, ex ijs quæ per genus, non per speciem uagantur, curationem indicat, qua hæc hebetare, & prorsus expugnare liceat. Cum uero subiungit. Ad aquam dulcem, & potui idoneam uenit quis; & ante obseruationem ad uomitum, ad vulneris dilatationem, ad demorsæ partis suctum, cucurbitulas adfixit, partem incidit, urentia medicamenta, aut ea quæ uim eandem adipiscuntur, admo- uuit, postremo partem amputauit: secum reputauit medicamina, quæ per summam cutim ferre, & applicari solita, inimicæ ad intima perniciæ repugnarent. Hæc itaque, quæ disseruit Erasistratus, ueritati consentanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodicos demirari licet, qui mortiferam uim corporibus illapsam, negotiorum, quæ ipsa facefsit, esse causam diffiteantur: verum rudiu- sculè nomini attendunt. Nam apud ipsos palam immissa uis. *Φθοροποιός*, id est mortifera, nominatur: *Φθοροποιοί* autem nullius officij alius esse potest, quam causæ. Ajunt hæc nomina, *μάρτυρας*, & *ἀνακλύπτεν*, esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quædam dictionum non pro uirtute, sed nuda enunciatione comprehenduntur. Enimuero quemadmodum in his uocibus *μάρτυρας*, & *ἀνακλύπτεν*, partes neque certos, neque principes retinent significatus; sic in hoc uerbo *Φθοροποιός*, partes productionis gratia, non pro uirtute coaluerunt. Hinc ad causarum differentias transeunt, affirmantque causarum aliquas euidentes esse, quæ dum aduersam ualitudinem creant, separantur: cuiusmodi sunt frigus, labor, æstus, & similia. quasdam continentes, quæ permanent, postquam morbum excitant, hoc est, quibus præsentibus, & effectus eorum adsunt: incrementibus, affectus augentur: decrementibus, minuuntur: & cum desinunt, iidem finiuntur: quibus

quibus solis ac per se manentibus, effectus quoque ipsi manent. Talia quidem receptissima sunt causarum discrimina, quorum nulli phthoropœon subijci potest. Evidens enim causa non est, quoniam morbus ipse permanet, nec ipsa à corpore separatur. Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hic addit: quemadmodum accidit ijs, qui à rabioso cane sunt demorsi. Quod si neque evidens causa, neque continens fuerit, neque per se, neque alterius consortio causa erit. Quod si à nulla causarum differentia phthoropœon deducere possumus, consequitur, ut neq; causam esse fateamur. Quod autem asserunt, uocabula quædam in se non habere partes rerum significatrices, sed nuda & simplici pronuntiatione ficta esse, fateri necesse est. Verum non omnia, sed perpauca talem nancisci conditionem existimandum est: neque enim *πρωτὴν* in hoc nomine *φθοροπ* 10 *πρωτὴν*, perinde atque assumptitia profertur, sed longè principem obtinet significationem. Quemadmodum enim *φθορᾶς*, id est corruptionis, nomen mutationem in peius significat; sic hoc uerbum *πρωτὴν* sumi debet, ut nihil amplius ex eo quod hanc dictionem *φθορᾶς* secum habeat, declaret, neque prorsus id significat, quod omnes palàm audiunt, & huic simile redditur, *πρωτὴν δὲ ἵψος*. Si dant à corruptione sanis fieri morbum, concedunt utiq; uim in huiuscemodi uerbo *πρωτὴν* subesse: siquidem aliquid est, quod corruptionem efficiat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur per singulas causas, quæ corporibus subijciuntur, idque tam in lethalibus uenenis, quàm in ijs quæ corporibus ingeruntur. Verum nonnihil subiacere causarum differentijs produunt. Quinetiam aberrarunt, non exactam diuisionem assumentes. Qui uerò se dogmaticos profitentur, causam esse partim præparantem, partim continentem asserunt, ut inguinum ulcus, & inguinariam 20 febrim, & quæ effectui tum assistat, tum etiam separetur, ut à fractis præcipitatio. In summa quoties quidpiam suapte natura causa fuerit, nec ulla diuisione comprehenditur, uitiosum est, neque causæ adscribitur, eorum quæ idem genus sortiuntur. Sed quod phthoropœon causa sit, nomen ipsum argumento est, & in ijs quæ contingunt, apertius ostenditur. Quid aliud causæ arbitrantur esse post impressum à serpentibus ictum, quàm ex animante uim, & illapsum in corpora uirus? Neque enim frigus, neque æstus, neque sectionem corporis, neque cruditatem, neq; aliud quicquam simile causari possunt. Verum quoniam causarum differentijs gaudent, & aliquas continentes, alias euidentes appellant, ipsis dicendum, utroque istorum modorum euidentem quidem causam esse, quod affectum præcedit, & quod corporis substantiam præoccupat: continentem uerò, quod morbis præsentibus adest, qua separata recedunt, quæ cum ipsa euenerant. Sed de ijs hæc 30 tenus. Statuendum itaque mortiferam uim intrinsecus manifestissimam esse causam, ipsamque principem facere scopum oportet. Et antequàm ad ima decumbant morbi, uarijs modis est certandum, donec uis tota corporibus excutiat. Modò enim reuocari debet ea parte, qua pestis intrauerit: modò aliqua alia, præsertim principatum non obtinente, antè coërceatur, quàm altius irreperens uiscera tangat: aut eius perniciēs eluatur, retundaturque, cum iam membratim peruagatura est. Itaque uenena si hausta sint, crebris uomitionibus: si morfu impressa, scarificatione, affixis cucurbitulis, exuctu, carnis circumscriptione, nonnunquam amputatione extremæ partis, euocantur. Retinentur uerò infusione, & imposito medicamentorum acriū cohibentur. hæc simul utiq; arcere uirus, & eluere possunt. Restinguuntur, & euincuntur meraciore potu, aut passo nulla aqua diluto, uel contrariorum esu, quæ acrimonia sint prædita. Postremò deiectione alui, euocatus sudor, & alia quædam in commune, quæ membratim demonstrabimus, auxiliantur. Verum enim 40 uero non lethiferam modò materiam; sed & magnitudinem, & tempus, pro scopo considerare oportet. etenim ab ijs remedia quàm plurimum discrimen capeffunt. A magnitudine quidem, cum nonnulla ex uenenis, & uirosis animalibus pericula minantur: alia putredines altas, aut exteriores excitant: alia vehementissimos dolores, aut cæcos cient: alia uix medicamenti cedunt, & magis minúsve molestias excitant. Oportet autem ea, quæ pericula ferunt, peruiacioribus auxilijs expugnari: & minus infesta, mitioribus. Quippe absurdum fuerit in grauioribus, segnioribus medicamenti homines in discrimen adducere: in minoribus uerò, uehementium auxiliorum iniuria corpus lacessere. Finitio à temporibus in promptu est: hoc enim subito in pericula, & præsentis molestias adducit: illud uerò sensim, & dilatas in diem longam, aut breuiorem producit. Itaq; 50 in acutis quidem cōfestim multa simul auxilia repræsentari oportet: reliquis, paulatim. Hæc quædam artis formula breuiter definita sint. Iam membratim rem prosequamur.

Cum hætenus tradiderit Dioscorides de his priuatim uenenis, quæ epota aut in cibis sumpta, corpora nostra permutant, corrumpunt, destruunt, & deniq; in perniciem agunt, ut hac in re nihil amplius desiderari posset, statuit deinceps de his etiam sibi esse differendum, quæ uirulenta animalia ictu, uel morfu relinquant. Quod utiq; probe sciret, hæc non minora, quàm illa repræsentare discrimina, imò etiam maiora: quandoquidem eueniant hæc ex tempore, & præter opinionem, plerumq; in campestribus, & montibus, ubi nullum auxilium, nullaq; uel rara remedia. Quamobrem de his non minus diligenter disseruat, quàm de alijs, quæ corporibus ingeruntur, argumento satis manifestis, quod uniuersalia horum remedia non una tantum præfatione, sed pluribus scriptitauerit. Quod cum animaduertit recentiorum quidam, haud dubie existimant, hoc sextum uolumen in quatuor libros esse diuidendum, nempe in sextum,

Ratio tractatus de uirulentis animalibus.

Nouus ordo  
huius libri.

in sextum, septimum, octauum, & nonum. Veruntamen ij mihi non rectè (pace semper eruditorum dixerim) ea expendisse uidentur, quæ in huiusce libri præfationis initio à Dioscoride scribuntur: is enim apertissime hunc sextum librum totius operis ultimum declarauit. Quapropter ipse Dioscoridem secutus, relictis aliorum opinionibus, asserere non dubitauerim, hunc uniuersum de uenenis, & uenenatis animalibus tractatū, unum tantum, non plures esse libros: tanetsi pro cuiusq; arbitrio in plures sectiones diuidi possit. Quarum prima ijs dari poterit, quæ ore sumuntur in corpus: secunda canis rabidi morsibus: tertia indicij ac symptomatibus, quæ à uenenatis morsibus oriuntur: postrema uero eorum curationi. Verum enimuero cum hæc diutius examinauerim, ut Dioscoridis doctrina ad maius omnium commodum in unum congeratur, & ne tot huius libri fiant sectiones, uenenosorum animalium tum indicia, tum accidentia, quæ proprijs capitibus tradidit Dioscorides, ijs coniunximus, quibus ipse egit de eorundem curatione, & remedijs, ut unusquisq; unctim nulla temporis iactura, uno tantum capite indicia, accidentia, & curationem consequatur. Quod & ipse fecit Dioscorides, ubi superius de uenenis differuit, quæ in corpus sumuntur. Ibi enim indicia à curationibus non disiunxit. Nam si in uno tractatu indicia, in altero uero curationes quaerantur, maius temporis dispendium fiet, maiorq; menti molestia inferetur, quam si hæc omnia in unum redacta legentibus sese offerant. Neq; hoc nobis uitio adscribendum esse putamus, quando res eò magis placere soleant, quò commodius fieri possunt, cum præterea illud (ut aiunt) frustra fiat per plura, quod fieri potest per pauciora. Neq; etiam ob id quis calumniari poterit, quòd Dioscoridis codicem aliqua ex parte deprauauerim: quòd nusquam à me deprauatum, sed tantum in meliorem formam, & ad priorem authoris doctrinam ipsum redactum, & restitutum putem. Porro non aliud super hac præfatione nobis dicendum uidetur (quæ multis intellectu difficilis extitit, ut Marcellus ipse fatetur, quòd fortasse Dialecticam ignorauerit) nisi quòd aliud sanè hæc præfatio non sit, quam Dioscoridis Aristotelem secuti disceptatio, aduersus eos omnes, qui superficie tenus in medica facultate, super nuda ac simplici uocabulorum interpretatione altercantur, eorumq; præsertim, quæ ex uarijs, ac diuersis uocibus componuntur. Quandoquidem hæc interpretationis uocabulorum distractio, potius ad sophistas, & nugatores attinet, quam ad expertos, & probatos medicos, ut facile uidere est in pluribus irreprehensibilibus uocabulorū exemplis ex pluribus uocibus compositorum, quæ in lib. perihermenias ab Aristotele assignantur. Quippe quoniam nouerat ipse Dioscorides, quòd tam methodicorum, quam dogmaticorum quidam in ipsis compositis uoculis declarandis expertorum, exercitatorumq; medicorum sententiā, proprijs uoculis denominatam, haudquaquam secuti fuerant. Ceterum & eos non parum reprehendit, qui absque aliquo Dialecticæ fundamento, diuisiones in causis facere audent. nam cum in diuisionibus errorem committant, in ijs quoq; quæ sequuntur, errant necesse est. Proinde qui hæc latius uberiusq; noscere cupiunt, Aristotelem consulant libro secundo physicorum: illis siquidem mihi amplissime satisfiet. Potuissimus quidem & nos rem hanc pluribus prosequi: sed cum nostrum institutum non sit, nunc in aliam materiam digredi, hæc silentio prætereunda duximus.

... CANIS RABIOSVS.



Σημεῖα κυνὸς λυσώντος, καὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦ δεδηγμένων. SIGNA RABIOSI CANIS, ET DEMORSORVM AB EO. CAP. XXXVI.

DE RABIOSI canis morfu sermonem alijs præposuimus, quòd id animal domesticum, ac frequens esse consuevit, & in rabiem sæpius agitur, ac perit, ab eoque cauere difficile. inde periculum inuitabile hominem manet, nisi multis utatur auxilijs. Canis plerumque flagrantissimis æstibus in rabiem efferatur: interdum quoties frigora inceserunt. Rabiosus autem porum & escam auersatur: largam spumantemque pituitam naribus, & ore proijcit: toruè & solito tristius intuetur: in omnes passim sine latratu irruit, & æquè feras hominesq; tam familiares, quam ignotos mordet: nec protinus infestum quicquam infligit, nisi, ut vulnus, dolorem: exinde morbus ille, qui ab aquæ metu hydrophobicus Graia est voce appellatus, contrahitur. Euenit autem cum

cum distentione neruorum, totiusque corporis rubore, præsertim faciei, cum sudore, & languore quodam. Aliqui auræ splendorem fugiunt: alij sine vlla doloris intercapedine vexantur. Sunt etiam qui canuin more latratus ædant, & obuiam factos morfu adoriuntur, ac mordēdo simili uitio labefaciunt. Proinde ex ijs, qui hoc uitium senserint, neminem seruatum vidimus, nisi forsitan ex historia vnum aut alterum euasisse audiamus. siquidem Eudemus superasse quendam affirmat. Themisonem aliqui demorsum in hunc furorem incidisse, et euasisse fatentur. Alij ipsum cum amico aquā expauescenti morem gereret, & officium exhiberet, quadam naturarum concordia, similem contraxisse affectum: sed post multos tandem cruciatus seruatum extitisse. Molestissimum itaque genus morbi, à quo multos, anteaquam ipsum experirentur, vindicauimus, & complures  
 10 ab alijs medicis seruatos nouimus.

**N**ULLVM in uniuersum animal homini tam domesticum, familiaremque reperitur, nullumque quod tam multiplici, uarioque genere constet, quam canis. Hinc est, quod uiri, mulieres, ac pueri ijs magis delectantur, quam ceteris animalibus, quæ in domibus nostris aluntur, tanta quidem intercedit canibus cum homine societas. Qui tamen in rabiem acti, quos momorderint, in maximum discrimen plerumque deducunt. Cum itaque canes à continuo hominum consortio nunquam absint, qui propterea illorum moribus magis subiiciuntur, quam ceterorum, quæ morfu pariter, uel ictu uenenum eiaciuntur; ideo merito quidem de his prius, quam de reliquis bestiis uenenatis tradidit Dioscorides. Ceterum quanquam ipse causas non scribit, cur magis æstate Caniculæ ardoribus, uideam hyeme frigorigibus uehementissimis in rabiem aguntur, quam reliquis anni temporibus; cum tamen palam sit, canum rabiem non aliunde prouenire, quam ab atrabiliarijs excrementis, facile cognosci potest, id æstate euenire perusto à caloribus eorum sanguine, hyeme uero frigorigibus concreto. Rabidi canis indicia describit Galenus libro de theriaca ad Pisonem (si tamen liber is Galeni legitimus est) his uerbis. Si audieris canem, qui aliquem momorderit, gracilem corpore, & siccum, oculis rubentibus, cauda demissa, spuma ex ore fluente, præterea lingua foras porrecta, et tanquam bile colorata obuium, quenquam insiliisse, citraque rationem cucurrisse, deinde rursus subito consistentem cum ira quadam magis furenti non ipsi præuisos momordisse, hæc inquam si in eo sic habere audieris, statim rabiosum canem fuisse intelligas. hæc ille. Incedunt præterea (ut quidam asserunt) lento gradu, demissis auribus, abscissa uoce, stupido capite, et obuios non modo homines nullo delectu; sed et bestias demordent. Nec mirum si proprium mordeant dominum, aliosque domesticos omnes, nullius habito discrimine, uel ratione. siquidem cum proprium atræ bilis sit sensus omnes inficere, omnium et sui ipsius obliti, domesticos ipsos cognoscere nequeunt. Id quod etiam pluribus hominibus accidit, qui melancholici effecti, non modo patrem, matrem, uxorem, et proprios filios; sed etiam se ipsos quandoque occiderunt. Verum enim uero non tantum æstiuis caloribus, et hyemis frigore canes in rabiem aguntur, sed etiam morticinarum, putridarum, uermibusque scatentium carniū esu: quin et marcescentis earum sanguinis. Quod si fuerint hæc carnes eorum animalium, quæ pestilentia, aut ictu fulminis, aut uenenosorum moribus interierint, eo facilius maiorique afficiuntur rabie. Quæ etiam excitari solet computrescentibus aquis frequentius ebibitis, quod hæc omnia atrabiliarios succos augeant, et putredine corrumpant. Eoque magis his de causis in rabiem aguntur, quanto alter altero suapte natura magis atræ bili obnoxius fuerit. Aduertant præterea nobiles mulieres, ne suis catellis, quos in delicijs habent, et quibus maxime oblectantur, cibum uel iusculum edendum præbeant, quibus aromata, præsertimque piper et gingiber, fuerint admixta. Quippe cum hæc caliditatis, siccitatisque modum excedant, eadem ratione, qua ingens æstatis feruor, canes rabidos efficiunt. Caueant ideo eas libenter moneo, ne ipsis forte fortuna id mali accadat, quod Tridenti euenisse sci-  
 20 mus clarissimo paulo utriusque legis doctore. Is siquidem inter ludendum cum quodam suo catello iam rabie affecto, leuiter in inferiori labio demorsus fuit. Sed ipse huius rei ignarus quarto post mense rabidus factus, et tandem hydrophobicus miserabiliter mortem obiit, nullo adiutus medicamento. Ad hæc sciendum est, quod non canes tantum (quantum ij magis, quam cetera animalia in rabiem aguntur) rabidi fiunt; sed etiam alia pleraque animalia, nempe uulpes, mustelæ, uiuerræ, martes, simiæ, et id genus alia. Quapropter nesciuerim, quo argumento dixerit Galenus libro sexto de locis affectis, solum canem inter cetera animalia corripit rabie: nisi uoluerit dicere (ut equidem reor) canes ceteris animantibus rabiei magis esse obnoxios. Refert Aristoteles libro octauo de historia animalium, canelos etiam, et equos in rabiem agi. Id quod ego quoque asserere possum: etenim memini, cum ruri degerem, me uidisse equum rabie furentem, qui fracto capistro obuiam quandam uetulam per capitis, et crinium uitam morfu comprehensam, decem pluresque passus à terra suspensam pertulit, nullo tamen uulnere illato, sed magno sanè terrore. Hoc affectu capiuntur (ut Auicenna est author) etiam muli, qui suis aliquando moribus dominos, et stabularios rabidos, et ueluti arrepticios reddiderunt. Verum huiusmodi animalia non nisi raro, uel nunquam per se rabie tentantur: quandoquidem ferè semper id illis eueniat, cum à canibus, seu lupis, aut uulpibus rabidis mordentur. Ceterum (ut ipse Dioscorides inquit) rabiosorum canum morfus infestum quicquam protinus non infligit, nisi, ut uulnus, dolorem. Sed neglecta curatione, demorsi aliquo post tempore rabidi fiunt, et aquam expauescunt. quod etiam fatetur Galenus libro de theriaca ad Pisonem, alijsque in locis. Idcirco diligenter aduertant, qui à canibus mordentur, si aliqua sese offerant indicia, quibus conijci possit, canem, qui momorderit, rabie laborasse. Siquidem neglectis remedijs (ut modo diximus) in id discriminis demorsi adducuntur, ut nullus subinde relinquatur salutis locus. Tradidere Orbasius, Paulus, Aëtius, Auicenna, alijsque probatissimi authores, quod illitis per integram noctem contritis iuglandibus canum moribus, et postmodum gallis, aut gallinis in escam exhibitis, gallinaceos ipsos sequenti die interire, si à rabido cane illation fuerit uulnus. Sunt etiam qui asserant, si panis emanante è uulnere sanguine inficiatur, et cuicumque cani quam-  
 30

Canis rabiosi uenefica natura, & signa.

Canes quibus causis rabie exagitantur.

Animalia alia rabie tentantur.



Neglecti mor-  
sus discrimi-  
na, & causa.

Salutis indi-  
cium.

tumulus fanelico offeratur, canem non modò illum non mandere; sed nec olfacere quidem. Attamen his tantum experientis (meo consilio) non planè fidendum fuerit: quauquam ea à probatissimis prodantur authoribus. quapropter alia indicia iam dicta diligenter fuerint perquirenda. Cum autem rabidorum canum morsus negliguntur, post aliquod temporis spatium demorsi præter morem cogitabundi fiunt, eaq; mente reuoluunt, quæ illis insueta sunt, quod iam ueneni uis in cerebrum repens imaginatricem occupet facultatem. Si uerò adhuc in longum protrahuntur nullis remedijs adiuti, ijs frequentius nocte interruptitur somnus, sæpiusq; pauore expergiscuntur: exinde hominum, & domesticorum consortia uisitant, & cum serino quodam aspectu secum submurmurant: solitudinem deligunt, lucem & candida omnia odere maxime, rubent quandoq; facie, ijsq; extremarum partium nervi conuelluntur: postremo eò deducuntur, ut aquam expauescant. Quod certissimum mortis, & inexpugnabilis ueneni præbet indicium. Proinde dicebat Dioscorides ex ijs, qui hoc uitium senserint, neminem seruari posse. Allata itaq; in eorum conspectu aqua, citius potu facile sanarentur, si tamen bibere possent, ingentissimis clamoribus, & canū latratu astantes terrent. Quod si diutius ante eos aqua ipsa dimittatur, tremunt, sudant, deficiunt animo, delirant, pauoreq; concutiuntur, ac si in ignem illico se proijciendos cernerent. Id uerò accidit, quòd melancholici effecti, corruptis, infectisq; inde animalibus facultatibus, recusant miselli, metuuntq; aquam, qua sola sanari possunt. Nec alia de causa id euenire censent medici, quàm huiusce inexpugnabilis ueneni prauitate. Nam cum humorum omnium, & totius corporis principalium facultatum, functionumq; imperium uenenum ipsum susceperit, cumq; iam omnes corporis dispositiones sibi similes reddiderit, mouentur uniuersi corporis uires, irruuntq; contra id, quod sibi contrarium existimant, hoc est, contra ipsam aquam, si ea in medium offeratur. Quocirca Galenus libro de iheriaca ad Pisonem, ita scribit. Non enim corpus duntaxat ipsis inarescit, & conuellitur interdum, febriq; acri intus uritur, sed animus etiam delirat, & gravissimum ipsis affert symptoma. Quippe aquam timent, ac propter multam siccitatem humidi tenentur desiderio, & à potu abstinunt, quia mente alienati, id quod auxiliari possit, non considerant. Fugientes enim aquam, pauentesq; miserrimo mortis genere intereunt. hætenus Galenus. Hæ itaq; rationabiles sunt causæ, quibus in aque timorem deueniunt. Veruntamen quidam testantur, ut Aëtius, Posidonius, & Rufus, id etiam accidere posse, quòd rabidi canis imaginem uidere in aquis imaginentur, cuius speciem recolentes, protinus ingenti terrore corripuntur. quod quidem nimiam ob siccitatem perpetiuntur. Nam philosophus quidam (ut Aëtius refert) morsus à cane rabido, & egrégia animi uirtute affectioni resistens, dum phantastici canis imago sibi obuersaretur in balneo (ea enim ipsi quoque quemadmodum & reliquis eodem morbo affectis apparebat) diu intra se meditatus, ecquid tandem inquit commune est cani cum balneo: quod effatus balneum intrauit, & imperterritus bibit, atq; ita morbum superauit, & incolumis egressus. Unde postea in proverbium manauit; quid cani cum balneo. Refert Auic. quòd si quis à cane rabido demorsus, aqua timens in speculo respiciens, se ipsum cognouerit, huic salutis spem non deesse. Quod utiq; arguit hydrophobicis quoque sanari posse, cum ueneni uis non adeò uniuersum occupauerit corpus, & cerebri facultates, ut omnino rationatrix facultas ablata sit. Quamobrem mirum non est, si philosophus ille, cuius historiam refert Aëtius, curatus euaserit, cum manifestò appareat eius rationatricem facultatem parum fuisse affectam. Ad hæc scribit Auicenna euenire interdum, ut à cane rabido demorsi quædam frustra carnis ingenti cum dolore mingant, quæ forma prope canes paruulos referant. quod etiam ab alijs recentioribus accepimus, quin & ab ijs, qui huiusmodi catulos se misxisse fatentur. Ceterum cum hoc potius fabulosum, quàm rationi consentaneum uideatur, atq; ab ipsa natura penitus alienum, si qui id uerum esse rationibus, & auctoritatibus comprobatum uidere cupiunt, Gentilem Fulginatam consulant Auicennæ interpretem: item Conciliatorem differentia 179. Quandoquidem ex ijs nimium intelligunt, quo pacto hæc præter naturæ institutum quandoq; eueniant. Postremo asserit in hoc capite Dioscorides sateri aliquos Themisonem, cum amico aquam expauescenti morem gereret, & officium exhiberet, quadam naturarum concordia similem contraxisse affectum. Sed id potius ego euenisse crediderim, quòd Themison medicus amicum laborantem excitandi causa ad aquam, & cibum, secum manducasset, aut bibisset, ex eodem sanè poculo, eius fortasse salua infecto, aut alio quouis modo oris spumam contigisse. Nam si, ut Galenus tradit libro sexto de locis affectis, rabidorum canum salua, nuda corporis membra contingens, non aliter homines rabidos efficit, quàm si demorarentur, quid mirum, si rabidi hominis salua id ipsum effecerit? Proinde eos admonet Auicenna, qui rabidorum curam agunt, ne eorundem ciborum reliquias comedant. Nec paruipendat aliquis spumæ contactu infici posse homines: quippe quòd duos uiderim ego, qui spuma tantum perfusi, nullo quidem ex morsu accepto uulnere, rabiem contraxerunt. Legitur in Aristotele libro VIII. capite XXII. de historia animalium, quòd omnia animalia à cane rabido demorsa rabui, excepto homine. Quæ tamen sententia aperte falsa deprehenditur, ut nullies experimento comperitum est. Quamobrem potius adducor, ut credam Aristotelis codicem eo in loco deprauatum esse, quàm ut in re clara, & omnibus cognita, ipsum Aristotelem ignorantæ accusare uelim.

Θεραπεία τῶν ὑπὸ λυσσῶντος κυνὸς διγμάτων.

REMEDIA DEMORSORVM.

DE CANE RABIOSO. CAP. XXXVII.

RATIO medendi duplex. vna communis, qua utendum in omnes morsus, quos uirulentæ animantes impresserunt: alia peculiaris priuataq; eorum duntaxat quos rabiosi canes momorderint: quæ nonnullis quidem summam opem ferre confuevit: alijs uerò inutilis, maxime qui ex multo iam tempore ictum acceperunt. Quæ ad hanc pertinent, primum exponemus, deinde cursum perstringemus, quæ ad communem medendi rationem pertinent. Cancros itaque fluuiatiles in farmentis

in farmentis albæ uitis cremare oportet, & cinerem eorum, quàm minutissimè tritum habere reconditum: itidem gentianæ radicem tusam, cribratamque reponere. Quoties autem canis rabio-  
sus morsum intulerit, in quaternos cyathos meraci uini, bina cineris cancrorū cochlearia, unumq;  
gentianæ coniiciantur: hæc in polentæ dilutioris modum subacta, quatrinduo bibantur. Inter prin-  
cipia medicamentum hoc modo detur. Atqui si ab illato morsu bini ternive dies fluxerint, cura-  
tionem auspicabimur à triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus. Optimum hoc ad-  
uersus rabiosorum morsus auxilium, quod & plerisque unum satisfecit, eoque cum fiducia uti li-  
cet. Sed ut alijs etiānum auxilijs contra ineuitabile periculum muniamur, nihil cæteris uti pro-  
hibet. Satius autem multò fuerit, etiamsi in uanum recidat, medicamentorum inhumanos tolerare  
10 cruciatus, quàm per inertiam, ac desidiā in discrimen adduci. Nec ita in demorsis à rabioso ani-  
mali maiora vulnera uereri oportet, uti minora, & ulcusculis cutis similia: quippe maiori vulnere  
confertim copiosus sanguis emanans, potest nonnihil uirulenti liquoris exhaurire: quod in mino-  
ribus non accidit. quin à maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scalpelli circun-  
scribere, & prehenfam hamulo aut vulsella carnem amputare oportet. In vtrisque circumstantia lo-  
ca altioribus vlcusculis scarificanda, ut copiosior sanguinis uacuatio arceat, ne uenenum mem-  
bratim insinuetur. Cucurbitulæ cum multa flamma agglutinatæ id iuuamenti præstant, ut uene-  
ni uis extrahatur.

T A M accuratè exquisitèq; tradidit hoc capite Dioscorides rabidi canis curationem, nihil planè silentio præte-  
20 riens, ut mihi superuacuum esse uideatur quicquam addere. Verū ut nostrum sequamur institutum, utq; etiānum le-  
ctoribus fiat satis, qui nouis semper rebus inbiant, non alienum fuerit hic nonnulla commemorare, quæ multos fortas-  
se delectabunt, quod ea in hac re non inutilia, neq; scitu iniucunda putem. In primis itaq; illud animaduertendum est,  
quod alia utiq; ratione cancrorum fluuiatilium cinerem præparabat Galenus, quàm Dioscorides, ut constat aperte ex:  
uerbis ipsius Galeni lib. xi. simp. medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. At fluuiatilium cancrorum cinis, quan-  
quam similiter prædictis exicatorius est; substantiæ tamen totius proprietate, mirificè contra rabiosorum morsorū  
efficax est, isq; tum solus, tum cum gentiana & thure multò præstantior. Thuris sanè partem esse unam oportet,  
quinque autem gentianæ, porro cancrorum decem. Et rarò equidem aliter illis uisus nos sumus usi: ceterum ad eum  
modum plerunque, quo utebatur Aescbriō empiricus, medicamentorum peritissimus senex, conciuis, ac præce-  
ptor meus. Patella erat aris rubri, in quam impositos cancos uiuentes, hætenus urebat, donec in cinerem redi-  
gerentur, ut facile ad laeuorem redigi possent. Hic Aescbriō sic paratum promptum semper in edibus hoc habebat  
30 medicamen, tēpore æstiuo urens cancos ipsos post ortum Canis, quando sol in Leonem transisset, luna decima octa-  
ua. Porro bibendum hoc medicamen ijs, qui à cane rabido fuissent morfi, præbebat quotidie usque ad diem quadrage-  
simum mensura cochlearij satis magni, aquæ inspersum. At si non protinus ab initio, uerū aliquot post dies à morsu  
curam cœpisset demorsus, tunc quotidie duo cochlearia aquæ inspergebat. Ad ipsum uerò uulnus emplasticum applica-  
bat medicamentum, quod ex pice brutia, & opopanace, acetoq; conficitur, habens picis libram unam, unum aceti a-  
cerrimi sextarium Italicum, opopanacis uerò uncias tres. hæc Galenus. Ceterum sciendum est, eos maxime, meo  
iudicio, hallucinari (ut latius libro secundo prodidimus) qui ganmaros Latinis uocatos, cancrorum fluuiatilium lo-  
co, à cane rabido demorsis potui exhibent. Nanque aliud Græcis animal esse censemus καρκίνον, aliud uerò αἰσα-  
κόν, & καμμορίδα. Scripsit & Damocrates carminibus huiusce cancrorū antidoti componendi rationem (ut li-  
bro secundo de antidotis refert Galenus) eo sanè modo, quo ipsum fortasse secutus eam reddit Dioscorides. Attamen  
40 antiquorum quidam refinam terebinthinam imposuerunt thuris uice, quod Aescbriō Galeni præceptor huic semper  
inseruit medicamento. In summa huius antidoti uires miris laudibus ab authoribus celebrantur, adeo ut scripserit Ga-  
lenus, neminem unquam mortuum esse, qui hoc antidoto rectè fuerit usus. His non dissimiles uires ueteres assignant  
Alyssō, si ficcum quadraginta diebus continuè detur ex hydromelite potandum: sed à prima statim die incipiendum  
erit. Huius experimenti meminit Galenus libro secundo de antidotis, ubi alia quoq; ualentiora remedia ad rabidorum  
morsus ex Asclepiade retulit. Verū nobis difficile admodum fuerit decernere, quanam bodie planta sit, quæ uete-  
rum Alysson representet, ita ut potius de hoc diuinandum esset, quàm aliquid certi statuendum, ut latius superius li-  
bro tertio disseruimus. Commendauit Aëtius secundo, & sexto uolumine, ad morsus rabidorum canum bitumen lu-  
daicum, siue Asphaltitis lacus, asserens si drachmæ pondere ex aqua bibatur, non id modò aquæ pauorem arcere; sed  
50 & eos sanare, quos iam priuim timor inuaserit. Memorauit etiā marinos hippocampos ex aceto nigro & melle  
subactos, tam potu hæstos, quàm uulneri illitos. Confert præterea his maxime acutus rumex: quare idem scripsit se  
nouisse senem quendam, qui demorsos à cane rabido hoc solo rumice curabat. Primò enim ulcus eius decocto fovebat:  
deinde herbam ipsam illinebat, eandemq; potandam exhibebat. quod quidem medicamentum tanquam efficacissimum  
summo opere cōmendabat. Plurima autem, & turbulenta qui illam assumpserint, mungere solent: id quod maxime hac  
in curatione confert. Quo fortasse argumento extulit Auicenna propria quedam medicamenta, quæ cantharidas ad-  
mixtas habent, ut ualentissimè non modò urinam excernerent demorsus; sed etiam sanguinem ipsum, asserens paulò post  
securum esse salutis indicium, cum post medicamenta sanguinem mingunt affecti. Porro Galenus libro de theriaca ad  
Pisonem, theriacam præfert tam intus in corpus sumptam, quàm exterius supra morsus illitam. Sed cion hæc, quæ no-  
stro tempore conficitur, non adeo præstet, quemadmodum ea, quam ipse conficiebat Galenus, illi sanè fidere non pos-  
sumus, nisi factò prius de ea periculo in gallis à uipera demorsis, ut ipse docet Galenus. Prodest item potamogetium

Curatio de-  
morsorum à  
cane rabioso.

Multorum  
error.

Curatio ex  
Aëtio.

Remedia su-  
specta.

cum sale exterius illitum : itidem caprifici cortex contusus, & ex aqua potus : quin & absinthium, & allium, minus centaurium, aristolochia, artemisia, scordium, chamædrys, bryonia, pulegium, & laser, tam exterius illita, quam interius sumpta. Sunt qui credant securissimum esse remedium ipsius rabidi canis, qui momorderit, iecur tostum, & a demorsis in cibis deuoratum. quod etiam scribit Dioscorides : quanuis id non affirmauerit, ut libro secundo capite de diuerforum animalium iecinoribus legitur. Proinde scribit Galenus libro 21. simplicium medicamentorum, iecur canis rabientis alijs ualentioribus antidotis admistum quam plurimos sanasse, sed eos tamen interiisse, qui solum nullis alijs adiectis medicamentis illud estarunt. Sunt etiamnum qui credant, ut loco ante citato tradit Dioscorides, arceri aque pauores dente eo, qui caninus dicitur, si is a cane, qui momorderit, exemptus, & folliculo inditus, pro amuleo brachio adnectatur. Sed nemini his fidendum esse persuaferim, ut in nostra huius sexti libri præfatione de pretiosorum lapillorum suspensione diximus : satius enim esse semper existimaui certis ac tutis uti medicamentis. Ceterum curationis summa manuum maxime operam exposcit. Quandoquidem uulnus diducere oportet, laniatamq; per ambitum carnem rescindere : ita enim latior fit ueneni exterius euocandi aditus, demitur quod tabefactum est, & ex sanguinis fluore ab excidentibus cultris excitato, repens affectio non parum reuellitur. Quod etiam facere expedit scalpello circumquaq; profundius adacto, & subinde appositis scalpto loco cucurbitulis sanguinem fortiter extrahentibus, aut hirudinibus. Medicamenta autem, quæ alium citant, & humores deijciunt, in principio omnino uitanda sunt, sicuti etiam sanguinis missio. quippe cum hæc a circumferentijs ad centrum trabendi facultatem habeant, facile egros in mortis traherent discrimen. Tametsi in curationis processu, & ubi præsertim medicorum negligentia citius quam expetat ratio conclusum fuerit uulnus, irrepperitq; uenenum ( ut postea dicetur ) medicamenta alium ducentia, pariterq; sanguinis missio in sanguineis temperaturis admodum quandoque proficiant. Verum enimvero perpauci nostra hac ætate habentur a rabioso cane demorsi, qui medicos consulant. Nam tanta est religionis uis, ut omnes, 20 quos canes rabiosi momorderint, partim ad diui Donini templum confugiant, partim uero ad diui Bellini sacellum, ubi quibusdam exorcismis, & panibus characteribus obsignatis a sacerdotibus perquam facile curantur, ut plurimorum testimonio equidem fateri possum. Sed cogitanti mihi quoniam pacto hoc tam facile eueniat, nonnullæ sese obtulerunt rationes, quas liberè dicam. Haud dubie in primis diuina auxiliatur gratia : quippe cum non parum molestiæ maliq; morsu canis rabiosi affectis inferre possint cacodæmones, ut qui in atrabiliarijs humoribus suam habeant sedem, ij quidem exorcismis cedentes abeunt, & afflictorum corpora munda relinquunt, sublato secum ueneno. Illud præterea addiderim, quod fortasse sacerdotes ipsi aliquod nobis occultum habent antidotum, quod panibus illis admiscentes, ægris deuorandum : uel id aliquo in potu bibendum exhibent. His deniq; accedit magna laborantium fides, quam suscipit Deus optimus maximus, cuius solius munere omnia nostra delentur incommoda, atque omnes auferuntur ægritudines. 30

Auxilium re-  
ligiosum.

Καὶ οὖτος τῶν ὑπὸ λυσσῶντος κυνὸς δειγμάτων. VSTIO DEMORSORVM A CANE  
RABIOSO. CAP. XXXVIII.

CONTRA virulentos ictus, vltio expeditissimum est auxilium, utpote cum ignis cætera viribus præstet, simul quod virus domet, & ferri penitus non patiat : simul quod pars ignem experita, postea non vulgare fundamentum curationi futuræ præbeat, manente diutius exulceratione. An maduertendum ex eo tempore, cum crustæ decident, ne vlceris oræ coalescant, & cicatrice induantur, sed si fieri potest ad multum, idque præstitutum tempus, vlcerationes, & fordidas adhuc & inflammationem minantes prorogari conuenit. Quod inditum ijs salsamentum optimè præstabit, 40 & syluestre allium detritum, ite cepæ, succusve, præsertim Cyrenaicus, aut qui Medicus, aut Parthicus appellatur. Tritici grana tam mæsa, quam non mansa imponantur : siquidem subacta pistave a perfusione vulnere dilatant. Sunt qui a mædentium ieiunio, sibi aliquid asciscere arbitrètur, quod suapte natura resistat : verum id certum non est. cæterum tempestiuus eorum vsus minimè est conueniendus. Si verò, quod perfæpe accidit, ante dies præfinitos cicatrices coirent, cõmitterenturq; manum postulabunt : nanq; eas diducere, carnemque scalpello circinare, aut iterum inurere expedit. Vbi verò propositum tempus præterijt, vlcus ad cicatricem ducendum, & emplastro, quod è salibus conficitur, locus comprehendendus : nec multò post sinapismo vtendum.

Vstionis, siue  
cauterij vili-  
tas.

CAUTERIVM, quod ferro igne candenti, aut auro, aut argento fit, non modò salutiferum est ad rabidi canis morsum : sed etiam aliorum quoruncunq; animalium uirus ei aculantium, quin & ad alios insanabiles ferre morbos. Proinde mirum non est, quod hoc loco dixerit Dioscorides vstionem, siue cauterium contra virulentos ictus aut morsus expeditissimum esse auxilium. Fiat itaq; cauterium intrepidè, tantæq; amplitudinis, ut vlceris cicatrices breuè cõmitti non possint. Quod si timidus quispiam vstionem ignis terrore recuset, septicis & exulcerantibus medicamentis utendum erit. Qua in re cæteris præstat, quod uocant argentum sublimatum. admiscetur id unguentis refrigerantibus, ut minus doloris inferat. Probatur hoc, quod non modò ualentissime inurat : sed quod etiam exusta ab eo caro, obductaq; crusta duobus tantum diebus post decadat, si tamen recenti butyro assidue illinatur. id quod in aliorum exustione non euenit, nisi longiore temporis tractu. Quod si igne, aut adurenti medicamento ( ut multis de causis quandoq; accidit ) id effici nequeat, diligenter prouidendum est, ne uulnus coeat, sed diutius maneat diductum & apertum, superimpositis emplastris ualide attrahentibus, cuiusmodi sunt quæ è brutia picæ, resinis, uario gummi genere, & id genus 50

genus alijs parantur. Si uero cauteria fiant, diligenter procurandum, ut relictâ quàm primùm excidat crusta, quò ueneno pateat exitus. quippe ea diu in uulnere retenta, omnes obducit meatus magno egrorum detrimento. Porro non magno quidem negotio deciderit apposita continuè liquida uernice oui uitello, & recenti butyro permixta: quin & butyro solo igni liquato, & madefactis in eo splenijs superimposito: præstat enim hoc cæteris. Vbi uero è uulnere crusta deciderit, salutarium quidem fuerit remedium plaga quotidie puluerem præcipitati (sic enim uocant chymistæ argentum uiuum in puluerem rubicundum conflatum) inspergere: siquidem id eximium præstantissimumque medicamentum, præter id quòd uulnus occludi prohibet, diuq; patens seruat, attrahit etiânum ex alto ad superficiem potenter uenenum. Quâ in re cætera huiusce facultatis præcellit medicamenta. Commodè etiâ, nec minus efficaciter idem puluis attractorijs emplastris, siue unguentis admisceri, & subinde uulnere admoueri potest. etenim iandudum certior sum, in uniuersa medicæ facultatis materia, nullum haberi medicamentum, quod ualentius ab alto reuocet extrahatq; uirus, quàm præcipitatum dictum. Ad hæc tamen si (ut omnibus ferè placet) in quadragesimum diem apertum uulnus dimittere sit satis; non tamen errauerit, qui diutius prorogauerit, ut quicquid mali residuum fuerit, exhauriatur.

Præcipitati  
vocati uis.

Διάτα τῶν ὑπὸ κυνὸς Λυσῶντος δειχθέντων. RATIO VICTVS IN MORSV  
RABIOSI CANIS. CAP. XXXIX.

Quæ ad partem istam pertinent præsidia, ita se habent. Cæterùm victus rationem ex ijs, quæ ueneno aduersantur, coniectura quadam colligere oportet, simul ut ueneni uires hebetet restin-  
20 guatq;e, simul ut arceat, quò minus ad intima perniciës illabatur. Etenim assumpta perniciosarum virium penetrationi resistunt. Quorum utrunque præstare potest vini meracioris, pasci, & lactis potus. quippe qui hæc omnia capiunt ad curam, nonnihil ueneno obijciunt, quòd omnem eius acrimoniam obrundat. Simili modo alliorum, porrorum, ceparumq;e cibus: quòd ea difficulter conficiantur, vixq;e aboleantur. Nam multos dies huius cibi qualitates remanent, quo tempore nec euincuntur, nec permutantur à mortifera vi, sed contrarijs illa vis expugnatur. Cui rei antidotorum vsus accommodatur, & theriaces, Mithridatij, & eius quod eupatorio temperatur, denique omnium quæ magnam aromatum partem sibi vendicant. quippe aromata omnia viribus & substantijs ægrè permutantur: quare in corporibus euincunt. Victus ratio hoc modo se  
30 habet. Nosse conuenit, pauorem aquæ non statò, definitoq;e tempore exoriri: plurimum tamen ad quadragesimum vsque diem neglectis differri consueuit: post semestrem etiâ nonnullos inuadit: quendam post annum aquam horruisse constat. quæ nobis visu comperta fuere. Narrant & aliquos post septennium aquæ metu fuisse tentatos. Inter principia demorsorum à cane rabiosa curandi ratio talis est. Verùm enim uero si ea quæ retulimus auxilia, primis diebus prætermissa fuerint, nec scalpro carnem circinare, nec vstionem experiri operæpretium est. non enim quod pertransijt, satis euocare possent. Nulla utique istius rei occasio aut utilitas, sed in cassum corpora doloribus sternentur. Alter verò curationis modus accedat. Deiectio magnum præbet iuuamentum, utpote cùm mouendo, corporis habitum transmutet: & quæ colocynthidem recipit hiera. item lac schistum, quod simul deiectionem moueat, & uenenum domare possit. cibi acres, & meraculi potus, quibus vis ueneni vehementer retunditur, quotidie sumi debent. Cæterùm sudores  
40 ante cibos, & post etiâ ciendi. Dropacismi sinapismi que alternatim per corpus totum adijciendi. Sed longè omnium efficacissimum auxilium helleborismus cognoscitur: quo cum fiducia non semel atque iterum, sed frequentius ante quadragesimum diem, vel post hoc tempus uti licet. Tantam enim vehementiam hoc auxilium habere fertur, ut quidam qui iam aquæ metum sentirent, sumpto helleboro, simul ac primum morbi imperum experirentur, fuerint seruati. nam & iam vitio tentatos nemo vnquam seruare potest. Itaque primum curam contra rabiosi canis morsus breui sermone exposuimus. iam ad alia, quæ uenenatis morsibus sèuire consueuerunt, transeundum. Notas vno contextu, deinde communem medendi modum, qui omnibus còuenire possit, explicabimus. Cursum deinceps subiungemus ea, quæ sua proprietate nonnullis auxilium præstare possunt. Postremò subnectentur etiâ uenenata, quæ nullis cedunt remedijs.

50 INSTITVENDA demorsis à cane rabioso diligenter est ratio uictus, nec ea tantùm regula, cuius hic meminit Dioscorides; sed etiâ ut ea sit ciborum quantitas, quæ ijs rectè conueniat. Siquidem huiusce curationis regimen tenuem uictum non expedit, sicuti nec plenior, ut Aëtius est author libro vi. ubi sic inquit. In uictu indigentia, & satietas euitanda, magis tamen indigentia: hæc enim succorum prauitatem adauget, quod nequaquam expedit malefico ulcери. Ergo alimentum moderari oportet, ut & rectè conficiatur, & optimum succum corpori præbeat. Nec minus egestionem, & urinarum prouocationem studendum. quod quidem tum ea, quæ prædiximus, tum scoriculum, & scandix comesta efficiunt. Puls uero simul & aluum, & urinam ducit. ac cicborium agreste crudum oblatum stomacho confert, quem nonnulli serim, nonnulli ab amaritudine picrim appellant. Prosunt & brassicæ cūnæ, & palustris asparagus, & hortensis, & agrestis rumex: & è piscibus qui carnem teneram habent, & cannari, cancri, & erinacei recentes cum uino mulso: & carniū extremitates, auiculæq; omnes montanæ, quæ facili coquuntur, boniq;

Ratio uictus  
demorsis à ca-  
ne rabioso in-  
stituenda.

Aquæ pavor  
ad quod usq;  
tēpus exoriat-  
tur.

Aquæ pavor  
quādo, & qui-  
bus curetur.

sunt succi. Vinum album tenue, neq; ualde antiquum. hæc ille. Ex quibus conijci potest, hac in curatione ea plurimum conferre, quæ urinam ualenter mouent. Idcirco Auicenna (ut proxima commentatione diximus) quedam profert medicamenta, quæ cantharidas excipiunt, ut unā cum lotio sanguis etiam reddatur. Proinde mirum non est, si quandoq; præuolens natura, per instrumentum urinæ, magno cum dolore parua ueluti liquida carnis frusta catulorum forma, uenenum propellat. His itaq; ea uictus ratione uti licebit, quæ urinam ægrè excernentibus à medicis institui solet. Verum si fluuiales cancri, quibus uniuersa abundat Hetruria, haberi poterunt, ijs tam in prandio, quàm in cena uescantur demorfi: quòd ijs mira insit facultas, aduersus rabidorum canum uenenum. Præbet Auicenna præter dulce uinum etiam aquam, in qua candens ferrum, uel chalybs restincta fuerint. Ceterum nosse conuenit (ut scribit Dioscorides) aquæ pauorem non statò definitòq; tempore exoriri: plurimum tamen ad quadragesimum usque diem neglectis differri consuevit: post semestre etiam nonnullos inuadit: quendam post annum aquam horruisse constat. quæ nobis uisu comperta fuere. Narrant & aliquos post septennium aquæ metu fuisse tentatos. Sed cogitanti mihi unde id eueniat, nulla sanè alia hætenus sese obtulit ratio, quàm quæ ex demorsorum temperamento, ac uiribus sumi potest. Quandoquidem nonnulli habentur, qui uiribus ualidissimis præstant: quidam qui debiles, & infirmi sunt: alij qui corporis meatus angustissimos habent, alij uerò contrà: quidam sincerissimis referti sunt humoribus, nonnulli uerò succis ichoribus, scatentibus, ac facillè putredini obnoxij. Ex quo fit, ut in his citius, in illis uerò serius hæc appareant symptomata. In Hetruria abstinent demorfi per integrum annum à quorundā lignorum contactu, præsertim corni arboris, & sanguineæ uirgæ uocatæ. Siquidem (ut testantur ij, qui rem experimento compertam habent) si harum arborum uirgæ tandiu manibus teneantur, quousq; concalescant, illico demorfi rabie exagitantur. Quod cuiquam minimè fabulosum uideri debet: etenim memini me uidisse in ciuitate nostra Illicinensi amicum quendam meam rabie correptum, quòd corni arboris uirgis (dabat enim lamificio operam) lanam diu excussisset, qui eorum oblitus, quibus sibi à medicis interdictum erat, rabidus interiit. Postremò sciendum est, aquæ pauorem haudquaquam curari posse, cum ueneni uis omnes corporis occupauerit facultates: quanuis in ipso pauoris initio, aut antequàm uenenum illapsum fuerit in uniuersum corpus, aliqui curati euaserint, ut philosophus ille, cuius historiam superius enarrauimus. præsertim cum pro uiribus in morbum nituntur malè affecti, & qui eorum curationem agunt. His ad stipulari uidetur Dioscorides: quippe qui quosdam aserit, qui iam aquæ metum sentiebant, sumpto cum fiducia bellaborismo non semel atque iterum, sed frequentius ante quadragesimum diem uel post, fuisse seruatos. Proinde scribit Auicenna eos, qui aquam expauescunt, deploratos non esse, quousq; in speculo intuentes seipsos cognoscunt, arguimento quòd non adhuc uenenum uniuersas infecerit cerebri facultates: Hoc igitur tempore medicamentis utendum est deiectionis, & si nihil obstat, sanguinis missio non aspernanda. Ex medicamentis autem in hoc cæteris præstat album uel nigrum ueratrum, ijs adiectis, quæ eorum infrenant feruorem. Conuenit etiam epithymum, seu, fumaria, myrobalana, elaterium, agaricum, rhubarbarum, centaurium mirus, genista semen, thapsia, confectio Amech, & hiera colocynthidis, & Armenius lapis: siquidem hæc in atra bile deijcienda principem tenent locum. Proderit item Syriacum bitumen frequentius ex aqua potum: quin & Mithridatis antidotum, & ipsa theriaca, & cancrorum fluuatilium combustorum puluis, Galeni modo paratus. Confert præterea his leporis, uulpis, & capreoli coagulum. Sed semper in primis omni studio curandum, ut aquam malè affecti bibant. Verum ne ipsam intuentes pavor inuadat, longissimis tenuibusq; met allicis fistulis è longinquo ducenda erit, aut ex superioribus contabulamentis: namq; ipsa sola seruari poterunt. Refert Aëtius, quòd si catuli coagulum ex aceto semel tantum ederint hydrophobici, statim eos caput potus aquæ cupiditas, & bibunt: ob idq; medicamentum hoc miris laudibus extulit. Sunt qui nigrum cicer aquæ incoquendum esse uelint: sic enim aqua claritatem amittit, nigræq; efficitur: & præter id quòd haurientibus pauorem non adfert, quemadmodum quæ sincera, pellucidæq; spectatur, urinam ualenter ducit. Nec desunt qui suadeant urentia cataplasmata occipiti esse apponenda, pariterq; post aures. Quæ etsi ad rem facere non uideantur, quòd ualentissimè excicent; ubi tamen deplorati sunt ægri, ualentissimis etiam medicamentis uti licebit.

Κοινὰ τῶν ἰοβόλων θεραπεύειν. COMMVNIS CVRATIO IN OMNES ICTVS  
VIRVLENTOS. CAP. XL.

ADVERSVS quidem omnem animalis ictum, quod uenenum vibrat, oris infectio conuenit. Sugentem uerò oportet ieiunum non esse, sed & cibum sumpsisse, & vino os abluisse: postea exiguum olei in ore continens plagam exugat. Locus ipse spongia fouendus, deinde scarificandus: sed vlcuscula altius imprimere expedit, quòd uirosa materies profundo euocetur. Circinatio autem carnis, & sectio, scarificatione longè potentius opitulatur: nanque ab ijs duo peculiaria præsidia fiunt. vnum, quòd uirus è loco tollitur: alterum, quòd eius ueneni pars, quæ ad interiora grassatur, cum multo copiosoq; sanguine excernitur. Quòd si locus sectionem non admittat, cucurbitulæ cum largiori flamma adfigendæ sunt. Sed iam de vitione suprà in rabiosorum morfu disseruimus. Si uerò icta pars, vtpote extrema, eam sectionem commodè non respuat, præsertim in omnibus serpentium ictibus, ut aspidis, cerastæ, similibumq; procul dubio amputanda est. Conuenientiora suprà dictis auxilia sunt, quæ epithemata vocant. Imponatur sarmentitius cinis, aut ficulnus, cum lixiuio stillatio subactus, garo, & acri fassamento: porri, cepæ, & allia modò minutissimè contrita illinuntur, modò cremata vulneribus iniiciuntur. Quinetiam dissecti gallinarum pulli, cum maximè tepent, percusso loco applicentur. Nec desunt qui hisce tanquam discordia quadam na-



dam naturali pugnantibus vtantur: verum huius rationem inire facillimū fuerit. Gallinæ enim calida natura præditæ sunt, argumento, quod deuoratum insigne virus conficiunt, & aridissima quæque semina consumant: item nonnunquam arenas lapillosque ingluuie sua deuoratos, dissolunt. Itaque animantis admoti calore adiutus spiritus, ab ista parte impetum capeffiens exiliensque secum venenum exigit. Nec me fugit, quid in Aegypto fieri soleat. Cum spicas Aegyptij metunt, ollam picis paratam habent, & appensam fasciam: tunc enim maximè serpentium iniurias expauescunt, tum propter spicilegij tempus, tum quod opacis simul abditæ speluncis, & cauernis, densoque aruorum cespite delitescunt. Molestissima enim animalia, & virus eructantia, Aegyptus in campis ferre consuevit. Vbi ergo aut in pedem, aut partem aliam, morsum intulerunt, qui ad  
 20 sunt, fasciam in ollam picis coniiciunt, & semel aut iterum brachium aut crus paulum supra vulnus obligant, & arctissime duo è præsentibus distringunt, locumque secantes qua circumactus est laqueus, picem instillant: cumque satis vulnus excepisse uidetur, laqueum resoluunt, & cepis alijsque supra memoratis illinunt. Præterea pix liquida cum sale trito & feruente illita, præsentaneo est auxilio, si iugiter innouetur. Conuenit & cedria, & simum caprarum ex vino decoctum. Locum aceto calido, calamintha in lotio, maris aqua, aut acida muria decocta, foueri salutare est. Quinetiam non desunt emplastra vehementissima, & calidissima, quæ venenum elicere, expugnare, & discutere possunt. Cuiusmodi sunt quæ ex sale, aut nitro, sinapi, & cachrye componuntur, de quibus consequenter erit tractandum. Erasistratus autem non iniusta reprehensione eos in-  
 26 cessit, qui incognitas ad hunc vsum facultates conscripserunt, vt elephanti fel, crocodilivæ sanguinem, ouaq; testudinis, & consimilia. Nam cum iuuantia quædam literis tradidisse videntur, planè in hæc sola incidentibus imposuerunt. Quare talia deuitanda sunt, cum difficilè, nisi regia facultate, peruestigari possint: neque, quod nostra fides ijs obstringatur, frequenti obseruatione, sufficiens experimentum præstiterint. Quæ autem ad communem omnium vsum pertinent, quæque facillè suppeditari, & omnibus à serpente percussis auxilium ferre queunt, subiungenda videntur. Intubus itaque, & erica, & astragalus, cum aceto pota, contra omnes serpentium morsus auxiliantur. Item bitumen, & virentes platani pilulæ in vino diluto coctæ, & paliuri decoctum: radix aristolochiæ, & eryngij: decoctæ etiam lauri baccæ, & deuorata, piperque largius esitatum, ruta, anethum, & cyclaminus: coma porrorum priuatim ex pane, aut allium, aut cepæ, salsamenta que quàm acerrima: origani decoctum cum vino potum, sceniculi, pulegij, calaminthæ, porrorumque succus cum melle desorptus. hæc quidem à plantis conquiruntur. Ab animantibus verò quædam vtiliter  
 30 peti solent, gallinaceorum cerebella in cibo, leporinum coagulum cum vino, itidem castorei sextans: testes marinæ testudinis sumpti multum prodesse traduntur: mustela sale inueterata inter auxiliaria medicamenta est. Commendatur in primis exenterata, quæ sale siccescens inueteratur: ex qua binas drachmas cum vino bibisse satis est. Sed de simplicibus, quæ dari solent, hæcenus. Percussis à serpente prodest alui deiectio, disfluens sudor, vrina copiosè reddita. Sunt & compositæ quædam potiones, quæ mira remedia polliceri traduntur, vt & opij & myrrhæ singuli oboli, piperis sicilicum: ea melle excipiuntur, & instar Aegyptiæ fabæ dantur cum vino. Itidem syluestris rutæ seminis, gith, cumini Aethiopici, aristolochiæ, galbani, singulorum pares portiones tri-  
 40 tæ, & cum erucæ succo subactæ, digeruntur in pastillos, qui drachmæ pondus æquent. dantur ex ijs terni cyathi cum vino. Hæc habui de communibus auxilijs quæ dicerem. De peculiaribus remedijs contra bestias, quæ venena uibrant, consequenter est dicendum.

VENENOSORVM animalium ictus, morsusque doctrinam, curandique rationem, duabus sectionibus tradidit Dioscorides. In quarum altera cuiuscumque ictus indicia exposuit: in altera uerò curationes diligentissime conscripsit. Ceteram præfationem hanc illi sectioni præposuit, quæ curandi rationem docet: in qua præfatione omnium uirulentorum ictuum curationem in uniuersum profecutus est. Verum quoniam (ut superius diximus in commentatione, quam in caput xxxv. huius libri conscripsimus) rati sumus illud non parum legentii negotium faceffere, quod ex diuersis locis indicia, & curationes conquirantur, ut id molestiæ quisque effugeret, utque citius commodiusque nulla temporis iactura omnia in unum redacta haberentur, ubi prius illa in duobus locis legebantur, nos omnia in unum locum  
 50 congesimus, atque ex duobus capitibus unum tantum fecimus, singulis uirulentorum ictibus sua peculiaria remedia subiicientes. Hanc uerò Dioscoridis præfationem prefiximus, in qua tametsi adeo exactè docteq; tradiderit is uniuersalem uirulentorum omnium animalium ictibus medendi methodum, ut nihil planè addi possit; tamen ne ab instituto nostro defecisse uideamur, in eorum gratiam, qui semper plura proferri expectant, nonnulla modò differam, quæ, ut arbitror, non inutilia, neque scitu iniucunda erunt. Dicam itaque primum animalium, ferarumque uirus, non in omnibus esse idem, sed in hoc uehementissimum, & omnium perniciosissimum, adeo ut una tantum hora hominem conficiat, ut in aspidem, cerastem, & basilisco: in alio uerò minus uehemens minusque lethale, uno uel duobus diebus interimens, ut in uiperam: in alio denique his longè imbecillius, ut in scorpione, & phalangio, longiore tempore necans. Verum quanquam id plerumque euenit, quod animalia quæ mordent, uel icunt, diuersorum sint generum, & proinde diuersa etiam eorum uenena; accidit tamen, ut ab aspidem, uel uiperam demorsi quandoque tribus tantum horis, interdum uno duntaxat die, nonnunquam pluribus diebus superuiuant. Quod à diuersis causis prouenit: siquidem in aspidem, & uiperarum genere longe

Ordinis Dioscoridis immutati ratio.

Venenorum diuersi gradus, & effectus.

nere longè perniciores sunt feminæ quàm mares, iuuenes quàm senes ( quauis non desint, qui contrarium putent) adultæ quàm adolescentes. Quinetiam feræ omnes, & insecta in montibus, & aridis locis inter uepres, & saxa degentes, ips citius hominem perdunt, quàm quæ palustres, uliginosq; tractus incolunt. Citius præterea necant, quæ orientalem, & meridionalem inhabitant plagam, quàm quæ septentrionalem. Ad hæc famelicæ depastis nocentiores sunt, & iritatæ uenenosiores sunt, quàm dimissæ. quauis omnium in uniuersum ictus perniciosiores sint æstate, quàm hyeme. Hæ itaq; causæ esse possunt, cur citius, uel scrius demorsi intereant. Id tamen etiam plerunq; fit ex fortiori, uel imbecilliori demorsorum temperamento, aut uasorum latitudine, uel angustia. quandoquidem ( ut superius pluribus in locis diximus) ueneno non tam facilis patebit aditus, ubi uasa suapte natura angusta fuerint, quàm ubi latiora.

Quorundam  
opi-explosa.

Virulëtorum  
ictuū, uel mor  
suū curatio.

Ceterum errant, Auicennæ testimonio, qui serpentium uenenum frigidum esse statuunt, quòd ab ipsis demorsi illico frigidi fiant, quòdq; serpentes ipsi, ut frigoris impatientes, appetente iam hyeme in subterraneis cauernis latènt, uel sub lapidibus, sub quibus priuatim se condunt uiperæ, ubi nonnunquam adeò frigore correptæ reperiuntur, ut stupide & immobiles reddatæ, tanquam congelatæ persistant. Frigiditas enim toti corpori ex ictu uel morfu adueniens, non utique euenit ex ueneni frigiditate; sed quòd innatus calor ab extremis, & ultimis corporis partibus ad cor se conferat, quòdq; etiam ueneno superetur, & extinguatur. Nec eo argumento frigidi temperamento serpentes sunt iudicandi, quòd scilicet hyeme immobiles, & ferè exanimis suis in cauernis reperiuntur. quippe nulla alia de causa id illis accidit, quàm quòd eorum natura, quæ calidissima est, id maxime refugiat, quòd sibi contrarium sentit. Visitur hoc pariter in piscibus, qui cum frigidi natura sint, quàm primum ex aqua extrahuntur, aëris calore necantur. Quin & uespæ, quæ temperamento calidæ sunt, & siccæ, eadem ratione hyeme consiciuntur, nisi calidissimis recondantur locis. Sed iam ictuum, uel morsuum uirulentorum curationem aggrediamur. In qua Dioscoridem, Paulum, Aëtium, & alios æterni nominis scriptores imitati, dicimus efficacissimum esse remedium, morfu uel ictu illatum uulnus continuè ore sugere ( sugentem tamen prius præparatū esse oportet ) & subinde uenenum, uel uenenatum sanguinem expuere. Veruntamen id opus, meo quidem iudicio, perfici non potest, absq; magno sugentis discrimine. Nam si in aliqua oris parte, aut gingiuarum, linguae, palatq; ulcusculum aliquod fuerit, quanquam adeò insensibile, ut citim tantiam occupet, ubi uenenum in os suctione reuocatum ulceris locum contigerit, & sanguini se admiscuerit, qui forti suctione facile è gingiuis per dentium connexus manat, dubitandum non est, quin illico sugenti perniciem inferat: itaq; fiat, ut qui alteri mederi uelit, sibi ipsi necem parat. Quin nec minus periculi immineret, si uenenate saluæ tantillum in stomachum descenderet. Neq; temerè hæc dicimus. etenim iam nos uidimus ( ut superius in nostra in primam, & uniuersalem huius libri præfationem commentatione retulimus ) rusticum, qui cùm scenum quodam in prato secaret, fortè fortuna falce mediam secuit uiperam: & cùm à trunco, quem manu imprudens sustulerat, in digito morsus esset, os uulnere statim admouit, & uenenatum exuxit sanguinem. quo facto repente mortuus concidit. Proinde scite admonet Aëtius, ut caueant, qui sugunt, ne os habeant ulceratum. Porro ad hæc uitanda discrimina, recentiores galli uel gallinæ sedem plumis exuunt, & uulnere consultissime applicant, & demortuo primo, alterum substituant, idq; tandiu prosequuntur, quousq; uniuersa ueneni uis extrahatur. Cuius rei certum indicium habent, cùm gallus postremo appositus non moritur. Aëtius Dioscoridem secutus, non modò gallinaceos, gallinasq; uiuentes dissectas, & adhuc palpitantes his morfibz commodè applicari tradidit; sed etiam quodlibet uolatilium genus, item iuuenum, tenellorumq; quadrupedum. Dehinc idem iubet, excitatis calidæ aquæ potu uomitibus, ualentiora dari antidota, nempe theriacam, & Mithridatis antidotum. Mirificam uim in hac curatione habent, quantum equidem experientia comperi, quinta nostra essentia, pariterq; oleum de scorpionibus, quorum parandi rationem in præfationis huius libri commentario tradidimus: siquidem his tantum antidotis, imò nonnunquam solo oleo, nonnullos à uiperis demorsos sanauimus, paucis admodum horis, qui cùm nullum uitæ signum præberent, tanquam deplorati iacebant. Nam tanta est horum partium tenuitas, ut momento uniuersum corpus percurrant, & subinde omne superent uenenum. Protulit Aëtius sarmentorum, & ficulnæ cineris uaccæ, quæ è laurinis conficitur lignis. Cuius sententiam magis probandam censuimus, quòd hæc arbor suapte natura polleat aduersus uenena. Vbi uerò ueneni uis continuè reperitur, & non nisi longo tempore euinci possit, est diligenter aduertendum, ne icti unquam die ac noctu dormire sinantur, donec ueneni uis euauerit. quippe quòd somnus ( ut alijs in locis superius dictum est ) uenenum maxime ad cor, & cerebrum ducat, & secum trahat. Multa præter hæc habentur remedia uulnere illinenda, ut calx uiua, oleo & melle subacta. hæc enim ( ut Aëtius est auctor ) omnibus uenenatis morfibz opem fert, præterquam ab affide illatis. Sunt & qui nigri ueratri recentem radicem in uulnus figendam consulant: quòd hæc ( ut equidem me experientia cognouisse fateri possim ) uirus ualentissime extrahat. Quamobrem Tridentina rura cùm iumentum aliquod à serpente igitur, statim perforato ibidem corio, præstantissimo remedio ellebori nigri radices in uulnus inferunt. Prosumt etiam num magno iuuamento cepa, allium, porrum, asphodeli, & dracunculi radix elixa, confusa, & subinde theriaca, aut Mithridatio, & oleo de scorpionibus subacta, & illita. Non secus auxiliantur, iridis, ari, pbi, utriusq; chamæleonis, lilij, bemerocallis, belenij, fœniculi, smyrnij, gladioli, scillæ, spargani, cyclamini, bryoniz, utriusq; raphani, & bulbaceorum omnium radices, concisæ, ac decoctæ, & morfibz illitæ: quæ omnia sæpe à nobis experta sunt. Conferunt præterea bdellium, Syriacum bitumen, pix liquida, castoreum, montanarum caprarum finium, euphorbium, sulphur urinæ admixtum, sal, nitrium, taurinum fel, oleraceæ erucæ, utrunq; laser, galbanum, sagapenum, panacis lacryma, erica, hyssopum, origani omne genus, dictamnium Cretense, & Italicum, calamintha, corozæ omnis, uerberaca, halicacabum, fatiua & agrestis ruta, sonchus tam aspera, quàm leuis, sisymbrium, sinapi, nasturtium, lepidium, iberis, thlaspi, aut in emplastris, aut in fomentis exterius adhibita. Quæ uerò pota, uel deuorata ualentissima censentur, ea omnia erunt, quæ in nostro in huius libri præfationem commentario longiori catalogo recensuimus.

suimus. tametsi prius ad uenenatos ictus præferantur Medica mala, & eorum semen: quoniam & echij, & uicis, & ligustici, & peonie, & hyacinthi: præterea uirides platani pensiles pilule, iuniperi bacce, conyza, chamaedrys, scordium, chamæpitys, echini terrestris caro, gallinaceorum & gallinarum cerebrum, leporis & equi coagulata ex uino potum, marina testudinis sanguis cum cymino, porri succus ex melle, nasturtium, maioris centaurij, gētiāne, albi dictamni, & superior gladioli radix, thlaspi, pulegium, Cretense dictamnium, elichrysi coma, ranae oleo incoctæ, & sale conspersæ, earundem ius, oleo & sale adiectis, & cerui genitale siccum, & in puluerem potum. Mirificum ac singulare remedium præstat illius herbe radix, quam Goritienses, ex eo quod serpentium morsibus celeriter, & efficaciter medeatur, Serpentinam uocant, cuius historiam descripsimus libro secundo in coronopi mentione: hæc siquidem in puluerem ex uino hausta cochlearis mensura, à ueneno quouis serpente demorsos breui tempore sanat: neque ea folium ualet aduersus uirulentos ictus; sed etiam contra epota uenena. Iis fere uiribus pollent (ut quidam recentiores faciunt) flosculi illi syluestres roseo colore micantes, quos nonnulli syluestres garophylos uocant.

Porro Galenus libro de theriaca ad Pisonem, ceteris antidotis tam simplicibus, quam compositis ad uirulentorum morsus Andromachi theriacam prætulit his uerbis. Theriaca est procul dubio apud uniuersos homines celebratissimum antidotum, tum quod pollicito neminem frustretur, tum ob ipsius actionis efficaciam. Siquidem nullam unquam à feris, quæ hominem solent interinere, commorsum, hac statim epota periisse memorie est proditum. Nullus eadem præsumpta baud multo post morfu impetitus, belluæ ueneno ceu illam superante interijt. Quod subinde nonnulli prætores etiam, penes quos uita, & necis potestas est, experiuntur: atque medicamentum probare uolentes, an quod promittat præstare quoque possit, in omnibus iam ob praua quedam, & illegitima facinora ad mortem iudicatis, de ipsa faciunt experimentum. Nos autem cum in hominibus id non possumus, in alijs quibusdam animantibus idem facientes,

ueram medicamenti probationem inuenire conemur. Namque gallis, qui domi non enutriti, neque nobis sunt contubernales, sed potius agrestibus, & sterciore præditi temperamento, captis, feræ obijcimus, & qui inter illos non biberint ex medicamento, protinus intereunt: qui uero biberint, conualescunt, & à morfu uitam retinent. Interdum uero medicamentum adulteratum sit, hoc quoque modo probare conuenit. Si epota theriaca, non purgetur, qui purgans sumpsit medicamentum, hoc ipso iudicamus antidotum esse præstantissimum, quoniam purgationem, ei qui medicamento usus sit purgante, impeditur, ut tali experimento à ueri medicaminis inuentione nunquam aberrauerimus. hæc Galenus. Cuius nimirum etate qui prætorum in facinorosos exercebant iudicium, facile probare poterant num theriaca probata esset facultatis, an adulterina. Namque pluribus in locis qui ob sua facinora mortis supplicio, damnabantur, non semper capite, aut laqueo, aut quouis alio poenæ genere necabantur, prout leges statuebant: sed sæpius in theatrum ducti, ut mitiori supplicio è medio tollerentur, aspidibus, & uiperis offerebantur demordendi.

Huius rei testis est Galenus eodem libro ad Pisonem, ubi post enarrationem Cleopatræ interitum sic inquit. Pluries in magna Alexandria sum contemplatus, quam celeriter aspides homines perimant. Cum enim aliquem hac poenæ lege damnatum, humaniter, citoque uolunt occidere, adijciant ipsius pectori feram, iubentesque paululum ambulare, ita sine mora hominem tollunt è medio. Probanda igitur fuerit theriaca, præsertim quæ sit hoc tempore, antequam ematur, uel alicui propinetur, in gallis agrestibus à feris sæpius enarratis demorsis, ut docet Galenus, aut in alio quouis animali: etenim in simijs (ut opinor) tutius & certius id experiri possent, quod simiæ magis ceteris hominem referant. Narrant quidam antiquitus fuisse gentes in pluribus orbis partibus, quæ suapte natura cum serpentibus degabant, tractabantque manibus, nullo unquam ab his morfu accepto. Cuius rei testis est Plinius libro VII. capite II. ubi ita scriptum reliquit. Crates Pergamenus in Hellesponto circa Parium genus hominum fuisse tradit, quos Ophiogenes uocat, serpentum ictus contactu leuare solitos, & manu imposita uenena extrahere corpori. Varro etiam nunc

esse paucos ibi, quorum saluæ contra ictus serpentum medeantur. Similis et in Aphrica genus Psyllorum fuit, ut Agatharchides scribit, à Psyllo rege dicta. Horum corpori ingentium fuit uirus exitiale serpentibus, ex cuius odore sopirent eas. Mos uero liberos genitos protinus obijcendi se uisissimis earum. eoque genere pudicitiam coniugum experient di, non profugientibus adulterino sanguine natos serpentibus. Hæc gens ipsa quidem propè interemptione sublata est à Nassomonibus, qui nunc eas tenent sedes. Genus tamen hominum ex his, qui profugerant, aut cum pugnatum est, abfuerant, bodieque remanet in paucis. Simile & in Italia Marforum gente durat, quos à Circes filio ortos ferunt, & ideo inesse ijs uim naturalem eam. hæc Plinius. Veruntamen, ut auctor est Galenus libro de theriaca ad Pisonem, Marfi qui suo tempore extabant, contra serpentum uenena nullam utique propriam habebant facultatem: sed fraude quadam uniuersam decipiebant plebeculam. Ipse enim loco citato ita scribit. Circulatores hi nunquam congruo tempore uiperas uenantur, sed multo post uernationem, cum non amplius uigent. Captas autem ipsas crebro sibi ipsis as-

sues faciunt, & cibus non solitis enutriunt, imò carnes ipsis permittentes, & continue mordere cogentes, ut uirus ex earum ore uacuetur efficiunt. quinetiam maxas quasdam obijciunt, quæ dentium foramina obstruant. Atque hac ratione morsus sunt imbecilles, ut uidentibus magnum sit miraculum, talis ipsorum ad fraudem parandam artificij imperitis. hæc Galenus. Ceterum id fraudis doliue genus, nostro etiam tempore locum habet, in his præsertim circulatoribus, & circumsoraneis, qui ex diui Pauli stirpe (quod tamen plane mentiuntur) se prognatos prædicant. Quippe quod fere omnes Apuli sint ex Leccia urbe oriundi, aut ex circumstantibus locis. quanquam facile possint originem duxisse à Marfis eorum uicinis, qui sexcentis, aut fortasse millenis annis ante diuam Paulum existerent. Cauendam igitur fuerit ab eorum nugis: nam quicquid loquuntur, pollicenturque, id omne fraudulentè, & dolose agunt. Capiunt enim uiperas abeunte iam hyeme, & ut magis ab earum morsibus se tuteantur, manus sibi perquam diligenter inungunt quodam unguento hac in uenatione ab ipsis experto. Unguentum illud conficitur ex oleo syluestris raphani semine expresso, dracunculi radice, & aspidodoli succo, leporis cerebro, sabine folijs, lauri baccis, & alijs quibusdam ad-

Theriaca laudibus à Galeno celebrata.

Gentes tute à serpentibus, eorumque ictibus medentes.

Fraus circumsoraneorum, qui diui Pauli stirpem mentiuntur.

Vnguentum  
Nicandri.

Curatio secu-  
dum quendam  
eremitam.

ditis. Affirmant eo unguento perunctos à serpentibus ici non posse. Quod ego facile crediderim, cùm etiam apud  
Nicandrum in theriacis unguentum repererim, quo qui fuerit perunctus, à feris ici non possit. Nicandri uerba subi-  
ciam, quæ soluta oratione ita redduntur. Quod si in triujs mista reptilia iam recens generantia sese, et rem secum  
habentia, in ollam mittas, repones aduersum perniciosas noxas remedium. Inicies autem in ollam illam cerebri, seu  
medullæ cerui recens cæsi drachmas triginta: cotylas quatuor rosacci, cuius primam, median, et tertiam expressio-  
nem unguentarij præcipuas, et solas numerant. Olei splendentis crudi totidem cotylas infunde, et cotylam cere-  
uinam, atq; hæc in rotundo uase celeriter calefacito, donec liquefactæ serpentium squamæ mollescant. postea arte pe-  
ratan molam recipies, et hæc omnia in unum mista turbabis, teresq; cum serpentibus. Longè autem spinas separa:  
quandoquidè maleficum illis uenenum adbereat. Omnia porrò membra ex hoc unguento inunge, tumq; uel in quomuis  
uiam, uel grabatum etiam te tutò conferes, uel cùm arentis æstatis tempore ad aræ opera cinctus, tridentibus pro-  
fundum manipulatorum aceruum disquisiueris. hæc ille. Capiunt igitur qui Marfos se faciunt, uiperas, aliudq; quod-  
uis serpentium genus hoc modo: captisq; statim caput salua persundunt, cuius contactu non parum ualescunt, et ue-  
neni feritatem deponunt, quod hominis salua facultate sit illis prorsus contraria. Cùm autem in foro, ut miraculo-  
sum de se spectaculum præbeant, ab his nullo ueneni incommodo demordi se facere uolunt, oblato prius illis duræ car-  
nis frusto, id dentibus dilaniare cogunt, ut uirius, quod prope dentes quosdam uesciculis continetur, in mansam effunde-  
tur carnem. Non desunt tamen qui etiam uesciculas illas forcipibus abscindant, ne amplius ueneno repleantur. Itaque  
hæc fraude uniuersam gentem decipiunt. Verim pulcherrime horum fraus quandoq; detegitur, cùm simul in eodem  
foro plures eiusdem prauj generis homines contendunt, ut alter alteri primum locum præcipiat, et summam apud  
populum auctoritatem consequatur. Nam ij, ut quisq; se legitime ex diui Pauli familia ortum ostendat, uiperis, qui-  
bus uenenum exemptum non sit, seimicem dilacerant, præsumptis tamen suis fallacibus antidotis: quibus tandem fru-  
strati, à ueneno uicti relictis uexillis, tanquam moribundi, suis e pulpitis in terram cadunt. Et certè nisi statim periti  
medici illis opem ferrent, mortem sepe immaturam oppeterent: licet etiam interdum occumbant, et animam caco-  
dæmonibus, corpora uerò suis serpentibus deuoranda relinquunt. Equidem memini, cùm essem Perusijs, me duos hu-  
iusce generis circumforaneos uidisse in foro, qui in tribus corporis partibus à uiperis demorsi erant: et ij sanè ambo  
periissent, nisi Carauitus ille Bononiensis chirurgicus, et præceptor meus, oleo nostro de scorpionibus eos inunxisset:  
nec suus illis profuisset lapis, quem uendunt, et omnibus præferunt, aduersus omnia uenena. Quemadmodum idem  
non profuit ijs, qui Tridenti inuicem in foro demorsi, et ueluti mortui in hospitium delati, prædicto oleo sanitati re-  
stitui fuere, magno quidem amborum discrimine, ac dedecore. Sunt qui dicant eum lapidem, uel potius terræ obsigna-  
tam à Melite insula allatam, quam omnibus præponunt antidotis, uim omnino aduersus serpentium uenena efficacem  
habere, quemadmodum et ea, quæ à Lemno insula Lemnia uocatur: Veruntamen ubi ab aspidē, uel uipera quis fue-  
rit demorsus, parum uel nihil proficit. quamobrem credendum minime fuerit, panem uel uinum, quibus suas ijs ad-  
murmurant cantilenas, eos qui sumpserint, tutos à serpentibus, et alijs id genus uenenum eiacularibus, ad integrum  
usq; annum seruare posse. Quandoquidem nouimus nos, qui hoc pane deuorato se tutos à serpentibus existimantes,  
serpentium uenerationi se dedere: sed ab ijs tandem demorsi huius admurmurati panis opinione falsi interiere. Non  
tamen eam inficias, quin aliqui reperiantur, quibus quædam ea à cælo facultas tributa est, ut à serpentibus non mor-  
deantur. Siquidem noui ego plures, qui simpliciter, nulloq; artificio aut uerbis aspidēs, et uiperas quotidie capiebāt,  
nec unquam ab ijs icti fuere. quauis serpentes ab ijs modo pedibus calcati, modo manibus compressi fuerint, ac diu-  
tius in nudo eorum sinu gestati. Neq; præterea negauerim, serpentes non posse carminibus, et incantationibus com-  
pelli, quod plurimis id constet experimentis. Ceterum, ut nihil quod ad curationem ictuum uirulentorum facere  
possit, à nobis prætermittatur, qui omnia quæ scimus, ingenuè docemus, non uerebor prodere memoriæ (etsi id sciam  
ad medicos non spectare, neq; ab ipsis recipi) quoniam pacto in Romano agro senex quidam eremita amicus meus, à  
feris ictos sanabat, ipsis absentibus ægris. Cùm enim quis è circumstantibus populis à serpente demordebatur, id per-  
nuncium eremite significabant: tum is interrogabat nuncium, an medicamentum icti loco bibere uellet. Quod si id  
se facturum respondebat, iubebat ille, ut dextrum pedem calceo denudatum solo sisteret, et cultello totius pedis uesti-  
gio lineam circunducebat: deinde iubebat pedem auferri, et intra spatium liuæ signatæ cultelli cuspide hæc uerba in-  
scribebat: CARO CARYZE, SANVM REDVCE, REPVTA SANVM, EMANVEL PAS-  
RACLETVS. mox terram eodem gladio abrahebat, ita ut omnes abolerentur characteres: abrasum puluerem fi-  
atili quodam paruo aqua pleno excipiebat, ibiq; tantisper dimittebat, donec terra subsideret: demum nuncij interula  
aquam percolabat, et cruce signatam illi bibendam præbebat. Sed certè mirum est, quod eadem hora ictus sanaba-  
tur, qua nuncius potionem illam sumpserat, ut mihi planè compertum est, et omnibus illius regionis incolis. Hæc est  
curatio in uirulentos ictus, qua utebatur ille eremita. qui mihi sæpius dixit, hoc esse maius secretum, efficaciusq; reme-  
dium, quod habeant ij, qui suam originem in diui Pauli familiam falso referunt.

ΣΦΗΚΕΣ, ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΑΙ. VESPAE, ET. APES. CAP. XLI.

INTER ferientium venenatorum notas, nihil de vespis, & apibus articulatim digessimus, quod  
conspicue omnibus sint, & nihil excellens, aut notatu dignum in his obseruetur: inter remedia ta-  
men carum meminisse non fuit alienum. Igitur aduersus vtrarumque ictus prodest illita malua, &  
hordeacea farina cum aceto, ficulneum lac in vulnus instillatū, & muria, aut aquæ marinæ fots.

ET SI uestparum, & apum ictus nemini unquam attulerit necem; cum tamen dolores molestissimi inde quandoque oriantur, non alienum, neque inutile fuerit ea nosse medicamenta, quibus facile iisdem mulceri possint. Quamobrem iam dictis à Dioscoride remedijs ea addenda duximus, quæ priuatim scribit Aëtius lib. xiii. sic inquit. Si quis ab apibus, & uestpis illesus permanere uelit, cum malua folia cum oleo illita, & eruca, siue bruchus cum oleo illitus asseruabunt. Quandoquidem uerò quidam ab his clanculum percussi, ob dolorem perturbantur, putantq; se à maligno aliquo animante petitos esse, necessarium existimo prius ostendere quæ signa horum ictus comitentur. Hos itaq; qui ab apibus punguntur, dolor ictus consequitur, & rubor loci, cum tumore partium in ambitu sitarum: stimulus autem omnino in percusso loco reperietur. Eadem etiam hos, quos uestpa pupugit, concomitantur, sed intensiora: uerim stimulus uestpæ in percusso loco non relinquit. Auxilium autem utriq; ferunt luto, aut stercore bubulo eis illito cum posca: aut malua folijs impositis cum posca: aut camolia cum malua & posca: aut sesamo cum posca. Naturaliter autem opitulatur ueneranda, & uiuifica strombi conchylij imago in sigillo ferreo exculpta, & loco ictus appressa: non enim permittit amplius inflammationem generari. In potu præterea ipsis foliorum lauri tenerorum drachmas duas cum uino austero præbeto. hæc Aëtius. Ceterum compertum est, dolorem statim sedari illitis muscis prius contritis. Id quod similiter præstant thymbra, melissophyllum, & sisymbrium.

Vesparum, & apum ictus, & remedia.

## Φαλαγγία. PHALANGIA.

## CAP. XLII.

DEMORSIS à phalangijs locus quidem ipse, quasi ab impacto aculeo ruber, non intumescens, nec per ambitum calidus est, sed mediocriter humescit: ubi uerò contrariorum occursum refrixit, consequitur corpore toto tremor, distentiones poplitum, & inguinum, conuulsionibus non dissimiles. in lumbis collectio exoritur, & perpetua urinae libido lacepsit, multa que reddendis excrementis colluctatio. vniuersa cute frigidus sudor emanat, collacrymant oculi, offusis que nebulis caligant. Horum ictibus ficulneum cinerem adiecto sale trito, & uino imponere oportet: aut radicem syluestris punice quam tenuissimè tritam: aut aristolochiam cum hordei farina, & aceto subactam. Ulcera aquæ maris proluenda, aut apiastri decocto, foliaque eiusdem illinenda: Laxuacris perpetim utendum, & propinandum abrotoni semen, anisum, aristolochiam, cicer syluestre, cinnum Aethiopicum, cedrides tritas, platani corticem, & trifoliæ herbæ semen: priuatim autem, singulorum ex ijs binas drachmas dare cum uini hemina conuenit. item myricæ fructus, & chamæpityos, & viridium cupressi pilularum decoctum, admisto uino. Sunt qui fluuiatilis cancri expressi succum cum lacte, assumpto apij semine, confestim molestijs liberare prodant.

PHALANGIORVM genera quanquam plura à ueteribus describuntur, tamen Aëtio libro xiii. capite xviii. sex tantum numerantur, his uerbis. In phalangiorum genere primum quidem rhagium, alterum lupum, tertium formicarium, quartum cranocolaptes, quintum sclerocephalum, sextum scolecium appellant. Ac primum quidem Rhagium, id est, acineum, figura rotundum est, colore uerò nigrum, acini uerò nigra similitudine, unde etiam appellationem accepit: & eos quidem iuxta medium uentrem habet, pedes uerò ex utraque parte: quam breuissimos. Alterum uerò Lupus appellatum, muscas perdit, eisq; paschitur: ac corpus quidem habet latum, & uolubile, partes uerò circa collum ipsius incisæ sunt: amplius autem & os eius eminentias tres habet. Tertium autem Myrmecium, hoc est, formicarium dictum, formicæ maximè assimilatur, colore fuliginoso: corpus uerò eius uelut astris quibusdam insignitum est, maximè circa dorsum. Quartum deinde Cranocolaptes, sublongum est, & uiride stimulusq; iuxta collum habet, atq; si in quem irruat, locos circa caput petit. Quintum Sclerocephalum dictum, caput habet saxæ, & obduratum: lineamenta uerò per omne corpus similia animalibus illis, quæ circumuolitant noctu lucernas. Sextum autem Scolecium siue uermicarium appellatum, sublongum est, & submaculosum, maximè circa caput. Atque hæc quidem species phalangiorum enumerantur. hæcenus Aëtius. Qui tamen cuiuscunque phalangij notas, & indicia seorsum non descripsit (genus enim diuersum diuersa quoq; parit symptomata) sed omnia in commune simul collegit.

Phalagiorum genera ex Aëtio.

Quamobrem si particulatim cuiusque phalangij indicia per se scire cupimus, Nicandrum consulamus. Is siquidem in theriacis præter id quod plura, quam fecerit Aëtius, phalangiorum genera reddit, singulorum etiam priuatim indicia describit suis uerbis, qui ita paraphrastice in Latinum uertuntur. Opera iam nunc noxij considera phalangis, signaq; eius morsus. Primus itaq; splendidus Rhox appellatur, niger planè, accumulatis pedibus prorepens, in eadem uentrem ore, & dentibus septum habens. Cui ab hoc inflatum fuerit uulnus, perinde corpore apparet atque si nihil quicquam fauciat foret: oculi uerò inferiori parte rubescunt, frigus iuxta in corpore adheret, insigitur, statimq; color, & membra hominis à supernis ad ima uergere uidentur: neque penis semine uiduus demittitur, sed lumbos occupans ita frigus genuum nexus dissoluit. Asterion iam secundum obserua, in cuius dorso pinguis quedam res lucent, ac lucide in corpore uirgulæ. Percussus ab hoc inexpectatus horror cum flamine quodam adoritur, caput uerò somnus grauat, genuum & membrorum nexus, & imbecillitas fit. Cyaneum aliud sublime; crinitum, & asperum æqualiter est. Difficilem corpori infert illud puncturam, quodcunque labefactauerit, corq; graui languore succumbit. Nox & caligo tempora circumstant, uomitumq; edit è collo lubricum, ab araneis telis non multum distantem, adeoq; tandem interitum subministrat. Ab hoc alius est Agrostes, qui specie sua lupo similis est, muscarum incertemtori, qui apum obseruator est, culicum qui psenes dicuntur, & æstrorum, & omnium quæ ad telam ipsius perueniunt. Hic imbellè plagam, & uanu uulnus homini infligit. Quod autem Dysderi, siue stibecum appellant, rutilum satis,

Phalang. genera, & morsus notæ ex Nicandro.



Phalagiorum  
ictuum signa,  
& curatio ex  
Aëtio.

satis, uespere crudis uescenti persimile. Hic si quempiam uulnerarit, ingens est uulnere tumor erigitur: morbi etiam quidam ad genua, alias etiam neruorum cordis, & uenarum languentium trepidatio, alias uirium destitutio, ut percussus saepius domet, atque interinat. Extremi maleficij animal, somnum asferens, qui hominem quiescere ab huius seculi laboribus faciat. Est praeterea Formicarium dictum, quod formicis plane simile sit, collo quidem rutilum, reliquum corpus nigredini ex putredine factae, par est, undique latum stellatum dorsum punctis; distinctum gerens, cui subcinericium tempus ad modicam ceruicem attollitur. Atque ex hoc phalangio dolores priorum similes uenenatorum ueniunt. Sunt & alia parua phalangia scarabaei similia, quae in agris inter legumina sua carpunt pascua. Horum circa cruciantem morsum tubercula, & pustulae exurgunt, cor oberrans furit, lingua incondite obmurmurat, oculi etiam subuertuntur. Educatur in Aegypto in perseae folijs, quem Cranocolapten dicunt, phalangia similis, quae circum lucernas cum impetu uolat nocte. Eius horribile semper caput incessanter nutat, uterus autem grauiatur. Hic ubi cupiam stimulum infixit, quem ceruice tenuis gerit, facile sane citra omnem laborem ad interitum ducit. haec Nicander. A quo tamen in hoc dissentit Aëtius, quod sclerocephalum ijs simile fecerit bestiis, quae noctu lucernas circumuolitant, Nicander uero hanc cranocolapten comparauerit. Sed iam ea prosequamur, quae de phalangiorum ictibus tradidit Aëtius, qui loco superius citato sic habet. Quae percussos a phalangijs concomitantur, communia sunt iuxta magnitudinem, & paruitatem discreta. Morsus porro tenuis est, ut uix conspici possit: tumor autem liuidus, quibusdam etiam rubicundus: frigiditas adest circa genua, lumbos, & scapulas, nonnunquam uero totum corpus aggrauatur. amplius & dolor asiduus adest, tremor, pallor, uigiliae. Quibusdam uero pudendi tentigo, & circa caput pruritus, aliquando etiam circa suras: oculi humecti, & lacrymantes, ac caui, & uenter inequaliter eleuatur. Intumescit autem uniuersum corpus, faciesque, & maxime circa linguam partes, adeo ut impedito sermone balbutiant demorsis. Quibusdam uero urinae emittendae difficultas adest, cum pudendi tentigine, & dolore. Si uero minxerint, aquosae ipsorum sunt urinae, quaedam aranearum telis similia in se habentes, & uomitus quoque similis. aliquando uero & per uomitum, & per uentrem talia excernuntur. Ceterum in calidam aquam demissi, dolore leuati sibi uidentur: post uero est balneo egredientibus, intentum dolet pudendum. Senioribus uero pudendum plurimum laxatur, ac minime intenditur. Atque haec quidem communiter ad omnium ictus sequuntur. Si uero cranocolaptes aliquem percusserit, caput magis dolet, & uertigines consequuntur, frigus continens, delirium, corporis iactatio, & uentriculi perturbationes. Omnes autem a phalangijs percussi uiuantur asiduus balneis: ictus etiam locus ex trifolij bituminosi decocto, cum oleo proluatur, totum uero corpus ex cerato liquidissimo pinguescat. uiuantur etiam fomento spongiarum in calido aceto tinctarum, & plaga continue adhibitarum. Cataplasmata autem eis conueniunt: bulbi, sanguinaria, porrum, furfures aceto incocti, hordeacea farina incoctis cum ea in uino aut melle lauri folijs, ruta, grossi, caprinum stercus cum uino, amaracus cum aceto, syluestris ruta cum aceto, & cyperus. haec Aëtius. Ceterum Dioscorides uarijs in locis huius totius operis de medica materia plura alia medicamenta intus in corpus sumenda aduersus phalangiorum morsus commemorauit, praeter ea quae hoc capite speciatim retulit. Ea autem sunt, si summam colligantur, myrti baccarum succus ex uino potus, succus item foliorum mori cyathi mensura, lixiuum est fici uel caprifici cinere paratum, asparagi radicum decoctum, agrestis laetuea, coris semen, hederae succus ex aceto potus, ruta ex uino hausta, hieracium, dauci semen, melanthium drachmae pondere ex aqua potum, aparine, melissophyllum, & phalangium herba ex uino pota, pentaphyllum, hyacinthi radix, & sedum minus. Quae uero ad idem exterius illinenda commendauit, haec sunt, nullus piscis dissectus, maluae decoctum, aqua marina, & marinorum iuncorum ternella folia. Nec desunt composita medicamenta ab authoribus tradita. quae si quis uidere & habere cupit, Galenum consulat libro secundo de antidotis, ubi ualentissima describuntur antidota ad phalangiorum ictus, & pluribus ueterum clarissimorum medicorum monumentis excerpta. In summa tamen legitima theriaca, & Mithridatum contra phalangiorum uenenum ceteris praestantiora censentur. Sunt etiamnum in phalangiorum genere recensende, quae nobis in Hetruria TARANTULAE uocantur. Quarum historiam, & admiranda symptomata superius libro secundo abunde retulimus, cum de phalangijs differeremus. Quinetiam inibi docuimus, quo modo ab ijs ictu curentur muscis instrumentis, ductisque quam longissimis tripudijs. quare eo se conferre poterunt, qui haec scire desiderant.

Tarantulae uenenum, & remedia uide libro II.

### Σκολόπενδρα. SCOLOPENDRA.

### CAP. XLIII.

SI SCOLOPENDRA, aut dicta ophioctene, morsum intulit, locus per ambitum liuore suffragillatur, & computrescit: interdumque, licet raro, faeculentus, atque ruber cernitur. A morsu ipso exulcerari locus incipit, vlcusque id negotium exhibet, ferè remedijs inuictum: praeterea toto corpore prurigo sentitur. Haec ubi morsum infixit, sal quam leuissimè tritus, ex aceto vulnere inspargendus, aut ruta syluestris superponenda. Locus acida muria fouendus, & danda in poru aristolochia cum uino, aut serpyllum, aut calamintha, aut ruta syluestris.

Scolopendre uenenosae consideratio.

TERRESTRES Scolopendras Hetrusci centipedas uocant. Sunt enim in Hetruria omnibus uulgaris notitiae uermes, innumeris utrinque pedibus refertae, colore subrufo: diuerso quoque genere constant. Ceterum ea tantum ictu uenenum relinquunt, quae quod morsu serpentes interficiant, ophioctene appellantur, quarum tantum exsistimus hoc loco meminisse Dioscoridem. Veruntamen quae in uniuerso genere exsint, haec compertum non habeo. Quibusdam in regionibus tanta copia increuere scolopendreae, ut fugatae ab eis populi, proprios deseruerint lares. quod Arrietis contigisse scribit Theophrastus. Progreditur scolopendra tam in anteriorem, quam in posteriorem partem.

partem. Idcirco scribit Aristoteles libro IIII. capite VII. de historia animalium, quod dissecta Scolopendra altera parte in caput, altera in caudam mouetur, & serpit. Vnde uidetur existimasse Nicander, hanc bicipitem esse, ut eius uerba in theriacis innuunt, cum inquit. Modicâq; pempredon, bicepsq; scolopendra. Cuius euntis alæ, ut remi nauis, fistinant. Non inepta quidem Nicandri comparatio: nam scolopendra pedum multitudine uelociq; motu triremem representant. Harum moribus (ut Dioscorides ait) auxiliantur aspidodeli semen, et flores ex uino poti. Quinetiâ (ut scribit Aëtius) ea omnia scolopendræ ictibus medentur, quæ pruatim muris aranei moribus conueniunt, de quorum curatione paulo inferius dicemus. Præferunt antiquorum nonnulli cinerem aceto subactum, & uulnere illitum, item scillam: præterea pulegium, rutam, & mentham ex uino potam. De marinis Scolopendris tradidimus superius libro secundo. Nec tamen mihi compertum est, aliam noxam ab ijs inferri, quam ingentem pruritus ijs tantum

Scolopendræ  
morsus reme-  
dia.

20 partibus, quibus inheferunt (ut scribit Aristoteles, & Dioscorides) earum erucarum more, quæ pilis horrent, & quæ præsertim in pinu uitam agunt.

## Σκορπίος. SCORPIO.

## CAP. XLIIII.

SCORPIONIS morfu inflammari statim incipit locus, & indurefcit, ac intensus rubet, vicissimque dolore premitur: modò siquidem exæstuat, modò frigore occupatur. Labor repente fatigat, & aliquando meliusculè habet, aliquando recrudescit. Consequitur sudor, horroris sensus, & tremor. Extremæ corporis partes refrigerant, inguina extolluntur, per sedem flatus exeunt, capilli eriguntur, pallor membra decolorat, & dolor, tanquam ex pungente acu, per uniuersam cutem sentitur. Percussis præsentem est auxilio ficulneum lac in vulnus instillatum. Scorpium ipse, qui i-

20 ctum vibrauit, tritus, & percusso loco impositus, suæ plagæ remedium est, ob cæcam quandam naturarum (ut constat) discordiam, quæ antipathia appellatur. Præterea tritus, & impositus cum sale, lini semine, & althæa, scorpium conuenit. Sulphur ignem non expertum, refina terebinthina exceptum, & emplastri modo adiectum, auxiliatur. Itidem galbanum ad splenij formam ductum, & calamintha, quæ trita illinatur, & farina hordei in uino parata, in decocto rutæ. Semen trifoliæ herbæ tritum, & vulnere iniectum opitulatur. Hæc ad affectum locum pertinent. Post hæc quàm efficacissimis potionibus utendum, cuiusmodi sunt aristolochiæ, præsertim corticis binæ drachmæ cum uino, tusa gentiana, & pulegij decoctum, & baccæ lauri paucis numero tritæ, & calamintha cum posca, in qua magnopere discoqui debet: cupressus cum uino, & ruta, nec secus ficulneum hæc: laferpitium, si addit: sin desideretur, peucedani succo utendum. efficax est potum trifolij, & ocimi semen. Horum autem omnium uicem pensat iugis lauacri usus, euocatus sudor, & di-

30 lurae uini potiones.

PLURA, ac uaria antiquis numerantur Scorpionum genera, ut latius libro secundo diximus, quorum alij multum, alij parum suo ictu efficiunt. Porro Nicander in theriacis scribit eorum octo reperiri genera, his uerbis. Agendum aculeo dolorifico armatum scorpionem canam, eiusq; tetricum genus. Quorum primus albicans, neque fonticus, neque lethalis est. Sed cui rutilæ genæ micant, calorem flagrantemq; mortalibus furorem incussit, quo malo homines horrore concutuntur, & frigore, perinde ac qui febre diuexantur, & acri siti incenduntur. Qui liuidus est, malam trepidationem, & motionem tribuit hominibus, quos percusserit, qui ceu attoniti, & uani, & stulti rident. Alius uiridante colore, qui simul ac corpus hominis concusserit, tremores, & frigora illico admittit, acrisq; grando talibus uidetur circumstare, etiam si sol ardentissime radijs suis flagret. Talis tantæque eius stimuli affusio, cuius uertebræ nouem (lego septem, cum non plures scorpionum caudis inesse comperiantur) iuncturis connexæ apice suo nocent. Alius liuido colore, ingentem aluam gestat, latumq;: herba enim uescens, semper insaturabilis manet, corpus etiam hominis excedens, inguini insolubili ictu nocens: tam uehemens eius genus, & ori morsus insitus, infixusque est. Deprehendes itidem similem scorpionem litorali seu marino cancro, qui albentes algas fluctumq; maris decerpit pascendo. Alij rursus incuruis æquales planè paguris uidentur, corpore grandes, chelis, & forcipibus æquè solidi, atque paguri, qui in saxosis cauernis demorantes sibi timent. quinetiam è paguris tales scorpiones, genus & ortum suum ducunt. Nam cum rupes, tenuesq; multum strepentis maris reliquerint algas, eos ex mari inescantes piscatores extrahunt. At paguri se peti ea uenatione sentientes, murium rimas, & nidos subeunt, ubi prolem perditricem habent, ibiq; è mortuis tandem paguris scorpj nocentes per foramina ista generantur. Postremo melichlorus tibi

40 animaduertendus, cuius summum uerticillum prænigrum est, inextinctumq; noxam infligit, hominibus certè insensibilis ille obliquo gressu corpus flammæ simile commouens: pueris uerò, & natu minoribus celerem interitum adduxit: quibus & circum terga densæ alæ expanduntur locustæ fruges rodenti non dissimiles. hætenus Nicander. Ceterum scorpionum ictuum indicia, & curationem conscripsit diligentissime Aëtius libro XIII. cap. XIX. sic in-

50 quiens. A Scorpio percussos uehementissimus plagæ dolor consequitur, frigiditasq;, ac tensio, et stupor: circaq; plagam, & totum corpus frigidus sudor: & his, qui iuxta infernas partes percussi sunt, inguina excitantur, ac intumescent: qui uerò circa supernas, locus sub alis. Et hæc quidem leuiter percussis adsunt. Validius autem ictus ardor circa plagam adest, quemadmodum in ambustis, & uerrucarum instar formicarum eruptio circa labra, & totum corpus, ut grandine se impeti putent. Facies distortquetur, sordes circa oculos adsunt glutinosæ, & lacrymæ uisco- sæ: durities articularum, anusq; procidit, cum egerendi cupiditate: spuma circa os est, et uomitus largus, singultus; conuulsiones opisthotonicis similes. His igitur serpyllum, althææ radicem, & elaphobosum bibendum præbeto.

Scorpionum  
genera ex Ni-  
candro.

Scorpionum  
ictus, & cura-  
tio ex Aëtio.

Remedia alia  
ex Diosc.

Præter opinionem autem facit elaphoboscus, tum uiridis comesta, tum sicca pota. Cochleam item hortulanam maxime accipito, eamque una cum operimento tritam, plagæ imponito, & confestim sedabis dolorem. Idem etiam uermes terreni facere dicuntur. Prodest præterea fluuiatilis cancer tritus, addito lasere, in uino potus. Confert uerbenaca recta, aut uiridis cataplasmatibus modo imposita, aut sicca in puluerem pota. Conducit etiamnum pulvis ex equalibus partibus cumini, melanthij, & iaticis seminis confectus, & drachmæ pondere ex uino potus. Datur & pastinacæ semen, quin & ponticæ nuces: quippe hæ non modo in cibum sumptæ; sed in cingulo quoque gestatæ, gestantem ab omni scorpionum ictu tutum reddunt. hæc ex Aëtio. Commune & uulgare remediū est plagam perungere ipsorum scorpionum oleo. Proinde oleum nostrum de scorpionibus, cuius antea sæpenumero mentionem fecimus, hæc in curatione maxime conueniet. Scorpionum ictibus Dioscorides præter ea medicamenta, quorum hoc capite meministi, hæc quoque præsertim in superioribus libris mederi tradidit: nempe anonum melle subactum, fluuiatiles cochleas, mullum piscem recentem, smaridem muria asseruatum, diuulsas lacertas, domesticos mures concisos, tritici farinam uino aut aceto subactam, sonchi & intubi succum, ocimum polentæ admistum, anaracum ex sale & aceto, hieracium, laserpitij lacrymam, melissophyllum, chamæpitum: uerbasci illius folia, quod tantum auream florem gerit, leucoij aurei semen: & polemoniæ radicem, cui tantam uim contra scorpiones inesse quidam tradunt, ut ij ab his non feriantur, qui eam gestauerint: quos, si forte percussi fuerint, nihil tamen molesti passuros affirmant. Et hæc omnia profunt tantum uulneri illita. Quæ uero pota, uel deuorata auxilium præstant, eiusdem testimonio, hæc erunt: fluuiatiles canceri triti, & cum asinino lacte poti: asinorum & equorum, qui in pascuis degunt, finum liquidum in uino, & potum: oxylapathi, & oxalidis semen ex uino aut ex aqua potum, agrestis lactuca: abrotani hortensis, pastinacæ, hyacinthi, & urticæ semen: quin & olusatrum, & heliotropium, & cardanum, & myrrha, & myrti baccarum uinum. E quibus omnibus cum plura possint confici antidota, pro uaria medicorum intentione, non operæpretium puto, nos hæc in re longiorem moram ducere, ut quæ potius peritissimi cuiusque iudicio sit relinquenda.

Τρυγὼν θαλάσσιον, σκορπιὸς καὶ δράκων θαλάσσιος. PASTINACA MARINA. SCORPIO ET DRACO MARINI. CAP. XLV.


SI MARINA pastinaca percussit, protinus accidunt molesti dolores, assidue conuulsiones, lassitudo, & imbecillitas. mens percussis labat, postea obmutescunt: oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum uicinis partibus denigratur, & ita obstupescit, ut tangentem non sentiat. hunc si quis premar, atra sanies, crassa, & male olens excernitur. Ei qui marina pastinaca ictus, omnia, quæ de uiperarum morfu paulo post referemus, simili modo conueniunt. Peculiariter autem ictus à marino scorpione, & dracone inferuntur, qui molestos cruciatus cient: interdum autem, sed raro, nomas excitat. Quibus absinthij, saluiæ, aut sulphuris ex aceto triti potio subuenit. Ipsi etiam disseci, uulneribusque impositi, sui cuiusque ictus remedio sunt.

Pastinacæ marinae ictus signa.

QVI à marina Pastinaca percussi sunt (ut testatum reliquit Aëtius) his uulneris locus manifeste apparet. Sequitur autem dolor pertinax, & totius corporis stupor. Acutum enim, & firmum habet aculeum, quo uehementissima uim in altum impulsio, nervi sauciantur. quapropter in aliquibus mors derepente totum conuellens corpus comitatur. Narrant quidam, quod si quis caudam pastinacæ, quæ ictum intulit, auferat, & in arborem maxime quercum, suspendat ac figat, ipsam quidem arborem arescere, egrum autem sanari, atque id iuxta contrariæ affectionis, & remedij rationem contingere. Id quod etiam asserit Nicander in theriacis, his planè uerbis. Trygonem, hoc est, pastinacam, itidem maleficum, mareque uastatē draconem arcere noui. Dolore autem sic hominem afficit trygon, cum oblongis sagenis defatigatum piscatorem aculeo suo ceciderit: uel etiam ramis arboribus infixus fuerit, nam tum arbor ea sit obscurior, ignobiliorque. Siquidem ab huius morfu, ceu solis æstu, eius & radices perditæ unâ cum folijs flaccidæ redduntur, & arescunt: homini uero caro putredine imminuitur. hæc Nicander. Ceterum auxilium sentiant percussi, ut Aëtius inquit, ubi stupor, & refrigeratio totius corporis consequatur, ex calidis illitionibus, & consimilibus cataplasmatibus. Proprie autem furfures aceto incocti, & pro cataplasmate impositi eis auxiliantur, & ipsum adeo acetum pro sotu assusum maxime prodest. Magis autem conueniunt eis attractoria, & quæ tenuium partium sunt, ac calida. quo nimirum per attractoriam facultatem uenenum ex profundo attrahatur, & per calorem frigiditas mitigetur, & quæ tenuium sunt partium, in altum proreptent. Ad hanc igitur rem in promptu habebis apta, sulphur uiuum urina ueteri subactum, marrubium, lauri folia, echium, radicem panacis, saluiam, & similia. At uero si hæc desiderentur, fermentum acidum cum liquida pice emollitum imponito: mirabiliter enim auxiliatur. Dato item lauri decoctum, aut succum Cyrenaicum cum myrrha magnitudine fabæ, ac modico pipere terito, ac dato cum uino: aut silphium, aut laser ex uino: aut succi fici guttas quinque, cum tribus serpylli grana bibendas præbe. Hæc Aëtius aduersus pastinacæ marinae ictus auxilia reddidit. Ad quos præterea commendatur saluiæ decoctum continue pluribus diebus potum: quin & scordium in puluerem tritum, & ex sui ipsius decocto potum, itemque uerbenaca. Non tamen ob id prætermittenda est theriaca, aut Mithridatis antidotus, aut quinta nostra essentia, cuius iam sæpe meminimus. Porro Nicander quoque nonnulla remedia protulit, quæ hæc sunt. Anchusæ folia, quinquifolium, rubi flores, æthium, oxalis, lycopsis, ordulum, chamæpitum, sagi cortex, agrestis pastinacæ semen, terebinthi fructus, phycus marinus, adiantum, smyrnium, eryngium, libanotis, cachry, & utrumque papauer.

Pastinacæ ictus remedia.

A' MVRÆ araneo percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraque pustula, diluta sanie turgens, exurgit: proximæ partes liuent. Rupta pustula, depascens ulcus, non ei dissimile, quod serpit, occupat. Intestinorum quoque tormina, difficultas urinæ, & frigida asperginis offusio consequuntur. Huius moribus auxiliatur ex galbano splenium, per se vulnere exterius impositum, ut medicamenti modo aceto tritum, & hordeacea farina cum aceto mulso illita. Quinetiam mus ipse, qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus sui veneficia luit. Resistunt quoque acini dulcis punici decocti, & illiti: item porri, & allia contrita, necnon aquæ calidæ fortus: sed hæc ad locum pertinent. Prodest potum abrotoni decoctum, maximè si in uino derur. præterea serpyllum, & galbanum, & cruca uino madefacta: recentes cupressi pilulæ cum aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethrum cum uino, & chamæleonis herbæ radix. Nec desunt, qui literarum monumentis tradiderunt, tritum murem araneum contra suos ictus commodè bibi. Quam historiam apud alios inuentam, dignam duntaxat censuimus, quæ adnotaretur. Alij asseuerant, demorsum non aliàs exulcerari, nisi prægnas mus araneus fuerit: tum sanè auxiliari ferunt.



QV ANQVAM Mus araneus, qui, quod colore mustelæ sit similis, Græcis μυγάλα dicitur, ab omnibus inter uenenata numeratur; attamen in agro Tridentino is nullam morfu infert noxam, quemadmodum nec scorpio. Historiam eius superius libro secundo retulimus. quare iam ad eius morsus notas, & remedia progrediamur. Demorsus itaq; ab eo (ut Aëtius inquit) uulnera manifesta fiunt: quadrifido enim ordine illata uulnera conspiciuntur: & sanguis quidem primum purus promanat, paulo post uerò saniosus. animal enim ipsum putrefactione occidit. Consueuerunt etiam bulle insurgere, quas si quis dirumpat, carnem subiacentem fæculentam offendet, & fissuris disparatâ. Inflatio autem sequitur demorsos. Ceterum hoc animal frequentius ad testes insilire solet, eosq; uerbere impetere, non hominis modò; sed cuiusque etiam bruti animantis. Auxilium autem ferunt cum ob putrefactionem periclitantur demorsu, post prædicta communia remedia, lauri tenella folia, unius aut duarum drachmarum pondere, trita & ex uino pota. Conueniunt etiam ipsis omnia communia uenenorum remedia è uino dulci in potu sumpta. In pecoribus uerò & iumentis illa ipsa cum aqua trita, naribus infunde: est enim ipsis præsens remedium. Vnde etiam hominibus similiter in potu exhibeto. Morsus porro cumino, & allio, putamine extrinseco non abiecto, cõtegatur. Eadem etiam cum oleo trita assidue ac diligenter locis circumscitis illinantur. Si uerò ruptæ fuerint bullæ, & ulcera oborta, acida muria proluatur locus, aspergaturq; subinde usti hordei puluere. Verum non rumpentur, nisi prægnans fuerit mus araneus, qui morsum infixit. Quod si exulcerentur, mali punici dulcis putamen coctum tritum erit imponendum, & ulcera ex eodem decocto, aut magis myrti decocto proluenda, fouendaq;. Strato uerò inquit, in muris aranei morsu primum scalpello circumquaq; uulnerandum esse locum, & murem subinde araneum ustum cum aceto imponendum; aut sinapi tritum, & aceto exceptum. In potu uerò opem ferunt panax, cruca, capparis cortex, gentianæ radix, & recta uerbenaca, omnia ex uino pota, aut in cataplasmate conformata, & moribus illita. Prosumt & mialuæ folia imposita, & magna antidota potui data. Ceterum lectorem admonitum uolumus, Muris aranei imaginem, quam hic damus, ueram esse, & diligenter ad rei imitationem expressam: non illam, quam libro secundo perperam & infabrè pictam inueniet. Error sanè librarij fuit, qui imprudenter deprauatam in legitime locum supposuit. Quem errorem hoc loco emendare, & lectorem monere opportunum duximus.

Muris aranei  
morsus notæ,  
& curatio.

SI VIPERA momordit, corpus intumet, uehementer arefcit, subalbidumque colorem concipit. Sanies à vulnere profunditur, primùm suppinguis, mox cruenta. pustulæ adustis similes erumpunt: & antea depascens ulcus, quod in proxima repens, non summa modò corporis; sed intima quoque corripit. Gingiuæ ijs cruore suffunduntur: inflammatio circa iecur erumpit: tormina, & biliosi uomitus sequuntur. Sopor, tremor, & urinæ difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur. Vbi uerò uipera morsum impressit, simum caprinum cum uino, studiosè impositum opitulatur. item laurus & abrotonum, & galbanum splenij loco superiectum, & origanum uiride inditum. pulli gallinarum discerpti, & confestim admoti: erui farina uino subacta; radicis cortex usque eò tufus, ut in puluerem solutus abeat, & scilla tosta: detritum chamæmelum, hordeaceæ farina cataplasma in aceto mulso præparatum, sed locus antè eo calido foueatur. hæc loco imponuntur. Contra uiperinos ictus rubus cum uino prodest. Aliqui anchusam tenui folio constantem auxiliari produnt. Leporini coaguli in uino terni oboli bibuntur, & porracei succi hemina in mero, & foliorum apiastris succus, & syluestris ruta. hæc in uino potari debent. Vinum frequenter bibendum, allia mandenda, & cepæ, & porri recentes, salsamenta acerrima, & opipara. simplicia hæc sunt. Percussis à uipera præclarè auxiliatur medicamentum, quod myrrhæ, piperis, castorij, floris portulacæ seminisque, dimidio acetabulo constat: hæc omnia in Cretico passo teruntur, aut in alio probato. Erasistratus in eo libro, qui περὶ δυνάμεων, id est de uiribus, inscribitur, pleraque alia tradidit, quæ ictis à vipera auxilium ferre possunt: inter quæ talia maximè laudantur. Gallinacea cerebella cum uino pota, semen satiuæ brassicæ tritum, & acetabuli mensura cum uino potum. Quinetiam bonum est digitum in liquidam picem intingere, deinde uinum, quo digitus fuerit elutus, bibere. Hæc sunt quæ contra uiperæ ictus auxiliantur.

Viperarum  
morsus indi-  
cia.

VIPERARVM historiam exactius, ut puto, latiusque libro secundo tradidimus, quàm ut operæpretium sit hic eandem repetere, uel plura nobis supersint addenda. Quare tantum reliquum est, ut iam de earum morsus indicij, et re medijs differamus. Reperiuntur itaque in eis (ut Aëtius memorie prodidit) quos uipera mas momordit, uulnera in loco bina: in his uerò qui à femina demorsi sunt, quaterna. Primum autem ex eis excernitur sanguis, deinde sanies sanguinolenta, & oleosa. Adest tumor biliosus, feruidus, bullosus, subruber, deinde liuidus, denigratus, & proserpens. Siccitas uehemens inest ori, ardor, exolutio, & frigidi horroris insultus, aliquando & bilis uomitus, tormina, capitis grauitas, uertigo, pallor, singultus, febris, spiritus & anhelitus celer, color plumbeus, & frigidus sudor. Mors in horis septem, aut ut longissimè absit, tertia die, in his qui non seruantur, & maximè his, qui à uipera femina sunt icti. hæc ille. Quæ omnia Nicandro accepta referri possunt: siquidem is in theriacis ita ad Latinum sensum scribit. Hinc luctum à uipera manantem uiatores diuulgant: duos enim instar nerui acutos masculi dentes in ore suo uirus eruant, ostendant: uipera uerò femina semper plures exerit, pernicioso suo ore insultans. Atqui in carne icti facillè latos dentes perpendas. Porro è uiperæ inflata plaga sanies aliàs pinguedini similis, aliàs cruenta, interdum sine ullo colore conficitur: Sed quæ ulcus ipsum caro circumdat, germinans graui offert sese tumore: interdum rubens, tumque palam liuida cernitur: quandoque etiam aquosum onus concipit. Frequentes præterea bullæ, ceu uacui per ignem tumores, perinde ac corpus igni sit ambustum, in cute supernè ebulliunt. illic subinde putredines circumcirca accurrunt, aliæ quidem seorsum à uulnere, aliæ circa plagam ueneno non dissimilem mortem edentes. Aspera itaque noxa, uehementerque ignescens totum corpus exedit: hic per guttur, atque collum coeuntes sonitus, agminatim strepunt: quinetiam oculorum uertigine mæret. Illicoque membris grauis imbecillitas, & lumbis anxietas uenit: at in capite caliginosum onus consistit. Atqui laborans ille aliàs siti aridum guttur suum exiccat, sepeque ex unguibus cum frigus tenet. Hyberna autem niue exuberans grando, omnia membra degrauiat. Crebro etiam biliosos uentris sui tumores expuit, toto corpore pallens, ac humens circa membra sudor nuus iactu frigidior circumfunditur. Colorem interdum liuidi plumbi gerit, aliàs obscurum, mox floribus similis est eris. hæcenus Nicander. Præstat igitur (ut Aëtius auctor est) priusquam cruenta prodeat urina, alij plurimum deuorare, & uinum meracum copiosum bibere, excitatis subinde uomitibus. Efficacissimum enim eis remedium est allij esus, ac meracior uini potio, inquit Archigenes, adeo ut si quis multum eius sustineat usus, itemque meri potum, nullo alio auxilio opus habeat. Conuenit item maximè theriacæ uiperis sine dilatione pota, & uulnere illico superposita: Quin & ipsa uipera excoriata, capite, et cauda abscessis, interaneis omnibus reiectis, anguillarum modo cocta, & à demorsis deuorata, maximum ictis præsidium offert. Caput autem à uiua amputatum, diligenter per uolsellam prehensum, morsuique impositum, ea parte adhuc calente, quæ ceruicem contigit, uenenum id mirifice extrahit. Conducit & dissectam gallinam adhuc internè calentem morsui imponere, idque alijs pariter dissectis, frequenter, & assidue repetere. Oportet etiam scalpello per ambitum demorsionum locum circuncidere, & cucurbitulas subinde admouere. A cucurbitulis foliorum fraxini succus in potu exhibendus est, & expressa à succo folia uulneri illinenda: est enim ualde efficax ad uiperarum morsus fraxinus arbor. Melissophylli item folia, & succus tum ex uino potus, tum uulnere exterius illitus, euident auxilium confert, etiamsi iam moriatur æger. Auiunt præterea, si quis melanthij drachmas quatuor edat, non moriturum. Similiter etiam melaphroditos herba efficax est, & canceri fluuiales cum lacte triti, & poti, & uulnere adhibiti. Magnificè etiam prosunt ranæ coctæ, & in cibum sumptæ, & iusculum earum subinde bibitum. Præstat & nasturtium plurimum

Viperarum  
morsus reme-  
dia.



mum edere, uel tritum ex uino bibere. Facit autem ad id mirificè testudinis sanguis exiccatus, & cum syluestri cumino potus. Utendum etiam omnibus communibus remedijs, supra sæpius relatis: quippe superuacaneum fuerit eadem tam sepe repetere. Maxime uero utendum est anchusæ radice, & heliotropio cum uino. dandus & hematites lapis. Auxiliantur & raphani in cibo accepti, & deinde uomitu reiecti, exhibita statim à uomitu Andromachi theriaca. Post scarificationem, & gallinarum impositionem, uulnus ex trifolij bituminosi decocto calido, diu proluendum ac seruandū est: nam si pauco id tempore fiat, demorsi peius afficiuntur. Deinde porrum & panem cum sale illini conuenit, aut allium cum aceto, aut ipsius exusti, aut fraxini cinerem, aut alium quemuis cum aceto, aut hastulæ regie, aut sycomori folia cum pane: aut lauri tenellis folijs, coctis & cum oleo tritis integatur locus, aut caprino stercore, priusquam claudatur. Ceterum, ut libro de theriaca ad Pisonem author est Galenus, non modò è uiperarū morsibus retrahitur uenenum appposito tantum, ut Aëtius inquit, uiperæ capite; sed ipsa quoque uipera tota contusa, & uulnere imposita. Contra uiperarum morsus mirificè medetur echij epotus succus, herbaque ipsa uulnere imposita, ut superius libro quarto prodidimus, illius Alcibij historiam referentes, à quo echium Alcibiadis cognomentum accepit. quandoquidem planta hæc (ut ipse Dioscorides testatur) facultatibus adeo præstantibus insignitur, ut epota eius radix ex uino, non percussis modò à serpentibus opituletur; sed eos quoque qui antea biberint, feriri non patiatur. Commendauit etiamnum aduersus uiperarum morsus Dioscorides sparsim in suis de medica materia libris, præter ea quæ hoc capite retulit, alia præstantissima simplicia medicamenta, partim exterius applicanda, partim bibenda, uel comedenda, quorum nonnulla hic subiiciam. Vulnere igitur exterius illita conferunt, iuniperi, & fraxini folia, tritici surfures ex rutæ decocto incocta, erui farina uino macerata, scilla ex aceto seruefacta, personatæ, ebuli, & sambuci radices in uino elixatæ, sarmentitius cinis aceto subactus, aliaque complura, quæ breuitati studentes nunc silentio inuoluimus. Pota uero profunt cassia odorata, costum, myricæ semen, pistacia, cerui genitale exiccatum, tritum & potum; chondrylla, anagallidis succus, ferulæ medulla, aparine, rubiæ radice, & terrestri tribuli succus: auxiliatur etiam bryoniæ radix. Admirandos insuper præbet effectus radix illa, quam Goritienses ab auxiliari eius ui Serpentina uocant, cuius historiam, pariterque usus rationem superius libro secundo tradidimus. Verum præter hæc præsentaneo remedio sanat nostra quinta essentia, cochlearis mensura pluries eodem die pota: item oleum nostrum de scorpiionibus, de quo etiam sæpius dictum est, ea ratione inunctum, quam superius ipsius conficiendi modum describentes retulimus. In Viperarum quoque genere ea nimirum immanis fera recenseri potest, quam AMMODITE uocant, cuius etsi nusquam, quod extet, meminerit Dioscorides; minime tamen silentio prætereundum est, quin hæc eiusque ueneni remedia describantur. Siquidem Ammodite, meo iudicio, in pluribus Italie et Illyrie locis reperiuntur, præsertim in Goritiensi comitatu, & Iapidie montibus. Est enim fera hæc uiperæ omnino similis, præterquam quod capite sit ampliore, & maxillis latoribus, quodque ultimo rostro superiori parte eminentiam quandam habeat, acutæ uerrucæ similem. Vnde circumforanei, qui serpentes eorumque ueneni remedia profitentur, hanc feram uulgò appellant Aspido del corno, hoc est, Aspidem cornutum. Neque sanè ineptum illi nomen indiderunt: namque non minori cum uelocitate interficit, quam aspis. Scimus enim quosdam ab his inopinatè demorsos, tribus tantum horis morte occubuisse. Proinde scite libro XIII. cap. xxv. de eo ita scriptum reliquit Aëtius. Ammodites magnitudine quidem cubitalis est (maior enim non pingitur, neque scribitur) colore uero arenosus, per corpus autem maculis nigris insignitus: caudam habet præduram, supernè discissam. A quibusdam uero Cenchrias, hoc est miliaris, ob caudæ instar milij duritiem, appellatus est. Latiores autem maxillas, quam uipera habet, cumque in multis, alijs ei similis sit, colore magis difcerni potest. uipera enim subflaua est. Ceterum ab Ammodite percussos festina ut plurimum mors sequitur. qui uero tam breui non pereunt, his sanguis è uulnere manat, & uulnus intumescit: sed paulò post sanies effertur, sequiturque capitis grauitas, & animi deliquium. Qui uero optime dispositi sunt, & robusti, in triduo intereunt: quanquam reperti sunt, qui in septimum usque diem durarint. Celerius uero mors aduenit his, qui à femina sauciantur. Auxilium porrò & ij ferunt, primum quidem à communibus remedijs, utpote ab adfixis cucurbitulis, circumciso prius per ambitum uulneris loco, & superioribus partibus artissimis uinculis constrictis: quin abscessa, dilatataque statim scalpello plaga. Proprie autem eis auxiliatur mentha ex aqua mulsæ pota, castorium, cassia, & artemisiæ succus cum aqua. Danda etiam in potu theriace, necnon uulnere eadem illinenda. Utendum & emplastris attractorijs, & subinde cataplasmata, quæ ad nomas siue ulcera serpentia conducunt, imponenda. Viperæ præterea similis, ut quidam tradunt, ea etiam fera fuerit, quam SEPA nominant, cuius historiam superius libro secundo retulimus. quanquam inibi Dioscorides Sepem lacertæ generi assignauit, unde & eam lacertam Chalcidicam à quibusdam uocari tradidit. Itaque cum uaria sit apud authores Sepis historia, facile adducor, ut credam, Sepa reperiiri non modò in lacertarum; sed etiam in mortiferarum serpentium, & uiperarum genere. Quod sanè uidetur asserere Nicander in theriacis suis. Siquidem cum inquit primò, Præterea niualis, & asper admodum mons Othrys rubentes bestias profert, canaque uallibus, & salebrosæ rupes, nemorosumque promontorium, ubi sitibundus ingreditur Seps, colore nunquam uno uisus, &c. haud dubiè ostendit serpentem, immanemque feram se representare, non autem lacertam. Cum uero secundo ait, Sepem item corpore demisso, exiguis haud dissimilem lacertis, declinabis, nulli dubium est, quin eam descriperit, quam Chalcidicam lacertam uocant. Nicandro subscribit Dioscorides, quippe qui etsi libro secundo ea ratione Sepa statim post lacertas reddiderit, quod lacertis corpore, & forma sit similis; attamen libro quinto, Sepa uiperarum generi adscripsit, ubi de acetum mulsæ uiribus differens, inquit. Acetum mulsam contra morsum eius uiperæ, quam sepa uocant, haustum meconium, ixiannue auxilio est. Aëtius tamen eius Sepis tantum meminuit, quæ inter mortiferos serpentes uel uiperæ genera recensetur, his uerbis. Serpens, qui Seps appellatur, longitudine quidem duorum cubitorum reperitur: ex crasso autem in tenuem abit: rectè uero ac tardè proserpit. Caput habet latum, os acutum: uniuersum autem

Simplicia medicamenta ex Diosc.

Ammodite historia, & uenefica uis.

Ammodite morsus signa, & curatio.

Sepis feræ consideratio.

Sepis morfus  
signa, & reme-  
dia.

tem corpus multis albis notis respersum. Sed aliter de Sepis forma, magnitudine, & gressu tradidit Pausanias, ut superius libro secundo suo loco adnotatum reliquimus. Ceterum ab ea percussis (ut tradit Aëtius) sanguis è uulnere manifestus excernitur, & paulò post sanies graeolens, tumor, & dolor segnis est: sed affecte partes putrefactae dealbantur, & totum corpus uiliginè, quae alphas appellatur, simili colore uisitur. Pili, capilliq; è toto corpore defluunt, atque intra tres, aut quatuor dies isti pereunt. Porro opem & hi sentiunt ex iisdem rebus, quae in uiperæ et cerasæ, & ammoditæ morfu relatæ sunt. Exhibenda est præterea portulaca plurima in cibo, & uinum bibendum myrtites meracius. Conueniet item spongiam calido aceto imbutam, morsui imponere, & ex butyro cum melle locum illinire, aut milium cum melle, aut paleas unâ cum terra, quæ eis adhaeret, exustas imponere. hæc Aëtius. Ex quibus facile conijci potest, cum ambæ hæc feræ è uiperarum sint genere, ijs tutò antidotis earum uenenum superari posse, quibus uiperæ frangitur, & euincitur. Sed quoniam hæc humane uitæ tam inimica animalia aliam admodum perniciosam feram mihi in mentem reuocarunt, quæ Græcis ideo **ACONTIA** appellatur, quòd iaculi, uel sagittæ modo in hominem profiliat, cum nihil de ea à Dioscoride memoriæ proditum sit, sciuerimq; & hanc in Italia reperiri, non alienum duxi de eius historia ac ueneni curatione ea hoc loco commemorare, quæ ex probatis authoribus excerpssi. Hanc itaq; describens Galenus libro de theriaca ad Pisonem, inquit. Acontis serpens, ubi se multum extenderit, ceu iaculum quoddam corporibus insiliens, sic perimit. Hæc, ut Aëtius scriptis tradidit, serpens est duorum cubitorum magnitudine, figura autem crassa in tenuem abeunte, colore uiridi, præsertim iuxta uentrem, ut milium colore referat, unde & cenchrias, hoc est miliaris, appellatur. Aiunt hanc fortiozem fieri, cum milium floret. Porro ubi se ad ledendum parat, extendit se ipsam, ac ueluti iaculum uibratum corporibus inuolat, atque hoc modo uerberat. Ab huius morfu omnia, quæ de uiperæ dicta sunt, sequuntur accidentia, atque etiam grauiora, adeò ut etiam putrefactiones & carniū defluxus consequantur, ac grauior item mors succedat. Ceterum remedia similiter eadem, quæ ad uiperæ morsum his conducunt. Est qui refert inter recentiores non obscurus author, quòd cum pastor quidam misellus, sub cuiusdam arboris umbra estate media quietem somnans, caperet, cuius socij non procul oues pascebant, ab Acontia, quæ in arbore ascenderat, ita percussus fuit in sinistram manillam, ut illico perierit. At socij audito percussione sonitu, uiso serpente, quem nouerant, super defuncti pectus, relicto grege in propinquum rus, pauore territi, aufugerunt. Reperitur hoc seuisimi serpentis genus, ut quidam mihi retulerunt, in quibusdam Calabriae, & Sicilie locis, ubi ipsam incolæ à sagitta Sacttone uernaculo nomine appellant.

Acontiz hi-  
storia, morsus  
notæ, & cura.

### ΣΚΥΤΑΛΑ, καὶ ἀμφισβᾶνα. CAECILIA, ET AMPHISBAENA.

C. A. P. XLVIII.

**CONSIMILIA** suprà dictis in uipera eueniunt ijs qui à cæcilia nomine, & amphisbæna demorsi sunt, eademque ferè auxiliantur. quare hoc uenenum priuatam descriptionem sortitum non est, neque uisum est dignum, quod alio genere comprehendatur. De ijs autem mentionem hoc loco fecimus, quoniam ferè remedijs ad uiperas scriptis, percussis ab eis adiuuari soleant.

Amphisbæ-  
na, & cæcilia  
consider.

**NON** desunt, qui scripserint, Amphisbænam præter naturæ institutum duobus cum capitibus gigni, quæ utranque serpentis extremitatem occupant: fieriq; ob id putent, ut fera in utranque partem repai. Quod tamen fabulosum censemus: nam & hydræ poëtæ, septem capitibus consistere fabulantur: id quod nihilominus falsum est. Verumtamen non negauerim ego id monstrosè, & præter naturæ intentionem euenire non posse in omni serpentium ouiparorum genere, quemadmodum & uolatilium. Siquidem pluries compertum est, ex uno tantum ouo duobus uitelis referto, nasci pullum modò habentem quatuor alas, modò totidem crura, totidemq; pedes: atque etiam lacertæ uise sunt aliquando bicipites. Sed hæc non utique statuunt, haberi aliquod serpentium genus naturæ biceps. Hoc scitissimè, & apertissimè confirmat Aristoteles libro, & capite IIII. de generatione animalium, sic inquit. Monstra rarò admodum sunt in ijs, quæ singulos pariunt, sed crebrius in ijs, quorum partus est numerosus, & præcipue in auium genere, potissimumq; in gallinis. Iis enim partus numerosus, non modò quòd sæpe pariant, ut columbæ; uerum etiam quòd multos simul conceptus intra se contineant, & temporibus omnibus coeant. Hinc gemina etiam pariunt plura: coherent enim conceptus, quoniam in propinquo alter alteri est, quomodo interdum fructus arborum complures. Quòd si uitella distinguuntur membrana, gemini pulli discreti sine ulla superuacua parte generantur. Sed si uitella continuantur, nec ulla interiecta membrana determinantur, pulli ex ijs monstrosi prodeunt, corpore, & capite uno, cruribus quaternis, alis totidem. quoniam superiora ex albumine generantur, & prius: (uitellum enim cibo ijs est) pars autem inferior postea instituitur. quanquam cibus idem, indiscretusq; suppedatur. Iam serpens etiam biceps uisus est, uidelicet eadem de causa: nam id quoque genus oua parit, & multa numero. hæc Aristoteles. Quæ sane mihi facile persuadent, ut credam, omnino falsum esse, quòd Amphisbæna ex sui generis natura biceps perpetuò nascatur. Verum quandoquidem hoc serpentis genus terrestrium lumbricorum modo utrisq; extremitatibus, capite scicet & cauda, acuminatis gignitur, adeò ut difficillimè possit caput à cauda discerni, existimauere quidam hanc feram . . . obus consistere capitibus. Proinde Aëtius libro XIII. cap. XXVII. scribit, Scytalam (hanc alij Cæciliam interretantur) & Amphisbænam animalia esse inter se similia. Non enim, inquit, ex crassis in caudam tenuem abeunt, sed æqualis crassitudinis in uniuersum existunt, ut neque cognoscant uidentes ea, iuxta utram partem caput aut cauda sint sita. Quod equidem tum in terrenis & alui tinea, tum in erucis quibusdam, tum etiam in hirudinibus conspicitur. Differt autem, ut idem tradit, amphisbæna à scytala, quòd illa ex utraque parte progrediat, unde à Græcis illi nomen

Amphisbæna  
biceps nō est.

nomen inditum est. Galenus porro libro de theriaca ad Pisonem, Amphibænā bicipitem esse existimat (si tamen liber is adscriptitiis non est) ut hæc uerba, quæ in eo leguntur, aperte ostendunt. Amphibæna (est autem animal biceps, quemadmodum sanæ & nauigia utrinque proram habentia, cui natura ex superfluo substantiæ bina capita est largita) hoc inquam animal, aiunt, si mulier grauida supergressa fuerit, malè abortum facit. hæc ille. Ceterum, ut ipse Aëtius scriptum reliquit, ab utraque demorsis contingit morsum obscurum esse, ac uix apparere, ueluti sunt muscarum ictus. quapropter etiamsi mordeant, non enecant tamen, sed inflammationem excitant, ut apiam & uesparum stimulus. Quare transferantur ad hos quoque, quæ de illis sunt relata, uerim facultate intensiore. Ex his etiam Aëtij uerbis conijci potest, cùm horum animalium ictus admodum tenuis, & obscurus sit, Amphibænae caput inesse terrenis uermibus, uel alui tinea per simile: ac proinde adeo etiam caudæ æmulum, ut alterum ab altera non nisi difficile discerni possit. Cæciliam autem Hetrusci uulgò appellant Lucignola. Amphibænae corium, authore Nicandro, oleastri baculo circumuestitum, si manibus frigore torpentibus tractetur, calorem statim adfert, articulorumq; nexus dissoluit.

Vtriusq; morsus signa, & curatio.

Δρύινος. DRYINVS. CAP. XLIX.

A DRYINO morsis pustulæ, molestique dolores incidunt, præsertim quæ dilutæ saniei emissarium subest: quinetiam erosio, terminaqué consequuntur. Ab eo ictis conuenit aristolochia cum uino pota, trifolium herba, radix hastulæ regiæ similiter assumpta, & fructus ex omni glandiferarum arborum genere: & tuscæ ilicis radices, & illitæ parti ictæ auxiliantur.

- 20 DRYINVS, ut in theriacis testatum reliquit Nicander, in quercubus latebras parat, aut alicubi in concauis fagis, in montibus uersatur. Appellant eum alio nomine etiam hydrium, sed & alij chelydrium, qui relictis bryis, paulè, suæq; naturæ idoneo lacu uenatu intercipit in pratis molurides, & ranas. Hic si à myope musca illa quæ uis anti-mautia prouocante, petatur, insuetum illum impetum suscipiens, cum concauæ quercus robur celeri saltu subit, stru-cto sibi in imo cespite cubili. Candet tergo, caput illi æquale, adeoq; hydro simile: grauis autem foetor à corpore eius euaporat. Quemadmodum quando incurua, necnon abrafa corij præsemina sub teretibus ferramentis circa humen-tes equorum exuias, & pelles hument. Si quempiam is uel in talum, uel pedis plantam percusserit, à corpore icti ho-minis difficilis odor sparsus fertur, atq; circa ictum niger in acutum surgit tumor, mentemq; moerentis angor, & tri-stitia, quibus detinetur, obscurant. Species nimio dolore conflaccescit, & perit: cutis cum corpore admodum malè olet, adeo ipsum atrum uenenum semper depascens consumit: quin & caligo lumina eius obfuscans, occultansq; ma-lè affectum perdit. Alij à dryino icti caprarum instar seu ouium balant, ac omnino difficiles redduntur, impendioq; cruciantur: Vrina eis decutitur, & pallescit. Ipsi uerò dormitantes stertunt, frequentibus singultibus correpti, alias per collum uomitum fellis similem, alias cruentum cructantes, ipsumq; malum acrem sitim generat: postremo laboran-tibus membris tremorem effundit. hæc Nicander. Ceterum Dryini nomen huic feræ mortiferæ inditum est, quod in quercuum cauernis; quæ prope radices sunt, stabuletur. Græcis enim quercus δρύς dicitur. Proinde Galenus libro de theriaca ad Pisonem, de dryino ita scribit. Dryinus serpens sic nominatus, quod in radicibus quercuum uiuat, tam malignus ad perdendum proditur, ut eius, qui supergreditur imprudens, cutis à pedibus excoriatur, tota crura ad-modum intumescent, & quod magis mirificum est, manus quoque ipse curantium eodem modo periclitentur. Si au-tem quis aggrediatur eum perimere, olfactu adeo mulctari aiunt, ut quemlibet gratum odorem prauum esse existimet, nec alterius præterea rei queat sentire. hæc Galenus. Dryino, ut Aëtius inquit, abundat Hellepontus. Is la-tibula in quercuum radicibus habet, atque adeo foetidus est, ut etiamsi quis eum non uideat, foetore loci cognoscatur. Est autem cubitorum duorum longitudine, obesus, ac asperrimis squamis circa uniuersum corpus munitus. Porro qui ab eo percutiuntur, his tumor insurgit nigricans, dolor uehemens, nomæ, delirium, corporis siccitas, singultus, bi-liosus uomitus, aut omnino simplex, urinae suppressio, tremor, interceptio uocis, stupor, scissura, et mortificatio per-cussorum locorum: plurimi etiā intereunt. Porro & hi quoq; ex ijs, quæ in uiperæ morfu dicta sunt, opem sentiunt: itemq; ex communibus remedijs iuxta consequentium accessionum proportionem adhibitis.

Dryini histo-ria, & eius ic-tus notæ ex Nican.

Ex Galeno.

Dryini descri-ptio, & mor-sus curatio.

Αἰμόρροος, καὶ δῖψας. HAEMORRHOVS, ET DIPAS.

CAP. L.

- 50 AB HAEMORRHOO ictis vehementes cruciatus accidunt, qui angusta, contractaque corpo-ra ex continuo dolore reddunt. Ex plaga copiosus sudor effluit, & quacunq; parte corporis ci-catrix ulla fuerit, ea sanguine manat. Excrementa per aluum cruenta eijciuntur, profluensq; san-guis in globo coit. A pulmone sanguinem extusunt, & in uomitiones effusi sine remedio com-moriuntur. Quos uerò dipas percussit, solutus ac non constrictus tumor premit, sitisque usque eò pertinax, ut satiari non possit, ac sine ulla intercapedine excruciet: & si potum pleno ore affa-tim trahant, illico in eandem sitim relabuntur: proinde toto habitu similes sunt ijs, qui antea potus nihil hauserint. quare propter continuam sitim, & prester, & causon, aut dipas appellatur.

Hæmorrhoi, dipadisq; morsus uelut immedicabiles à plerisque maiorum deplorati relinque-bantur. quare si peculiaribus contra dipadam remedijs egeamus, communia experiri operæpre-tium erit. Protinus autem scarificatione uri, uisionem facere, & si locus patiat, extremorum am-putatione



putatione opus erit: consequenter quàm acerrima cataplasmata ad mouere, de quibus sæpenumero diximus. Nec me fugit, acres cibos, maximè à falsamentis, utiles esse. Meracæ potiones, & lauacra profunt, quæ subinde interiecto breui spatio assumenda sunt, priusquàm morbi genus emerferit. quo semel erumpente opem ferre non potest ulla medici opera. In ictu hæmorrhoi eadem profunt. Insuper quæ in commune opitulatur, ut scarificationes, uisiones, acres cibi, meraci potus, & quæ nunc in dipsade definiuimus. Quinetiam decocta uitis folia, & cum melle trita.

Hæmorrhoi  
perniciosis i-  
ctus, & histo-  
ria.

Hæmorrhoi  
morsus notæ,  
& curatio.

Dipsadis hi-  
storia, morsus  
signa, & cura.

**HÆMORRHOYS**, & Hæmorrhoi, authore Galeno in libro de theriaca ad Pisonem, suis ipsorum nominibus similem hominibus perniciem inferunt. quippe percussī, sanguine per os, & nares, totoq; corpore effuso, intereunt. Hic (ut in theriacis cecinit Nicander) petrosas rimas assiduò incolit, asperum, supinum, & modicè pendentem lectum illic sumens, ubi tractum suum habeat, deinde pabulo satur fiat. Longitudo eius pedis uestigio æqualis: ceterum quod ad latitudinem attinet, à capite adusque caudam totus & subtilis, & minutus est. Aliàs colore igneo, aliàs rursus candens. Collo satis constricto est, gracilis cauda necessariò in arcum contracta, extensa est angustè, & tenuiter. Supra eius frigidus, & niuales oculos, duo cornua fronti sunt infusa: albore luminum suorum, locustis uel syluestribus apibus par. Insuper horribile, & asperum ei caput horret, obliquè modico corpore suo instar cerastæ claudicans. Ex medio etiam dorso paruum nauigium semper appellit, ad terram uentrem suum atterens: squamis uerò & itinere parum substrepit, perinde ac arundinis copiam transeat. Post ictum statim decolor species accurrit, nigra nimirum, corq; ipsum dolore circumangitur: uenter aqua refertus effluit. Quàn & prima nocte sanguis cum ex naribus, tum collo, & auribus salit, recens bilioso ueneno coinquinatus: lotium item rubens accurrit. quæq; in corpore sunt uulnera, & plagæ, hæmorrhoi rumpuntur, aperiunturq;: cutēs enim fuligine contrahuntur. Caveas itaq; in primis, ne in te scemina hæmorrhoi uirus suum iaculetur. Nam si cui morsum illa inflixerit, ei gingiue simul ignescunt, penitusq; & unguibus sanguis cum impetu procurrit. Dentes etiam ex ea cæde graueolentes, seu humentes molunt. hæc ex Nicandro. Cui subscribit Aëtius, sic inquit. Animalia hæc (hæmorrhoum, & hæmorrhoida intellige) colore quidem sunt arenoso, magnitudine autem tres palmos æquant, & in tenuem caudam angusta figura paulatim desinunt. Sunt autem igneo oculorum fulgore, rectaq; & tardè prorepant. Per corpus uerò multis notis albis, & nigris uariata sunt, & asperioribus squamis obsita: quapropter dum serpunt, sonus auditur. Et scemina quidem uentri incumbens, per terram reptat, & gressum infernè circa caudam firmat: mas uerò circa uentrem in gressu nititur, & collum serpendo extendit. Consequitur horum morsum color icti loci cruentus, coloris terræ, & nigricans: ex quo nihil in initio effluit, præterquam paucum quidpiam aquosum. Venter dolore tentatur, adestq; spirandi difficultas. Deinde sanguis ex naribus profluit, & ex ipsius morsus foraminibus: & si qua in corpus obducta iandiu sit cicatrix, ea rumpitur, & sanguinem profundit. atq; hæc quidem in maris Hæmorrhoi morsus contingit. A scemina uerò Hæmorrhoidis morsu ad hæc & anguli oculorum, dentium gingiue, & unguium radices sanguine manant, & ut simpliciter dicam, per omne corpus sanguinem effundi contingit. Dentes præterea excidunt, & gingiue putrescunt. Horum porro curam facere oportet, primum quidem sanguinis eruptioni obluendo ac resistendo ijs medicamentis, quæ aptè sanguinem sistere possunt. deinde cataplasmata plagæ imponendo ex folijs uitis coctis tritis cum melle, & portulacæ folijs cum polenta. Antea uerò quàm cruenta prædeat urina, alij multum deuorent, multumq; uini diluti bibant, & ad uomitum cogantur. deinde confestim theriacæ exhibeatur. & postea pisces multos, alij tritis cum oleo tinctos edant. Sumant item in cibo panē, & uiam passam dulcem, & deinde uino diluto largè haurire uolant. Plaga uerò aqua frigida proluatur: uesica autem spongijs calidis foueatur. Sed iam de Dipsade dissectam, quæ sic à Græcis dicta est, quod continuam, & inextinguibilem sitim excitet. Huius mentionem fecit Galenus libro xi. simplicium medicamentorum, ubi eiusmodi seras in Lybia, non in Italia reperiri scribit: quod hæc regio humida sit, illa uerò siccissima. Hoc autem à Maris, qui Romæ uiperas uenabantur, accepisse ait: quibus tamen non omnibus fidem adhibendam esse existimat. Quare longè minus nos ijs circūforaneis fidem præstare debemus, qui Marfos hosce imitati, diui Pauli generi se adscribunt, seq; inde ortum duxisse prædicant. Nam si Galeni ætate hi mendacissimi nebulones uniuerso orbi imponebant, ueri quidem simillimum est, eos qui hodie per Italiam uagantur, longè magis decipere posse, quàm fecerint Marfi illi antiqui. quippe non dubitandum, quin eorum astus à Galeni seculo in hunc usque diem protractus, maximum suscepit incrementum, quod constet mortaliū ingenia tam in bonum, quàm in malum procliuiā, ætate magis acui. Meminit etiam Dipsadis Galenus libro de theriaca ad Pisonem, sic scribens. A dipsade commorsi causo febri malè conficiuntur. nam & multa siti, & æstu uehementi uexati, interdum & disrupti, diem obeunt. His Galeni uerbis subscribit Aëtius libro xiii. ubi sic inquit. Dipsas, quæ à quibusdam causus appellatur, uipera est species, quæ magis in maritimis locis reperitur, quàm alibi, magnitudine cubitali, ex crassa in tenuem desinens: notas autem habet per omne corpus fuluas, & nigras: caput uerò angustius. Sequitur autem ab ea demorsos, præter ea quæ de uipera dicta sunt, & sitis intolerabilis planè, adeo ut etiam si multus potus eis adhibeatur, sitis non sedetur: & tamen neque per urinas, neque per uomitum, neq; per sudores quicquam excernitur. Duobus igitur pereunt modis, aut ob multam sitim exusti, si potum non sumant: aut ob multam potus repletionem distensus rumpitur uenter, uel infernè circa inguina, uel circa inum uentrem, ut in aqua inter cutem sæpius euenit. Ceterum & his, ceu à uipera demorsis, auxiliamur: propriè autem in his potiones magis urinam cientes exhibeantur. Alius item per infusum eluatur, et oleo cum decoctis exhibito, ad uomitum cogendi sunt malè affecti. Ad plagæ uerò locum, post exuccionem, circuncisionem circumquaque scalpello factam, cucurbitularum affixionem, & dissectas gallinas admotas, calx uiua cum oleo imponitur, & emplastra attractoria, & theriaca illinuntur. Porro Dipsadis priuatim

priuatim meminit Aelianus lib. ix. de historia animalium, sic inquit. Dipsas, cuius uim, & naturam eius, nomen nobis declarat, inferior quidem est magnitudine, quam uipera, sed tamen in occidendo quam celerrime superior. Cuius morfu confixi etsi assiduam potionem hauriant; ad sitim tamen continuo exardescunt, & ad bibendum eatenus inflammantur, quoad celerrime rumpantur. Eam Sostratus cum albam esse ait, tum duas in cauda lineas nigras habere. Et sicut audio, uario, multipliciq; nomine nuncupatur: quidam presterem uocant, alij causonem, alij anombaten, à quibusdam melanurus appellari fertur. Cum in Aphrica, tum magis in Arabia nascitur. hæc Aelianus. Ex quibus uerbis manifestè deprehenditur error Leoniceni uiri aliquan eruditissimi, qui Dipsadem putauit corporis forma nullis notis à uipera diuersam esse. Nec equidem scio, qua ratione, uel autoritate mixus, in hanc opinionem uenerit, in eaq; persistere.

Leonici error.

## Υδρος. NATRIX.

## CAP. LI.

AB NATRICE demorsis vlcus dilatatur, & liuidum, ac ingens euadit. Sanies ex eo multa, & atra, & malè olens, non secus atque ijs quæ serpunt vlceribus, expuitur. Si ergo morsum natrix adegit, prodest origanum tritum, & aqua subactum: lixiui cum oleo indita, aut aristolochiæ cortex, aut querna radix minutim contrita, & hordei farina cum aqua, & melle colliquata. Bibuntur etiam binæ aristolochiæ drachmæ in potione poscæ cyathis duobus, deinceps marrubij succus, vel decoctum alterius cum uino. fauus recens datur in aceto.

HYDRVS anguis in aquis plerumque degit, à quibus nomen sibi uendicauit. Sunt & qui Natricem, quod à quis innatet, uocent: Hic si relictis aquis, terras inhabitet, longè nocentior euadit, uocaturq; tunc chersydrus. Distinguit tamen is à dryinio, qui (ut superius diximus) Nicandro hydrus etiam appellatur. Siquidem ipse de Hydro, cuius nunc historiam, morsus discrimina, & remedia prosequimur, differuit sub Chersydri nomine in theriacis, sic carmine in prosum uerso scribens. Age itaque chersydri, qui aspidi conformis est, figuram æqualem recita. Sed plagam eius malefica, & pessima sanè signa sequuntur. Tota cutis circa carnem arida, & abominabilis expassa ab internis partibus, humentem ictum satis certò indicat, putredine fathiscens. Quinetiam dolores immensi ignescentes, hominem tandem interimunt. mox etiam per membra pustule funguntur, aliæ ex alia parte inuicem turbantes egrum. Atqui chersydrus iam antea in uuido, seu parum aquæ habenti lacu, irreconciliabilem ranis iram adfert. Enimuero ubi sole aqua exiccata fuerit, adeoq; ariditas in fundo extiterit lacus, tum hic serpens in terra sese continet, & squallidus, & deformis in sole tetrum corpus suum refocillans: in semitis autem, lingua sua afflando sitibundus sulcos exedit. hæc ille. Chersydri quoque meminit Aëtius libro XIII. capite XXXV. his uerbis. Serpens hic chersydri appellationem inde habet, quod in principio quidem in aquosis degit locis, & hydrus appellatur ab ipsis aquis, hoc est natrix. postea uerò siccos incolit locos, & ex compositione locorum, chersydri, id est natricis terrestres, nomen inuenit. In humidis quidem locis, ex humido ictu exsatiatus, non purum uenenum habet: cum autem terrestris sit, nocentius id acquirit. Ceterum forma, paruam terrestrem aspidem refert, præterquam quod ceruicem non ita latam habet: hoc enim insigne solum aspidem præ his habent. Qui igitur ab hoc morfu sunt, eis communiter eadem accidunt, quæ in aliorum serpentium morfu, uelut est tumor, continuus dolor ardens, liuidus locus, & seculentus, uertigo oculorum, exolutio, uomitus biliosus, ac foetidus. Proprie autem motus totius corporis inordinatus, ut et per uentrè quedam inordinate ferantur: mors autem intra tres dies. Porro ex communibus remedijs etiam hi opem ferunt, & ex theriacis antidotis. Priuatim uerò coni cupressi drachmam unam, et myrti baccarum itidem unam, terito, & cum melle rosaceo, aut uino mulso in potu exhibeto. Iuxta uerò affectum locum calcem uiuam, & similia, cum oleo imposito.

Hydri, siue natricis historia.

Chersydri natura, morsus, & curatio.

## Κένχρος. CENCHRVS.

## CAP. LII.

CENCHRI morsum, qui viperino ictui similis est, putridum vlcus sequitur. carnes antea, ut in aqua inter cutem, prætumidæ defluunt, lethargo corripiuntur, & ueterno pressi somnos captat. Erasistratus eos iecinore, intestino ieiuno, coloquæ conflictari author est. quippe dissectis ipsis, omnes ferè partes corruptæ reperiuntur. Morsis à cenchro auxiliatur lactucæ fructus cum lini semine illitus, & satureia trita, & syluestris ruta, & serpyllum, cum duabus hastulæ regiæ drachmis, & tribus vini cyathis, aut aristolochiæ radix, item cardamomum, & gentiana.

QVAVVIS Aëtius appellauit Cenchrum ammoditen, & acontiam cenchriten; non tamen propterea censendum est Cenchrum, de quo hic differit Dioscorides, ammoditen, aut acontiam esse: quod hic nullam cum illis habeat cognationem, nec similitudinem. Ea autem de causa Cenchrus dictus est, quod maculis perquam minimis (ut Lucas est author) milij magnitudine, & colore, uniuersum eius corpus respersum appareat. Auicenna cenchrum famosum appellat.

Cenchri consideratio.

## Κεράς. CERASTES.

## CAP. LIII.

A CERASTE percussis locus attollitur, cum duritia pustulosus. è plaga sanies profluit, modo atra, modo pallidior: sed toto concretu varicosus intumescit: genitale intenditur, mens labat, & oculorum



& oculorum caligo exoritur: denique rigore neruorum distenti commoriuntur. Si cerasites percusserit, cita partis amputatio suffragatur. quare sine mora istam partem amputare, aut scalpro confestim circuncidere, & ijs similia prosequi oportet. Vrentia insuper reliquijs admouenda: siquidem virns hoc veneno basilisci simile est.

Cerasites mors exitialis, & auxilia.

**CERASTAE**, quorundam probatissimorum authorum testimonio, in Aphrica duobus in capite cornibus cochlearum instar oriuntur, à quibus cerasæ, hoc est cornuti, nomen inuenerunt. Horum morsus letalis ferè semper fuerit, nisi (ut Dioscorides inquit) demorsum membrum statim à reliquo corpore abscindatur, amputeturq; aut saltem illico omnis caro, quæ demorsum ambit locum, circuncidatur. Immanis hæc fera (ut refert Aëtius) cubitalis est longitudinis, longissima duorum est cubitorum, corpore uerò arenosa, & iuxta caudam desquamata. Eminentias habet in capite duas, cornuum similitudine: partes uero circa uentrem ex ordine squamis obsitæ sunt. quapropter in serpendo sonum sibilum similem edit: per obliquum autem, non recta prorepat. Ceterum percussis ab ea, eleuatio ac tumor plagæ capitis clauum similitudine insurgit, & sanies profluit uini colore, aut nigricans, & maxime per ambitum, uelut in cruentatis ac sugillatis alijs fieri consuevit. Reliqua item, quæ in uiperæ morsu dicta sunt, etiam his succedunt, cum intensione uehementiori. Vt plurimum uerò usq; ad nonum diem supersunt. Remedia autem eadem, quæ morsis à uipera conferunt, hæc Aëtius.

**ASPIS.**

**CAP. LIIII.**

**AB ASPIDE** ictus vulnus exiguum prorsus, quasi ab adaucta acu citra tumorem conspicitur: sanguis exiguus ille quidem, sed ater distillat: caligo uelox oculos obnubit: labor in totum corpus multiplex, omnino leuis, & non sine uoluptate consequitur. Ideo Nicander perpulchrè cecinit. At uir perit absque labore, uirens, atq; discolor. mediocris stomachi dolor afficit: frons perpetuò reuellitur: genæ contremiscunt, quasi sine sensu in somno uacillent. hos mors tollit, ad diei trientem non dilata. Cæterum ijs, qui ab aspide feriuntur, quæ de cerasite scripta sunt, auxilia dari debent. Nam uenenum hoc, quemadmodum basilisci, aut sanguis bubulus, celerrimè in arterijs sanguinem cogit.

Aspidis perniciosis ictus, & genera.

**REPERIO** apud eos autores, qui animalium historias tradunt, tria Aspidum genera constitui, & unumquodque ubi hominem morsu comprehenderit, celerrimè mortem inferre: quippe tanta est earum ueneni uis in hominum necem, ut rarissime seruentur, qui ab eis percussi fuerint. De his scribens Galenus libro de theriacis ad Pisonem, sic inquit. Inter aspidem nominata pyas collum exporrigens, & spatij metita longitudinem, perinde ac si tunc rationalis fera facta esset, uenenum solerter corporibus inspiat. Harum itaq; sexarum una (siquidem tria sunt Aspidum genera, pyas dicta, chersæa, & chelidonia) reginam ferunt Cleopatram, eam uellet custodes latere, statim, & citra suspicionem mortem sibi consciuisse. Hæc ille, qui subinde pluribus historiam enarrauit tam inuicti animi huiusce moribunda reginæ. Ceterum chelidoniam uocatam, id nominis sibi comparasse uolunt, quod hirundinum modo dorso nigricet, & candicet aluo. quemadmodum & pyas altera dicitur, quod in hominem expuat. chersæa uerò ita dicta est, quod in mediterraneis semper degat.

Aspidum historia, ictus non tantum, & cura.

Harum omnium meminit Aëtius libro xlii. cap. xx. sic inquit. Aspidum apud scriptores tres species reperiuntur. quedam enim ex eis terrestres appellantur: quedam uerò chelidoniæ, quæ circa fluuiorum ripas, præsertim Nili, latibula habent: aliæ uerò pyades nominantur. Terrestres quidem igitur maiores sunt, & quandoque usq; ad quinque cubitorum longitudinem reperiuntur. Maxime uerò pyades, cinereo sunt colore, uiridq; & ad auri colorem inclinante. Terrestres uerò ut plurimum & ipsæ cineræ sunt coloris, quanquam & subuirides reperiuntur. Ceterum accessiones, & signa communia sunt in his, quos aspidem momordit. Vulnere enim in demorso loco, uelut ab acu puncta inueniuntur: bina quidem ex maris morsu, ex femellæ uerò quatuor citra magnum dolorem, à quibus nihil effluit, nisi uolentum animal sit, quod morsum inflixit. Consequitur autem stupor, pallor, frontis refrigeratio, aspidum hiatus, palpebrarum nictationes, colli inclinatio, capitis grauitas, segnities, & collapsio in somnum profundum: ad finem uerò & conuulsio. Mors autem in tribus ad summum hominis ex terrestri morsu sequitur: in chelidoniæ uerò ictu præsentissima adest. Porro his, qui à pyade conspuuntur, caligo oculorum succedit, & cordis dolor, faciei tumor, ac auditus corruptio: tardius autem mors consequitur. Auxilium autem ab aspide morfi ferunt, & præsertim quos pyas momordit, ex acerrimi aceti potu: dandum autem est, quousque aceti qualitatem circa dextram præcordiorum partem perceptent. hepar enim in morsu ab aspide primum aiunt sensu priuari. Ceterum ad prænotionem, an uicturus sit percussus, centaurium cum uino tritum bibendum præbent: siquidem enim euomet pharmacum, morietur: si non, uiuet. Quo uerò ueneni in corpus distributi uis probè euomatur, allia trita cum xytho exhibenda sunt, donec nauſeabundus reddatur malè affectus. aut opopanax cum uino diluto detur, & confestim euomet. Numius autem inquit. Origanum uiridem, aut aridam pro ægri uiribus cum uino dato. Post uomitum antidotis theriacis utendum, & communibus remedijs prædictis. Utilliter autem ad plagam imponuntur post cucurbitarum adhibitionem, & scarificationem, centaurium cum myrrha, & modico opio. Rumex autem si cataplasmatibus modo imponatur, nihil lædatur. Præter opinionem uerò auxiliatur theriace tum plagæ imposita, tum pota. Profunt autem & aspidum excitationes cum euulsionibus, & plagis, & uniuersi corporis motus, & aqua marina calida pro fomento aspersa. Hactenus de aspidibus Aëtius. Efficacissimum porro, et omnium, quantum equidem expertus sum, præstantissimum antidotum contra uenenosum ictum aspidum, quas surdas dicunt, que in



que in Italia pluribus in locis reperiuntur, est nostra quinta essentia, ex aqua uitæ & antidoto nostro confecta. Quippe cum tenuium admodum sit partium, istius oculi in uniuersum corpus diffunditur, uenas, & arterias confestim permeans. Vnde prohibet, ne sanguis & spiritus in uasis refrigerati cogantur: atque aucto calore innato, ueneni uim æret potentissimè, idq; superat citissimè.

ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ. BASILISCVS.

CAP. LV.

ERASISTRATVS in libro, quem de medicaminibus, & uenenis condidit, de uocato basilisco scitè ita refert. Cùm basiliscus momorderit, vulnus ad auri colorem efflauescit. Itaq; in plurimis, quæ virus ei aculantur, comites notæ ita se habent. Ad basilisci morsum, ut idem Erasistratus author est, auxiliatur castorij drachma in uino pota: item papaueris succus. Ictuum remedia ita se habent.

MULTIPLEX uariâq; est apud ferarum scriptores Basilisci historia, quem Latini Regulum uocant. Sunt enim qui scribant tantæ perniciæ animal esse Basiliscum, ut solo oculorum intuitu, alij sibilo tantum, alij halitu, alij uerò morsu, homines statim interimat. Nec desunt qui uulgi opinionem secuti, ex antiqui galli ovo hanc sæuissimam feram nasci putant. Ex hac itaque historie uarietate, ac inconstantia facile adducor, ut credam, plerosque historiam basilisci, ut fabularem, descripsisse. Id quod etiam probè Dioscorides sensisse, atq; adeo nostro iudicio adstipulari uidetur. Siquidem is ne cum alijs accusaretur, Erasistratum citauit, authoremq; historie huius fecit. Basilisci meminit Galenus libro de theriaca ad Pisonem (si tamen liber ille inter legitimos censetur) ubi sic inquit. Basiliscus bellua subflaua, & triplici frontis apice munita, tantummoda conspectus, & quando sibilat auditus, uidentes se, & audientes necat: atq; si quod aliud animal illum etiam mortuum attingit, statim moritur. Hinc aiunt omne aliud reptilium genus cauere, ne basilisco uicinum habitet. Libro uerò x. capite primo de simplicium medicamentorum facultatibus idem contra Xenocratem scribens, non omnino Basilisci historiam comprobare uidetur, sic inquit. Nam bestiam seu feram regiam, quam uocant ΒΑΣΙΛΙΝΔΩΝ ΘΥΓΙΩΝ, ne uidere quidem mihi unquam contigit: & si uera sunt, quæ de illa referuntur, periculosum etiam est uel propè accedere ad hoc animal. Aelianus præterea Basiliscum tanta ueneni acuitate, & immanitate pollere ait, ut quauis magnitudine dodrantalem non excedat mensuram; serpentes tamen omnes etiam ingentes suo duntaxat halitu extinguat, adeo ut uirga quoque è longinquo contactus, illico tangentem conficiat. Huius item horrendissimæ feræ historiam tradidit Plinius libro viii. capite xxi. ubi ita scriptum reliquit. Apud Hesperios Aethiopas fons est Nigris, ut plerique existimauere, Nili caput, ut argumenta, quæ diximus, persuadent. Iuxta hunc fera appellatur Catoblepas, modica aliouin, cæterisq; membris iners, caput tantum prægrauè egre ferens: id deiectum semper in terram. Aliàs internecio humani generis, omnibus, qui oculos eius uidere, confestim expirantibus. Eadem & Basilisci serpentis est uis. Cyrenaica hunc generat provincia, duodecim non amplius digitorum magnitudine, candida in capite macula, ut quodam diademate insigni. Sibilo omnes fugat serpentes: nec flexu multiplici, nec ut reliquæ, corpus impellit, sed celsus & erectus in medio incedens. Necat frutices non contactos modò, uerum & afflato: exurit herbas, rumpit saxa. Talis uis malo est. Creditum quondam ex equo occiso hasta, & per eam subeunte ut non equitem modò, sed equum quoque absumptum. Huic tali monstro (sæpe enim enectum concupiuere reges uidere) mustelarum uirus exitio est: adeo naturæ nihil placuit esse sine pari. Inijciunt eas cauernis, faciliè cognitæ sola tabe. Necant illæ simul odore, moriunturq; et naturæ pugnam conficiunt. Hæc de basilisco Plinius. Quem tamen plura cum alijs fabulosa narasse putamus. Nam si tantum oculorum intuitu, sibilo, aut halitu hominem interficit, non equidem uideo, quomodo factum sit, ut ij qui ipsum uiderunt, eiusq; faciem adnotarunt, ex quorum postea relatione huius feræ historiam plerique descripserunt, incolumes euaserint: præsertim cum tam paruum sit animal, ut nisi è propinquo loco conspici possit. Atque adeo hinc mihi impossibile uidetur, quin ipse aspicientes non uiderit, cum (ut Plinius refert) non multiplici flexu incedat, ut reliquæ feræ, sed celsus, & erectus: uel quòd ex infecto circumstante aëre, qui uiderunt non perierint. Ceterum cum Erasistratus his fabulis nullâ fortasse fidem adhiberet, certoq; sciret Basiliscum morsu tantum, ut aliæ feræ, homines interimere, eius duntaxat morsus curationem instituit. Verum quandoquidem huiusce ueneni uis adeo uehemens, & immanis existit, ut expugnari non possit, non est cur plura hic referam, quam ex Erasistrato memoriæ prodidit Dioscorides. Quem ducem & authorem secuti, ut ipse suis de medica materia libris hoc sexto finem imposuit; ita nos nostris in eos commentarijs, quos ad nostram communemq; rei medicæ studioforum utilitatem conscripsimus, iam extremam manum imponemus. Non obliui immensas gratias agere deo optimo maximo, cui & omnia accepta referimus, & honorem ac gloriam tribuimus sempiternam.

Basilisci varia historia.

Catoblepas.

Plura fabulosa in Basilisci historia.

LIBRI SEXTI ET VLTIMI FINIS.

VENETIIS, IN OFFICINA ERASMIANA,  
VINCENTII VALGRISII, MENSE  
IANUARIO, M. D. LIIII.